



N° 84F0209XIF au catalogue

Mortalité, liste sommaire des causes

2003



Statistique
Canada

Statistics
Canada

Canada

Comment obtenir d'autres renseignements

Toute demande de renseignements au sujet du présent produit ou au sujet de statistiques ou de services connexes doit être adressée à : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 (téléphone : 1 800 263-1136; 1 (613) 951-1746; courriel : hd-ds@statcan.ca).

Pour obtenir des informations sur l'ensemble des données de Statistique Canada qui sont disponibles, veuillez composer l'un des numéros sans frais suivants. Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel ou visiter notre site Web.

Service national de renseignements **1 800 263-1136**

Service national d'appareils de télécommunication pour les malentendants **1 800 363-7629**

Renseignements concernant le Programme des bibliothèques de dépôt **1 800 700-1033**

Télécopieur pour le Programme des bibliothèques de dépôt **1 800 889-9734**

Renseignements par courriel **infostats@statcan.ca**

Site Web **www.statcan.ca**

Renseignements sur les commandes et les abonnements

Le produit n° 84F0209XIF au catalogue est disponible gratuitement dans le site Internet de Statistique Canada. Les utilisateurs peuvent obtenir des exemplaires à www.statcan.ca sous la rubrique Produits et services.

Normes de service au public

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois, et ce, dans la langue officielle de leur choix. À cet égard, notre organisme s'est doté de *normes de service à la clientèle* qui doivent être observées par les employés lorsqu'ils offrent des services à la clientèle. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1 800 263-1136. Les normes de services sont aussi publiées sur www.statcan.ca sous À propos de Statistique Canada > Offrir des services aux Canadiens.



Statistique Canada
Division de la statistique de la santé

Mortalité, liste sommaire des causes

2003

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2006

Tous droits réservés. Le contenu de la présente publication peut être reproduit, en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, sans autre permission de Statistique Canada sous réserve que la reproduction soit effectuée uniquement à des fins d'étude privée, de recherche, de critique, de compte rendu ou en vue d'en préparer un résumé destiné aux journaux, et/ou à des fins non commerciales. Statistique Canada doit être cité comme suit : Source (ou « Adapté de », s'il y a lieu) : Statistique Canada, nom du produit, numéro au catalogue, volume et numéro, période de référence et page(s). Autrement, il est interdit de reproduire quelque contenu de la présente publication, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, ou de le transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, reproduction électronique, mécanique, photographique, pour quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable des Services d'octroi de licences, Division des services à la clientèle, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Mars 2006

N° 84F0209XIF au catalogue

ISSN 1718-3952

Périodicité : annuelle

Ottawa

This publication is available in English upon request (Catalogue no. 84F0209XIE).

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

Informations pour l'utilisateur

Signes conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada :

- . indisponible pour toute période de référence
- .. indisponible pour une période de référence précise
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- 0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
- 0^s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie
- p provisoire
- r révisé
- x confidentiel en vertu des dispositions de la *Loi sur la statistique*
- E à utiliser avec prudence
- F trop peu fiable pour être publié

Remerciements

Statistique Canada tient à manifester sa gratitude envers les provinces et territoires qui nous ont fourni, de leurs registres des statistiques de l'état civil, les données sur la mortalité qui apparaissent dans ce rapport.

Introduction

Cette publication contient des tableaux statistiques qui présentent le nombre de décès selon l'âge, le sexe et la cause initiale de décès regroupée pour le Canada, les provinces et les territoires. Les tableaux incluent aussi les taux de mortalité selon l'âge et les taux de mortalité normalisés selon l'âge pour chaque groupe de causes initiales de décès.

Note sur le contenu

La cause initiale de décès est classifiée selon la Dixième révision de la Classification internationale des maladies (CIM-10) de l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui. La cause initiale de décès était classifiée selon la Neuvième révision de la Classification internationale de maladies (CIM-9) de 1979 à 1999.

Note sur l'historique

À partir de la parution des données de l'an 2000, cette publication remplace les tableaux standards **Mortalité, liste sommaire des causes**, n° 84F0209X au catalogue (publiés en format papier pour les années 1997 à 1999) et n° 84F0209X au catalogue (publiés en format PDF pour l'année 1997 seulement). Les tableaux standards ont remplacé la publication **Mortalité – Liste sommaire des causes**, n° 84-209-X au catalogue.

Publication, parution des données de l'an 2003

Cette parution de la publication annuelle en HTML et PDF contient des tableaux de données pour l'an 2003 ainsi que les faits saillants et l'analyse appropriés.

Données de 2000 à 2003 dans CANSIM, disponibles dès la première parution de la publication

L'accès gratuit aux données de 2000 à 2003 est permis via une interface spéciale de CANSIM. L'accès direct aux tableaux CANSIM se fait de trois façons différentes dans le produit HTML :

Section **Tableaux** :

- Tableaux CANSIM connexes
- Tableaux individuels, dans la Source

Section **Produits connexes** :

- Choisis parmi les tableaux de CANSIM de Statistique Canada

Table des matières

Faits saillants	6
Analyse	7
Produits connexes	10
Tableaux statistiques	
1 Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie	13
1-1 Canada	13
1-2 Terre-Neuve-et-Labrador	16
1-3 Île-du-Prince-Édouard	19
1-4 Nouvelle-Écosse	22
1-5 Nouveau-Brunswick	25
1-6 Québec	28
1-7 Ontario	31
1-8 Manitoba	34
1-9 Saskatchewan	37
1-10 Alberta	40
1-11 Colombie-Britannique	43
1-12 Territoire du Yukon	46
1-13 Territoires du Nord-Ouest	49
1-14 Nunavut	52
2 Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada	55
2-1 Moins d'un an	55
2-2 1 à 4 ans	58
2-3 5 à 9 ans	61
2-4 10 à 14 ans	64
2-5 15 à 19 ans	67
2-6 20 à 24 ans	70
2-7 25 à 29 ans	73
2-8 30 à 34 ans	76
2-9 35 à 39 ans	79
2-10 40 à 44 ans	82
2-11 45 à 49 ans	85

Table des matières – suite

2-12	50 à 54 ans	88
2-13	55 à 59 ans	91
2-14	60 à 64 ans	94
2-15	65 à 69 ans	97
2-16	70 à 74 ans	100
2-17	75 à 79 ans	103
2-18	80 à 84 ans	106
2-19	85 à 89 ans	109
2-20	90 ans et plus	112
Qualité des données, concepts et méthodologie		
	Définitions	115
	Statistique de l'état civil — Base de données sur les décès	119
	Statistique de l'état civil — Base de données sur les naissances	125
	Estimations de la population selon l'âge et le sexe pour le Canada, les provinces et les territoires	130
	Notes explicatives pour les tableaux	132
Appendice		
I.	Liste sommaire des causes de décès	135

Faits saillants

- L'espérance de vie à la naissance pour les hommes et pour les femmes a atteint un niveau record en 2003, selon de nouvelles données sur la mortalité.
- Le nombre de décès est en hausse depuis un certain nombre d'années, du fait de l'augmentation et du vieillissement de la population. En 2003, 226 169 personnes sont décédées au Canada, une hausse de 1,2 % par rapport aux 223 603 décès enregistrés l'année précédente. Durant cette même période, la population canadienne a augmenté de 1,0 %.
- Afin d'éliminer les effets du vieillissement de la population sur les taux de mortalité, on utilise les « taux de mortalité normalisés selon l'âge » en faisant des comparaisons temporelles. Le taux de mortalité normalisé selon l'âge pour les deux sexes confondus a diminué en 2003, pour s'établir à 586,9 décès pour 100 000 habitants, comparativement à 598,2 en 2002. Ce taux a diminué progressivement à chaque année depuis son dernier sommet atteint en 1993 quand il s'est établi à 694,9 décès.
- L'espérance de vie à 65 ans, qui correspond au nombre d'années en moyenne qu'une personne âgée de 65 ans pourrait s'attendre à vivre, s'est améliorée tant pour les hommes que pour les femmes en 2003.
- Le taux de mortalité infantile, soit les décès au cours de la première année de vie, a diminué pour s'établir à 5,3 décès pour chaque 1 000 naissances vivantes, comparativement à 5,4 en 2002.
- Au cours du dernier quart de siècle, les causes principales de décès au Canada ont été les maladies de l'appareil circulatoire et les tumeurs malignes, ou le cancer. En 2003, les maladies de l'appareil circulatoire et le cancer confondus ont causé 6 décès sur 10 (62,0 %).
- En 2003, les maladies de l'appareil circulatoire et le cancer confondus ont causé 6 décès sur 10 (62,0 %).
- Plus de 55 % de tous les décès dus au cancer en 2003 étaient dus à une tumeur maligne localisée dans l'un des cinq sièges suivants : poumon, colorectal, sein chez la femme, prostate chez l'homme et pancréas.
- Le cancer du poumon a causé 26,3 % de tous les décès dus au cancer en 2003, ce qui représente la proportion la plus grande de tous les sièges. Le nombre de décès dus au cancer du poumon a augmenté de 1,1 % par rapport à 2002, pour s'établir à 17 374 en 2003.
- Le taux de mortalité normalisé selon l'âge pour le cancer du poumon, lequel élimine les effets d'une population vieillissante, a diminué en 2003 pour les deux sexes confondus, pour s'établir à 47,0 décès pour 100 000 habitants, comparativement à 47,8 en 2002.
- Le Canada a connu deux éclosions importantes de maladies infectieuses en 2003. Les données nationales de mortalité montrent que 511 décès sont attribuables au *Clostridium difficile* (*C. difficile*) et 30 décès au syndrome respiratoire aiguë sévère (SRAS) chez les Canadiens en 2003. Tous les décès attribuables au SRAS ont eu lieu en Ontario.

Analyse

L'espérance de vie à la naissance pour les hommes et pour les femmes a atteint un niveau record en 2003, selon de nouvelles données sur la mortalité.

Pour les deux sexes confondus, l'espérance de vie à la naissance est passée de 79,7 ans en 2002 à un sommet sans précédent de 79,9 ans.

Les deux sexes ont contribué à cette hausse. L'espérance de vie à la naissance pour les femmes a augmenté de 0,3 an en 2003 par rapport à l'année précédente, leur espérance de vie se situant à un niveau jamais atteint auparavant, soit 82,4 ans.

L'espérance de vie à la naissance pour les hommes a aussi atteint un niveau record de 77,4 ans en 2003, en hausse de 0,2 an par rapport à l'année précédente. L'augmentation a été légèrement plus faible que pour les femmes.

De ce fait, l'écart entre l'espérance de vie des hommes et celle des femmes s'est élargi très légèrement en 2003, passant à 5,0 ans, comparativement à 4,9 ans en 2002.

Au cours du dernier quart de siècle, le plus grand écart entre l'espérance de vie des femmes et des hommes a eu lieu en 1979. Cette année-là l'écart était de 7,4 ans. Entre 1979 et 2003, l'écart s'est rétréci, car l'espérance de vie des hommes s'est améliorée de 6,0 années et celle des femmes de 3,6 années.

Au cours de cette période de 24 ans, les hommes ont eu en moyenne un gain d'une année d'espérance de vie à chaque quatre années civiles, tandis que l'espérance de vie des femmes s'est accrue en moyenne d'un an à chaque 6,7 années civiles.

Au niveau provincial, l'espérance de vie en 2003 pour les deux sexes confondus était la plus élevée en Colombie-Britannique et en Ontario.

Augmentation du nombre de décès du fait du vieillissement de la population

Le nombre de décès est en hausse depuis un certain nombre d'années, du fait de l'augmentation et du vieillissement de la population. En 2003, 226 169 personnes sont décédées au Canada, une hausse de 1,2 % par rapport aux 223 603 décès enregistrés l'année précédente. Durant cette même période, la population canadienne a augmenté de 1,0 %.

Le nombre de décès a augmenté dans chaque province et territoire, sauf à l'Île-du-Prince-Édouard, au Québec et au Yukon, où il a diminué.

Baisse du taux de mortalité normalisé selon l'âge

Afin d'éliminer les effets du vieillissement de la population sur les taux de mortalité, on utilise les « taux de mortalité normalisés selon l'âge » en faisant des comparaisons temporelles. Le taux de mortalité normalisé selon l'âge pour les deux sexes confondus a diminué en 2003, pour s'établir à 586,9 décès pour 100 000 habitants, comparativement à 598,2 en 2002. Ce taux a diminué progressivement à chaque année depuis son dernier sommet atteint en 1993 quand il s'est établi à 694,9 décès.

Le taux a poursuivi sa tendance à la baisse pour les hommes en 2003, s'établissant à 733,4 décès pour 100 000 habitants, comparativement à 747,8 décès en 2002. Ce niveau est en baisse par rapport à son dernier sommet de 902,1 en 1993.

Le taux de mortalité normalisé selon l'âge a aussi diminué pour les femmes, s'établissant à 475,4 décès pour 100 000 habitants, après avoir augmenté à 485,7 en 2002. Cette année-là, on a observé une augmentation de ce taux pour la première fois en neuf ans.

Amélioration de l'espérance de vie des personnes âgées

L'espérance de vie à 65 ans, qui correspond au nombre d'années en moyenne qu'une personne âgée de 65 ans pourrait s'attendre à vivre, s'est améliorée tant pour les hommes que pour les femmes en 2003.

Les hommes âgés de 65 ans en 2003 pouvaient s'attendre à vivre en moyenne 17,4 années de plus, tandis que les femmes pouvaient s'attendre à vivre 20,8 années de plus.

En 2002, les chiffres comparables étaient 17,2 ans pour les hommes et 20,6 ans pour les femmes. L'écart entre les deux sexes est demeuré le même, soit 3,4 ans.

Baisse légère du taux de mortalité infantile

Le taux de mortalité infantile, soit les décès au cours de la première année de vie, a diminué pour s'établir à 5,3 décès pour chaque 1 000 naissances vivantes, comparativement à 5,4 en 2002.

La baisse de la mortalité infantile est due à un déclin à la fois du nombre de décès et du taux de mortalité des enfants âgés entre 7 et 364 jours. Le nombre de ces décès a chuté à 668 en 2003, comparativement à 696 en 2002. Ceci représente une diminution de 4,0 %. De plus, le taux de mortalité des enfants âgés entre 7 et 364 jours est passé de 2,1 décès pour chaque 1 000 naissances à 2,0.

Les taux de mortalité des enfants âgés de moins d'un jour et des enfants âgés entre 1 et 6 jours sont restés au même niveau qu'en 2002. Ainsi, en 2002 et 2003, le taux de mortalité des enfants âgés de moins d'un jour était de 2,5 décès pour 1 000 naissances et celui des enfants âgés entre 1 et 6 jours était de 0,7 décès.

En 2003, le taux de mortalité infantile masculine s'établissait à 5,7 décès pour 1 000 naissances vivantes, tandis que le taux de mortalité infantile féminine se situait à 4,8. Ces deux taux ont connu une baisse légère de 0,1 an par rapport à 2002.

Il y a eu 1 765 décès infantiles en 2003. Ce nombre était presque le même que celui de 2002, année où il y a eu 1 762 décès infantiles. Par ailleurs, le nombre de naissances vivantes a fait un bond de 1,9 % en 2003.

Le taux de mortalité infantile était supérieur au taux national dans les trois provinces des Prairies — Manitoba, Saskatchewan et Alberta — et dans les trois territoires. Le taux de mortalité infantile de l'Alberta a connu une baisse substantielle en 2003, pour s'établir à 6,6 décès infantiles pour 1 000 naissances vivantes, comparativement à 7,3 en 2002.

Six décès sur dix sont dus aux maladies de l'appareil circulatoire et au cancer

Au cours du dernier quart de siècle, les causes principales de décès au Canada ont été les maladies de l'appareil circulatoire et les tumeurs malignes, ou le cancer.

En 2003, les maladies de l'appareil circulatoire et le cancer confondus ont causé 6 décès sur 10 (62,0 %).

Les décès dus aux maladies de l'appareil circulatoire ont représenté presque le tiers (32,8 %) de tous les décès en 2003. Toutefois, le nombre de décès dus à ce groupe de causes représentait presque la moitié (47,3 %) de tous les décès en 1979.

Le cancer a causé 65 990 décès en 2003, une hausse de 1,4 % par rapport à 2002. Depuis 1979, la proportion de tous les décès dus au cancer est passée de 22,9 % cette année-là à 29,2 % en 2003.

Les décès dus aux maladies de l'appareil circulatoire et le cancer sont plus fréquents quand les gens avancent en âge, et la population canadienne vieillit. Les taux de mortalité normalisés selon l'âge éliminent les effets du vieillissement de la population sur les tendances de la mortalité.

Le taux de mortalité normalisé selon l'âge de décès dus aux maladies de l'appareil circulatoire a diminué considérablement au cours du dernier quart de siècle, de 408,8 décès pour 100 000 habitants en 1979, à 185,9 décès en 2003.

Au cours de la même période, le taux de mortalité normalisé selon l'âge de décès dus au cancer a diminué beaucoup plus lentement, il est passé de 187,8 décès pour 100,000 habitants en 1979 et s'établit à 175,6 décès en 2003.

Les décès dus au cancer sont principalement liés à cinq sièges

Plus de 55 % de tous les décès dus au cancer en 2003 étaient dus à une tumeur maligne localisée dans l'un des cinq sièges suivants : poumon, colorectal, sein chez la femme, prostate chez l'homme et pancréas.

Le cancer du poumon a causé 26,3 % de tous les décès dus au cancer en 2003, ce qui représente la proportion la plus grande de tous les sièges. Le nombre de décès dus au cancer du poumon a augmenté de 1,1 % par rapport à 2002, pour s'établir à 17 374 en 2003.

Le taux de mortalité normalisé selon l'âge pour le cancer du poumon, lequel élimine les effets d'une population vieillissante, a diminué en 2003 pour les deux sexes confondus, pour s'établir à 47,0 décès pour 100 000 habitants, comparativement à 47,8 en 2002.

Dans le cas des hommes, le taux de mortalité normalisé selon l'âge pour le cancer du poumon est passé de 65,6 pour 100 000 habitants en 2002 à 65,1 en 2003. Le taux de mortalité masculin pour le cancer du poumon a atteint son sommet à la fin des années 1980, en s'établissant à 81,3 décès pour 100 000 habitants en 1988. Les taux normalisés selon l'âge du cancer colorectal et du cancer de la prostate ont aussi diminué chez les hommes en 2003, ils se sont établis respectivement à 23,0 et 22,8 décès pour 100 000 habitants. Ces deux taux avaient culminé en 1995.

Au cours du dernier quart de siècle, le taux de mortalité du cancer du poumon chez les femmes a doublé, passant de 16,3 décès en 1979 à 35,4 décès pour 100 000 habitants en 2003. Par opposition, les taux de mortalité du cancer colorectal et du cancer du sein chez la femme ont chuté en 2003, se situant respectivement à 14,6 et 24,1 décès pour 100 000 femmes. Ainsi, cette tendance à la baisse qui a débuté au milieu des années 1980 se poursuit.

Les décès dus au cancer du pancréas ont fait un bond de 7,5 % en 2003, pour s'établir à 3 411 pour les deux sexes confondus. Le taux de mortalité normalisé selon l'âge pour le cancer du pancréas a augmenté un peu en 2003, passant de 8,7 décès pour 100 000 habitants en 2002 à 9,1 en 2003. Le taux de mortalité chez les hommes était de 10,3 décès pour 100 000 habitants, et celui chez les femmes, de 8,1, les deux taux étant un peu plus élevés qu'en 2002.

Éclosions de maladies infectieuses en 2003

Le Canada a connu deux éclosions importantes de maladies infectieuses en 2003. Les données nationales de mortalité montrent que 511 décès sont attribuables au *Clostridium difficile* (*C. difficile*) et 30 décès au syndrome respiratoire aiguë sévère (SRAS) chez les Canadiens en 2003. Tous les décès attribuables au SRAS ont eu lieu en Ontario.

Étant donné que le SRAS est une nouvelle maladie, on ne dispose pas de données sur les tendances. En ce qui a trait à *C. difficile*, on a assisté à une hausse de 67,5 % des décès en 2003 comparativement à 2002.

La presque totalité de la hausse a été enregistrée au Québec, où le nombre de décès dus à cette infection est passé à 355 en 2003, soit plus du double du nombre observé en 2002.

Produits connexes

Choisis parmi les publications de Statistique Canada

82-221-X	Indicateurs de la santé
84-208-X	Causes de décès
84-548-X	Comparabilité de la CIM-10 et de la CIM-9 pour les statistiques de la mortalité au Canada
84F0211X	Décès

Choisis parmi les tableaux de CANSIM de Statistique Canada

102-0521	Décès, selon la cause, Chapitre I : Certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99), le groupe d'âge et le sexe, Canada
102-0522	Décès, selon la cause, Chapitre II : Tumeurs (C00-D48), le groupe d'âge et le sexe, Canada
102-0523	Décès, selon la cause, Chapitre III : Maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certains troubles du système immunitaire (D50-D89), le groupe d'âge et le sexe, Canada
102-0524	Décès, selon la cause, Chapitre IV : Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90), le groupe d'âge et le sexe, Canada
102-0525	Décès, selon la cause, Chapitre V : Troubles mentaux et du comportement (F00-F99), le groupe d'âge et le sexe, Canada
102-0526	Décès, selon la cause, Chapitre VI : Maladies du système nerveux (G00-G99), le groupe d'âge et le sexe, Canada
102-0527	Décès, selon la cause, Chapitre VII : Maladies de l'oeil et de ses annexes (H00-H59), le groupe d'âge et le sexe, Canada
102-0528	Décès, selon la cause, Chapitre VIII : Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde (H60-H95), le groupe d'âge et le sexe, Canada
102-0529	Décès, selon la cause, Chapitre IX : Maladies de l'appareil circulatoire (I00-I99), le groupe d'âge et le sexe, Canada
102-0530	Décès, selon la cause, Chapitre X : Maladies de l'appareil respiratoire (J00-J99), le groupe d'âge et le sexe, Canada
102-0531	Décès, selon la cause, Chapitre XI : Maladies de l'appareil digestif (K00-K93), le groupe d'âge et le sexe, Canada

102-0532	Décès, selon la cause, Chapitre XII : Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L00-L99), le groupe d'âge et le sexe, Canada
102-0533	Décès, selon la cause, Chapitre XIII : Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M00-M99), le groupe d'âge et le sexe, Canada
102-0534	Décès, selon la cause, Chapitre XIV : Maladies de l'appareil génito-urinaire (N00-N99), le groupe d'âge et le sexe, Canada
102-0535	Décès, selon la cause, Chapitre XV : Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99), le groupe d'âge et le sexe, Canada
102-0536	Décès, selon la cause, Chapitre XVI : Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96), le groupe d'âge et le sexe, Canada
102-0537	Décès, selon la cause, Chapitre XVII : Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99), le groupe d'âge et le sexe, Canada
102-0538	Décès, selon la cause, Chapitre XVIII : Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99), le groupe d'âge et le sexe, Canada
102-0540	Décès, selon la cause, Chapitre XX : Causes externes de morbidité et de mortalité (V01-Y89), le groupe d'âge et le sexe, Canada
102-0551	Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires
102-0552	Décès, selon certains groupes de causes et le sexe, Canada, provinces et territoires

Choisis parmi les enquêtes de Statistique Canada

3231	Statistique de l'état civil - Base de données sur les naissances
3233	Statistique de l'état civil - Base de données sur les décès
3604	Estimations de la population selon l'âge et le sexe pour le Canada, les provinces et les territoires

Choisis parmi les tableaux du Canada en statistiques de Statistique Canada

- *Taux de mortalité infantile, par province et territoire*
- *Suicides et taux de suicide selon le sexe et l'âge*
- *Espérance de vie à la naissance, selon le sexe, par provinces*
- *Taux de mortalité normalisés, selon certaines causes de décès et le sexe*

Tableaux statistiques

Tableau 1-1

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Canada¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89) 3, 4, 5	226 169	114 905	111 264	714,4	732,9	696,2	586,9	733,4	475,4
Infections à la salmonelle (A01-A02)	8	0	8	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	576	239	337	1,8	1,5	2,1	1,4	1,6	1,3
Tuberculose (A16-A19)	93	51	42	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	71	40	31	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	22	11	11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Coqueluche (A37)	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	2	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	21	6	15	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
Septicémie (A40-A41)	1 552	738	814	4,9	4,7	5,1	4,0	4,8	3,5
Syphilis (A50-A53)	5	4	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	394	259	135	1,2	1,7	0,8	1,0	1,4	0,7
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	440	373	67	1,4	2,4	0,4	1,3	2,1	0,4
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	485	258	227	1,5	1,6	1,4	1,3	1,7	1,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	65 990	34 701	31 289	208,4	221,3	195,8	175,6	215,3	148,1
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	1 018	691	327	3,2	4,4	2,0	2,7	4,1	1,5
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	1 413	1 052	361	4,5	6,7	2,3	3,8	6,3	1,7
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	1 944	1 188	756	6,1	7,6	4,7	5,2	7,4	3,5
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	6 938	3 711	3 227	21,9	23,7	20,2	18,3	23,0	14,6
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	1 501	945	556	4,7	6,0	3,5	4,0	5,7	2,6
Tumeur maligne du pancréas (C25)	3 441	1 687	1 754	10,9	10,8	11,0	9,1	10,3	8,1
Tumeur maligne du larynx (C32)	465	375	90	1,5	2,4	0,6	1,3	2,3	0,4
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	17 374	10 203	7 171	54,9	65,1	44,9	47,0	62,7	35,4
Mélanome malin de la peau (C43)	748	455	293	2,4	2,9	1,8	2,0	2,7	1,5
Tumeur maligne du sein (C50)	5 097	37	5 060	16,1	0,2	31,7	13,3	0,2	24,1
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	377	2,4	1,9
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	731	4,6	3,5
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	1 573	9,8	7,6
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	3 658	23,3	24,1	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	1 384	862	522	4,4	5,5	3,3	3,7	5,3	2,4
Tumeur maligne de la vessie (C67)	1 586	1 100	486	5,0	7,0	3,0	4,1	7,0	2,1
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	1 587	897	690	5,0	5,7	4,3	4,4	5,3	3,6
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	6 243	3 417	2 826	19,7	21,8	17,7	16,7	21,2	13,2
Maladie de Hodgkin (C81)	107	59	48	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	2 550	1 380	1 170	8,1	8,8	7,3	6,8	8,4	5,5
Leucémie (C91-C95)	2 303	1 308	995	7,3	8,3	6,2	6,2	8,2	4,6
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	1 279	668	611	4,0	4,3	3,8	3,4	4,2	2,8
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	4	2	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	8 912	4 423	4 489	28,1	28,2	28,1	23,5	27,7	20,5
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes, et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	1 433	739	694	4,5	4,7	4,3	3,7	4,8	3,0
Anémies (D50-D64)	532	210	322	1,7	1,3	2,0	1,3	1,4	1,2
Diabète sucré (E10-E14)	7 970	3 991	3 979	25,2	25,5	24,9	20,5	25,2	16,9
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	232	88	144	0,7	0,6	0,9	0,6	0,6	0,5
Malnutrition (E40-E46)	194	70	124	0,6	0,4	0,8	0,5	0,5	0,5
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	38	18	20	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Méningite (G00, G03)	55	28	27	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Maladie de Parkinson (G20-G21)	1 679	928	751	5,3	5,9	4,7	4,2	6,1	3,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	5 504	1 631	3 873	17,4	10,4	24,2	13,1	11,1	13,9
Maladies cardio-vasculaires graves (I00-I78)	73 827	37 004	36 823	233,2	236,0	230,4	185,0	238,4	144,0
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	52 974	27 950	25 024	167,3	178,3	156,6	133,3	178,9	98,2
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	502	173	329	1,6	1,1	2,1	1,3	1,1	1,5

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-1 – suite

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Canada¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Cardiopathie hypertensive (I11)	594	224	370	1,9	1,4	2,3	1,5	1,4	1,4
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	122	54	68	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	40 608	22 452	18 156	128,3	143,2	113,6	102,4	142,9	71,3
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	18 662	10 643	8 019	58,9	67,9	50,2	47,5	67,0	32,2
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	627	322	305	2,0	2,1	1,9	1,6	2,0	1,2
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	21 319	11 487	9 832	67,3	73,3	61,5	53,4	73,8	37,8
Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi (I25.0)	1 554	920	634	4,9	5,9	4,0	4,0	5,7	2,6
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	19 765	10 567	9 198	62,4	67,4	57,6	49,3	68,1	35,2
Autres cardiopathies (I26-I51)	11 148	5 047	6 101	35,2	32,2	38,2	27,8	33,2	23,8
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	90	54	36	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	81	38	43	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Insuffisance cardiaque (I50)	4 284	1 756	2 528	13,5	11,2	15,8	10,3	12,1	9,1
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	6 693	3 199	3 494	21,1	20,4	21,9	17,1	20,6	14,3
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	1 259	448	811	4,0	2,9	5,1	3,1	3,0	3,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	15 283	6 332	8 951	48,3	40,4	56,0	37,7	41,6	34,7
Athérosclérose (I70)	1 335	609	726	4,2	3,9	4,5	3,2	4,1	2,7
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	2 976	1 665	1 311	9,4	10,6	8,2	7,7	10,8	5,4
Anévrisme aortique et dissection (I71)	1 870	1 136	734	5,9	7,2	4,6	4,9	7,3	3,1
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	1 106	529	577	3,5	3,4	3,6	2,8	3,5	2,3
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	428	184	244	1,4	1,2	1,5	1,1	1,1	1,1
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	4 957	2 176	2 781	15,7	13,9	17,4	12,0	15,0	10,4
Grippe (J10-J11)	218	84	134	0,7	0,5	0,8	0,5	0,6	0,5
Pneumopathie (J12-J18)	4 739	2 092	2 647	15,0	13,3	16,6	11,5	14,4	9,8
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	69	25	44	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	40	13	27	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	29	12	17	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	10 162	5 468	4 694	32,1	34,9	29,4	25,8	36,0	19,9
Bronchite chronique et non précisée (J40-J42)	1577	73	84	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,3
Emphysème (J43)	698	437	261	2,2	2,8	1,6	1,8	2,8	1,2
Asthme (J45-J46)	287	96	191	0,9	0,6	1,2	0,8	0,6	0,9
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	9 020	4 862	4 158	28,5	31,0	26,0	22,8	32,1	17,5
Pneumocoïnoses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	71	70	1	0,2	0,4	0,0	0,2	0,4	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	1 051	556	495	3,3	3,5	3,1	2,6	3,7	1,9
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	2 162	1 186	976	6,8	7,6	6,1	5,6	7,6	4,2
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	413	193	220	1,3	1,2	1,4	1,0	1,2	0,9
Maladies de l'appendice (K35-K38)	42	22	20	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Hernies (K40-K46)	240	102	138	0,8	0,7	0,9	0,6	0,7	0,5
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	2 352	1 539	813	7,4	9,8	5,1	6,4	8,9	4,1
Maladie alcoolique du foie (K70)	1 155	845	310	3,6	5,4	1,9	3,1	4,8	1,7
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	1 197	694	503	3,8	4,4	3,1	3,2	4,1	2,4
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	316	155	161	1,0	1,0	1,0	0,8	1,0	0,6
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	3 503	1 723	1 780	11,1	11,0	11,1	8,7	11,4	7,0
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	25	12	13	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	48	29	19	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
Insuffisance rénale (N17-N19)	3 426	1 681	1 745	10,8	10,7	10,9	8,5	11,1	6,8
Autres maladies des reins (N25, N27)	4	1	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	97	31	66	0,3	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	58	0,4	0,4	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	13	0,1	0,1
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	23	0,1	0,2
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	2	0,0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	21	0,1	0,2
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	991	552	439	3,1	3,5	2,7	4,2	4,6	3,8

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-1 – suite

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Canada¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	912	461	451	2,9	2,9	2,8	3,3	3,3	3,2
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	3 079	1 605	1 474	9,7	10,2	9,2	8,4	10,4	6,5
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	20 330	8 347	11 983	64,2	53,2	75,0	51,4	54,0	48,3
Accidents (blessures involontaires) (V01-V99, Y85-Y86)	9 047	5 451	3 596	28,6	34,8	22,5	25,5	35,1	16,6
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	3 125	2 220	905	9,9	14,2	5,7	9,7	14,2	5,4
Accidents de véhicule à moteur ⁸	2 866	2 007	859	9,1	12,8	5,4	9,0	12,9	5,1
Autres accidents de transport terrestre ⁹	67	52	15	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	192	161	31	0,6	1,0	0,2	0,6	1,0	0,2
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	5 922	3 231	2 691	18,7	20,6	16,8	15,7	20,9	11,2
Chutes (W00-W19)	1 978	1 024	954	6,2	6,5	6,0	5,0	6,7	3,7
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	27	26	1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	266	214	52	0,8	1,4	0,3	0,8	1,4	0,3
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	196	120	76	0,6	0,8	0,5	0,6	0,8	0,4
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	886	615	271	2,8	3,9	1,7	2,7	3,8	1,6
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	2 569	1 232	1 337	8,1	7,9	8,4	6,6	8,2	5,2
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	3 765	2 903	862	11,9	18,5	5,4	11,3	17,8	5,1
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	618	585	33	2,0	3,7	0,2	1,8	3,5	0,2
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	3 147	2 318	829	9,9	14,8	5,2	9,5	14,3	4,8
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	447	326	121	1,4	2,1	0,8	1,5	2,1	0,8
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	138	112	26	0,4	0,7	0,2	0,5	0,8	0,2
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	309	214	95	1,0	1,4	0,6	1,0	1,4	0,6
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	6	6	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	643	430	213	2,0	2,7	1,3	1,9	2,6	1,2
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	7	7	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	636	423	213	2,0	2,7	1,3	1,9	2,5	1,2
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	193	88	105	0,6	0,6	0,7	0,5	0,6	0,5

- La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
- Les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité en 2003 sont les estimations postcensitaires mises à jour au 1er juillet 2003, rajustées pour le sous-dénombrement net au recensement et incluent les résidents non permanents. Ces estimations de population figurent dans la publication « Statistiques démographiques annuelles, 2004 » (numéro 91-213-XIB/XPB au catalogue).
- La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
- Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
- « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics », disponible à www.cdc.gov/nchs/data/dvs/im9_2002.pdf.
- Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
- Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
- Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
- Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Nota : Voir la section *Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.*

Source : Statistique Canada, *Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès et Division de la démographie (estimations de population) (Tableaux CANSIM 102-0551 et 102-0552).*

Tableau 1-2

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Terre-Neuve-et-Labrador¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	4 281	2 265	2 016	825,9	888,6	765,2	696,2	878,7	552,3
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	5	2	3	1,0	0,8	1,1	0,8	0,8	0,9
Tuberculose (A16-A19)	2	1	1	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,2
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	1	0	1	0,2	0,0	0,4	0,1	0,0	0,2
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	1	1	0	0,2	0,4	0,0	0,1	0,4	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	22	9	13	4,2	3,5	4,9	3,6	3,7	3,9
Syphilis (A50-A53)	1	1	0	0,2	0,4	0,0	0,1	0,2	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	3	0	3	0,6	0,0	1,1	0,6	0,0	1,1
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	2	2	0	0,4	0,8	0,0	0,3	0,7	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	3	0	3	0,6	0,0	1,1	0,5	0,0	0,8
Tumeurs malignes (C00-C97)	1 173	648	525	226,3	254,2	199,3	190,7	238,9	153,0
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	13	12	1	2,5	4,7	0,4	2,1	4,4	0,3
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	26	20	6	5,0	7,8	2,3	4,4	7,6	1,5
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	55	28	27	10,6	11,0	10,2	8,9	10,3	7,7
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	133	67	66	25,7	26,3	25,1	21,7	24,1	19,4
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	14	12	2	2,7	4,7	0,8	2,4	4,5	0,7
Tumeur maligne du pancréas (C25)	58	29	29	11,2	11,4	11,0	8,9	9,9	7,8
Tumeur maligne du larynx (C32)	7	6	1	1,4	2,4	0,4	1,1	2,3	0,3
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	293	194	99	56,5	76,1	37,6	49,0	70,9	30,7
Mélanome malin de la peau (C43)	20	12	8	3,9	4,7	3,0	3,3	4,2	2,5
Tumeur maligne du sein (C50)	91	2	89	17,6	0,8	33,8	14,2	0,8	24,4
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	5	1,9	1,6
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	12	4,6	3,4
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	30	11,4	9,1
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	66	25,9	26,6	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	26	15	11	5,0	5,9	4,2	4,0	5,2	3,2
Tumeur maligne de la vessie (C67)	29	22	7	5,6	8,6	2,7	4,6	8,5	2,0
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	39	23	16	7,5	9,0	6,1	6,7	7,7	5,8
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	54	27	27	10,4	10,6	10,2	8,3	9,2	7,1
Maladie de Hodgkin (C81)	2	1	1	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,2
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	24	13	11	4,6	5,1	4,2	3,6	4,2	3,0
Leucémie (C91-C95)	17	8	9	3,3	3,1	3,4	2,5	2,6	2,1
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	11	5	6	2,1	2,0	2,3	1,8	1,9	1,7
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	202	113	89	39,0	44,3	33,8	32,9	42,7	25,6
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes, et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	48	27	21	9,3	10,6	8,0	7,7	10,0	6,1
Anémies (D50-D64)	11	5	6	2,1	2,0	2,3	2,0	2,3	1,6
Diabète sucré (E10-E14)	253	104	149	48,8	40,8	56,6	41,2	40,6	40,6
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	3	1	2	0,6	0,4	0,8	0,5	0,4	0,4
Malnutrition (E40-E46)	1	0	1	0,2	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	2	1	1	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,2
Méningite (G00, G03)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladie de Parkinson (G20-G21)	32	17	15	6,2	6,7	5,7	5,2	6,9	4,1
Maladie d'Alzheimer (G30)	123	39	84	23,7	15,3	31,9	19,1	16,6	21,1
Maladies cardio-vasculaires graves (I00-I78)	1 532	824	708	295,6	323,3	268,7	244,3	319,7	184,6
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	1 111	619	492	214,3	242,9	186,7	177,7	239,0	129,4
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	3	1	2	0,6	0,4	0,8	0,5	0,4	0,6

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-2 – suite

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Terre-Neuve-et-Labrador¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Cardiopathie hypertensive (I11)	15	4	11	2,9	1,6	4,2	2,4	1,8	2,9
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	2	0	2	0,4	0,0	0,8	0,3	0,0	0,5
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	867	513	354	167,3	201,3	134,4	138,6	195,2	93,5
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	352	207	145	67,9	81,2	55,0	56,0	78,1	38,4
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	4	1	3	0,8	0,4	1,1	0,7	0,3	1,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	511	305	206	98,6	119,7	78,2	82,0	116,7	54,1
Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi (I25.0)	137	81	56	26,4	31,8	21,3	22,1	29,3	15,2
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	374	224	150	72,2	87,9	56,9	59,9	87,4	38,9
Autres cardiopathies (I26-I51)	224	101	123	43,2	39,6	46,7	35,9	41,6	32,0
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	2	2	0	0,4	0,8	0,0	0,4	0,8	0,0
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance cardiaque (I50)	91	37	54	17,6	14,5	20,5	14,2	16,3	13,5
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	131	62	69	25,3	24,3	26,2	21,4	24,5	18,5
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	41	13	28	7,9	5,1	10,6	6,6	5,7	7,2
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	303	145	158	58,5	56,9	60,0	47,4	57,0	39,9
Athérosclérose (I70)	21	11	10	4,1	4,3	3,8	3,4	4,4	2,6
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	56	36	20	10,8	14,1	7,6	9,2	13,6	5,6
Anévrisme aortique et dissection (I71)	33	23	10	6,4	9,0	3,8	5,4	8,5	2,7
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	23	13	10	4,4	5,1	3,8	3,9	5,1	2,9
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	11	9	2	2,1	3,5	0,8	1,8	3,7	0,5
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	79	34	45	15,2	13,3	17,1	12,2	14,6	10,4
Grippe (J10-J11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie (J12-J18)	79	34	45	15,2	13,3	17,1	12,2	14,6	10,4
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	3	1	2	0,6	0,4	0,8	0,5	0,6	0,5
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	3	1	2	0,6	0,4	0,8	0,5	0,6	0,5
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	200	127	73	38,6	49,8	27,7	32,3	51,8	19,7
Bronchite chronique et non précisée (J40-J42)	3	1	2	0,6	0,4	0,8	0,5	0,4	0,6
Emphysème (J43)	10	8	2	1,9	3,1	0,8	1,7	3,2	0,7
Asthme (J45-J46)	2	1	1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6	0,2
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	185	117	68	35,7	45,9	25,8	29,7	47,7	18,2
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	1	1	0	0,2	0,4	0,0	0,2	0,3	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	16	8	8	3,1	3,1	3,0	3,0	3,4	2,8
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	32	19	13	6,2	7,5	4,9	5,1	7,5	3,4
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	5	2	3	1,0	0,8	1,1	0,7	0,8	0,7
Maladies de l'appendice (K35-K38)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	6	2	4	1,2	0,8	1,5	1,0	0,8	1,2
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	32	16	16	6,2	6,3	6,1	5,5	5,9	4,9
Maladie alcoolique du foie (K70)	12	11	1	2,3	4,3	0,4	2,1	4,0	0,3
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	20	5	15	3,9	2,0	5,7	3,4	1,9	4,5
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	9	6	3	1,7	2,4	1,1	1,5	2,3	0,9
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	88	40	48	17,0	15,7	18,2	13,5	16,7	12,1
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	1	1	0	0,2	0,4	0,0	0,1	0,5	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	1	1	0	0,2	0,4	0,0	0,1	0,4	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	86	38	48	16,6	14,9	18,2	13,2	15,9	12,1
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	1	0	1	0,2	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	1	0,4	0,6	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	1	0,4	0,6
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	1	0,4	0,6
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	13	8	5	2,5	3,1	1,9	4,0	4,9	3,1

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-2 – suite

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Terre-Neuve-et-Labrador¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	18	9	9	3,5	3,5	3,4	4,2	4,6	3,7
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	30	16	14	5,8	6,3	5,3	5,3	6,9	3,3
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	331	155	176	63,9	60,8	66,8	54,0	61,5	47,8
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	127	85	42	24,5	33,3	15,9	21,9	31,8	12,1
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	50	41	9	9,6	16,1	3,4	9,2	15,3	3,4
Accidents de véhicule à moteur ⁸	42	33	9	8,1	12,9	3,4	7,7	12,2	3,4
Autres accidents de transport terrestre ⁹	1	1	0	0,2	0,4	0,0	0,2	0,4	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	7	7	0	1,4	2,7	0,0	1,3	2,6	0,0
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	77	44	33	14,9	17,3	12,5	12,7	16,6	8,7
Chutes (W00-W19)	16	7	9	3,1	2,7	3,4	2,5	2,2	2,5
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	3	3	0	0,6	1,2	0,0	0,4	0,7	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	5	5	0	1,0	2,0	0,0	0,8	1,7	0,0
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	5	5	0	1,0	2,0	0,0	1,0	2,1	0,0
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	8	5	3	1,5	2,0	1,1	1,6	2,2	1,2
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	40	19	21	7,7	7,5	8,0	6,4	7,7	5,0
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	48	37	11	9,3	14,5	4,2	9,1	14,6	3,8
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	13	13	0	2,5	5,1	0,0	2,5	5,2	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	35	24	11	6,8	9,4	4,2	6,5	9,4	3,8
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	4	3	1	0,8	1,2	0,4	0,9	1,5	0,3
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	4	3	1	0,8	1,2	0,4	0,9	1,5	0,3
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	6	4	2	1,2	1,6	0,8	1,1	1,6	0,6
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	1	1	0	0,2	0,4	0,0	0,3	0,6	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	5	3	2	1,0	1,2	0,8	0,8	1,0	0,6
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	6	2	4	1,2	0,8	1,5	1,0	0,8	1,2

- La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
- Les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité en 2003 sont les estimations postcensitaires mises à jour au 1er juillet 2003, rajustées pour le sous-dénombrement net au recensement et incluent les résidents non permanents. Ces estimations de population figurent dans la publication « Statistiques démographiques annuelles, 2004 » (numéro 91-213-XIB/XPB au catalogue).
- La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
- Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
- « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics », disponible à www.cdc.gov/nchs/data/dvs/im9_2002.pdf.
- Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
- Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
- Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
- Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Nota : Voir la section *Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.*

Source : Statistique Canada, *Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès et Division de la démographie (estimations de population) (Tableaux CANSIM 102-0551 et 102-0552).*

Tableau 1-3

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Île-du-Prince-Édouard¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89) 3, 4, 5	1 183	594	589	861,8	889,1	836,0	639,7	819,1	514,6
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose (A16-A19)	1	1	0	0,7	1,5	0,0	0,5	1,3	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	1	1	0	0,7	1,5	0,0	0,5	1,3	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	3	2	1	2,2	3,0	1,4	2,0	2,9	1,3
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	3	3	0	2,2	4,5	0,0	1,8	3,8	0,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	1	1	0	0,7	1,5	0,0	0,7	1,5	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	2	1	1	1,5	1,5	1,4	0,9	1,3	0,6
Tumeurs malignes (C00-C97)	353	174	179	257,2	260,4	254,1	202,8	236,2	183,7
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	1	1	0	0,7	1,5	0,0	0,5	1,0	0,0
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	3	2	1	2,2	3,0	1,4	1,5	2,5	1,1
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	12	8	4	8,7	12,0	5,7	7,1	10,8	3,8
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	36	11	25	26,2	16,5	35,5	20,5	14,5	25,0
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	11	8	3	8,0	12,0	4,3	6,3	11,4	3,9
Tumeur maligne du pancréas (C25)	21	11	10	15,3	16,5	14,2	12,1	14,2	9,6
Tumeur maligne du larynx (C32)	6	5	1	4,4	7,5	1,4	3,7	6,6	1,3
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	94	50	44	68,5	74,8	62,4	55,5	68,8	47,3
Mélanome malin de la peau (C43)	2	1	1	1,5	1,5	1,4	1,1	1,3	0,7
Tumeur maligne du sein (C50)	23	1	22	16,8	1,5	31,2	13,3	1,4	23,3
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	1	1,4	1,1
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	4	5,7	4,5
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	6	8,5	5,4
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	17	25,4	23,5	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	10	6	4	7,3	9,0	5,7	5,9	8,3	4,4
Tumeur maligne de la vessie (C67)	7	6	1	5,1	9,0	1,4	4,0	8,4	1,4
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	5	2	3	3,6	3,0	4,3	3,0	2,9	2,7
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	37	19	18	27,0	28,4	25,5	20,8	26,1	16,6
Maladie de Hodgkin (C81)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	13	6	7	9,5	9,0	9,9	7,3	8,1	6,8
Leucémie (C91-C95)	15	10	5	10,9	15,0	7,1	8,4	13,7	4,1
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	9	3	6	6,6	4,5	8,5	5,2	4,3	5,7
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	57	26	31	41,5	38,9	44,0	31,9	34,5	31,5
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes, et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	9	3	6	6,6	4,5	8,5	5,2	3,8	6,5
Anémies (D50-D64)	3	0	3	2,2	0,0	4,3	1,4	0,0	2,3
Diabète sucré (E10-E14)	19	11	8	13,8	16,5	11,4	10,7	15,0	7,2
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Malnutrition (E40-E46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladie de Parkinson (G20-G21)	8	6	2	5,8	9,0	2,8	4,2	8,6	1,3
Maladie d'Alzheimer (G30)	28	8	20	20,4	12,0	28,4	13,0	11,2	14,0
Maladies cardio-vasculaires graves (I00-I78)	433	212	221	315,4	317,3	313,7	219,2	288,4	169,0
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	318	160	158	231,7	239,5	224,3	161,7	216,4	118,2
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	3	0	3	2,2	0,0	4,3	1,4	0,0	2,6

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-3 – suite

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Île-du-Prince-Édouard¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Cardiopathie hypertensive (I11)	4	1	3	2,9	1,5	4,3	2,1	1,4	2,2
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	1	1	0	0,7	1,5	0,0	0,6	1,1	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	232	122	110	169,0	182,6	156,1	119,3	162,7	84,1
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	80	45	35	58,3	67,4	49,7	43,0	59,1	28,7
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	152	77	75	110,7	115,3	106,4	76,4	103,7	55,4
Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi (I25.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	152	77	75	110,7	115,3	106,4	76,4	103,7	55,4
Autres cardiopathies (I26-I51)	78	36	42	56,8	53,9	59,6	38,3	51,2	29,3
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance cardiaque (I50)	39	17	22	28,4	25,4	31,2	18,0	23,7	14,1
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	39	19	20	28,4	28,4	28,4	20,3	27,5	15,2
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	3	1	2	2,2	1,5	2,8	1,5	1,5	1,9
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	92	40	52	67,0	59,9	73,8	46,0	55,7	42,8
Athérosclérose (I70)	6	3	3	4,4	4,5	4,3	2,8	4,3	1,7
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	14	8	6	10,2	12,0	8,5	7,2	10,6	4,4
Anévrisme aortique et dissection (I71)	10	6	4	7,3	9,0	5,7	5,0	7,9	2,6
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	4	2	2	2,9	3,0	2,8	2,2	2,7	1,8
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	2	0	2	1,5	0,0	2,8	1,0	0,0	1,7
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	52	19	33	37,9	28,4	46,8	24,2	27,2	24,2
Grippe (J10-J11)	2	1	1	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	2,0
Pneumopathie (J12-J18)	50	18	32	36,4	26,9	45,4	22,8	25,8	22,3
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	49	28	21	35,7	41,9	29,8	25,7	38,7	19,2
Bronchite chronique et non précisée (J40-J42)	2	1	1	1,5	1,5	1,4	0,9	1,4	0,7
Emphysème (J43)	5	3	2	3,6	4,5	2,8	3,4	4,3	2,6
Asthme (J45-J46)	2	0	2	1,5	0,0	2,8	0,9	0,0	1,6
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	40	24	16	29,1	35,9	22,7	20,4	33,0	14,3
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	6	4	2	4,4	6,0	2,8	2,7	5,1	1,4
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	13	9	4	9,5	13,5	5,7	7,2	12,1	3,4
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	1	0	1	0,7	0,0	1,4	0,7	0,0	1,3
Maladies de l'appendice (K35-K38)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	2	0	2	1,5	0,0	2,8	1,1	0,0	1,8
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	5	4	1	3,6	6,0	1,4	2,6	4,3	0,7
Maladie alcoolique du foie (K70)	3	3	0	2,2	4,5	0,0	1,7	3,3	0,0
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	2	1	1	1,5	1,5	1,4	1,0	1,0	0,7
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	19	10	9	13,8	15,0	12,8	9,2	13,7	6,2
Syndrome néphrotique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	1	1	0	0,7	1,5	0,0	0,4	1,4	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	18	9	9	13,1	13,5	12,8	8,8	12,4	6,2
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	1	1,5	1,4	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	2	0	2	1,5	0,0	2,8	2,0	0,0	4,1

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-3 – suite

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Île-du-Prince-Édouard¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	7	3	4	5,1	4,5	5,7	6,0	5,5	6,7
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	8	2	6	5,8	3,0	8,5	4,4	2,8	4,9
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	86	41	45	62,7	61,4	63,9	45,4	56,7	36,8
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	46	33	13	33,5	49,4	18,5	30,3	52,1	11,2
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	13	12	1	9,5	18,0	1,4	9,6	19,3	1,1
Accidents de véhicule à moteur ⁸	11	10	1	8,0	15,0	1,4	8,8	16,9	1,1
Autres accidents de transport terrestre ⁹	1	1	0	0,7	1,5	0,0	0,4	1,5	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	1	1	0	0,7	1,5	0,0	0,5	1,0	0,0
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	33	21	12	24,0	31,4	17,0	20,7	32,7	10,2
Chutes (W00-W19)	8	4	4	5,8	6,0	5,7	4,5	5,4	3,3
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	1	1	0	0,7	1,5	0,0	0,8	1,7	0,0
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	2	0	2	1,5	0,0	2,8	1,3	0,0	2,4
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	4	3	1	2,9	4,5	1,4	3,4	6,0	1,0
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	18	13	5	13,1	19,5	7,1	10,7	19,7	3,4
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	14	12	2	10,2	18,0	2,8	10,3	17,1	3,8
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	2	2	0	1,5	3,0	0,0	1,2	2,4	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	12	10	2	8,7	15,0	2,8	9,1	14,6	3,8
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	1	1	0	0,7	1,5	0,0	0,4	1,5	0,0
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	1	1	0	0,7	1,5	0,0	0,4	1,5	0,0
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	3	2	1	2,2	3,0	1,4	1,7	2,5	1,0
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	3	2	1	2,2	3,0	1,4	1,7	2,5	1,0
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	3	3	0	2,2	4,5	0,0	1,5	4,3	0,0

- La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
- Les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité en 2003 sont les estimations postcensitaires mises à jour au 1er juillet 2003, rajustées pour le sous-dénombrement net au recensement et incluent les résidents non permanents. Ces estimations de population figurent dans la publication « Statistiques démographiques annuelles, 2004 » (numéro 91-213-XIB/XPB au catalogue).
- La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
- Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
- « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics », disponible à www.cdc.gov/nchs/data/dvs/im9_2002.pdf.
- Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
- Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
- Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
- Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Nota : Voir la section *Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.*

Source : Statistique Canada, *Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès et Division de la démographie (estimations de population) (Tableaux CANSIM 102-0551 et 102-0552).*

Tableau 1-4

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Nouvelle-Écosse¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	8 064	4 003	4 061	861,4	873,3	849,9	634,9	791,6	516,2
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	6	1	5	0,6	0,2	1,0	0,4	0,2	0,5
Tuberculose (A16-A19)	4	1	3	0,4	0,2	0,6	0,3	0,2	0,4
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	4	1	3	0,4	0,2	0,6	0,3	0,2	0,4
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	54	20	34	5,8	4,4	7,1	4,5	4,0	5,0
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	6	5	1	0,6	1,1	0,2	0,4	0,8	0,1
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	3	2	1	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	10	4	6	1,1	0,9	1,3	0,8	0,9	0,6
Tumeurs malignes (C00-C97)	2 423	1 246	1 177	258,8	271,8	246,3	200,5	240,8	171,7
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	35	26	9	3,7	5,7	1,9	3,0	4,8	1,3
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	51	36	15	5,4	7,9	3,1	4,3	6,8	2,3
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	67	42	25	7,2	9,2	5,2	5,6	8,1	3,6
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	245	133	112	26,2	29,0	23,4	20,2	25,9	15,7
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	39	17	22	4,2	3,7	4,6	3,4	3,4	3,5
Tumeur maligne du pancréas (C25)	123	73	50	13,1	15,9	10,5	10,1	13,8	7,2
Tumeur maligne du larynx (C32)	15	15	0	1,6	3,3	0,0	1,2	2,8	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	677	400	277	72,3	87,3	58,0	57,3	77,5	41,9
Mélanome malin de la peau (C43)	33	17	16	3,5	3,7	3,3	2,8	3,2	2,5
Tumeur maligne du sein (C50)	220	1	219	23,5	0,2	45,8	17,8	0,1	32,0
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	15	3,1	2,7
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	22	4,6	3,4
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	46	9,6	6,5
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	106	23,1	21,0	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	48	30	18	5,1	6,5	3,8	3,7	5,4	2,3
Tumeur maligne de la vessie (C67)	54	35	19	5,8	7,6	4,0	4,4	6,9	2,7
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	55	30	25	5,9	6,5	5,2	5,0	5,8	4,1
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	197	106	91	21,0	23,1	19,0	16,4	20,5	13,2
Maladie de Hodgkin (C81)	3	2	1	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,3
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	73	40	33	7,8	8,7	6,9	6,1	7,8	5,0
Leucémie (C91-C95)	81	45	36	8,7	9,8	7,5	6,6	8,7	4,9
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	40	19	21	4,3	4,1	4,4	3,3	3,6	3,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	375	179	196	40,1	39,1	41,0	30,2	34,8	26,7
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes, et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	38	17	21	4,1	3,7	4,4	3,0	3,3	2,9
Anémies (D50-D64)	18	8	10	1,9	1,7	2,1	1,4	1,7	1,1
Diabète sucré (E10-E14)	286	140	146	30,6	30,5	30,6	22,5	27,4	18,8
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	7	3	4	0,7	0,7	0,8	0,6	0,6	0,4
Malnutrition (E40-E46)	6	2	4	0,6	0,4	0,8	0,5	0,4	0,4
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	1	1	0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0
Méningite (G00, G03)	2	0	2	0,2	0,0	0,4	0,1	0,0	0,2
Maladie de Parkinson (G20-G21)	43	22	21	4,6	4,8	4,4	3,2	4,2	2,4
Maladie d'Alzheimer (G30)	212	62	150	22,6	13,5	31,4	14,4	12,5	15,6
Maladies cardio-vasculaires graves (I00-I78)	2 744	1 379	1 365	293,1	300,8	285,7	204,1	271,0	154,3
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	1 965	1 028	937	209,9	224,3	196,1	147,2	200,7	107,4
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	13	7	6	1,4	1,5	1,3	1,0	1,4	0,8

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-4 – suite

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Nouvelle-Écosse¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Cardiopathie hypertensive (I11)	30	7	23	3,2	1,5	4,8	2,1	1,2	2,4
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	5	1	4	0,5	0,2	0,8	0,3	0,2	0,4
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	1 429	794	635	152,6	173,2	132,9	108,0	154,8	73,3
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	658	389	269	70,3	84,9	56,3	51,0	75,4	32,4
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	8	3	5	0,9	0,7	1,0	0,5	0,5	0,5
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	763	402	361	81,5	87,7	75,6	56,4	78,8	40,4
Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi (I25.0)	15	7	8	1,6	1,5	1,7	1,1	1,4	0,7
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	748	395	353	79,9	86,2	73,9	55,3	77,5	39,7
Autres cardiopathies (I26-I51)	488	219	269	52,1	47,8	56,3	35,8	43,1	30,5
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	3	3	0	0,3	0,7	0,0	0,2	0,5	0,0
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	7	1	6	0,7	0,2	1,3	0,7	0,2	1,1
Insuffisance cardiaque (I50)	202	73	129	21,6	15,9	27,0	13,8	15,0	13,1
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	276	142	134	29,5	31,0	28,0	21,1	27,4	16,3
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	64	23	41	6,8	5,0	8,6	4,7	4,7	4,4
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	549	227	322	58,6	49,5	67,4	39,6	45,2	34,9
Athérosclérose (I70)	33	18	15	3,5	3,9	3,1	2,4	3,8	1,7
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	133	83	50	14,2	18,1	10,5	10,2	16,7	6,0
Anévrisme aortique et dissection (I71)	80	51	29	8,5	11,1	6,1	6,2	10,3	3,5
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	53	32	21	5,7	7,0	4,4	4,0	6,4	2,4
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	17	7	10	1,8	1,5	2,1	1,5	1,4	1,7
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	215	88	127	23,0	19,2	26,6	15,0	17,4	13,1
Grippe (J10-J11)	9	2	7	1,0	0,4	1,5	0,6	0,4	0,7
Pneumopathie (J12-J18)	206	86	120	22,0	18,8	25,1	14,4	17,0	12,4
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	6	3	3	0,6	0,7	0,6	0,5	0,7	0,3
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	5	2	3	0,5	0,4	0,6	0,4	0,5	0,3
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	1	1	0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	386	212	174	41,2	46,3	36,4	29,6	42,6	22,1
Bronchite chronique et non précisée (J40-J42)	6	4	2	0,6	0,9	0,4	0,4	0,8	0,2
Emphysème (J43)	13	7	6	1,4	1,5	1,3	1,1	1,3	0,8
Asthme (J45-J46)	13	4	9	1,4	0,9	1,9	1,0	0,7	1,2
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	354	197	157	37,8	43,0	32,9	27,1	39,8	20,0
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	3	3	0	0,3	0,7	0,0	0,2	0,6	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	31	13	18	3,3	2,8	3,8	2,3	2,6	2,2
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	81	40	41	8,7	8,7	8,6	6,4	7,9	5,3
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	20	8	12	2,1	1,7	2,5	1,4	1,5	1,2
Maladies de l'appendice (K35-K38)	1	1	0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0
Hernies (K40-K46)	11	6	5	1,2	1,3	1,0	0,8	1,1	0,5
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	66	42	24	7,1	9,2	5,0	5,7	7,8	4,0
Maladie alcoolique du foie (K70)	30	21	9	3,2	4,6	1,9	2,7	3,9	1,8
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	36	21	15	3,8	4,6	3,1	3,0	4,0	2,2
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	13	5	8	1,4	1,1	1,7	1,0	1,0	1,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	125	53	72	13,4	11,6	15,1	9,0	10,7	8,0
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	1	1	0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	2	1	1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Insuffisance rénale (N17-N19)	122	51	71	13,0	11,1	14,9	8,7	10,3	7,9
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	1	1	0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	2	0,4	0,5	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	26	17	9	2,8	3,7	1,9	4,3	5,4	3,1

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-4 – suite

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Nouvelle-Écosse¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	31	13	18	3,3	2,8	3,8	3,9	3,5	4,1
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	44	18	26	4,7	3,9	5,4	3,6	4,4	2,4
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	707	293	414	75,5	63,9	86,6	54,0	58,6	49,2
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	281	164	117	30,0	35,8	24,5	24,6	34,2	16,2
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	93	68	25	9,9	14,8	5,2	10,0	14,7	5,7
Accidents de véhicule à moteur ⁸	81	57	24	8,7	12,4	5,0	8,8	12,5	5,5
Autres accidents de transport terrestre ⁹	1	0	1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,2
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	11	11	0	1,2	2,4	0,0	1,1	2,2	0,0
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	188	96	92	20,1	20,9	19,3	14,6	19,5	10,5
Chutes (W00-W19)	105	48	57	11,2	10,5	11,9	7,5	9,9	5,7
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	8	8	0	0,9	1,7	0,0	0,9	1,8	0,0
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	13	8	5	1,4	1,7	1,0	1,3	1,7	1,1
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	17	10	7	1,8	2,2	1,5	1,5	1,9	1,1
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	45	22	23	4,8	4,8	4,8	3,4	4,2	2,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	99	78	21	10,6	17,0	4,4	10,1	16,1	4,3
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	31	31	0	3,3	6,8	0,0	3,0	6,1	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	68	47	21	7,3	10,3	4,4	7,1	10,0	4,3
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	7	6	1	0,7	1,3	0,2	0,8	1,4	0,3
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	3	2	1	0,3	0,4	0,2	0,4	0,4	0,3
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	4	4	0	0,4	0,9	0,0	0,5	1,0	0,0
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	22	13	9	2,4	2,8	1,9	2,3	2,5	2,0
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	22	13	9	2,4	2,8	1,9	2,3	2,5	2,0
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	13	7	6	1,4	1,5	1,3	1,1	1,4	0,9

- La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
- Les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité en 2003 sont les estimations postcensitaires mises à jour au 1er juillet 2003, rajustées pour le sous-dénombrement net au recensement et incluent les résidents non permanents. Ces estimations de population figurent dans la publication « Statistiques démographiques annuelles, 2004 » (numéro 91-213-XIB/XPB au catalogue).
- La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
- Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
- « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics », disponible à www.cdc.gov/nchs/data/dvs/im9_2002.pdf.
- Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
- Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
- Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
- Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Nota : Voir la section *Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.*

Source : Statistique Canada, *Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès et Division de la démographie (estimations de population) (Tableaux CANSIM 102-0551 et 102-0552).*

Tableau 1-5

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Nouveau-Brunswick¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	6 257	3 217	3 040	833,3	867,8	799,6	629,2	811,6	491,6
Infections à la salmonelle (A01-A02)	1	0	1	0,1	0,0	0,3	0,1	0,0	0,2
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	3	1	2	0,4	0,3	0,5	0,3	0,3	0,4
Tuberculose (A16-A19)	1	1	0	0,1	0,3	0,0	0,1	0,3	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	1	1	0	0,1	0,3	0,0	0,1	0,3	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	1	0	1	0,1	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	15	5	10	2,0	1,3	2,6	1,5	1,3	1,7
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	6	4	2	0,8	1,1	0,5	0,6	0,9	0,4
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	2	2	0	0,3	0,5	0,0	0,2	0,4	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	12	9	3	1,6	2,4	0,8	1,3	2,4	0,5
Tumeurs malignes (C00-C97)	1 808	988	820	240,8	266,5	215,7	189,6	245,6	152,4
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	28	18	10	3,7	4,9	2,6	3,0	4,4	1,7
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	31	22	9	4,1	5,9	2,4	3,3	5,3	1,8
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	44	31	13	5,9	8,4	3,4	4,4	7,5	2,1
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	158	80	78	21,0	21,6	20,5	16,3	20,1	13,8
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	22	8	14	2,9	2,2	3,7	2,2	1,9	2,6
Tumeur maligne du pancréas (C25)	97	49	48	12,9	13,2	12,6	10,3	12,4	8,9
Tumeur maligne du larynx (C32)	12	10	2	1,6	2,7	0,5	1,2	2,2	0,4
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	514	330	184	68,5	89,0	48,4	55,7	82,0	36,7
Mélanome malin de la peau (C43)	23	10	13	3,1	2,7	3,4	2,7	2,5	2,9
Tumeur maligne du sein (C50)	128	1	127	17,0	0,3	33,4	13,1	0,3	23,3
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	19	5,0	3,8
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	9	2,4	1,6
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	44	11,6	8,6
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	123	33,2	31,5	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	44	26	18	5,9	7,0	4,7	4,7	6,5	3,1
Tumeur maligne de la vessie (C67)	41	30	11	5,5	8,1	2,9	4,1	7,6	1,6
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	40	24	16	5,3	6,5	4,2	4,3	5,6	3,1
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	162	93	69	21,6	25,1	18,1	17,2	23,3	12,7
Maladie de Hodgkin (C81)	3	0	3	0,4	0,0	0,8	0,3	0,0	0,5
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	71	47	24	9,5	12,7	6,3	7,5	11,7	4,6
Leucémie (C91-C95)	52	26	26	6,9	7,0	6,8	5,6	6,6	4,8
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	36	20	16	4,8	5,4	4,2	3,8	5,0	2,9
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	269	133	136	35,8	35,9	35,8	27,5	32,7	23,8
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes, et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	29	18	11	3,9	4,9	2,9	3,2	4,7	1,7
Anémies (D50-D64)	23	5	18	3,1	1,3	4,7	2,0	1,3	2,4
Diabète sucré (E10-E14)	262	143	119	34,9	38,6	31,3	25,6	35,6	18,5
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	9	2	7	1,2	0,5	1,8	0,8	0,4	1,0
Malnutrition (E40-E46)	5	1	4	0,7	0,3	1,1	0,5	0,2	0,6
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	4	1	3	0,5	0,3	0,8	0,3	0,2	0,3
Méningite (G00, G03)	2	1	1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,1
Maladie de Parkinson (G20-G21)	30	17	13	4,0	4,6	3,4	2,9	4,3	2,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	164	53	111	21,8	14,3	29,2	14,2	14,0	14,5
Maladies cardio-vasculaires graves (I00-I78)	2 135	1 048	1 087	284,3	282,7	285,9	205,1	262,2	158,7
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	1 568	826	742	208,8	222,8	195,2	151,6	206,3	107,7
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	8	1	7	1,1	0,3	1,8	0,8	0,3	1,2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-5 – suite

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Nouveau-Brunswick¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Cardiopathie hypertensive (I11)	16	6	10	2,1	1,6	2,6	1,4	1,5	1,2
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	2	0	2	0,3	0,0	0,5	0,2	0,0	0,3
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	1 088	603	485	144,9	162,7	127,6	105,6	150,5	69,4
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	572	333	239	76,2	89,8	62,9	56,8	82,3	36,4
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	7	5	2	0,9	1,3	0,5	0,7	1,3	0,4
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	509	265	244	67,8	71,5	64,2	48,1	66,8	32,6
Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi (I25.0)	3	3	0	0,4	0,8	0,0	0,3	0,7	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	506	262	244	67,4	70,7	64,2	47,7	66,1	32,6
Autres cardiopathies (I26-I51)	454	216	238	60,5	58,3	62,6	43,6	54,1	35,5
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	2	2	0	0,3	0,5	0,0	0,2	0,5	0,0
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	5	1	4	0,7	0,3	1,1	0,6	0,3	0,8
Insuffisance cardiaque (I50)	185	83	102	24,6	22,4	26,8	16,6	21,2	13,7
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	262	130	132	34,9	35,1	34,7	26,2	32,2	21,0
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	40	10	30	5,3	2,7	7,9	3,8	2,6	4,5
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	411	145	266	54,7	39,1	70,0	38,4	36,3	38,7
Athérosclérose (I70)	13	9	4	1,7	2,4	1,1	1,2	2,2	0,6
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	103	58	45	13,7	15,6	11,8	10,1	14,8	7,1
Anévrisme aortique et dissection (I71)	64	39	25	8,5	10,5	6,6	6,4	9,8	4,2
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	39	19	20	5,2	5,1	5,3	3,7	5,0	2,9
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	13	9	4	1,7	2,4	1,1	1,4	2,1	0,7
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	136	68	68	18,1	18,3	17,9	12,3	17,6	8,8
Grippe (J10-J11)	11	4	7	1,5	1,1	1,8	1,0	1,0	0,8
Pneumopathie (J12-J18)	125	64	61	16,6	17,3	16,0	11,3	16,6	7,9
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	300	165	135	40,0	44,5	35,5	29,5	42,4	22,1
Bronchite chronique et non précisée (J40-J42)	3	1	2	0,4	0,3	0,5	0,3	0,3	0,2
Emphysème (J43)	19	11	8	2,5	3,0	2,1	2,1	2,7	1,6
Asthme (J45-J46)	13	6	7	1,7	1,6	1,8	1,2	1,5	1,1
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	265	147	118	35,3	39,7	31,0	25,9	37,9	19,2
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	1	1	0	0,1	0,3	0,0	0,1	0,2	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	18	7	11	2,4	1,9	2,9	1,8	1,8	1,6
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	66	35	31	8,8	9,4	8,2	6,8	8,9	5,4
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	7	1	6	0,9	0,3	1,6	0,7	0,3	1,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	1	0	1	0,1	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1
Hernies (K40-K46)	7	4	3	0,9	1,1	0,8	0,7	0,9	0,4
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	53	35	18	7,1	9,4	4,7	5,7	8,0	3,6
Maladie alcoolique du foie (K70)	19	16	3	2,5	4,3	0,8	2,0	3,4	0,7
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	34	19	15	4,5	5,1	3,9	3,7	4,6	3,0
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	6	2	4	0,8	0,5	1,1	0,6	0,5	0,7
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	123	61	62	16,4	16,5	16,3	11,6	15,5	9,4
Syndrome néphrotique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	1	0	1	0,1	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	1	1	0	0,1	0,3	0,0	0,1	0,3	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	120	59	61	16,0	15,9	16,0	11,3	14,9	9,3
Autres maladies des reins (N25, N27)	1	1	0	0,1	0,3	0,0	0,1	0,3	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	2	0	2	0,3	0,0	0,5	0,2	0,0	0,4
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	2	0,5	0,6	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	17	9	8	2,3	2,4	2,1	3,4	3,6	3,2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-5 – suite

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Nouveau-Brunswick¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	23	8	15	3,1	2,2	3,9	3,5	2,8	4,2
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	67	27	40	8,9	7,3	10,5	6,1	7,2	5,3
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	501	212	289	66,7	57,2	76,0	48,8	53,0	45,1
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	302	190	112	40,2	51,3	29,5	35,1	51,0	19,9
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	104	81	23	13,9	21,8	6,0	14,2	22,6	5,8
Accidents de véhicule à moteur ⁸	98	76	22	13,1	20,5	5,8	13,4	21,3	5,6
Autres accidents de transport terrestre ⁹	2	1	1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	4	4	0	0,5	1,1	0,0	0,5	1,0	0,0
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	198	109	89	26,4	29,4	23,4	21,0	28,4	14,0
Chutes (W00-W19)	54	24	30	7,2	6,5	7,9	5,1	6,2	4,0
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	3	3	0	0,4	0,8	0,0	0,4	0,8	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	13	13	0	1,7	3,5	0,0	1,7	3,4	0,0
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	7	2	5	0,9	0,5	1,3	1,0	0,6	1,2
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	33	24	9	4,4	6,5	2,4	4,0	5,9	2,2
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	88	43	45	11,7	11,6	11,8	8,7	11,4	6,6
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	91	75	16	12,1	20,2	4,2	11,1	18,9	3,5
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	26	22	4	3,5	5,9	1,1	3,1	5,5	0,8
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	65	53	12	8,7	14,3	3,2	8,0	13,4	2,7
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	7	3	4	0,9	0,8	1,1	0,9	0,9	1,1
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	3	1	2	0,4	0,3	0,5	0,4	0,4	0,4
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	4	2	2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	3	2	1	0,4	0,5	0,3	0,3	0,5	0,2
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	3	2	1	0,4	0,5	0,3	0,3	0,5	0,2
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	8	4	4	1,1	1,1	1,1	0,7	1,0	0,5

- La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
- Les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité en 2003 sont les estimations postcensitaires mises à jour au 1er juillet 2003, rajustées pour le sous-dénombrement net au recensement et incluent les résidents non permanents. Ces estimations de population figurent dans la publication « Statistiques démographiques annuelles, 2004 » (numéro 91-213-XIB/XPB au catalogue).
- La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
- Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
- « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics », disponible à www.cdc.gov/nchs/data/dvs/im9_2002.pdf.
- Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
- Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
- Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
- Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Nota : Voir la section *Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.*

Source : Statistique Canada, *Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès et Division de la démographie (estimations de population) (Tableaux CANSIM 102-0551 et 102-0552).*

Tableau 1-6

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Québec¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	54 927	27 715	27 212	733,1	749,7	717,0	590,1	756,5	470,0
Infections à la salmonelle (A01-A02)	2	0	2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	361	139	222	4,8	3,8	5,8	3,8	4,2	3,6
Tuberculose (A16-A19)	21	10	11	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	17	8	9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	4	2	2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	6	3	3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Septicémie (A40-A41)	370	193	177	4,9	5,2	4,7	3,9	5,4	3,1
Syphilis (A50-A53)	2	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	83	52	31	1,1	1,4	0,8	0,9	1,2	0,6
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	129	116	13	1,7	3,1	0,3	1,5	2,6	0,4
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	118	59	59	1,6	1,6	1,6	1,3	1,7	1,1
Tumeurs malignes (C00-C97)	17 399	9 249	8 150	232,2	250,2	214,7	187,8	240,7	152,7
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	259	180	79	3,5	4,9	2,1	2,8	4,4	1,5
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	270	209	61	3,6	5,7	1,6	2,9	5,2	1,1
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	542	317	225	7,2	8,6	5,9	5,9	8,3	4,1
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	2 050	1 072	978	27,4	29,0	25,8	21,9	28,1	17,3
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	373	215	158	5,0	5,8	4,2	4,0	5,6	2,8
Tumeur maligne du pancréas (C25)	894	427	467	11,9	11,6	12,3	9,6	10,7	8,5
Tumeur maligne du larynx (C32)	167	136	31	2,2	3,7	0,8	1,8	3,4	0,6
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	5 331	3 284	2 047	71,2	88,8	53,9	57,7	83,7	39,9
Mélanome malin de la peau (C43)	124	75	49	1,7	2,0	1,3	1,3	1,8	1,0
Tumeur maligne du sein (C50)	1 277	10	1 267	17,0	0,3	33,4	13,5	0,3	23,9
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	61	1,6	1,3
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	204	5,4	3,8
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	325	8,6	6,1
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	768	20,8	22,3	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	356	232	124	4,8	6,3	3,3	3,8	5,8	2,3
Tumeur maligne de la vessie (C67)	386	261	125	5,2	7,1	3,3	4,1	7,2	2,1
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	420	237	183	5,6	6,4	4,8	4,8	5,8	3,9
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	1 527	841	686	20,4	22,7	18,1	16,6	21,9	12,8
Maladie de Hodgkin (C81)	23	11	12	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	622	341	281	8,3	9,2	7,4	6,8	8,8	5,3
Leucémie (C91-C95)	572	325	247	7,6	8,8	6,5	6,2	8,5	4,6
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	310	164	146	4,1	4,4	3,8	3,4	4,3	2,7
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	2 065	985	1 080	27,6	26,6	28,5	22,3	26,2	19,6
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes, et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	271	128	143	3,6	3,5	3,8	2,9	3,7	2,4
Anémies (D50-D64)	137	56	81	1,8	1,5	2,1	1,4	1,8	1,2
Diabète sucré (E10-E14)	1 699	823	876	22,7	22,3	23,1	18,0	22,3	14,8
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	92	39	53	1,2	1,1	1,4	0,9	1,2	0,8
Malnutrition (E40-E46)	80	31	49	1,1	0,8	1,3	0,8	1,0	0,7
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	12	8	4	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
Méningite (G00, G03)	16	10	6	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2
Maladie de Parkinson (G20-G21)	464	231	233	6,2	6,2	6,1	4,8	6,7	3,8
Maladie d'Alzheimer (G30)	1 752	459	1 293	23,4	12,4	34,1	17,8	14,2	19,3
Maladies cardio-vasculaires graves (I00-I78)	15 931	7 939	7 992	212,6	214,8	210,6	167,1	219,2	128,6
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	11 995	6 215	5 780	160,1	168,1	152,3	125,9	170,1	93,0
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	170	61	109	2,3	1,7	2,9	1,8	1,6	2,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-6 – suite

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Québec¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Cardiopathie hypertensive (I11)	69	24	45	0,9	0,6	1,2	0,7	0,7	0,7
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	30	11	19	0,4	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	9 056	4 905	4 151	120,9	132,7	109,4	94,9	133,1	66,5
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	5 151	2 926	2 225	68,8	79,1	58,6	54,3	77,6	36,5
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	262	135	127	3,5	3,7	3,3	2,7	3,6	2,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	3 643	1 844	1 799	48,6	49,9	47,4	37,9	51,9	28,1
Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi (I25.0)	41	20	21	0,5	0,5	0,6	0,4	0,6	0,3
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	3 602	1 824	1 778	48,1	49,3	46,8	37,5	51,3	27,7
Autres cardiopathies (I26-I51)	2 670	1 214	1 456	35,6	32,8	38,4	28,1	34,4	23,5
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	22	11	11	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	31	16	15	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3
Insuffisance cardiaque (I50)	945	416	529	12,6	11,3	13,9	9,8	12,2	8,1
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	1 672	771	901	22,3	20,9	23,7	17,8	21,5	14,9
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	242	71	171	3,2	1,9	4,5	2,5	2,1	2,6
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	2 866	1 191	1 675	38,3	32,2	44,1	29,9	34,1	27,0
Athérosclérose (I70)	147	69	78	2,0	1,9	2,1	1,5	2,1	1,2
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	681	393	288	9,1	10,6	7,6	7,3	10,8	4,8
Anévrisme aortique et dissection (I71)	454	283	171	6,1	7,7	4,5	4,9	7,8	2,9
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	227	110	117	3,0	3,0	3,1	2,4	3,1	1,9
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	100	47	53	1,3	1,3	1,4	1,1	1,3	0,9
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	769	336	433	10,3	9,1	11,4	8,0	10,4	6,8
Grippe (J10-J11)	15	7	8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Pneumopathie (J12-J18)	754	329	425	10,1	8,9	11,2	7,8	10,2	6,6
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	31	12	19	0,4	0,3	0,5	0,3	0,4	0,3
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	27	10	17	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	4	2	2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	2 750	1 526	1 224	36,7	41,3	32,2	29,0	44,7	20,8
Bronchite chronique et non précisée (J40-J42)	63	26	37	0,8	0,7	1,0	0,6	0,7	0,5
Emphysème (J43)	194	120	74	2,6	3,2	1,9	2,1	3,2	1,3
Asthme (J45-J46)	45	14	31	0,6	0,4	0,8	0,5	0,4	0,6
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	2 448	1 366	1 082	32,7	37,0	28,5	25,8	40,4	18,4
Pneumocnioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	23	23	0	0,3	0,6	0,0	0,3	0,6	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	245	120	125	3,3	3,2	3,3	2,6	3,4	2,0
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	607	310	297	8,1	8,4	7,8	6,4	8,5	5,1
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	68	32	36	0,9	0,9	0,9	0,7	0,9	0,6
Maladies de l'appendice (K35-K38)	11	7	4	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
Hernies (K40-K46)	64	24	40	0,9	0,6	1,1	0,7	0,7	0,6
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	616	401	215	8,2	10,8	5,7	6,7	9,6	4,2
Maladie alcoolique du foie (K70)	252	202	50	3,4	5,5	1,3	2,7	4,7	1,0
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	364	199	165	4,9	5,4	4,3	4,0	4,8	3,1
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	74	30	44	1,0	0,8	1,2	0,8	0,9	0,7
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	908	450	458	12,1	12,2	12,1	9,5	13,0	7,3
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	7	3	4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	6	5	1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	894	442	452	11,9	12,0	11,9	9,3	12,8	7,2
Autres maladies des reins (N25, N27)	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	34	13	21	0,5	0,4	0,6	0,3	0,4	0,3
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	9	0,2	0,3	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	2	0,1	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	3	0,1	0,1
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	3	0,1	0,1
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	191	100	91	2,5	2,7	2,4	3,7	3,8	3,6

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-6 – suite

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Québec¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	182	90	92	2,4	2,4	2,4	2,8	2,8	2,8
Symptômes, signes et résultats anormaux d'exams cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	407	198	209	5,4	5,4	5,5	4,5	5,5	3,6
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	5 550	2 212	3 338	74,1	59,8	87,9	58,3	63,2	54,0
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1 999	1 169	830	26,7	31,6	21,9	23,5	32,3	15,5
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	710	508	202	9,5	13,7	5,3	9,2	13,6	5,1
Accidents de véhicule à moteur ⁸	665	467	198	8,9	12,6	5,2	8,7	12,5	5,0
Autres accidents de transport terrestre ⁹	5	3	2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	40	38	2	0,5	1,0	0,1	0,5	1,0	0,0
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	1 289	661	628	17,2	17,9	16,5	14,3	18,7	10,5
Chutes (W00-W19)	275	161	114	3,7	4,4	3,0	3,0	4,5	2,0
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	10	10	0	0,1	0,3	0,0	0,1	0,3	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	50	38	12	0,7	1,0	0,3	0,7	1,0	0,3
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	45	31	14	0,6	0,8	0,4	0,5	0,8	0,3
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	144	102	42	1,9	2,8	1,1	1,9	2,7	1,0
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	765	319	446	10,2	8,6	11,8	8,1	9,4	6,9
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	1 260	982	278	16,8	26,6	7,3	15,8	25,0	6,8
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	173	161	12	2,3	4,4	0,3	2,1	3,9	0,3
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	1 087	821	266	14,5	22,2	7,0	13,7	21,0	6,5
Aggressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	88	60	28	1,2	1,6	0,7	1,1	1,6	0,7
Aggressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	30	26	4	0,4	0,7	0,1	0,4	0,7	0,1
Aggressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	58	34	24	0,8	0,9	0,6	0,7	0,9	0,6
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	4	4	0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	50	41	9	0,7	1,1	0,2	0,7	1,1	0,2
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	2	2	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	48	39	9	0,6	1,1	0,2	0,6	1,0	0,2
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	29	12	17	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3

- La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
- Les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité en 2003 sont les estimations postcensitaires mises à jour au 1er juillet 2003, rajustées pour le sous-dénombrement net au recensement et incluent les résidents non permanents. Ces estimations de population figurent dans la publication « Statistiques démographiques annuelles, 2004 » (numéro 91-213-XIB/XPB au catalogue).
- La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
- Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
- « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics », disponible à www.cdc.gov/nchs/data/dvs/im9_2002.pdf.
- Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
- Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
- Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
- Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Nota : Voir la section *Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.*

Source : *Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès et Division de la démographie (estimations de population) (Tableaux CANSIM 102-0551 et 102-0552).*

Tableau 1-7

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Ontario¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	84 207	42 598	41 609	687,0	703,6	670,9	580,8	719,4	475,8
Infections à la salmonelle (A01-A02)	3	0	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	113	53	60	0,9	0,9	1,0	0,8	1,0	0,6
Tuberculose (A16-A19)	30	17	13	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	20	12	8	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	10	5	5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	8	2	6	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
Septicémie (A40-A41)	643	302	341	5,2	5,0	5,5	4,4	5,2	3,8
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	160	105	55	1,3	1,7	0,9	1,1	1,5	0,7
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	137	118	19	1,1	1,9	0,3	1,0	1,8	0,3
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	163	85	78	1,3	1,4	1,3	1,1	1,4	0,9
Tumeurs malignes (C00-C97)	24 535	12 838	11 697	200,2	212,0	188,6	172,8	210,2	147,1
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	368	257	111	3,0	4,2	1,8	2,6	4,1	1,4
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	571	416	155	4,7	6,9	2,5	4,0	6,6	1,9
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	742	469	273	6,1	7,7	4,4	5,2	7,6	3,4
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	2 560	1 404	1 156	20,9	23,2	18,6	17,9	23,0	13,9
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	606	417	189	4,9	6,9	3,0	4,3	6,6	2,4
Tumeur maligne du pancréas (C25)	1 240	592	648	10,1	9,8	10,4	8,7	9,5	8,0
Tumeur maligne du larynx (C32)	157	130	27	1,3	2,1	0,4	1,1	2,1	0,4
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	5 939	3 426	2 513	48,5	56,6	40,5	42,5	55,4	32,7
Mélanome malin de la peau (C43)	318	207	111	2,6	3,4	1,8	2,2	3,2	1,4
Tumeur maligne du sein (C50)	1 924	12	1 912	15,7	0,2	30,8	13,4	0,2	24,2
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	150	2,4	2,0
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	301	4,9	3,8
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	641	10,3	8,3
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	1 372	22,7	23,9	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	518	321	197	4,2	5,3	3,2	3,7	5,2	2,4
Tumeur maligne de la vessie (C67)	623	429	194	5,1	7,1	3,1	4,3	7,3	2,2
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	576	325	251	4,7	5,4	4,0	4,2	5,0	3,4
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	2 509	1 370	1 139	20,5	22,6	18,4	17,7	22,4	14,2
Maladie de Hodgkin (C81)	57	33	24	0,5	0,5	0,4	0,4	0,5	0,3
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	1 017	531	486	8,3	8,8	7,8	7,2	8,6	6,1
Leucémie (C91-C95)	902	522	380	7,4	8,6	6,1	6,4	8,6	4,7
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	530	283	247	4,3	4,7	4,0	3,7	4,6	3,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	3	1	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	3 420	1 691	1 729	27,9	27,9	27,9	23,9	28,0	21,0
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes, et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	593	309	284	4,8	5,1	4,6	4,1	5,3	3,3
Anémies (D50-D64)	195	78	117	1,6	1,3	1,9	1,3	1,4	1,2
Diabète sucré (E10-E14)	3 303	1 689	1 614	26,9	27,9	26,0	22,6	28,0	18,3
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	45	18	27	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3
Malnutrition (E40-E46)	36	13	23	0,3	0,2	0,4	0,2	0,2	0,3
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	9	5	4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Méningite (G00, G03)	14	9	5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Maladie de Parkinson (G20-G21)	634	358	276	5,2	5,9	4,5	4,2	6,2	2,9
Maladie d'Alzheimer (G30)	1 927	575	1 352	15,7	9,5	21,8	12,4	10,5	13,2
Maladies cardio-vasculaires graves (I00-I78)	28 132	14 121	14 011	229,5	233,2	225,9	188,6	241,5	147,9
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	20 215	10 686	9 529	164,9	176,5	153,6	136,1	181,5	101,1
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	163	59	104	1,3	1,0	1,7	1,1	1,0	1,2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-7 – suite

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Ontario¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Cardiopathie hypertensive (I11)	219	89	130	1,8	1,5	2,1	1,5	1,5	1,3
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	46	21	25	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	16 253	8 939	7 314	132,6	147,6	117,9	109,5	151,2	77,5
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	6 958	3 947	3 011	56,8	65,2	48,5	47,2	65,8	32,6
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	291	148	143	2,4	2,4	2,3	2,0	2,5	1,6
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	9 004	4 844	4 160	73,5	80,0	67,1	60,4	82,8	43,3
Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi (I25.0)	425	250	175	3,5	4,1	2,8	2,9	4,1	1,9
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	8 579	4 594	3 985	70,0	75,9	64,3	57,4	78,7	41,4
Autres cardiopathies (I26-I51)	3 534	1 578	1 956	28,8	26,1	31,5	23,7	27,5	20,8
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	41	24	17	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,2
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	20	10	10	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1
Insuffisance cardiaque (I50)	1 217	487	730	9,9	8,0	11,8	7,9	9,0	7,2
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	2 256	1 057	1 199	18,4	17,5	19,3	15,4	18,0	13,2
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	445	169	276	3,6	2,8	4,5	2,9	2,9	2,8
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	5 887	2 473	3 414	48,0	40,8	55,0	38,9	43,3	35,7
Athérosclérose (I70)	431	170	261	3,5	2,8	4,2	2,8	3,1	2,5
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	1 154	623	531	9,4	10,3	8,6	7,8	10,7	5,9
Anévrisme aortique et dissection (I71)	701	421	280	5,7	7,0	4,5	4,8	7,2	3,1
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	453	202	251	3,7	3,3	4,0	3,1	3,5	2,8
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	167	61	106	1,4	1,0	1,7	1,2	1,0	1,3
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	1 972	854	1 118	16,1	14,1	18,0	12,9	15,9	11,3
Grippe (J10-J11)	93	36	57	0,8	0,6	0,9	0,6	0,7	0,6
Pneumopathie (J12-J18)	1 879	818	1 061	15,3	13,5	17,1	12,3	15,2	10,7
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	14	4	10	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	5	0	5	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	9	4	5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	3 541	1 834	1 707	28,9	30,3	27,5	23,9	32,0	19,3
Bronchite chronique et non précisée (J40-J42)	42	19	23	0,3	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3
Emphysème (J43)	231	146	85	1,9	2,4	1,4	1,6	2,4	1,0
Asthme (J45-J46)	109	40	69	0,9	0,7	1,1	0,8	0,7	0,9
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	3 159	1 629	1 530	25,8	26,9	24,7	21,3	28,5	17,2
Pneumocoïnoses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	20	19	1	0,2	0,3	0,0	0,1	0,3	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	366	201	165	3,0	3,3	2,7	2,4	3,6	1,8
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	764	431	333	6,2	7,1	5,4	5,3	7,3	3,8
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	172	84	88	1,4	1,4	1,4	1,2	1,4	1,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	18	12	6	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1
Hernies (K40-K46)	92	43	49	0,8	0,7	0,8	0,6	0,7	0,5
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	913	616	297	7,4	10,2	4,8	6,5	9,4	4,0
Maladie alcoolique du foie (K70)	459	343	116	3,7	5,7	1,9	3,3	5,1	1,7
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	454	273	181	3,7	4,5	2,9	3,2	4,3	2,3
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	136	73	63	1,1	1,2	1,0	0,9	1,3	0,7
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	1 238	618	620	10,1	10,2	10,0	8,2	11,0	6,6
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	10	4	6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	21	8	13	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2
Insuffisance rénale (N17-N19)	1 205	606	599	9,8	10,0	9,7	7,9	10,8	6,4
Autres maladies des reins (N25, N27)	2	0	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	24	6	18	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	0,2
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	22	0,4	0,4	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	7	0,1	0,1
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	17	0,3	0,3
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	2	0,0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	15	0,2	0,3
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	418	229	189	3,4	3,8	3,0	4,6	4,9	4,2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-7 – suite

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Ontario¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	353	175	178	2,9	2,9	2,9	3,3	3,3	3,3
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	1 485	830	655	12,1	13,7	10,6	10,8	13,6	8,0
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	7 189	2 934	4 255	58,7	48,5	68,6	48,7	50,4	46,3
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	3 170	1 811	1 359	25,9	29,9	21,9	23,0	30,7	16,1
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	929	650	279	7,6	10,7	4,5	7,5	10,8	4,3
Accidents de véhicule à moteur ⁸	848	583	265	6,9	9,6	4,3	6,9	9,8	4,0
Autres accidents de transport terrestre ⁹	22	20	2	0,2	0,3	0,0	0,2	0,3	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	59	47	12	0,5	0,8	0,2	0,5	0,7	0,2
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	2 241	1 161	1 080	18,3	19,2	17,4	15,5	19,9	11,8
Chutes (W00-W19)	964	475	489	7,9	7,8	7,9	6,4	8,2	5,1
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	86	69	17	0,7	1,1	0,3	0,7	1,1	0,2
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	65	39	26	0,5	0,6	0,4	0,5	0,6	0,4
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	311	210	101	2,5	3,5	1,6	2,4	3,4	1,5
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	815	368	447	6,6	6,1	7,2	5,5	6,5	4,6
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	1 038	783	255	8,5	12,9	4,1	8,0	12,6	3,8
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	132	129	3	1,1	2,1	0,0	1,0	2,0	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	906	654	252	7,4	10,8	4,1	7,0	10,6	3,7
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	156	113	43	1,3	1,9	0,7	1,3	1,9	0,7
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	49	44	5	0,4	0,7	0,1	0,4	0,8	0,1
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	107	69	38	0,9	1,1	0,6	0,9	1,1	0,6
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	1	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	202	135	67	1,6	2,2	1,1	1,5	2,1	1,0
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	2	2	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	200	133	67	1,6	2,2	1,1	1,5	2,1	1,0
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	77	32	45	0,6	0,5	0,7	0,5	0,5	0,5

- La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
- Les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité en 2003 sont les estimations postcensitaires mises à jour au 1er juillet 2003, rajustées pour le sous-dénombrement net au recensement et incluent les résidents non permanents. Ces estimations de population figurent dans la publication « Statistiques démographiques annuelles, 2004 » (numéro 91-213-XIB/XPB au catalogue).
- La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
- Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
- « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics », disponible à www.cdc.gov/nchs/data/dvs/im9_2002.pdf.
- Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
- Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
- Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
- Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Nota : Voir la section *Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.*

Source : *Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès et Division de la démographie (estimations de population) (Tableaux CANSIM 102-0551 et 102-0552).*

Tableau 1-8

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Manitoba¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	9 867	4 974	4 893	849,5	863,3	835,9	632,4	800,3	508,5
Infections à la salmonelle (A01-A02)	1	0	1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	11	6	5	0,9	1,0	0,9	0,6	0,9	0,4
Tuberculose (A16-A19)	7	4	3	0,6	0,7	0,5	0,5	0,6	0,5
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	5	4	1	0,4	0,7	0,2	0,3	0,6	0,2
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	2	0	2	0,2	0,0	0,3	0,2	0,0	0,3
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	59	28	31	5,1	4,9	5,3	3,8	4,5	3,3
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	5	3	2	0,4	0,5	0,3	0,4	0,4	0,3
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	10	6	4	0,9	1,0	0,7	0,9	1,0	0,7
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	27	17	10	2,3	3,0	1,7	1,9	2,8	1,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	2 568	1 342	1 226	221,1	232,9	209,4	175,8	216,3	149,0
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	48	28	20	4,1	4,9	3,4	3,5	4,5	2,4
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	55	40	15	4,7	6,9	2,6	3,8	6,3	1,7
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	74	48	26	6,4	8,3	4,4	5,0	7,8	3,2
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	268	146	122	23,1	25,3	20,8	18,1	23,5	13,8
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	55	31	24	4,7	5,4	4,1	3,9	4,9	3,0
Tumeur maligne du pancréas (C25)	136	67	69	11,7	11,6	11,8	9,2	10,9	7,7
Tumeur maligne du larynx (C32)	10	7	3	0,9	1,2	0,5	0,8	1,2	0,4
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	619	333	286	53,3	57,8	48,9	44,6	54,2	37,7
Mélanome malin de la peau (C43)	26	16	10	2,2	2,8	1,7	1,8	2,7	1,1
Tumeur maligne du sein (C50)	223	1	222	19,2	0,2	37,9	14,9	0,1	27,0
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	22	3,8	3,1
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	23	3,9	3,1
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	56	9,6	6,8
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	173	30,0	27,4	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	55	34	21	4,7	5,9	3,6	3,8	5,5	2,4
Tumeur maligne de la vessie (C67)	57	49	8	4,9	8,5	1,4	3,7	7,9	0,8
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	37	22	15	3,2	3,8	2,6	2,7	3,4	2,1
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	277	160	117	23,8	27,8	20,0	19,1	26,0	13,4
Maladie de Hodgkin (C81)	2	2	0	0,2	0,3	0,0	0,2	0,3	0,0
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	111	70	41	9,6	12,1	7,0	7,8	11,3	4,9
Leucémie (C91-C95)	109	68	41	9,4	11,8	7,0	7,6	11,2	4,9
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	55	20	35	4,7	3,5	6,0	3,5	3,2	3,6
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	354	187	167	30,5	32,5	28,5	23,6	30,1	19,3
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes, et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	75	44	31	6,5	7,6	5,3	4,7	6,9	3,5
Anémies (D50-D64)	19	7	12	1,6	1,2	2,0	1,0	1,1	0,9
Diabète sucré (E10-E14)	412	187	225	35,5	32,5	38,4	27,0	30,2	24,5
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	11	6	5	0,9	1,0	0,9	0,6	0,9	0,3
Malnutrition (E40-E46)	11	6	5	0,9	1,0	0,9	0,6	0,9	0,3
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	4	1	3	0,3	0,2	0,5	0,3	0,1	0,5
Maladie de Parkinson (G20-G21)	79	43	36	6,8	7,5	6,1	4,4	6,7	3,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	152	43	109	13,1	7,5	18,6	7,8	6,7	8,5
Maladies cardio-vasculaires graves (I00-I78)	3 200	1 580	1 620	275,5	274,2	276,7	191,3	250,0	147,4
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2 278	1 206	1 072	196,1	209,3	183,1	137,9	191,2	98,4
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	12	2	10	1,0	0,3	1,7	0,7	0,3	1,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-8 – suite

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Manitoba¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Cardiopathie hypertensive (I11)	42	19	23	3,6	3,3	3,9	2,6	3,1	2,1
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	8	5	3	0,7	0,9	0,5	0,6	0,8	0,4
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	1 710	942	768	147,2	163,5	131,2	104,6	149,5	70,9
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	691	381	310	59,5	66,1	53,0	42,5	60,1	29,5
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	5	3	2	0,4	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	1 014	558	456	87,3	96,8	77,9	61,8	88,9	41,0
Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi (I25.0)	54	26	28	4,6	4,5	4,8	3,3	4,1	2,9
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	960	532	428	82,6	92,3	73,1	58,6	84,9	38,2
Autres cardiopathies (I26-I51)	506	238	268	43,6	41,3	45,8	29,4	37,5	24,0
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	2	1	1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	2	1	1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1
Insuffisance cardiaque (I50)	233	89	144	20,1	15,4	24,6	12,4	13,8	11,6
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	269	147	122	23,2	25,5	20,8	16,7	23,4	12,1
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	50	19	31	4,3	3,3	5,3	2,6	3,1	2,3
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	706	274	432	60,8	47,6	73,8	40,6	42,7	38,6
Athérosclérose (I70)	28	7	21	2,4	1,2	3,6	1,6	1,1	1,7
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	138	74	64	11,9	12,8	10,9	8,6	11,9	6,4
Anévrisme aortique et dissection (I71)	83	45	38	7,1	7,8	6,5	5,4	7,3	4,0
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	55	29	26	4,7	5,0	4,4	3,2	4,5	2,5
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	15	4	11	1,3	0,7	1,9	1,0	0,6	1,3
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	252	123	129	21,7	21,3	22,0	14,3	19,0	11,3
Grippe (J10-J11)	17	9	8	1,5	1,6	1,4	1,0	1,4	0,7
Pneumopathie (J12-J18)	235	114	121	20,2	19,8	20,7	13,3	17,6	10,6
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	1	0	1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	1	0	1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	422	233	189	36,3	40,4	32,3	25,8	36,6	19,6
Bronchite chronique et non précisée (J40-J42)	6	3	3	0,5	0,5	0,5	0,3	0,5	0,3
Emphysème (J43)	16	11	5	1,4	1,9	0,9	1,1	1,8	0,7
Asthme (J45-J46)	10	2	8	0,9	0,3	1,4	0,6	0,3	0,7
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	390	217	173	33,6	37,7	29,6	23,8	34,1	17,9
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	4	4	0	0,3	0,7	0,0	0,3	0,7	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	49	21	28	4,2	3,6	4,8	2,8	3,2	2,3
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	114	67	47	9,8	11,6	8,0	7,0	10,5	4,8
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	23	10	13	2,0	1,7	2,2	1,5	1,6	1,3
Maladies de l'appendice (K35-K38)	1	0	1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
Hernies (K40-K46)	13	4	9	1,1	0,7	1,5	0,8	0,7	0,7
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	82	47	35	7,1	8,2	6,0	6,2	7,5	5,0
Maladie alcoolique du foie (K70)	46	31	15	4,0	5,4	2,6	3,7	5,1	2,4
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	36	16	20	3,1	2,8	3,4	2,5	2,4	2,6
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	14	7	7	1,2	1,2	1,2	0,8	1,1	0,6
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	181	89	92	15,6	15,4	15,7	10,9	14,1	9,1
Syndrome néphrotique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	181	89	92	15,6	15,4	15,7	10,9	14,1	9,1
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	7	3	4	0,6	0,5	0,7	0,4	0,5	0,4
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	56	32	24	4,8	5,6	4,1	5,8	6,4	5,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-8 – suite

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Manitoba¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	58	38	20	5,0	6,6	3,4	5,5	7,1	3,9
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	384	172	212	33,1	29,9	36,2	21,9	27,3	17,9
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	915	393	522	78,8	68,2	89,2	56,0	63,3	50,3
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	391	228	163	33,7	39,6	27,8	29,1	39,2	20,2
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	122	74	48	10,5	12,8	8,2	10,8	13,3	8,4
Accidents de véhicule à moteur ⁸	109	67	42	9,4	11,6	7,2	9,6	12,0	7,4
Autres accidents de transport terrestre ⁹	6	3	3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	7	4	3	0,6	0,7	0,5	0,7	0,8	0,5
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	269	154	115	23,2	26,7	19,6	18,2	25,9	11,8
Chutes (W00-W19)	111	56	55	9,6	9,7	9,4	6,4	9,1	4,4
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	2	2	0	0,2	0,3	0,0	0,2	0,4	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	15	11	4	1,3	1,9	0,7	1,3	1,9	0,7
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	11	7	4	0,9	1,2	0,7	0,9	1,2	0,5
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	36	20	16	3,1	3,5	2,7	3,0	3,5	2,5
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	94	58	36	8,1	10,1	6,1	6,4	9,7	3,7
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	165	129	36	14,2	22,4	6,1	14,4	22,5	6,3
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	30	29	1	2,6	5,0	0,2	2,4	4,8	0,2
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	135	100	35	11,6	17,4	6,0	12,0	17,7	6,1
Aggressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	40	34	6	3,4	5,9	1,0	3,7	6,1	1,3
Aggressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	3	3	0	0,3	0,5	0,0	0,3	0,6	0,0
Aggressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	37	31	6	3,2	5,4	1,0	3,4	5,5	1,3
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	25	12	13	2,2	2,1	2,2	2,0	1,9	2,0
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	25	12	13	2,2	2,1	2,2	2,0	1,9	2,0
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	15	7	8	1,3	1,2	1,4	1,0	1,1	1,0

- La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
- Les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité en 2003 sont les estimations postcensitaires mises à jour au 1er juillet 2003, rajustées pour le sous-dénombrement net au recensement et incluent les résidents non permanents. Ces estimations de population figurent dans la publication « Statistiques démographiques annuelles, 2004 » (numéro 91-213-XIB/XPB au catalogue).
- La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
- Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
- « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics », disponible à www.cdc.gov/nchs/data/dvs/im9_2002.pdf.
- Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
- Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
- Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
- Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Nota : Voir la section *Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.*

Source : Statistique Canada, *Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès et Division de la démographie (estimations de population) (Tableaux CANSIM 102-0551 et 102-0552).*

Tableau 1-9

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Saskatchewan¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	9 007	4 639	4 368	905,7	938,9	873,0	615,9	781,8	483,9
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	7	4	3	0,7	0,8	0,6	0,4	0,6	0,3
Tuberculose (A16-A19)	7	6	1	0,7	1,2	0,2	0,6	1,1	0,1
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	6	5	1	0,6	1,0	0,2	0,5	0,9	0,1
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	1	1	0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	1	0	1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	58	27	31	5,8	5,5	6,2	4,2	4,6	4,0
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	11	10	1	1,1	2,0	0,2	0,9	1,6	0,2
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	8	6	2	0,8	1,2	0,4	0,9	1,3	0,5
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	27	17	10	2,7	3,4	2,0	2,1	3,0	1,3
Tumeurs malignes (C00-C97)	2 270	1 234	1 036	228,3	249,8	207,1	170,7	210,4	142,8
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	32	15	17	3,2	3,0	3,4	2,4	2,5	2,2
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	55	44	11	5,5	8,9	2,2	4,2	7,7	1,2
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	49	35	14	4,9	7,1	2,8	3,4	6,1	1,2
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	219	111	108	22,0	22,5	21,6	16,6	19,4	14,0
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	38	17	21	3,8	3,4	4,2	2,9	2,9	2,9
Tumeur maligne du pancréas (C25)	114	65	49	11,5	13,2	9,8	8,6	11,4	6,3
Tumeur maligne du larynx (C32)	14	7	7	1,4	1,4	1,4	1,1	1,2	1,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	542	309	233	54,5	62,5	46,6	41,9	52,9	34,2
Mélanome malin de la peau (C43)	25	15	10	2,5	3,0	2,0	2,2	2,7	1,8
Tumeur maligne du sein (C50)	171	2	169	17,2	0,4	33,8	13,1	0,4	24,0
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	10	2,0	1,9
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	21	4,2	3,2
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	51	10,2	7,2
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	225	45,5	36,1	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	58	36	22	5,8	7,3	4,4	4,6	6,3	3,1
Tumeur maligne de la vessie (C67)	60	40	20	6,0	8,1	4,0	4,5	6,7	2,9
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	47	26	21	4,7	5,3	4,2	4,1	5,1	3,1
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	217	124	93	21,8	25,1	18,6	16,0	21,1	11,9
Maladie de Hodgkin (C81)	1	0	1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	97	54	43	9,8	10,9	8,6	7,2	9,3	5,2
Leucémie (C91-C95)	86	52	34	8,6	10,5	6,8	6,1	8,6	4,3
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	33	18	15	3,3	3,6	3,0	2,6	3,1	2,2
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	322	163	159	32,4	33,0	31,8	23,8	27,8	21,0
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes, et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	67	35	32	6,7	7,1	6,4	4,6	5,9	3,6
Anémies (D50-D64)	28	15	13	2,8	3,0	2,6	1,5	2,2	1,0
Diabète sucré (E10-E14)	340	168	172	34,2	34,0	34,4	22,9	28,5	17,9
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	12	4	8	1,2	0,8	1,6	0,7	0,6	0,9
Malnutrition (E40-E46)	9	3	6	0,9	0,6	1,2	0,5	0,4	0,7
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	3	1	2	0,3	0,2	0,4	0,2	0,1	0,2
Méningite (G00, G03)	2	0	2	0,2	0,0	0,4	0,2	0,0	0,4
Maladie de Parkinson (G20-G21)	60	35	25	6,0	7,1	5,0	3,6	5,3	2,6
Maladie d'Alzheimer (G30)	230	84	146	23,1	17,0	29,2	12,5	12,7	12,2
Maladies cardio-vasculaires graves (I00-I78)	3 130	1 587	1 543	314,8	321,2	308,4	195,1	258,5	144,7
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2 201	1 177	1 024	221,3	238,2	204,7	139,3	193,1	96,6
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	20	6	14	2,0	1,2	2,8	1,2	0,9	1,5

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-9 – suite

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Saskatchewan¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Cardiopathie hypertensive (I11)	43	17	26	4,3	3,4	5,2	2,5	2,9	2,1
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	5	2	3	0,5	0,4	0,6	0,3	0,3	0,2
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	1 507	860	647	151,5	174,1	129,3	97,4	141,5	61,9
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	632	372	260	63,6	75,3	52,0	41,3	60,8	26,1
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	12	7	5	1,2	1,4	1,0	0,7	1,1	0,4
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	863	481	382	86,8	97,4	76,3	55,4	79,6	35,4
Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi (I25.0)	99	58	41	10,0	11,7	8,2	6,7	9,6	4,3
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	764	423	341	76,8	85,6	68,2	48,7	70,0	31,1
Autres cardiopathies (I26-I51)	626	292	334	63,0	59,1	66,8	37,9	47,6	30,9
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	3	2	1	0,3	0,4	0,2	0,3	0,5	0,2
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	5	3	2	0,5	0,6	0,4	0,5	0,6	0,4
Insuffisance cardiaque (I50)	302	133	169	30,4	26,9	33,8	16,1	20,4	13,3
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	316	154	162	31,8	31,2	32,4	21,0	26,1	16,9
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	78	30	48	7,8	6,1	9,6	4,5	4,7	4,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	693	289	404	69,7	58,5	80,7	41,1	45,7	37,4
Athérosclérose (I70)	39	20	19	3,9	4,0	3,8	2,3	3,2	1,6
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	119	71	48	12,0	14,4	9,6	8,0	11,8	4,9
Anévrisme aortique et dissection (I71)	75	47	28	7,5	9,5	5,6	5,1	7,9	3,1
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	44	24	20	4,4	4,9	4,0	2,8	4,0	1,9
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	11	4	7	1,1	0,8	1,4	0,7	0,6	0,7
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	272	108	164	27,4	21,9	32,8	15,9	17,4	14,5
Grippe (J10-J11)	15	7	8	1,5	1,4	1,6	0,9	1,0	0,9
Pneumopathie (J12-J18)	257	101	156	25,8	20,4	31,2	15,0	16,4	13,7
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	3	2	1	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,1
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	3	2	1	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,1
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	383	206	177	38,5	41,7	35,4	24,3	32,2	19,9
Bronchite chronique et non précisée (J40-J42)	6	3	3	0,6	0,6	0,6	0,4	0,5	0,3
Emphysème (J43)	32	20	12	3,2	4,0	2,4	2,1	3,1	1,6
Asthme (J45-J46)	10	2	8	1,0	0,4	1,6	0,7	0,3	1,1
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	335	181	154	33,7	36,6	30,8	21,1	28,4	16,9
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	1	1	0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	30	14	16	3,0	2,8	3,2	1,7	2,1	1,4
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	92	47	45	9,3	9,5	9,0	6,5	8,0	5,2
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	16	4	12	1,6	0,8	2,4	0,9	0,6	1,2
Maladies de l'appendice (K35-K38)	1	0	1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
Hernies (K40-K46)	8	2	6	0,8	0,4	1,2	0,5	0,3	0,6
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	73	49	24	7,3	9,9	4,8	6,5	9,2	3,9
Maladie alcoolique du foie (K70)	43	30	13	4,3	6,1	2,6	3,8	5,6	2,2
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	30	19	11	3,0	3,8	2,2	2,6	3,6	1,7
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	8	4	4	0,8	0,8	0,8	0,5	0,7	0,5
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	168	82	86	16,9	16,6	17,2	9,7	12,9	7,5
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	168	82	86	16,9	16,6	17,2	9,7	12,9	7,5
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	5	2	3	0,5	0,4	0,6	0,4	0,3	0,4
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	4	0,8	0,6	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	1	0,2	0,1
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	35	23	12	3,5	4,7	2,4	4,2	5,4	2,9

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-9 – suite

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Saskatchewan¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	50	23	27	5,0	4,7	5,4	5,2	4,6	5,8
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	116	44	72	11,7	8,9	14,4	7,1	7,2	7,1
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	839	358	481	84,4	72,5	96,1	54,3	59,4	49,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	458	295	163	46,1	59,7	32,6	38,0	55,5	21,5
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	162	121	41	16,3	24,5	8,2	15,8	24,0	7,6
Accidents de véhicule à moteur ⁸	154	114	40	15,5	23,1	8,0	15,1	22,8	7,4
Autres accidents de transport terrestre ⁹	2	2	0	0,2	0,4	0,0	0,2	0,3	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	6	5	1	0,6	1,0	0,2	0,5	0,9	0,2
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	296	174	122	29,8	35,2	24,4	22,2	31,5	14,0
Chutes (W00-W19)	86	51	35	8,6	10,3	7,0	5,6	8,6	3,4
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	3	3	0	0,3	0,6	0,0	0,3	0,6	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	7	6	1	0,7	1,2	0,2	0,7	1,3	0,1
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	11	3	8	1,1	0,6	1,6	1,1	0,6	1,6
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	48	30	18	4,8	6,1	3,6	5,0	6,2	3,7
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	141	81	60	14,2	16,4	12,0	9,6	14,2	5,1
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	112	92	20	11,3	18,6	4,0	11,6	18,7	4,5
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	35	35	0	3,5	7,1	0,0	3,5	7,1	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	77	57	20	7,7	11,5	4,0	8,1	11,7	4,5
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	39	30	9	3,9	6,1	1,8	4,3	6,6	2,0
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	7	4	3	0,7	0,8	0,6	0,7	0,8	0,6
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	32	26	6	3,2	5,3	1,2	3,6	5,7	1,4
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	20	13	7	2,0	2,6	1,4	2,0	2,8	1,3
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	1	1	0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	19	12	7	1,9	2,4	1,4	1,9	2,6	1,3
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	4	0	4	0,4	0,0	0,8	0,2	0,0	0,3

- La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
- Les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité en 2003 sont les estimations postcensitaires mises à jour au 1er juillet 2003, rajustées pour le sous-dénombrement net au recensement et incluent les résidents non permanents. Ces estimations de population figurent dans la publication « Statistiques démographiques annuelles, 2004 » (numéro 91-213-XIB/XPB au catalogue).
- La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
- Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
- « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics », disponible à www.cdc.gov/nchs/data/dvs/im9_2002.pdf.
- Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
- Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
- Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
- Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Nota : Voir la section *Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.*

Source : Statistique Canada, *Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès et Division de la démographie (estimations de population) (Tableaux CANSIM 102-0551 et 102-0552).*

Tableau 1-10

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Alberta¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	18 585	9 709	8 876	588,4	608,4	567,9	583,3	721,4	474,8
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	28	11	17	0,9	0,7	1,1	0,9	0,9	0,8
Tuberculose (A16-A19)	6	3	3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	5	3	2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	1	0	1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	3	0	3	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,2
Septicémie (A40-A41)	120	55	65	3,8	3,4	4,2	3,7	4,2	3,4
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	26	16	10	0,8	1,0	0,6	0,7	0,8	0,6
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	28	21	7	0,9	1,3	0,4	0,8	1,2	0,5
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	38	20	18	1,2	1,3	1,2	1,2	1,5	1,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	5 160	2 681	2 479	163,4	168,0	158,6	166,4	197,7	145,1
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	87	62	25	2,8	3,9	1,6	2,7	4,1	1,5
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	123	96	27	3,9	6,0	1,7	3,9	6,7	1,6
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	144	76	68	4,6	4,8	4,4	4,5	5,5	3,7
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	462	239	223	14,6	15,0	14,3	14,9	17,6	12,7
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	135	80	55	4,3	5,0	3,5	4,3	5,7	3,2
Tumeur maligne du pancréas (C25)	291	146	145	9,2	9,1	9,3	9,4	10,7	8,3
Tumeur maligne du larynx (C32)	32	23	9	1,0	1,4	0,6	1,0	1,7	0,5
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	1 254	714	540	39,7	44,7	34,6	41,3	52,6	33,0
Mélanome malin de la peau (C43)	62	43	19	2,0	2,7	1,2	2,0	3,2	1,2
Tumeur maligne du sein (C50)	418	4	414	13,2	0,3	26,5	12,9	0,3	23,8
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	41	2,6	2,5
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	53	3,4	3,3
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	129	8,3	7,7
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	362	22,7	28,6	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	113	70	43	3,6	4,4	2,8	3,7	5,1	2,5
Tumeur maligne de la vessie (C67)	121	81	40	3,8	5,1	2,6	4,0	6,3	2,2
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	145	83	62	4,6	5,2	4,0	4,6	5,4	3,7
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	484	246	238	15,3	15,4	15,2	15,6	17,9	13,8
Maladie de Hodgkin (C81)	7	4	3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	185	98	87	5,9	6,1	5,6	5,9	6,9	5,0
Leucémie (C91-C95)	198	96	102	6,3	6,0	6,5	6,4	7,2	5,9
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	93	47	46	2,9	2,9	2,9	3,1	3,5	2,7
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	1	1	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	704	356	348	22,3	22,3	22,3	22,7	26,4	19,9
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes, et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	108	59	49	3,4	3,7	3,1	3,4	4,3	2,8
Anémies (D50-D64)	37	15	22	1,2	0,9	1,4	1,1	1,2	1,0
Diabète sucré (E10-E14)	462	227	235	14,6	14,2	15,0	14,6	17,1	12,7
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	16	4	12	0,5	0,3	0,8	0,5	0,3	0,5
Malnutrition (E40-E46)	14	4	10	0,4	0,3	0,6	0,4	0,3	0,5
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	2	0	2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
Méningite (G00, G03)	6	4	2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1
Maladie de Parkinson (G20-G21)	108	65	43	3,4	4,1	2,8	3,3	5,2	2,2
Maladie d'Alzheimer (G30)	344	115	229	10,9	7,2	14,7	10,3	9,8	10,5
Maladies cardio-vasculaires graves (I00-I78)	6 521	3 279	3 242	206,4	205,5	207,4	202,3	254,0	160,9
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	4 568	2 448	2 120	144,6	153,4	135,6	142,2	187,4	105,7
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	35	13	22	1,1	0,8	1,4	1,1	0,9	1,3

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-10 – suite

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Alberta¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Cardiopathie hypertensive (I11)	67	20	47	2,1	1,3	3,0	2,0	1,5	2,2
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	11	6	5	0,3	0,4	0,3	0,4	0,5	0,3
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	3 640	2 063	1 577	115,2	129,3	100,9	113,7	157,0	78,9
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	1 223	685	538	38,7	42,9	34,4	38,3	52,7	27,0
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	8	4	4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	2 409	1 374	1 035	76,3	86,1	66,2	75,2	104,0	51,7
Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi (I25.0)	676	401	275	21,4	25,1	17,6	21,7	30,0	14,7
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	1 733	973	760	54,9	61,0	48,6	53,5	74,0	37,1
Autres cardiopathies (I26-I51)	815	346	469	25,8	21,7	30,0	25,0	27,4	23,0
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	3	1	2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	1	1	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance cardiaque (I50)	331	132	199	10,5	8,3	12,7	9,8	11,1	9,0
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	480	212	268	15,2	13,3	17,1	15,0	16,1	13,9
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	104	33	71	3,3	2,1	4,5	3,1	2,6	3,3
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	1 360	574	786	43,1	36,0	50,3	41,8	46,0	38,7
Athérosclérose (I70)	266	104	162	8,4	6,5	10,4	7,9	8,8	7,5
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	223	120	103	7,1	7,5	6,6	7,3	9,2	5,8
Anévrisme aortique et dissection (I71)	146	81	65	4,6	5,1	4,2	4,8	6,1	3,6
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	77	39	38	2,4	2,4	2,4	2,5	3,1	2,1
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	44	22	22	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,2
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	364	174	190	11,5	10,9	12,2	11,0	14,1	9,2
Grippe (J10-J11)	11	3	8	0,3	0,2	0,5	0,3	0,3	0,4
Pneumopathie (J12-J18)	353	171	182	11,2	10,7	11,6	10,6	13,8	8,8
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	4	2	2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	2	1	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	2	1	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	793	432	361	25,1	27,1	23,1	25,1	34,6	19,4
Bronchite chronique et non précisée (J40-J42)	9	5	4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2
Emphysème (J43)	76	46	30	2,4	2,9	1,9	2,5	3,6	1,7
Asthme (J45-J46)	29	11	18	0,9	0,7	1,2	0,9	0,8	0,9
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	679	370	309	21,5	23,2	19,8	21,5	29,8	16,6
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	8	8	0	0,3	0,5	0,0	0,3	0,6	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	147	87	60	4,7	5,5	3,8	4,5	7,0	2,9
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	159	95	64	5,0	6,0	4,1	5,0	7,2	3,4
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	39	19	20	1,2	1,2	1,3	1,2	1,3	1,1
Maladies de l'appendice (K35-K38)	7	2	5	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	0,3
Hernies (K40-K46)	15	7	8	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	206	134	72	6,5	8,4	4,6	6,4	8,7	4,3
Maladie alcoolique du foie (K70)	121	79	42	3,8	5,0	2,7	3,7	4,9	2,6
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	85	55	30	2,7	3,4	1,9	2,7	3,8	1,7
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	14	8	6	0,4	0,5	0,4	0,4	0,6	0,3
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	236	117	119	7,5	7,3	7,6	7,3	9,3	5,8
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	2	1	1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	2	2	0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	232	114	118	7,3	7,1	7,5	7,2	9,1	5,8
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	10	3	7	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2	0,4
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	7	0,4	0,6	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	1	0,1	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	1	0,1	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	136	77	59	4,3	4,8	3,8	4,8	5,4	4,3

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-10 – suite

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Alberta¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	102	65	37	3,2	4,1	2,4	3,4	4,3	2,6
Symptômes, signes et résultats anormaux d'exams cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	152	80	72	4,8	5,0	4,6	4,8	5,7	3,9
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	1 489	662	827	47,1	41,5	52,9	45,9	49,4	42,4
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	846	564	282	26,8	35,3	18,0	26,5	37,3	16,3
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	441	311	130	14,0	19,5	8,3	13,9	19,4	8,3
Accidents de véhicule à moteur ⁸	401	281	120	12,7	17,6	7,7	12,6	17,4	7,7
Autres accidents de transport terrestre ⁹	16	14	2	0,5	0,9	0,1	0,5	0,9	0,1
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	24	16	8	0,8	1,0	0,5	0,8	1,1	0,5
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	405	253	152	12,8	15,9	9,7	12,6	17,9	8,0
Chutes (W00-W19)	94	62	32	3,0	3,9	2,0	2,9	4,3	1,6
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	1	1	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	22	14	8	0,7	0,9	0,5	0,7	0,9	0,5
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	11	7	4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	23	16	7	0,7	1,0	0,4	0,7	1,0	0,4
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	254	153	101	8,0	9,6	6,5	7,9	11,1	5,2
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	441	333	108	14,0	20,9	6,9	13,3	19,9	6,5
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	83	77	6	2,6	4,8	0,4	2,4	4,4	0,4
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	358	256	102	11,3	16,0	6,5	10,9	15,5	6,1
Aggressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	63	46	17	2,0	2,9	1,1	2,0	2,8	1,1
Aggressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	19	14	5	0,6	0,9	0,3	0,6	0,9	0,3
Aggressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	44	32	12	1,4	2,0	0,8	1,4	1,9	0,8
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	275	182	93	8,7	11,4	6,0	8,3	10,7	5,8
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	275	182	93	8,7	11,4	6,0	8,3	10,7	5,8
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	16	8	8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5

- La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
- Les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité en 2003 sont les estimations postcensitaires mises à jour au 1er juillet 2003, rajustées pour le sous-dénombrement net au recensement et incluent les résidents non permanents. Ces estimations de population figurent dans la publication « Statistiques démographiques annuelles, 2004 » (numéro 91-213-XIB/XPB au catalogue).
- La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
- Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
- « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics », disponible à www.cdc.gov/nchs/data/dvs/im9_2002.pdf.
- Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
- Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
- Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
- Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Nota : Voir la section *Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.*

Source : *Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès et Division de la démographie (estimations de population) (Tableaux CANSIM 102-0551 et 102-0552).*

Tableau 1-11

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Colombie-Britannique¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	29 320	14 910	14 410	706,1	724,3	688,2	543,1	659,0	448,0
Infections à la salmonelle (A01-A02)	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	42	22	20	1,0	1,1	1,0	0,7	1,0	0,6
Tuberculose (A16-A19)	13	6	7	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	11	5	6	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	2	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Coqueluche (A37)	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	3	1	2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Septicémie (A40-A41)	206	95	111	5,0	4,6	5,3	3,7	4,2	3,4
Syphilis (A50-A53)	2	2	0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	91	61	30	2,2	3,0	1,4	1,7	2,4	1,2
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	119	98	21	2,9	4,8	1,0	2,6	4,3	1,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	83	45	38	2,0	2,2	1,8	1,6	2,0	1,4
Tumeurs malignes (C00-C97)	8 170	4 232	3 938	196,8	205,6	188,1	156,2	182,8	137,0
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	146	91	55	3,5	4,4	2,6	2,8	3,7	1,9
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	224	164	60	5,4	8,0	2,9	4,4	7,0	2,1
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	210	131	79	5,1	6,4	3,8	3,9	5,6	2,7
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	789	437	352	19,0	21,2	16,8	15,0	18,8	11,7
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	206	139	67	5,0	6,8	3,2	4,0	5,8	2,3
Tumeur maligne du pancréas (C25)	464	226	238	11,2	11,0	11,4	8,9	9,7	8,3
Tumeur maligne du larynx (C32)	44	35	9	1,1	1,7	0,4	0,9	1,5	0,3
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	2 070	1 137	933	49,9	55,2	44,6	40,3	48,9	33,7
Mélanome malin de la peau (C43)	113	59	54	2,7	2,9	2,6	2,2	2,6	1,9
Tumeur maligne du sein (C50)	609	3	606	14,7	0,1	28,9	11,6	0,1	21,5
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	50	2,4	1,8
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	82	3,9	2,9
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	243	11,6	8,5
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	441	21,4	19,6	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	155	92	63	3,7	4,5	3,0	3,0	4,0	2,1
Tumeur maligne de la vessie (C67)	207	146	61	5,0	7,1	2,9	3,8	6,4	1,9
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	222	125	97	5,3	6,1	4,6	4,6	5,5	3,7
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	769	426	343	18,5	20,7	16,4	14,7	18,6	11,7
Maladie de Hodgkin (C81)	9	6	3	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	335	180	155	8,1	8,7	7,4	6,4	7,8	5,2
Leucémie (C91-C95)	268	156	112	6,5	7,6	5,3	5,1	6,8	3,8
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	157	84	73	3,8	4,1	3,5	3,0	3,7	2,5
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	1 126	580	546	27,1	28,2	26,1	21,2	24,9	18,1
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes, et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	194	98	96	4,7	4,8	4,6	3,6	4,3	3,1
Anémies (D50-D64)	60	21	39	1,4	1,0	1,9	1,0	0,9	1,1
Diabète sucré (E10-E14)	930	499	431	22,4	24,2	20,6	17,3	21,7	13,5
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	37	11	26	0,9	0,5	1,2	0,6	0,5	0,7
Malnutrition (E40-E46)	32	10	22	0,8	0,5	1,1	0,5	0,5	0,6
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	5	1	4	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
Méningite (G00, G03)	8	3	5	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2
Maladie de Parkinson (G20-G21)	220	133	87	5,3	6,5	4,2	3,9	5,8	2,5
Maladie d'Alzheimer (G30)	570	192	378	13,7	9,3	18,1	9,5	8,5	9,8
Maladies cardio-vasculaires graves (I00-I78)	9 962	4 976	4 986	239,9	241,7	238,1	175,3	219,2	139,4
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	6 675	3 540	3 135	160,8	172,0	149,7	118,1	155,8	87,6
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	74	23	51	1,8	1,1	2,4	1,4	1,0	1,5

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-11 – suite

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Colombie-Britannique¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Cardiopathie hypertensive (I11)	86	36	50	2,1	1,7	2,4	1,5	1,6	1,3
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	12	7	5	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	4 775	2 678	2 097	115,0	130,1	100,2	84,8	117,1	58,8
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	2 325	1 346	979	56,0	65,4	46,8	41,9	58,8	28,2
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	30	16	14	0,7	0,8	0,7	0,5	0,7	0,4
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	2 420	1 316	1 104	58,3	63,9	52,7	42,5	57,5	30,2
Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi (I25.0)	95	66	29	2,3	3,2	1,4	1,8	2,8	0,9
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	2 325	1 250	1 075	56,0	60,7	51,3	40,6	54,7	29,2
Autres cardiopathies (I26-I51)	1 728	796	932	41,6	38,7	44,5	30,1	35,8	25,9
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	12	8	4	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,2
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	10	5	5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Insuffisance cardiaque (I50)	726	284	442	17,5	13,8	21,1	12,0	13,2	11,2
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	980	499	481	23,6	24,2	23,0	17,7	22,1	14,2
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	191	78	113	4,6	3,8	5,4	3,3	3,4	3,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	2 395	965	1 430	57,7	46,9	68,3	41,2	42,7	39,5
Athérosclérose (I70)	350	197	153	8,4	9,6	7,3	6,4	8,6	4,6
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	351	196	155	8,5	9,5	7,4	6,4	8,7	4,7
Anévrisme aortique et dissection (I71)	221	137	84	5,3	6,7	4,0	4,1	6,0	2,7
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	130	59	71	3,1	2,9	3,4	2,3	2,6	2,1
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	47	21	26	1,1	1,0	1,2	0,9	0,9	0,9
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	837	367	470	20,2	17,8	22,4	14,1	16,8	12,5
Grippe (J10-J11)	45	15	30	1,1	0,7	1,4	0,8	0,7	0,8
Pneumopathie (J12-J18)	792	352	440	19,1	17,1	21,0	13,3	16,1	11,6
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	7	1	6	0,2	0,0	0,3	0,1	0,0	0,2
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	1	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	6	1	5	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	1 317	696	621	31,7	33,8	29,7	23,6	30,7	19,2
Bronchite chronique et non précisée (J40-J42)	16	9	7	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,2
Emphysème (J43)	102	65	37	2,5	3,2	1,8	1,9	2,8	1,3
Asthme (J45-J46)	53	15	38	1,3	0,7	1,8	1,0	0,7	1,2
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	1 146	607	539	27,6	29,5	25,7	20,4	26,7	16,6
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	10	10	0	0,2	0,5	0,0	0,2	0,4	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	142	80	62	3,4	3,9	3,0	2,4	3,5	1,7
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	232	131	101	5,6	6,4	4,8	4,3	5,8	3,2
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	61	32	29	1,5	1,6	1,4	1,1	1,4	0,8
Maladies de l'appendice (K35-K38)	2	0	2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	21	9	12	0,5	0,4	0,6	0,4	0,4	0,4
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	305	195	110	7,3	9,5	5,3	5,9	8,0	4,1
Maladie alcoolique du foie (K70)	169	109	60	4,1	5,3	2,9	3,3	4,4	2,3
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	136	86	50	3,3	4,2	2,4	2,6	3,6	1,7
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	41	19	22	1,0	0,9	1,1	0,7	0,8	0,6
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	411	198	213	9,9	9,6	10,2	7,3	8,8	6,2
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	2	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	15	11	4	0,4	0,5	0,2	0,3	0,5	0,1
Insuffisance rénale (N17-N19)	394	186	208	9,5	9,0	9,9	6,9	8,3	6,1
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	13	3	10	0,3	0,1	0,5	0,2	0,1	0,3
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	10	0,5	0,4	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	3	0,1	0,1
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	1	0,0	0,1
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	1	0,0	0,1
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	88	53	35	2,1	2,6	1,7	3,1	3,7	2,5

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-11 – suite

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Colombie-Britannique¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	86	35	51	2,1	1,7	2,4	2,3	2,0	2,7
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	363	206	157	8,7	10,0	7,5	7,8	9,9	5,8
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	2 702	1 077	1 625	65,1	52,3	77,6	48,5	47,6	47,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1 361	864	497	32,8	42,0	23,7	29,0	40,6	17,8
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	479	340	139	11,5	16,5	6,6	11,1	16,3	6,0
Accidents de véhicule à moteur ⁸	437	306	131	10,5	14,9	6,3	10,2	14,8	5,6
Autres accidents de transport terrestre ⁹	10	7	3	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	32	27	5	0,8	1,3	0,2	0,7	1,2	0,2
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	882	524	358	21,2	25,5	17,1	17,9	24,3	11,8
Chutes (W00-W19)	261	133	128	6,3	6,5	6,1	4,6	5,9	3,6
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	5	4	1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2	0,1
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	48	40	8	1,2	1,9	0,4	1,2	2,0	0,4
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	21	14	7	0,5	0,7	0,3	0,4	0,6	0,3
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	255	189	66	6,1	9,2	3,2	6,0	8,8	3,2
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	292	144	148	7,0	7,0	7,1	5,5	6,7	4,3
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	450	341	109	10,8	16,6	5,2	10,3	15,8	4,9
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	80	74	6	1,9	3,6	0,3	1,8	3,3	0,3
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	370	267	103	8,9	13,0	4,9	8,5	12,5	4,6
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	39	28	11	0,9	1,4	0,5	1,0	1,4	0,6
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	22	16	6	0,5	0,8	0,3	0,6	0,8	0,3
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	17	12	5	0,4	0,6	0,2	0,4	0,6	0,3
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	1	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	36	25	11	0,9	1,2	0,5	0,8	1,1	0,5
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	1	1	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	35	24	11	0,8	1,2	0,5	0,8	1,1	0,5
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	22	13	9	0,5	0,6	0,4	0,4	0,6	0,3

- La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
- Les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité en 2003 sont les estimations postcensitaires mises à jour au 1er juillet 2003, rajustées pour le sous-dénombrement net au recensement et incluent les résidents non permanents. Ces estimations de population figurent dans la publication « Statistiques démographiques annuelles, 2004 » (numéro 91-213-XIB/XPB au catalogue).
- La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
- Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
- « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics », disponible à www.cdc.gov/nchs/data/dvs/im9_2002.pdf.
- Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
- Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
- Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
- Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Nota : Voir la section *Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.*

Source : Statistique Canada, *Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès* et *Division de la démographie (estimations de population) (Tableaux CANSIM 102-0551 et 102-0552).*

Tableau 1-12

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Territoire du Yukon¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	133	85	48	435,3	550,3	317,7	649,4	780,5	508,9
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose (A16-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	1	1	0	3,3	6,5	0,0	3,7	6,7	0,0
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	49	32	17	160,4	207,2	112,5	243,4	311,0	165,7
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	3	2	1	9,8	12,9	6,6	15,7	19,2	11,7
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	1	1	0	3,3	6,5	0,0	1,9	3,6	0,0
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	5	3	2	16,4	19,4	13,2	26,5	23,3	23,9
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	1	1	0	3,3	6,5	0,0	5,3	9,7	0,0
Tumeur maligne du pancréas (C25)	1	1	0	3,3	6,5	0,0	1,9	3,6	0,0
Tumeur maligne du larynx (C32)	1	1	0	3,3	6,5	0,0	3,7	6,7	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	17	14	3	55,6	90,6	19,9	97,2	161,0	32,0
Mélanome malin de la peau (C43)	1	0	1	3,3	0,0	6,6	2,3	0,0	5,0
Tumeur maligne du sein (C50)	5	0	5	16,4	0,0	33,1	16,9	0,0	37,7
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	0	0,0	0,0
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	2	13,2	16,9
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	1	6,5	16,2	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de la vessie (C67)	1	1	0	3,3	6,5	0,0	5,2	9,5	0,0
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	3	2	1	9,8	12,9	6,6	18,4	20,7	15,4
Maladie de Hodgkin (C81)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leucémie (C91-C95)	1	0	1	3,3	0,0	6,6	7,3	0,0	15,4
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	2	2	0	6,5	12,9	0,0	11,1	20,7	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	7	5	2	22,9	32,4	13,2	30,7	37,7	23,2
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes, et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anémies (D50-D64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diabète sucré (E10-E14)	2	0	2	6,5	0,0	13,2	7,5	0,0	17,0
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Malnutrition (E40-E46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladie de Parkinson (G20-G21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	1	1	0	3,3	6,5	0,0	7,4	20,1	0,0
Maladies cardio-vasculaires graves (I00-I78)	34	15	19	111,3	97,1	125,8	207,2	169,5	237,4
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	23	10	13	75,3	64,7	86,0	133,6	87,3	166,7
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-12 – suite

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Territoire du Yukon¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Cardiopathie hypertensive (I11)	2	0	2	6,5	0,0	13,2	13,7	0,0	23,9
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	15	9	6	49,1	58,3	39,7	77,0	71,1	75,0
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	2	2	0	6,5	12,9	0,0	7,6	13,9	0,0
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	13	7	6	42,5	45,3	39,7	69,5	57,2	75,0
Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi (I25.0)	5	5	0	16,4	32,4	0,0	14,3	27,0	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	8	2	6	26,2	12,9	39,7	55,2	30,2	75,0
Autres cardiopathies (I26-I51)	6	1	5	19,6	6,5	33,1	42,9	16,2	67,8
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance cardiaque (I50)	4	1	3	13,1	6,5	19,9	30,8	16,2	44,3
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	2	0	2	6,5	0,0	13,2	12,1	0,0	23,6
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	9	4	5	29,5	25,9	33,1	60,9	72,6	59,1
Athérosclérose (I70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	2	1	1	6,5	6,5	6,6	12,6	9,7	11,6
Anévrisme aortique et dissection (I71)	1	1	0	3,3	6,5	0,0	5,3	9,7	0,0
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	1	0	1	3,3	0,0	6,6	7,4	0,0	11,6
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	1	1	0	3,3	6,5	0,0	1,9	3,6	0,0
Grippe (J10-J11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie (J12-J18)	1	1	0	3,3	6,5	0,0	1,9	3,6	0,0
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	3	3	0	9,8	19,4	0,0	17,3	35,2	0,0
Bronchite chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Asthme (J45-J46)	1	1	0	3,3	6,5	0,0	5,2	9,5	0,0
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	2	2	0	6,5	12,9	0,0	12,1	25,7	0,0
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	1	1	0	3,3	6,5	0,0	5,3	9,7	0,0
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladie alcoolique du foie (K70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	1	1	0	3,3	6,5	0,0	7,4	20,1	0,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	2	1	1	6,5	6,5	6,6	12,6	14,0	11,7
Syndrome néphrotique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	2	1	1	6,5	6,5	6,6	12,6	14,0	11,7
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	2	2	0	6,5	12,9	0,0	8,6	16,3	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-12 – suite

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Territoire du Yukon¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	1	1	0	3,3	6,5	0,0	3,7	7,0	0,0
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	8	5	3	26,2	32,4	19,9	28,1	26,5	28,6
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	20	14	6	65,5	90,6	39,7	74,6	99,3	48,6
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	6	4	2	19,6	25,9	13,2	20,5	29,7	11,2
Accidents de véhicule à moteur ⁸	6	4	2	19,6	25,9	13,2	20,5	29,7	11,2
Autres accidents de transport terrestre ⁹	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	14	10	4	45,8	64,7	26,5	54,1	69,6	37,5
Chutes (W00-W19)	1	1	0	3,3	6,5	0,0	2,5	5,3	0,0
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	3	3	0	9,8	19,4	0,0	9,8	18,9	0,0
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	2	2	0	6,5	12,9	0,0	9,0	16,3	0,0
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	3	2	1	9,8	12,9	6,6	10,6	17,0	4,1
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	5	2	3	16,4	12,9	19,9	22,2	12,0	33,4
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	6	6	0	19,6	38,8	0,0	19,0	37,9	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	3	3	0	9,8	19,4	0,0	7,6	13,9	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	3	3	0	9,8	19,4	0,0	11,4	24,0	0,0
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	1	1	0	3,3	6,5	0,0	1,9	3,6	0,0
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	1	1	0	3,3	6,5	0,0	1,9	3,6	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. Les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité en 2003 sont les estimations postcensitaires mises à jour au 1er juillet 2003, rajustées pour le sous-dénombrement net au recensement et incluent les résidents non permanents. Ces estimations de population figurent dans la publication « Statistiques démographiques annuelles, 2004 » (numéro 91-213-XIB/XPB au catalogue).
3. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
4. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
5. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics », disponible à www.cdc.gov/nchs/data/dvs/im9_2002.pdf.
6. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
7. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
8. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
9. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Nota : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès et Division de la démographie (estimations de population) (Tableaux CANSIM 102-0551 et 102-0552).

Tableau 1-13

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Territoires du Nord-Ouest¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	202	109	93	478,6	500,4	455,3	960,3	1 037,4	912,4
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose (A16-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	1	0	1	2,4	0,0	4,9	2,0	0,0	4,3
Septicémie (A40-A41)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	1	0	1	2,4	0,0	4,9	6,6	0,0	12,8
Tumeurs malignes (C00-C97)	59	24	35	139,8	110,2	171,4	288,6	287,7	312,9
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	3	1	2	7,1	4,6	9,8	7,1	4,9	10,3
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	9	7	2	21,3	32,1	9,8	40,8	73,0	9,0
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du pancréas (C25)	1	1	0	2,4	4,6	0,0	2,2	4,4	0,0
Tumeur maligne du larynx (C32)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	14	6	8	33,2	27,5	39,2	64,1	55,8	76,6
Mélanome malin de la peau (C43)	1	0	1	2,4	0,0	4,9	5,8	0,0	12,7
Tumeur maligne du sein (C50)	8	0	8	19,0	0,0	39,2	33,1	0,0	63,8
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	3	14,7	31,2
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	0	0,0	0,0
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	3	13,8	50,9	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	1	0	1	2,4	0,0	4,9	2,4	0,0	5,8
Tumeur maligne de la vessie (C67)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	1	0	1	2,4	0,0	4,9	1,8	0,0	3,7
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	5	2	3	11,8	9,2	14,7	23,9	25,5	22,8
Maladie de Hodgkin (C81)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	1	0	1	2,4	0,0	4,9	2,0	0,0	4,2
Leucémie (C91-C95)	2	0	2	4,7	0,0	9,8	9,0	0,0	18,6
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	2	2	0	4,7	9,2	0,0	12,9	25,5	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	10	4	6	23,7	18,4	29,4	69,3	73,3	76,9
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes, et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anémies (D50-D64)	1	0	1	2,4	0,0	4,9	7,5	0,0	16,4
Diabète sucré (E10-E14)	2	0	2	4,7	0,0	9,8	13,2	0,0	25,6
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Malnutrition (E40-E46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladie de Parkinson (G20-G21)	1	1	0	2,4	4,6	0,0	7,5	13,9	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	1	0	1	2,4	0,0	4,9	7,9	0,0	10,3
Maladies cardio-vasculaires graves (I00-I78)	50	28	22	118,5	128,5	107,7	279,0	283,7	274,5
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	42	25	17	99,5	114,8	83,2	229,7	228,1	211,3
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-13 – suite

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Territoires du Nord-Ouest¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Cardiopathie hypertensive (I11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	31	21	10	73,4	96,4	49,0	155,9	172,5	131,5
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	15	8	7	35,5	36,7	34,3	82,5	71,8	88,4
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	16	13	3	37,9	59,7	14,7	73,4	100,7	43,1
Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi (I25.0)	4	3	1	9,5	13,8	4,9	19,8	25,3	13,4
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	12	10	2	28,4	45,9	9,8	53,6	75,4	29,7
Autres cardiopathies (I26-I51)	11	4	7	26,1	18,4	34,3	73,7	55,6	79,8
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance cardiaque (I50)	5	1	4	11,8	4,6	19,6	38,9	33,9	42,9
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	6	3	3	14,2	13,8	14,7	34,9	21,7	37,0
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	1	1	0	2,4	4,6	0,0	7,5	13,9	0,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	6	1	5	14,2	4,6	24,5	37,8	33,9	63,1
Athérosclérose (I70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	1	1	0	2,4	4,6	0,0	4,1	7,8	0,0
Anévrisme aortique et dissection (I71)	1	1	0	2,4	4,6	0,0	4,1	7,8	0,0
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	1	0	1	2,4	0,0	4,9	2,6	0,0	5,3
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	7	4	3	16,6	18,4	14,7	40,5	67,8	26,5
Grippe (J10-J11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie (J12-J18)	7	4	3	16,6	18,4	14,7	40,5	67,8	26,5
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	10	6	4	23,7	27,5	19,6	64,9	90,8	50,4
Bronchite chronique et non précisée (J40-J42)	1	1	0	2,4	4,6	0,0	6,6	13,7	0,0
Emphysème (J43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Asthme (J45-J46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	9	5	4	21,3	23,0	19,6	58,2	77,1	50,4
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	1	1	0	2,4	4,6	0,0	5,8	10,8	0,0
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	1	1	0	2,4	4,6	0,0	2,0	3,7	0,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	1	1	0	2,4	4,6	0,0	6,2	11,7	0,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	1	0	1	2,4	0,0	4,9	2,1	0,0	4,3
Maladie alcoolique du foie (K70)	1	0	1	2,4	0,0	4,9	2,1	0,0	4,3
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	2	2	0	4,7	9,2	0,0	12,9	25,5	0,0
Syndrome néphrotique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	2	2	0	4,7	9,2	0,0	12,9	25,5	0,0
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	2	1	1	4,7	4,6	4,9	4,1	4,1	4,1

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-13 – suite

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Territoires du Nord-Ouest¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	1	1	0	2,4	4,6	0,0	2,0	4,1	0,0
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	15	6	9	35,5	27,5	44,1	56,6	24,7	66,8
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	8	3	5	19,0	13,8	24,5	41,5	49,2	43,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	25	19	6	59,2	87,2	29,4	82,8	113,4	54,8
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	7	5	2	16,6	23,0	9,8	13,8	17,8	10,5
Accidents de véhicule à moteur ⁸	6	4	2	14,2	18,4	9,8	13,8	17,8	10,5
Autres accidents de transport terrestre ⁹	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	1	1	0	2,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	18	14	4	42,6	64,3	19,6	69,0	95,6	44,3
Chutes (W00-W19)	3	2	1	7,1	9,2	4,9	16,7	22,2	16,4
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	3	2	1	7,1	9,2	4,9	6,4	8,5	4,3
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	2	2	0	4,7	9,2	0,0	4,3	8,5	0,0
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	2	2	0	4,7	9,2	0,0	7,8	14,5	0,0
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	8	6	2	19,0	27,5	9,8	33,8	41,9	23,6
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	10	10	0	23,7	45,9	0,0	21,7	42,1	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	4	4	0	9,5	18,4	0,0	9,0	17,6	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	6	6	0	14,2	27,5	0,0	12,7	24,5	0,0
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	1	1	0	2,4	4,6	0,0	2,2	4,2	0,0
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	1	1	0	2,4	4,6	0,0	2,2	4,2	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
- Les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité en 2003 sont les estimations postcensitaires mises à jour au 1er juillet 2003, rajustées pour le sous-dénombrement net au recensement et incluent les résidents non permanents. Ces estimations de population figurent dans la publication « Statistiques démographiques annuelles, 2004 » (numéro 91-213-XIB/XPB au catalogue).
- La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
- Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
- « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics », disponible à www.cdc.gov/nchs/data/dvs/im9_2002.pdf.
- Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
- Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
- Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
- Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Nota : Voir la section *Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.*

Source : Statistique Canada, *Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès et Division de la démographie (estimations de population) (Tableaux CANSIM 102-0551 et 102-0552).*

Tableau 1-14

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Nunavut¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{3, 4, 5}	134	85	49	459,8	563,6	348,5	1 087,1	1 111,3	1 123,9
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose (A16-A19)	1	1	0	3,4	6,6	0,0	2,1	4,0	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	1	1	0	3,4	6,6	0,0	2,1	4,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	1	1	0	3,4	6,6	0,0	20,7	32,6	0,0
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	1	1	0	3,4	6,6	0,0	3,7	7,3	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ⁶	1	1	0	3,4	6,6	0,0	2,1	4,0	0,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	23	13	10	78,9	86,2	71,1	282,3	270,5	288,6
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	1	1	0	3,4	6,6	0,0	3,6	6,7	0,0
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	1	1	0	3,4	6,6	0,0	4,2	7,6	0,0
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	1	1	0	3,4	6,6	0,0	33,9	42,4	0,0
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	4	1	3	13,7	6,6	21,3	22,3	9,1	38,0
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	1	0	1	3,4	0,0	7,1	24,3	0,0	65,1
Tumeur maligne du pancréas (C25)	1	0	1	3,4	0,0	7,1	17,2	0,0	54,9
Tumeur maligne du larynx (C32)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	10	6	4	34,3	39,8	28,5	110,5	116,4	102,0
Mélanome malin de la peau (C43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du sein (C50)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	0	0,0	0,0
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	0	0,0	0,0
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	1	6,6	10,6	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de la vessie (C67)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	2	1	1	6,9	6,6	7,1	36,6	38,8	28,6
Maladie de Hodgkin (C81)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	1	0	1	3,4	0,0	7,1	12,3	0,0	28,6
Leucémie (C91-C95)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	1	1	0	3,4	6,6	0,0	24,3	38,8	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	1	1	0	3,4	6,6	0,0	24,3	38,8	0,0
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes, et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	1	1	0	3,4	6,6	0,0	26,1	43,9	0,0
Anémies (D50-D64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diabète sucré (E10-E14)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Malnutrition (E40-E46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	1	0	1	3,4	0,0	7,1	1,9	0,0	3,8
Maladie de Parkinson (G20-G21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies cardio-vasculaires graves (I00-I78)	23	16	7	78,9	106,1	49,8	325,1	401,3	182,2
Maladies du cœur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	15	10	5	51,5	66,3	35,6	198,4	247,5	115,9
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	1	0	1	3,4	0,0	7,1	8,2	0,0	18,2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-14 – suite

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Nunavut¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Cardiopathie hypertensive (I11)	1	1	0	3,4	6,6	0,0	8,2	15,0	0,0
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	5	3	2	17,2	19,9	14,2	68,7	92,6	26,1
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	3	2	1	10,3	13,3	7,1	40,8	53,8	18,2
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	2	1	1	6,9	6,6	7,1	27,9	38,8	7,9
Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi (I25.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	2	1	1	6,9	6,6	7,1	27,9	38,8	7,9
Autres cardiopathies (I26-I51)	8	6	2	27,5	39,8	14,2	113,2	139,8	71,5
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance cardiaque (I50)	4	3	1	13,7	19,9	7,1	71,0	80,4	65,1
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	4	3	1	13,7	19,9	7,1	42,2	59,4	6,4
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	6	4	2	20,6	26,5	14,2	75,5	86,3	66,4
Athérosclérose (I70)	1	1	0	3,4	6,6	0,0	33,9	42,4	0,0
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	1	1	0	3,4	6,6	0,0	17,2	25,1	0,0
Anévrisme aortique et dissection (I71)	1	1	0	3,4	6,6	0,0	17,2	25,1	0,0
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	1	0	1	3,4	0,0	7,1	1,9	0,0	3,9
Grippe (J10-J11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie (J12-J18)	1	0	1	3,4	0,0	7,1	1,9	0,0	3,9
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	8	0	8	27,5	0,0	56,9	149,4	0,0	468,9
Bronchite chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Asthme (J45-J46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	8	0	8	27,5	0,0	56,9	149,4	0,0	468,9
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	1	1	0	3,4	6,6	0,0	24,3	38,8	0,0
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladie alcoolique du foie (K70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	2	2	0	6,9	13,3	0,0	26,2	42,5	0,0
Syndrome néphrotique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	2	2	0	6,9	13,3	0,0	26,2	42,5	0,0
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	5	1	4	17,2	6,6	28,5	9,5	3,7	15,5

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 1-14 – suite

Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie — Nunavut¹

	Nombre de décès			Taux brut de mortalité pour 100 000 personnes ²			Taux de mortalité normalisé selon l'âge pour 100 000 personnes ²		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	8	6	2	27,5	39,8	14,2	17,9	27,0	7,8
Toutes autres maladies (résiduel) ⁷	4	1	3	13,7	6,6	21,3	30,6	3,7	65,1
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	21	15	6	72,1	99,5	42,7	63,3	86,2	36,8
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	9	5	4	30,9	33,2	28,5	24,5	22,2	27,5
Accidents de véhicule à moteur ⁸	8	5	3	27,5	33,2	21,3	20,9	22,2	19,7
Autres accidents de transport terrestre ⁹	1	0	1	3,4	0,0	7,1	3,6	0,0	7,9
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	12	10	2	41,2	66,3	14,2	38,8	64,0	9,3
Chutes (W00-W19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	5	4	1	17,2	26,5	7,1	20,7	33,3	4,9
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	1	0	1	3,4	0,0	7,1	2,1	0,0	4,4
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	2	2	0	6,9	13,3	0,0	4,5	8,7	0,0
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	4	4	0	13,7	26,5	0,0	11,5	22,0	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	31	25	6	106,4	165,8	42,7	96,4	145,7	43,9
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	6	5	1	20,6	33,2	7,1	19,1	31,2	6,4
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	25	20	5	85,8	132,6	35,6	77,3	114,5	37,5
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	1	0	1	3,4	0,0	7,1	3,6	0,0	7,4
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	1	0	1	3,4	0,0	7,1	3,6	0,0	7,4
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
- Les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité en 2003 sont les estimations postcensitaires mises à jour au 1er juillet 2003, rajustées pour le sous-dénombrement net au recensement et incluent les résidents non permanents. Ces estimations de population figurent dans la publication « Statistiques démographiques annuelles, 2004 » (numéro 91-213-XIB/XPB au catalogue).
- La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
- Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
- « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics », disponible à www.cdc.gov/nchs/data/dvs/im9_2002.pdf.
- Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
- Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
- Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
- Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Nota : Voir la section *Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.*

Source : Statistique Canada, *Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès et Division de la démographie (estimations de population) (Tableaux CANSIM 102-0551 et 102-0552).*

Tableau 2-1

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — Moins d'un an^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	1 765	983	782	526,6	572,5	478,3
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	1	1	0	0,3	0,6	0,0
Tuberculose (A16-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	1	0	1	0,3	0,0	0,6
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	6	0	6	1,8	0,0	3,7
Septicémie (A40-A41)	9	4	5	2,7	2,3	3,1
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	9	7	2	2,7	4,1	1,2
Tumeurs malignes (C00-C97)	7	2	5	2,1	1,2	3,1
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	2	0	2	0,6	0,0	1,2
Tumeur maligne du pancréas (C25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du larynx (C32)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Mélanome malin de la peau (C43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du sein (C50)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	0	0,0
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	0	0,0
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	0	0,0
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	0	0,0	...
Tumeurs malignes du rein et du bassin du rein (C64-C65)	1	1	0	0,3	0,6	0,0
Tumeur maligne de la vessie (C67)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	3	1	2	0,9	0,6	1,2
Maladie de Hodgkin (C81)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie (C91-C95)	3	1	2	0,9	0,6	1,2
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	1	0	1	0,3	0,0	0,6
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes, et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	2	1	1	0,6	0,6	0,6
Anémies (D50-D64)	1	0	1	0,3	0,0	0,6
Diabète sucré (E10-E14)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malnutrition (E40-E46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	7	3	4	2,1	1,7	2,4
Maladie de Parkinson (G20-G21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cardio-vasculaires graves (I00-I78)	24	16	8	7,2	9,3	4,9
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	20	13	7	6,0	7,6	4,3

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-1 – suite

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — Moins d'un an², 3, 4, 5

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	1	1	0	0,3	0,6	0,0
Cardiopathie hypertensive (I11)	1	0	1	0,3	0,0	0,6
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	1	0	1	0,3	0,0	0,6
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	1	0	1	0,3	0,0	0,6
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi (I25.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres cardiopathies (I26-I51)	17	12	5	5,1	7,0	3,1
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	1	1	0	0,3	0,6	0,0
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	1	1	0	0,3	0,6	0,0
Insuffisance cardiaque (I50)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	15	10	5	4,5	5,8	3,1
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3	2	1	0,9	1,2	0,6
Athérosclérose (I70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	1	1	0	0,3	0,6	0,0
Anévrisme aortique et dissection (I71)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies des artères, des artéριοles et des capillaires (I72-I78)	1	1	0	0,3	0,6	0,0
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	6	3	3	1,8	1,7	1,8
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	12	6	6	3,6	3,5	3,7
Grippe (J10-J11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie (J12-J18)	12	6	6	3,6	3,5	3,7
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	1	0	1	0,3	0,0	0,6
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	1	0	1	0,3	0,0	0,6
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	1	0	1	0,3	0,0	0,6
Bronchite chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Asthme (J45-J46)	1	0	1	0,3	0,0	0,6
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	1	1	0	0,3	0,6	0,0
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	5	5	0	1,5	2,9	0,0
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	1	0	1	0,3	0,0	0,6
Hernies (K40-K46)	4	3	1	1,2	1,7	0,6
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie alcoolique du foie (K70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	5	3	2	1,5	1,7	1,2
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	1	1	0	0,3	0,6	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	4	2	2	1,2	1,2	1,2
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	981	548	433	292,7	319,2	264,8
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	423	224	199	126,2	130,5	121,7

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-1 – suite

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — Moins d'un an^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	158	95	63	47,1	55,3	38,5
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	66	44	22	19,7	25,6	13,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	25	13	12	7,5	7,6	7,3
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	4	2	2	1,2	1,2	1,2
Accidents de véhicule à moteur ¹²	4	2	2	1,2	1,2	1,2
Autres accidents de transport terrestre ¹³	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	21	11	10	6,3	6,4	6,1
Chutes (W00-W19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	2	1	1	0,6	0,6	0,6
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	19	10	9	5,7	5,8	5,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	8	3	5	2,4	1,7	3,1
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	8	3	5	2,4	1,7	3,1
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	1	1	0	0,3	0,6	0,0
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	1	1	0	0,3	0,6	0,0
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	0	0	0	0,0	0,0	0,0

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
6. Les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité en 2003 sont les estimations postcensitaires mises à jour au 1er juillet 2003, rajustées pour le sous-dénombrement net au recensement et incluent les résidents non permanents. Ces estimations de population figurent dans la publication « Statistiques démographiques annuelles, 2004 » (numéro 91-213-XIB/XPB au catalogue).
7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics », disponible à www.cdc.gov/nchs/data/dvs/im9_2002.pdf.
10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Nota : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès et Division de la démographie (estimations de population) (Tableau CANSIM 102-0551).

Tableau 2-2

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 1 à 4 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	312	174	138	22,7	24,8	20,6
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	3	3	0	0,2	0,4	0,0
Tuberculose (A16-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	2	2	0	0,1	0,3	0,0
Septicémie (A40-A41)	6	2	4	0,4	0,3	0,6
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	8	5	3	0,6	0,7	0,4
Tumeurs malignes (C00-C97)	29	17	12	2,1	2,4	1,8
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Tumeur maligne du pancréas (C25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du larynx (C32)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Mélanome malin de la peau (C43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du sein (C50)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	0	0,0
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	0	0,0
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	0	0,0
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	0	0,0	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de la vessie (C67)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	8	4	4	0,6	0,6	0,6
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	11	8	3	0,8	1,1	0,4
Maladie de Hodgkin (C81)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	2	0	2	0,1	0,0	0,3
Leucémie (C91-C95)	9	8	1	0,7	1,1	0,1
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	9	4	5	0,7	0,6	0,7
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes, et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	6	3	3	0,4	0,4	0,4
Anémies (D50-D64)	3	3	0	0,2	0,4	0,0
Diabète sucré (E10-E14)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malnutrition (E40-E46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	2	2	0	0,1	0,3	0,0
Maladie de Parkinson (G20-G21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cardio-vasculaires graves (I00-I78)	15	10	5	1,1	1,4	0,7
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	15	10	5	1,1	1,4	0,7

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-2 – suite

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 1 à 4 ans², 3, 4, 5

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	1	0	1	0,1	0,0	0,1
Cardiopathie hypertensive (I11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi (I25.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres cardiopathies (I26-I51)	14	10	4	1,0	1,4	0,6
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance cardiaque (I50)	1	0	1	0,1	0,0	0,1
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	12	9	3	0,9	1,3	0,4
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Athérosclérose (I70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Anévrisme aortique et dissection (I71)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies des artères, des artérols et des capillaires (I72-I78)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	15	8	7	1,1	1,1	1,0
Grippe (J10-J11)	3	1	2	0,2	0,1	0,3
Pneumopathie (J12-J18)	12	7	5	0,9	1,0	0,7
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	2	2	0	0,1	0,3	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	2	2	0	0,1	0,3	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Bronchite chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Asthme (J45-J46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	6	4	2	0,4	0,6	0,3
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	2	2	0	0,1	0,3	0,0
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie alcoolique du foie (K70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	6	3	3	0,4	0,4	0,4
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	35	16	19	2,5	2,3	2,8

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-2 – suite

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 1 à 4 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	26	13	13	1,9	1,8	1,9
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	51	25	26	3,7	3,6	3,9
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	86	49	37	6,3	7,0	5,5
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	29	15	14	2,1	2,1	2,1
Accidents de véhicule à moteur ¹²	28	15	13	2,0	2,1	1,9
Autres accidents de transport terrestre ¹³	1	0	1	0,1	0,0	0,1
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	57	34	23	4,1	4,8	3,4
Chutes (W00-W19)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	14	11	3	1,0	1,6	0,4
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	12	7	5	0,9	1,0	0,7
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	4	2	2	0,3	0,3	0,3
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	25	13	12	1,8	1,8	1,8
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	6	3	3	0,4	0,4	0,4
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	5	2	3	0,4	0,3	0,4
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	0	0	0	0,0	0,0	0,0

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
 2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
 3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
 4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
 5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
 6. Les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité en 2003 sont les estimations postcensitaires mises à jour au 1er juillet 2003, rajustées pour le sous-dénombrement net au recensement et incluent les résidents non permanents. Ces estimations de population figurent dans la publication « Statistiques démographiques annuelles, 2004 » (numéro 91-213-XIB/XPB au catalogue).
 7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
 8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
 9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics », disponible à www.cdc.gov/nchs/data/dvs/im9_2002.pdf.
 10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
 11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
 12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
 13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.
- Nota :** Voir la section *Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.*
- Source :** Statistique Canada, *Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès* et *Division de la démographie (estimations de population) (Tableau CANSIM 102-0551).*

Tableau 2-3

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 5 à 9 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	204	128	76	10,4	12,8	8,0
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose (A16-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	3	1	2	0,2	0,1	0,2
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	45	34	11	2,3	3,4	1,2
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du pancréas (C25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du larynx (C32)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Mélanome malin de la peau (C43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du sein (C50)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	0	0,0
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	0	0,0
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	0	0,0
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	0	0,0	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de la vessie (C67)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	13	8	5	0,7	0,8	0,5
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	18	15	3	0,9	1,5	0,3
Maladie de Hodgkin (C81)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	3	3	0	0,2	0,3	0,0
Leucémie (C91-C95)	15	12	3	0,8	1,2	0,3
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	14	11	3	0,7	1,1	0,3
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes, et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	5	2	3	0,3	0,2	0,3
Anémies (D50-D64)	3	3	0	0,2	0,3	0,0
Diabète sucré (E10-E14)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malnutrition (E40-E46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	3	1	2	0,2	0,1	0,2
Maladie de Parkinson (G20-G21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cardio-vasculaires graves (I00-I78)	6	2	4	0,3	0,2	0,4
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	5	2	3	0,3	0,2	0,3

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-3 – suite

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 5 à 9 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathie hypertensive (I11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi (I25.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres cardiopathies (I26-I51)	5	2	3	0,3	0,2	0,3
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	1	0	1	0,1	0,0	0,1
Insuffisance cardiaque (I50)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	4	2	2	0,2	0,2	0,2
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	1	0	1	0,1	0,0	0,1
Athérosclérose (I70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Anévrisme aortique et dissection (I71)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies des artères, des artérols et des capillaires (I72-I78)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	6	2	4	0,3	0,2	0,4
Grippe (J10-J11)	1	0	1	0,1	0,0	0,1
Pneumopathie (J12-J18)	5	2	3	0,3	0,2	0,3
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Bronchite chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Asthme (J45-J46)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	3	2	1	0,2	0,2	0,1
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	1	0	1	0,1	0,0	0,1
Hernies (K40-K46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie alcoolique du foie (K70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	12	6	6	0,6	0,6	0,6

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-3 – suite

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 5 à 9 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	10	4	6	0,5	0,4	0,6
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	28	19	9	1,4	1,9	0,9
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	69	45	24	3,5	4,5	2,5
Accidents de transport (V01-Y99, Y85)	41	26	15	2,1	2,6	1,6
Accidents de véhicule à moteur ¹²	35	21	14	1,8	2,1	1,5
Autres accidents de transport terrestre ¹³	3	2	1	0,2	0,2	0,1
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	3	3	0	0,2	0,3	0,0
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	28	19	9	1,4	1,9	0,9
Chutes (W00-W19)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	12	10	2	0,6	1,0	0,2
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	5	1	4	0,3	0,1	0,4
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	7	4	3	0,4	0,4	0,3
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	4	3	1	0,2	0,3	0,1
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	3	2	1	0,2	0,2	0,1
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	0	0	0	0,0	0,0	0,0

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
6. Les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité en 2003 sont les estimations postcensitaires mises à jour au 1er juillet 2003, rajustées pour le sous-dénombrement net au recensement et incluent les résidents non permanents. Ces estimations de population figurent dans la publication « Statistiques démographiques annuelles, 2004 » (numéro 91-213-XIB/XPB au catalogue).
7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics », disponible à www.cdc.gov/nchs/data/dvs/im9_2002.pdf.
10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Nota : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès et Division de la démographie (estimations de population) (Tableau CANSIM 102-0551).

Tableau 2-4

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 10 à 14 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	295	181	114	13,9	16,7	11,0
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose (A16-A19)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Septicémie (A40-A41)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Tumeurs malignes (C00-C97)	40	24	16	1,9	2,2	1,5
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du pancréas (C25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du larynx (C32)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Mélanome malin de la peau (C43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du sein (C50)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	0	0,0
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	0	0,0
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	0	0,0
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	1	0,1	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Tumeur maligne de la vessie (C67)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	16	10	6	0,8	0,9	0,6
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	12	8	4	0,6	0,7	0,4
Maladie de Hodgkin (C81)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	4	3	1	0,2	0,3	0,1
Leucémie (C91-C95)	7	5	2	0,3	0,5	0,2
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	9	3	6	0,4	0,3	0,6
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes, et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	5	2	3	0,2	0,2	0,3
Anémies (D50-D64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Diabète sucré (E10-E14)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malnutrition (E40-E46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Maladie de Parkinson (G20-G21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cardio-vasculaires graves (I00-I78)	14	10	4	0,7	0,9	0,4
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	11	9	2	0,5	0,8	0,2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-4 – suite

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 10 à 14 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathie hypertensive (I11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi (I25.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres cardiopathies (I26-I51)	11	9	2	0,5	0,8	0,2
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Insuffisance cardiaque (I50)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	10	8	2	0,5	0,7	0,2
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	2	0	2	0,1	0,0	0,2
Athérosclérose (I70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Anévrisme aortique et dissection (I71)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Autres maladies des artères, des artérols et des capillaires (I72-I78)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	4	1	3	0,2	0,1	0,3
Grippe (J10-J11)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Pneumopathie (J12-J18)	2	0	2	0,1	0,0	0,2
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Bronchite chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Asthme (J45-J46)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	3	1	2	0,1	0,1	0,2
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	2	0	2	0,1	0,0	0,2
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Maladie alcoolique du foie (K70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	20	13	7	0,9	1,2	0,7

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-4 – suite

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 10 à 14 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	13	9	4	0,6	0,8	0,4
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	34	16	18	1,6	1,5	1,7
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	110	72	38	5,2	6,6	3,7
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	77	47	30	3,6	4,3	2,9
Accidents de véhicule à moteur ¹²	70	44	26	3,3	4,1	2,5
Autres accidents de transport terrestre ¹³	4	3	1	0,2	0,3	0,1
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	3	0	3	0,1	0,0	0,3
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	33	25	8	1,6	2,3	0,8
Chutes (W00-W19)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	12	8	4	0,6	0,7	0,4
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	6	5	1	0,3	0,5	0,1
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	11	9	2	0,5	0,8	0,2
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	27	19	8	1,3	1,7	0,8
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	26	18	8	1,2	1,7	0,8
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	10	5	5	0,5	0,5	0,5
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	8	4	4	0,4	0,4	0,4
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	1	0	1	0,0	0,0	0,1

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
 2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
 3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
 4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
 5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
 6. Les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité en 2003 sont les estimations postcensitaires mises à jour au 1er juillet 2003, rajustées pour le sous-dénombrement net au recensement et incluent les résidents non permanents. Ces estimations de population figurent dans la publication « Statistiques démographiques annuelles, 2004 » (numéro 91-213-XIB/XPB au catalogue).
 7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
 8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
 9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics », disponible à www.cdc.gov/nchs/data/dvs/im9_2002.pdf.
 10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
 11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
 12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
 13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.
- Nota :** Voir la section *Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.*
- Source :** Statistique Canada, *Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès* et *Division de la démographie (estimations de population) (Tableau CANSIM 102-0551).*

Tableau 2-5

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 15 à 19 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	985	699	286	46,4	64,1	27,7
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose (A16-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	4	2	2	0,2	0,2	0,2
Septicémie (A40-A41)	5	2	3	0,2	0,2	0,3
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	83	50	33	3,9	4,6	3,2
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	4	1	3	0,2	0,1	0,3
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Tumeur maligne du pancréas (C25)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du larynx (C32)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Mélanome malin de la peau (C43)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Tumeur maligne du sein (C50)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	0	0,0
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	0	0,0
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	0	0,0
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	0	0,0	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Tumeur maligne de la vessie (C67)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	13	8	5	0,6	0,7	0,5
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	36	24	12	1,7	2,2	1,2
Maladie de Hodgkin (C81)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	7	4	3	0,3	0,4	0,3
Leucémie (C91-C95)	26	18	8	1,2	1,7	0,8
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	26	15	11	1,2	1,4	1,1
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes, et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Anémies (D50-D64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Diabète sucré (E10-E14)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malnutrition (E40-E46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie de Parkinson (G20-G21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cardio-vasculaires graves (I00-I78)	27	11	16	1,3	1,0	1,5
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	19	8	11	0,9	0,7	1,1

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-5 – suite

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 15 à 19 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathie hypertensive (I11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	2	0	2	0,1	0,0	0,2
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi (I25.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Autres cardiopathies (I26-I51)	17	8	9	0,8	0,7	0,9
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance cardiaque (I50)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	16	8	8	0,8	0,7	0,8
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	7	3	4	0,3	0,3	0,4
Athérosclérose (I70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Anévrisme aortique et dissection (I71)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies des artères, des artérols et des capillaires (I72-I78)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	2	0	2	0,1	0,0	0,2
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	5	5	0	0,2	0,5	0,0
Grippe (J10-J11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie (J12-J18)	5	5	0	0,2	0,5	0,0
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	3	1	2	0,1	0,1	0,2
Bronchite chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Asthme (J45-J46)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Pneumocoïnoses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	5	4	1	0,2	0,4	0,1
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Hernies (K40-K46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie alcoolique du foie (K70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	4	1	3	0,2	0,1	0,3
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Insuffisance rénale (N17-N19)	2	0	2	0,1	0,0	0,2
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	18	11	7	0,8	1,0	0,7

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-5 – suite

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 15 à 19 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	40	32	8	1,9	2,9	0,8
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	61	34	27	2,9	3,1	2,6
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	444	329	115	20,9	30,2	11,1
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	356	262	94	16,8	24,0	9,1
Accidents de véhicule à moteur ¹²	340	249	91	16,0	22,8	8,8
Autres accidents de transport terrestre ¹³	7	6	1	0,3	0,6	0,1
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	9	7	2	0,4	0,6	0,2
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	88	67	21	4,1	6,1	2,0
Chutes (W00-W19)	13	9	4	0,6	0,8	0,4
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	3	3	0	0,1	0,3	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	21	18	3	1,0	1,7	0,3
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	18	11	7	0,8	1,0	0,7
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	31	25	6	1,5	2,3	0,6
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	216	161	55	10,2	14,8	5,3
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	32	27	5	1,5	2,5	0,5
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	184	134	50	8,7	12,3	4,8
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	36	31	5	1,7	2,8	0,5
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	13	11	2	0,6	1,0	0,2
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	23	20	3	1,1	1,8	0,3
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	15	13	2	0,7	1,2	0,2
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	15	13	2	0,7	1,2	0,2
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	4	3	1	0,2	0,3	0,1

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
6. Les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité en 2003 sont les estimations postcensitaires mises à jour au 1er juillet 2003, rajustées pour le sous-dénombrement net au recensement et incluent les résidents non permanents. Ces estimations de population figurent dans la publication « Statistiques démographiques annuelles, 2004 » (numéro 91-213-XIB/XPB au catalogue).
7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics », disponible à www.cdc.gov/nchs/data/dvs/im9_2002.pdf.
10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Nota : Voir la section *Qualité des données, concepts et méthodologie* — *Notes explicatives pour les tableaux*.

Source : Statistique Canada, *Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès* et *Division de la démographie (estimations de population)* (Tableau CANSIM 102-0551).

Tableau 2-6

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 20 à 24 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	1 314	970	344	60,0	86,6	32,1
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Tuberculose (A16-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	2	0	2	0,1	0,0	0,2
Septicémie (A40-A41)	3	1	2	0,1	0,1	0,2
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Tumeurs malignes (C00-C97)	89	53	36	4,1	4,7	3,4
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	3	3	0	0,1	0,3	0,0
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Tumeur maligne du pancréas (C25)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Tumeur maligne du larynx (C32)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Mélanome malin de la peau (C43)	5	4	1	0,2	0,4	0,1
Tumeur maligne du sein (C50)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	1	0,1
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	0	0,0
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	3	0,3
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	0	0,0	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Tumeur maligne de la vessie (C67)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	15	7	8	0,7	0,6	0,7
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	29	13	16	1,3	1,2	1,5
Maladie de Hodgkin (C81)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	11	6	5	0,5	0,5	0,5
Leucémie (C91-C95)	15	5	10	0,7	0,4	0,9
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	26	19	7	1,2	1,7	0,7
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes, et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	6	1	5	0,3	0,1	0,5
Anémies (D50-D64)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Diabète sucré (E10-E14)	5	2	3	0,2	0,2	0,3
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malnutrition (E40-E46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Maladie de Parkinson (G20-G21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cardio-vasculaires graves (I00-I78)	49	34	15	2,2	3,0	1,4
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	43	30	13	2,0	2,7	1,2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-6 – suite

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 20 à 24 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Cardiopathie hypertensive (I11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	6	6	0	0,3	0,5	0,0
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	5	5	0	0,2	0,4	0,0
Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi (I25.0)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	4	4	0	0,2	0,4	0,0
Autres cardiopathies (I26-I51)	36	24	12	1,6	2,1	1,1
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Insuffisance cardiaque (I50)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	34	22	12	1,6	2,0	1,1
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Athérosclérose (I70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	3	3	0	0,1	0,3	0,0
Anévrisme aortique et dissection (I71)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Autres maladies des artères, des artérolies et des capillaires (I72-I78)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	4	1	3	0,2	0,1	0,3
Grippe (J10-J11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie (J12-J18)	4	1	3	0,2	0,1	0,3
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	6	1	5	0,3	0,1	0,5
Bronchite chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Asthme (J45-J46)	5	1	4	0,2	0,1	0,4
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	6	5	1	0,3	0,4	0,1
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	4	1	3	0,2	0,1	0,3
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie alcoolique du foie (K70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	2	0	2	0,1	0,0	0,2
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	2	0	2	0,1	0,0	0,2
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	1	0,1
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	2	0,2
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	1	0,1
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	1	0,1
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	21	13	8	1,0	1,2	0,7

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-6 – suite

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 20 à 24 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	51	39	12	2,3	3,5	1,1
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	85	49	36	3,9	4,4	3,4
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	529	416	113	24,2	37,1	10,6
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	383	296	87	17,5	26,4	8,1
Accidents de véhicule à moteur ¹²	362	277	85	16,5	24,7	7,9
Autres accidents de transport terrestre ¹³	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	19	17	2	0,9	1,5	0,2
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	146	120	26	6,7	10,7	2,4
Chutes (W00-W19)	23	21	2	1,1	1,9	0,2
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	17	17	0	0,8	1,5	0,0
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	14	10	4	0,6	0,9	0,4
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	49	34	15	2,2	3,0	1,4
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	43	38	5	2,0	3,4	0,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	306	248	58	14,0	22,1	5,4
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	40	37	3	1,8	3,3	0,3
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	266	211	55	12,1	18,8	5,1
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	90	71	19	4,1	6,3	1,8
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	38	33	5	1,7	2,9	0,5
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	52	38	14	2,4	3,4	1,3
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	36	24	12	1,6	2,1	1,1
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	36	24	12	1,6	2,1	1,1
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	0	0	0	0,0	0,0	0,0

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
6. Les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité en 2003 sont les estimations postcensitaires mises à jour au 1er juillet 2003, rajustées pour le sous-dénombrement net au recensement et incluent les résidents non permanents. Ces estimations de population figurent dans la publication « Statistiques démographiques annuelles, 2004 » (numéro 91-213-XIB/XPB au catalogue).
7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics », disponible à www.cdc.gov/nchs/data/dvs/im9_2002.pdf.
10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Nota : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès et Division de la démographie (estimations de population) (Tableau CANSIM 102-0551).

Tableau 2-7

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 25 à 29 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	1 196	828	368	56,4	77,0	35,2
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose (A16-A19)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	3	1	2	0,1	0,1	0,2
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	12	4	8	0,6	0,4	0,8
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Tumeurs malignes (C00-C97)	119	55	64	5,6	5,1	6,1
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	5	2	3	0,2	0,2	0,3
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	10	4	6	0,5	0,4	0,6
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Tumeur maligne du pancréas (C25)	3	1	2	0,1	0,1	0,2
Tumeur maligne du larynx (C32)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Mélanome malin de la peau (C43)	4	4	0	0,2	0,4	0,0
Tumeur maligne du sein (C50)	14	0	14	0,7	0,0	1,3
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	5	0,5
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	0	0,0
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	2	0,2
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	0	0,0	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Tumeur maligne de la vessie (C67)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	15	8	7	0,7	0,7	0,7
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	30	17	13	1,4	1,6	1,2
Maladie de Hodgkin (C81)	4	2	2	0,2	0,2	0,2
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	14	9	5	0,7	0,8	0,5
Leucémie (C91-C95)	12	6	6	0,6	0,6	0,6
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	21	12	9	1,0	1,1	0,9
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes, et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	6	3	3	0,3	0,3	0,3
Anémies (D50-D64)	4	3	1	0,2	0,3	0,1
Diabète sucré (E10-E14)	13	6	7	0,6	0,6	0,7
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malnutrition (E40-E46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie de Parkinson (G20-G21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cardio-vasculaires graves (I00-I78)	67	45	22	3,2	4,2	2,1
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	52	38	14	2,5	3,5	1,3

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-7 – suite

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 25 à 29 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathie hypertensive (I11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	15	14	1	0,7	1,3	0,1
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	7	6	1	0,3	0,6	0,1
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	8	8	0	0,4	0,7	0,0
Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi (I25.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	8	8	0	0,4	0,7	0,0
Autres cardiopathies (I26-I51)	37	24	13	1,7	2,2	1,2
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Insuffisance cardiaque (I50)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	36	24	12	1,7	2,2	1,1
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	10	4	6	0,5	0,4	0,6
Athérosclérose (I70)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	4	3	1	0,2	0,3	0,1
Anévrisme aortique et dissection (I71)	4	3	1	0,2	0,3	0,1
Autres maladies des artères, des artérols et des capillaires (I72-I78)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	4	0	4	0,2	0,0	0,4
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	8	4	4	0,4	0,4	0,4
Grippe (J10-J11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie (J12-J18)	8	4	4	0,4	0,4	0,4
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	9	7	2	0,4	0,7	0,2
Bronchite chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Asthme (J45-J46)	8	6	2	0,4	0,6	0,2
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	4	2	2	0,2	0,2	0,2
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	9	5	4	0,4	0,5	0,4
Maladie alcoolique du foie (K70)	6	3	3	0,3	0,3	0,3
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	7	0,7
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	1	0,1
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	6	0,6
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	25	14	11	1,2	1,3	1,1

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-7 – suite

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 25 à 29 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	57	40	17	2,7	3,7	1,6
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	102	53	49	4,8	4,9	4,7
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	399	315	84	18,8	29,3	8,0
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	255	207	48	12,0	19,2	4,6
Accidents de véhicule à moteur ¹²	242	196	46	11,4	18,2	4,4
Autres accidents de transport terrestre ¹³	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	11	10	1	0,5	0,9	0,1
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	144	108	36	6,8	10,0	3,4
Chutes (W00-W19)	15	10	5	0,7	0,9	0,5
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	4	3	1	0,2	0,3	0,1
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	7	6	1	0,3	0,6	0,1
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	2	0	2	0,1	0,0	0,2
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	76	54	22	3,6	5,0	2,1
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	40	35	5	1,9	3,3	0,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	245	197	48	11,5	18,3	4,6
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	30	28	2	1,4	2,6	0,2
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	215	169	46	10,1	15,7	4,4
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	48	36	12	2,3	3,3	1,1
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	24	22	2	1,1	2,0	0,2
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	24	14	10	1,1	1,3	1,0
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	49	34	15	2,3	3,2	1,4
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	47	32	15	2,2	3,0	1,4
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	1	1	0	0,0	0,1	0,0

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
6. Les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité en 2003 sont les estimations postcensitaires mises à jour au 1er juillet 2003, rajustées pour le sous-dénombrement net au recensement et incluent les résidents non permanents. Ces estimations de population figurent dans la publication « Statistiques démographiques annuelles, 2004 » (numéro 91-213-XIB/XPB au catalogue).
7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics », disponible à www.cdc.gov/nchs/data/dvs/im9_2002.pdf.
10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Nota : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès et Division de la démographie (estimations de population) (Tableau CANSIM 102-0551).

Tableau 2-8

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 30 à 34 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	1 497	993	504	67,1	88,1	45,6
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose (A16-A19)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	5	2	3	0,2	0,2	0,3
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	4	3	1	0,2	0,3	0,1
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	36	27	9	1,6	2,4	0,8
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	7	5	2	0,3	0,4	0,2
Tumeurs malignes (C00-C97)	228	107	121	10,2	9,5	10,9
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	5	3	2	0,2	0,3	0,2
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	14	7	7	0,6	0,6	0,6
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	14	8	6	0,6	0,7	0,5
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	6	2	4	0,3	0,2	0,4
Tumeur maligne du pancréas (C25)	2	0	2	0,1	0,0	0,2
Tumeur maligne du larynx (C32)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	6	3	3	0,3	0,3	0,3
Mélanome malin de la peau (C43)	11	5	6	0,5	0,4	0,5
Tumeur maligne du sein (C50)	27	1	26	1,2	0,1	2,4
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	15	1,4
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	1	0,1
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	7	0,6
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	0	0,0	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Tumeur maligne de la vessie (C67)	2	0	2	0,1	0,0	0,2
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	21	13	8	0,9	1,2	0,7
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	43	34	9	1,9	3,0	0,8
Maladie de Hodgkin (C81)	5	2	3	0,2	0,2	0,3
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	19	16	3	0,9	1,4	0,3
Leucémie (C91-C95)	17	14	3	0,8	1,2	0,3
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	50	28	22	2,2	2,5	2,0
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes, et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	14	9	5	0,6	0,8	0,5
Anémies (D50-D64)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Diabète sucré (E10-E14)	23	11	12	1,0	1,0	1,1
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Malnutrition (E40-E46)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Maladie de Parkinson (G20-G21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cardio-vasculaires graves (I00-I78)	119	79	40	5,3	7,0	3,6
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	93	67	26	4,2	5,9	2,4

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-8 – suite

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 30 à 34 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Cardiopathie hypertensive (I11)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	38	34	4	1,7	3,0	0,4
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	12	11	1	0,5	1,0	0,1
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	25	22	3	1,1	2,0	0,3
Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi (I25.0)	3	3	0	0,1	0,3	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	22	19	3	1,0	1,7	0,3
Autres cardiopathies (I26-I51)	53	32	21	2,4	2,8	1,9
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	3	3	0	0,1	0,3	0,0
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	3	1	2	0,1	0,1	0,2
Insuffisance cardiaque (I50)	4	2	2	0,2	0,2	0,2
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	43	26	17	1,9	2,3	1,5
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	18	7	11	0,8	0,6	1,0
Athérosclérose (I70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	7	4	3	0,3	0,4	0,3
Anévrisme aortique et dissection (I71)	5	4	1	0,2	0,4	0,1
Autres maladies des artères, des artéioles et des capillaires (I72-I78)	2	0	2	0,1	0,0	0,2
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	3	0	3	0,1	0,0	0,3
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	9	5	4	0,4	0,4	0,4
Grippe (J10-J11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie (J12-J18)	9	5	4	0,4	0,4	0,4
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	8	3	5	0,4	0,3	0,5
Bronchite chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Asthme (J45-J46)	7	2	5	0,3	0,2	0,5
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	5	4	1	0,2	0,4	0,1
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	16	8	8	0,7	0,7	0,7
Maladie alcoolique du foie (K70)	11	6	5	0,5	0,5	0,5
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	5	2	3	0,2	0,2	0,3
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	7	3	0,4	0,6	0,3
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Insuffisance rénale (N17-N19)	9	7	2	0,4	0,6	0,2
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	1	0,1
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	9	0,8
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	9	0,8
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	15	8	7	0,7	0,7	0,6

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-8 – suite

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 30 à 34 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	79	57	22	3,5	5,1	2,0
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	131	71	60	5,9	6,3	5,4
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	379	294	85	17,0	26,1	7,7
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	210	160	50	9,4	14,2	4,5
Accidents de véhicule à moteur ¹²	194	147	47	8,7	13,0	4,3
Autres accidents de transport terrestre ¹³	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	14	11	3	0,6	1,0	0,3
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	169	134	35	7,6	11,9	3,2
Chutes (W00-W19)	12	10	2	0,5	0,9	0,2
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	14	12	2	0,6	1,1	0,2
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	10	7	3	0,4	0,6	0,3
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	89	71	18	4,0	6,3	1,6
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	42	32	10	1,9	2,8	0,9
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	295	229	66	13,2	20,3	6,0
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	35	31	4	1,6	2,8	0,4
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	260	198	62	11,6	17,6	5,6
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	37	25	12	1,7	2,2	1,1
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	10	8	2	0,4	0,7	0,2
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	27	17	10	1,2	1,5	0,9
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	51	30	21	2,3	2,7	1,9
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	51	30	21	2,3	2,7	1,9
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	1	1	0	0,0	0,1	0,0

- La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
- Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
- Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
- Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
- Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
- Les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité en 2003 sont les estimations postcensitaires mises à jour au 1er juillet 2003, rajustées pour le sous-dénombrement net au recensement et incluent les résidents non permanents. Ces estimations de population figurent dans la publication « Statistiques démographiques annuelles, 2004 » (numéro 91-213-XIB/XPB au catalogue).
- La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
- Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
- « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics », disponible à www.cdc.gov/nchs/data/dvs/im9_2002.pdf.
- Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
- Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
- Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
- Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Nota : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès et Division de la démographie (estimations de population) (Tableau CANSIM 102-0551).

Tableau 2-9

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 35 à 39 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	2 404	1 592	812	96,7	127,3	65,7
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose (A16-A19)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	12	6	6	0,5	0,5	0,5
Syphilis (A50-A53)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	7	6	1	0,3	0,5	0,1
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	80	69	11	3,2	5,5	0,9
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	6	3	3	0,2	0,2	0,2
Tumeurs malignes (C00-C97)	506	223	283	20,4	17,8	22,9
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	13	9	4	0,5	0,7	0,3
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	12	12	0	0,5	1,0	0,0
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	25	13	12	1,0	1,0	1,0
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	37	25	12	1,5	2,0	1,0
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	10	10	0	0,4	0,8	0,0
Tumeur maligne du pancréas (C25)	16	10	6	0,6	0,8	0,5
Tumeur maligne du larynx (C32)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	50	23	27	2,0	1,8	2,2
Mélanome malin de la peau (C43)	15	4	11	0,6	0,3	0,9
Tumeur maligne du sein (C50)	82	0	82	3,3	0,0	6,6
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	21	1,7
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	4	0,3
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	11	0,9
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	0	0,0	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	7	6	1	0,3	0,5	0,1
Tumeur maligne de la vessie (C67)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	56	28	28	2,3	2,2	2,3
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	70	49	21	2,8	3,9	1,7
Maladie de Hodgkin (C81)	8	6	2	0,3	0,5	0,2
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	30	23	7	1,2	1,8	0,6
Leucémie (C91-C95)	29	18	11	1,2	1,4	0,9
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	75	32	43	3,0	2,6	3,5
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes, et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	17	14	3	0,7	1,1	0,2
Anémies (D50-D64)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Diabète sucré (E10-E14)	32	19	13	1,3	1,5	1,1
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malnutrition (E40-E46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Maladie de Parkinson (G20-G21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cardio-vasculaires graves (I00-I78)	278	198	80	11,2	15,8	6,5
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	219	163	56	8,8	13,0	4,5

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-9 – suite

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 35 à 39 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	5	0	5	0,2	0,0	0,4
Cardiopathie hypertensive (I11)	5	4	1	0,2	0,3	0,1
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	130	106	24	5,2	8,5	1,9
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	67	53	14	2,7	4,2	1,1
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	6	4	2	0,2	0,3	0,2
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	57	49	8	2,3	3,9	0,6
Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi (I25.0)	6	4	2	0,2	0,3	0,2
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	51	45	6	2,1	3,6	0,5
Autres cardiopathies (I26-I51)	79	53	26	3,2	4,2	2,1
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	4	1	3	0,2	0,1	0,2
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Insuffisance cardiaque (I50)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	73	51	22	2,9	4,1	1,8
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	44	26	18	1,8	2,1	1,5
Athérosclérose (I70)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	12	8	4	0,5	0,6	0,3
Anévrisme aortique et dissection (I71)	9	8	1	0,4	0,6	0,1
Autres maladies des artères, des artéριοles et des capillaires (I72-I78)	3	0	3	0,1	0,0	0,2
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	6	3	3	0,2	0,2	0,2
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	17	8	9	0,7	0,6	0,7
Grippe (J10-J11)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Pneumopathie (J12-J18)	15	6	9	0,6	0,5	0,7
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	8	4	4	0,3	0,3	0,3
Bronchite chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Asthme (J45-J46)	6	3	3	0,2	0,2	0,2
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	4	3	1	0,2	0,2	0,1
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	6	4	2	0,2	0,3	0,2
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	43	23	20	1,7	1,8	1,6
Maladie alcoolique du foie (K70)	30	13	17	1,2	1,0	1,4
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	13	10	3	0,5	0,8	0,2
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	10	4	6	0,4	0,3	0,5
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	10	4	6	0,4	0,3	0,5
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	4	0,3
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	4	0,3
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	28	13	15	1,1	1,0	1,2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-9 – suite

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 35 à 39 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	95	66	29	3,8	5,3	2,3
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	194	116	78	7,8	9,3	6,3
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	490	374	116	19,7	29,9	9,4
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	254	191	63	10,2	15,3	5,1
Accidents de véhicule à moteur ¹²	223	166	57	9,0	13,3	4,6
Autres accidents de transport terrestre ¹³	6	3	3	0,2	0,2	0,2
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	25	22	3	1,0	1,8	0,2
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	236	183	53	9,5	14,6	4,3
Chutes (W00-W19)	19	16	3	0,8	1,3	0,2
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	3	3	0	0,1	0,2	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	28	25	3	1,1	2,0	0,2
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	8	7	1	0,3	0,6	0,1
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	124	87	37	5,0	7,0	3,0
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	54	45	9	2,2	3,6	0,7
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	434	343	91	17,5	27,4	7,4
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	42	39	3	1,7	3,1	0,2
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	392	304	88	15,8	24,3	7,1
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	40	32	8	1,6	2,6	0,6
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	12	9	3	0,5	0,7	0,2
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	28	23	5	1,1	1,8	0,4
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	71	51	20	2,9	4,1	1,6
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	70	50	20	2,8	4,0	1,6
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	1	0	1	0,0	0,0	0,1

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
6. Les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité en 2003 sont les estimations postcensitaires mises à jour au 1er juillet 2003, rajustées pour le sous-dénombrement net au recensement et incluent les résidents non permanents. Ces estimations de population figurent dans la publication « Statistiques démographiques annuelles, 2004 » (numéro 91-213-XIB/XPB au catalogue).
7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics », disponible à www.cdc.gov/nchs/data/dvs/im9_2002.pdf.
10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Nota : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès et Division de la démographie (estimations de population) (Tableau CANSIM 102-0551).

Tableau 2-10

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 40 à 44 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	3 911	2 415	1 496	143,6	176,8	110,3
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Tuberculose (A16-A19)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Septicémie (A40-A41)	25	13	12	0,9	1,0	0,9
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	18	14	4	0,7	1,0	0,3
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	100	82	18	3,7	6,0	1,3
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	6	4	2	0,2	0,3	0,1
Tumeurs malignes (C00-C97)	1 107	466	641	40,7	34,1	47,3
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	14	10	4	0,5	0,7	0,3
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	23	20	3	0,8	1,5	0,2
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	44	26	18	1,6	1,9	1,3
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	78	42	36	2,9	3,1	2,7
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	22	17	5	0,8	1,2	0,4
Tumeur maligne du pancréas (C25)	47	28	19	1,7	2,0	1,4
Tumeur maligne du larynx (C32)	2	2	0	0,1	0,1	0,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	227	100	127	8,3	7,3	9,4
Mélanome malin de la peau (C43)	34	19	15	1,2	1,4	1,1
Tumeur maligne du sein (C50)	179	0	179	6,6	0,0	13,2
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	35	2,6
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	8	0,6
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	40	2,9
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	0	0,0	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	19	12	7	0,7	0,9	0,5
Tumeur maligne de la vessie (C67)	6	5	1	0,2	0,4	0,1
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	73	48	25	2,7	3,5	1,8
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	114	75	39	4,2	5,5	2,9
Maladie de Hodgkin (C81)	5	4	1	0,2	0,3	0,1
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	48	33	15	1,8	2,4	1,1
Leucémie (C91-C95)	52	33	19	1,9	2,4	1,4
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	9	5	4	0,3	0,4	0,3
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	142	62	80	5,2	4,5	5,9
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes, et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	24	13	11	0,9	1,0	0,8
Anémies (D50-D64)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Diabète sucré (E10-E14)	79	51	28	2,9	3,7	2,1
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Malnutrition (E40-E46)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Maladie de Parkinson (G20-G21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies cardio-vasculaires graves (I00-I78)	600	435	165	22,0	31,8	12,2
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	481	374	107	17,7	27,4	7,9

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-10 – suite

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 40 à 44 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	9	6	3	0,3	0,4	0,2
Cardiopathie hypertensive (I11)	6	4	2	0,2	0,3	0,1
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	334	273	61	12,3	20,0	4,5
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	181	149	32	6,6	10,9	2,4
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	5	4	1	0,2	0,3	0,1
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	148	120	28	5,4	8,8	2,1
Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi (I25.0)	11	9	2	0,4	0,7	0,1
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	137	111	26	5,0	8,1	1,9
Autres cardiopathies (I26-I51)	132	91	41	4,8	6,7	3,0
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	4	3	1	0,1	0,2	0,1
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Insuffisance cardiaque (I50)	14	10	4	0,5	0,7	0,3
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	113	77	36	4,2	5,6	2,7
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	6	4	2	0,2	0,3	0,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	101	49	52	3,7	3,6	3,8
Athérosclérose (I70)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	10	7	3	0,4	0,5	0,2
Anévrisme aortique et dissection (I71)	6	5	1	0,2	0,4	0,1
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	4	2	2	0,1	0,1	0,1
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	10	6	4	0,4	0,4	0,3
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	43	26	17	1,6	1,9	1,3
Grippe (J10-J11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie (J12-J18)	43	26	17	1,6	1,9	1,3
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	31	13	18	1,1	1,0	1,3
Bronchite chronique et non précisée (J40-J42)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Emphysème (J43)	3	1	2	0,1	0,1	0,1
Asthme (J45-J46)	14	6	8	0,5	0,4	0,6
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	14	6	8	0,5	0,4	0,6
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	4	2	2	0,1	0,1	0,1
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	20	12	8	0,7	0,9	0,6
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	8	5	3	0,3	0,4	0,2
Maladies de l'appendice (K35-K38)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	108	60	48	4,0	4,4	3,5
Maladie alcoolique du foie (K70)	75	39	36	2,8	2,9	2,7
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	33	21	12	1,2	1,5	0,9
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	18	11	7	0,7	0,8	0,5
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Insuffisance rénale (N17-N19)	16	10	6	0,6	0,7	0,4
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	3	1	2	0,1	0,1	0,1
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	29	12	17	1,1	0,9	1,3

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-10 – suite

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 40 à 44 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	145	90	55	5,3	6,6	4,1
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	333	200	133	12,2	14,6	9,8
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	552	410	142	20,3	30,0	10,5
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	253	176	77	9,3	12,9	5,7
Accidents de véhicule à moteur ¹²	237	161	76	8,7	11,8	5,6
Autres accidents de transport terrestre ¹³	4	3	1	0,1	0,2	0,1
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	12	12	0	0,4	0,9	0,0
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	299	234	65	11,0	17,1	4,8
Chutes (W00-W19)	39	33	6	1,4	2,4	0,4
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	2	2	0	0,1	0,1	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	31	25	6	1,1	1,8	0,4
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	18	12	6	0,7	0,9	0,4
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	145	109	36	5,3	8,0	2,7
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	64	53	11	2,4	3,9	0,8
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	463	357	106	17,0	26,1	7,8
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	64	61	3	2,4	4,5	0,2
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	399	296	103	14,7	21,7	7,6
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	51	37	14	1,9	2,7	1,0
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	16	9	7	0,6	0,7	0,5
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	35	28	7	1,3	2,0	0,5
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	118	89	29	4,3	6,5	2,1
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	117	88	29	4,3	6,4	2,1
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	5	1	4	0,2	0,1	0,3

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
6. Les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité en 2003 sont les estimations postcensitaires mises à jour au 1er juillet 2003, rajustées pour le sous-dénombrement net au recensement et incluent les résidents non permanents. Ces estimations de population figurent dans la publication « Statistiques démographiques annuelles, 2004 » (numéro 91-213-XIB/XPB au catalogue).
7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics », disponible à www.cdc.gov/nchs/data/dvs/im9_2002.pdf.
10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Nota : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès et Division de la démographie (estimations de population) (Tableau CANSIM 102-0551).

Tableau 2-11

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 45 à 49 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	5 731	3 534	2 197	227,6	282,1	173,6
Infections à la salmonelle (A01-A02)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Tuberculose (A16-A19)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Septicémie (A40-A41)	30	15	15	1,2	1,2	1,2
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	51	36	15	2,0	2,9	1,2
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	76	64	12	3,0	5,1	0,9
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	24	18	6	1,0	1,4	0,5
Tumeurs malignes (C00-C97)	2 110	955	1 155	83,8	76,2	91,3
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	52	38	14	2,1	3,0	1,1
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	59	51	8	2,3	4,1	0,6
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	68	37	31	2,7	3,0	2,5
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	155	79	76	6,2	6,3	6,0
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	65	50	15	2,6	4,0	1,2
Tumeur maligne du pancréas (C25)	74	43	31	2,9	3,4	2,5
Tumeur maligne du larynx (C32)	20	17	3	0,8	1,4	0,2
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	514	245	269	20,4	19,6	21,3
Mélanome malin de la peau (C43)	57	40	17	2,3	3,2	1,3
Tumeur maligne du sein (C50)	309	4	305	12,3	0,3	24,1
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	46	3,6
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	22	1,7
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	70	5,5
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	11	0,9	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	48	38	10	1,9	3,0	0,8
Tumeur maligne de la vessie (C67)	29	19	10	1,2	1,5	0,8
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	112	70	42	4,4	5,6	3,3
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	167	99	68	6,6	7,9	5,4
Maladie de Hodgkin (C81)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	83	53	30	3,3	4,2	2,4
Leucémie (C91-C95)	63	31	32	2,5	2,5	2,5
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	19	13	6	0,8	1,0	0,5
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	232	114	118	9,2	9,1	9,3
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes, et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	28	13	15	1,1	1,0	1,2
Anémies (D50-D64)	4	2	2	0,2	0,2	0,2
Diabète sucré (E10-E14)	122	86	36	4,8	6,9	2,8
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	3	1	2	0,1	0,1	0,2
Malnutrition (E40-E46)	3	1	2	0,1	0,1	0,2
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	4	2	2	0,2	0,2	0,2
Maladie de Parkinson (G20-G21)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Maladie d'Alzheimer (G30)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Maladies cardio-vasculaires graves (I00-I78)	1 068	810	258	42,4	64,7	20,4
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	878	705	173	34,9	56,3	13,7

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-11 – suite

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 45 à 49 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	11	4	7	0,4	0,3	0,6
Cardiopathie hypertensive (I11)	11	10	1	0,4	0,8	0,1
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	673	563	110	26,7	44,9	8,7
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	370	315	55	14,7	25,1	4,3
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	15	12	3	0,6	1,0	0,2
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	288	236	52	11,4	18,8	4,1
Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi (I25.0)	30	26	4	1,2	2,1	0,3
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	258	210	48	10,2	16,8	3,8
Autres cardiopathies (I26-I51)	181	126	55	7,2	10,1	4,3
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	5	3	2	0,2	0,2	0,2
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	3	3	0	0,1	0,2	0,0
Insuffisance cardiaque (I50)	9	7	2	0,4	0,6	0,2
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	164	113	51	6,5	9,0	4,0
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	11	9	2	0,4	0,7	0,2
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	135	69	66	5,4	5,5	5,2
Athérosclérose (I70)	11	7	4	0,4	0,6	0,3
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	33	20	13	1,3	1,6	1,0
Anévrisme aortique et dissection (I71)	18	14	4	0,7	1,1	0,3
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	15	6	9	0,6	0,5	0,7
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	19	9	10	0,8	0,7	0,8
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	36	24	12	1,4	1,9	0,9
Grippe (J10-J11)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Pneumopathie (J12-J18)	35	23	12	1,4	1,8	0,9
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	53	33	20	2,1	2,6	1,6
Bronchite chronique et non précisée (J40-J42)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Emphysème (J43)	4	4	0	0,2	0,3	0,0
Asthme (J45-J46)	18	10	8	0,7	0,8	0,6
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	30	18	12	1,2	1,4	0,9
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	10	8	2	0,4	0,6	0,2
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	31	14	17	1,2	1,1	1,3
Ulcère gastro-duodéal (K25-K28)	11	10	1	0,4	0,8	0,1
Maladies de l'appendice (K35-K38)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Hernies (K40-K46)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	188	128	60	7,5	10,2	4,7
Maladie alcoolique du foie (K70)	128	89	39	5,1	7,1	3,1
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	60	39	21	2,4	3,1	1,7
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	23	18	5	0,9	1,4	0,4
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	20	16	4	0,8	1,3	0,3
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	1	0,1
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	1	0,1
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	39	22	17	1,5	1,8	1,3

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-11 – suite

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 45 à 49 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	182	130	52	7,2	10,4	4,1
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	512	323	189	20,3	25,8	14,9
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	518	379	139	20,6	30,3	11,0
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	239	179	60	9,5	14,3	4,7
Accidents de véhicule à moteur ¹²	214	156	58	8,5	12,5	4,6
Autres accidents de transport terrestre ¹³	6	5	1	0,2	0,4	0,1
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	19	18	1	0,8	1,4	0,1
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	279	200	79	11,1	16,0	6,2
Chutes (W00-W19)	49	40	9	1,9	3,2	0,7
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	3	3	0	0,1	0,2	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	18	15	3	0,7	1,2	0,2
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	18	9	9	0,7	0,7	0,7
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	123	79	44	4,9	6,3	3,5
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	68	54	14	2,7	4,3	1,1
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	454	331	123	18,0	26,4	9,7
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	71	65	6	2,8	5,2	0,5
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	383	266	117	15,2	21,2	9,2
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	23	19	4	0,9	1,5	0,3
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	8	8	0	0,3	0,6	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	15	11	4	0,6	0,9	0,3
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	93	69	24	3,7	5,5	1,9
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	92	68	24	3,7	5,4	1,9
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	5	5	0	0,2	0,4	0,0

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
6. Les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité en 2003 sont les estimations postcensitaires mises à jour au 1er juillet 2003, rajustées pour le sous-dénombrement net au recensement et incluent les résidents non permanents. Ces estimations de population figurent dans la publication « Statistiques démographiques annuelles, 2004 » (numéro 91-213-XIB/XPB au catalogue).
7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics », disponible à www.cdc.gov/nchs/data/dvs/im9_2002.pdf.
10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Nota : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès et Division de la démographie (estimations de population) (Tableau CANSIM 102-0551).

Tableau 2-12

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 50 à 54 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	7 865	4 770	3 095	361,0	441,8	281,7
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Tuberculose (A16-A19)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	2	0	2	0,1	0,0	0,2
Septicémie (A40-A41)	39	18	21	1,8	1,7	1,9
Syphilis (A50-A53)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	84	70	14	3,9	6,5	1,3
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	60	56	4	2,8	5,2	0,4
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	15	8	7	0,7	0,7	0,6
Tumeurs malignes (C00-C97)	3 408	1 650	1 758	156,4	152,8	160,0
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	92	73	19	4,2	6,8	1,7
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	70	60	10	3,2	5,6	0,9
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	98	69	29	4,5	6,4	2,6
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	317	183	134	14,6	17,0	12,2
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	93	71	22	4,3	6,6	2,0
Tumeur maligne du pancréas (C25)	185	109	76	8,5	10,1	6,9
Tumeur maligne du larynx (C32)	27	25	2	1,2	2,3	0,2
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	889	457	432	40,8	42,3	39,3
Mélanome malin de la peau (C43)	66	37	29	3,0	3,4	2,6
Tumeur maligne du sein (C50)	449	1	448	20,6	0,1	40,8
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	48	4,4
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	25	2,3
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	112	10,2
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	30	2,8	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	99	61	38	4,5	5,7	3,5
Tumeur maligne de la vessie (C67)	34	25	9	1,6	2,3	0,8
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	126	76	50	5,8	7,0	4,6
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	272	172	100	12,5	15,9	9,1
Maladie de Hodgkin (C81)	8	5	3	0,4	0,5	0,3
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	141	91	50	6,5	8,4	4,6
Leucémie (C91-C95)	85	55	30	3,9	5,1	2,7
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	38	21	17	1,7	1,9	1,5
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	376	201	175	17,3	18,6	15,9
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes, et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	36	23	13	1,7	2,1	1,2
Anémies (D50-D64)	6	2	4	0,3	0,2	0,4
Diabète sucré (E10-E14)	191	124	67	8,8	11,5	6,1
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	4	4	0	0,2	0,4	0,0
Malnutrition (E40-E46)	4	4	0	0,2	0,4	0,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Maladie de Parkinson (G20-G21)	5	2	3	0,2	0,2	0,3
Maladie d'Alzheimer (G30)	5	3	2	0,2	0,3	0,2
Maladies cardio-vasculaires graves (I00-I78)	1 669	1 264	405	76,6	117,1	36,9
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	1 343	1 073	270	61,7	99,4	24,6

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-12 – suite

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 50 à 54 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	16	7	9	0,7	0,6	0,8
Cardiopathie hypertensive (I11)	20	17	3	0,9	1,6	0,3
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	1	0	1	0,0	0,0	0,1
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	1 103	909	194	50,6	84,2	17,7
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	597	491	106	27,4	45,5	9,6
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	20	15	5	0,9	1,4	0,5
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	486	403	83	22,3	37,3	7,6
Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi (I25.0)	40	34	6	1,8	3,1	0,5
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	446	369	77	20,5	34,2	7,0
Autres cardiopathies (I26-I51)	203	140	63	9,3	13,0	5,7
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	8	7	1	0,4	0,6	0,1
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	6	4	2	0,3	0,4	0,2
Insuffisance cardiaque (I50)	28	16	12	1,3	1,5	1,1
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	161	113	48	7,4	10,5	4,4
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	14	7	7	0,6	0,6	0,6
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	237	128	109	10,9	11,9	9,9
Athérosclérose (I70)	23	21	2	1,1	1,9	0,2
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	52	35	17	2,4	3,2	1,5
Anévrisme aortique et dissection (I71)	34	24	10	1,6	2,2	0,9
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	18	11	7	0,8	1,0	0,6
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	17	10	7	0,8	0,9	0,6
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	63	36	27	2,9	3,3	2,5
Grippe (J10-J11)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie (J12-J18)	63	36	27	2,9	3,3	2,5
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	84	41	43	3,9	3,8	3,9
Bronchite chronique et non précisée (J40-J42)	4	2	2	0,2	0,2	0,2
Emphysème (J43)	10	5	5	0,5	0,5	0,5
Asthme (J45-J46)	13	4	9	0,6	0,4	0,8
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	57	30	27	2,6	2,8	2,5
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	21	13	8	1,0	1,2	0,7
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	59	33	26	2,7	3,1	2,4
Ulcère gastro-duodéal (K25-K28)	16	12	4	0,7	1,1	0,4
Maladies de l'appendice (K35-K38)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Hernies (K40-K46)	3	2	1	0,1	0,2	0,1
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	257	188	69	11,8	17,4	6,3
Maladie alcoolique du foie (K70)	171	132	39	7,8	12,2	3,5
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	86	56	30	3,9	5,2	2,7
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	6	3	3	0,3	0,3	0,3
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	49	32	17	2,2	3,0	1,5
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	48	31	17	2,2	2,9	1,5
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	2	0	2	0,1	0,0	0,2
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	1	0,1
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	51	24	27	2,3	2,2	2,5

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-12 – suite

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 50 à 54 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	138	102	36	6,3	9,4	3,3
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	608	363	245	27,9	33,6	22,3
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	451	334	117	20,7	30,9	10,6
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	206	145	61	9,5	13,4	5,6
Accidents de véhicule à moteur ¹²	176	118	58	8,1	10,9	5,3
Autres accidents de transport terrestre ¹³	10	9	1	0,5	0,8	0,1
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	20	18	2	0,9	1,7	0,2
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	245	189	56	11,2	17,5	5,1
Chutes (W00-W19)	53	39	14	2,4	3,6	1,3
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	2	2	0	0,1	0,2	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	15	10	5	0,7	0,9	0,5
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	11	9	2	0,5	0,8	0,2
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	92	65	27	4,2	6,0	2,5
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	72	64	8	3,3	5,9	0,7
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	404	286	118	18,5	26,5	10,7
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	79	74	5	3,6	6,9	0,5
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	325	212	113	14,9	19,6	10,3
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	29	16	13	1,3	1,5	1,2
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	6	3	3	0,3	0,3	0,3
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	23	13	10	1,1	1,2	0,9
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	69	42	27	3,2	3,9	2,5
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	1	1	0	0,0	0,1	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	68	41	27	3,1	3,8	2,5
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	6	3	3	0,3	0,3	0,3

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
 2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
 3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
 4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
 5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
 6. Les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité en 2003 sont les estimations postcensitaires mises à jour au 1er juillet 2003, rajustées pour le sous-dénombrement net au recensement et incluent les résidents non permanents. Ces estimations de population figurent dans la publication « Statistiques démographiques annuelles, 2004 » (numéro 91-213-XIB/XPB au catalogue).
 7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
 8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
 9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics », disponible à www.cdc.gov/nchs/data/dvs/im9_2002.pdf.
 10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
 11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
 12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
 13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.
- Nota :** Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.
- Source :** Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès et Division de la démographie (estimations de population) (Tableau CANSIM 102-0551).

Tableau 2-13

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 55 à 59 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	10 189	6 269	3 920	552,9	686,0	422,0
Infections à la salmonelle (A01-A02)	1	0	1	0,1	0,0	0,1
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	9	7	2	0,5	0,8	0,2
Tuberculose (A16-A19)	5	4	1	0,3	0,4	0,1
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	3	3	0	0,2	0,3	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Septicémie (A40-A41)	56	29	27	3,0	3,2	2,9
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	40	29	11	2,2	3,2	1,2
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	36	36	0	2,0	3,9	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	17	10	7	0,9	1,1	0,8
Tumeurs malignes (C00-C97)	4 725	2 479	2 246	256,4	271,3	241,8
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	110	86	24	6,0	9,4	2,6
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	141	119	22	7,7	13,0	2,4
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	113	78	35	6,1	8,5	3,8
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	456	262	194	24,7	28,7	20,9
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	108	75	33	5,9	8,2	3,6
Tumeur maligne du pancréas (C25)	269	154	115	14,6	16,9	12,4
Tumeur maligne du larynx (C32)	50	42	8	2,7	4,6	0,9
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	1 371	802	569	74,4	87,8	61,3
Mélanome malin de la peau (C43)	65	42	23	3,5	4,6	2,5
Tumeur maligne du sein (C50)	463	5	458	25,1	0,5	49,3
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	38	4,1
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	70	7,5
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	164	17,7
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	75	8,2	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	114	77	37	6,2	8,4	4,0
Tumeur maligne de la vessie (C67)	56	44	12	3,0	4,8	1,3
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	164	102	62	8,9	11,2	6,7
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	367	223	144	19,9	24,4	15,5
Maladie de Hodgkin (C81)	4	2	2	0,2	0,2	0,2
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	191	111	80	10,4	12,1	8,6
Leucémie (C91-C95)	115	72	43	6,2	7,9	4,6
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	57	38	19	3,1	4,2	2,0
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	531	293	238	28,8	32,1	25,6
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes, et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	64	39	25	3,5	4,3	2,7
Anémies (D50-D64)	9	6	3	0,5	0,7	0,3
Diabète sucré (E10-E14)	357	252	105	19,4	27,6	11,3
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	5	2	3	0,3	0,2	0,3
Malnutrition (E40-E46)	5	2	3	0,3	0,2	0,3
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie de Parkinson (G20-G21)	13	8	5	0,7	0,9	0,5
Maladie d'Alzheimer (G30)	14	6	8	0,8	0,7	0,9
Maladies cardio-vasculaires graves (I00-I78)	2 442	1 832	610	132,5	200,5	65,7
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2 009	1 562	447	109,0	170,9	48,1

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-13 – suite

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 55 à 59 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	19	7	12	1,0	0,8	1,3
Cardiopathie hypertensive (I11)	14	11	3	0,8	1,2	0,3
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	3	2	1	0,2	0,2	0,1
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	1 652	1 324	328	89,7	144,9	35,3
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	885	702	183	48,0	76,8	19,7
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	30	25	5	1,6	2,7	0,5
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	737	597	140	40,0	65,3	15,1
Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi (I25.0)	96	80	16	5,2	8,8	1,7
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	641	517	124	34,8	56,6	13,4
Autres cardiopathies (I26-I51)	321	218	103	17,4	23,9	11,1
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	9	6	3	0,5	0,7	0,3
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	6	4	2	0,3	0,4	0,2
Insuffisance cardiaque (I50)	44	35	9	2,4	3,8	1,0
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	262	173	89	14,2	18,9	9,6
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	17	13	4	0,9	1,4	0,4
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	293	163	130	15,9	17,8	14,0
Athérosclérose (I70)	35	30	5	1,9	3,3	0,5
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	88	64	24	4,8	7,0	2,6
Anévrisme aortique et dissection (I71)	56	47	9	3,0	5,1	1,0
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	32	17	15	1,7	1,9	1,6
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	21	12	9	1,1	1,3	1,0
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	88	51	37	4,8	5,6	4,0
Grippe (J10-J11)	4	1	3	0,2	0,1	0,3
Pneumopathie (J12-J18)	84	50	34	4,6	5,5	3,7
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	1	0	1	0,1	0,0	0,1
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	1	0	1	0,1	0,0	0,1
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	194	95	99	10,5	10,4	10,7
Bronchite chronique et non précisée (J40-J42)	4	1	3	0,2	0,1	0,3
Emphysème (J43)	35	18	17	1,9	2,0	1,8
Asthme (J45-J46)	10	2	8	0,5	0,2	0,9
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	145	74	71	7,9	8,1	7,6
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	21	14	7	1,1	1,5	0,8
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	81	53	28	4,4	5,8	3,0
Ulcère gastro-duodéal (K25-K28)	12	8	4	0,7	0,9	0,4
Maladies de l'appendice (K35-K38)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	6	4	2	0,3	0,4	0,2
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	280	204	76	15,2	22,3	8,2
Maladie alcoolique du foie (K70)	166	124	42	9,0	13,6	4,5
Autres maladies chroniques et cirrheses du foie (K73-K74)	114	80	34	6,2	8,8	3,7
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	3	1	2	0,2	0,1	0,2
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	83	51	32	4,5	5,6	3,4
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Insuffisance rénale (N17-N19)	82	50	32	4,5	5,5	3,4
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	0	0,0	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	47	25	22	2,6	2,7	2,4

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-13 – suite

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 55 à 59 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	174	118	56	9,4	12,9	6,0
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	686	379	307	37,2	41,5	33,1
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	339	245	94	18,4	26,8	10,1
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	146	100	46	7,9	10,9	5,0
Accidents de véhicule à moteur ¹²	130	88	42	7,1	9,6	4,5
Autres accidents de transport terrestre ¹³	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	14	11	3	0,8	1,2	0,3
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	193	145	48	10,5	15,9	5,2
Chutes (W00-W19)	50	39	11	2,7	4,3	1,2
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	3	3	0	0,2	0,3	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	15	12	3	0,8	1,3	0,3
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	9	5	4	0,5	0,5	0,4
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	49	34	15	2,7	3,7	1,6
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	67	52	15	3,6	5,7	1,6
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	292	231	61	15,8	25,3	6,6
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	61	60	1	3,3	6,6	0,1
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	231	171	60	12,5	18,7	6,5
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	15	10	5	0,8	1,1	0,5
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	15	10	5	0,8	1,1	0,5
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	41	22	19	2,2	2,4	2,0
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	40	21	19	2,2	2,3	2,0
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	8	4	4	0,4	0,4	0,4

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
6. Les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité en 2003 sont les estimations postcensitaires mises à jour au 1er juillet 2003, rajustées pour le sous-dénombrement net au recensement et incluent les résidents non permanents. Ces estimations de population figurent dans la publication « Statistiques démographiques annuelles, 2004 » (numéro 91-213-XIB/XPB au catalogue).
7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics », disponible à www.cdc.gov/nchs/data/dvs/im9_2002.pdf.
10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Nota : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès et Division de la démographie (estimations de population) (Tableau CANSIM 102-0551).

Tableau 2-14

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 60 à 64 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	12 911	7 852	5 059	924,3	1 146,8	710,4
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	16	9	7	1,1	1,3	1,0
Tuberculose (A16-A19)	3	3	0	0,2	0,4	0,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	2	2	0	0,1	0,3	0,0
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	76	47	29	5,4	6,9	4,1
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	40	28	12	2,9	4,1	1,7
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	15	14	1	1,1	2,0	0,1
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	30	20	10	2,1	2,9	1,4
Tumeurs malignes (C00-C97)	6 249	3 408	2 841	447,4	497,7	398,9
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	140	104	36	10,0	15,2	5,1
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	159	133	26	11,4	19,4	3,7
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	171	119	52	12,2	17,4	7,3
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	606	381	225	43,4	55,6	31,6
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	142	98	44	10,2	14,3	6,2
Tumeur maligne du pancréas (C25)	333	205	128	23,8	29,9	18,0
Tumeur maligne du larynx (C32)	55	44	11	3,9	6,4	1,5
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	1 999	1 169	830	143,1	170,7	116,6
Mélanome malin de la peau (C43)	81	54	27	5,8	7,9	3,8
Tumeur maligne du sein (C50)	535	3	532	38,3	0,4	74,7
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	21	2,9
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	77	10,8
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	150	21,1
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	169	24,7	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	147	102	45	10,5	14,9	6,3
Tumeur maligne de la vessie (C67)	97	74	23	6,9	10,8	3,2
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	174	94	80	12,5	13,7	11,2
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	498	288	210	35,7	42,1	29,5
Maladie de Hodgkin (C81)	3	2	1	0,2	0,3	0,1
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	194	110	84	13,9	16,1	11,8
Leucémie (C91-C95)	171	100	71	12,2	14,6	10,0
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	130	76	54	9,3	11,1	7,6
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	695	371	324	49,8	54,2	45,5
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes, et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	69	37	32	4,9	5,4	4,5
Anémies (D50-D64)	9	3	6	0,6	0,4	0,8
Diabète sucré (E10-E14)	501	328	173	35,9	47,9	24,3
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	8	2	6	0,6	0,3	0,8
Malnutrition (E40-E46)	7	1	6	0,5	0,1	0,8
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Méningite (G00, G03)	6	1	5	0,4	0,1	0,7
Maladie de Parkinson (G20-G21)	23	18	5	1,6	2,6	0,7
Maladie d'Alzheimer (G30)	39	19	20	2,8	2,8	2,8
Maladies cardio-vasculaires graves (I00-I78)	3 155	2 235	920	225,9	326,4	129,2
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	2 512	1 857	655	179,8	271,2	92,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-14 – suite

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 60 à 64 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	34	19	15	2,4	2,8	2,1
Cardiopathie hypertensive (I11)	20	13	7	1,4	1,9	1,0
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	3	2	1	0,2	0,3	0,1
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	2 080	1 601	479	148,9	233,8	67,3
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	1 071	819	252	76,7	119,6	35,4
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	31	23	8	2,2	3,4	1,1
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	978	759	219	70,0	110,8	30,8
Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi (I25.0)	114	90	24	8,2	13,1	3,4
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	864	669	195	61,9	97,7	27,4
Autres cardiopathies (I26-I51)	375	222	153	26,8	32,4	21,5
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	5	2	3	0,4	0,3	0,4
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	11	3	8	0,8	0,4	1,1
Insuffisance cardiaque (I50)	64	38	26	4,6	5,5	3,7
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	295	179	116	21,1	26,1	16,3
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	36	20	16	2,6	2,9	2,2
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	450	241	209	32,2	35,2	29,3
Athérosclérose (I70)	38	34	4	2,7	5,0	0,6
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	119	83	36	8,5	12,1	5,1
Anévrisme aortique et dissection (I71)	73	61	12	5,2	8,9	1,7
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	46	22	24	3,3	3,2	3,4
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	28	17	11	2,0	2,5	1,5
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	79	45	34	5,7	6,6	4,8
Grippe (J10-J11)	2	1	1	0,1	0,1	0,1
Pneumopathie (J12-J18)	77	44	33	5,5	6,4	4,6
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	379	199	180	27,1	29,1	25,3
Bronchite chronique et non précisée (J40-J42)	7	3	4	0,5	0,4	0,6
Emphysème (J43)	45	28	17	3,2	4,1	2,4
Asthme (J45-J46)	11	3	8	0,8	0,4	1,1
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	316	165	151	22,6	24,1	21,2
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	9	9	0	0,6	1,3	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	37	26	11	2,6	3,8	1,5
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	113	77	36	8,1	11,2	5,1
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	20	15	5	1,4	2,2	0,7
Maladies de l'appendice (K35-K38)	3	3	0	0,2	0,4	0,0
Hernies (K40-K46)	3	0	3	0,2	0,0	0,4
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	305	222	83	21,8	32,4	11,7
Maladie alcoolique du foie (K70)	174	131	43	12,5	19,1	6,0
Autres maladies chroniques et cirrheses du foie (K73-K74)	131	91	40	9,4	13,3	5,6
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	19	15	4	1,4	2,2	0,6
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	98	66	32	7,0	9,6	4,5
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	3	1	2	0,2	0,1	0,3
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	3	1	2	0,2	0,1	0,3
Insuffisance rénale (N17-N19)	91	64	27	6,5	9,3	3,8
Autres maladies des reins (N25, N27)	1	0	1	0,1	0,0	0,1
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	2	2	0	0,1	0,3	0,0
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	1	0,1	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	39	17	22	2,8	2,5	3,1

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-14 – suite

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 60 à 64 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	135	90	45	9,7	13,1	6,3
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	831	454	377	59,5	66,3	52,9
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	325	232	93	23,3	33,9	13,1
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	125	86	39	8,9	12,6	5,5
Accidents de véhicule à moteur ¹²	112	78	34	8,0	11,4	4,8
Autres accidents de transport terrestre ¹³	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	12	7	5	0,9	1,0	0,7
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	200	146	54	14,3	21,3	7,6
Chutes (W00-W19)	70	53	17	5,0	7,7	2,4
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	8	6	2	0,6	0,9	0,3
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	11	8	3	0,8	1,2	0,4
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	38	24	14	2,7	3,5	2,0
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	73	55	18	5,2	8,0	2,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	187	154	33	13,4	22,5	4,6
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	50	50	0	3,6	7,3	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	137	104	33	9,8	15,2	4,6
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	18	15	3	1,3	2,2	0,4
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	4	4	0	0,3	0,6	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	14	11	3	1,0	1,6	0,4
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	1	1	0	0,1	0,1	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	30	17	13	2,1	2,5	1,8
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	30	17	13	2,1	2,5	1,8
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	10	3	7	0,7	0,4	1,0

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
6. Les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité en 2003 sont les estimations postcensitaires mises à jour au 1er juillet 2003, rajustées pour le sous-dénombrement net au recensement et incluent les résidents non permanents. Ces estimations de population figurent dans la publication « Statistiques démographiques annuelles, 2004 » (numéro 91-213-XIB/XPB au catalogue).
7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics », disponible à www.cdc.gov/nchs/data/dvs/im9_2002.pdf.
10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Nota : Voir la section *Qualité des données, concepts et méthodologie* — *Notes explicatives pour les tableaux*.

Source : Statistique Canada, *Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès* et *Division de la démographie (estimations de population)* (Tableau CANSIM 102-0551).

Tableau 2-15

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 65 à 69 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	16 622	10 042	6 580	1 446,1	1 815,0	1 103,7
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	31	16	15	2,7	2,9	2,5
Tuberculose (A16-A19)	9	5	4	0,8	0,9	0,7
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	7	4	3	0,6	0,7	0,5
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	2	1	1	0,2	0,2	0,2
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	103	56	47	9,0	10,1	7,9
Syphilis (A50-A53)	1	1	0	0,1	0,2	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	27	16	11	2,3	2,9	1,8
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	11	10	1	1,0	1,8	0,2
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	42	23	19	3,7	4,2	3,2
Tumeurs malignes (C00-C97)	7 533	4 282	3 251	655,3	773,9	545,3
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	119	89	30	10,4	16,1	5,0
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	172	127	45	15,0	23,0	7,5
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	214	150	64	18,6	27,1	10,7
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	787	484	303	68,5	87,5	50,8
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	190	138	52	16,5	24,9	8,7
Tumeur maligne du pancréas (C25)	403	222	181	35,1	40,1	30,4
Tumeur maligne du larynx (C32)	65	53	12	5,7	9,6	2,0
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	2 419	1 445	974	210,4	261,2	163,4
Mélanome malin de la peau (C43)	73	42	31	6,4	7,6	5,2
Tumeur maligne du sein (C50)	468	2	466	40,7	0,4	78,2
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	29	4,9
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	86	14,4
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	174	29,2
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	311	56,2	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	167	122	45	14,5	22,1	7,5
Tumeur maligne de la vessie (C67)	162	117	45	14,1	21,1	7,5
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	208	126	82	18,1	22,8	13,8
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	610	370	240	53,1	66,9	40,3
Maladie de Hodgkin (C81)	10	7	3	0,9	1,3	0,5
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	256	152	104	22,3	27,5	17,4
Leucémie (C91-C95)	207	130	77	18,0	23,5	12,9
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	137	81	56	11,9	14,6	9,4
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	876	484	392	76,2	87,5	65,8
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes, et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	103	69	34	9,0	12,5	5,7
Anémies (D50-D64)	18	9	9	1,6	1,6	1,5
Diabète sucré (E10-E14)	631	385	246	54,9	69,6	41,3
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	6	3	3	0,5	0,5	0,5
Malnutrition (E40-E46)	6	3	3	0,5	0,5	0,5
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Méningite (G00, G03)	2	2	0	0,2	0,4	0,0
Maladie de Parkinson (G20-G21)	74	45	29	6,4	8,1	4,9
Maladie d'Alzheimer (G30)	84	39	45	7,3	7,0	7,5
Maladies cardio-vasculaires graves (I00-I78)	4 499	3 042	1 457	391,4	549,8	244,4
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	3 425	2 401	1 024	298,0	434,0	171,8

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-15 – suite

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 65 à 69 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	45	19	26	3,9	3,4	4,4
Cardiopathie hypertensive (I11)	29	22	7	2,5	4,0	1,2
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	6	2	4	0,5	0,4	0,7
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	2 783	2 017	766	242,1	364,6	128,5
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	1 411	1 029	382	122,8	186,0	64,1
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	53	36	17	4,6	6,5	2,9
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	1 319	952	367	114,7	172,1	61,6
Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi (I25.0)	160	111	49	13,9	20,1	8,2
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	1 159	841	318	100,8	152,0	53,3
Autres cardiopathies (I26-I51)	562	341	221	48,9	61,6	37,1
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	10	7	3	0,9	1,3	0,5
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	13	7	6	1,1	1,3	1,0
Insuffisance cardiaque (I50)	122	82	40	10,6	14,8	6,7
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	417	245	172	36,3	44,3	28,8
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	55	38	17	4,8	6,9	2,9
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	686	377	309	59,7	68,1	51,8
Athérosclérose (I70)	57	36	21	5,0	6,5	3,5
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	276	190	86	24,0	34,3	14,4
Anévrisme aortique et dissection (I71)	194	138	56	16,9	24,9	9,4
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	82	52	30	7,1	9,4	5,0
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	28	14	14	2,4	2,5	2,3
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	144	78	66	12,5	14,1	11,1
Grippe (J10-J11)	7	2	5	0,6	0,4	0,8
Pneumopathie (J12-J18)	137	76	61	11,9	13,7	10,2
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	676	363	313	58,8	65,6	52,5
Bronchite chronique et non précisée (J40-J42)	3	1	2	0,3	0,2	0,3
Emphysème (J43)	60	39	21	5,2	7,0	3,5
Asthme (J45-J46)	13	5	8	1,1	0,9	1,3
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	600	318	282	52,2	57,5	47,3
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	4	4	0	0,3	0,7	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	42	23	19	3,7	4,2	3,2
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	168	95	73	14,6	17,2	12,2
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	26	12	14	2,3	2,2	2,3
Maladies de l'appendice (K35-K38)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hernies (K40-K46)	15	10	5	1,3	1,8	0,8
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	309	212	97	26,9	38,3	16,3
Maladie alcoolique du foie (K70)	156	116	40	13,6	21,0	6,7
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	153	96	57	13,3	17,4	9,6
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	13	7	6	1,1	1,3	1,0
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	158	88	70	13,7	15,9	11,7
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	1	0	1	0,1	0,0	0,2
Insuffisance rénale (N17-N19)	156	88	68	13,6	15,9	11,4
Autres maladies des reins (N25, N27)	1	0	1	0,1	0,0	0,2
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	4	3	1	0,3	0,5	0,2
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	1	0,2	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	2	0,3
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	29	13	16	2,5	2,3	2,7

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-15 – suite

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 65 à 69 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)						
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	1 133	643	490	98,6	116,2	82,2
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	356	236	120	31,0	42,7	20,1
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	122	69	53	10,6	12,5	8,9
Accidents de véhicule à moteur ¹²	105	55	50	9,1	9,9	8,4
Autres accidents de transport terrestre ¹³	1	1	0	0,1	0,2	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	16	13	3	1,4	2,3	0,5
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	234	167	67	20,4	30,2	11,2
Chutes (W00-W19)	89	67	22	7,7	12,1	3,7
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	1	1	0	0,1	0,2	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	16	12	4	1,4	2,2	0,7
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	19	13	6	1,7	2,3	1,0
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	16	12	4	1,4	2,2	0,7
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	93	62	31	8,1	11,2	5,2
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	142	109	33	12,4	19,7	5,5
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	37	36	1	3,2	6,5	0,2
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	105	73	32	9,1	13,2	5,4
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	8	4	4	0,7	0,7	0,7
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	3	2	1	0,3	0,4	0,2
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	5	2	3	0,4	0,4	0,5
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	23	14	9	2,0	2,5	1,5
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	23	14	9	2,0	2,5	1,5
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	15	5	10	1,3	0,9	1,7

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
6. Les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité en 2003 sont les estimations postcensitaires mises à jour au 1er juillet 2003, rajustées pour le sous-dénombrement net au recensement et incluent les résidents non permanents. Ces estimations de population figurent dans la publication « Statistiques démographiques annuelles, 2004 » (numéro 91-213-XIB/XPB au catalogue).
7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics », disponible à www.cdc.gov/nchs/data/dvs/im9_2002.pdf.
10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Nota : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès et Division de la démographie (estimations de population) (Tableau CANSIM 102-0551).

Tableau 2-16

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 70 à 74 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	24 617	14 734	9 883	2 364,9	3 036,5	1 778,5
Infections à la salmonelle (A01-A02)	1	0	1	0,1	0,0	0,2
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	56	30	26	5,4	6,2	4,7
Tuberculose (A16-A19)	7	6	1	0,7	1,2	0,2
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	6	5	1	0,6	1,0	0,2
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	1	1	0	0,1	0,2	0,0
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	167	99	68	16,0	20,4	12,2
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	33	13	20	3,2	2,7	3,6
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	7	6	1	0,7	1,2	0,2
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	51	23	28	4,9	4,7	5,0
Tumeurs malignes (C00-C97)	9 953	5 811	4 142	956,2	1 197,6	745,4
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	160	120	40	15,4	24,7	7,2
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	223	170	53	21,4	35,0	9,5
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	287	197	90	27,6	40,6	16,2
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	1 018	645	373	97,8	132,9	67,1
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	241	154	87	23,2	31,7	15,7
Tumeur maligne du pancréas (C25)	495	261	234	47,6	53,8	42,1
Tumeur maligne du larynx (C32)	81	66	15	7,8	13,6	2,7
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	3 124	1 951	1 173	300,1	402,1	211,1
Mélanome malin de la peau (C43)	80	51	29	7,7	10,5	5,2
Tumeur maligne du sein (C50)	528	8	520	50,7	1,6	93,6
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	36	6,5
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	102	18,4
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	208	37,4
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	480	98,9	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	223	142	81	21,4	29,3	14,6
Tumeur maligne de la vessie (C67)	239	191	48	23,0	39,4	8,6
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	206	124	82	19,8	25,6	14,8
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	981	550	431	94,2	113,3	77,6
Maladie de Hodgkin (C81)	12	8	4	1,2	1,6	0,7
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	387	210	177	37,2	43,3	31,9
Leucémie (C91-C95)	355	210	145	34,1	43,3	26,1
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	225	121	104	21,6	24,9	18,7
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	2	1	1	0,2	0,2	0,2
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	1 241	701	540	119,2	144,5	97,2
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes, et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	158	90	68	15,2	18,5	12,2
Anémies (D50-D64)	37	18	19	3,6	3,7	3,4
Diabète sucré (E10-E14)	1 048	614	434	100,7	126,5	78,1
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	18	6	12	1,7	1,2	2,2
Malnutrition (E40-E46)	14	3	11	1,3	0,6	2,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	4	3	1	0,4	0,6	0,2
Méningite (G00, G03)	8	4	4	0,8	0,8	0,7
Maladie de Parkinson (G20-G21)	166	107	59	15,9	22,1	10,6
Maladie d'Alzheimer (G30)	274	114	160	26,3	23,5	28,8
Maladies cardio-vasculaires graves (I00-I78)	7 293	4 678	2 615	700,6	964,1	470,6
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	5 403	3 569	1 834	519,1	735,5	330,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-16 – suite

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 70 à 74 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	67	27	40	6,4	5,6	7,2
Cardiopathie hypertensive (I11)	56	32	24	5,4	6,6	4,3
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	9	6	3	0,9	1,2	0,5
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	4 322	2 958	1 364	415,2	609,6	245,5
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	2 156	1 467	689	207,1	302,3	124,0
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	59	33	26	5,7	6,8	4,7
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	2 107	1 458	649	202,4	300,5	116,8
Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi (I25.0)	190	133	57	18,3	27,4	10,3
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	1 917	1 325	592	184,2	273,1	106,5
Autres cardiopathies (I26-I51)	949	546	403	91,2	112,5	72,5
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	13	9	4	1,2	1,9	0,7
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	8	5	3	0,8	1,0	0,5
Insuffisance cardiaque (I50)	263	148	115	25,3	30,5	20,7
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	665	384	281	63,9	79,1	50,6
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	97	52	45	9,3	10,7	8,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	1 309	745	564	125,8	153,5	101,5
Athérosclérose (I70)	90	50	40	8,6	10,3	7,2
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	394	262	132	37,9	54,0	23,8
Anévrisme aortique et dissection (I71)	273	189	84	26,2	39,0	15,1
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	121	73	48	11,6	15,0	8,6
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	35	18	17	3,4	3,7	3,1
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	307	174	133	29,5	35,9	23,9
Grippe (J10-J11)	7	2	5	0,7	0,4	0,9
Pneumopathie (J12-J18)	300	172	128	28,8	35,4	23,0
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	2	1	1	0,2	0,2	0,2
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	1	0	1	0,1	0,0	0,2
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	1	1	0	0,1	0,2	0,0
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	1 336	751	585	128,3	154,8	105,3
Bronchite chronique et non précisée (J40-J42)	13	6	7	1,2	1,2	1,3
Emphysème (J43)	143	90	53	13,7	18,5	9,5
Asthme (J45-J46)	19	4	15	1,8	0,8	2,7
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	1 161	651	510	111,5	134,2	91,8
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	14	13	1	1,3	2,7	0,2
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	88	55	33	8,5	11,3	5,9
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	307	198	109	29,5	40,8	19,6
Ulcère gastro-duodéal (K25-K28)	46	26	20	4,4	5,4	3,6
Maladies de l'appendice (K35-K38)	6	5	1	0,6	1,0	0,2
Hernies (K40-K46)	29	18	11	2,8	3,7	2,0
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	325	221	104	31,2	45,5	18,7
Maladie alcoolique du foie (K70)	127	103	24	12,2	21,2	4,3
Autres maladies chroniques et cirrhotiques du foie (K73-K74)	198	118	80	19,0	24,3	14,4
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	31	18	13	3,0	3,7	2,3
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	325	186	139	31,2	38,3	25,0
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	5	2	3	0,5	0,4	0,5
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	6	4	2	0,6	0,8	0,4
Insuffisance rénale (N17-N19)	313	179	134	30,1	36,9	24,1
Autres maladies des reins (N25, N27)	1	1	0	0,1	0,2	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	11	4	7	1,1	0,8	1,3
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	4	0,8	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	21	10	11	2,0	2,1	2,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-16 – suite

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 70 à 74 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	179	106	73	17,2	21,8	13,1
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	1 700	937	763	163,3	193,1	137,3
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	423	255	168	40,6	52,6	30,2
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	128	85	43	12,3	17,5	7,7
Accidents de véhicule à moteur ¹²	117	77	40	11,2	15,9	7,2
Autres accidents de transport terrestre ¹³	6	4	2	0,6	0,8	0,4
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	5	4	1	0,5	0,8	0,2
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	295	170	125	28,3	35,0	22,5
Chutes (W00-W19)	144	79	65	13,8	16,3	11,7
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	11	8	3	1,1	1,6	0,5
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	15	9	6	1,4	1,9	1,1
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	14	10	4	1,3	2,1	0,7
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	111	64	47	10,7	13,2	8,5
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	105	87	18	10,1	17,9	3,2
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	34	34	0	3,3	7,0	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	71	53	18	6,8	10,9	3,2
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	7	4	3	0,7	0,8	0,5
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	7	4	3	0,7	0,8	0,5
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	16	10	6	1,5	2,1	1,1
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	16	10	6	1,5	2,1	1,1
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	23	14	9	2,2	2,9	1,6

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
6. Les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité en 2003 sont les estimations postcensitaires mises à jour au 1er juillet 2003, rajustées pour le sous-dénombrement net au recensement et incluent les résidents non permanents. Ces estimations de population figurent dans la publication « Statistiques démographiques annuelles, 2004 » (numéro 91-213-XIB/XPB au catalogue).
7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics », disponible à www.cdc.gov/nchs/data/dvs/im9_2002.pdf.
10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Nota : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès et Division de la démographie (estimations de population) (Tableau CANSIM 102-0551).

Tableau 2-17

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 75 à 79 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	32 463	17 845	14 618	3 859,3	4 961,3	3 036,0
Infections à la salmonelle (A01-A02)	2	0	2	0,2	0,0	0,4
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	103	33	70	12,2	9,2	14,5
Tuberculose (A16-A19)	21	8	13	2,5	2,2	2,7
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	16	7	9	1,9	1,9	1,9
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	5	1	4	0,6	0,3	0,8
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	1	0	1	0,1	0,0	0,2
Infection à méningocoques (A39)	1	0	1	0,1	0,0	0,2
Septicémie (A40-A41)	237	138	99	28,2	38,4	20,6
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	44	19	25	5,2	5,3	5,2
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	3	2	1	0,4	0,6	0,2
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	67	37	30	8,0	10,3	6,2
Tumeurs malignes (C00-C97)	10 878	6 025	4 853	1 293,2	1 675,1	1 007,9
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	111	63	48	13,2	17,5	10,0
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	198	147	51	23,5	40,9	10,6
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	295	177	118	35,1	49,2	24,5
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	1 182	654	528	140,5	181,8	109,7
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	263	164	99	31,3	45,6	20,6
Tumeur maligne du pancréas (C25)	593	283	310	70,5	78,7	64,4
Tumeur maligne du larynx (C32)	80	59	21	9,5	16,4	4,4
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	3 159	1 910	1 249	375,5	531,0	259,4
Mélanome malin de la peau (C43)	101	61	40	12,0	17,0	8,3
Tumeur maligne du sein (C50)	611	5	606	72,6	1,4	125,9
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	23	4,8
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	112	23,3
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	228	47,4
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	732	203,5	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	214	122	92	25,4	33,9	19,1
Tumeur maligne de la vessie (C67)	287	207	80	34,1	57,6	16,6
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	181	91	90	21,5	25,3	18,7
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	1 062	570	492	126,3	158,5	102,2
Maladie de Hodgkin (C81)	22	9	13	2,6	2,5	2,7
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	437	225	212	52,0	62,6	44,0
Leucémie (C91-C95)	351	206	145	41,7	57,3	30,1
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	251	130	121	29,8	36,1	25,1
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	1	0	1	0,1	0,0	0,2
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	1 446	780	666	171,9	216,9	138,3
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes, et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	235	125	110	27,9	34,8	22,8
Anémies (D50-D64)	55	31	24	6,5	8,6	5,0
Diabète sucré (E10-E14)	1 352	704	648	160,7	195,7	134,6
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	29	19	10	3,4	5,3	2,1
Malnutrition (E40-E46)	20	14	6	2,4	3,9	1,2
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	9	5	4	1,1	1,4	0,8
Méningite (G00, G03)	5	3	2	0,6	0,8	0,4
Maladie de Parkinson (G20-G21)	347	213	134	41,3	59,2	27,8
Maladie d'Alzheimer (G30)	664	258	406	78,9	71,7	84,3
Maladies cardio-vasculaires graves (I00-I78)	10 789	6 172	4 617	1 282,6	1 716,0	958,9
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	7 732	4 578	3 154	919,2	1 272,8	655,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-17 – suite

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 75 à 79 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	73	22	51	8,7	6,1	10,6
Cardiopathie hypertensive (I11)	55	28	27	6,5	7,8	5,6
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	22	10	12	2,6	2,8	2,5
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	6 177	3 785	2 392	734,3	1 052,3	496,8
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	2 930	1 789	1 141	348,3	497,4	237,0
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	89	47	42	10,6	13,1	8,7
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	3 158	1 949	1 209	375,4	541,9	251,1
Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi (I25.0)	237	135	102	28,2	37,5	21,2
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	2 921	1 814	1 107	347,3	504,3	229,9
Autres cardiopathies (I26-I51)	1 405	733	672	167,0	203,8	139,6
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	10	4	6	1,2	1,1	1,2
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	10	4	6	1,2	1,1	1,2
Insuffisance cardiaque (I50)	526	264	262	62,5	73,4	54,4
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	859	461	398	102,1	128,2	82,7
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	173	79	94	20,6	22,0	19,5
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	2 183	1 119	1 064	259,5	311,1	221,0
Athérosclérose (I70)	153	75	78	18,2	20,9	16,2
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	548	321	227	65,1	89,2	47,1
Anévrisme aortique et dissection (I71)	364	212	152	43,3	58,9	31,6
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	184	109	75	21,9	30,3	15,6
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	77	35	42	9,2	9,7	8,7
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	545	284	261	64,8	79,0	54,2
Grippe (J10-J11)	23	7	16	2,7	1,9	3,3
Pneumopathie (J12-J18)	522	277	245	62,1	77,0	50,9
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	10	4	6	1,2	1,1	1,2
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	5	2	3	0,6	0,6	0,6
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	5	2	3	0,6	0,6	0,6
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	1 958	1 120	838	232,8	311,4	174,0
Bronchite chronique et non précisée (J40-J42)	23	15	8	2,7	4,2	1,7
Emphysème (J43)	140	94	46	16,6	26,1	9,6
Asthme (J45-J46)	30	13	17	3,6	3,6	3,5
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	1 765	998	767	209,8	277,5	159,3
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	18	18	0	2,1	5,0	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	157	89	68	18,7	24,7	14,1
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	387	236	151	46,0	65,6	31,4
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	62	33	29	7,4	9,2	6,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	11	7	4	1,3	1,9	0,8
Hernies (K40-K46)	38	20	18	4,5	5,6	3,7
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	244	145	99	29,0	40,3	20,6
Maladie alcoolique du foie (K70)	71	57	14	8,4	15,8	2,9
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	173	88	85	20,6	24,5	17,7
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	45	24	21	5,3	6,7	4,4
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	514	270	244	61,1	75,1	50,7
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	6	3	3	0,7	0,8	0,6
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	7	4	3	0,8	1,1	0,6
Insuffisance rénale (N17-N19)	500	263	237	59,4	73,1	49,2
Autres maladies des reins (N25, N27)	1	0	1	0,1	0,0	0,2
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	6	3	3	0,7	0,8	0,6
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	8	2,2	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	3	0,6
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	24	9	15	2,9	2,5	3,1

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-17 – suite

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 75 à 79 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	217	110	107	25,8	30,6	22,2
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	2 508	1 196	1 312	298,2	332,5	272,5
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	659	353	306	78,3	98,1	63,6
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	109	65	44	13,0	18,1	9,1
Accidents de véhicule à moteur ¹²	103	59	44	12,2	16,4	9,1
Autres accidents de transport terrestre ¹³	4	4	0	0,5	1,1	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	2	2	0	0,2	0,6	0,0
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	550	288	262	65,4	80,1	54,4
Chutes (W00-W19)	241	138	103	28,7	38,4	21,4
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	11	11	0	1,3	3,1	0,0
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	19	8	11	2,3	2,2	2,3
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	17	8	9	2,0	2,2	1,9
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	262	123	139	31,1	34,2	28,9
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	85	69	16	10,1	19,2	3,3
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	25	25	0	3,0	7,0	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	60	44	16	7,1	12,2	3,3
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	2	1	1	0,2	0,3	0,2
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	2	1	1	0,2	0,3	0,2
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	10	4	6	1,2	1,1	1,2
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	10	4	6	1,2	1,1	1,2
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	42	20	22	5,0	5,6	4,6

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
6. Les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité en 2003 sont les estimations postcensitaires mises à jour au 1er juillet 2003, rajustées pour le sous-dénombrement net au recensement et incluent les résidents non permanents. Ces estimations de population figurent dans la publication « Statistiques démographiques annuelles, 2004 » (numéro 91-213-XIB/XPB au catalogue).
7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics », disponible à www.cdc.gov/nchs/data/dvs/im9_2002.pdf.
10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Nota : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès et Division de la démographie (estimations de population) (Tableau CANSIM 102-0551).

Tableau 2-18

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 80 à 84 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	37 008	18 020	18 988	6 334,4	8 097,3	5 249,7
Infections à la salmonelle (A01-A02)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	114	49	65	19,5	22,0	18,0
Tuberculose (A16-A19)	20	11	9	3,4	4,9	2,5
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	16	9	7	2,7	4,0	1,9
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	4	2	2	0,7	0,9	0,6
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	276	121	155	47,2	54,4	42,9
Syphilis (A50-A53)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	25	13	12	4,3	5,8	3,3
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	1	1	0	0,2	0,4	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	63	40	23	10,8	18,0	6,4
Tumeurs malignes (C00-C97)	9 352	4 846	4 506	1 600,7	2 177,6	1 245,8
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	88	49	39	15,1	22,0	10,8
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	194	129	65	33,2	58,0	18,0
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	294	166	128	50,3	74,6	35,4
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	1 049	507	542	179,5	227,8	149,8
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	186	97	89	31,8	43,6	24,6
Tumeur maligne du pancréas (C25)	528	211	317	90,4	94,8	87,6
Tumeur maligne du larynx (C32)	48	38	10	8,2	17,1	2,8
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	2 146	1 276	870	367,3	573,4	240,5
Mélanome malin de la peau (C43)	80	52	28	13,7	23,4	7,7
Tumeur maligne du sein (C50)	577	5	572	98,8	2,2	158,1
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	29	8,0
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	98	27,1
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	214	59,2
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	820	368,5	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	161	86	75	27,6	38,6	20,7
Tumeur maligne de la vessie (C67)	297	190	107	50,8	85,4	29,6
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	113	54	59	19,3	24,3	16,3
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	1 006	519	487	172,2	233,2	134,6
Maladie de Hodgkin (C81)	9	2	7	1,5	0,9	1,9
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	390	191	199	66,8	85,8	55,0
Leucémie (C91-C95)	383	215	168	65,6	96,6	46,4
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	224	111	113	38,3	49,9	31,2
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	1 424	647	777	243,7	290,7	214,8
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes, et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	262	132	130	44,8	59,3	35,9
Anémies (D50-D64)	105	45	60	18,0	20,2	16,6
Diabète sucré (E10-E14)	1 515	676	839	259,3	303,8	232,0
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	36	16	20	6,2	7,2	5,5
Malnutrition (E40-E46)	29	11	18	5,0	4,9	5,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	7	5	2	1,2	2,2	0,6
Méningite (G00, G03)	5	2	3	0,9	0,9	0,8
Maladie de Parkinson (G20-G21)	493	280	213	84,4	125,8	58,9
Maladie d'Alzheimer (G30)	1 267	440	827	216,9	197,7	228,6
Maladies cardio-vasculaires graves (I00-I78)	14 009	6 827	7 182	2 397,8	3 067,7	1 985,6
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	9 708	4 914	4 794	1 661,6	2 208,1	1 325,4

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-18 – suite

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 80 à 84 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	105	34	71	18,0	15,3	19,6
Cardiopathie hypertensive (I11)	104	32	72	17,8	14,4	19,9
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	19	11	8	3,3	4,9	2,2
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	7 464	3 924	3 540	1 277,6	1 763,3	978,7
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	3 406	1 760	1 646	583,0	790,9	455,1
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	118	59	59	20,2	26,5	16,3
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	3 940	2 105	1 835	674,4	945,9	507,3
Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi (I25.0)	268	150	118	45,9	67,4	32,6
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	3 672	1 955	1 717	628,5	878,5	474,7
Autres cardiopathies (I26-I51)	2 016	913	1 103	345,1	410,3	304,9
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	7	2	5	1,2	0,9	1,4
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	8	2	6	1,4	0,9	1,7
Insuffisance cardiaque (I50)	808	359	449	138,3	161,3	124,1
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	1 193	550	643	204,2	247,1	177,8
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	241	87	154	41,3	39,1	42,6
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3 242	1 401	1 841	554,9	629,5	509,0
Athérosclérose (I70)	236	119	117	40,4	53,5	32,3
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	582	306	276	99,6	137,5	76,3
Anévrisme aortique et dissection (I71)	379	210	169	64,9	94,4	46,7
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	203	96	107	34,7	43,1	29,6
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	75	34	41	12,8	15,3	11,3
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	894	438	456	153,0	196,8	126,1
Grippe (J10-J11)	37	20	17	6,3	9,0	4,7
Pneumopathie (J12-J18)	857	418	439	146,7	187,8	121,4
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	18	7	11	3,1	3,1	3,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	10	3	7	1,7	1,3	1,9
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	8	4	4	1,4	1,8	1,1
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	2 232	1 240	992	382,0	557,2	274,3
Bronchite chronique et non précisée (J40-J42)	23	14	9	3,9	6,3	2,5
Emphysème (J43)	140	90	50	24,0	40,4	13,8
Asthme (J45-J46)	48	15	33	8,2	6,7	9,1
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	2 021	1 121	900	345,9	503,7	248,8
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	12	12	0	2,1	5,4	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	208	118	90	35,6	53,0	24,9
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	384	221	163	65,7	99,3	45,1
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	76	29	47	13,0	13,0	13,0
Maladies de l'appendice (K35-K38)	5	2	3	0,9	0,9	0,8
Hernies (K40-K46)	49	18	31	8,4	8,1	8,6
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	155	78	77	26,5	35,0	21,3
Maladie alcoolique du foie (K70)	28	24	4	4,8	10,8	1,1
Autres maladies chroniques et cirrheses du foie (K73-K74)	127	54	73	21,7	24,3	20,2
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	64	33	31	11,0	14,8	8,6
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	767	408	359	131,3	183,3	99,3
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	2	1	1	0,3	0,4	0,3
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	9	6	3	1,5	2,7	0,8
Insuffisance rénale (N17-N19)	756	401	355	129,4	180,2	98,1
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	18	2	16	3,1	0,9	4,4
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	15	6,7	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	4	1,1
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	22	4	18	3,8	1,8	5,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-18 – suite

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 80 à 84 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	254	119	135	43,5	53,5	37,3
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	3 308	1 274	2 034	566,2	572,5	562,3
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	813	403	410	139,2	181,1	113,4
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	114	67	47	19,5	30,1	13,0
Accidents de véhicule à moteur ¹²	107	60	47	18,3	27,0	13,0
Autres accidents de transport terrestre ¹³	3	3	0	0,5	1,3	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	4	4	0	0,7	1,8	0,0
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	699	336	363	119,6	151,0	100,4
Chutes (W00-W19)	350	192	158	59,9	86,3	43,7
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	1	1	0	0,2	0,4	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	6	4	2	1,0	1,8	0,6
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	7	3	4	1,2	1,3	1,1
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	13	7	6	2,2	3,1	1,7
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	322	129	193	55,1	58,0	53,4
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	53	44	9	9,1	19,8	2,5
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	9	9	0	1,5	4,0	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	44	35	9	7,5	15,7	2,5
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	10	6	4	1,7	2,7	1,1
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	10	6	4	1,7	2,7	1,1
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	9	6	3	1,5	2,7	0,8
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	9	6	3	1,5	2,7	0,8
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	20	10	10	3,4	4,5	2,8

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
6. Les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité en 2003 sont les estimations postcensitaires mises à jour au 1er juillet 2003, rajustées pour le sous-dénombrement net au recensement et incluent les résidents non permanents. Ces estimations de population figurent dans la publication « Statistiques démographiques annuelles, 2004 » (numéro 91-213-XIB/XPB au catalogue).
7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics », disponible à www.cdc.gov/nchs/data/dvs/im9_2002.pdf.
10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Nota : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès et Division de la démographie (estimations de population) (Tableau CANSIM 102-0551).

Tableau 2-19

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 85 à 89 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	33 370	13 668	19 702	11 192,9	14 031,6	9 815,3
Infections à la salmonelle (A01-A02)	1	0	1	0,3	0,0	0,5
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	124	46	78	41,6	47,2	38,9
Tuberculose (A16-A19)	15	7	8	5,0	7,2	4,0
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	13	6	7	4,4	6,2	3,5
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	2	1	1	0,7	1,0	0,5
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	286	121	165	95,9	124,2	82,2
Syphilis (A50-A53)	1	1	0	0,3	1,0	0,0
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	15	9	6	5,0	9,2	3,0
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	68	32	36	22,8	32,9	17,9
Tumeurs malignes (C00-C97)	6 019	2 817	3 202	2 018,9	2 891,9	1 595,2
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	72	26	46	24,2	26,7	22,9
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	102	58	44	34,2	59,5	21,9
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	192	90	102	64,4	92,4	50,8
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	761	287	474	255,3	294,6	236,1
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	111	43	68	37,2	44,1	33,9
Tumeur maligne du pancréas (C25)	324	113	211	108,7	116,0	105,1
Tumeur maligne du larynx (C32)	25	20	5	8,4	20,5	2,5
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	1 055	609	446	353,9	625,2	222,2
Mélanome malin de la peau (C43)	44	23	21	14,8	23,6	10,5
Tumeur maligne du sein (C50)	451	3	448	151,3	3,1	223,2
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	20	10,0
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	75	37,4
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	135	67,3
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	616	632,4	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	119	62	57	39,9	63,6	28,4
Tumeur maligne de la vessie (C67)	227	149	78	76,1	153,0	38,9
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	54	24	30	18,1	24,6	14,9
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	612	274	338	205,3	281,3	168,4
Maladie de Hodgkin (C81)	5	2	3	1,7	2,1	1,5
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	232	109	123	77,8	111,9	61,3
Leucémie (C91-C95)	252	117	135	84,5	120,1	67,3
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	122	45	77	40,9	46,2	38,4
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	1	1	0	0,3	1,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	1 024	420	604	343,5	431,2	300,9
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes, et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	225	101	124	75,5	103,7	61,8
Anémies (D50-D64)	115	44	71	38,6	45,2	35,4
Diabète sucré (E10-E14)	1 196	480	716	401,2	492,8	356,7
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	46	18	28	15,4	18,5	13,9
Malnutrition (E40-E46)	40	16	24	13,4	16,4	12,0
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	6	2	4	2,0	2,1	2,0
Méningite (G00, G03)	1	0	1	0,3	0,0	0,5
Maladie de Parkinson (G20-G21)	341	171	170	114,4	175,5	84,7
Maladie d'Alzheimer (G30)	1 527	462	1 065	512,2	474,3	530,6
Maladies cardio-vasculaires graves (I00-I78)	13 768	5 451	8 317	4 618,0	5 596,0	4 143,4
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	9 454	3 829	5 625	3 171,0	3 930,8	2 802,3

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-19 – suite

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 85 à 89 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	71	19	52	23,8	19,5	25,9
Cardiopathie hypertensive (I11)	116	29	87	38,9	29,8	43,3
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	27	8	19	9,1	8,2	9,5
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	7 071	2 953	4 118	2 371,7	3 031,5	2 051,5
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	3 015	1 261	1 754	1 011,3	1 294,5	873,8
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	93	31	62	31,2	31,8	30,9
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	3 963	1 661	2 302	1 329,3	1 705,2	1 146,8
Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi (I25.0)	206	96	110	69,1	98,6	54,8
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	3 757	1 565	2 192	1 260,2	1 606,6	1 092,0
Autres cardiopathies (I26-I51)	2 169	820	1 349	727,5	841,8	672,1
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	7	4	3	2,3	4,1	1,5
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	4	1	3	1,3	1,0	1,5
Insuffisance cardiaque (I50)	996	398	598	334,1	408,6	297,9
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	1 162	417	745	389,8	428,1	371,2
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	256	78	178	85,9	80,1	88,7
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3 324	1 215	2 109	1 114,9	1 247,3	1 050,7
Athérosclérose (I70)	290	114	176	97,3	117,0	87,7
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	444	215	229	148,9	220,7	114,1
Anévrisme aortique et dissection (I71)	260	136	124	87,2	139,6	61,8
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	184	79	105	61,7	81,1	52,3
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	43	14	29	14,4	14,4	14,4
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	1 063	474	589	356,5	486,6	293,4
Grippe (J10-J11)	49	21	28	16,4	21,6	13,9
Pneumopathie (J12-J18)	1 014	453	561	340,1	465,0	279,5
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	19	5	14	6,4	5,1	7,0
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	10	3	7	3,4	3,1	3,5
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	9	2	7	3,0	2,1	3,5
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	1 803	968	835	604,8	993,7	416,0
Bronchite chronique et non précisée (J40-J42)	25	18	7	8,4	18,5	3,5
Emphysème (J43)	75	43	32	25,2	44,1	15,9
Asthme (J45-J46)	46	14	32	15,4	14,4	15,9
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	1 657	893	764	555,8	916,8	380,6
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	10	10	0	3,4	10,3	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	213	112	101	71,4	115,0	50,3
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	310	129	181	104,0	132,4	90,2
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	73	21	52	24,5	21,6	25,9
Maladies de l'appendice (K35-K38)	10	2	8	3,4	2,1	4,0
Hernies (K40-K46)	46	18	28	15,4	18,5	13,9
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	92	36	56	30,9	37,0	27,9
Maladie alcoolique du foie (K70)	12	8	4	4,0	8,2	2,0
Autres maladies chroniques et cirrheses du foie (K73-K74)	80	28	52	26,8	28,7	25,9
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	64	30	34	21,5	30,8	16,9
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	743	340	403	249,2	349,0	200,8
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	5	5	0	1,7	5,1	0,0
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	7	4	3	2,3	4,1	1,5
Insuffisance rénale (N17-N19)	731	331	400	245,2	339,8	199,3
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	25	12	13	8,4	12,3	6,5
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	13	13,3	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	0	0,0
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	11	6	5	3,7	6,2	2,5

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-19 – suite

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 85 à 89 ans^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	323	121	202	108,3	124,2	100,6
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	3 735	1 195	2 540	1 252,8	1 226,8	1 265,4
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	964	370	594	323,3	379,8	295,9
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	50	24	26	16,8	24,6	13,0
Accidents de véhicule à moteur ¹²	46	22	24	15,4	22,6	12,0
Autres accidents de transport terrestre ¹³	2	1	1	0,7	1,0	0,5
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	2	1	1	0,7	1,0	0,5
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	914	346	568	306,6	355,2	283,0
Chutes (W00-W19)	391	135	256	131,1	138,6	127,5
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	6	3	3	2,0	3,1	1,5
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	9	5	4	3,0	5,1	2,0
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	9	3	6	3,0	3,1	3,0
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	499	200	299	167,4	205,3	149,0
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	34	22	12	11,4	22,6	6,0
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	6	6	0	2,0	6,2	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	28	16	12	9,4	16,4	6,0
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	1	1	0	0,3	1,0	0,0
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	1	1	0	0,3	1,0	0,0
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	2	0	2	0,7	0,0	1,0
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	2	0	2	0,7	0,0	1,0
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	25	9	16	8,4	9,2	8,0

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
6. Les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité en 2003 sont les estimations postcensitaires mises à jour au 1er juillet 2003, rajustées pour le sous-dénombrement net au recensement et incluent les résidents non permanents. Ces estimations de population figurent dans la publication « Statistiques démographiques annuelles, 2004 » (numéro 91-213-XIB/XPB au catalogue).
7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics », disponible à www.cdc.gov/nchs/data/dvs/im9_2002.pdf.
10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Nota : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès et Division de la démographie (estimations de population) (Tableau CANSIM 102-0551).

Tableau 2-20

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 90 ans et plus^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Total, toutes les causes de décès (A00-Y89)^{7, 8, 9}	31 506	9 204	22 302	20 696,2	23 352,7	19 768,1
Infections à la salmonelle (A01-A02)	2	0	2	1,3	0,0	1,8
Shigellose et amibiase (A03, A06)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Certaines autres infections intestinales (A04, A07-A09)	115	41	74	75,5	104,0	65,6
Tuberculose (A16-A19)	5	2	3	3,3	5,1	2,7
Tuberculose de l'appareil respiratoire (A16)	2	1	1	1,3	2,5	0,9
Autres formes de tuberculose (A17-A19)	3	1	2	2,0	2,5	1,8
Coqueluche (A37)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Scarlatine et érysipèle (A38, A46)	1	0	1	0,7	0,0	0,9
Infection à méningocoques (A39)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Septicémie (A40-A41)	211	62	149	138,6	157,3	132,1
Syphilis (A50-A53)	1	0	1	0,7	0,0	0,9
Poliomyélite aiguë (A80)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Encéphalite transmise par les arthropodes (A83-A84, A85.2)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Rougeole (B05)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Hépatite virale (B15-B19)	4	1	3	2,6	2,5	2,7
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Paludisme (B50-B54)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles ¹⁰	65	19	46	42,7	48,2	40,8
Tumeurs malignes (C00-C97)	3 510	1 397	2 113	2 305,7	3 544,5	1 872,9
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx (C00-C14)	34	16	18	22,3	40,6	16,0
Tumeur maligne de l'oesophage (C15)	56	23	33	36,8	58,4	29,3
Tumeur maligne de l'estomac (C16)	123	56	67	80,8	142,1	59,4
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus (C18-C21)	465	147	318	305,5	373,0	281,9
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques (C22)	57	23	34	37,4	58,4	30,1
Tumeur maligne du pancréas (C25)	168	46	122	110,4	116,7	108,1
Tumeur maligne du larynx (C32)	12	9	3	7,9	22,8	2,7
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon (C33-C34)	411	210	201	270,0	532,8	178,2
Mélanome malin de la peau (C43)	31	16	15	20,4	40,6	13,3
Tumeur maligne du sein (C50)	403	0	403	264,7	0,0	357,2
Tumeur maligne du col de l'utérus (C53)	10	8,9
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée (C54-C55)	51	45,2
Tumeur maligne de l'ovaire (C56)	55	48,8
Tumeur maligne de la prostate (C61)	...	413	1 047,9	...
Tumeurs malignes du rein et du bassinnet du rein (C64-C65)	58	25	33	38,1	63,4	29,3
Tumeur maligne de la vessie (C67)	148	77	71	97,2	195,4	62,9
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central (C70-C72)	19	2	17	12,5	5,1	15,1
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés (C81-C96)	302	108	194	198,4	274,0	172,0
Maladie de Hodgkin (C81)	3	2	1	2,0	5,1	0,9
Lymphome non hodgkinien (C82-C85)	101	31	70	66,3	78,7	62,0
Leucémie (C91-C95)	136	52	84	89,3	131,9	74,5
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives (C88, C90)	62	23	39	40,7	58,4	34,6
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées (C96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97)	694	226	468	455,9	573,4	414,8
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes, et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue (D00-D48)	167	62	105	109,7	157,3	93,1
Anémies (D50-D64)	154	36	118	101,2	91,3	104,6
Diabète sucré (E10-E14)	898	248	650	589,9	629,2	576,1
Déficiences nutritionnelles (E40-E64)	75	17	58	49,3	43,1	51,4
Malnutrition (E40-E46)	64	15	49	42,0	38,1	43,4
Autres carences nutritionnelles (E50-E64)	11	2	9	7,2	5,1	8,0
Méningite (G00, G03)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie de Parkinson (G20-G21)	215	82	133	141,2	208,1	117,9
Maladie d'Alzheimer (G30)	1 628	288	1 340	1 069,4	730,7	1 187,8
Maladies cardio-vasculaires graves (I00-I78)	13 936	3 853	10 083	9 154,5	9 776,0	8 937,4
Maladies du coeur (I00-I09, I11, I13, I20-I51)	9 552	2 748	6 804	6 274,7	6 972,3	6 031,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-20 – suite

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 90 ans et plus^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques (I00-I09)	43	8	35	28,2	20,3	31,0
Cardiopathie hypertensive (I11)	156	21	135	102,5	53,3	119,7
Cardionéphropathie hypertensive (I13)	30	11	19	19,7	27,9	16,8
Cardiopathies ischémiques (I20-I25)	6 757	1 985	4 772	4 438,6	5 036,4	4 229,8
Infarctus aigu du myocarde (I21-I22)	2 552	791	1 761	1 676,4	2 007,0	1 560,9
Autres cardiopathies ischémiques aiguës (I24)	106	31	75	69,6	78,7	66,5
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques (I20, I25)	4 099	1 163	2 936	2 692,6	2 950,8	2 602,4
Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi (I25.0)	192	48	144	126,1	121,8	127,6
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique (I20, I25.1-I25.9)	3 907	1 115	2 792	2 566,5	2 829,0	2 474,8
Autres cardiopathies (I26-I51)	2 566	723	1 843	1 685,6	1 834,4	1 633,6
Endocardite aiguë et subaiguë (I33)	1	0	1	0,7	0,0	0,9
Maladies du péricarde et myocardite aiguë (I30-I31, I40)	2	0	2	1,3	0,0	1,8
Insuffisance cardiaque (I50)	1 404	396	1 008	922,3	1 004,7	893,5
Toutes autres formes de cardiopathie (I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51)	1 159	327	832	761,3	829,7	737,5
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive (I10, I12)	350	60	290	229,9	152,2	257,1
Maladies cérébrovasculaires (I60-I69)	3 236	782	2 454	2 125,7	1 984,1	2 175,2
Athérosclérose (I70)	397	121	276	260,8	307,0	244,6
Autres maladies du système circulatoire (I71-I78)	401	142	259	263,4	360,3	229,6
Anévrisme aortique et dissection (I71)	192	82	110	126,1	208,1	97,5
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires (I72-I78)	209	60	149	137,3	152,2	132,1
Autres troubles du système circulatoire (I80-I99)	53	8	45	34,8	20,3	39,9
Grippe et pneumopathie (J10-J18)	1 615	506	1 109	1 060,9	1 283,8	983,0
Grippe (J10-J11)	80	25	55	52,6	63,4	48,8
Pneumopathie (J12-J18)	1 535	481	1 054	1 008,3	1 220,4	934,2
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures (J20-J22)	14	4	10	9,2	10,1	8,9
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë (J20-J21)	9	2	7	5,9	5,1	6,2
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision (J22)	5	2	3	3,3	5,1	2,7
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J40-J47)	1 378	626	752	905,2	1 588,3	666,6
Bronchite chronique et non précisée (J40-J42)	54	12	42	35,5	30,4	37,2
Emphysème (J43)	43	25	18	28,2	63,4	16,0
Asthme (J45-J46)	33	4	29	21,7	10,1	25,7
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (J44, J47)	1 248	585	663	819,8	1 484,3	587,7
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques (J60-J66, J68)	2	2	0	1,3	5,1	0,0
Pneumopathie due à des substances solides et liquides (J69)	221	75	146	145,2	190,3	129,4
Autres maladies du système respiratoire (J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98)	267	95	172	175,4	241,0	152,5
Ulcère gastro-duodénal (K25-K28)	60	19	41	39,4	48,2	36,3
Maladies de l'appendice (K35-K38)	2	0	2	1,3	0,0	1,8
Hernies (K40-K46)	43	7	36	28,2	17,8	31,9
Maladie chronique et cirrhose du foie (K70, K73-K74)	20	8	12	13,1	20,3	10,6
Maladie alcoolique du foie (K70)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie (K73-K74)	20	8	12	13,1	20,3	10,6
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire (K80-K82)	64	21	43	42,0	53,3	38,1
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (N00-N07, N17-N19, N25-N27)	693	236	457	455,2	598,8	405,1
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique (N00-N01, N04)	3	0	3	2,0	0,0	2,7
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision (N02-N03, N05-N07, N26)	4	2	2	2,6	5,1	1,8
Insuffisance rénale (N17-N19)	686	234	452	450,6	593,7	400,6
Autres maladies des reins (N25, N27)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Infections rénales (N10-N12, N13.6, N15.1)	20	3	17	13,1	7,6	15,1
Hyperplasie de la prostate (N40)	...	16	40,6	...
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme (N70-N76)	1	0,9
Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00-O99)	0	0,0
Grossesse se terminant par un avortement (O00-O07)	0	0,0
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité (O10-O99)	0	0,0
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)	3	1	2	2,0	2,5	1,8

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-20 – suite

Décès, selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada¹ — 90 ans et plus^{2, 3, 4, 5}

	Nombre de décès			Taux de mortalité selon l'âge pour 100 000 personnes ⁶		
	Hommes et femmes	Hommes	Femmes	Hommes et femmes	Hommes	Femmes
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)	650	158	492	427,0	400,9	436,1
Toutes autres maladies (résiduel) ¹¹	4 223	955	3 268	2 774,1	2 423,1	2 896,7
Accidents (blessures involontaires) (V01-X59, Y85-Y86)	1 115	326	789	732,4	827,1	699,4
Accidents de transport (V01-V99, Y85)	23	17	6	15,1	43,1	5,3
Accidents de véhicule à moteur ¹²	21	16	5	13,8	40,6	4,4
Autres accidents de transport terrestre ¹³	1	1	0	0,7	2,5	0,0
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles (V90-V99, Y85)	1	0	1	0,7	0,0	0,9
Accidents non liés au transport (W00-X59, Y86)	1 092	309	783	717,3	784,0	694,0
Chutes (W00-W19)	416	140	276	273,3	355,2	244,6
Décharges accidentelles d'armes à feu (W32-W34)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Noyade et submersion accidentelles (W65-W74)	2	0	2	1,3	0,0	1,8
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes (X00-X09)	1	1	0	0,7	2,5	0,0
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances (X40-X49)	7	3	4	4,6	7,6	3,5
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles (W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86)	666	165	501	437,5	418,6	444,1
Lésions auto-infligées (suicide) (X60-X84, Y87.0)	23	16	7	15,1	40,6	6,2
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu (X72-X74)	2	2	0	1,3	5,1	0,0
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X60-X71, X75-X84, Y87.0)	21	14	7	13,8	35,5	6,2
Agressions (homicide) (X85-Y09, Y87.1)	3	3	0	2,0	7,6	0,0
Agressions (homicide) par armes à feu (X93-X95)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles (X85-X92, X96-Y09, Y87.1)	3	3	0	2,0	7,6	0,0
Intervention de la force publique (Y35, Y89.0)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée (Y10-Y34, Y87.2, Y89.9)	7	2	5	4,6	5,1	4,4
Décharges d'armes à feu intention non déterminée (Y22-Y24)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles (Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9)	7	2	5	4,6	5,1	4,4
Faits de guerre et leurs séquelles (Y36, Y89.1)	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84, Y88)	26	9	17	17,1	22,8	15,1

1. La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.
2. Âge au dernier anniversaire précédant le décès.
3. Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.
4. Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.
5. Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.
6. Les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité en 2003 sont les estimations postcensitaires mises à jour au 1er juillet 2003, rajustées pour le sous-dénombrement net au recensement et incluent les résidents non permanents. Ces estimations de population figurent dans la publication « Statistiques démographiques annuelles, 2004 » (numéro 91-213-XIB/XPB au catalogue).
7. La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.
8. Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)
9. « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics », disponible à www.cdc.gov/nchs/data/dvs/im9_2002.pdf.
10. Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.
11. Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.
12. Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.
13. Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Nota : Voir la section Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux.

Source : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès et Division de la démographie (estimations de population) (Tableau CANSIM 102-0551).

Définitions

Les définitions utilisées pour la production des tableaux statistiques sur les données canadiennes des statistiques de l'état civil sont celles recommandées par l'Organisation mondiale de la santé¹ et les Nations Unies².

Accouchement. Un accouchement peut comprendre la mise au monde d'un ou de plusieurs enfants vivants ou mort-nés. Le nombre d'accouchements pendant une période donnée sera égal ou inférieur au nombre total de naissances, car les naissances multiples (jumeaux, triplés ou naissances multiples d'ordre plus élevé) sont comptées comme des accouchements uniques.

Âge. Âge au dernier anniversaire précédant le décès. Dans le cas de la mortalité infantile, le nombre de mois (ou minutes, heures, ou jours) révolus depuis la naissance.

Cause de décès. La cause de décès qui est codée et qui sert à la production des totalisations est la cause initiale de décès. Elle est définie comme étant « (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel ». Cette cause initiale de décès est choisie d'après un certain nombre de conditions précisées sur le certificat médical de la cause de décès.

À partir de l'an 2000, au Canada, les causes de décès et de mortinaissances sont codées conformément à la 10^e révision de la **Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes** (CIM-10) publiée par l'Organisation mondiale de la santé. L'ancienne révision, CIM-9³ était utilisée au Canada pour classer les causes de décès et de mortinaissances de 1979 à 1999.

Codes de la CIM-10. Les codes de la **Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes** (CIM), 10^e révision, ont été établis en 1992 par l'Organisation mondiale de la santé. Le manuel de la CIM-10 comprend la liste des codes particuliers attribués aux maladies, traumatismes et causes de décès.

Décès. La disparition permanente de tout signe de vie à tout moment après une naissance vivante. Les mortinaissances ne sont pas prises en compte dans les statistiques de décès, sauf indication contraire.

- **Mortalité infantile** : Décès d'un enfant âgé de moins d'un an.
- **Mortalité néonatale** : Décès d'un enfant âgé de moins de quatre semaines (de 0 à 27 jours).
- **Mortalité néonatale précoce** : Décès d'un enfant âgé de moins d'une semaine (de 0 à 6 jours).
- **Mortalité périnatale** : Décès d'un enfant âgé de moins d'une semaine (de 0 à 6 jours), ou décès d'un fœtus de 28 semaines ou plus de gestation.
- **Mortalité post-néonatale** : Décès d'un enfant âgé de moins d'un an, mais d'au moins 28 jours (de 28 à 364 jours).

Durée de la gestation. L'intervalle, en semaines révolues, entre le premier jour des dernières menstruations de la mère et le jour de l'accouchement (c'est-à-dire durée de la grossesse), ou toute estimation de cet intervalle fondée sur une échographie, un examen médical, ou toute autre méthode. La méthode de calcul de la durée de la gestation n'est pas précisée dans les documents canadiens sur l'enregistrement des naissances. **Avant terme** désigne une période de gestation de moins de 37 semaines entières; **à terme**, une période de 37 à 41 semaines entières; et **après terme**, une période de 42 semaines entières ou davantage.

1. Organisation mondiale de la santé (OMS). *Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, dixième révision, volumes 1 et 2 (CIM-10)*. Genève, 1992.

2. Nations Unies. *Principes et recommandations pour un système de statistiques de l'état civil*. Études statistiques, Série M, no 19, rév. 1. New York, 1974.

3. Organisation mondiale de la santé (OMS). *Classification internationale des maladies, révision de 1975, volume 1 (CIM-9)*. Genève, 1977.

Espérance de vie. Le nombre moyen d'années qu'il reste à vivre, à la naissance ou à d'autres âges, déterminé d'après un ensemble de taux de mortalité par âge, calculé pour une année donnée.

État matrimonial. La situation conjugale légale de la personne décédée au moment de son décès. Les personnes qui vivent en union de fait sont classées dans la catégorie correspondant à leur état matrimonial légal. Une personne **célibataire** est une personne qui n'a jamais été mariée, ou dont le mariage a été annulé et qui ne s'est pas remariée. Une personne **séparée** est une personne qui est légalement mariée, mais qui ne vit pas avec son (sa) conjoint(e) parce que le couple ne veut plus vivre ensemble. Une personne **divorcée** est une personne qui est légalement divorcée et qui ne s'est pas remariée. Une personne **mariée** est une personne qui est légalement mariée et qui n'est pas séparée. Une personne **veuve** est une personne dont le (la) conjoint(e) est mort(e) et qui ne s'est pas remariée.

Mortinaissance. Le produit de conception complètement expulsé ou extrait du corps de la mère et qui, après cette séparation, ne respire ni ne manifeste aucun signe de vie.

La plupart des provinces et les trois territoires exigent que soit déclarée toute mortinaissance qui survient après au moins 20 semaines de gestation, ou pour laquelle le poids à la naissance est d'au moins 500 grammes. Le Québec et la Saskatchewan (et le Nouveau-Brunswick, avant novembre 1996), exigent uniquement que soient déclarées les mortinaissances pour lesquelles le poids à la naissance est d'au moins 500 grammes, indépendamment de la durée de la gestation. Jusqu'en 1997, l'Île-du-Prince-Édouard exigeait que soit déclarée toute mortinaissance survenue après au moins 20 semaines de gestation, quel que soit le poids à la naissance.

Les données sur les mortinaissances sont totalisées selon le lieu de résidence de la mère.

Naissance vivante. L'expulsion ou extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation, d'un produit de conception qui, après cette séparation, respire ou manifeste tout autre signe de vie.

Population. Les personnes dont le lieu de résidence habituel se situe au Canada, y compris les fonctionnaires canadiens en poste à l'étranger et leur famille, les membres des Forces canadiennes en service à l'étranger et leur famille, les équipages des navires marchands canadiens et les résidents non permanents du Canada.

Les estimations démographiques corrigées sont utilisées dans les statistiques de l'état civil afin de mieux refléter la population du Canada; ces estimations incluent un rajustement à la hausse pour tenir compte du sous-dénombrement dû au recensement et aux résidents non permanents. Le sous-dénombrement net au recensement est la différence entre le sous-dénombrement et le surdénombrement au recensement. Le premier désigne les personnes qui appartenaient à l'univers du recensement, mais qui n'ont pas été dénombrées; le second, les personnes qui ont été dénombrées plus d'une fois, ou qui l'ont été, mais qui ne faisaient pas partie de l'univers du recensement. Les résidents non permanents sont les personnes qui revendiquent le statut de réfugié, ceux qui détiennent un permis d'étude, de travail, ou du Ministre, et toutes les personnes à charge de celles-ci et qui ne sont pas nées au Canada.

Les estimations démographiques de milieu d'année (1^{er} juillet) servent à calculer les taux des publications des statistiques de l'état civil. La Division de la démographie de Statistique Canada révisé fréquemment les estimations démographiques.

Le Recensement de la population du Canada de 1991, par groupe d'âge, les deux sexes réunis, est utilisé comme **population-type** pour calculer les taux de mortalité normalisés selon l'âge.

Tableau explicatif 1

Taux de mortalité normalisés selon l'âge

Groupe(i)	Âge	Population-type	Pondération
1	< 1	403 061	0,0143
2	1 à 4 ans	1 550 285	0,0551
3	5 à 9 ans	1 953 045	0,0695
4	10 à 14 ans	1 913 115	0,0680
5	15 à 19 ans	1 926 090	0,0685
6	20 à 24 ans	2 109 452	0,0750
7	25 à 29 ans	2 529 239	0,0899
8	30 à 34 ans	2 598 289	0,0924
9	35 à 39 ans	2 344 872	0,0834
10	40 à 44 ans	2 138 891	0,0761
11	45 à 49 ans	1 674 153	0,0595
12	50 à 54 ans	1 339 902	0,0476
13	55 à 59 ans	1 238 441	0,0440
14	60 à 64 ans	1 190 217	0,0423
15	65 à 69 ans	1 084 588	0,0386
16	70 à 74 ans	834 024	0,0297
17	75 à 79 ans	622 221	0,0221
18	80 à 84 ans	382 303	0,0136
19	85 à 89 ans	192 410	0,0068
20	90 et plus	95 467	0,0034
Total		28 120 065	1,0000

Provinces et territoires. Sauf indication contraire, la répartition géographique des décès dans les tableaux de cette publication se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.

Le Nunavut est devenu officiellement un territoire canadien le 1^{er} avril 1999. Le nom « Territoires du Nord-Ouest » désigne un territoire dont les frontières géographiques diffèrent selon que l'on se situe avant ou après cette date.

Les décès et les mortinaissances des résidents du Nunavut qui sont survenus avant le 1^{er} avril 1999 sont inclus avec ceux des résidents des Territoires du Nord-Ouest. Les décès et les mortinaissances des résidents du Nunavut se produisant à partir du 1^{er} avril 1999 sont totalisés séparément.

Taux de mortalité

- **Taux brut de mortalité** : Le nombre de décès pendant une année donnée pour 100 000 habitants, à partir du 1^{er} juillet de cette même année.
- **Taux de mortalité normalisé selon l'âge** : Le calcul du taux normalisé selon l'âge vise à supprimer l'effet des différences dans la structure d'âge de diverses populations selon différentes zones géographiques et sur une certaine période. Les taux de mortalité normalisés selon l'âge montrent le nombre de décès pour 100 000 habitants qui seraient survenus dans une zone géographique donnée si la structure d'âge de la population de cette zone géographique était la même que celle d'une population-type.

Formule servant à calculer le taux de mortalité r normalisé selon l'âge :

$$r = \sum_{i=1}^{20} \left(\frac{d_i}{p_i} \right) w_i \quad \text{où,}$$

Pour le groupe d'âge i :

d_i est le nombre de décès spécifique par âge et sexe pour une cause particulière de décès pour une année et une zone géographique données,

p_i est l'estimation démographique spécifique par âge et sexe au 1^{er} juillet de la même année et zone géographique, et

w_i est la pondération pour ce groupe d'âge dans une population-type. Le Recensement de la population du Canada de 1991 est utilisé comme population-type. Cette population-type et les pondérations calculées sont reproduites dans la section plus haut, sous le titre Population. Veuillez noter que la même pondération est utilisée pour les deux sexes.

Pour produire un taux pour 100 000 habitants, r est multiplié par 100 000.

- **Taux de mortalité par âge** : Le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 habitants dans le même groupe d'âge au 1^{er} juillet de la même année.
- **Taux de mortalité infantile** : Le nombre de décès infantiles pendant une année donnée pour 1 000 naissances vivantes pendant la même année.
- **Taux de mortalité néonatale** : Le nombre de décès néonataux pendant une année donnée pour 1 000 naissances vivantes pendant la même année.
- **Taux de mortalité néonatale précoce** : Le nombre de décès néonataux précoces pendant une année donnée pour 1 000 naissances vivantes pendant la même année.
- **Taux de mortalité périnatale** : Le nombre de décès périnataux pendant une année donnée pour 1 000 naissances totales (c'est-à-dire naissances vivantes et mortinaissances de 28 semaines ou plus de gestation) pendant la même année.
- **Taux de mortalité post-néonatale** : Le nombre de décès post-néonataux pendant une année donnée pour 1 000 naissances vivantes pendant la même année.

Taux de mortinaissance. Le nombre de mortinaissances pour 1 000 naissances totales (naissances vivantes et mortinaissances).

Statistique de l'état civil — Base de données sur les décès

Aperçu de l'enquête

Il s'agit d'une enquête administrative conçue pour recueillir annuellement auprès de tous les bureaux provinciaux et territoriaux de l'état civil des renseignements démographiques et médicaux (cause de décès) sur tous les décès survenus au Canada. Certaines données sont également recueillies sur les résidents du Canada décédés dans certains États américains.

Les données sont utilisées pour calculer des indicateurs de base (comme des nombres et des taux) concernant les décès de résidents du Canada. L'information provenant de cette base de données est également utilisée pour le calcul de statistiques, comme les taux de mortalité par cause et l'espérance de vie.

Avant 1921, il était impossible de produire des séries satisfaisantes de données de l'état civil pour le Canada dans son ensemble. Au départ, huit provinces étaient parties à l'entente de collaboration en vue d'établir un système national de données sur l'état civil qui a mené à la publication du premier rapport annuel pour le Canada en 1921; le rapport contenait les données de l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie-Britannique. Le Québec s'est joint aux autres provinces en 1926 et Terre-Neuve, en 1949 (après être entrée dans la Confédération) et leurs données ont été incluses dans les totalisations régulières à partir de ces années-là, respectivement. De 1924 à 1955, des données de base ont été publiées en annexe aux tableaux nationaux pour le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest; les données de ces territoires ont été incluses dans les totalisations régulières pour la première fois en 1956. Le Nunavut est devenu officiellement un territoire du Canada le 1^{er} avril 1999. La dénomination Territoires du Nord Ouest s'applique à un territoire dont les limites géographiques avant et après le 1^{er} avril 1999 sont différentes.

Avant 1944, tous les événements démographiques étaient classés selon le lieu de l'événement. Depuis 1944, les naissances, les mortinaissances et les décès sont classés selon le lieu de résidence déclaré, celui-ci étant le lieu de résidence de la mère pour les naissances et pour les mortinaissances.

Dans la Base de données sur la mortalité, la variable de cause de décès est codée conformément à la « Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes » (CIM) de l'Organisation mondiale de la santé. Le tableau qui suit indique les années de référence pour lesquelles chaque révision de cette classification a été utilisée. Les utilisateurs des données doivent noter que les données sur la cause de décès codées d'après diverses révisions de la classification ne sont pas comparables et devraient consulter Statistique Canada s'ils veulent se servir de données sur cette variable obtenues d'après diverses révisions de la classification.

Révision de la « Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes » (CIM) et années de référence de l'utilisation à Statistique Canada :

- CIM-3 utilisée de 1921 à 1930
- CIM-4 utilisée de 1931 à 1940
- CIM-5 utilisée de 1941 à 1949
- CIM-6 utilisée de 1950 à 1957
- CIM-7 utilisée de 1958 à 1968
- CIMA-8 utilisée de 1969 à 1978
- CIM-9 utilisée de 1979 à 1999

– CIM-10 utilisée de 2000 jusqu'à présent

Sources de données et méthodologie

Population d'enquête

L'univers conceptuel de la Base de données sur la mortalité comprend les décès de résidents du Canada survenus n'importe où dans le monde.

La population cible de la Base de données sur la mortalité comprend les décès de résidents du Canada survenus au Canada et dans les États américains.

La population réelle (observée) de la Base de données sur la mortalité comprend les décès de résidents du Canada et de non-résidents du Canada survenus au Canada, ainsi que les décès de résidents du Canada survenus dans certains États américains.

Échantillonnage

Il s'agit d'un recensement avec plan transversal.

Sources des données

Il s'agit d'une enquête à participation obligatoire. Les données sont tirées de fichiers administratifs.

Les lois provinciales et territoriales sur la statistique de l'état civil (ou les textes législatifs équivalents) rendent obligatoire l'enregistrement de toutes les naissances vivantes, toutes les mortinaissances, tous les décès et tous les mariages survenus dans la province ou le territoire. Ces lois se rapprochent le plus possible d'une loi modèle sur les statistiques de l'état civil qu'on a rédigée afin d'assurer l'uniformité des lois et des méthodes de déclaration des provinces et territoires.

Une entente entre le gouvernement du Canada et les gouvernements des provinces et des territoires régit le fonctionnement du système canadien des statistiques de l'état civil. Le Conseil de la statistique de l'état civil du Canada, un comité consultatif formé par décret, s'occupe des questions stratégiques et opérationnelles. Les provinces et les territoires ainsi que Statistique Canada sont tous représentés à ce Conseil. Aux termes de l'entente, tous les bureaux de l'état civil recueillent un ensemble normalisé d'éléments de données, mais ont la liberté de recueillir des renseignements supplémentaires.

Le formulaire d'enregistrement de décès comprend deux parties, l'une réservée aux renseignements personnels et l'autre, aux renseignements médicaux. Les renseignements personnels sont fournis par une personne bien informée, habituellement un parent de la personne décédée, à l'entrepreneur de pompes funèbres. La partie du formulaire qui correspond au certificat médical de décès est remplie par le médecin qui a constaté le décès, ou par le coroner dans les cas où il y a une enquête. L'entrepreneur de pompes funèbres, ou la personne qui joue ce rôle, doit inscrire sur le formulaire d'enregistrement de décès les détails concernant la disposition de la dépouille (par exemple, inhumation) et doit présenter le formulaire dûment rempli au registraire local, qui délivrera le permis d'inhumer.

Le bureau central de l'état civil de chaque province ou territoire fournit à Statistique Canada des données tirées des formulaires d'enregistrement de décès. Pour chaque décès, toutes les provinces et tous les territoires déclarent les éléments de données suivants aux fins de leur inclusion dans le système canadien des statistiques de l'état civil :

- âge, sexe, état matrimonial, lieu de résidence et lieu de naissance de la personne décédée;
- date du décès;

- cause initiale du décès codée selon la « Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes » (CIM) (voir la section « Description de l'enquête » pour d'autres renseignements sur cette variable);
- province ou territoire où a eu lieu le décès;
- lieu de l'accident (pour la plupart des décès accidentels non reliés au transport);
- autopsie (s'il y en a eu une et, dans l'affirmative, si on a tenu compte des résultats pour établir la cause de décès)

Toutes les provinces et tous les territoires fournissent à Statistique Canada des copies sur microfilm ou des images optiques des formulaires d'enregistrement de décès. En outre, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Québec, l'Ontario et les provinces de l'Ouest extraient des formulaires les données de base requises et les transmettent à Statistique Canada sous une forme lisible par machine. Pour Terre-Neuve-et-Labrador, et les territoires, Statistique Canada s'occupe de convertir les données de base qui y sont fournies sur microfilm en une forme lisible par machine. Les modifications subséquentes à apporter aux enregistrements à cause d'erreurs ou d'omissions sont communiquées immédiatement à Statistique Canada. Cependant, les totalisations ne reflètent pas les modifications reçues après la date limite.

Détection des erreurs

Les provinces et les territoires qui transmettent des données sous une forme lisible par machine effectuent des vérifications (présence des données, validation des fourchettes de valeurs des codes et cohérence des données) avant de procéder à l'envoi, conformément à des normes de vérification préparées par Statistique Canada. La Division de la statistique de la santé a fait valoir activement auprès des provinces et des territoires l'utilisation d'un dictionnaire de données normalisé et de contrôles de cohérence normalisés pour la saisie des données. À Statistique Canada, les données sont soumises à des routines de vérification plus complètes en vue de confirmer la complétude et la qualité des données. Pour 2000, environ 9 % des enregistrements ont dû faire l'objet d'un suivi qui a demandé l'examen des copies sur microfilm ou des images optiques des formulaires d'enregistrement ou la consultation des bureaux de l'état civil pertinents. Après la création d'un fichier de données provisoires, des tableaux de vérification sont produits, puis examinés par les bureaux de l'état civil et par Statistique Canada (par exemple, distribution, variation importante, pourcentage et nombre de valeurs inconnues, valeurs extrêmes, variation de la composition relative).

La dernière étude générale de la qualité de la saisie et du codage des données, qui a été réalisée en 1981, a indiqué que les taux d'erreurs sont assez faibles pour la plupart des variables. Depuis, des études ont été réalisées ponctuellement pour des provinces particulières. La plus récente a été réalisée en 2002 sur les données sur les décès de 2000 de l'Île-du-Prince-Édouard, après le développement d'un nouveau système de saisie des données par cette province. Après tirage d'un échantillon aléatoire systématique d'enregistrements, on a comparé les données saisies par l'Île-du-Prince-Édouard à celles figurant sur les documents microfilmés. Les discordances ont été décrites dans un rapport qui a été présenté au registraire de l'état civil de l'Île-du-Prince-Édouard. Dans l'ensemble, le taux d'erreur était nul pour la plupart des variables statistiques importantes (sexe de la personne décédée, lieu de naissance) et très faible pour d'autres (date de naissance, âge). Les questions traitées dans le rapport sont le mode de traitement des modifications, la cohérence de la déclaration du nom du conjoint ou de la conjointe, la déclaration correcte du lieu où s'est produit le traumatisme, l'exécution éventuelle d'un exercice de recapture et de vérification totale de certaines variables, et le dépistage plus précoce des erreurs.

Maintenant que l'Île-du-Prince-Édouard a mis en place son propre système de saisie des données, Statistique Canada ne saisit plus régulièrement les données sur les décès que pour Terre-Neuve-et-Labrador, pour les trois territoires et pour tout enregistrement transmis en retard. La Division des opérations et de l'intégration tient à jour les contrôles de la qualité de la saisie des données, comme la vérification totale de la saisie pour les nouveaux commis et la ressaisie par lot pour les commis expérimentés, afin de maintenir le taux d'erreurs inférieur à 3 %.

Imputation

On recourt à l'imputation pour remplacer les données manquantes sur le sexe de la personne décédée uniquement pour la production des tableaux figurant dans les publications. Moins de cinq enregistrements par an font l'objet d'une imputation.

Évaluation de la qualité

Quand la production de la base nationale annuelle de données sur la mortalité (telle que décrite à la section Détection des erreurs qui précède) est terminée, Statistique Canada effectue une série de contrôles de qualité qui incluent :

1. la production d'un ensemble de tableaux de vérification qui contiennent des totalisations élémentaires pour la majorité des variables de la base de données, selon la province ou le territoire où a eu lieu l'événement,
2. l'envoi des tableaux de vérification à chaque bureau provincial/territorial de l'état civil afin que ceux-ci les examinent et confirment qu'ils obtiennent les mêmes résultats que Statistique Canada,
3. la vérification de la cohérence interne, par exemple, en calculant des fréquences pour certains éléments de données et en les examinant pour déceler les valeurs extrêmes et
4. la comparaison des données les plus récentes à celles des années antérieures pour déceler toute variation inhabituelle ou inattendue.

Les totalisations sont comparées aux données de l'état civil publiées par les provinces et les territoires, si elles existent. Une fois que Statistique Canada a créé le fichier de données pour la publication, la diffusion des statistiques sur la mortalité est annoncée dans *Le Quotidien*.

Contrôle de la divulgation

La Loi interdit à Statistique Canada de rendre publique toute donnée susceptible de révéler de l'information obtenue en vertu de la *Loi sur la statistique* et se rapportant à toute personne, entreprise ou organisation reconnaissable sans que cette personne, entreprise ou organisation le sache ou y consente par écrit. Diverses règles de confidentialité s'appliquent à toutes les données diffusées ou publiées afin d'empêcher la publication ou la divulgation de toute information jugée confidentielle. Au besoin, des données sont supprimées pour empêcher la divulgation directe ou par recoupement de données reconnaissables.

Exactitude des données

Couverture

Comme l'enregistrement des décès est exigé par la loi dans chaque province et territoire du Canada, la déclaration est virtuellement complète. Le sous-dénombrement est jugé minime, mais est néanmoins surveillé. Il peut être dû au fait que des enregistrements sont transmis après la date limite, mais cette situation est beaucoup moins courante que pour les enregistrements de naissance. Le certificat d'enregistrement de décès est exigé pour l'obtention du permis d'inhumation ou de disposer de la dépouille, ainsi que pour le règlement de la succession, ce qui motive la parenté ou les agents officiels à remplir rapidement le formulaire d'enregistrement. Il arrive que des décès soient enregistrés par les autorités locales, mais que les documents pertinents ne soient pas transmis au registraire de la province ou du territoire avant la date limite. Pour 1996, ces cas représentaient environ 400 décès, six années après l'année du décès (enregistrements tardifs cumulés), soit deux dixièmes de pour cent du nombre total d'enregistrements.

D'autres cas d'enregistrements tardifs ou manquants correspondent à des dépouilles non identifiées ou à des décès de résidents du Canada survenus à l'étranger. Pour les dépouilles non identifiées, il est d'usage de considérer la date de la découverte comme étant la date du décès. Habituellement, les décès de personnes non identifiées représentent moins de dix cas par an. En ce qui concerne les décès survenus à l'étranger, seuls ceux survenus

aux États-Unis sont déclarés régulièrement à Statistique Canada et, pour ceux-ci, des résumés d'enregistrement de décès sont transmis à Statistique Canada par environ 20 États américains. Une correspondance récente avec le National Center for Health Statistics (NCHS) des États-Unis montre qu'en 2000, 635 décès de résidents du Canada sont survenus aux États-Unis, mais que 280 enregistrements de décès ont été envoyés à Statistique Canada par les registraires des États. Les analystes de la Division de la statistique de la santé examinent avec les registraires des provinces, des territoires et des États le moyen d'accroître les échanges d'enregistrements entre autorités compétentes à des fins statistiques et administratives.

Les décès de membres du cadre actif des Forces canadiennes sont également sous-dénombrés. Les décès de Canadiens survenus outre-mer pendant qu'ils sont en activité de service dans les Forces armées ne sont pas inclus dans les bases de données de Statistique Canada, parce qu'ils ne sont pas enregistrés par les provinces et territoires. Les analystes de la Division de la statistique de la santé étudient avec des représentants du ministère de la Défense nationale des moyens d'établir un formulaire d'enregistrement de décès pour ce ministère, en s'appuyant sur le modèle de formulaire élaboré par le Conseil de la statistique de l'état civil du Canada.

Le surdénombrement est minime. Des décès de non-résidents survenus au Canada sont enregistrés, mais sont exclus de la plupart des totalisations. Les enregistrements de décès en double sont repérés durant les opérations de traitement ordinaires effectuées sur chaque sous-ensemble provincial ou territorial d'enregistrements, ainsi que lors de vérifications interprovinciales supplémentaires. Les cas éventuels d'enregistrements en double sont résolus en se reportant aux copies sur microfilm ou aux images optiques des formulaires d'enregistrement ou en consultant les bureaux provinciaux et territoriaux de l'état civil pertinents.

Taux de réponse

Réponse partielle

Pour la période de 1997 à 2000, les taux de réponse varient de 99 % à 100 % pour la plupart des variables démographiques figurant dans la Base de données sur la mortalité (âge, sexe, province et division de recensement de résidence). Pour le lieu de naissance et l'état matrimonial de la personne décédée, les taux de réponse sont de l'ordre de 95 % à 97 % à l'échelle nationale, mais ils sont de 100 % si l'on exclut le Québec. Pour la cause initiale du décès, les taux de réponse ont généralement augmenté durant la période de référence, pour passer de 97,7 % pour les données de 1997, à 98,9 % pour 1998, à 99,4 % pour 1999 et à 99,3 pour 2000, tandis que pour le nom et la date de naissance, ils sont de 100 %. La déclaration des codes postaux s'est améliorée, pour passer de 69 % des décès en 1997, à 76 % en 1998 et à 89 % de 1998 à 2000. La déclaration du lieu de naissance de la mère et du père de la personne décédée demeure médiocre, le taux national n'étant que de 35 %. Le Québec et l'Ontario recueillent cette information sur le formulaire d'enregistrement, mais n'incluent pas la variable dans le fichier électronique transmis à Statistique Canada.

Autres questions concernant l'exactitude des données

Âge au moment du décès des personnes de plus de 100 ans

Les démographes Bourbeau et Lebel ont comparé les données sur la mortalité et les données de recensement du Canada à celles d'autres pays et ont conclu que le nombre de centenaires semble assez élevé comparativement à d'autres pays industrialisés. Étant donné l'absence d'un système d'enregistrement des données de l'état civil au Canada avant 1921 et les taux élevés d'immigration au Canada, il est difficile de déterminer si le nombre de personnes de 100 ans et plus est surestimé. Chaque année, le fichier de données sur les décès fait l'objet d'une vérification en vue de déterminer si les valeurs aberrantes d'âge et de date de naissance sont dues à des erreurs de saisie. On s'efforce, dans la mesure du possible, d'obtenir une notice nécrologique pour les plus âgés des vieillards. La comparaison à d'autres sources de données est difficile, particulièrement dans le cas des immigrants. Quand le certificat de naissance n'est pas disponible, il se peut que l'âge surestimé ait été utilisé systématiquement dans d'autres documents, comme l'inscription au régime provincial d'assurance-maladie, la déclaration de revenus et le recensement.

Certificat de cause de décès

La détermination de la cause initiale du décès comporte deux étapes, à savoir la déclaration faite par la personne qui établit le certificat et la classification (codage) faite par un nosologiste (codeur des données médicales). Lorsqu'une personne meurt, le médecin traitant, le coroner, un médecin légiste ou une autre personne autorisée remplit le certificat médical de décès. Celui-ci comprend plusieurs sections où doivent être consignés la cause immédiate du décès, les causes antécédentes, les autres états morbides importants, la nature du décès (par exemple, naturel, accidentel, suicide, homicide) et d'autres renseignements sur les traumatismes. Les études de la qualité de l'établissement des certificats ont montré qu'environ le tiers de ceux-ci contiennent des erreurs importantes. La plupart (environ 85 %) correspondent à l'inscription d'un état morbide non spécifique, comme « accident vasculaire cérébral » ou « insuffisance cardiaque ». Environ 10 % des erreurs sont dues à l'inscription des états morbides selon une séquence illogique. Certaines de ces erreurs peuvent être résolues durant le codage, dont les règles de classification permettent de repérer les séquences illogiques. Les 5 % de cas restants sont ceux pour lesquels des causes concurrentes sont mentionnées sur le certificat. Toutefois, l'offre d'une formation appropriée aux personnes qui émettent les certificats peut réduire considérablement ces erreurs. Statistique Canada collabore avec les registraires provinciaux et territoriaux à la réalisation de deux projets visant à améliorer la qualité des certificats. L'un de ces projets est un atelier d'une demi-journée reconnu comme un crédit en formation médicale permanente et l'autre est le développement d'un tutoriel en ligne.

Statistique de l'état civil — Base de données sur les naissances

Aperçu de l'enquête

Il s'agit d'une enquête administrative conçue pour recueillir annuellement auprès de tous les bureaux provinciaux et territoriaux de l'état civil des renseignements démographiques sur toutes les naissances vivantes survenues au Canada. Certaines données sont également recueillies sur les naissances vivantes survenues chez des résidentes du Canada dans certains États américains.

Les données sont utilisées pour calculer des indicateurs de base (comme des nombres et des taux) concernant les naissances survenues chez des résidentes du Canada. L'information provenant de cette base de données est également utilisée pour le calcul de statistiques, comme les taux de fertilité selon l'âge.

Avant 1921, il était impossible de produire des séries satisfaisantes de données de l'état civil pour le Canada dans son ensemble. Au départ, huit provinces étaient parties à l'entente de collaboration en vue d'établir un système national de données sur l'état civil qui a mené à la publication du premier rapport annuel pour le Canada en 1921; le rapport contenait les données de l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie-Britannique. Le Québec s'est joint aux autres provinces en 1926 et Terre-Neuve, en 1949 (après être entrée dans la Confédération) et leurs données ont été incluses dans les totalisations régulières à partir de ces années là, respectivement. De 1924 à 1955, des données de base ont été publiées en annexe aux tableaux nationaux pour le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest; les données de ces territoires ont été incluses dans les totalisations régulières pour la première fois en 1956. Le Nunavut est devenu officiellement un territoire du Canada le 1^{er} avril 1999. La dénomination Territoires du Nord-Ouest s'applique à un territoire dont les limites géographiques avant et après le 1^{er} avril 1999 sont différentes.

Avant 1944, tous les événements démographiques étaient classés selon le lieu de l'événement. Depuis 1944, les naissances, les mortinaissances et les décès sont classés selon le lieu de résidence déclaré, celui-ci étant le lieu de résidence de la mère pour les naissances et pour les mortinaissances.

Sources de données et méthodologie

Population d'enquête

L'univers conceptuel de la Base de données sur les naissances comprend les naissances provenant de résidentes du Canada survenues n'importe où dans le monde. La population cible de la Base de données sur les naissances comprend les naissances provenant de résidentes du Canada survenues au Canada et dans les États américains. La population réelle (observée) de la Base de données sur les naissances comprend les naissances provenant de résidentes du Canada et de non-résidentes du Canada survenues au Canada, ainsi que les naissances provenant de résidentes du Canada survenues dans certains États américains.

Échantillonnage

Il s'agit d'un recensement avec plan transversal.

Collecte

Il s'agit d'une enquête à participation obligatoire. Les données sont tirées de fichiers administratifs.

Les lois provinciales et territoriales sur la statistique de l'état civil (ou les textes législatifs équivalents) rendent obligatoire l'enregistrement de toutes les naissances vivantes, toutes les mortinaissances, tous les décès et tous les mariages survenus dans la province ou le territoire. Ces lois se rapprochent le plus possible d'une loi modèle sur les statistiques de l'état civil qu'on a rédigée afin d'assurer l'uniformité des lois et des méthodes de déclaration des provinces et territoires.

Une entente entre le gouvernement du Canada et les gouvernements des provinces et des territoires régit le fonctionnement du système canadien des statistiques de l'état civil. Le Conseil de la statistique de l'état civil du Canada, un comité consultatif formé par décret, s'occupe des questions stratégiques et opérationnelles. Les provinces et les territoires ainsi que Statistique Canada sont tous représentés à ce Conseil. Aux termes de l'entente, tous les bureaux de l'état civil recueillent un ensemble normalisé d'éléments de données, mais ont la liberté de recueillir des renseignements supplémentaires.

Le formulaire principal d'enregistrement d'une naissance vivante est rempli par les parents, qui doivent le présenter au bureau de l'état civil local. La plupart des provinces exigent également que les médecins (ou les autres accoucheuses) déclarent toutes les naissances auxquelles ils assistent.

Le bureau central de l'état civil de chaque province ou territoire fournit à Statistique Canada les données tirées des formulaires d'enregistrement de naissances. Pour chaque naissance, toutes les provinces et tous les territoires déclarent les éléments de données suivants aux fins de leur inclusion dans le système canadien des statistiques de l'état civil :

- date et lieu de la naissance;
- sexe, poids à la naissance et âge gestationnel de l'enfant;
- âge, état matrimonial et lieu de naissance des deux parents;
- lieu de résidence de la mère;
- type de naissance (simple ou multiple);
- parité.

Toutes les provinces et tous les territoires fournissent à Statistique Canada des copies sur microfilm ou des images optiques des formulaires d'enregistrement de naissance. En outre, Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Québec, l'Ontario et les provinces de l'Ouest extraient des formulaires les données de base requises et les transmettent à Statistique Canada sous une forme lisible par machine. Pour les territoires, Statistique Canada s'occupe de convertir les données de base qui y sont fournies sur microfilm en une forme lisible par machine. Les modifications subséquentes à apporter aux enregistrements à cause d'erreurs ou d'omissions sont communiquées immédiatement à Statistique Canada. Cependant, les totalisations ne reflètent pas les modifications reçues après la date limite.

Détection des erreurs

Les provinces et les territoires qui transmettent des données sous une forme lisible par machine effectuent des vérifications (présence des données, validation des fourchettes de valeurs des codes et cohérence des données) avant de procéder à l'envoi, conformément à des normes de vérification préparées par Statistique Canada. La Division de la statistique de la santé a fait valoir activement auprès des provinces et des territoires l'utilisation d'un dictionnaire de données normalisé et de contrôles de cohérence normalisés pour la saisie des données. À Statistique Canada, les données sont soumises à des routines de vérification plus complètes en vue de confirmer la complétude et la qualité des données. Pour 2000, environ 8 % des enregistrements ont dû faire l'objet d'un suivi qui a demandé l'examen des copies sur microfilm ou des images optiques des formulaires d'enregistrement ou la consultation des bureaux de l'état civil pertinents. Après la création d'un fichier de données provisoires, des tableaux de vérification sont produits, puis examinés par les bureaux de l'état civil et par Statistique Canada (par exemple, distribution,

variation importante, pourcentage et nombre de valeurs inconnues, valeurs extrêmes, variation de la composition relative).

La dernière étude générale de la qualité de la saisie et du codage des données, qui a été réalisée en 1981, a indiqué que les taux d'erreurs sont assez faibles pour la plupart des variables. Depuis, des études ont été réalisées ponctuellement pour des provinces particulières. La plus récente a été réalisée en 2002 sur les données sur les naissances de 2000 de l'Île-du-Prince-Édouard, après le développement d'un nouveau système de saisie des données par cette province. Après tirage d'un échantillon aléatoire systématique d'enregistrements, on a comparé les données saisies par l'Île-du-Prince-Édouard à celles figurant sur les documents microfilmés. Les discordances ont été décrites dans un rapport qui a été présenté au registraire de l'état civil de l'Île-du-Prince-Édouard. Dans l'ensemble, le taux d'erreur était nul pour la plupart des variables statistiques importantes (sexe de l'enfant, âge de la mère, nombre total d'enfants, indicateurs de naissances multiples). Les questions traitées dans le rapport sont le mode de traitement des modifications, la cohérence de la déclaration du poids à la naissance en unités métriques, l'exécution éventuelle d'un exercice de recapture et de vérification totale de certaines variables, et le dépistage plus précoce des erreurs.

Maintenant que l'Île-du-Prince-Édouard a mis en place son propre système de saisie des données, Statistique Canada ne saisit plus régulièrement les données sur les naissances que pour les trois territoires et pour tout enregistrement transmis en retard. La Division des opérations et de l'intégration tient à jour les contrôles de la qualité de la saisie des données, comme la vérification totale de la saisie pour les nouveaux commis et la ressaisie par lot pour les commis expérimentés, afin de maintenir le taux d'erreurs inférieur à 3 %.

Imputation

Les données manquantes sur le sexe de l'enfant sont imputées uniquement pour produire les totalisations figurant dans les publications. Le sexe est attribué d'après le dernier chiffre du numéro d'enregistrement. En général, le nombre annuel d'enregistrements faisant l'objet d'une imputation n'est pas supérieur à cinq (sauf pour 1996, où le sexe de l'enfant a été imputé dans 125 enregistrements et pour 1998, où le nombre était de 77).

Évaluation de la qualité

Quand la production de la base nationale annuelle de données sur les naissances (telle que décrite à la section Détection des erreurs qui précède) est terminée, Statistique Canada effectue une série de contrôles de qualité qui incluent :

1. la production d'un ensemble de tableaux de vérification qui contiennent des totalisations élémentaires pour la majorité des variables de la base de données, selon la province ou le territoire où a eu lieu l'événement,
2. l'envoi des tableaux de vérification à chaque bureau provincial/territorial de l'état civil afin que ceux-ci les examinent et confirment qu'ils obtiennent les mêmes résultats que Statistique Canada,
3. la vérification de la cohérence interne, par exemple, en calculant des fréquences pour certains éléments de données et en les examinant pour déceler les valeurs extrêmes et
4. la comparaison des données les plus récentes à celles des années antérieures pour déceler toute variation inhabituelle ou inattendue.

Les totalisations sont comparées aux données de l'état civil publiées par les provinces et les territoires, si elles existent. Une fois que Statistique Canada a créé le fichier de données pour la publication, la diffusion des statistiques sur les naissances est annoncée dans *Le Quotidien*.

Contrôle de la divulgation

La Loi interdit à Statistique Canada de rendre publique toute donnée susceptible de révéler de l'information obtenue en vertu de la *Loi sur la statistique* et se rapportant à toute personne, entreprise ou organisation reconnaissable sans que cette personne, entreprise ou organisation le sache ou y consente par écrit. Diverses règles de confidentialité s'appliquent à toutes les données diffusées ou publiées afin d'empêcher la publication ou la divulgation de toute information jugée confidentielle. Au besoin, des données sont supprimées pour empêcher la divulgation directe ou par recoupement de données reconnaissables.

Exactitude des données

Couverture

Comme l'enregistrement des naissances est exigé par la loi dans chaque province et territoire du Canada, la déclaration est virtuellement complète. Le sous-dénombrement est jugé minime, mais est néanmoins surveillé. Il peut être dû à l'enregistrement tardif qui, s'il n'est pas fait immédiatement après la naissance, est nécessaire pour l'inscription à l'école. Statistique Canada reçoit les données sur les enregistrements tardifs (habituellement de 1 000 à 1 500 cas, cinq ans après l'année de l'événement) et étudie à l'heure actuelle la possibilité d'inclure les enregistrements tardifs et les modifications tardives dans le fichier de données en vue de les inclure dans les publications subséquentes. L'enregistrement incomplet est également une source de sous-dénombrement. Par exemple, certaines provinces exigent qu'une déclaration notariée soit remplie lorsque la mère refuse de nommer le père sur la demande d'enregistrement de naissance. Tant que la déclaration n'est pas notariée, la demande n'est pas enregistrée.

La déclaration des naissances survenues à l'étranger est incomplète. Les naissances d'enfants dont la mère est résidente du Canada qui ont lieu dans d'autres pays que les États-Unis ne sont pas déclarées; bien qu'il existe une entente bilatérale avec les États-Unis, certains États ne déclarent pas nécessairement les naissances d'enfants dont la mère est résidente du Canada survenues sur leur territoire.

Le non-enregistrement est minime, sauf en Ontario, où les agents provinciaux de la santé ont constaté une augmentation du nombre de notifications médicales de naissance pour lesquelles il n'existe pas de formulaire de déclaration correspondant rempli par les parents. En 2000, le nombre de ces cas était de 4 000, soit 3 % de l'ensemble des naissances survenues en Ontario, mais ce chiffre est probablement inférieur en réalité, parce que les enregistrements en double et les enregistrements tardifs sont inclus dans ce total. La situation se manifeste principalement dans les districts de l'Ontario qui perçoivent des frais de service pour l'enregistrement des naissances (par exemple, en 2003, la ville d'Ottawa percevait des frais de service de 30 \$ pour enregistrer une naissance) et pour les nouveau-nés décédés dans les jours qui suivent la naissance (pour 25 % de décès de nouveau-nés survenus en Ontario, il n'existe pas de certificat d'enregistrement de naissance correspondant). Ces problèmes de qualité ont fait l'objet de plusieurs discussions avec le Bureau du registraire général de l'état civil de l'Ontario. Des arrêts de travail et un arriéré d'enregistrements ont limité les ressources dont le Bureau dispose pour les opérations de suivi. En ce qui concerne les enregistrements de naissance qui n'ont pas été produits pour un nouveau-né décédé, il est reconnu que la collecte de ces données auprès des familles en deuil est difficile.

Le surdénombrement est minime. Les naissances d'enfants dont la mère est une non-résidente sont enregistrées, mais exclues de la plupart des totalisations. Les enregistrements de naissance en double sont repérés durant les opérations de traitement ordinaires de chaque sous-ensemble de données provinciales ou territoriales, et lors de vérifications interprovinciales supplémentaires, ainsi que de comparaisons entre les bases de données sur les naissances et sur les mortinaissances dans le cas de naissances multiples. Pour résoudre les cas d'enregistrement en double éventuel, on vérifie les copies sur microfilms ou les images optiques des formulaires d'enregistrement, ou on consulte les bureaux provinciaux ou territoriaux de l'état civil pertinents.

Taux de réponse

Réponse partielle

Pour la période de 1997 à 2000, les taux de réponse sont de 98 % à 100 % pour la plupart des variables de la Base de données sur les naissances, sauf en ce qui concerne l'état matrimonial de la mère, l'âge du père et le lieu de naissance, pour lesquels le taux de réponse est de 90 % à 95 %. Une exception importante est que l'Ontario ne fournit pas les données sur les dates de naissance de la mère et du père à Statistique Canada; toutefois, cette province fournit l'âge de chaque parent. Dans le cadre des mesures prises pour améliorer la sécurité après les attaques terroristes du 11 septembre 2001, le Bureau du registraire de l'état civil de l'Ontario a décidé de saisir les données sur ces variables. Donc en principe, l'Ontario transmettra les données sur les dates de naissance du père et de la mère à Statistique Canada à compter de l'année de référence 2003.

Autres questions concernant l'exactitude des données

Données de l'Ontario sur le poids à la naissance et la durée de la gestation

Durant le développement du Système canadien de surveillance périnatale, on a constaté que la troncature des poids de naissance appliquée par l'Ontario causait des problèmes. Les questions de la troncature du poids de naissance et de la vérification uniforme des données sur le poids de naissance et sur la durée de la gestation (tirées de la notification de naissance remplie par le médecin plutôt que du formulaire d'enregistrement rempli par les parents) ont été résolues en collaboration avec le Bureau du registraire de l'état civil de l'Ontario. La qualité de ces données continue d'être surveillée régulièrement.

Données sur le faible poids à la naissance et la courte durée de la gestation

Les analystes de la Division de la statistique de la santé continuent de suivre les progrès réalisés dans le domaine des techniques de reproduction assistées et des techniques médicales en regard de la déclaration de nouveau-nés de poids de naissance extrêmement faibles et (ou) d'âge gestationnel faible. Les pratiques concernant l'enregistrement de ces naissances manquent d'uniformité, même si leur déclaration est obligatoire aux termes de la loi. Statistiquement, ce problème est dû à l'utilisation d'indicateurs de rechange pour la mortalité infantile qui sont calculés en prenant pour dénominateur les naissances vivantes de bébés pesant 500 grammes ou plus.

Estimations de la population selon l'âge et le sexe pour le Canada, les provinces et les territoires

Aperçu de l'enquête

Ce programme d'estimations de la population sert au calcul des indicateurs démographiques, sociaux et économiques (taux de fécondité, taux de mortalité, taux de nuptialité, taux de divortialité, taux de chômage, taux d'inscription scolaire, etc.) pour lesquels la population, ou une partie de celle-ci, sert de dénominateur. Ces données permettent aussi de calculer des pondérations qui seront utilisées dans les enquêtes de Statistique Canada (Enquête sur la population active, Enquête sur l'équipement ménager, Enquête sociale générale, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, etc.). Elles permettent également d'analyser le niveau annuel d'immigration par le gouvernement du Canada. Elles servent aussi comme population de base pour la préparation des projections démographiques par Statistique Canada. Les estimations démographiques sont essentielles pour déterminer le montant des paiements de transfert versés par l'administration fédérale aux provinces et territoires et ce aux termes de la *Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé* et de la *Loi canadienne sur les prêts aux étudiants*.

Sources de données et méthodologie

Échantillonnage

Il s'agit d'un recensement.

Collecte

Les données sont tirées de fichiers administratifs et sont dérivées d'autres enquêtes.

Les estimations postcensitaires, obtenues par la méthode des composantes, ont comme point de départ la population du recensement le plus récent corrigée pour le sous-dénombrement net et rajustée au 1^{er} juillet (Enquête 3901). Ainsi, par exemple, pour estimer la population au 1^{er} juillet 2003, on a tenu compte, pour chaque génération (définie ici comme l'ensemble des personnes nés au cours d'une même année censitaire), des événements démographiques survenus depuis le recensement de 2001. À cette population de départ, on a donc ajouté le nombre de naissances, des immigrants et le solde des résidents non permanents, puis on en a retranché le nombre des décès, des émigrants. Pour chaque province, il faut en outre ajouter le solde migratoire interprovincial. On aboutit ainsi, à une estimation postcensitaire de la population totale au 1^{er} juillet 2003. Les composantes de l'accroissement démographique sont estimées à l'aide de diverses sources.

Estimation

Les estimations démographiques peuvent être intercensitaires ou postcensitaires. Les estimations intercensitaires sont produites à l'aide de deux recensements, tandis que les estimations postcensitaires sont produites à partir du plus récent recensement. Du point de vue de l'actualité des données, les estimations postcensitaires sont manifestement plus à jour que celles du dernier recensement, mais elles sont moins précises. La production d'estimations intercensitaires consiste à corriger rétrospectivement les estimations postcensitaires à l'aide des données d'un nouveau recensement. Pour le calcul des estimations postcensitaires, on ajoute ou retranche à l'effectif de population le plus récent, corrigé de l'erreur de couverture au recensement (c'est-à-dire le

sous-dénombrement et le surdénombrement) le nombre de naissances, le nombre de décès et les composantes migratoires internes et internationales. Le fait d'inclure les résidents non permanents dans la population cible oblige à ajouter à la population de départ, ou à en soustraire, la variation nette de la taille de cette sous-population. Les estimations sont d'abord produites pour chaque province et territoire, puis totalisées pour obtenir une estimation de la population du Canada. Afin de produire des estimations postcensitaires par âge et sexe, on utilise la même méthode que celle de la population totale à la différence qu'elle est appliquée à chaque cohorte d'âge et sexe de la population de départ. Pour plus de renseignements sur les méthodes d'estimation, voir Méthodes d'estimation de la population et des familles à Statistique Canada, Division de la démographie, n° 91-528-X au catalogue.

Contrôle de la divulgation

La Loi interdit à Statistique Canada de rendre publique toute donnée susceptible de révéler de l'information obtenue en vertu de la *Loi sur la statistique* et se rapportant à toute personne, entreprise ou organisation reconnaissable sans que cette personne, entreprise ou organisation le sache ou y consente par écrit. Diverses règles de confidentialité s'appliquent à toutes les données diffusées ou publiées afin d'empêcher la publication ou la divulgation de toute information jugée confidentielle. Au besoin, des données sont supprimées pour empêcher la divulgation directe ou par recoupement de données reconnaissables.

Révisions et désaisonnalisation

Les données sont révisées une fois par an. Après chaque recensement, les estimations postcensitaires sont révisées afin de produire estimations intercensitaires.

Exactitude des données

Les estimations de population selon l'âge et le sexe sont entachées d'une certaine marge d'imprécision qui provient (1) des erreurs dans les corrections pour le sous-dénombrement net (2) des autres sources de données et des méthodes d'estimation des composantes. Les erreurs provenant des méthodes d'estimations et des sources de données autres que les recensements ont une importance difficilement quantifiable mais non négligeable puisqu'à chaque niveau de ventilation se glisse un nouveau coefficient d'imprécision. Les effectifs totaux des composantes contiennent une certaine marge d'erreur de départ. La méthode utilisée pour leur attribuer un sexe et un âge, ajoute à chaque étape une erreur supplémentaire aux nombres ainsi obtenus. Néanmoins, en ce qui concerne la qualité de leurs sources de données, les composantes peuvent être divisées en deux catégories : d'une part les naissances, les décès, l'immigration, pour lesquels les sources peuvent être considérées comme très bonnes lorsqu'il s'agit de données définitives et d'autre part l'émigration totale, les résidents non permanents et la migration interprovinciale pour lesquelles les méthodes utilisées peuvent être une source d'erreur plus importante. Mentionnons enfin que l'importance de l'erreur provenant de l'estimation des composantes peut varier suivant la province, le sexe et l'âge et que d'éventuelles erreurs portant sur certaines composantes (les naissances et l'émigration totale) peuvent affecter davantage un groupe d'âge ou un sexe. Les estimations intercensitaires sont entachées des mêmes erreurs que les estimations postcensitaires. À ces erreurs s'ajoutent celles provenant de la façon dont on a distribué les erreurs en fin de période, soit en fonction du temps écoulé depuis le recensement servant de point de départ.

Notes explicatives pour les tableaux

Tableau 1 Décès selon certains groupes de causes, le sexe et la géographie

Sources des données : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès et Division de la démographie (estimations de population)

Le décès correspond à la disparition permanente de tout signe de vie à n'importe quel moment après une naissance vivante. Les mortinaissances ne sont pas prises en compte.

La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.

Dans ce tableau, les nombres excluent les décès de non-résidents du Canada.

Les données manquantes sur le sexe des personnes décédées ont été imputées en fonction du numéro de l'enregistrement du décès.

La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.

Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)

« National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics », disponible à www.cdc.gov/nchs/data/dvs/im9_2002.pdf.

Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.

Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.

Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.

Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité en 2003 sont les estimations postcensitaires mises à jour au 1er juillet 2003, rajustées pour le sous-dénombrement net au recensement et incluent les résidents non permanents. Ces estimations de population figurent dans la publication « Statistiques démographiques annuelles, 2004 » (numéro 91-213-XIB/XPB au catalogue).

Tableau 2 Décès selon certains groupes de causes, le groupe d'âge au décès et le sexe, Canada

Sources des données : Statistique Canada, Statistique de l'état civil du Canada, Bases de données sur les naissances et sur les décès et Division de la démographie (estimations de population)

Le décès correspond à la disparition permanente de tout signe de vie à n'importe quel moment après une naissance vivante. Les mortinaissances ne sont pas prises en compte.

La répartition géographique des décès dans ce tableau se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne décédée.

Dans ce tableau, les nombres excluent les décès de non-résidents du Canada.

Les données manquantes sur le sexe des personnes décédées ont été imputées en fonction du numéro de l'enregistrement du décès.

Âge au dernier anniversaire précédant le décès.

Pour « Âge au décès, tous les âges », le taux de mortalité représente le taux brut de mortalité ou le nombre de décès pendant une année donnée pour 100 000 personnes au 1er juillet de cette même année.

Pour « Âge au décès, moins d'un an », le taux de mortalité utilise les naissances vivantes de l'année civile.

Pour « Âge au décès, 1 à 4 ans », le taux de mortalité utilise les estimations de population des 0 à 4 ans moins les naissances vivantes de l'année civile.

Pour « Âge au décès », chaque groupe d'âge à l'exception de « Tous les âges », le taux de mortalité représente le taux de mortalité par âge ou le nombre de décès dans un groupe d'âge particulier pendant une année donnée pour 100 000 personnes dans le même groupe d'âge au 1er juillet de la même année.

La cause de décès totalisée est la cause initiale de décès. Cette dernière se définit comme étant (a) la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou (b) les circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. La cause initiale est choisie parmi les états indiqués sur le certificat médical de la cause de décès.

Organisation mondiale de la Santé (OMS), Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)

« National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics », disponible à www.cdc.gov/nchs/data/dvs/im9_2002.pdf.

Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision, et leurs séquelles A00, A05, A20 à A36, A42 à A44, A48 à A49, A54 à A79, A81 à A82, A85.0 à A85.1, A85.8, A86 à B04, B06 à B09, B25 à B49, B55 à B99.

Toutes autres maladies (résiduel) D65 à E07, E15 à E34, E65 à F99, G04 à G12, G23 à G25, G31 à H93, K00 à K22, K29 à K31, K50 à K66, K71 à K72, K75 à K76, K83 à M99, N13.0 à N13.5, N13.7 à N13.9, N14, N15.0, N15.8 à N15.9, N20 à N23, N28 à N39, N41 à N64, N80 à N98. À partir de 2003, la catégorie U04 est également incluse dans ce groupe.

Accidents de véhicule à moteur V02 à V04, V09.0, V09.2, V12 à V14, V19.0 à V19.2, V19.4 à V19.6, V20 à V79, V80.3 à V80.5, V81.0 à V81.1, V82.0 à V82.1, V83 à V86, V87.0 à V87.8, V88.0 à V88.8, V89.0, V89.2.

Autres accidents de transport terrestre V01, V05 à V06, V09.1, V09.3 à V09.9, V10 à V11, V15 à V18, V19.3, V19.8 à V19.9, V80.0 à V80.2, V80.6 à V80.9, V81.2 à V81.9, V82.2 à V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9.

Les estimations de population utilisées pour calculer les taux de mortalité en 2003 sont les estimations postcensitaires mises à jour au 1er juillet 2003, rajustées pour le sous-dénombrement net au recensement et incluent les résidents non permanents. Ces estimations de population figurent dans la publication « Statistiques démographiques annuelles, 2004 » (numéro 91-213-XIB/XPB au catalogue).

Appendice I

Liste sommaire des causes de décès

Tableau explicatif 1

Causes de décès pour les totalisations de statistiques sur la mortalité, liste « B », noms et codes de la CIM-10

Causes de décès	Codes de la CIM-10
Total, toutes les causes de décès	A00-Y89
Infections à la salmonelle	A01-A02
Shigellose et amibiase	A03, A06
Certaines autres infections intestinales	A04, A07-A09
Tuberculose	A16-A19
Tuberculose de l'appareil respiratoire	A16
Autres formes de tuberculose	A17-A19
Coqueluche	A37
Scarlatine et érysipèle	A38, A46
Infection à méningocoques	A39
Septicémie	A40-A41
Syphilis	A50-A53
Poliomyélite aiguë	A80
Encéphalite transmise par les arthropodes	A83-A84, A85.2
Rougeole	B05
Hépatite virale	B15-B19
Maladies dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]	B20-B24
Paludisme	B50-B54
Maladies infectieuses et parasitaires autres et sans précision et leurs séquelles	A00, A05, A20-A36, A42-A44, A48-A49, A54-A79, A81-A82, A85.0-A85.1, A85.8, A86-B04, B06-B09, B25-B49, B55-B99
Tumeurs malignes	C00-C97
Tumeurs malignes de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx	C00-C14
Tumeur maligne de l'oesophage	C15
Tumeur maligne de l'estomac	C16
Tumeurs malignes du côlon, du rectum et de l'anus	C18-C21
Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques	C22
Tumeur maligne du pancréas	C25
Tumeur maligne du larynx	C32
Tumeurs malignes de la trachée, des bronches et du poumon	C33-C34
Mélanome malin de la peau	C43
Tumeur maligne du sein	C50
Tumeur maligne du col de l'utérus	C53
Tumeurs malignes du corps de l'utérus et de l'utérus, partie non précisée	C54-C55
Tumeur maligne de l'ovaire	C56
Tumeur maligne de la prostate	C61
Tumeurs malignes du rein et du bassin du rein	C64-C65
Tumeur maligne de la vessie	C67
Tumeurs malignes des méninges, du cerveau et des autres parties du système nerveux central	C70-C72
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés	C81-C96
Maladie de Hodgkin	C81
Lymphome non hodgkinien	C82-C85
Leucémie	C91-C95
Myélome multiple et tumeurs immunoprolifératives	C88, C90
Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées	C96
Toutes les autres formes de tumeurs malignes et de tumeurs malignes non précisées	C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C66, C68-C69, C73-C80, C97
Tumeurs in situ, tumeurs bénignes, et tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue	D00-D48
Anémies	D50-D64
Diabète sucré	E10-E14
Déficiences nutritionnelles	E40-E64
Malnutrition	E40-E46
Autres carences nutritionnelles	E50-E64
Méningite	G00, G03
Maladie de Parkinson	G20-G21
Maladie d'Alzheimer	G30

Tableau explicatif 1 – suite

Causes de décès pour les totalisations de statistiques sur la mortalité, liste « B », noms et codes de la CIM-10

Causes de décès	Codes de la CIM-10
Maladies cardio-vasculaires graves	I00-I78
Maladies du cœur	I00-I09, I11, I13, I20-I51
Rhumatisme articulaire aigu et cardiopathies rhumatismales chroniques	I00-I09
Cardiopathie hypertensive	I11
Cardionéphropathie hypertensive	I13
Cardiopathies ischémiques	I20-I25
Infarctus aigu du myocarde	I21-I22
Autres cardiopathies ischémiques aiguës	I24
Autres formes de cardiopathies ischémiques chroniques	I20, I25
Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi	I25.0
Toutes autres formes de cardiopathie ischémique chronique	I20, I25.1-I25.9
Autres cardiopathies	I26-I51
Endocardite aiguë et subaiguë	I33
Maladies du péricarde et myocardite aiguë	I30-I31, I40
Insuffisance cardiaque	I50
Toutes autres formes de cardiopathie	I26-I28, I34-I38, I42-I49, I51
Hypertension essentielle (primitive) et néphropathie hypertensive	I10, I12
Maladies cérébrovasculaires	I60-I69
Athérosclérose	I70
Autres maladies du système circulatoire	I71-I78
Anévrisme aortique et dissection	I71
Autres maladies des artères, des artérioles et des capillaires	I72-I78
Autres troubles du système circulatoire	I80-I99
Grippe et pneumopathie	J10-J18
Grippe	J10-J11
Pneumopathie	J12-J18
Autres affections aiguës des voies respiratoires inférieures	J20-J22
Bronchite aiguë et bronchiolite aiguë	J20-J21
Infection aiguë des voies respiratoires inférieures, sans précision	J22
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	J40-J47
Bronchite chronique et non précisée	J40-J42
Emphysème	J43
Asthme	J45-J46
Autres maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	J44, J47
Pneumoconioses et affections respiratoires dues à des agents chimiques	J60-J66, J68
Pneumopathie due à des substances solides et liquides	J69
Autres maladies du système respiratoire	J00-J06, J30-J39, J67, J70-J98
Ulcère gastro-duodénal	K25-K28
Maladies de l'appendice	K35-K38
Hernies	K40-K46
Maladie chronique et cirrhose du foie	K70, K73-K74
Maladie alcoolique du foie	K70
Autres maladies chroniques et cirrhoses du foie	K73-K74
Cholélithiase et autres troubles de la vésicule biliaire	K80-K82
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie	N00-N07, N17-N19, N25-N27
Syndrome néphritique aigu et d'évolution rapide et syndrome néphrotique	N00-N01, N04
Glomérulonéphrite, néphrite et néphropathie chroniques, sans précision	
quant au caractère aigu ou chronique, et sclérose rénale sans précision	N02-N03, N05-N07, N26
Insuffisance rénale	N17-N19
Autres maladies des reins	N25, N27
Infections rénales	N10-N12, N13.6, N15.1
Hyperplasie de la prostate	N40
Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme	N70-N76
Grossesse, accouchement et puerpéralité	O00-O99
Grossesse se terminant par un avortement	O00-O07
Autres complications liées à la grossesse, à l'accouchement et à la puerpéralité	O10-O99
Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale	P00-P96
Malformations congénitales et anomalies chromosomiques	Q00-Q99
Symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs	R00-R99
Toutes autres maladies (résiduel)	D65-E07, E15-E34, E65-F99, G04-G12, G23-G25, G31-H93, K00-K22, K29-K31, K50-K66, K71-K72, K75-K76, K83-M99, N13.0-N13.5, N13.7-N13.9, N14, N15.0, N15.8-N15.9, N20-N23, N28-N39, N41-N64, N80-N98, U04
Accidents (blessures involontaires)	V01-X59, Y85-Y86
Accidents de transport	V01-V99, Y85
Accidents de véhicule à moteur	V02-V04, V09.0, V09.2, V12-V14, V19.0-V19.2, V19.4-V19.6, V20-V79, V80.3-V80.5, V81.0-V81.1, V82.0-V82.1, V83-V86, V87.0-V87.8, V88.0-V88.8, V89.0, V89.2
Autres accidents de transport terrestre	V01, V05-V06, V09.1, V09.3-V09.9, V10-V11, V15-V18, V19.3, V19.8-V19.9, V80.0-V80.2, V80.6-V80.9, V81.2-V81.9, V82.2-V82.9, V87.9, V88.9, V89.1, V89.3, V89.9

Tableau explicatif 1 – suite

Causes de décès pour les totalisations de statistiques sur la mortalité, liste « B », noms et codes de la CIM-10

Causes de décès	Codes de la CIM-10
Accidents de transport par eau, aérien et de vol spatial, et accidents de transport autres et sans précision et leurs séquelles	V90-V99, Y85
Accidents non liés au transport	W00-X59, Y86
Chutes	W00-W19
Décharges accidentelles d'armes à feu	W32-W34
Noyade et submersion accidentelles	W65-W74
Exposition à la fumée, au feu et aux flammes	X00-X09
Intoxication accidentelle par des substances nocives et exposition à ces substances	X40-X49
Accidents non liés au transport, autres et sans précision et leurs séquelles	W20-W31, W35-W64, W75-W99, X10-X39, X50-X59, Y86
Lésions auto-infligées (suicide)	X60-X84, Y87.0
Lésions auto-infligées (suicide) par décharge d'armes à feu	X72-X74
Lésions auto-infligées (suicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles	X60-X71, X75-X84, Y87.0
Agressions (homicide)	X85-Y09, Y87.1
Agressions (homicide) par armes à feu	X93-X95
Agressions (homicide) par d'autres moyens et moyens sans précision et leurs séquelles	X85-X92, X96-Y09, Y87.1
Intervention de la force publique	Y35, Y89.0
Événements dont l'intention n'est pas déterminée	Y10-Y34, Y87.2, Y89.9
Décharges d'armes à feu intention non déterminée	Y22-Y24
Autres événements et événements sans précision, intention non déterminée et leurs séquelles	Y10-Y21, Y25-Y34, Y87.2, Y89.9
Faits de guerre et leurs séquelles	Y36, Y89.1
Complications de soins médicaux et chirurgicaux	Y40-Y84, Y88

Nota : Organisation mondiale de la Santé (OMS), *Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10)*

Source : « National Center for Health Statistics », États-Unis, liste « B » dans « Instruction Manual; Part 9; ICD-10 Cause-of-Death Lists for Tabulating Mortality Statistics », disponible à www.cdc.gov/nchs/data/dvs/im9_2002.pdf.