Bulletin du Relevé des oiseaux des Territoires du Nord-Ouest/Nunavut

Printemps 2008

Programme coordonné par le Service canadien de la faune d'Environnment Canada depuis 1995

Nouvelles du programme des relevés

Observations de 2007 dignes de mention:

- Guillemot noir (trouvé sans vie) à Cambridge Bay (octobre 2007)
- Martin-pêcheur d'Amérique à Cambridge Bay (septembre 2007)
- Grive solitaire à Cambridge Bay (juillet 2007)
- Vacher à tête brune et Hirondelle rustique à l'île Bylot (août 2007)
- Urubu à tête rouge à Arviat (juillet 2007)
- Tyran tritri à Rankin Inlet (juillet 2007)
- Pic flamboyant à Whale Cove (septembre 2007)
- Tourterelle triste à Yellowknife (octobre 2007)
- Pélican d'Amérique à Trout Lake (août 2007)
- Pluvier siffleur dans l'île Akimiski, baie James (août 2007)
- Possible Grimpereau brun à Fort Smith (juillet 2007)
- Cincles d'Amérique (observation de huit) au ruisseau Doris (mars 2007)
- Merlebleu azuré au lac Meadowbank (juin 2007)

Cet Urubu à tête rouge a été observé à Arviat en juillet dernier. (Photo: Lynne Rollins)

Lieux des relevés d'oiseaux

Voici une carte à jour des lieux des relevés faits dans le Nord. Nous remercions tous les chercheurs et les scientifiques citoyens dévoués qui ont fait la collecte des données au cours des 13 dernières années. Avec votre aide, nous remplirons les espaces au cours des 10 prochaines années.

Faits en bref

- **Plus de quatre millions d'oiseaux ont été dénombrés depuis 1995**
- **493 observateurs ont soumis 10 143 listes d'observation**



Government of Canada
Gouvernement du Canada
Canada

Conseils:

Souvenez-vous que pour confirmer l'observation d'un oiseau rare dans les T.N.-O. ou le Nunavut, vous devez soumettre une preuve photographique (même si elle est embrouillée)

OU

un dessin descriptif.

PORTRAIT D'UN ORNITHOLOGUE AMATEUR DU NORD : Doug Stern

Doug est un habitué des listes d'observation qui habite Cambridge Bay et a passé des étés dans le Nord de l'île Ellesmere dans le cadre de son travail pour Parcs Canada. Il nous a également régalés de plusieurs observations intéressantes au cours des années et il a vécu tant d'expériences qu'il pense qu'un jour, peut-être, il publiera une collection de ses récits fascinants sur la faune.

1) Depuis combien de temps observez-vous les oiseaux?

« Depuis mes premières expériences de camping et d'excursions en canot à l'adolescence en Ontario. »

2) Quel est votre oiseau préféré observé dans le Nord?

« J'en ai deux : premièrement, un Roselin à tête grise juvénile vu en 1994, à 20 miles [32 km] de l'embouchure de la rivière Hood, Bathurst Inlet. Dans la lueur crépusculaire d'angle faible ce soir-là, j'ai pensé qu'il ressemblait au canari que quelqu'un aurait perdu! Deuxièmement, parmi les oiseaux du Nord que j'observe chaque année, je dois dire que l'Eider à tête grise mâle est mon favori. C'est l'oiseau le plus attirant, sa parade nuptiale est superbe, et il émet un roucoulement grave plutôt intéressant. Un Fred Astaire à plumes. Qu'est-ce qu'une eider femelle pourrait vouloir de plus? »

À en juger par son sourire, Doug a dû voir un oiseau hivernant très intéressant. (Photo reproduite avec la permission de Doug Stern)

3) Conseils de Doug aux ornithologues amateurs du Nord :

« Vous devez pêcher pour attraper le poisson. C'est la même chose pour les observations intéressantes d'oiseaux. Sortez et observez. Vous pourriez aider à élargir l'aire de répartition connue de certaines espèces, rapporter des observations inhabituelles de voyages hors des sentiers battus ou de votre propre jardin. Qui sait? Peut être verrez vous une espèce vraiment hors de son aire comme le Martin pêcheur à Cambridge Bay l'automne passé… »

Un nid d'Oie des neiges avec vue. Le nid, et cinq autres sur un pic de 275 m (900 pieds) ou à proximité, a été une des observations faites par Doug l'an passé dans l'île Ellesmere. Les nids étaient situés sous un nid de faucon gerfaut occupé. Une des oies (photo ci-dessus à droite) portait un collier d'un projet de marquage sur l'estuaire du fleuve Saint Laurent. (Montage: Doug Stern)

Aires de répartition en évolution:

Les données d'observation aident les scientifiques à établir des cartes exactes de répartition nord.



Aire de répartition du Moucherolle à côtés olive. En fait, on trouve ce moucherolle de la famille des Tyrannidae vivant dans les forêts de conifères et dans les tourbières à 400 km plus au nord qu'indiqué dans la plupart des guides d'observation des oiseaux (l'aire connue auparavant est indiquée par le pointillé).

Vous êtes-vous déjà demandé comment les cartes de répartition sont faites dans votre guide d'observation des oiseaux? En fait, elles sont possible grâce aux nombreux efforts d'un grand nombre de personnes et d'organismes. Les auteurs des livres sur les oiseaux peuvent se servir de méthodes telles que l'examen des images satellite pour trouver les habitats convenables, la consultation des experts de certaines espèces ou l'utilisation des données obtenues dans le cadre de programmes comme le Relevé des oiseaux des T.N.-O. et du Nunavut.

Il est très difficile pour les ornithologues de déterminer quelles espèces sont présentes dans des régions vastes et peu densément peuplées comme les T.N.-O. et le Nunavut. Pour la plupart, les cartes de répartition des espèces dans les T.N.-O. et le Nunavut étaient fondées principalement sur les types d'habitat et sur les observations historiques. Il s'agit d'hypothèses bien fondées. Mais, grâce à l'ajout continu des observations à la base de donnée du Relevé, nous réussissons à déterminer l'aire de répartition des espèces d'oiseaux dans le Nord avec plus d'exactitude.

Récemment, nous avons examiné les aires de répartition nord de plus de 250 espèces d'oiseaux à partir des données fournies par NatureServe (www.natureserve.org, en anglais et espagnol seulement). Nous avons déterminé de nouvelles aires de nidification confirmées en utilisant les observations fournies dans le cadre du Relevé par des bénévoles ainsi que les données historiques que nous avons enregistrées dans la base de données. L'aire de répartition de certaines espèces n'a subit que des changements mineurs tandis que d'autres espèces n'apparaissaient même pas sur les cartes des T.N.-O. ou du Nunavut. Ces données seront éventuellement diffusées par les mises à jour des aires de répartition dans l'hémisphère occidental publiées par NatureServe.



Aire de répartition du Râle jaune. Espèce difficile à trouver et préoccupante en vertu de la Loi sur les espèces en péril, il semblerait que le Râle jaune soit plus commun dans le Sud des T.N.-O. qu'on le pensait.

Nous avons inclus quelques-unes des modifications de l'aire de répartition les plus intéressantes faites à partir des observations du Relevé, celle du Râle jaune et du Moucherolle à côtés olive. La zone ombrée au delà du pointillé illustre la présence nouvelle de l'espèce, les points noirs sont les observations faites dans le cadre du Relevé, et le pointillé indique la limite de l'aire de répartition de l'espèce connue auparavant.

Les aires de répartition exactes sont très importantes pour les études d'impact relatives aux aires protégées ou à l'activité industrielle, les projets de planification de la conservation des oiseaux à l'échelle de l'Amérique du Nord comme les plans régionaux de conservation et l'application des lois fédérales comme la Loi *sur les espèces en péril.*

Ce troglodyte des marais mâle a été observé en 2007 à l'est de Checkpoint, T.N.-O. (Photo: Craig Machtans)

Le défi pour les ornithologues amateurs des T.N.-O.

Troglodyte des marais

Depuis le début des années 1990, l'espèce a été observée à plusieurs reprises dans le Sud des T.N.-O. Jusqu'à maintenant, la nidification s'est limitée à la réserve de parc national du Canada Nahanni (2005). En 2008, nous vous lançons le défi de trouver un nid de Troglodyte des marais contenant des œufs ou des oisillons capables de voler et d'en prendre la photo.

Temple de la renommée des ornithologues de 2007

Merci à tous ceux et celles qui nous ont envoyé leurs listes en 2007. Nous leur exprimons notre gratitude en publiant dans cet espace le nom des personnes qui nous ont transmis des données l'an dernier. Nous n'avons inscrit que les principaux observateurs.

Jason Akearok
Lindsay Armer
Aulavik Park Staff
Auyuittuq Park Staff
Patricia Baldwin
Olivier Barden
Jon Bart
Rae Braden
Valery Braden
Keith Brady
Susan & Mike Bryan
Bob Bromley
Bill Carpenter
Suzanne Carriere
Nicole Chatel
Lisa Chirrey
Sarah Dauncey
Lynne Dickson
Rian Dickson
Craig Dockrill
Kyle Elliott
Alan Fehr
Charles Francis
Alain Fontaine
Martin Gebauer
Ryan Greig
Bill Gundlach
Glen Guthrie
Siu-Ling Han
David Haogak
Hendrik Herfst
Brad Heath
Reid Hildebrandt
Jason Hudson
Sharon Irwin
Sara Jaward
Brian Johns
Vicky Johnston
Robin Johnstone
Ludovic Jolicoeur
Fred Jumbo
Andrew Keenainak
Daniel Kilabuk
Richard Knapton
Joe Kudlak
Alicia Korpach
Nicole Lights
Carmen Lishman
David Livingstone
Craig Machtans
Nancy Makpah
Mark Mallory
Aaron Marshall
Kevin Martee
Mike Matou
Laurie McGregor
Steve Moore
Rachel Munday
Rod O'Brien
Robert Odear
Damian Panayi
Richard Popko
PRISM volunteers
Jennie Rausch
Garnet Raven
Robert Reid
Lynne Rollins
Mike Rosen
Carl Savignac
Nathan Senner
Sue Shirley
Krista Sittler
Cyndi Smith
Paul Allen Smith
Wayne Starling
Doug Stern
Doug Tate
Nathan Tigullaraq
Jeff van den Scott
Lisa-Jo van den Scott
Mario Villemure
Leslie Wakelyn
Western Arctic Parks Unit
Hugh Westheuser
Dave Wilderspin
Rick Wilson
Credence Wood
Brian Zawadski
Kate Osted

Photos d'observations notables en 2007 : [À gauche] Tourterelle triste observée à Yellowknife en octobre dernier. (Photo: Reid Hildebrandt); **[à droite]** un Vacher à tête brune mâle observé dans l'île Bylot en août. Il s'agit de l'observation d'un Vacher la plus au nord jusqu'à maintenant. (Photo: Ludovic Jolicoeur)

Des questions? Des suggestions?

Relevé des oiseaux des T.N.-O/Nunavut
Service canadien de la faune
Environnement Canada
Suite 301, 5204-50th Ave
Yellowknife, T.N.-O X1A 1E2

Phone: 867-669-4773
Fax: 867-873-8185
Email: NWTChecklist@ec.gc.ca

Nos partenaires

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
Affaires indiennes et du Nord Canada
Parcs Canada

This publication also available in english.

ISSN : 1925-4253 CW70-15/2008F-PDF