



LA TUBERCULOSE AU CANADA 2010 PRÉDIFFUSION



Agence de la santé
publique du Canada

Public Health
Agency of Canada

Canada

Promouvoir et protéger la santé des Canadiens grâce au leadership, aux partenariats, à l'innovation et aux interventions en matière de santé publique.
– Agence de la santé publique du Canada

Also available in English under the title:
Tuberculosis in Canada 2010 – Pre-release

Pour obtenir une copie de ce rapport, veuillez envoyer votre demande à :
Centre de la lutte contre les maladies transmissibles et les infections
Agence de la santé publique du Canada
Pièce 2410, 100 promenade Eglantine, Immeuble Santé Canada
I.A. 0602C, Pré Tunney
Ottawa (ON) K1A 0K9
Courriel : ccdic-clmti@phac-aspc.gc.ca

Le présent rapport a été préparé par :

Victor Gallant, MA
Chris Archibald, MDCM, MScS, FRCPC
Annie-Claude Bourgeois, MSc
Kathryn Dawson, BSc
Jessica Halverson, MHP, TSH
Derek Scholten, MSc
Ania Zycki, MA

Suggestion proposée : Agence de la santé publique du Canada La tuberculose au Canada 2010 – Prédiffusion Ottawa (Canada) : ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2012

REMERCIEMENTS

Les auteurs tiennent à remercier les programmes provinciaux et territoriaux de lutte contre la tuberculose et leurs équipes d'avoir contribué et participé au Système canadien de déclaration des cas de tuberculose.

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2012

Cat.: No.HP37-5/1-2010F-PDF

INTRODUCTION

Pour faciliter la publication anticipée de La tuberculose au Canada 2010, les sept tableaux suivants ont été extraits du Système canadien de déclaration des cas de tuberculose (SCDCT) pour l'année 2010. Les données contenues dans le présent rapport préalable représentent le nombre total de cas de tuberculose active déclarés à l'Agence de la santé publique du Canada en date du 31 août 2011. Ces données devraient être considérées comme provisoires jusqu'à la publication du rapport complet La tuberculose au Canada 2010.

GRANDES LIGNES

En 2010, 1 577 nouveaux cas de tuberculose active et de retraitement ont été déclarés au SCDCT, ce qui indique un taux d'incidence de 4,6 pour 100 000 habitants. Il s'agit du taux le plus faible atteint nationalement depuis le début de la collecte des données sur la TB au Canada en 1924. Cependant, le taux d'incidence de la TB varie selon la province ou le territoire. En particulier, il y a eu un nombre de cas disproportionnellement élevé déclarés au Nunavut. En raison d'une élosion en cours au Nunavut, le territoire rapporte 101 cas de TB active pour 2010, ce qui représente presque le double de ce qui a été déclaré en 2009, engendrant ainsi un taux d'incidence déclaré de 304,0 par population de 100 000 (tableau 1).

Selon les rapports préliminaires, toutes les provinces et tous les territoires ont déclaré au moins un cas de TB active en 2010. Terre-Neuve-et-Labrador a signalé une diminution du nombre de cas déclaré, passant de 22 en 2009 à huit en 2010. Dans les provinces et les territoires restants, à l'exception du Nunavut, le nombre de cas déclaré en 2010 est stable comparativement au nombre de cas déclaré en 2009 (tableau 1).

Le plus grand nombre de cas, soit de 18 % de l'ensemble, a été signalé chez les personnes âgées de 25 à 34 ans. Toutefois, le taux d'incidence correspondant (6,0 par population de 100 000) dans ce groupe d'âge a été surpassé par le taux par âge de 9,6 pour 100 000 déclaré chez les personnes âgées de plus de 74 ans (tableau 2).

Dans les provinces et les territoires, la répartition suit généralement la tendance nationale avec le plus grand nombre de cas déclarés chez les personnes âgées de 25 à 44 ans. Il y avait cependant quelque déviation de la tendance. En Saskatchewan en 2010, près de 50 % des cas déclarés étaient chez les personnes âgées de 0 à 24 ans, alors que ce groupe d'âge constitue seulement 18 % des cas dans le reste du Canada. En Colombie-Britannique, 21 % des cas déclarés étaient chez des personnes âgées de 75 ans ou plus, alors que cette proportion était seulement de 14 % de tous les cas déclarés au Canada (tableau 3).

En 2010, les personnes nées à l'étranger représentaient 66 % de tous les cas de TB active déclarés. Les cas chez les non-Autochtones nés au Canada et chez les Autochtones nés au Canada ont

respectivement représenté 12 % et 21 % de tous les cas déclarés. En Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec, la majorité des cas déclarés était chez les personnes nées à l'étranger. Au Manitoba, en Saskatchewan et dans le Nord (ce qui comprend les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon), la majorité des cas étaient chez les Autochtones nés au Canada. Dans les provinces de l'Atlantique, le faible taux de cas déclarés était principalement séparé entre les personnes nées à l'étranger et les nonAutochtones nés au Canada; des cas ont cependant été déclarés chez les Autochtones de TerreNeuveet-Labrador (tableau 4).

En 2010, la TB pulmonaire continue à être la localisation principale la plus souvent signalée, étant responsable de 64 % de tous les cas déclarés (tableau 5). Dans toutes les provinces et tous les territoires, la majorité des cas diagnostiqués étaient pulmonaires. En Saskatchewan et dans les Territoires du Nord-Ouest, une plus grande proportion des cas diagnostiqués se rapportaient à la forme de la maladie primaire comparativement aux autres provinces ou territoires (tableau 6).

Finalement, 64 cas de primo-infection tuberculeuse ont été déclarés en 2010; 67 % de ces cas étaient chez les Autochtones nés au Canada. En outre, 89 % des 197 cas de TB des ganglions lymphatiques périphériques ont été diagnostiqués chez des personnes nées à l'étranger (tableau 7).

Tableau 1

Nouveaux cas de tuberculose active et de retraitement déclarés et taux d'incidence pour 100 000 – Canada et provinces/territoires : 2000-2010

Année du diagnostic	CANADA										Province/territoire					
	T. N.-L.	I. P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nt			
2000 Cas	1 724	10	2	3	10	318	700	98	104	133	286	3	10	47		
	Taux	5,6	1,9	1,5	0,3	1,3	4,3	6,0	8,5	10,3	4,4	7,1	9,9	24,7	170,9	
2001 Cas	1 772	19	3	8	10	261	699	115	114	116	379	0	8	40		
	Taux	5,7	3,6	2,2	0,9	1,3	3,5	5,9	10,0	11,4	3,8	9,3	0,0	19,6	142,2	
2002 Cas	1 667	9	1	9	11	288	716	98	89	128	287	0	4	27		
	Taux	5,3	1,7	0,7	1,0	1,5	3,9	5,9	8,5	8,9	4,1	7,0	0,0	9,6	93,7	
2003 Cas	1 631	7	3	6	12	257	693	127	91	110	305	1	12	7		
	Taux	5,2	1,3	2,2	0,6	1,6	3,4	5,7	10,9	9,1	3,5	7,4	3,2	28,2	23,9	
2004 Cas	1 613	7	1	8	10	219	700	144	70	109	299	4	10	32		
	Taux	5,0	1,4	0,7	0,9	1,3	2,9	5,6	12,3	7,0	3,4	7,2	12,7	23,1	107,2	
2005 Cas	1 641	9	1	7	6	255	643	114	139	146	265	3	8	45		
	Taux	5,1	1,7	0,7	0,7	0,8	3,4	5,1	9,7	14,0	4,4	6,3	9,4	18,4	148,4	
2006 Cas	1 654	12	0	10	2	228	673	134	87	131	320	3	6	48		
	Taux	5,1	2,4	0,0	1,1	0,3	3,0	5,3	11,3	8,8	3,8	7,5	9,3	13,9	155,8	
2007 Cas	1 576	7	0	7	5	229	680	103	106	112	278	3	15	31		
	Taux	4,8	1,4	0,0	0,7	0,7	3,0	5,3	8,6	10,6	3,2	6,5	9,2	34,4	99,1	
2008 Cas	1 643	8	0	4	5	240	603	141	95	167	300	8	13	59		
	Taux	4,9	1,6	0,0	0,4	0,7	3,1	4,7	11,7	9,4	4,7	6,8	24,2	29,7	186,7	
2009 Cas	1 659	22	1	8	11	196	629	156	93	176	294	4	12	57		
	Taux	4,9	4,3	0,7	0,9	1,5	2,5	4,8	12,8	9,0	4,8	6,6	11,9	27,5	177,1	
2010* Cas	1 577	8	1	10	10	208	633	132	82	134	241	6	11	101		
	Taux	4,6	1,6	0,7	1,1	1,3	2,6	4,8	10,7	7,8	3,6	5,3	17,4	25,1	304,0	

* Les cas et les taux pour 2010 sont provisoires jusqu'à la publication du rapport annuel La tuberculose au Canada 2010. Il est probable que ces chiffres changent.

Tableau 2

Nombre de nouveaux cas de tuberculose active et de traitement déclarés et taux d'incidence pour 100 000 selon le groupe d'âge – Canada : 2000-2010

Année du diagnostic	TOTAL	Groupe d'âge							Age unk.				
		<1	01-04	05-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64				
2000	Cas	1 724	17	50	44	207	316	279	208	160	204	239	0
	Taux	5,6	5,0	3,4	1,1	5,0	7,3	5,3	4,8	5,7	9,5	14,0	-
2001	Cas	1 772	11	33	70	180	325	289	207	182	219	256	0
	Taux	5,7	3,3	2,3	1,7	4,3	7,5	5,5	4,6	6,2	10,1	14,5	-
2002	Cas	1 667	11	43	45	211	314	264	202	162	199	216	0
	Taux	5,3	3,4	3,1	1,1	4,9	7,3	5,0	4,4	5,2	9,2	11,9	-
2003	Cas	1 631	7	34	41	198	332	277	207	154	178	203	0
	Taux	5,2	2,1	2,5	1,0	4,6	7,7	5,3	4,4	4,7	8,1	10,8	-
2004	Cas	1 613	6	33	45	198	324	272	198	167	177	193	0
	Taux	5,0	1,8	2,4	1,1	4,6	7,5	5,3	4,1	4,9	8,0	10,0	-
2005	Cas	1 641	10	38	71	254	279	278	212	143	168	188	0
	Taux	5,1	2,9	2,8	1,8	5,8	6,4	5,4	4,3	4,0	7,5	9,5	-
2006	Cas	1 654	10	46	51	261	253	287	201	158	168	219	0
	Taux	5,1	2,9	3,3	1,3	5,8	5,8	5,7	4,0	4,3	7,4	10,7	-
2007	Cas	1 576	12	33	53	200	254	285	209	160	152	218	0
	Taux	4,8	3,3	2,4	1,4	4,4	5,7	5,7	4,0	4,2	6,5	10,4	-
2008	Cas	1 643	8	30	52	205	297	279	232	165	172	203	0
	Taux	4,9	2,2	2,1	1,4	4,5	6,6	5,7	4,4	4,2	7,2	9,4	-
2009	Cas	1 659	11	33	46	232	297	295	235	177	142	191	0
	Taux	4,9	2,9	2,3	1,2	5,1	6,4	6,2	4,4	4,3	5,7	8,7	-
2010*	Cas	1 577	9	29	39	200	284	268	210	175	147	216	0
	Taux	4,6	2,4	1,9	1,0	4,4	6,0	5,7	3,9	4,1	5,7	9,6	-

* Les cas et les taux pour 2010 sont provisoires jusqu'à la publication du rapport annuel La tuberculose au Canada 2010. Il est probable que ces chiffres changent.

Tableau 3

Nombre de nouveaux cas de tuberculose active et de retraitement déclarés et taux d'incidence pour 100 000 selon le groupe d'âge – Canada et provinces/territoires : 2010

Groupe d'âge	CANADA						Province/territoire							
	Cas	9	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.	Nt
<1	Taux	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	7
	Cas	29	0	0	0	0	6	2	4	12	1	0	0	4
01-04	Taux	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,4	6,5	22,1	0,5	0,0	0,0	140,8
	Cas	39	0	0	0	0	3	8	11	8	4	3	0	2
05-14	Taux	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	7,1	6,2	0,9	0,6	0,0	29,3
	Cas	200	0	0	1	1	24	74	17	19	18	15	0	3
15-24	Taux	4,4	0,0	0,0	0,8	1,1	2,4	4,1	9,5	12,5	3,4	2,5	0,0	41,0
	Cas	284	2	0	2	2	38	112	23	13	26	39	0	25
25-34	Taux	6,0	3,4	0,0	1,8	2,2	3,5	6,3	14,0	9,2	4,3	6,3	0,0	439,6
	Cas	268	1	1	1	2	34	114	30	9	31	27	1	15
35-44	Taux	5,7	1,4	5,4	0,8	2,0	3,2	6,0	18,9	7,2	5,7	4,3	19,0	336,9
	Cas	210	1	0	2	1	30	93	16	8	15	34	3	7
45-54	Taux	3,9	1,2	0,0	1,3	0,8	2,3	4,4	8,7	5,2	2,6	4,7	47,4	197,0
	Cas	175	1	0	0	2	27	69	11	4	12	39	1	7
55-64	Taux	4,1	1,3	0,0	0,0	1,8	2,6	4,3	7,5	3,3	3,0	6,6	21,0	342,5
	Cas	147	2	0	0	1	20	61	10	5	11	30	1	5
65-74	Taux	5,7	4,4	0,0	0,0	1,5	3,0	6,3	11,6	6,7	5,1	8,3	49,7	672,0
	Cas	216	1	0	4	1	26	100	10	4	16	52	0	1
75+	Taux	9,6	3,1	0,0	5,9	1,8	4,7	11,6	11,8	5,1	8,8	16,4	0,0	111,7
	Cas	1 577	8	1	10	10	208	633	132	82	134	241	6	101
Total*	Taux	4,6	1,6	0,7	1,1	1,3	2,6	4,8	10,7	7,8	3,6	5,3	17,4	304,0

* Les cas et les taux pour 2010 sont provisoires jusqu'à la publication du rapport annuel La tuberculose au Canada 2010. Il est probable que ces chiffres changent.

Tableau 4

Nouveaux cas de tuberculose active et cas de retraitement déclarés selon l'origine – Canada et provinces/territoires : 2010

Origine	CANADA							Province/territoire					
		T.-N.-L.	I.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Nord	
Amérindiens	Cas	188	0	0	0	0	3	6	75	52	11	25	16
	Taux	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	3,3	60,9	44,4	9,2	16,5	69,4
Indiens inscrits	Cas	184	0	0,0	0,0	0,0	3	5	75	52	9	24	16
	Taux	21,8	-	-	-	-	4,0	2,7	53,4	37,5	8,0	18,1	59,4
Indiens (inscrits) vivant dans une réserve	Cas	106	0	0,0	0,0	0,0	0	2	52	34	6	12	0
	Taux	21,5	-	-	-	-	0,0	2,1	58,3	46,7	8,1	17,4	0,0
Indiens (inscrits) vivant hors réserve	Cas	72	0	0,0	0,0	0,0	0	0	23	18	3	12	16
	Taux	20,4	-	-	-	-	0,0	0,0	45,0	27,4	7,8	18,9	154,3
Inconnu	Cas	6	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
	Taux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indiens non inscrits	Cas	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1
	Taux	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inuits	Cas	116	3	0	0	0	12	2	0	0	0	0	99
	Taux	198,6	56,2	0,0	0,0	0,0	98,8	104,1	0,0	0,0	0,0	0,0	281,3
Métis	Cas	26	1	0	0	0	0	0	1	18	4	2	0
	Taux	7,5	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	34,1	4,9	4,0	0,0
Total des Autochtones	Cas	330	4	0	0	0	15	8	76	70	15	27	115
	Taux	26,4	16,7	0,0	0,0	0,0	13,5	3,3	39,8	41,1	7,4	13,4	181,0
Non-Autochtones	Cas	183	2	0	5	5	50	52	13	5	10	39	2
	Taux	0,7	0,4	0,0	0,6	0,7	0,7	0,6	1,6	0,6	0,4	1,3	5,1
Total des personnes nées au Canada	Cas	513	6	0	5	5	65	60	89	75	25	66	117
Afrique, prévalence du VIH élevée	Cas	90	0	0	1	1	18	41	5	1	19	4	0
	Taux	37,4	0,0	0,0	55,2	72,3	46,1	35,1	58,0	24,3	56,5	11,8	0,0

Tableau 4 cont'd

Origine	CANADA	Province/territoire										
		T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Nord
Afrique, prévalence du VTH faible	Cas	28	0	0	0	1	10	9	3	0	5	0
	Taux	21,5	0,0	0,0	0,0	137,7	13,7	22,2	106,4	0,0	70,9	0,0
Région des Amériques - pays de l'Amérique latine et des Antilles	Cas	64	0	0	0	0	25	33	0	0	2	4
	Taux	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	6,2	0,0	0,0	3,0	6,7
Économies de marché établies et Europe centrale	Cas	51	0	0	1	0	14	27	0	0	4	5
	Taux	1,9	0,0	0,0	2,7	0,0	4,1	1,9	0,0	0,0	1,5	1,0
Europe orientale	Cas	18	0	0	0	1	5	10	0	0	1	1
	Taux	4,9	0,0	0,0	0,0	97,8	6,4	5,0	0,0	0,0	3,5	2,7
Méditerranée orientale	Cas	90	0	0	2	0	14	58	2	1	11	2
	Taux	11,8	0,0	0,0	22,7	0,0	7,9	13,4	22,4	20,1	17,8	3,2
Asie du Sud-Est	Cas	249	1	0	0	0	14	154	5	1	20	54
	Taux	30,3	83,2	0,0	0,0	0,0	29,8	30,1	34,9	22,0	28,6	32,0
Pacifique occidental	Cas	429	1	1	1	2	33	221	18	4	46	101
	Taux	22,8	42,2	24,1	12,0	28,7	24,5	25,8	29,8	20,3	21,4	17,7
Région inconnue	Cas	19	0	0	0	0	2	4	10	0	1	2
Total des personnes nées à l'étranger	Cas	1 038	2	1	5	5	135	557	43	7	109	173
Lieu de naissance inconnu	Cas	26	0	0	0	0	8	16	0	0	0	2
Total	Cas	1 577	8	1	10	10	208	633	132	82	134	241
	Taux	4,6	1,6	0,7	1,1	1,3	2,6	4,8	10,7	7,8	3,6	5,3
												118
												105,8

NOTA : Si le dénominateur pour la population PT dans la cellule est inférieur à 40, les données provinciales/territoriales sont supprimées et présentées sous forme agrégée. Pour les provinces de l'Atlantique (Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-Ét-Édouard), les données de population pour le statut des Indiens inscrits dans la réserve et horsréserve ne sont disponibles qu'en forme agrégée. Les taux indiqués pour ces groupes représentent toute la région de l'Atlantique.

* Les cas et les taux pour 2010 sont provisoires jusqu'à la publication annuelle La tuberculose au Canada 2010. Il est probable que ces chiffres changent.

Tableau 5

Nouveaux cas de tuberculose active et de retraitement déclarés et taux d'incidence pour 100 000 selon la localisation principale – Canada : 2000-2010

Localisation principale	Primo-infection*	Année du diagnostic									2010**
		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
Respiratoire	Cas	99	121	88	79	94	106	91	64	59	62
	Taux	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Pulmonaire†	Cas	1 085	1 145	1 038	974	948	972	1 079	1 023	1 121	1 108
	Taux	3,5	3,7	3,3	3,1	3,0	3,0	3,3	3,1	3,4	3,3
Autres formes respiratoires‡	Cas	63	51	55	64	97	115	92	97	84	103
	Taux	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	1 016
Miliaire	Cas	13	7	12	17	20	18	19	16	28	21
	Taux	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
SNC	Cas	16	17	20	26	19	20	18	22	12	14
	Taux	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1
Non respiratoire	Ganglions lymphatiques périphériques	258	234	240	249	251	245	210	205	183	209
	Taux	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,6	0,5	0,6
Autres§	Cas	161	163	180	170	181	165	144	149	156	142
	Taux	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5	0,4	0,5	0,5	150
Inconnue	Cas	29	34	34	52	3	0	1	0	0	0
	Taux	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL		1 724	1 772	1 667	1 631	1 641	1 654	1 576	1 643	1 659	1 577
	Taux	5,6	5,7	5,3	5,2	5,0	5,1	4,8	4,9	4,9	4,6

* La primo-infection tuberculeuse inclut la primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire et la pleurésie tuberculeuse de la primo-infection progressive (codes 010,0-010,9 de la CIM-9; A15,7 et A16,7 de la CIM-10).

† La tuberculose pulmonaire englobe la tuberculose du poumon et des voies aériennes de conduction, qui comprend la fibrose tuberculeuse du poumon, la bronchectasie tuberculeuse, la pneumonie tuberculeuse, le pneumothorax tuberculeux, la tuberculose trachéale ou bronchique isolée et la laryngite tuberculeuse (codes 011-011,9, 012,2, 012,3 de la CIM-9; codes A15,0-A15,3, A15,5, A15,9, A16,0-A16,2, A16,4, A16,9 de la CIM-10). Sont inclus dans les cas de tuberculose pulmonaire les cas, sans égard à la désignation de la localisation dans la CIM (sauf pour le diagnostic primaire) pour lesquels les résultats des frotts et des cultures (effectués à partir des expectorations, du liquide de lavage bronchique et du liquide de lavage gastrique) sont positifs,

‡ Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire : pleurésie tuberculeuse (non primaire), tuberculose des ganglions lymphatiques endothoraciques, du médiastin, du rhinopharynx, du nez (cloison) et des sinus de la face (codes 012,0, 012,1 et 012,8 de la CIM-9; codes A15,4, A15,6, A15,8, A16,3, A16,5, A16,8 de la CIM-10).

§ Autres : tuberculose de l'intestin, du péritoine et des articulations, des os et des articulations, des ganglions mésentériques, de l'appareil génito-urinaire, de la peau, de l'œil, de l'oreille, du corps thyroïde, de la glande surrenale et de la rate.

** Les cas et les taux pour 2010 sont provisoires jusqu'à la publication du rapport annuel La tuberculose au Canada 2010. Il est probable que ces chiffres changent.

Tableau 6

Nouveaux cas de tuberculose active et de retraitement déclarés et taux d'incidence pour 100 000 selon la localisation principale – Canada et provinces/territoires : 2010

Localisation	CANADA							Province/territoire						
	T.-N.-L.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	Qc	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.-N.-O.	Nt	
Primo-infection*	Cas	64	0	0	1	2	9	8	18	5	3	0	4	12
	Taux	0,2	0,0	0,0	0,1	0,3	0,0	0,1	0,6	1,7	0,1	0,0	9,1	36,1
Pulmonaire	Cas	1 016	7	0	4	6	144	392	85	48	74	172	6	4
	Taux	3,0	1,4	0,0	0,4	0,8	1,8	3,0	6,9	4,6	2,0	3,8	17,4	222,8
Autres formes respiratoires	Cas	108	0	1	0	13	41	9	8	12	12	0	0	11
	Taux	0,3	0,0	0,7	0,1	0,0	0,2	0,3	0,7	0,8	0,3	0,3	0,0	33,1
Miliaire	Cas	19	0	0	1	0	4	6	5	0	1	1	0	0
	Taux	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0
SNC	Cas	23	0	0	0	0	4	12	1	1	0	3	0	1
	Taux	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	2,3	3,0
Ganglions lymphatiques périphériques	Cas	197	0	0	1	1	19	97	13	6	26	34	0	0
	Taux	0,6	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,7	1,1	0,6	0,7	0,8	0,0	0,0
Autres	Cas	150	1	0	2	1	22	76	11	1	16	16	0	1
	Taux	0,4	0,2	0,0	0,2	0,1	0,3	0,6	0,9	0,1	0,4	0,4	0,0	3
Inconnue	Cas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Taux	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total**	Cas	1 577	8	1	10	10	208	633	132	82	134	241	6	11
	Taux	4,6	1,6	0,7	1,1	1,3	2,6	4,8	10,7	7,8	3,6	5,3	17,4	25,1
														304,0

* La primo-infection tuberculeuse inclut la primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire et la pleurésie tuberculeuse de la primo-infection progressive (codes 010,0-010,9 de la CIM-9; A15,7 et A16,7 de la CIM-10).

† La tuberculose pulmonaire englobe la tuberculose du poumon et des voies aériennes de conduction, qui comprend la fibrose tuberculeuse du poumon, la bronchectasie tuberculeuse, la pneumonie tuberculeuse, le pneumothorax tuberculeux, la tuberculose trachéale ou bronchique isolée et la laryngite tuberculeuse (codes 011-011,9, 012,2, 012,3 de la CIM-9; codes A15,0-A15,3, A15,5, A15,9, A16,0-A16,2, A16,4, A16,9 de la CIM-10). Sont inclus dans les cas de tuberculose pulmonaire les cas, sans égard à la désignation de la localisation dans la CIM (sauf pour le diagnostic primaire) pour lesquels les résultats des frottis et des cultures (effectués à partir des expectorations, du liquide de lavage bronchique et du liquide de lavage gastrique) sont positifs.

‡ Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire : pleurésie tuberculeuse (non primaire), tuberculose des ganglions lymphatiques endothoraciques, du médiastin, du rhinopharynx, du nez (cloison) et des sinus de la face (codes 012,0, 012,1 et 012,8 de la CIM-9; codes A15,4, A15,6, A15,8, A16,3, A16,5, A16,8 de la CIM-10).

§ Autres : tuberculose de l'intestin, du péritone et des ganglions mésentériques, des os et des articulations, de l'appareil génito-urinaire, de la peau, de l'œil, de l'oreille, du corps thyroïde, de la glande surénale et de la rate.

** Les cas et les taux pour 2010 sont provisoires jusqu'à la publication du rapport annuel La tuberculose au Canada 2010. Il est probable que ces chiffres changent.

Tableau 7

Nouveaux cas de tuberculose active et de retraitement signalés selon l'origine et la localisation principale – Canada : 2010

Origine	Total	Respiratoire				Localisation principale				Non respiratoire		
		Primo-infection*	Pulmonaire†	Autres formes respiratoires‡	Miliaire	SNC	Ganglions lymphatiques périphériques	Autres§	Inconnue			
Amérindiens	188	26	117	17	4	2	8	14	0			
Indiens (inscrits)	184	26	114	17	4	2	8	13	0			
Indiens (inscrits) vivant dans une réserve	106	19	62	12	1	0	7	5	0			
Indiens (inscrits) vivant hors réserve	72	7	47	5	3	1	1	8	0			
Inconnu	6	0	5	0	0	1	0	0	0			
Personnes nées au Canada												
Indiens non inscrits	4	0	3	0	0	0	0	1	0			
Inuits	116	13	86	12	1	1	0	3	0			
Métis	26	4	18	1	0	1	0	2	0			
Total des Autochtones	330	43	221	30	5	4	8	19	0			
NonAutochtones	183	12	125	13	5	2	10	16	0			
Total	513	55	346	43	10	6	18	35	0			

Tableau 7 cont'd

Origine	Total	Localisation principale						
		Primo-infection*	Pulmonaire†	Autres formes respiratoires‡	Miliaire	SNC	Ganglions lymphatiques périphériques	Autres§
Afrique, prévalence du VIH élevée	90	1	54	4	0	3	19	9
Afrique, prévalence du VIH faible	28	0	19	1	0	1	4	3
Région des Amériques – pays de l'Amérique latine et des Antilles	64	1	42	5	0	1	10	5
Europe orientale	18	0	14	1	1	0	1	1
Économies de marché établies et Europe centrale	51	0	38	10	1	0	1	1
Méditerranée orientale	90	1	50	6	1	0	17	15
Asie du SudEst	249	1	155	17	1	5	44	26
Pacifique occidental	429	5	271	18	4	7	76	48
Région inconnue	19	0	12	2	0	0	3	2
Total	1 038	9	655	64	8	17	175	110
Lieu de naissance inconnu	26	0	15	1	1	0	4	5
TOTAL **	1 577	64	1 016	108	19	23	197	150

† La tuberculose pulmonaire englobe la tuberculose du poumon et des voies aériennes de conduktion, qui comprend la fibrose tuberculeuse du poumon, la bronchectasie tuberculeuse, la pneumonie tuberculeuse, le pneumothorax tuberculeux, la tuberculose trachéale ou bronchique isolée et la laryngite tuberculeuse (codes 011-011.9, 012.2, 012.3 de la CIM-9; codes A15,0A15,3, A15,5, A15,9, A16,0-A16,2, A16,4, A16,9 de la CIM-10). Sont inclus dans les cas de tuberculose pulmonaire les cas, sans regard à la désignation de la localisation dans la CIM (sauf pour le diagnostic primaire) pour lesquels les résultats des frottis et des cultures (effectués à partir des expectorations, du liquide de lavage bronchique et du liquide de lavage gastrique) sont positifs.

‡ Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire : pleurésie tuberculeuse (non primaire), tuberculose des ganglions lymphatiques endothoraciques, du médiastin, du rhinopharynx, du nez (cloison) et des sinus de la face (codes 012.0, 012.1 et 012.8 de la CIM-9; codes A15,4, A15,6, A15,8, A16,3, A16,5, A16,8 de la CIM-10).

§ Autres : tuberculose de l'intestin, du péritone et des articulations, de l'appareil génito-urinaire, de la peau, de l'œil, de l'oreille, du corps thyroïde, de la glande surrénale et de la rate.

** Les cas et les taux pour 2010 sont provisoires jusqu'à la publication du rapport annuel. La tuberculose au Canada 2010. Il est probable que ces chiffres changent.