Environnement Canada | Environment Canada
Environnement atmosphérique | Atmospheric Environment

UNE REVUE HEBDOMADAIRE DU CLIMAT AU CANADA

PERSPECTIVES CLIMATIQUES

LE CENTRE CLIMATOLOGIQUE CANADIEN,
SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT ATMOSPHERIQUE,
4905 DUFFERIN ST., DOWNSVIEW, ONTARIO M3H 5T4

1 JUIN 1979 VOL. 1 NO. 16



Déviation de la température moyenne (°C)
par rapport à la normale de 1941-70
du 22 au 28 mai 1979
Surfaces ombrées – au-dessus de la normale

S.E.A.

FAITS SAILLANTS DU TEMPS POUR LA SEMAINE DU 22 AU 28 MAI 1979

Chaud et sec dans les Prairies mais des pluies torrentielles dans l'Est canadien

Une crête de haute pression a assuré du temps sec et des températures supérieures à la normale dans tout l'Ouest canadien, exception faite cependant de la partie nord de la région côtière de la Colombie-Britannique où les précipitations ont été plus abondantes. Les moyennes de températures de la semaine ont surpassé la normale par 8°C dans le nord des Prairies.

Un creux barométrique dans les couches supérieures de la troposphère a donné du temps froid et très humide dans l'est du Canada. Les précipitations ont été très abondantes dans le sud du Québec et de l'Ontario et aux Maritimes.

A de rares exceptions près, l'ensemble du Canada a bénéficié de condition idéales le jour des élections, le 22 mai, et ceci a favorisé une très forte participation au vote.

NOTA: Les données contenues dans cette revue sont extraites des rapports non contrôlés qui nous parviennent d'environ 170 stations d'observations synoptiques de surface du Service de l'Environnement atmosphérique.

YUKON

Le Yukon a connu des températures qui, en moyenne, se sont maintenues à moins 1°C de la normale. Les moyennes de température de la semaine ont varié de 8.7°C à Watson Lake à 10°C à Dawson et à Mayo. Watson Lake a enregistré un minimum de -1°C les 22 et 25 mai; le mercure marquait aussi -1°C à Dawson le 26 mai il est monté à 25°C le lendemain.



N.B.: Les valeurs perdent leur representativité dans les régions accidentées telles que les Rocheuses.

L'air chargée d'humidité du Pacifique a donné des précipitations un peu plus abondantes dans le sud du Yukon cette semaine; il est tombé 10.3 mm le 26 mai à Watson Lake, ce qui a donné un total de 15.7 mm pour la semaine. Les accumulations de la semaine n'ont toutefois pas dépassé 5 mm dans le Nord.

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Les températures se sont généralement maintenues au-dessus de la normale cette semaine sur la section continentale des Territoires du Nord-Ouest tandis que l'Archipel arctique subissait des moyennes de température qui se maintenaient bien au-dessous de la normale. Les anomalies de la semaine ont varié de 1°C à 3°C dans le district du Mackenzie et de 3°C à 6°C dans le district du Keewatin. Fort Smith a bénéficié de la plus haute température de la semaine le 24°C alors que le mercure est monté jusqu'à 24°C, ce qui a contribué à produire la plus haute moyenne de la semaine dans les Territoires, soit 13.1°C. Le point le plus froid du pays cette semaine demeure Eureka où le mercure est descendu jusqu'à -17°C le 23, abaissant ainsi la moyenne de la semaine à -12.8°C, soit 7.5°C sous la normale.

Les précipitations ont généralement été plus abondantes que la normale dans le district du Keewatin et dans la partie sud du district du Mackenzie. La plupart des stations ont reçu de 15 mm à 30 mm; il est tombé 31.4 mm de précipitation le 27 mai à Hay River, ce qui a porté le total de la semaine à 35.6 mm. La partie centrale de la région du fleuve Mackenzie et la plus

grande partie de l'Archipel arctique ont connu du temps plutôt sec; la plupart des stations ont enregistré moins de 5 mm de précipitation. Le 28 mai, on mesurait encore 148 cm de neige au sol à Cape Dyer et 94 cm à Clyde; ces deux stations sont situées sur la côte est de la Terre de Baffin.

de la semaine. Le mercure s'est hissé jusqu'à 31°C le 22 mai à Lytton, portant ainsi la moyenne de la semaine à 16.6°C à cet endroit. Le maximum de 22°C à Fort Nelson le 25 mai a éclipsé l'ancien record de 21°C établi en 1961. Le mercure est descendu jusqu'à -1°C à Williams Lake dans la nuit du 28.



Epaisseur de la neige au sol (cm.)
le 28 mai 1979
TR–trace

S.E.A.

Dans l'Arctique, les glaces semblent plus épaisses cette année. Elles ont néanmoins déjà commencer à s'entrouvrir dans la mer de Beaufort où les étendues d'eaux sans glace sont plus importantes que d'habitude. Les glaces ont aussi commencer de se retirer de la rive est de la baie d'Hudson; la débâcle y suit cependant son cours normal. Les conditions sont plus favorables dans les détroits d'Hudson et de Davis où la débâcle devance quelque peu la normale.

COLOMBIE-BRITANNIQUE

La majeure partie de la province a connu des températures dont la moyenne de la semaine s'est maintenue en deçà de 1°C de la normale mais Cranbrook a cependant joui d'une température moyenne dépassant par 2.7°C la normale

La partie nord de la province a subi un temps généralement humide cette semaine. Il est tombé plus de 100 mm de précipitation sur la partie nord de la région côtière et plus de 50 mm dans la région de la Rivière de la Paix. Prince Rupert a enregistré 56.8 mm durant la seule journée du 25 et les accumulations de la semaine y ont atteint 120 mm. Le sud de la province a profité d'un temps plus sec et les accumulations de la semaine sont demeurées inférieures à 10 mm à la plupart des stations.

Les accumulations des degrés-jours de croissance surpassent la normale dans toute la province et atteignent plus de 4 fois la normale dans la vallée du Fraser inférieur.

ALBERTA

La première partie de la semaine a été marquée par du temps chaud en Alberta mais le froid est revenu à la toute fin de la semaine. Les moyennes de températures se sont néanmoins maintenues entre 0°C et 4°C au-dessus de la normale. La moyenne de la semaine a atteint 17.2°C à Medecine Hat mais Banff, dans les rocheuses, a dû se contenter d'une moyenne de 11.0°C. Le mercure a atteint 30°C à Lethbridge et à Medecine Hat le 26 mai. Un nouveau maximum record a été établi à Rocky Mountain House lorsque le mercure est monté jusqu'à 27°C le 23 mai.

Les précipitations ont été faibles dans le sud de la province; la plupart des stations ont récolté moins de 5 mm. Le nord de l'Alberta a reçu des quantités de précipitatons de l'ordre de 10 mm. Quelques stations forestières ont rapporté des chutes de neige de 15 cm à 31 cm le 28 mai.

Il a gelé à Banff, à Edson et à Red Deer alors que le mercure y est descendu à -2°C durant la semaine et jusqu'à -4°C à certaines autres stations dans la régions des Avants-Monts. A ce moment-ci, l'effet destructeur qu'a pu avoir ce gel sur les semences n'est pas encore connu.

Les travaux aratoires se poursuivent dans la plupart des régions agricoles à l'exception de celle de la rivière de la Paix où le mauvais temps a retardé les travaux dans les champs. Les accumulations des degrés-jours de croissance demeurent encore bien au-dessous de la normale dans l'ensemble de la province cette semaine.

MANITOBA - SASKATCHEWAN

Les températures se maintiennent au-dessus de la moyenne dans les Prairies. Les moyennes des anomalies ont varié de 2°C dans le sud de la Saskatchewan à 8°C dans le nord des deux provinces mais les températures moyennes du sud du Manitoba sont demeurées normales. Saskatoon a connu une moyenne hebdomadaire de 16.6°C tandis que Churchill obtenait une moyenne de 6.9°C. Le mercure est monté à 29°C à Kindersley, Prince Albert et Wynyard durant la fin de semaine tandis que Brandon et Portage la Prairie enregistraient un maximum de 28°C le 28 mai. Le mercure est descendu à -4°C au début de la semaine à Churchill et à Thompson.

Les précipitations ont été faibles dans l'ensemble des deux provinces; la plupart des stations ont enregistré moins de 5 mm sauf dans le sud du Manitoba où les accumulations ont atteint 10 mm. Portage la Prairie a récolté 15.8 mm.

Exception faite du nord de la Saskatchewan, les accumulations des degrés-jours de croissance demeurent bien en-dessous de la normale pour ce temps-ci de l'année. Le temps plutôt sec a permis un assèchement jugé satisfaisant des terres à culture.

ONTARIO

Le régime de température sur l'Ontario s'est renversé cette semaine. Les moyennes de la semaine sont remontées au-dessus de la normale dans le nord de la province tandis qu'elles glissaient sous la normale dans le Sud, atteignant même 5°C sous la normale dans la région de Windsor. La moyenne de température est passée à 13.7°C à Kenora tandis qu'elle descendait jusqu'à 6.7°C à Moosonee. Le mercure a atteint 26°C le 28 mai à Kenora et à Red Lake mais il retraitait jusqu'à -5°C à Armstrong et à Moosonee les 24 et 25 mai respectivement.

Le temps a été passablement humide dans le Sud ontarien cette semaine. Plusieurs stations ont reçu entre 25 mm et 50 mm de précipitations; il est tombé 61.4 mm de pluie à Windsor dont 33.3 mm durant la journée du 25 mai. En contrepartie, le nord-ouest de la province a bénéficié d'un temps passablement sec; la plupart des stations ont rapporté des accumulations de moins de 3 mm.

Les accumulations de degrés-jours de croissance suivent la normale jusqu'ici dans la majeure partie de la province, exception faite du Nord-Ouest ontarien où elles sont plus faibles. Les pluies fort abondantes tombées dans le sud de la province ont apporté un nouveau retard à l'agriculture, plus particulièrement dans les comtés de Kent et d'Essex qui avaient été inondés plutôt ce printemps.

QUÉBEC

L'arrivée d'une crête barométrique au début de la semaine a permis de chasser le temps maussade qui avait prédominé durant la fin de la semaine précédente. L'accalmie ne fut que de courte de durée dans le sud de la province mais elle s'est poursuivie un peu plus longtemps dans les autres régions. La température la plus élevée dans la province n'a été que de 21°C, ce qui s'est produit à Gaspé les 22 et 23 mai et à Sherbrooke le 23. La moyenne de température pour la semaine est donc descendue jusqu'à 2.5°C sous la normale dans le sud de la province mais elle s'est maintenue au-dessus de la normale dans toutes les autres régions, la dépassant par 4°C à Gaspé. Sept-Iles a bénéficié de plus de 60 heures d'ensoleillement au cours de la semaine.

Un système dépressionnaire progressant lentement du sud au nord et au nord-est, a couvert le Québec durant la seconde moitié de la semaine. Les précipitations ont été abondantes dans toutes les régions. Dans le sud, il a plu durant au moins quatre jours au cours de la semaine; les accumulations de la semaine ont atteint 63.7 mm à Sherbrooke où il est tombé 42 mm durant la seule journée du 25 mai et plusieurs autres stations ont reçu plus de 40 mm de pluie.

Le sud de la province a été balayé par des vents forts et soutenus durant la journée du 25 mai. Montréal et Québec ont souffert de pannes d'électricité. Les vents moyens pour la journée ont soufflé à 39 km/h à Québec et à 40.6 km/h à Montréal tandis que les rafales y atteignaient respectivement 78 km/h et 59 km/h.

PROVINCES DE L'ATLANTIQUE

Bien que les températures se soient affaiblies légèrement, les moyennes de la semaine sont néanmoins demeurés en haut de la normale dans la majeure partie des Maritimes. Les anomalies moyennes ont atteint 4.0°C à Terre-Neuve. Yarmouth (Nouvelle-Ecosse) a bénéficié d'une moyenne de 13.1°C pour la semaine, la moyenne la plus élevée de la région de l'Atlantique. Les maxima ont dépassé 20°C à plusieurs stations et le mercure a atteint 24°C le 22 mai à Sydney en Nouvelle-Ecosse tandis que le maximum de 22.3°C obtenu ce jour-là à Gander (Terre-Neuve) améliorait d'un dixième de degré l'ancien record. Cartwright et Wabush Lake, tous deux situés au Labrador, ont subi un minimum de -3°C durant la fin de semaine.

Les précipitations ont été très abondantes dans les Maritimes cette semaine. Plusieurs stations ont récolté entre 50 mm et 100 mm de pluie. Il est tombé 97.5 mm en deux jours à St-Jean au Nouveau-Brunswick, soient les 25 et 26 mai, portant ainsi le total de la semaine à 131.4 mm; jusqu'ici, les accumulations du mois totalisent 252.5 mm à cet endroit, ce qui égale le record de mai et il reste encore 3 jours avant la fin du mois. Le Labrador et Terre-Neuve ont connu un temps plus sec cette semaine alors que la plupart des stations ont rapporté des quantités de précipitations de moins de 10 mm.

Les pluies torrentielles de la semaine ont remis à plus tard la mise en terre des semences en Nouvelle-Ecosse; il n'y a qu'un faible pourcentage de l'ensemencement qui a pu être complété dans le nord de la province. Les pluies diluviennes ne que semblent pas avoir miner le succès du 47ième festival annuel de la floraison des pommiers de la vallée d'Annapolis en Nouvelle-Ecosse même si les gens sont venus en plus petit nombre que par les années passées.

PERSPECTIVES CLIMATIQUES

Personnel

Rédacteur en chef:	Terry Allsopp
Rédacteur adjoint:	Yves Durocher
Personnel technique:	Fred Richardson, Andy Radomski
Graphiques et mise en page:	Debra Bittle, Bill Johnson
Composition des caractères:	Myra D'Gabriel

Correspondants

Terry Mullane, (Centre de prévision des glaces)
Norm Penny, (Région du Pacifique)
Bill Prusak, (Région de l'Ouest)
Fred Luciow, (Région du Centre)
Bryan Smith, (Région de l'Ontario)
Jacques Miron, (Région du Québec)
J.F. Amirault, (Région de l'Atlantique)

Information - Téléphone (416) 667-4711/4956

PRÉVISION DE 15 JOURS DES ANOMALIES DE TEMPÉRATURE



Prévision des anomalies de la température
pour les 15 jours commençant le 30 mai 1979

Légende

++	bien au-dessus de la normale		
+	au-dessus de la normale	−	au-dessous de la normale
N	normale	−−	bien au-dessous de la normale

C.M.C./ S.E.A.

Technique de prévision

La prévision se fonde sur la méthode des analogues basée sur les prévisions ponctuelles pour 70 stations canadiennes.

Echelle de température

A chacun des points et pour différents moments de l'année, toutes les observations passées des moyennes de 15 jours ont été classifiées en 5 groupes contenant chacun 20% de ces observations.

Stations	Prévision actuelle des anomalies de température (ΔT)	
Dawson	Bien au-dessous de la normale	($\Delta T < -1.4°C$)
Frobisher	Au-dessous de la normale	($-1.6°C < \Delta T < -0.5°C$)
Trenton	Au-dessus de la normale	($0.4°C < \Delta T < 1.5°C$)
Vancouver	Au-dessous de la normale	($-1.2°C < \Delta T < -0.4°C$)

N.B. On entend par "anomalie" un écart à la moyenne de 1949-1973.



Degrés-jours de croissance
accumulés cette saison jusqu'au 26 mai 1979
* la saison de croissance n'est pas commencée

S.E.A.

HISTORIQUE

En 1948, les régions du Fraser inférieur en Colombie-Britannique ont été inondées durant une période allant de la fin de mai à la mi-juin. Le printemps n'avait pas été marqué par une surdose d'humidité mais, durant la période de novembre à février, les précipitations ont été si abondantes que le sol fut saturé au moment du gel; la couverture nivale cet hiver-là fut plus forte que d'habitude. Quesnel a recu 67.3 mm de précipitation en novembre, soit 155% de la normale du mois et 81.0 mm en février, ce qui represente cette fois 239% de la normale. A Abbotsford, il est tombé 241.8 mm en novembre et 228 mm en février, soient respectivement 130% et 149% de la normale. Le réchauffement soudain de la température en mai a alors provoqué un ruissellement excessif; plus de 55,000 acres ont été inondés et 2,000 résidences ont été endommagées.



Moyenne de 7 jours de la hauteur de la surface isobarique de 50 kPa (500 mb) du 21 au 27 mai 1979

Terminologie des changements climatiques

Nous commencerons dans un prochain numéro une série d'articles portant sur les changements climatiques et les modèles simulant le climat. Afin de faciliter la compréhension de certains termes qui seront fréquemment utilisés, une définition graphique accompagne ici leur définition tirée de la Note Technique no. 79 (OMM #195, T.P.100) de l'OMM intitulée "Changements climatiques". Il est à noter que les fluctuations climatiques sont généralement beaucoup plus complexes que les graphiques très simplistes peuvent laisser entrevoir. Voici donc la définition de six termes couramment utilisé lors des discussions ayant rapport aux changements climatiques.

Discontinuité climatique::= un changement climatique qui consiste en un changement plutôt abrupte et permanent d'une valeur moyenne à une autre durant la période des relevés.



DISCONTINUITÉ

oscillation climatique::= une fluctuation par laquelle une variable tend à varier graduellement et doucement entre les maxima et les minima successifs(pour opposition à vacillation).



OSCILLATION

tendance climatique::= un changement climatique caractérisé par une croissance ou une décroissance lisse et monotonique de la valeur moyenne durant la période des relevés.



TENDANCE

Cette définition n'est pas restreinte à une variation linéaire avec le temps mais est plutôt caractérisée par un seul maximum et un seul minimum aux extrémités de la courbe.

vacillation climatique::= une fluctuation par laquelle une variable tend à demeurer alternativement autour de deux (ou plusieurs) valeurs moyennes et à glisser d'une valeur moyenne à l'autre à intervalles réguliers ou irréguliers (par opposition à oscillation).

VACILLATION

persistance::= une fluctuation caracterisée par une absence de variation de la valeur moyenne durant la période des relevés.



PERSISTANCE

apériodique::= un changement climatique non suivi par un changement correspondant inverse d'amplitude semblable durant la période des relevés.



APÉRIODIQUE

A Noter

La NOAA du gouvernement américain mettra bientôt en service une nouvelle bouée météorologique sur le lac Supérieur, à 70 kilomètres au nord de Pointe Keeweenaw. Elle enregistrera la vélocité du vent, la pression atmosphérique, les températures de l'air et de la surface de l'eau et la hauteur des vagues. Ces observations seront transmises au bureau météorologique de Toronto.

DONNÉES DES TEMPÉRATURES ET DES PRÉCIPITATIONS POUR LA SEMAINE SE TERMINANT À 0600 T.U., LE 29 MAI 1979

Station	Température (°C)				Précip. (mm)	
	Moyenne	Ecart à la normale	Maximale extrême	Minimale extrême	Totale	Ecart à la normale
COLOMBIE-BRITANNIQUE						
Abbotsford	15	2	27	6	10.9	- 0.8
Blue River	M	M	M	M	M	M
Bull Harbour	11	0	21	5	M	M
Castlegar A	15	1	28	4	9.0	-11.3
Cranbrook A	15	3	26	1	10.6	-18.4
Comox A	13	0	20	5	3.2	- 4.8
Estevan Point	M	M	M	5	6.4	-15.1
Fort Nelson A	12	1	23	0	32.7	18.9
Fort St. John A	12	1	24	1	54.2	43.0
Kamloops A	16	1	29	5	3.6	- 1.3
Lytton	17	0	31	5	3.6	0.3
Penticton A	15	1	28	2	7.0	- 0.8
Port Hardy A	11	1	20	5	56.9	42.1
Prince George A	11	0	25	1	27.7	15.8
Prince Rupert A	10	0	15	3	M	M
Quesnel A	12	0	27	0	12.0	2.3
Revelstoke A	14	- 1	27	4	15.3	3.3
Smithers A	10	0	17	1	5.7	- 0.5
Terrace A	11	- 1	16	6	13.5	5.0
Vancouver Int'l A	14	1	22	6	7.0	- 1.5
Victoria Int'l A	13	0	23	3	0.8	- 5.7
Williams Lake A	11	1	24	- 1	7.0	- 3.6
YUKON						
Dawson A	11	0	25	- 1	6.2	- 1.4
Mayo A	11	0	21	1	3.2	- 2.2
Watson Lake A	9	- 1	19	- 1	15.7	9.4
Whitehorse A	10	0	18	1	M	M
TERRITOIRES DU NORD-OUEST						
Alert	-12	- 5	- 8	-15	3.2	0.8
Baker Lake	1	6	6	- 4	29.2	26.6
Cambridge Bay A	- 4	2	2	-15	9.2	6.6
Cape Dyer	- 4	M	3	-11	16.0	M
Chesterfield Inlet	2	6	9	- 4	M	M
Clyde	- 8	- 4	- 2	-13	1.0	- 1.7
Coppermine	- 2	1	4	-10	15.5	13.6
Coral Harbour	- 1	3	3	- 8	15.6	10.7
Ennadai	4	5	13	- 9	11.2	6.9
Eureka	-13	- 8	- 9	-17	0.2	0.0
Fort Simpson	11	2	22	1	14.6	1.6
Fort Smith A	13	4	24	0	11.8	4.0
Frobisher Bay A	1	2	6	- 4	15.7	11.5
Hall Beach A	- 6	M	1	-16	2.3	M
Hay River A	8	1	22	- 2	35.6	30.2
Inuvik A	4	1	16	- 4	8.0	1.4
Mould Bay	-12	- 5	- 5	-16	0.5	- 1.4
Norman Wells A	10	2	20	1	0.0	- 3.5
Resolute A	-12	- 4	- 8	-16	1.1	- 0.9
Sachs Harbour	M	M	M	M	7.8	6.1
Yellowknife A	9	2	22	- 3	18.4	14.7
ALBERTA						
Banff	11	2	24	- 2	7.0	- 5.2
Calgary Int'l A	14	2	27	0	0.0	-10.6
Cold Lake A	15	2	27	2	0.6	- 7.0
Coronation A	13	1	27	1	3.8	- 4.8
Edmonton Mun. A	16	3	27	3	2.4	- 9.1
Edmonton Namao A	15	2	27	2	2.7	- 7.8
Edson A	12	1	28	- 2	3.0	- 7.7
Fort Chipewyan	14	4	25	1	2.2	- 3.7
Fort McMurray A	15	4	28	3	1.8	- 5.0
Grande Prairie A	12	0	24	1	2.5	- 9.7
Jasper	11	1	24	- 1	5.6	- 4.3
Lethbridge A	16	3	30	3	0.0	- 8.9
Medicine Hat A	17	3	30	5	0.0	- 9.4
Peace River A	12	1	27	- 1	9.5	1.2
Red Deer A	13	2	28	- 2	1.2	-10.7
Rocky Mountain House	11	0	27	- 3	1.8	-12.0
Vermilion A	14	2	28	2	1.5	- 7.1
Whitecourt	13	3	27	0	5.2	- 6.3
SASKATCHEWAN						
Broadview	15	3	26	5	5.3	- 8.3
Buffalo Narrows	13	M	24	3	4.8	M
Cree Lake	12	M	22	2	5.2	M
Estevan A	15	2	27	3	3.8	- 6.7
Hudson Bay	15	4	27	1	M	M
Kindersley	16	3	29	2	0.0	- 4.9
La Ronge A	14	4	25	2	2.2	-17.4
North Battleford A	16	3	28	5	0.0	- 8.1
Prince Albert A	16	4	29	2	0.6	- 7.3
Regina A	15	2	28	4	9.8	- 1.4
Saskatoon A	17	4	28	5	0.3	- 8.4
Swift Current A	15	2	27	1	4.8	- 3.2
Uranium City	13	M	24	0	3.9	M
Wynyard	14	2	29	- 1	17.1	- 4.2
Yorkton A	15	3	26	2	3.2	- 7.3
MANITOBA						
Bissett	13	M	26	- 1	9.0	M
Brandon A	15	3	28	4	4.8	-12.6
Churchill A	7	7	22	- 4	2.4	- 6.0
Dauphin A	14	3	26	2	10.8	- 5.8
Gillam A	11	M	25	- 3	1.4	M
Gimli	11	- 1	19	1	5.4	- 8.5
Lynn Lake	13	8	23	- 2	3.6	-21.6
Norway House	12	M	25	0	2.0	M
Pilot Mound	14	2	27	4	3.2	-11.9
Portage la Prairie	14	2	28	3	15.8	- 6.1
The Pas A	14	4	24	2	3.2	- 8.6
Thompson A	11	5	25	- 4	1.2	-20.5
Winnipeg Int'l A	13	1	27	2	8.8	- 8.3
ONTARIO						
Armstrong A	10	1	22	- 5	M	M
Atikokan	9	- 2	25	- 3	2.4	-17.6
Earlton A	10	- 1	18	0	27.8	9.9
Geraldton	8	- 1	20	- 4	2.0	-16.5
Gore Bay A	10	- 2	17	1	9.4	1.0
Kapuskasing A	9	- 2	19	- 3	9.3	-12.7
Kenora A	14	2	26	5	2.0	-13.0
Kingston A	11	- 2	17	7	M	M
Lansdowne House	11	3	22	1	0.2	-15.4
London A	10	- 4	20	2	38.5	26.7
Moosonee	7	- 1	20	- 5	6.0	-16.3
Mount Forest	M	M	18	M	M	M
Muskoka A	11	- 2	18	- 2	14.2	- 1.3
North Bay A	10	- 2	17	1	14.4	- 1.1
Ottawa Int'l A	12	- 3	17	5	21.6	6.5
Petawawa A	12	M	18	2	12.4	M
Pickle Lake	12	3	24	0	3.2	-13.4
Red Lake A	11	0	26	- 2	4.9	- 7.9
Simcoe	11	- 2	19	6	21.6	12.3
Sioux Lookout A	12	1	25	- 1	0.2	-17.0
Sudbury A	10	- 2	17	2	13.2	- 0.5
Thunder Bay A	9	- 1	21	- 1	2.4	-14.1
Timmins A	10	- 1	18	- 1	20.4	5.3
Toronto Int'l A	11	- 3	18	2	35.1	23.6
Trenton A	12	- 3	19	4	15.6	0.1
Trout Lake	10	4	21	- 1	0.0	-12.5
Wawa A	8	M	19	- 4	4.0	M
Wiarton A	9	- 3	15	- 1	17.2	6.3
Windsor A	11	- 5	22	6	61.4	47.9
QUEBEC						
Bagotville A	10	- 2	19	0	7.0	-10.6
Baie Comeau	9	0	17	2	23.6	- 0.8
Border	2	3	15	- 4	17.4	11.5
Chibougamau	8	M	17	- 2	23.2	M
Fort Chimo A	M	M	M	- 2	M	M
Gaspé A	11	3	21	3	18.4	8.7
Grindstone Island	9	1	17	4	33.2	16.4
Inoucdjouac	1	1	13	- 4	1.4	- 3.3
Maniwaki	11	- 1	19	1	22.8	10.6
Matagami A	5	M	18	- 3	19.1	M
Mont Joli A	9	- 1	20	2	27.2	11.4
Montréal Int'l A	12	- 3	19	5	32.9	20.4
Natashquan A	9	2	16	3	11.6	-15.2
Nitchequon	4	0	16	- 4	15.7	- 3.0
Port Menier	8	1	19	- 1	23.3	2.6
Poste de la Baleine	4	1	20	- 7	5.5	- 4.1
Québec A	11	- 2	20	3	51.4	35.7
Riviere du Loup	10	0	17	4	25.6	20.4
Roberval A	10	- 1	15	4	47.2	36.2
Schefferville A	3	0	14	- 3	12.6	- 0.4
Sept-Iles A	9	1	19	2	38.5	11.7
Sherbrooke A	11	0	21	2	63.7	54.3
Val d'Or A	10	- 1	18	0	27.6	14.1
NOUVEAU-BRUNSWICK						
Charlo A	11	3	22	4	33.1	20.8
Chatham A	12	0	23	4	M	M
Fredericton A	12	- 1	23	2	94.6	70.8
Moncton A	12	0	23	3	77.2	51.3
Saint John A	12	1	21	5	131.4	103.1
NOUVELLE-ECOSSE						
Greenwood A	12	0	22	2	70.2	52.2
Shearwater A	12	1	19	7	49.7	19.5
Sydney A	9	- 1	24	4	65.4	41.1
Truro	M	M	22	M	M	M
Yarmouth A	13	2	19	5	81.3	54.1
ILE-DU-PRINCE-EDOUARD						
Charlottetown	12	1	22	5	M	M
Summerside	13	1	23	6	53.2	29.9
TERRE-NEUVE						
Battle Harbour	5	2	13	1	2.6	-14.6
Cartwright	7	3	21	- 3	1.0	- 9.8
Deer Lake	11	4	20	2	7.6	-16.0
Gander Int'l A	11	3	22	3	4.0	- 8.2
Goose A	8	1	17	- 1	27.3	13.7
Hopedale	4	1	12	- 1	5.0	- 4.6
St. Anthony	7	M	16	- 1	6.8	M
St. John's A	8	1	18	- 2	12.2	-10.9
Stephenville A	11	2	17	4	M	M
Wabush Lake	4	1	15	- 3	4.4	-17.1

M-Indique des données manquantes