CATALOGUE 22-002F

22-002F
no 11
1973
20 juin
c. 3

Statistics Canada
Statistique Canada

Pour publication le 20 juin 1973
à 3 h. de l'après-midi

Série de 20 rapports: $4

Série de rapports sur les grandes cultures — Nº 9
(Sommaire des précipitations de l'automne et de l'hiver
1er septembre 1972 au 31 mars 1973 sont inclus.)

RAPPORT TÉLÉGRAPHIQUE SUR LES CULTURES — PROVINCES DES PRAIRIES

Statistique Canada publie aujourd'hui le cinquième d'une série de 11 rapports télégraphiques sur l'état des cultures dans les provinces des Prairies. Ces rapports reposent sur les renseignements communiqués par un nombre choisi de correspondants agricoles des ministères fédéral et provinciaux de l'Agriculture, par des observateurs agricoles particuliers et des producteurs de grains. Les renseignement météorologiques contenus dans le présent bulletin sont fournis par le service de l'Environnement atmosphérique, Environnement Canada.

SOMMAIRE

Provinces des Prairies: — Les pluies étaient généralisées la fin de semaine dernière dans la plupart des provinces des Prairies. Quelques districts dans le sud et le centre de la Saskatchewan faisaient exception avec des averses seulement ou aucune précipitation. Ailleurs, les pluies ont été abondantes avec la chute de près de quatre pouces de pluie dans les régions auparavant désséchées du sud-est de l'Alberta. Il y a eu des inondations dans l'est du Manitoba et dans le nord de la Saskatchewan et les agriculteurs n'ont pu terminer leurs travaux de semailles dans les champs non ensemencés. Les cultures ont progressé et l'amélioration est évidemment plus marquées dans les régions de sécheresse; à ce stade de croissance, on peut s'attendre à de bonnes récoltes. Les conditions atmosphériques ont retardé la pulvérisation.

Manitoba: — D'abondantes pluies ont amélioré l'état de croissance bien que certaines régions basses sont maintenant inondées dans la lisière est de la province. Les cultivateurs ont terminé les semailles dans la plupart des districts et la récolte semble bien s'annoncer. Le seigle est en train d'épier et on prévoit que les récoltes seront de passables à bonnes. Le démariage des betteraves à sucre est en cours et les cultures spéciales poussent bien. On rapporte relativement peu de dégâts causés par les insectes et la pulvérisation des mauvaises herbes a été retardée à cause du temps.

Division de l'agriculture
Section des Cultures

5-3102-509

Published by Authority of the Minister of Industry, Trade and Commerce
Statistics Canada should be credited when republishing all or any part of this document

Publication autorisée par le ministre de l'Industrie et du Commerce
Reproduction autorisée sous reserve d'indication de la source: Statistique Canada

La culture du foin est inférieure à la moyenne et la coupe a été retardée par la pluie.

Saskatchewan: — Des pluies persistantes dans le nord-est ont laissé bien des terrains non ensemencés tandis que d'autres déjà ensemencés ont été inondés. La partie très sèche du sud-ouest de la province a reçu quelques averses locales, mais il y a toujours de nombreuses régions sèches. Les régions du nord-ouest et du centre-ouest ont reçu des pluies abondantes tandis que les districts du centre-sud et de l'ouest sont demeurées secs. En général, on prévoit des récoltes supérieures à la moyenne.

Alberta: — Les pluies généralisées qui sont tombées par intermittence sur la majeure partie de la province du 14 au 17 juin ont fait renaître les perspectives de bonnes cultures pour 1973. Bien que la quantité de pluie ait varié, les régions ayant un grand besoin d'humidité ont reçu plus de quatre pouces de pluie. Avant cette pluie, le manque d'humidité en surface avait causé une germination inégale des cultures semées tard. Le fourrage et les céréales semées tôt commençaient à se ressentir du temps sec. La pulvérisation n'a pas été répandue jusqu'à ce jour à cause de la sécheresse et du vent. Avec le retour du beau temps, la pulvérisation devrait se généraliser au cours des deux prochaines semaines. Les sauterelles continuent à constituer un problème dans certaines régions et bien que la pluie doit améliorer la situation, on rapporte qu'il y a eu d'importants dégâts. Dans les régions du sud et de l'est, il y a eu peu d'humidité depuis la mi-mai et les cultures semées à l'automne étaient déjà trop avançées pour profiter des récentes pluies. D'autres cultures et les pâturages devraient s'améliorer avec l'abondance d'humidité. Dans les régions du centre et du nord, les plantes fourragères et les pâturages demeurent en bon état pour cette période de l'année.

Maladies des plantes et sauterelles: — La Station de recherches du ministère de l'Agriculture du Canada à Winnipeg signale que selon des informations en provenance des États-Unis, la rouille de l'avoine et la rouille de la tige du blé sont généralisées, mais faibles dans certaines sections. De graves infestations de rouille de la feuille du blé ont été signalées dans une grande partie de la région sud où l'on cultive du blé d'hiver et des spores ont été transportées du sud jusque dans l'Ouest du Canada au cours des derniers jours de mai et au début de juin. On a trouvé des traces de rouille de la feuille de blé dans le sud du Manitoba le 14 juin et cette rouille est probablement présente en petites quantités dans une grande partie du sud de la Saskatchewan. Cependant, il est trop tôt pour dire combien de rouille de la feuille du blé se développera dans l'Ouest du Canada en 1973, mais les conditions présentes sont favorables à ce développement.

Le temps chaud de la dernière fin de semaine a encore favorisé l'éclosion des sauterelles et des mesures de contrôle plus sévères sont appliquées. Toutefois, le temps frais et humide des deux derniers jours limitera les dégâts et la croissance des sauterelles et réduira davantage cette menace. Les dégâts aux cultures demeurent minimes.

MANITOBA

A Vita, les conditions hygrométriques sont bonnes mais d'ici environ une semaine, les sols plus légers auront besoin de pluie. La plupart des sols lourds ont suffisamment d'humidité pour les deux ou trois prochaines semaines. Les mauvaises herbes poussent très rapidement, mais la pulvérisation qui est commencée en permet un bon contrôle. L'Endeven produit de bons résultats dans la folle avoine. Les semailles sont terminées, sauf dans les cas où il a fallu les recommencer. Le foin cultivé

pousse bien, les pâturages sont bons mais on signale des rendements inférieurs à la moyenne pour les herbages. Des régions isolées sont envahies de sauterelles et on a commencé la pulvérisation. Dans la région d'Altona, on signale cinq pouces de pluie qui ont entraîné de graves inondations. Il est possible que les pluies abondantes aient résolu en partie le problème des insectes dans cette région. A Morden, il est tombé au moins un pouce de pluie au cours des derniers jours. Des orages localisés ont apporté jusqu'à deux pouces de pluie et même davantage dans certaines parties des municipalités de Stanley et de Pembina. On signale un peu de grêle mais sans que les cultures en aient souffert beaucoup jusqu'à maintenant. Il n'y a plus d'altise dans le colza mais la chrysomèle du tournesol et le ver gris causent quelques problèmes dans la région; on fait un peu de pluvérisation dans le but de les exterminer. La majeure partie des semailles tardives de lin et de sarrasin sont terminées. Comme les conditions hygrométriques sont plus que satisfaisantes, les cultures poussent bien mais pour certaines cultures spéciales, il faudra du temps chaud et ensoleillé. Le temps humide a retardé la pulvérisation des mauvaises herbes. La première coupe de foin ne sera pas abondante mais le temps humide des derniers jours améliorera le rendement de la recoupe. Les pâturages ont recommencé à pousser après les dernières pluies.

Les conditions hygrométriques sont excellentes dans la région de Pilot Mound. Le lin et le colza semés tard poussent bien. On signale dans la région quelques dégâts du colza causés par l'altise de même que des dégâts causés par le ver gris. La pluvérisation des mauvaises herbes est terminée à 30 %; de forts vents et la pluie ont retardé la pulvérisation des cultures semées tôt. Les céréales poussent bien, le tournesol atteint environ quatre pouces de hauteur et on procède au premier sarclage. La croissance du foin et des pâturages est excellente et on travaille les jachères. Les semailles sont presque terminées et les cultures hâtives poussent bien à Somerset. Les mauvaises herbes sont abondantes, surtout la folle avoine et la sétaire verte. De forts vents ont retardé la pulvérisation. On signale quelques dégâts dans les cultures à cause de pluies abondantes et d'un peu de grêle. Les conditions hygrométriques sont moyennes mais il faut du temps chaud pour faire pousser les cultures, les pâturages et le foin. Il est tombé 0.5 pouce de pluie à Melita la semaine dernière et il y a suffisamment d'humidité. L'état des cultures varie entre bon et excellent, mais la récolte de foin s'annonce seulement passable. Il faudrait une humidité durable pour permettre la croissance soutenue du foin et des pâturages.

L'humidité est excessive à cause des dernières pluies signalées à Beauséjour mais il est impossible d'évaluer les dégâts actuellement. Il faudra du temps chaud et du vent pour assécher les champs. La lutte contre les mauvaises herbes est en retard à cause de la pluie, mais grâce à l'humidité, le foin et les pâturages poussent bien. On a dû interrompre la récolte des plantes fourragères à cause des pluies abondantes. On a signalé quatre pouces de pluie la semaine dernière à Selkirk, dont trois pouces, accompagnés de grêle sont tombés jeudi. On a signalé des grêlons atteignant un pouce et même un pouce et demi de diamètre à Lockport. Les conditions hygrométriques sont plus que suffisantes et dans les régions mal égouttées, certaines cultures ont été endommagées. La folle avoine continue à pousser et la pulvérisation est en retard à cause de l'humidité. De façon générale, les cultures poussent bien et le seigle d'automne épie. La pluie a retardé les semailles du lin et du colza. Le foin et les pâturages poussent bien. La saison des chenilles bat presque son plein et les larves sont arrivées à la métamorphose. Les arbres ont subi d'importants dégâts dans la région.

A Stonewall, les pluies abondantes des deux dernières semaines ont entraîné des inondations, qui ont réduit les dernières semailles. On a commencé la pulvérisation

contre les sauterelles dans la région mais elles ne causent pas encore de problèmes à cause de la pluie. La fenaison pourrait commencer mais on attend que le temps s'améliore. Des pluies excessives à Portage la Prairie ont noyé certaines cultures. Les semailles sont terminées à 95 % et les dernières pluies les ont retardées. Le foin et les pâturages sont en excellent état. La majorité des cultures poussent bien et on s'attend à une bonne récolte.

Les conditions de croissance se sont considérablement améliorées à Brandon la semaine dernière. Depuis le 1er avril, il est tombé 5.9 pouces de pluie dont seulement un pouce la semaine dernière. La récolte des plantes fourragères est commencée. Des averses ont interrompu la pulvérisation. L'altise a endommagé quelque peu les cultures de colza.

A Teulon, l'humidité est excessive. Grâce aux produits chimiques, on parvient à lutter tant bien que mal contre la folle avoine et on est parvenu à semer entre 95 % et 100 % des cultures jusqu'à maintenant. La croissance du foin et des pâturages est excellente. On signale quelques chenilles. A Arborg, il est tombé en moyenne plus de deux pouces de pluie la semaine dernière grâce auxquels les pâturages et les céréales poussent bien. Les céréales atteignent de six à dix pouces de hauteur. Dans les champs détrempés, la pulvérisation des mauvaises herbes à feuilles larges sera retardée pendant au moins deux jours encore.

A Minnedosa, les cultures semées tôt poussent bien. Le seigle d'automne épie et il s'annonce assez bien. La germination du colza est très variable. La croissance des mauvaises herbes est excellente et la pulvérisation se fait partout dans la région. La croissance du foin et des pâturages est supérieure à la moyenne car il y a suffisamment d'humidité.

La pluie à Shoal Lake a hâté la germination et tous les champs ensemencés poussent bien. La pulvérisation est en retard à cause de grands vents. La première étape des travaux dans les jachères est terminée presque partout. Le foin et les pâturages sont moins beaux que d'habitude à cause du printemps sec.

A Dauphin, il a gelé légèrement le 6 juin et une partie du sarrasin, qui commencait à sortir de terre, a été détruite. Deux pouces de pluie jeudi ont permis au sol d'atteindre un niveau optimal d'humidité. La croissance du foin et des pâturages est excellente. A cause de forts vents et de la pluie, la pulvérisation des mauvaises herbes a été arrêtée toute la semaine dernière. A cause de l'humidité, les semailles des cultures tardives ne sont pas encore terminées. Les dégâts de l'altise sont supérieurs à la normale. Les livrées et les chenilles sont aussi en grand nombre. A Swan River, on a dû interrompre les travaux dans les champs à cause de pluies abondantes et il reste encore 5 % des semailles à faire. La pluie retarde la lutte contre les mauvaises herbes, qui sont abondantes dans les cultures semées tôt. Il n'y a eu que peu de problèmes causés par les insectes jusqu'à maintenant. Les pâturages sont plus qu'excellents et la fenaison sera généralisée dans quelques jours.

La précipitation moyenne non pondérée depuis 1er avril a été de 28 % au-dessus de la normale, contre 13 % au dessus de la normale il y a une semaine, 28 % au-dessus de la normale il y a deux semaines mais 15 % au-dessous de la normale il y a un an. La température moyenne pour la semaine se terminant le 18 juin était de 2.6 degrés F. au-dessus de la normale contre 3.9 degrés au-dessous de la normale il y a une semaine, 4.6 degrés au-dessus de la normale il y a deux semaines mais 3.3 degrés au-dessous de la normale la semaine terminée le 19 juin 1972.

SASKATCHEWAN

A Moosomin, dans le sud-est de la province, les semailles sont terminées, et les conditions hygrométriques sont excellentes (il est en effet tombé 3.01 pouces de pluie depuis le 1er juin). Depuis le 1er avril, il est tombé, au total, 6.48 pouces de pluie. Les pâturages sont beaux et le seigle d'automne est en excellent état. Les cultivateurs pulvérisent certaines cultures hâtives pour les débarrasser de la folle avoine. Toutes les conditions sont très bonnes, et il semble que les récoltes seront supérieures à la moyenne. Dans le district de Indian Head, les semailles sont terminées; quelques champs ensemencés en premier doivent cependant être réensemencés car ils ont été infestés de folle avoine. Le temps frais a quelque peu retardé la croissance des cultures et, même si elles sortent très bien, il n'y a encore que peu de talles. La plupart des champs devront être désherbés au pulvérisateur. Les prairies artificielles et les pâturages poussent très bien; les rendements devraient être bien-au-dessus de la moyenne.

A Gravelbourg, dans le centre-sud, les cultures poussent rapidement et mesurent de 3 à 7 pouces de haut. Les opérations de pulvérisation s'étendent à presque toute la région, la croissance des mauvaises herbes ayant été forte. Les sauterelles ont causé certains dégâts dans quelques champs. Même si ce district a reçu 4 ¼ pouces de pluie depuis le 1er avril, les pâturages sont en bon état.

A Swift Current, dans le sud-ouest, les cultures poussent bien; toutefois dans la région de Swift Current même, elles ont besoin d'humidité. Les pluies ont été dispersées dans tout le district. Les insectes ne semblent pas avoir causé de dégâts toutefois, la folle avoine, la saponaire des vaches et le vulpin posent de sérieux problèmes dans de nombreuses régions. Les pâturages sont en très bon état sauf dans quelques secteurs relativement petits. A Leader, les 3 pouces de pluie qui sont tombés au cours de la semaine dernière ont charrié beaucoup de terre et ont inondé certaines terres basses. Avec du temps chaud, la croissance devrait être bonne.

A Melville, dans le centre-est, les semailles sont terminées. Les cultures semblent en bon état sauf dans quelques régions où l'excès d'humidité et la fraîcheur les ont fait jaunir. Il semble que la récolte de foin (naturel et artificiel) sera excellente. Les chutes de pluie dans cette région depuis le 1er mai ont atteint 6.67 pouces, contre 0.2 pouce l'année dernière. Dans la région de Endeavour, le temps humide des deux dernières semaines a retardé les semailles. Les cultures ont bien germé, mais le temps frais et humide en a considérablement ralenti la croissance. Les travaux de pulvérisation (contre la folle avoine et d'autres mauvaises herbes) ne sont pas encore terminés, et il se peut qu'ils aient été commencés trop tard dans certains champs. Les perspectives de récolte de foin naturel et artificiel sont très bonnes.

Dans le centre, autour de Drake, les semailles sont presque terminées; les travaux dans les terres en jachère et les opérations de pulvérisation sont en cours. Il est tombé près de 9 pouces dans cette région jusqu'ici. La croissance des cultures est d'environ 2 semaines en retard par rapport à la normale, et il faudrait qu'il fasse chaud avant longtemps. Un nombre considérable de champs ont été inondés. Il ne semble pas y avoir de sauterelles. A Craik, certains champs de lin, de moutarde et de colza ont dû être réensemencés. On signale des cas d'érosion causée par le vent. Les cultures ont bien germé, et la hauteur moyenne des céréales est d'environ 4 pouces. Les pâturages et les prairies artificielles sont en bon état. On signale la présence d'altises dans certains champs de moutarde; toutefois, les travaux de pulvérisation ne s'étendent pas à toute la région. A Saskatoon, les cultures continuent

à bien pousser; le blé et les céréales secondaires atteignent 10 pouces de haut; le colza semé tôt mesure maintenant 14 pouces et il commence à fleurir. Les prairies artificielles et les pâturages sont très beaux. Les trois pouces de pluie tombés depuis le 1er juin ont fourni assez d'humidité aux cultures et ont retardé l'activité des sauterelles.

A Rosetown dans le centre-ouest, le blé semé tôt et les céréales secondaires mesurent de 6 à 8 pouces environ. Le vent a causé des dégâts dans certains champs de lin; les agriculteurs sont en train de les réensemencer en variétés plus tardives. La pulvérisation des mauvaises herbes est terminée dans une proportion de 60 %. Les premiers travaux dans les terres en jachères sont maintenant terminés. L'état des pâturages et des prairies artificielles est médiocre; il leur faudrait de la pluie avant longtemps. Dans la région de Scott, le temps frais et sec de mai a retardé la croissance des cultures d'environ une semaine par rapport à la normale. Cependant, le pouce et ¾ de pluie qui est tombé au cours des dix derniers jours a considérablement amélioré la situation des céréales et des cultures fourragères. La pulvérisation des mauvaises herbes n'est pas encore avancée. On rapporte que la région de Coulee Hills est infestée de sauterelles.

A Melfort, dans le nord-est de la province, les pluies ont empêché les cultivateurs de terminer leurs semailles; 20 % des champs doivent encore être ensemencés. Certains champs ne seront pas du tout ensemencés ou seront ensemencés en variétés hâtives d'orge ou de colza. De nombreuses cultures ont été endommagées par les innondations. De nombreux champs sont infestés de mauvaises herbes, et les travaux de pulvérisation ne peuvent être faits que par la voie des airs. Les pâturages et les prairies artificielles poussent très bien; par contre, les céréales et les cultures oléagineuses ont besoin de temps chaud et sec.

La Saskatchewan Municipal Hail Insurance Association signale qu'il y a eu des orages les 2, 7, 10, 11, 13 et 14 juin. La majorité des dégâts ont été causés par l'orage du 10 juin dans les régions de Melville, Markinch, Canora, Foam Lake, Lanigan, Young, Kelvington, Watson, Kerrobert et Wilkie. Il semble toutefois, que les dégâts seront assez légers; certains champs de lin et de colza devront cependant être réensemencés. Dans certaines régions du nord, l'inspection des dégâts a été retardée à cause de l'excès d'humidité.

Depuis le 1er avril, la précipitation moyenne non pondérée a été de 49 % au-dessus de la normale, contre 60 % au-dessus de la normale il y a une semaine, 85 % au-dessus de la normale il y a deux semaines et 7 % au-dessous de la normale il y a un an. La température moyenne pour la semaine terminée le 18 juin 1973 a été de 0.8 degré F. au-dessus de la normale, contre 1.3 degré au-dessous de la normale il y a une semaine, 1.0 degré au-dessus de la normale il y a deux semaines et 1.4 degré au-dessous de la normale la semaine terminée le 19 juin 1972.

ALBERTA

A Medicine Hat, dans le sud-est, il est tombé 4.37 pouces de pluie dans le district entre le 14 et 17 juin. Les pâturages naturels et la plupart des cultures en terrain sec ont immédiatement réagi. Dans certaines régions, les cultures en terrain sec ont souffert de l'érosion éolienne avant la pluie. La récolte de la première coupe de luzerne destinée à la deshydratation commence. De nombreux trous d'eau et bourbiers contiennent de l'eau pour le bétail.

A Lethbridge, dans le sud-ouest, il est tombé environ 1.5 pouce de pluie depuis le 14 juin ce qui a grandement amélioré les céréales et les pâturages. Le seigle d'automne prend racine et le blé d'hiver a épié; le blé de printemps a commencé à taller. Le colza semé tôt est en pleine floraison et on prévoit une culture moyenne. L'ensemencement des cultures de conserverie est terminé et 70 % du démariage de la betterave à sucre est complété. L'éclosion des oeufs de sauterelles se poursuit bien que ralentie par le temps frais et pluvieux; quelques mesures de contrôle ont été entreprises. On signale des dommages causés par le ver gris et le gel. A Cardston, les cultures de printemps ont bonne apparence et se rétablissent très bien des dégâts dû au gel. Le blé d'hiver est en épis et le colza hâtif commence à fleurir. Les pâturages sont passables et les conditions hygrométriques bonnes; le bétail est en bon état. Le district autour de Claresholm a reçu jusqu'à trois pouces de pluie et les cultures se sont grandement améliorées; les agriculteurs s'occupent activement des travaux de pulvérisation des mauvaises herbes. Il faudrait qu'il fasse chaud.

Dans la région du centre-sud, près de Vulcan, il est tombé 3.70 pouces de pluie au cours de la fin de semaine dernière ce qui a considérablement amélioré les conditions. Les deux dernières semaines de temps frais ont ralenti la croissance de toutes les cultures et on a maintenant besoin de chaleur. La semaine dernière, on a dû vendre du bétail en raison de la médiocrité des pâturages; toutefois, les pluies récentes ont amélioré les pâturages. On signale un peu de gel dans la région ce qui pourra avoir des conséquences sur le seigle d'automne qui était partiellement en fleur.

A Olds, dans le centre sud-ouest, il est tombé 3.9 pouces de pluie depuis le 1er mai. La hauteur moyenne de l'orge, du blé et du colza est de deux pouces et les conditions de croissance sont excellentes pour toutes les céréales et les pâturages; il faudrait maintenant qu'il fasse chaud.

Une petite quantité de colza et d'orge n'a pas encore été semée dans le district de Sedgewick dans le centre nord-est de l'Alberta. Les six pouces de pluie tombés au cours de la fin de semaine dernière ont considérablement amélioré les perspectives de récolte. A Vermilion, les quatre pouces de pluie tombés au cours de la fin de semaine ont partiellement résolu le problème d'humidité, bien qu'ils aient causé certains petits problèmes d'innondation. Les cultures sont moyennes pour cette époque de l'année et on a maintenant besoin de chaleur. Les travaux de pulvérisation se poursuivent partout bien que les mauvaises herbes ne représentent pas encore un problème important.

L'état des cultures de céréale varie de bon à excellent près de Stettler dans le centre de la province. Les fourrages se sont détériorés mais devraient se rétablir à la suite de la chute de quatre pouces de pluie au cours de la fin de semaine dernière. Les travaux de pulvérisation reprendront dès que possible; un envahissement par la folle avoine, la spargoute des champs et le mil semblent causer les plus graves problèmes. L'ensemencement est terminé sauf pour une partie du colza et des cultures d'ensilage. Jusqu'à maintenant, on ne signale aucun problème d'insecte.

Dans le centre-ouest, près de Red Deer, l'ensemencement est presque terminé. La germination était moyenne et les deux à quatre pouces de pluie tombés ont amélioré les perspectives des cultures et des pâturages en améliorant les conditions de croissance qui sont maintenant excellentes. A Lacombe, l'ensemencement est terminé et de 15 à 20 % des travaux de pulvérisation sont terminés. Les 2.96 pouces de pluie tombés entre le 14 et le 17 juin sont venus très à propos pour les céréales et les prairies artificielles.

Dans le nord-est, jusque dans le centre-nord, à Colinton, on signale qu'il est tombé trois pouces de pluie au cours de la semaine dernière. Les cultures sont en bon état et les mauvaises herbes poussent également rapidement; toutefois, les travaux de pulvérisation sont rendue impossibles parce que le sol est détrempé. Les cultures fourragères qui ont semblé souffrir des ravages de l'hiver se reprennent très bien.

A Beaverlodge, dans la région de Peace River, les fortes pluies tombées partout dans la région ont largement amélioré les conditions des cultures. Les cultures de graines fourragères épient avec deux semaines d'avance. La pluie a retardé la germination de certaines cultures qui, par conséquent, ne parviendront pas toutes à maturité en même temps.

La Alberta Hail et Crop Insurance Corporation signale les orages suivants en Alberta: le 10 juin; des dégâts légers ont été causés aux cultures de fétuque par la tempête qui a frappé Hythe au cours de l'après-midi.

La moyenne non pondérée des précipitations depuis le 1er avril a été de 28 % au-dessus de la normale, contre 21 % au-dessus de la normale il y a une semaine, 11 % au-dessous de la normale il y a deux semaines et 10 % au-dessous de la normale il y a un an. La température moyenne pour la semaine terminée le 18 juin a été de 1.9 degré F au-dessous de la normale, contre 0.5 degré au-dessous de la normale il y a une semaine, 1.7 degré au-dessous de la normale il y a deux semaines et 1.1 degré au-dessous de la normale pour la semaine terminée le 19 juin 1972.

Precipitation and Temperature Data, Prairie Provinces(1)

Province and crop district	Station	Precipitation			Mean temperature week ending 8 a.m. June 18	
		Week ending 8 a.m. June 18, 1973	Total since April 1	Normal since April 1	1973	Normal
		inches			degrees F.	
MANITOBA						
1	Boissevain	.71	6.34	5.43	65	60
	Pierson	.23	7.91	4.95	66	61
2	Baldur	1.73	6.55	5.12	66	62
	Pilot Mound	.78	5.08	8.07	66	62
3	Altona	4.06	7.69	4.68	69	64
	Deerwood	1.02	2.51(2)	4.89	64	63
	Graysville	.57	4.84	4.60	68	62
	Morden	1.01	4.15	5.17	69	64
	Morris	1.56	5.74	4.53	65	64
	Portage la Prairie	1.30	6.64	6.01	65	63
	Roland	.61	5.44	4.86	67	64
4	Stonewall	1.14	6.19	5.13	64	62
5	Emerson	2.15	6.78	4.78	69	63
	Steinbach	.90	4.21	4.79	68	62
	Winnipeg	1.10	7.27	5.03	66	62
	Starbuck	1.58	5.38	4.78	67	63
6	Pinawa	7.16	9.89	2.95	62	60
	Great Falls	N.R.	2.00(2)	3.71	N.R.	62
	Sprague	.75	4.24	4.99	63	61
7	Virden	.86	4.82	4.74	64	61
8	Brandon	1.04	5.29	5.14	66	61
	Cypress River	2.79	7.34	4.96	65	62
9	Gladstone	.96	4.58	5.06	N.R.	62
10	Birtle	.46	4.80	4.82	61	59
	Rossburn	.56	5.41	4.26	61	59
	Russell	.82	5.35	3.98	61	59
11	Dauphin	2.27	6.30	5.26	61	61
12	Arborg	2.10	6.58	4.82	60	61
	Gimli	4.33	7.51	5.00	62	61
13	Swan River	.17	6.13	4.82	62	60
	Pasquia	1.80	6.87	N.R.	58	N.R.
	The Pas	1.05	7.40	4.03	57	59
	Thompson	.28	2.95	4.64	53	53
14	Grass River	N.R.	2.82(2)	5.16	N.R.	61
MANITOBA AVERAGE		1.50	6.23	4.88	63.9	61.3

For footnotes see page IV.

Precipitation and Temperature Data, Prairie Provinces(1)

Province and crop district	Station	Precipitation			Mean temperature week ending 8 a.m. June 18	
		Week ending 8 a.m. June 18, 1973	Total since April 1	Normal since April 1	1973	Normal
		inches			degrees F.	
SASKATCHEWAN						
1A	Carlyle	.49	6.38	4.16	62	59
	Estevan	.25	4.83	4.70	63	61
	Oxbow	N.R.	5.85(2)	4.13	N.R.	59
	Willmar	.50	5.11	4.55	N.R.	59
1B	Broadview	.23	5.32	4.93	61	58
	Moosomin	.40	6.34	4.81	62	60
2A	Yellow Grass	.71	6.09	4.23	63	61
	Weyburn	.70	4.90	4.18	61	60
	Midale	.28	4.04	4.05	62	61
	Amulet	.83	7.08	4.42	62	60
2B	Moose Jaw	.08	6.33	4.37	63	61
	Regina	.20	6.22	4.35	62	60
	Francis	N.R.	2.05(2)	3.79	N.R.	59
	Indian Head	.45	8.16	4.36	61	60
3AS	Ormiston	.77	5.99	4.42	60	60
	Cardross	.78	5.74	4.47	62	60
	Rock Glen	.85	7.17	4.42	61	59
3AN	Gravelbourg	N.R.	4.59(2)	3.62	N.R.	61
	Coderre	.62	7.27	4.07	60	60
	Chaplin	.04	6.30	3.66	60	61
3BS	Shaunavon	2.87	5.33	4.02	58	59
	Aneroid	1.75	4.88	3.76	60	60
	Instow	.88	2.93	3.83	58	59
3BN	Swift Current	.43	4.10	4.44	61	59
	Pennant	.42	2.59	3.86	62	60
	Hodgeville	.50	3.55(2)	4.01	N.R.	60
	Hughton	.16	3.03	3.27	62	61
4A	Maple Creek	2.02	4.52	3.75	61	61
	Consul	1.56	2.79	3.22	56	59
4B	Abbey	.74	2.95	3.56	63	60
	Leader	3.49	5.86	3.34	60	61
5A	Cupar	N.R.	7.63(2)	3.99	N.R.	60
	Balcarres	.47	6.62	4.37	N.R.	59
	Lipton	.37	8.50	3.77	60	59
	Yorkton	.34	7.01	4.22	61	59
	Bangor	.31	6.86	4.59	60	59
5B	Wynyard	.65	8.73	4.26	61	58
	Foam Lake	.53	8.84	4.35	53	58
	Kuroki	.35	9.09	4.40	59	58
	Kamsack, Cote	.37	6.68	4.03	60	59
6A	Davidson	.11	6.41	4.05	62	60

For footnotes see page IV.

Precipitation and Temperature Data, Prairie Provinces(1)

Province and crop district	Station	Precipitation			Mean temperature week ending 8 a.m. June 18	
		Week ending 8 a.m. June 18, 1973	Total since April 1	Normal since April 1	1973	Normal
		inches			degrees F.	
SASKATCHEWAN — Concluded						
6A	Strasbourg	.19	7.98	4.47	63	58
	Watrous	.31	8.43	3.68	62	60
	Liberty	.03	6.26	4.05	61	60
6B	Harris	.13	4.37	4.05	63	60
	Outlook	.17	4.19	3.35	62	61
	Saskatoon	.54	6.38	3.47	61	60
	Elbow	trace	3.10	4.17	62	60
	Tugaske	nil	6.79	4.15	61	60
	Dundurn	.02	4.99	3.25	60	60
7A	Kindersley	2.41	5.29	2.94	62	60
	Rosetown	.03	3.56	3.56	62	60
7B	Macklin	2.51	4.71	3.27	59	59
	Denzil	2.49	5.29	3.35	59	60
	Scott	1.13	4.05	3.62	60	58
	Biggar	.54	4.49	3.57	60	60
8A	Hudson Bay	.42	6.01	4.26	58	58
	Prairie River	.61	9.44	4.43	56	58
8B	Humboldt	1.12	7.99	3.76	60	59
	Melfort	.90	9.47	3.94	57	59
9A	North Battleford	.32	4.45	3.40	60	60
	Victoire	.72	6.86	3.74	52	57
	Prince Albert	.58	6.94	3.91	58	59
9B	Meadow Lake	1.54	7.48	3.89	58	55
	Waseca	N.R.	3.92(2)	3.63	N.R.	58
SASKATCHEWAN AVERAGE		.72	5.92	3.98	60.3	59.5
ALBERTA						
1	Empress	4.47	7.20	3.51	63	61
	Foremost	1.45	3.74	4.19	58	60
	Manyberries	1.85	3.47	3.55	58	60
	Medicine Hat	4.62	6.07	4.03	61	62
2	Brooks	4.44	6.86	3.83	58	60
	Gleichen	2.53	4.80	4.26	53	58
	Vauxhall	2.70	4.25	3.55	57	59
	Raymond	N.R.	2.49(2)	4.69	N.R.	60
	Lethbridge	1.36	3.70	5.20	57	59
	Trochu	3.27	4.98	4.10	N.R.	58

For footnotes see page IV.

Precipitation and Temperature Data, Prairie Provinces(1)

Province and crop district	Station	Precipitation			Mean temperature week ending 8 a.m. June 18	
		Week ending 8 a.m. June 18, 1973	Total since April 1	Normal since April 1	1973	Normal
		inches			degrees F.	
ALBERTA — Concluded						
2	Queenstown	3.65	5.97	4.62	59	58
3	Calgary	2.19	5.13	5.48	55	56
	Cardston	.41	3.46	5.96	54	57
	Pincher Creek	.86	4.55	6.69	55	55
	Fort MacLeod	1.52	4.07	5.86	56	60
	Claresholm	1.20	3.52	5.86	54	60
	High River	1.77	5.61	5.97	53	54
	Olds	1.66	5.08	5.23	52	55
4	Alliance	5.20	7.56	3.27	56	58
	Coronation	5.90	8.11	3.27	57	57
	Hughenden	4.78	7.45	3.35	55	58
	Lloydminster	1.67	5.12	3.55	57	58
	Stettler	4.03	6.27	4.23	56	58
	Vegreville	3.67	5.88	3.67	55	57
	Ranfurly	4.57	7.09	3.86	56	58
	Vermilion	4.62	6.80	3.42	57	57
5	Edmonton	3.19	6.51	4.78	56	58
	Lacombe	2.96	6.44	5.28	55	57
	Red Deer	1.99	5.05	6.37	55	57
	Rocky Mountain House	1.42	5.30	5.73	54	55
	Wetaskiwin	4.56	8.23	4.66	57	57
6	Campsie	2.71	7.81	4.22	53	56
	Yellowknife	N.R.	.70(2)	1.38	60	54
	Edson	.57	4.13	5.18	53	54
	Elk Point	2.14	5.16	3.72	57	56
	Whitecourt	1.85	5.97	4.63	54	55
7	Beaverlodge	1.38	3.73	3.72	51	56
	Chipewyan	.30	2.43	2.42	57	57
	Ft. Vermilion	N.R.	.71(2)	2.93	N.R.	57
	Grande Prairie	.47	2.95	3.76	54	57
	High Prairie	1.86	5.65	3.87	53	57
	Peace River	1.11	4.75	2.83	55	57
	Slave Lake	2.47	8.33	3.62	54	55
ALBERTA AVERAGE		2.58	5.48	4.29	55.5	57.4

(1) Source: Atmospheric Environment Service.
(2) Incomplete; not included in average.
N.R. — No report.

1972 Fall and 1973 Winter Precipitation Data, Prairie Provinces
Recording Stations by Crop Districts

Province, crop district and station		Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Total	% of normal
		inches								per cent
MANITOBA										
1 — Boissevain	A.	1.40	1.03	.27	.72	.07	.78	.14	4.41	65
	N.	1.53	.99	.76	.75	.97	.72	1.02	6.74	
Lyleton	A.	1.56	.67	.40	.73	T.	.30	.20	3.86	54
	N.	1.73	1.02	.76	.85	1.10	.67	1.07	7.20	
Pierson	A.	1.14	.74	.52	.52	T.	.30	.30	3.52	55
	N.	1.25	.87	.73	.79	.98	.89	.84	6.35	
2 — Pilot Mound	A.	2.28	1.03	.27	.22	.04	.38	.34	4.56	56
	N.	2.14	1.24	1.00	.73	1.10	.80	1.20	8.21	
3 — Morden	A.	2.55	1.62	.63	.74	.02	.42	.38	6.36	75
	N.	1.86	1.24	1.13	.97	1.07	.76	1.44	8.47	
Portage la Prairie.	A.	2.00	.78	.77	.65	.04	.46	.31	5.01	60
	N.	1.97	1.20	1.23	.79	1.02	.87	1.26	8.34	
Roland	A.	1.67	1.20	.40	.99E	T.	.39	.74E	5.39	70
	N.	1.82	1.12	1.02	.82	.93	.72	1.26	7.69	
5 — Winnipeg	A.	2.41	.97	.41	1.00	.10	.25	.54	5.68	70
	N.	2.07	1.37	1.07	.90	.93	.75	1.03	8.12	
6 — Great Falls	A.	2.81	1.20	1.53	1.60	.05E	.05	.25E	7.49	87
	N.	2.23	1.24	1.17	1.13	1.17	.82	.87	8.63	
Indian Bay	A.	3.58	1.32	.64	1.23	.15	.68	.31	7.91	81
	N.	2.34	1.44	1.25	1.32	1.25	.92	1.23	9.75	
Pinawa	A.	2.82	1.93	.99	1.34	.10	.54	.34	8.06	94
	N.	2.35	1.54	.96	.95	1.05	.70	1.03	8.58	
Sprague	A.	4.29	1.23	.69	.82E	.62	.33	1.01	8.99	106
	N.	2.47	1.35	1.05	.93	.96	.69	1.04	8.49	
7 — Virden	A.	.66	.81	.54	.60	.08	.71	.35	3.75	47
	N.	1.94	1.13	1.01	.97	1.08	.79	1.00	7.92	
8 — Brandon	A.	.77	.49	.41	.49	.09	.29	.23	2.77	40
	N.	1.75	.95	.87	.84	.85	.72	1.03	7.01	
10 — Birtle	A.	1.65	.34	.63	.53	.14	.45	.42	4.16	54
	N.	2.08	1.08	1.02	.88	.94	.74	1.02	7.76	
11 — Dauphin	A.	1.60	.18	.51	.74	.13	.86	.57	4.59	60
	N.	1.81	.98	1.10	.98	.94	.77	1.12	7.70	
12 — Gimli	A.	2.93	.83	.55	1.42	.07	.48	.50	6.78	79
	N.	1.98	1.57	1.32	1.05	1.00	.81	.88	8.61	
13 — The Pas	A.	2.91	.39	.85	.76	.68	.84	.80	7.23	95
	N.	2.17	1.21	1.14	.90	.73	.65	.81	7.61	
MANITOBA AVERAGE ...	A.	2.17	.93	.61	.84	.13	.47	.43	5.58	70
	N.	1.97	1.20	1.03	.92	1.00	.77	1.06	7.95	

For footnotes, see page X.

1972 Fall and 1973 Winter Precipitation Data, Prairie Provinces
Recording Stations by Crop Districts — Continued

Province, crop district and station		Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Total	% of normal
		inches								per cent
SASKATCHEWAN										
1A — Arcola	A.	1.05	.20	.35	.30	.05	.55	.27	2.77	54
	N.	1.13	.67	.64	.67	.55	.58	.87	5.11	
Estevan	A.	1.35	.34	.43	.53	.10	.40	.23	3.38	56
	N.	1.39	.93	.77	.78	.77	.65	.70	5.99	
Oxbow	A.	.98	.70	.55	.45	T.	.48E	.31E	3.47	62
	N.	1.09	.85	.88	.66	.66	.73	.71	5.58	
1B — Broadview	A.	.73	.40	.47	.55	.03	.39	.47	3.04	48
	N.	1.66	.81	.98	.71	.69	.58	.97	6.40	
Fleming	A.	.97	.52	.32	.45	.00	.58E	.30	3.14	42
	N.	1.78	.97	1.08	.79	.77	.81	1.19	7.39	
2A — Claybank	A.	1.15	1.27	.50	.32	.15	.54	.77	4.70	80
	N.	1.43	.73	.75	.64	.85	.71	.79	5.90	
Weyburn	A.	.78	.55	.51	.43	.22	.39	.34	3.22	68
	N.	1.41	.67	.51	.58	.62	.44	.54	4.77	
2B — Francis	A.	.52	.55	.48E	.10	.20	.18	.20	2.23	47
	N.	1.31	.68	.59	.56	.66	.49	.49	4.78	
Indian Head	A.	1.00	.79	.62	.80	.12	.58	.69	4.60	71
	N.	1.44	.91	.88	.79	.82	.73	.87	6.44	
Moose Jaw	A.	1.70	.84	.40	.43	.11	.59	.83	4.90	87
	N.	1.41	.75	.73	.81	.72	.55	.67	5.64	
Regina	A.	.59	.36	.43	.48	.05	.41	.51	2.83	50
	N.	1.43	.75	.71	.64	.71	.68	.72	5.64	
3AS — Limerick	A.	2.29	1.30	.30	.45	.20	.80	T.	5.34	95
	N.	1.48	.65	.66	.76	.88	.56	.64	5.63	
Radville	A.	.93	.28	.55	.50	.25	.80	.55	3.86	65
	N.	1.34	.65	.58	.76	.99	.83	.78	5.93	
3AN — Gravelbourg	A.	1.46	1.31	.50	.73	.01	.50	.32	4.83	96
	N.	1.18	.62	.64	.78	.79	.54	.50	5.05	
3BS — Hazenmore	A.	1.70	1.44	.08	.78	.08	.27	.30	4.65	81
	N.	1.00	.73	.68	.85	.95	.80	.75	5.76	
Shaunavon	A.	2.18	.75	.45	1.10	T.	.30	T.	4.78	90
	N.	1.16	.58	.57	.61	1.03	.77	.59	5.31	
Val Marie	A.	1.36	1.11	.15	.72	T.	.41	.21E	3.96	84
	N.	.70	.51	.65	.61	.79	.67	.79	4.72	
3BN — Beechy	A.	1.16	.00	T.	.06	.01	.40	.06	1.69	32
	N.	1.39	.79	.56	.51	.80	.62	.64	5.31	
Hughton	A.	1.36	.12	.65	.60	.25	.50	.30	3.78	74
	N.	1.26	.75	.61	.65	.63	.60	.61	5.11	
Swift Current ..	A.	2.39	.43	.45	.43	.12	.47	.51	4.80	80
	N.	1.38	.81	.76	.75	.87	.68	.72	5.97	

For footnotes, see page X.

1972 Fall and 1973 Winter Precipitation Data, Prairie Provinces
Recording Stations by Crop Districts — Continued

Province, crop district and station		Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Total	% of normal
		inches								per cent
SASKATCHEWAN — Continued										
4A — Maple Creek	A.	2.83	.62	.33	1.82	.06	.70	.13	6.49	110
	N.	1.27	.76	.64	.80	1.09	.74	.59	5.89	
Nashlyn	A.	1.92	.75	.30E	.80	T.	.20	.00	3.97	106
	N.	.84	.40	.40	.43	.70	.51	.45	3.73	
4B — Leader	A.	2.33	T.	.54	.85	.07	.67	.35	4.81	93
	N.	1.29	.73	.60	.47	.78	.61	.72	5.20	
Roadene	A.	1.85	.28	.35	.73	.08	.60	.52	4.41	76
	N.	1.32	.90	.66	.72	.87	.58	.79	5.84	
5A — Kelliher	A.	1.71E	.61	.70	.65	.20E	.45	1.09	5.41	83
	N.	1.52	1.06	.77	.70	.86	.67	.94	6.54	
Yorkton	A.	.98	.38	.42	.83	.03	.62	.83	4.09	58
	N.	1.67	.91	1.07	.83	.85	.76	.99	7.08	
5B Foam Lake	A.	1.36	.20	.28	.61	.18	.53	.89	4.05	61
	N.	1.60	.83	.95	.81	.88	.71	.86	6.64	
Kristines	A.	1.33	1.00	.35	.95	.40	.90	1.12	6.05	81
	N.	1.87	1.01	.93	.95	.82	.73	1.16	7.47	
6A — Davidson	A.	1.30	.26	.09	.97	.16	.98	.80	4.56	84
	N.	1.39	.76	.63	.67	.63	.67	.71	5.46	
Nokomis	A.	.61	.46	.28	.72	T.	.25	.71	3.03	49
	N.	1.62	.91	.74	.68	.98	.62	.62	6.17	
Strasbourg	A.	1.36	.57	.34	.55	.04	.59	1.17	4.62	78
	N.	1.51	.81	.69	.75	.68	.62	.83	5.89	
6B — Outlook	A.	.97	.14	.45	.87	.19	.46	.39	3.47	70
	N.	1.41	.66	.56	.53	.71	.53	.57	4.97	
Saskatoon	A.	.42	.41	.30	.75	.19	.78	.14	2.99	53
	N.	1.30	.75	.74	.72	.72	.71	.66	5.60	
Tugaske	A.	1.14	.52	.53	.87	.05	.50	1.12	4.73	77
	N.	1.52	.78	.64	.79	.84	.69	.90	6.16	
7A — Kindersley	A.	1.50	.07	.40	.55	.48	.60	.57	4.17	92
	N.	1.32	.66	.45	.52	.64	.44	.51	4.54	
Rosetown	A.	1.10	.17	.35	.53	.15	.35	.53	3.18	65
	N.	1.37	.70	.54	.57	.66	.50	.53	4.87	
7B — Biggar	A.	.80	.26	.31	.29	.24	.76	.10	2.76	57
	N.	1.13	.68	.54	.60	.60	.59	.74	4.88	
Macklin	A.	1.19	.18	.57	.46	.15	.60E	.67	3.82	70
	N.	1.25	.73	.56	.79	.76	.68	.67	5.44	
Scott	A.	1.81	.32	.65	.55	.38	.45	.27	4.43	87
	N.	1.20	.71	.64	.67	.65	.53	.67	5.07	

For footnotes, see page X.

1972 Fall and 1973 Winter Precipitation Data, Prairie Provinces
Recording Stations by Crop Districts — Continued

Province, crop district and station		Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Total	% of normal
		inches								per cent
SASKATCHEWAN — Concluded										
8A — Hudson Bay	A.	1.74	.22	1.09	.59	.35	.69	1.00	5.68	80
	N.	1.79	1.01	1.14	.81	.83	.63	.93	7.14	
Lost River	A.	1.68	.52	.91	1.32	.79	1.08	.16	6.46	89
	N.	1.56	1.12	1.03	.90	.83	.83	.95	7.22	
8B — Humboldt	A.	1.39	.58	.62	.99	.14	.64	.11	4.47	83
	N.	1.40	.79	.60	.62	.62	.58	.75	5.36	
Melfort	A.	1.65	.21	.55	.44	.19	.68	.04	3.76	56
	N.	1.57	1.06	.87	1.02	.76	.71	.71	6.70	
Pilger	A.	1.49E	.67	.69E	.85	.24	.60	.10E	4.64	63
	N.	1.67	1.09	.82	.82	.93	.87	1.16	7.36	
9A — Cameo	A.	1.76	.38	.88	.73	.56	1.09	.37	5.77	89
	N.	1.36	.87	.94	.88	.82	.72	.91	6.50	
North Battleford	A.	2.35	.58	.59	.51	.26	.48	.11	4.88	91
	N.	1.00	.81	.69	.79	.77	.63	.69	5.38	
Prince Albert ...	A.	1.44	.23	.91	.43	.40	.59	.14	4.14	68
	N.	1.37	.95	.81	.87	.68	.66	.74	6.08	
Victoire	A.	3.19	.31	1.40E	1.10	1.10	1.60	.50	9.20	146
	N.	1.64	.79	.70	1.03	.70	.63	.83	6.32	
9B — St. Walburg	A.	2.07	.17	1.27	.85E	.10E	1.45	1.22	7.13	126
	N.	1.24	.76	.66	.76	.83	.65	.77	5.67	
Waseca	A.	2.15	.44	1.36	.76	.41	.64	.52	6.28	94
	N.	1.34	.97	.89	.91	.92	.74	.88	6.65	
SASKATCHEWAN AVERAGE	A.	1.46	.50	.52	.66	.19	.60	.46	4.39	76
	N.	1.37	.80	.72	.73	.73	.65	.76	5.81	
ALBERTA										
1 — Consort Wades	A.	1.68	.22	.50	.65	.24E	.58	.66	4.53	87
	N.	1.18	.62	.64	.58	.75	.66	.76	5.19	
Manyberries	A.	1.75	.62	.11	.76	.21	.22	.07	3.74	73
	N.	.95	.59	.55	.66	.83	.67	.85	5.10	
Medicine Hat	A.	1.89	.79	.17	1.18	.07	.34	.03	4.47	79
	N.	1.30	.67	.64	.65	.89	.72	.76	5.63	
Suffield	A.	2.18	.83	.14	1.24	.14	.59	.06	5.18	104
	N.	1.38	.63	.59	.57	.77	.60	.46	5.00	
2 — Brooks	A.	2.39	.75	.06	1.62	.12	.85	.38	6.17	118
	N.	1.31	.62	.59	.59	.71	.73	.70	5.25	
Drumheller	A.	1.52	.34	.90	1.30	.05E	.89	.65	5.65	102
	N.	1.36	.70	.60	.64	.64	.65	.96	5.55	
Gleichen	A.	1.56	.70	.59	1.04	.03	.66	.29	4.87	83
	N.	1.29	.75	.74	.64	.75	.78	.90	5.85	

For footnotes, see page X.

1972 Fall and 1973 Winter Precipitation Data, Prairie Provinces
Recording Stations by Crop Districts — Continued

Province, crop district and station		Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Total	% of normal
		inches								per cent
ALBERTA — Continued										
2 — Lethbridge	A.	1.68	.71	T.	.87	.21	.51	.23	4.21	61
	N.	1.47	.90	.91	.84	.90	.88	1.01	6.91	
Raymond	A.	1.44	.62	.04	1.23	.18	.80	.21	4.52	60
	N.	1.45	.97	1.06	1.13	.90	1.02	.98	7.51	
Three Hills	A.	2.13	.40	.96	.71	.02	.83	.64	5.69	106
	N.	1.40	.82	.59	.54	.64	.64	.72	5.35	
Trochu Equity ...	A.	1.85	.19	.35	.85	T.	.60	.60	4.44	76
	N.	1.39	.91	.65	.68	.76	.71	.75	5.85	
3 — Calgary	A.	2.21	.73	.20	1.40	.13	.73	.38	5.78	103
	N.	1.39	.74	.63	.58	.67	.78	.80	5.59	
Claresholm	A.	3.15	.94	T.	1.59	.12	.83	.41	7.04	104
	N.	1.49	.95	.72	.82	.81	.90	1.05	6.74	
High River	A.	1.81	.77	.10	1.55	.35	.90	.54	6.02	88
	N.	1.55	.89	.74	.83	.81	1.01	1.00	6.83	
Pincher Creek ...	A.	2.92	2.05	.01	1.49	.39	.87	.59	8.32	89
	N.	1.88	1.18	1.26	1.15	1.25	1.18	1.45	9.35	
4 — Camrose	A.	1.56	.27	1.09	.52	.24	.55	.91	5.14	108
	N.	1.34	.55	.61	.56	.66	.53	.52	4.77	
Coronation	A.	1.41	.21	.69	.54	.38	.53	.71	4.47	77
	N.	1.43	.71	.62	.72	.82	.71	.80	5.81	
Hughenden	A.	1.85	.24	.86	.18	.38E	.83	.71	5.05	94
	N.	1.39	.65	.59	.66	.84	.69	.54	5.36	
Ranfurly	A.	2.17	.47	.97	.60	.20	.55	.66	5.62	90
	N.	1.78	.73	.78	.81	.83	.65	.67	6.25	
Stettler	A.	1.90	.25	.98	.14	T.	.11	.77	4.15	72
	N.	1.48	.65	.66	.64	.82	.79	.74	5.78	
Vermilion	A.	2.04	.47	.90	.34	.29	.50	1.23	5.77	104
	N.	1.51	.69	.63	.75	.75	.55	.66	5.54	
5 — Calmar	A.	1.97	.58	1.46	.71	.17	.43	.46	5.78	89
	N.	1.68	.82	.85	.81	.97	.80	.59	6.52	
Edmonton	A.	1.48	.50	.85	.68	.46	.50	.21	4.68	76
	N.	1.41	.73	.73	.84	.99	.79	.66	6.15	
Lacombe	A.	2.43	.61	1.06	.42	.15	.39	.34	5.40	89
	N.	1.52	.81	.59	.69	.81	.85	.82	6.09	
Red Deer	A.	2.97	.38	.54	.88	.20	.56	.64	6.17	102
	N.	1.55	.90	.61	.65	.81	.75	.77	6.04	
Rocky Mountain House.	A.	3.90	1.06	.85	1.81	.31	.83	.83	9.59	130
	N.	1.94	1.00	.80	.89	.93	.85	.98	7.39	
Wetaskiwin	A.	1.51	.23	1.08	.55	.07	.54	.57	4.55	69
	N.	1.57	.78	.73	.83	1.07	.86	.80	6.64	

For footnotes, see page X.

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA
1010523623

1972 Fall and 1973 Winter Precipitation Data, Prairie Provinces
Recording Stations by Crop Districts — Concluded

Province, crop district and station		Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Total	% of normal
		inches								per cent
ALBERTA — Concluded										
6 — Athabasca	A.	1.30	.47	.80	.82	.20	1.09	.14	4.82	66
	N.	1.47	.85	1.02	1.05	1.07	1.06	.80	7.32	
Campsie	A.	1.24	.63	.89	1.16	.20	.58	.03E	4.73	79
	N.	1.23	.67	.83	.75	.95	.92	.62	5.97	
Edson	A.	3.11	1.60	1.93	.93	.49	.74	.24	9.04	114
	N.	1.79	.95	1.01	1.02	1.22	1.02	.92	7.93	
Elk Point	A.	1.67	.39	1.22	.54	.39	.45	.65	5.31	84
	N.	1.76	.81	.82	.88	.78	.63	.65	6.33	
Iron River	A.	1.55	.94	1.23	.75	.26	.26	.20	5.19	93
	N.	1.66	.62	.77	.75	.58	.57	.63	5.58	
7 — Beaverlodge	A.	2.97	1.75	2.01	1.66	.82	1.00	.17	10.38	127
	N.	1.53	1.04	1.21	1.09	1.26	1.15	.91	8.19	
Fairview	A.	1.38	1.47	.43	1.42	1.11	1.22	.35	7.38	96
	N.	1.16	.99	1.19	1.17	1.09	1.15	.94	7.69	
Falher	A.	1.61	1.54	.47	1.20	.90	1.30	T.	7.02	87
	N.	1.50	.98	1.33	1.24	1.12	1.13	.75	8.05	
Grande Prairie ...	A.	2.02	1.39	1.66	1.34	.66	1.09	.10	8.26	102
	N.	1.35	1.02	1.22	1.20	1.34	1.11	.84	8.08	
High Prairie	A.	1.51	.45	1.15	2.08	.45	.27	T.	5.91	76
	N.	1.48	1.07	1.23	1.19	1.09	.97	.77	7.80	
ALBERTA AVERAGE	A.	1.99	.72	.74	.99	.29	.66	.42	5.81	91
	N.	1.47	.81	.80	.81	.89	.82	.80	6.40	

E. — Estimated.
A. — Actual.
N. — Normal.
T. — Trace.

Source: Atmospheric Environment Service.