



N° 84-214-XIF au catalogue

Recueil de statistiques de l'état civil, 1996



Statistique
Canada

Statistics
Canada

Canada

Des données sous plusieurs formes. . .

Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. Outre les publications, des totalisations habituelles et spéciales sont offertes. Les données sont disponibles sur Internet, disque compact, disquette, imprimé d'ordinateur, microfiche, microfilm et bande magnétique. Des cartes et d'autres documents de référence géographiques sont disponibles pour certaines sortes de données. L'accès direct à des données agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de données ordiolingue et le système d'extraction de Statistique Canada.

Comment obtenir d'autres renseignements

Toute demande de renseignements au sujet du présent produit ou au sujet de statistiques ou de services connexes doit être adressée à :

Halifax	(902) 426-5331	Regina	(306) 780-5405
Montréal	(514) 283-5725	Edmonton	(403) 495-3027
Ottawa	(613) 951-8116	Calgary	(403) 292-6717
Toronto	(416) 973-6586	Vancouver	(604) 666-3691
Winnipeg	(204) 983-4020		

Vous pouvez également visiter notre site sur le Web : <http://www.statcan.ca>

Un service d'appel interurbain sans frais est offert **à tous les utilisateurs qui habitent à l'extérieur des zones de communication locale** des centres de consultation régionaux.

Service national de renseignements	1 800 263-1136
Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants	1 800 363-7629
Numéro pour commander seulement (Canada et États-Unis)	1 800 267-6677

Renseignements sur les commandes et les abonnements

Les prix ne comprennent pas les taxes de vente

Le produit n° 84-214-XPF au catalogue est publiée occasionnellement en version imprimée standard. Au Canada, un numéro coûte 45 \$. À l'étranger, un numéro coûte 45 \$US. Veuillez commander par la poste, en écrivant à Statistique Canada, Division de la diffusion, Gestion de la circulation, 120, avenue Parkdale, Ottawa (Ontario) K1A 0T6; par téléphone, en composant le **(613) 951-7277** ou le **1 800 770-1033**; par télécopieur, en composant le **(613) 951-1584** ou le **1 800 889-9734**; ou par Internet, en vous rendant à « order@statcan.ca ». Lorsque vous signalez un changement d'adresse, veuillez fournir votre ancienne et votre nouvelle adresse. On peut aussi se procurer les produits de Statistique Canada auprès des agents autorisés, des librairies et des bureaux régionaux de Statistique Canada.

On peut aussi se procurer ce produit sur Internet (n° 84-214-XIF au catalogue). Un numéro coûte 33 \$CAN. Pour obtenir un numéro de ce produit, les utilisateurs sont priés de se rendre à http://www.statcan.ca/cgi-bin/downpub/feepub_f.cgi.

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois et dans la langue officielle de leur choix. À cet égard, notre organisme s'est doté de normes de service à la clientèle qui doivent être observées par les employés lorsqu'ils offrent des services à la clientèle. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec le centre de consultation régional de Statistique Canada le plus près de chez vous.



Statistique Canada
Division des statistiques sur la santé

Recueil de statistiques de l'état civil 1996

par Doreen Duchesne
François Nault
Heather Gilmour
Russell Wilkins

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 1999

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la présente publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, photographique, ou autre, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable des Services de concession des droits de licence, Division du marketing, Statistique Canada, Ottawa (Ontario) Canada K1A 0T6.

Octobre 1999

Prix : Canada : 45 \$
État-Unis : 45 \$US
À l'étranger : 45 \$US

N° 84-214-XPF au catalogue
ISBN 0-660-96232-2

N° 84-214-XIF au catalogue
ISBN 0-660-96232-2

Périodicité : hors série

Ottawa

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

The English version of this publication, "*Vital Statistics Compendium, 1996*," is also available on paper (catalogue 84-214-XPE, ISBN 0-660-17893-1) and on the Internet (84-214-XIE, ISBN 0-660-17893-1).

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada :

- .. nombres non disponibles
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- néant ou zéro
- - nombres infimes
- p nombres provisoires
- r nombres corrigés
- x confidentiel en vertu des dispositions de la *Loi sur la statistique* relatives au secret

Le papier utilisé dans la présente publication répond aux exigences minimales de l'« American National Standard for Information Sciences - Permanence of Paper for Printed Library Materials », ANSI Z39.48 - 1984.



TABLE DES MATIÈRES

	Page
Avant-propos	ix
Introduction	xi
La statistique de l'état civil au Canada	xi
Qualité des statistiques de l'état civil	xv
Données sur les divorces	xviii
 1. Vue d'ensemble	 1
Faits marquants - Au Canada, en moyenne chaque jour en 1996	2
Tableau 1.1 - Sommaire des statistiques de l'état civil, Canada, provinces et territoires, 1996	3
 2. Mariages	 5
Faits marquants - Nombre quotidien moyen de mariages selon le mois au Canada en 1996	6
Tableau 2.1 - Mariages et taux bruts de nuptialité, Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996	7
Tableau 2.2 - Indices synthétiques de primonuptialité selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996	8
Tableau 2.3 - Âge moyen au mariage selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996	9
Tableau 2.4 - Âge moyen au premier mariage selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996	10
Tableau 2.5 - Mariages et taux de nuptialité selon l'âge du marié, Canada, provinces et territoires, 1996	11
Tableau 2.6 - Mariages et taux de nuptialité selon l'âge de la mariée, Canada, provinces et territoires, 1996	12
Tableau 2.7 - Nombre et pourcentage de conjoints se mariant pour la première fois, Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996	13
 3. Divorces	 15
Tableau 3.1 - Divorces et taux bruts de divortialité, Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996	16
Tableau 3.2 - Indices synthétiques de divortialité, Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996	17
Tableau 3.3 - Taux de divortialité selon l'année du mariage, Canada, provinces et territoires, 1996	18
 4. Naissances	 19
Faits marquants - Nombre quotidien moyen de naissances vivantes selon le mois au Canada en 1996	20

TABLE DES MATIÈRES - suite

	Page
Tableau 4.1 - Naissances vivantes et taux bruts de natalité, Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996	21
Tableau 4.2 - Naissances vivantes selon l'âge de la mère et taux de fécondité par âge, Canada, provinces et territoires, 1996	22
Tableau 4.3 - Indices synthétiques de fécondité, Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996	23
Tableau 4.4 - Naissances vivantes et taux de natalité chez les adolescentes, Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996	24
Tableau 4.5 - Naissances vivantes chez les femmes de 30 ans et plus, Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996	25
Faits marquants - Les prénoms les plus à la mode en 1996	26
Tableau 4.6 - Nombre et répartition en pourcentage des naissances vivantes selon la parité, Canada, provinces et territoires, 1986 et 1996	27
Tableau 4.7 - Âge moyen à la procréation, toutes les naissances et premières naissances, Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996	28
Tableau 4.8 - Nombre et proportion de naissances chez les femmes non mariées, Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996	29
Faits marquants - Naissances survenues en 1996 à l'extérieur de la province ou du territoire de résidence de la mère	30
Tableau 4.9 - Nombre et proportion de naissances vivantes avec faible poids à la naissance (inférieur à 2 500 grammes), Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996	31
Tableau 4.10 - Faible poids à la naissance (inférieur à 2 500 grammes), selon certaines caractéristiques de la mère et de l'enfant, Canada, 1996	32
Tableau 4.11 - Nombre et proportion de naissances vivantes prématurées (moins de 37 semaines de gestation), Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996	33
Tableau 4.12 - Naissances vivantes prématurées (moins de 37 semaines de gestation), selon certaines caractéristiques de la mère et de l'enfant, Canada (Ontario non compris), 1996	34
Tableau 4.13 - Nombre de naissances multiples et taux de naissances multiples, Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996	35
 5. Mortalité fœtale et infantile	 37
Tableau 5.1 - Mortinaissances après au moins 20 semaines de gestation et taux de mortinatalité, Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996	38
Tableau 5.2 - Mortinaissances après au moins 28 semaines de gestation et taux de mortinatalité, Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996	39
Tableau 5.3 - Décès infantiles et taux de mortalité infantile, Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996	40
Tableau 5.4 - Décès néonataux précoces et taux de mortalité néonatale précoce, Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996	41
Tableau 5.5 - Décès néonataux et taux de mortalité néonatale, Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996	42

TABLE DES MATIÈRES - suite

	Page
Tableau 5.6 - Décès postnéonataux et taux de mortalité postnéonatale, Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996	43
Tableau 5.7 - Décès infantiles et taux de mortalité infantile (bébés de poids à la naissance inférieur à 500 grammes non compris), Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996	44
Tableau 5.8 - Décès périnataux et taux de mortalité périnatale, Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996	45
Tableau 5.9 - Certaines causes de décès infantiles et de mortinaissances, Canada, 1996	46
6. Mortalité globale	47
Faits marquants - Nombre quotidien moyen de décès selon le mois au Canada en 1996	48
Tableau 6.1 - Décès et taux bruts de mortalité, Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996	49
Tableau 6.2 - Décès et taux de mortalité des hommes selon l'âge, Canada, provinces et territoires, 1996	50
Tableau 6.3 - Décès et taux de mortalité des femmes selon l'âge, Canada, provinces et territoires, 1996	51
Graphiques et faits saillants pour les tableaux 6.2 et 6.3	52
Faits marquants - Décès survenus en 1996 à l'extérieur de la province ou du territoire de résidence de la personne décédée	53
Tableau 6.4 - Espérance de vie à la naissance, selon le sexe, Canada et provinces, 1986 à 1996	54
Tableau 6.5 - Espérance de vie à 65 ans, selon le sexe, Canada et provinces, 1986 à 1996	55
Tableau 6.6 - Probabilité de survie de la naissance jusqu'à 80 ans, selon le sexe, Canada et provinces, 1986 à 1996	56
7. Causes de décès	57
Faits marquants - Les 10 premières causes principales de décès chez l'homme et chez la femme en 1996	58
Faits saillants - Causes principales de décès et taux comparatifs de mortalité selon le sexe	59
Tableau 7.1 - Causes principales de décès et taux comparatifs de mortalité selon le sexe, Canada, 1996	63
<i>Taux comparatifs de mortalité selon le sexe, Canada, 1979 à 1996, et selon la province, 1995 et 1996 :</i>	
Figure 7.1 - Toutes les causes (CIM-9 : 001-799; E800-E999)	64
Figure 7.2 - Tous les cancers (CIM-9 : 140-208)	65
Figure 7.3 - Cancer de la trachée, des bronches et du poumon (CIM-9 : 162)	66
Figure 7.4 - Cancer du côlon, du rectum, de la jonction rectosigmoïdienne et de l'anus (CIM-9 : 153-154)	67

TABLE DES MATIÈRES - suite

	Page
Figure 7.5 - Cancer du sein chez la femme (CIM-9 : 174)	68
Figure 7.6 - Cancer de la prostate (CIM-9 : 185)	69
Figure 7.7 - Cancer du pancréas (CIM-9 : 157)	70
Figure 7.8 - Maladies de l'appareil circulatoire (CIM-9 : 390-459)	71
Figure 7.9 - Cardiopathies (CIM-9 : 391, 392.0, 393-398, 402, 404, 410-416, 420-429)	72
Figure 7.10 - Cardiopathies ischémiques (CIM-9 : 410-414)	73
Figure 7.11 - Infarctus aigu du myocarde (CIM-9 : 410)	74
Figure 7.12 - Insuffisance cardiaque (CIM-9 : 428)	75
Figure 7.13 - Troubles du rythme cardiaque (CIM-9 : 427)	76
Figure 7.14 - Maladies cérébrovasculaires (CIM-9 : 430-438)	77
Figure 7.15 - Hémorragie cérébrale et autres hémorragies intracrâniennes (CIM-9 : 431-432)	78
Figure 7.16 - Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes (CIM-9 : 490-496)	79
Figure 7.17 - Obstruction chronique des voies respiratoires, non classée ailleurs (CIM-9 : 496)	80
Figure 7.18 - Traumatismes accidentels (CIM-9 : E800-E949)	81
Figure 7.19 - Accidents impliquant des véhicules à moteur (CIM-9 : E810-E825, E929.0)	82
Figure 7.20 - Chutes accidentelles (CIM-9 : E880-E888, E929.3)	83
Figure 7.21 - Pneumonie et grippe (CIM-9 : 480-487)	84
Figure 7.22 - Diabète sucré (CIM-9 : 250)	85
Figure 7.23 - Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central (CIM-9 : 330-337)	86
Figure 7.24 - Maladie d'Alzheimer (CIM-9 : 331.0)	87
Figure 7.25 - Maladies des artères, artérioles et capillaires (CIM-9 : 440-448)	88
Figure 7.26 - Anévrisme de l'aorte (CIM-9 : 441)	89
Figure 7.27 - Athérosclérose (CIM-9 : 440)	90
Figure 7.28 - Psychoses (CIM-9 : 290-299)	91
Figure 7.29 - Suicide (CIM-9 : E950-E959)	92
Figure 7.30 - Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose (CIM-9 : 580-589)	93
Figure 7.31 - Maladies chroniques et cirrhose du foie (CIM-9 : 571)	94
Figure 7.32 - Infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) (CIM-9 : 042-044)	95
Figure 7.33 - Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques (CIM-9 : 300-316)	96
Faits saillants - Causes principales de décès selon l'âge et le sexe	97
Tableau 7.2 - Causes principales de décès selon l'âge et le sexe, Canada, 1996	99
Faits saillants - Décès dus à des causes extérieures	101
Tableau 7.3 - Nombre de décès dus à des causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800-E999), Canada, 1996	103

TABLE DES MATIÈRES - suite

	Page
8. Statistiques de l'état civil selon la division de recensement	105
Introduction	106
Carte 8.1 - Taux bruts de nuptialité selon la division de recensement, moyennes de 1994 à 1996, Canada	108
Carte 8.2 - Indices synthétiques de fécondité selon la division de recensement, moyennes de 1994 à 1996, Canada	109
Carte 8.3 - Pourcentage de naissances vivantes avec faible poids à la naissance (moins de 2 500 grammes), selon la division de recensement, moyennes de 1994 à 1996, Canada	110
Carte 8.4 - Taux de mortalité infantile selon la division de recensement, moyennes de 1994 à 1996, Canada	111
Carte 8.5 - Taux comparatifs de mortalité des hommes selon la division de recensement, moyennes de 1994 à 1996, Canada	112
Carte 8.6 - Taux comparatifs de mortalité des femmes selon la division de recensement, moyennes de 1994 à 1996, Canada	113
Tableau 8.1 - Certaines statistiques de l'état civil selon la division de recensement, Canada, 1996 et 1994 à 1996	114
Carte 8.7 - Divisions de recensement de 1996, Canada	121
Carte 8.8 - Divisions de recensement de 1996, Ouest canadien	122
Carte 8.9 - Divisions de recensement de 1996, centre et est du Canada	123
 9. Comparaisons internationales	 125
Faits saillants	126
Tableau 9.1 - Taux bruts de nuptialité dans les pays membres de l'OCDE, certaines années, 1970 à 1996	129
Tableau 9.2 - Indices synthétiques de fécondité dans les pays membres de l'OCDE, certaines années, 1970 à 1996	130
Tableau 9.3 - Taux de mortalité infantile dans les pays membres de l'OCDE, certaines années, 1970 à 1996	131
Tableau 9.4 - Espérance de vie à la naissance dans les pays membres de l'OCDE, selon le sexe, certaines années, 1971 à 1996	132
Tableau 9.5 - Taux comparatifs de mortalité dans les pays membres de l'OCDE, selon le sexe, certaines causes, 1992 à 1995	133
 10. Annexes	 135
Annexe 1 - Estimations démographiques corrigées, selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1 ^{er} juillet 1996	136
Annexe 2 - Estimations démographiques corrigées, selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1 ^{er} juillet, 1986 à 1996	137
Annexe 3 - Méthode de classement des causes principales de décès	138
Annexe 4 - Calcul des taux comparatifs de mortalité (TCM)	141
Annexe 5 - Codes de la CIM-9 utilisés pour totaliser les décès dus à des causes extérieures de traumatismes et empoisonnements	142

TABLE DES MATIÈRES - fin

	Page
11. Glossaire	145
12. Références	155

AVANT-PROPOS

Le *Recueil de statistiques de l'état civil* donne un aperçu des diverses catégories de données regroupées sous le nom de statistiques de l'état civil. Les données sur les naissances vivantes, les mortinaissances et les décès en sont des éléments de base. Certains des indicateurs démographiques et de la santé parmi les plus significatifs reposent sur ces données, notamment l'espérance de vie, la mortalité infantile, les causes de décès, les taux de fécondité et les variations démographiques. Ces données sont aussi les points de départ et d'arrivée de données plus complètes sur la santé axées sur la personne.

La présente publication inclut les données sur les mariages parce qu'elles sont recueillies par les mêmes bureaux provinciaux et territoriaux de l'état civil qui recueillent les données sur les naissances vivantes, les mortinaissances et les décès. Enfin, on présente aussi les données sur les divorces en raison de leur lien avec les données sur les mariages. La popularité croissante de l'union de fait et la proportion de plus en plus forte de naissances qui surviennent en dehors du mariage confèrent toutefois à ces données une moindre valeur sur le plan social qu'auparavant. Néanmoins, les mariages demeurent une activité d'une importance économique considérable et marquent le début d'un contrat légal de durée indéfinie. Pareillement, les divorces marquent le terme de ce contrat et ont des conséquences économiques pour les particuliers concernés. En outre, les membres de certains comités parlementaires et de la presse se sont récemment lancés dans un vif débat sur les conséquences du divorce et des dispositions subséquentes relatives à la garde des enfants et aux pensions alimentaires.

De nombreuses personnes ont contribué à la présente publication. François Nault a conçu le *Recueil* et supervisé l'élaboration de la première ébauche; Doreen Duchesne a préparé le chapitre sur les « causes de décès » et révisé le manuscrit; Heather Gilmour s'est chargée des chapitres intitulés « Statistiques de l'état civil selon la division de recensement » et « Comparaisons internationales »; Russell Wilkins a supervisé la production de l'ébauche finale et rédigé l'introduction; Rochelle Handleman et Susan Schaan ont participé aux premières étapes du traitement des données; Claude Grenier et Patricia Tully sont intervenues à l'étape ultérieure de la préparation des tableaux et de la vérification des données; Richard Trudeau a élaboré la méthode de sélection des causes principales de décès; enfin, Allan Rowell de la Division de la géographie a collaboré à la production des cartes. Les membres du personnel de soutien technique, Marc Saint-Laurent, Barbara Riggs, Colette Coghlan, Paula Woollam, Renée Bourbonnais, Micheline Pilon, Bernie Edwards et Agnès Jones, ont fourni une aide précieuse aux diverses étapes de la production. Enfin, le *Recueil* a été produit sous l'égide de Cyril Nair (auparavant chef, Section des données sur la santé et sur l'état civil) et Pamela White (auparavant directrice adjointe, Division des statistiques sur la santé).

Nous remercions vivement de leur collaboration les fournisseurs de données, c'est-à-dire les bureaux provinciaux et territoriaux de l'état civil et le Bureau d'enregistrement des actions en divorce du ministère de la Justice du Canada.

Nous espérons que les lecteurs jugeront utile l'information contenue dans ce *Recueil*. Ils peuvent adresser leurs commentaires sur la présentation et sur le contenu à Doreen Duchesne, par téléphone, au (613) 951-6379, par télécopieur, au (613) 951-0792, ou par courrier électronique, à l'adresse duchdor@statcan.ca.

Gary Catlin, directeur
Division des statistiques sur la santé

Octobre 1999

INTRODUCTION

Le *Recueil de statistiques de l'état civil* comprend des données sommaires sur les mariages, les divorces, les naissances vivantes, les mortinaissances et les décès. La présente introduction donne l'historique de la collecte et du traitement des données de l'état civil au Canada et en décrit les objectifs et l'organisation; on y traite aussi des sources, de la qualité et des méthodes de collecte des données de l'état civil. Le premier chapitre donne un aperçu des statistiques de l'état civil pour 1996. Les chapitres suivants ont pour thème les mariages, les divorces, les naissances, la mortalité fœtale et infantile, la mortalité globale, les causes de décès, les données selon la division de recensement et les comparaisons internationales. La plupart des graphiques et des tableaux contiennent des données tant nationales que provinciales et territoriales pour la période allant de 1986 à 1996; cependant, les données sur les causes de décès sont présentées à l'échelle nationale pour la période allant de 1979 à 1996, et à l'échelle provinciale et territoriale pour 1995 et 1996. Les annexes fournissent les données démographiques utilisées comme dénominateurs pour le calcul des taux, la méthode de calcul des taux comparatifs de mortalité, celle appliquée pour sélectionner les causes principales de décès et le tableau des codes de la *Classification internationale des maladies* (CIM) utilisés pour totaliser le nombre de décès dus à des causes extérieures. Le glossaire et la bibliographie figurent après les annexes.

Le système d'enregistrement des statistiques de l'état civil couvre l'ensemble des naissances, des décès et des mariages qui surviennent au Canada, mais on a exclu, dans la présente publication, les naissances et les décès se rapportant à des non-résidents temporairement au Canada. Les naissances et les décès de résidents du Canada survenus aux États-Unis, qui sont déclarés aux termes d'une entente réciproque, sont inclus. Par contre, les naissances et les décès concernant des résidents du Canada qui surviennent ailleurs qu'au Canada ou aux États-Unis sont exclus. Les données sur les mariages — qui sont présentées ici selon le lieu de l'événement uniquement — englobent les mariages de non-résidents qui ont lieu au Canada (p. ex., touristes japonais qui se marient à Jasper), mais n'incluent pas les mariages de résidents du Canada qui ont lieu ailleurs (y compris aux États-Unis).

La statistique de l'état civil au Canada

Historique

Le Bureau fédéral de la statistique (BFS, aujourd'hui Statistique Canada) a été créé en 1918 en vertu de la *Loi sur la statistique*. Deux conférences fédérales-provinciales ont été tenues subséquemment pour établir le système canadien de la statistique de l'état civil auquel participeraient le BFS et les bureaux provinciaux de l'état civil. Aux termes de ce projet collectif, le BFS devait fournir les formulaires d'enregistrement normalisés pour les naissances vivantes, les mortinaissances, les décès et les mariages¹; les provinces, quant à

¹ Les données sur le divorce ne font pas partie du système d'enregistrement des données de l'état civil décrit ici, mais elles figurent dans le *Recueil*, compte tenu de leur lien avec les données sur le mariage. Des renseignements généraux sur les statistiques sur le divorce sont fournis plus loin dans la présente section.

elles, devaient envoyer au BFS des transcriptions des formulaires dûment remplis. Au départ, huit provinces ont participé au système coopératif et leurs efforts ont mené à la publication du premier rapport annuel pour le Canada en 1921. Le Québec s'est joint au groupe en 1926 et Terre-Neuve, en 1949. Les données provenant des territoires ont été incluses pour la première fois dans les publications régulières en 1950.

Objectifs

L'enregistrement complet et exact de tous les événements démographiques au Canada continue d'être l'objectif principal de cet effort collectif des provinces, des territoires et de Statistique Canada. En vertu d'une entente fédérale-provinciale, l'enregistrement des naissances vivantes, des mortinaissances, des décès et des mariages incombe aux provinces et aux territoires. Les systèmes provinciaux et territoriaux d'enregistrement sont établis avant tout pour obtenir et pour conserver les preuves documentaires nécessaires pour protéger les droits de chaque personne. À n'importe quel moment après l'enregistrement, la personne ou la famille concernée peut consulter les registres afin d'obtenir une preuve des faits se rapportant à une naissance, une mortinaissance, un décès ou un mariage.

Outre l'enregistrement des événements démographiques, les bureaux provinciaux et territoriaux de l'état civil produisent des statistiques. Ces données sont utilisées à grande échelle par les spécialistes des politiques gouvernementales, mais elles servent aussi au monde de la recherche et à d'autres professionnels de la santé pour les estimations et les projections démographiques, l'analyse des tendances démographiques, la surveillance médicale et la recherche épidémiologique.

Les lois provinciales et territoriales sur la statistique de l'état civil (ou les textes législatifs équivalents) rendent obligatoire l'enregistrement de chaque naissance vivante, mortinaissance, décès ou mariage survenu dans la province ou le territoire. Ces lois se rapprochent le plus possible d'une loi modèle sur la statistique de l'état civil² qui a été approuvée par décret en 1919 pour favoriser l'uniformité des lois et des méthodes de déclaration des provinces et des territoires.

Une entente entre le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux régit le fonctionnement du système canadien de la statistique de l'état civil. Le Conseil de la statistique de l'état civil du Canada, comité consultatif créé par décret qui compte des représentants de chaque province et territoire et de Statistique Canada, coordonne le règlement des questions de politique et de fonctionnement. Aux termes de l'entente, tous les registraires sont tenus de recueillir systématiquement un ensemble précis de données élémentaires, mais ont la liberté de recueillir des renseignements supplémentaires.

² Voir *Fair* (1994).

Données élémentaires

Naissances vivantes Dans la plupart des provinces, le formulaire principal d'enregistrement d'une *naissance vivante* est rempli par les parents qui doivent le présenter à l'officier de l'état civil de leur région. Dans la plupart des provinces, le médecin (ou la personne qui assiste à l'accouchement) doit aussi déclarer la naissance. Le bureau central de l'état civil de chaque province ou territoire fournit à Statistique Canada des copies sur microfilm ou des images électroniques des formulaires d'enregistrement des naissances, ainsi que les données codées tirées de ces formulaires. Tous les bureaux fournissent des éléments de données sur les naissances pour les variables suivantes : date et lieu de la naissance; sexe et poids du nouveau-né et durée de la gestation; âge, état matrimonial et lieu de naissance de chaque parent; lieu de résidence de la mère; type de naissance (simple ou multiple); parité (nombre total d'enfants nés vivants et de mort-nés mis au monde par la mère). Le poids à la naissance et la durée de la gestation sont déclarés par les parents dans la plupart des provinces ou territoires, sauf à Terre-Neuve et au Québec (où les renseignements sont fournis par le médecin) et en Colombie-Britannique (depuis 1997). Cependant, les renseignements tirés du rapport du médecin peuvent servir à corriger la déclaration des parents en ce qui concerne ces deux variables.

Décès Le formulaire d'enregistrement d'un *décès* comprend deux parties, l'une pour l'enregistrement des renseignements personnels et l'autre, pour l'enregistrement des renseignements médicaux. Les renseignements personnels sont fournis à l'entrepreneur de pompes funèbres par une personne bien informée, ordinairement un parent de la personne décédée. La partie du formulaire correspondant au certificat médical de décès est remplie par le médecin qui a constaté le décès ou par le médecin légiste dans les cas où il y a une enquête. L'entrepreneur de pompes funèbres, ou la personne qui joue ce rôle, doit inscrire sur le formulaire d'enregistrement du décès les détails concernant l'inhumation ou toute autre disposition prise en ce qui concerne la dépouille et doit présenter le formulaire dûment rempli au registraire du bureau local de l'état civil qui délivrera le permis d'inhumer. Tous les bureaux de l'état civil transmettent les données sur les variables suivantes : âge, sexe, état matrimonial, lieu habituel de résidence et lieu de naissance de la personne décédée; date du décès; cause du décès; lieu du décès; lieu de l'accident (pour la plupart des décès accidentels non dus à un accident de transport); autopsie (exécutée ou non, et, dans l'affirmative, prise en compte ou non des résultats pour établir la cause du décès).

Mortinaissances Le formulaire d'enregistrement d'une *mortinaissance* regroupe en un seul document les renseignements sur la naissance et sur le décès ou comprend une déclaration de mortinaissance et un certificat médical de mortinaissance. Les exigences de déclaration sont les mêmes que pour les naissances vivantes et les décès. Les variables pour lesquelles des données sont déclarées lors de l'enregistrement d'une mortinaissance englobent celles énoncées pour une naissance ainsi que pour un décès. La plupart des provinces et territoires fournissent des données pour deux variables supplémentaires, en précisant si la mort du fœtus est survenue avant ou durant le travail et si le travail a été provoqué.

Mariages Le formulaire d'enregistrement d'un *mariage* est rempli par le marié et la mariée et présenté à l'officier de l'état civil de la région par le célébrant (personne qui célèbre le mariage). Le bureau central de l'état civil de chaque province ou territoire fournit à Statistique Canada les données tirées des formulaires d'enregistrement des mariages. Des données sont transmises pour les variables suivantes : dates de naissance du marié et de la mariée (sauf à Terre-Neuve et en Ontario); âges et états matrimoniaux du marié et de la mariée avant le mariage; lieux de naissance du marié et de la mariée (sauf à Terre-Neuve et au Manitoba); lieux de résidence du marié et de la mariée (sauf à Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et en Saskatchewan); confession du marié et de la mariée (sauf en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et au Québec); lieux de naissance des parents du marié et de ceux de la mariée (sauf à Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse, au Québec, en Ontario et au Manitoba); date et lieu du mariage et genre de célébrant; permis ou bans (sauf à Terre-Neuve, au Québec et en Alberta) et confession du célébrant (sauf en Nouvelle-Écosse et au Québec).

Traitement des données

Chaque province et territoire transmet à Statistique Canada des copies sur microfilm ou des images optiques des formulaires d'enregistrement des naissances vivantes, des décès, des mortinaissances et des mariages. En outre, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Québec, l'Ontario et les provinces de l'Ouest extraient des formulaires les données de base requises et les transmettent à Statistique Canada sous une forme lisible par machine. Pour l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve (sauf dans le cas des naissances vivantes) et pour les territoires, Statistique Canada s'occupe de mettre sous une forme lisible par machine les données de base qui lui sont fournies sur microfilm. Les modifications à apporter par la suite aux enregistrements à cause d'erreurs ou d'omissions sont communiquées à Statistique Canada aussitôt que les renseignements sont disponibles. Toutefois, les totalisations publiées ne reflètent pas les modifications reçues après la date limite.

Les provinces qui fournissent des données sous forme lisible par machine procèdent aussi au codage et à la vérification des données avant de les transmettre à Statistique Canada. Les méthodes de vérification varient d'une province ou d'un territoire à l'autre, mais incluent habituellement le contrôle de la présence des données, la validation des fourchettes de codes, au besoin, et des contrôles de cohérence entre éléments de données connexes, comme le poids à la naissance et la durée de la gestation, l'état matrimonial et l'âge, ou la cause de décès et le sexe.

Statistique Canada fournit aux bureaux de l'état civil de chaque province et territoire divers manuels, comme la *Classification internationale des maladies* (CIM) et la *Classification géographique type* (CGT), pour favoriser la production de données fiables et cohérentes; Statistique Canada offre aussi des services de formation et de consultation relatifs au codage des causes de décès.

Statistique Canada se charge de coder la cause de décès (dans le cas des décès ainsi que des mortinaissances) pour les provinces de l'Atlantique et les territoires, les renseignements géographiques pour le Yukon, ainsi que les déclarations visant des personnes qui ne résident pas dans la province ou le territoire où est survenu

l'événement. En ce qui concerne les naissances ou les décès de résidents du Canada survenus aux États-Unis, Statistique Canada code les renseignements nosologiques ainsi que géographiques; il se charge aussi de convertir en une présentation type les fichiers lisibles par machine fournis par certaines provinces. Enfin, les données requises que les provinces et territoires ne fournissent pas sous forme lisible par machine sont saisies sous une présentation type.

Puis, l'ensemble des données transmises par les provinces et les territoires sont soumises à une série de vérifications pour s'assurer de leur complétude et de leur qualité. Statistique Canada corrige la plupart des erreurs et des omissions décelées durant le traitement en se reportant aux enregistrements transmis sur microfilm, ou en consultant la province ou le territoire concerné. Récemment, Statistique Canada a élaboré des spécifications normalisées de vérification afin de les intégrer aux systèmes provinciaux de vérification des données.

Depuis 1990, l'Ontario utilise la technologie de l'imagerie optique pour emmagasiner les copies des documents d'enregistrement, si bien que ceux-ci ne sont plus copiés sur microfilm. De 1990 à 1995, il n'a pas été possible de vérifier complètement les statistiques de l'état civil déclarées par l'Ontario, parce que les images optiques n'ont pas été transmises à Statistique Canada. Les données pour lesquelles le code est invalide sont classées dans la catégorie « non déclarée » et les situations peu plausibles sont acceptées telles qu'elles ont été déclarées. À partir de 1996, on a de nouveau pu vérifier complètement les données transmises par l'Ontario grâce à la transmission d'images optiques à Statistique Canada.

Qualité des statistiques de l'état civil

Couverture

Étant donné les exigences légales de déclaration, on considère l'enregistrement des naissances, des décès, des mortinaissances et des mariages comme étant virtuellement complet. Cependant, les enregistrements reçus après la date limite (enregistrements tardifs) ne sont pas inclus dans les totalisations annuelles au moment de leur diffusion, situation qui se traduit par un certain sous-dénombrement. Par exemple, en 1994, les renseignements sur 280 décès et sur 1 720 naissances vivantes ont été transmis trop tard pour être inclus dans les totalisations. Le compte des enregistrements tardifs de mortinaissance et de mariage n'a pas été fait.

Complétude

La complétude de la déclaration des principales données élémentaires varie selon l'élément de données, la province ou le territoire déclarant et l'année. Pour l'ensemble des données sur les *décès*, provinces et territoires confondus, pour la période allant de 1991 à 1996, la complétude des données était d'au moins 99 % pour l'âge, le sexe, l'état matrimonial, le lieu de résidence et la cause de décès, de 95 % à 96 % pour le lieu de naissance du défunt, de 28 % à 30 % pour le lieu de naissance des parents du défunt et de 20 % à 22 % pour le lieu de l'accident (ordinairement, sans objet). Pour les données sur

les *naissances vivantes*, en 1996, la complétude des renseignements était de 98 % à 100 % pour la plupart des variables, sauf l'état matrimonial de la mère et l'âge et le lieu de naissance du père (de 91 % à 93 %). Pour les données sur les *mortinaissances*, en 1996, la complétude des renseignements était de 98 % à 100 % pour le lieu de l'événement, le type de naissance (simple ou multiple), le sexe, la durée de la gestation, la parité et l'âge de la mère, de 96 % pour le poids à la naissance, de 81 % pour la cause initiale de décès, de 85 % pour l'état matrimonial de la mère et de 86 % pour la personne ayant assisté à l'accouchement. Pour les données sur les *mariages*, la complétude des principales données élémentaires varie selon l'élément, la province ou le territoire déclarant et l'année. Dans la plupart des provinces et territoires, en 1996, la déclaration était pratiquement complète quand des renseignements étaient déclarés pour l'élément de données. Toutefois, nombre d'éléments de données (y compris la province de résidence) n'ont fait l'objet d'aucune déclaration dans une ou plusieurs provinces. Donc, les seules variables pour lesquelles des données ont été déclarées par toutes les provinces sont les âges et états matrimoniaux de la mariée et du marié avant le mariage, le lieu du mariage et le genre de célébrant.

En 1991, Statistique Canada a signé avec Terre-Neuve une entente lui permettant d'utiliser les données provenant du fichier de notification des naissances vivantes fournies par le ministère de la Santé de Terre-Neuve. Ce fichier fournit des renseignements plus complets, en ce qui concerne le nombre de naissances enregistrées ainsi que le nombre de variables pour lesquelles des données sont recueillies, que n'en fournissait antérieurement le bureau provincial de l'état civil. Avant 1991, le bureau d'enregistrement ne fournissait que le nombre de naissances déterminé d'après les formulaires d'enregistrement remplis par les parents (appelés déclaration de naissance), nombre qui devait ordinairement être corrigé pour tenir compte du sous-dénombrement. Par conséquent, les données des tableaux chronologiques sur les naissances ne couvrent pas Terre-Neuve, sauf celles correspondant au nombre total de naissances. Depuis 1995, le bureau de la statistique de l'état civil de la province transmet à Statistique Canada des enregistrements composites s'appuyant sur les deux documents susmentionnés.

Exactitude de la saisie et du codage des données

Un projet a été conçu pour évaluer les erreurs de codage et de saisie des données. Dans le cadre de ce projet, les données d'un échantillon d'enregistrements seront de nouveau saisies et codées, puis comparées à celles des enregistrements qui figurent dans la base nationale de données de l'état civil. En ce qui concerne les enregistrements de naissances, les éléments de données à examiner incluent la date de la naissance, la durée de la gestation, le sexe et le poids à la naissance de l'enfant, le type de naissance, ainsi que l'âge, la parité, l'état matrimonial et le lieu habituel de résidence de la mère. Pour les enregistrements des décès, les éléments de données en cours d'examen incluent la date, le lieu, la nature et la cause du décès et certaines caractéristiques de la personne décédée (sexe, date de naissance, âge au moment du décès, état matrimonial, lieu habituel de résidence, lieu de naissance et lieu de naissance des parents).

Des évaluations comparables de la qualité des données ont été menées antérieurement sur un échantillon d'enregistrements de 1980 et de 1981 pour les 10 provinces (Nagnur,

Currie et Heath, 1981; Nagnur *et al.*, non daté). Des échantillons d'enregistrements provenant des fichiers définitifs, vérifiés, lisibles par machine, ont été comparés aux versions recodées des documents originaux sur microfilm. On a ainsi repéré diverses sources d'erreur qui ont été décrites pour permettre d'améliorer le processus de collecte des données, par exemple en ce qui concerne la formation des personnes chargées du codage. Dans l'ensemble, ces études ont montré que le taux d'erreur était assez faible pour la plupart des variables. Cependant, des réserves ont été émises quant au codage géographique du lieu de résidence de la personne décédée (au niveau local ou municipal) et à l'égard du codage de la cause initiale de décès.

La cause de certains décès, notamment ceux survenus par homicide ou par suicide, pourrait avoir été classée provisoirement dans une catégorie non spécifique (comme « autres causes inconnues et non précisées », code 799.9 de la CIM-9) au moment de la première déclaration des données à Statistique Canada, avant que soit réalisée une enquête ou une autopsie (Young et Wagner, 1994; Wilkins, 1994). Par exemple, en Alberta en 1985 et en Ontario en 1990, un nombre de décès plus élevé qu'à l'ordinaire ont été classés dans les catégories des causes autres, inconnues, non précisées ou mal définies et un moins grand nombre dans celles des décès dus à un accident, à un empoisonnement ou aux conséquences d'actes de violence (p. ex., suicide ou homicide). Bien que des renseignements plus précis soient ordinairement transmis à une date ultérieure, les données publiées n'en tiennent pas compte.

Modifications du codage des causes de décès au fil du temps

Depuis 1979 au Canada, les rapports contenant des renseignements sur la cause de décès se fondent sur la 9^e révision de la *Classification internationale des maladies* (CIM-9). L'adoption de cette 9^e version, qui reflète une restructuration de la classification et certaines modifications des règles de détermination de la cause initiale de décès, a provoqué certaines discontinuités par rapport aux données classées selon les révisions antérieures. Par conséquent, toute comparaison des catégories de la CIM-9 à celles de révisions antérieures de la classification, que ce soit selon le code de catégorie ou le titre de la maladie, devrait faire référence à la CIM-9 ainsi qu'à la (aux) classification(s) antérieure(s). Il convient d'être particulièrement prudent pour certaines catégories, sections ou chapitres de la CIM, y compris la catégorie 558, qui contient des états classés antérieurement dans le chapitre sur les maladies infectieuses; la catégorie 579, qui comprend certains états classés antérieurement dans le chapitre sur les maladies endocriniennes; les catégories 390 à 398 et 424, où l'on ne suppose plus que l'origine est rhumatismale pour certains états; les catégories 490 à 493 pour l'asthme, la bronchite et l'emphysème, catégories à l'égard desquelles il n'est plus possible de coupler les données sur les maladies; la section sur la grossesse aboutissant à l'avortement (630 à 639), qui inclut maintenant les grossesses ectopiques; le chapitre sur les états périnataux, où on a modifié les limites d'âge; et le chapitre sur les symptômes, signes et états morbides mal définis, où certains symptômes ont été éliminés et intégrés à d'autres chapitres traitant d'appareils organiques particuliers.

En outre, étant donné l'importance croissante de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), la CIM-9 comporte un addendum qui fournit des codes particuliers pour l'infection par le VIH. Ces codes (042, 043 et 044), intégrés au

chapitre I de la CIM-9 sur les maladies infectieuses et parasitaires, sont utilisés au Canada depuis 1987. Auparavant, on classait l'infection par le VIH, si elle était identifiée de la sorte, dans la catégorie des troubles immunitaires, qui figure au chapitre III.

Actualité des données

Les données sont habituellement produites vers la fin de l'année qui suit l'année de référence visée et les totalisations sont diffusées peu après. La publication des totalisations pour 1996 a été retardée à cause de l'annulation de l'ancien programme de publication.

Estimations démographiques et taux

Avant 1992, les données utilisées aux dénominateurs pour calculer les taux démographiques n'incluaient pas les personnes n'ayant pas le droit de résider en permanence au Canada, ni les corrections pour tenir compte du sous-dénombrement net du recensement; cependant, les données utilisées au numérateur incluaient généralement ces deux groupes. Depuis 1992, on se sert d'une série corrigée d'estimations démographiques, remontant à 1971, pour résoudre ce problème. Cette série, produite et révisée fréquemment par la Division de la démographie, comprend des estimations démographiques annuelles correspondant au milieu de l'année (1^{er} juillet), pour chaque province et territoire, selon l'âge (chaque année d'âge), le sexe et l'état matrimonial³.

Pour produire les statistiques de l'état civil, on se fonde sur la définition légale de l'état matrimonial. Par conséquent, les personnes qui vivent en union de fait sont classées comme étant célibataires, veuves, séparées ou divorcées. Cependant, avant 1981, les estimations de population utilisées pour calculer les taux étaient déterminées en classant les conjoints de fait dans la catégorie des personnes mariées.

Données sur les divorces

Historique, objet et contenu des données sur les divorces

Les données sur les divorces ne font pas partie du système d'enregistrement des données de l'état civil décrit plus haut, mais elles sont incluses dans le *Recueil* en raison de leur lien avec les données sur les mariages. Depuis 1969, le Bureau d'enregistrement des actions en divorce (BEAD) du ministère de la Justice du Canada transmet les données sur les divorces à Statistique Canada. L'univers cible de la statistique sur le divorce englobe tous les cas de divorce traités au Canada.

³ En décembre 1998, la Division de la démographie a publié une nouvelle série d'estimations démographiques corrigées pour la période allant de 1971 à 1998. Toutefois, on s'est servi d'une série antérieure (publiée par la Division de la démographie dans la publication intitulée *Statistiques démographiques annuelles*, 1997, n° 91-213-XPB au catalogue) pour calculer les taux publiés dans le *Recueil* (voir les annexes 1 et 2 [p. 136-137]). Le glossaire contient d'autres renseignements sur les estimations et les taux démographiques.

Les statistiques sur les divorces sont importantes pour des raisons tant administratives que démographiques. Ces données sont essentielles à l'administration des programmes sociaux; par exemple, les ministères et les ambassades exigent habituellement une confirmation de l'état matrimonial d'une personne pour prendre les décisions relatives à la pension et à l'immigration. Les données sur le divorce sont utilisées en cas de litige ayant trait à un accident mortel et sont fréquemment un élément essentiel d'études spécialisées (p. ex., l'étude du divorce en tant que phénomène social) et de l'élaboration de mesures axées sur la famille (p. ex., projections concernant la fécondité).

Les éléments de données que contient le fichier de données sur les divorces sont les âges du mari et de son épouse au moment du mariage et du divorce, leur date de naissance et leur état matrimonial avant le mariage, la province ou territoire où est rendu le jugement de divorce, la durée du mariage et les raisons de sa dissolution, la personne qui a fait la demande de divorce et les renseignements sur les enfants à charge et sur la garde des enfants, au besoin.

Collecte des données

Le Bureau d'enregistrement des actions en divorce (BEAD) du ministère de la Justice du Canada recueille des renseignements sur tous les divorces traités au Canada. La décision de créer ce bureau central d'enregistrement des divorces a été prise pour éliminer l'enregistrement en double des renseignements relatifs aux procédures de divorce. À l'heure actuelle, on constate une telle duplication à l'intérieur d'une province ou d'un territoire pour environ 5 % des demandes et entre provinces et(ou) territoires, dans 0,5 % des cas.

Chaque année, le BEAD transmet à la Division des statistiques sur la santé de Statistique Canada un fichier de données lisible par machine sur les cas de divorce prononcés. Statistique Canada traite les données et produit un ensemble de totalisations types. Le nombre de divorces prononcés (jugements de divorce rendus) durant une année donnée ne correspond pas nécessairement au nombre d'actions en justice entamées cette année-là. De surcroît, les totalisations sur les divorces présentées ici (et dans la publication de Statistique Canada intitulée *Divorces*, n° 84F0213XPB au catalogue) précisent la province où a été rendu le jugement de divorce, plutôt que la province de résidence du mari ou de son épouse.

Évolution des motifs de divorce au fil du temps

Aux termes de la *Loi sur le divorce* de 1985, l'échec définitif d'un mariage est devenu le seul motif de divorce. Les preuves de l'échec définitif du mariage ont été réduites à la séparation pendant au moins un an, l'adultère, la cruauté physique ou la cruauté mentale. Quand le couple présente une demande conjointe de divorce, la seule catégorie valide est la séparation pendant au moins un an. Les trois autres motifs de divorce — l'adultère, la cruauté physique et la cruauté mentale — ne sont admissibles légalement que si un des conjoints entame une action en divorce contre l'autre.

Traitement des données

Après la finalisation d'un processus de divorce, dans chaque province ou territoire, le tribunal concerné transmet les renseignements au BEAD aux fins de leur saisie dans la base de données centrale. Après réception du fichier de données annuel du BEAD, Statistique Canada exécute une série de contrôles de cohérence pour évaluer la qualité des données et, après consultation du BEAD pour régler toute incohérence, produit une série de totalisations types.

Qualité des données

Statistique Canada produit des totalisations détaillées sur les divorces depuis 1969. Les nombres de divorces publiés ici correspondent au « nombre absolu de jugements » et n'incluent aucune autre forme de dissolution du mariage (p. ex., la séparation). Dans une certaine mesure, le nombre de jugements de divorce rendus une année particulière dépend de facteurs comme le nombre de requêtes en divorce présentées, le nombre de centres où sont entendues les requêtes en divorce et l'intervalle nécessaire pour qu'une requête en divorce aboutisse à un jugement final. Les variations pourraient être considérables tant à l'échelle provinciale que territoriale, d'où l'importance de tenir compte de cet aspect lors de comparaisons chronologiques entre province ou territoire ou au sein d'une province ou d'un territoire.

Les taux de divortialité ne sont pas nécessairement un indice exact de la dissolution des unions, puisqu'on les calcule en se fondant sur les unions contractées légalement. Or, au Canada, les unions de fait représentent une part importante de l'ensemble des unions, quoique cette proportion varie d'une province ou d'un territoire à l'autre. Toutefois, les conjoints de fait ne courent pas le risque de divorcer, puisqu'aucune action légale n'est nécessaire pour dissoudre la relation. Il est donc conseillé d'interpréter avec prudence les comparaisons entre diverses cultures, puisque l'union de fait peut représenter une forte proportion de l'ensemble des unions dans certaines collectivités.

Couverture et complétude des données

Étant donné l'obligation légale d'enregistrer les jugements de divorce dans chaque province et territoire, le taux de couverture et la qualité des données sont élevés. Toutefois, on pourrait observer de faibles variations de couverture d'une région à l'autre, dues principalement à la transmission tardive d'enregistrements après la date limite pour le dépouillement des données. Toutefois, l'effet global de ces variations sur les données statistiques et les totalisations est faible.

La complétude de la déclaration des renseignements sur les éléments de données de base varie selon l'élément, la province ou le territoire déclarant, et l'année. Le niveau de complétude est élevé pour la plupart des données élémentaires comprises dans les totalisations types produites par Statistique Canada. Les renseignements sur la garde des enfants et sur les enfants à charge ne sont toutefois pas complets, parce que les bureaux des tribunaux ne fournissent pas toujours les éléments de données nécessaires; de

surcroît, les dispositions quant à la garde des enfants ne sont pas nécessairement inscrites sur le formulaire d'enregistrement du divorce si elles n'ont pas été prises à la suite d'une ordonnance du tribunal (p. ex., si les parties ont pris une décision quant à la garde des enfants avant le jugement et que le tribunal n'a pas dû rendre un jugement). Par conséquent, les données résultant de l'enregistrement des divorces mènent à une sous-estimation du nombre total d'enfants à charge touchés par le divorce, ainsi que du nombre total d'ordonnances de garde d'enfants.

Information supplémentaire

Les produits suivants (20 \$ l'unité) offrent des renseignements plus détaillés sur les statistiques de l'état civil pour 1996 et 1997 : *Causes de décès, 1996 et 1997* (n° 84F0208XPB au catalogue); *Mortalité — Liste sommaire des causes, 1996 et 1997* (n° 84F0209XPB au catalogue, aussi offert gratuitement sur le site Web de Statistique Canada www.statcan.ca en fichiers PDF téléchargeables); *Les principales causes de décès à différents âges, Canada, 1996 et 1997* (n° 84F0503XPB au catalogue); *Naissances et décès, 1996 et 1997* (n° 84F0210XPB au catalogue); *Sommaire statistique de l'état civil selon la localité, 1996 et 1997* (n° 84F0001XPB au catalogue); *Divorces, 1996 et 1997* (n° 84F0213XPB au catalogue). Pour commander les produits susmentionnés ou des totalisations personnalisées sur une base de recouvrement des coûts, s'adresser à la Sous-section des services personnalisés à la clientèle, Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada, par téléphone, au (613) 951-1746, ou par télécopieur, au (613) 951-0792.

Les données de l'état civil pour les années antérieures figurent dans les publications suivantes : *Statistiques choisies sur la natalité et la fécondité, Canada, 1921-1990* (n° 82-553 au catalogue); *Statistiques choisies sur la mortalité infantile et statistiques connexes, Canada, 1921-1990* (n° 82-549 au catalogue); *Statistiques choisies sur la mortalité, Canada, 1921-1990* (n° 82-548 au catalogue); et *Longévité et tables de mortalité chronologiques abrégées, Canada et provinces, 1921 à 1981* (n° 89-506 au catalogue). Les tables de mortalité officielles (non abrégées) figurent dans la publication intitulée *Tables de mortalité, Canada et provinces* (n° 84-537 au catalogue pour 1990 à 1992 et n° 84-532 au catalogue pour 1975 à 1977, 1980 à 1982 et 1985 à 1987). Pour une analyse des tendances concernant le mariage et le divorce, consulter la publication intitulée *Le déclin du mariage au Canada de 1981 à 1991* (n° 84-536 au catalogue).

1. Vue d'ensemble

Au Canada, en moyenne chaque jour en 1996 ...

428 couples se sont mariés¹

- 317 mariages religieux et 111 unions civiles ont été célébrés ;
- 282 mariages ont uni des conjoints qui posaient ce geste pour la première fois ;
- 56 mariages ont uni des personnes nées à l'étranger² ;
- 2 mariages ont été célébrés entre des adolescents ;

195 couples ont divorcé

- 148 divorces ont été accordés à des couples où les deux conjoints étaient célibataires avant leur mariage ;
- 15 divorces touchaient des couples qui avaient divorcé au moins une fois avant leur mariage ;
- 52 divorces ont été accordés à des couples où les deux conjoints étaient dans la trentaine ;
- 5 divorces concernaient des conjoints âgés de moins de 25 ans ou de 65 ans et plus ;

1 001 nouveau-nés ont vu le jour

- 514 garçons et 487 filles sont nés ;
- 283 enfants provenaient de mères non mariées (122 au Québec) ;
- 60 bébés sont nés de mères adolescentes ;
- 57 bébés avaient un faible poids à la naissance ;
- 43 enfants étaient prématurés ;
- 177 enfants sont nés de mères âgées de 35 à 39 ans, tandis que 17 sont nés de mères âgées de 40 ans et plus ;
- 24 bébés provenaient de naissances multiples ;
- 6 enfants de moins d'un an sont morts et 6 autres sont mort-nés ;

582 personnes ont perdu la vie

- 305 hommes et 277 femmes sont décédés ;
- 51 hommes et 92 femmes avaient 85 ans et plus ;
- 10 hommes et 5 femmes avaient moins de 25 ans ;
- 217 décès étaient attribuables à des maladies du système circulatoire, incluant 158 décès causés par une maladie du cœur et 43 par une maladie cérébrovasculaire ;
- 162 décès étaient liés à un cancer, incluant 43 cancers du poumon, 17 cancers du côlon ou du rectum, 14 cancers du sein et 10 cancers de la prostate ;
- 52 décès résultaient des maladies du système respiratoire, incluant 26 décès reliés à des maladies pulmonaires obstructives chroniques et 20 à des pneumonies ou à la grippe ;
- 37 personnes sont mortes à la suite de traumatismes accidentels ou de violence, incluant 11 décès dus à un suicide, 8 à des accidents impliquant des véhicules à moteur et 1 à un homicide ;
- 7 décès résultaient de la maladie d'Alzheimer, 5 étaient directement attribuables à l'alcool et 4 à l'infection par le VIH.

¹ Le glossaire à la page 145 contient de plus amples explications sur les concepts utilisés dans cet encadré.

² Les statistiques sur le mariage publiées dans le Recueil incluent les mariages entre non résidents au Canada (par exemple, les touristes étrangers).

Tableau 1.1 Sommaire des statistiques de l'état civil, Canada, provinces et territoires, 1996¹

	Canada	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.
Mariages													
Nombre de mariages	156 691	3 194	924	5 392	4 366	23 968	66 208	6 448	5 671	17 283	22 834	197	206
Taux bruts de nuptialité ²	5,2	5,6	6,8	5,7	5,7	3,2	5,9	5,7	5,6	6,2	5,9	6,3	3,1
Indices synthétiques de primonuptialité ²													
Hommes	502	563	723	555	562	320	560	574	630	564	529	474	275
Femmes	536	592	749	585	590	353	595	612	644	604	557	493	284
Divorces													
Nombre de divorces	71 528	1 060	237	2 228	1 450	18 078	25 035	2 603	2 216	7 509	10 898	115	99
Taux bruts de divortialité ²	2,4	1,9	1,7	2,4	1,9	2,4	2,2	2,3	2,2	2,7	2,8	3,7	1,5
Indices synthétiques de divortialité ³	369	263	240	324	259	457	329	309	306	383	450	561	389
Naissances vivantes													
Nombre de naissances vivantes ⁴	366 200	5 747	1 694	10 573	8 176	85 226	140 012	15 478	13 300	37 851	46 138	443	1 562
Garçons	188 145	2 985	875	5 425	4 211	43 668	71 751	7 908	6 899	19 579	23 798	232	814
Filles	177 930	2 762	819	5 148	3 965	41 449	68 246	7 569	6 401	18 272	22 340	211	748
% avec faible poids à la naissance	5,8	6,1	5,3	5,4	5,1	5,9	6,0	5,5	5,0	6,1	5,2	4,3	5,5
Taux bruts de natalité ²	12,2	10,1	12,4	11,2	10,7	11,5	12,4	13,6	13,0	13,6	12,0	14,1	23,4
Indices synthétiques de fécondité	1,59	1,26	1,67	1,49	1,41	1,56	1,57	1,86	1,89	1,72	1,54	1,69	2,71
Espérance de vie (en années) à la naissance⁵													
Hommes	75,7	75,0	73,9	74,9	75,2	75,2	76,1	75,5	75,5	76,0	76,1	..	..
Femmes	81,4	80,5	80,7	80,7	81,2	81,5	81,4	80,8	81,4	81,3	81,9	..	..
Mortinaissances													
À au moins 20 semaines de gestation	2 121	25	8	74	42	342	905	119	59	239	295	2	11
À au moins 28 semaines de gestation	1 246	14	5	32	31	240	531	59	36	137	151	2	8
Taux de mortinatalité à au moins 28 semaines de gestation ⁶	3,4	2,4	2,9	3,0	3,8	2,8	3,8	3,8	2,7	3,6	3,3	4,5	5,1
Mortalité infantile													
Nombre de décès infantiles	2 051	38	8	59	40	396	802	104	112	236	237	-	19
Taux de mortalité infantile ⁷	5,6	6,6	4,7	5,6	4,9	4,6	5,7	6,7	8,4	6,2	5,1	-	12,2
Nombre de décès néonataux	1 441	32	8	37	24	290	584	67	76	153	165	-	5
Taux de mortalité néonatale ⁷	3,9	5,6	4,7	3,5	2,9	3,4	4,2	4,3	5,7	4,0	3,6	-	3,2
Nombre de décès postnéonataux	610	6	-	22	16	106	218	37	36	83	72	-	14
Taux de mortalité postnéonatale ⁷	1,7	1,0	-	2,1	2,0	1,2	1,6	2,4	2,7	2,2	1,6	-	9,0
Nombre de décès périnataux	2 450	40	13	66	51	486	1 014	118	96	265	287	2	12
Taux de mortalité périnatale ⁶	6,7	6,9	7,7	6,2	6,2	5,7	7,2	7,6	7,2	7,0	6,2	4,5	7,6
Décès													
Nombre de décès ⁸	212 880	3 928	1 268	7 751	5 896	52 336	79 099	9 497	8 765	16 391	27 536	120	272
Hommes	111 404	2 164	678	4 007	3 125	27 407	40 673	4 809	4 701	8 796	14 763	88	175
Femmes	101 476	1 764	590	3 744	2 771	24 929	38 426	4 688	4 064	7 595	12 773	32	97
Taux bruts de mortalité ²	7,1	6,9	9,3	8,2	7,7	7,1	7,0	8,3	8,6	5,9	7,1	3,8	4,1
Taux comparatifs de mortalité ⁹	654	718	755	700	681	662	649	670	647	643	628	877	982
Hommes	836	910	1 014	902	886	869	823	841	829	803	793	1 665	1 117
Femmes	517	562	559	550	528	514	519	541	501	515	495	421	874

¹ Voir le glossaire (p. 145) pour les définitions. Les données sur le mariage et sur le divorce sont produites d'après la province ou le territoire où a eu lieu l'événement; les données sur les naissances et les décès sont produites d'après la province ou le territoire de résidence. Les mesures fondées sur des chiffres faibles (p. ex., pour l'Île-du-Prince-Édouard, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest) doivent être interprétées avec prudence.

² Les taux bruts et les indices synthétiques de primonuptialité correspondent au nombre d'événements pour 1 000 habitants (p. ex., le taux brut de nuptialité est égal au nombre de mariages pour 1 000 habitants).

³ Les indices synthétiques de divortialité représentent le nombre de couples mariés que l'on s'attend à voir divorcer pour 1 000 mariages.

⁴ Comprend 125 naissances pour lesquelles on ne connaît pas le sexe de l'enfant (au Québec, en Ontario et au Manitoba).

⁵ Estimée d'après les données sur la mortalité de 1996 et les tables abrégées de mortalité.

⁶ Les taux de mortinatalité et de mortalité périnatale correspondent au nombre d'événements pour 1 000 naissances totales (c.-à-d. les naissances vivantes et les mortinaissances).


⁷ Les taux de mortalité infantile, néonatale et postnéonatale correspondent au nombre d'événements pour 1 000 naissances vivantes.

⁸ Comprend 18 hommes et 3 femmes pour lesquels on ne connaît pas la province ou le territoire de résidence.

⁹ Ces taux, qui sont normalisés en prenant pour référence la population du Canada de 1991, correspondent au nombre de décès pour 100 000 habitants (voir annexe 4, p. 141).

2. Mariages

Nombre quotidien moyen de mariages selon le mois au Canada en 1996





En 1996, nettement plus de la moitié (57 %) des mariages ont été célébrés durant les mois d'été (de juin à septembre). Août a été le mois record, suivi par juin et juillet. Un nombre assez faible de personnes se sont mariées en hiver : en moyenne, 136 mariages seulement ont eu lieu chaque jour en janvier, comparativement à 941 en août. Les week-ends consacrés à la fête du Travail en septembre, à la fête civique en août (dans certaines provinces), à la Fête du Canada en juillet et à la St-Jean-Baptiste en juin (célébrée au Québec) ont été choisis particulièrement fréquemment en 1996 : 19 181 mariages ont été célébrés durant ces quatre week-ends uniquement (12,2 % de l'ensemble des mariages célébrés cette année-là).

En dehors des mois d'été, le week-end de la Fête de la Reine en mai (3 882 mariages) et celui de l'Action de grâces en octobre (3 741 mariages) ont été les dates les plus recherchées en 1996 (environ 5 % des mariages de 1996). Durant la période de Noël (du 20 au 31 décembre), 4 617 couples se sont mariés.

Sept mariages sur 10 ont eu lieu un samedi (2 142 cérémonies, en moyenne). Suivent de loin le vendredi (374) et le dimanche (166). Les cinq jours de l'année les plus recherchés pour se marier en 1996 étaient tous des samedis du mois d'août (22 673 mariages). Deux jours de semaine se distinguent aussi : le jour de la St-Valentin (623 mariages un mercredi en 1996) et la veille de Noël (219 mariages un mardi).

Tableau 2.1 Mariages et taux bruts de nuptialité, Canada provinces et territoires, 1986 à 1996



	Canada	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.
Nombre de mariages													
1986	175 518	3 421	970	6 445	4 962	33 083	70 839	7 816	6 820	18 896	21 826	183	257
1987	182 151	3 481	924	6 697	4 924	32 616	76 201	7 994	6 853	18 640	23 395	189	237
1988	187 728	3 686	965	6 894	5 292	33 519	78 533	7 908	6 767	19 272	24 461	209	222
1989	190 640	3 905	1 019	6 828	5 254	33 325	80 377	7 800	6 637	19 888	25 170	214	223
1990	187 737	3 791	996	6 386	5 044	32 060	80 097	7 666	6 229	19 806	25 216	218	228
1991	172 251	3 480	876	5 845	4 521	28 922	72 938	7 032	5 923	18 612	23 691	196	215
1992	164 573	3 254	850	5 623	4 313	25 841	70 079	6 899	5 664	17 871	23 749	221	209
1993	159 317	3 163	885	5 403	4 177	25 021	66 575	6 752	5 638	17 860	23 447	180	216
1994	159 958	3 318	850	5 373	4 219	24 986	66 693	6 585	5 689	18 096	23 739	169	241
1995	160 251	3 404	877	5 329	4 252	24 238	67 583	6 703	5 799	18 044	23 597	207	218
1996	156 691	3 194	924	5 392	4 366	23 968	66 208	6 448	5 671	17 283	22 834	197	206
Taux bruts de nuptialité (nombre de mariages pour 1 000 habitants)													
1986	6,7	5,9	7,5	7,2	6,8	4,9	7,5	7,1	6,6	7,7	7,2	7,4	4,6
1987	6,9	6,0	7,2	7,5	6,7	4,8	7,9	7,3	6,6	7,6	7,6	7,3	4,3
1988	7,0	6,4	7,4	7,7	7,2	4,9	7,9	7,2	6,6	7,8	7,8	7,8	3,9
1989	7,0	6,8	7,8	7,5	7,1	4,8	7,9	7,1	6,5	7,9	7,8	7,8	3,9
1990	6,8	6,5	7,6	7,0	6,8	4,6	7,7	6,9	6,2	7,7	7,6	7,8	3,8
1991	6,1	6,0	6,7	6,4	6,0	4,1	7,0	6,3	5,9	7,2	7,0	6,7	3,5
1992	5,8	5,6	6,5	6,1	5,7	3,6	6,6	6,2	5,6	6,8	6,8	7,3	3,3
1993	5,5	5,4	6,6	5,8	5,5	3,5	6,2	6,0	5,6	6,6	6,6	5,9	3,4
1994	5,5	5,7	6,3	5,8	5,6	3,4	6,1	5,8	5,6	6,7	6,5	5,7	3,7
1995	5,4	5,9	6,5	5,7	5,6	3,3	6,1	5,9	5,7	6,6	6,3	6,8	3,3
1996	5,2	5,6	6,8	5,7	5,7	3,2	5,9	5,7	5,6	6,2	5,9	6,3	3,1



Le nombre de nouveaux mariages s'est chiffré à 156 700 en 1996, ce qui équivaut à une baisse de 2 % par rapport à l'année précédente et à une diminution de 18 % par rapport au record de 191 000 observé en 1989. En fait, le nombre de mariages célébrés en 1996 est le plus faible enregistré en 30 ans, malgré la croissance importante de la population durant cette période. Ce recul tient à la popularité de l'union de fait, particulièrement au Québec, où l'on enregistre le taux provincial de nuptialité le plus faible.

Tableau 2.2 Indices synthétiques de primonuptialité selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996

	Canada	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.
Hommes													
Nombre de premiers mariages pour 1 000 hommes de 15 à 49 ans													
1986	560	582	707	596	597	434	623	618	589	568	581	469	346
1987	563	591	674	622	594	423	630	623	596	567	603	446	301
1988	584	626	738	646	651	436	647	625	608	598	639	525	305
1989	593	664	804	647	644	434	657	629	628	626	645	496	303
1990	587	642	765	612	626	415	658	639	614	629	639	522	317
1991	546	593	712	566	571	381	610	591	609	590	598	468	285
1992	519	544	670	542	539	335	580	595	597	581	594	530	271
1993	504	529	702	531	523	326	555	580	605	583	577	403	282
1994	514	565	654	540	537	335	563	583	626	598	577	447	303
1995	516	592	674	543	544	325	572	597	640	606	563	573	289
1996	502	563	723	555	562	320	560	574	630	564	529	474	275
Femmes													
Nombre de premiers mariages pour 1 000 femmes de 15 à 49 ans													
1986	590	576	742	632	624	444	659	660	624	615	617	542	392
1987	598	576	689	657	619	441	675	664	633	613	640	467	346
1988	625	628	745	686	679	459	697	673	645	646	687	618	317
1989	636	670	809	689	682	461	705	683	675	670	696	561	332
1990	634	660	769	652	660	462	703	691	662	675	696	593	330
1991	587	611	722	599	597	424	646	644	645	633	649	515	311
1992	560	570	678	577	570	374	623	639	627	620	632	556	294
1993	543	551	711	562	552	363	596	626	635	619	612	467	308
1994	552	593	656	572	555	372	601	626	653	640	618	464	333
1995	553	623	706	581	571	361	610	645	655	638	596	551	318
1996	536	592	749	585	590	353	595	612	644	604	557	493	284





La baisse des indices synthétiques de primonuptialité reflète la tendance courante à retarder ou tout simplement à éviter le mariage observée chez un nombre croissant de couples. Selon les taux de 1996, seulement 50 % d'hommes et 54 % de femmes se seront mariés à un moment donné avant l'âge de 50 ans; par contre, les taux de 1989 étaient nettement plus élevés, soit 59 % pour les hommes et 64 % pour les femmes. Compte tenu de la popularité de l'union de fait au Québec, on s'attend à ce qu'environ le tiers seulement des célibataires de cette province se marient avant l'âge de 50 ans (si le comportement observé en 1996 continue de prévaloir).

Tableau 2.3 Âge moyen au mariage selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996

	Canada	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.
Mariés	Âge moyen¹												
1986	30,3	28,3	28,9	29,8	29,4	30,2	30,3	29,6	29,0	30,0	32,1	32,4	29,6
1987	31,1	28,7	29,6	30,5	30,2	30,7	31,2	30,2	29,8	30,5	32,8	33,7	30,9
1988	31,2	28,8	29,5	30,8	30,3	31,1	31,2	30,5	30,0	30,8	32,7	32,5	30,2
1989	31,4	29,2	29,6	31,0	30,4	31,2	31,3	30,8	30,1	31,1	33,0	34,8	30,5
1990	31,6	29,6	31,1	31,5	30,7	31,4	31,5	30,8	30,5	31,3	33,1	34,9	30,8
1991	31,8	29,7	30,8	31,9	30,8	31,7	31,6	31,2	30,8	31,5	33,3	34,4	30,8
1992	32,1	30,2	31,4	32,2	31,1	32,4	32,1	31,2	31,2	31,6	33,5	34,8	31,3
1993	32,4	30,2	31,4	32,4	31,5	32,8	32,3	31,8	31,2	31,9	33,6	35,4	32,6
1994	32,6	30,4	31,8	32,5	31,9	32,9	32,6	31,6	31,3	32,0	33,6	35,5	32,4
1995	32,8	30,9	32,2	32,8	32,0	33,5	32,7	31,8	31,5	32,2	34,0	33,9	32,9
1996	33,2	31,5	32,0	33,1	32,4	34,0	33,0	32,3	31,6	32,7	34,5	36,7	34,0
Mariées													
1986	27,7	25,7	26,5	27,4	26,9	27,7	27,7	27,1	26,4	27,3	29,0	28,7	27,0
1987	28,4	26,2	27,1	28,1	27,7	28,2	28,6	27,7	27,1	27,8	29,8	30,1	27,7
1988	28,6	26,3	27,2	28,4	27,8	28,6	28,7	28,0	27,4	28,1	29,7	28,8	27,7
1989	28,8	26,9	27,6	28,6	27,9	28,8	28,9	28,2	27,5	28,5	30,0	31,3	27,2
1990	29,0	27,1	28,7	29,1	28,4	29,1	29,1	28,3	27,8	28,7	30,1	31,3	28,1
1991	29,3	27,3	28,3	29,5	28,5	29,2	29,3	28,6	28,3	29,0	30,4	31,0	28,0
1992	29,6	27,9	29,0	29,8	28,7	29,9	29,7	28,8	28,5	29,1	30,6	31,4	28,8
1993	29,9	27,9	29,0	30,1	29,0	30,3	29,9	29,2	28,6	29,4	30,8	32,3	29,2
1994	30,1	28,1	29,7	30,1	29,6	30,4	30,2	29,1	28,7	29,4	30,8	31,6	29,5
1995	30,3	28,6	29,7	30,5	29,5	30,9	30,4	29,3	28,9	29,7	31,3	31,9	29,7
1996	30,7	29,1	29,6	30,8	30,0	31,5	30,6	29,8	29,1	30,1	31,7	33,4	31,2

¹ Consulter le glossaire (p. 146) pour le calcul de l'âge moyen.





L'âge moyen au mariage, qui augmente régulièrement chez les hommes et chez les femmes depuis 10 ans, était de 33,2 ans pour les hommes et de 30,7 ans pour les femmes en 1996. En moyenne, les mariés avaient 2,5 ans de plus que les mariées.

Tableau 2.4 Âge moyen au premier mariage selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996

	Canada	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.
Mariés	Âge moyen¹												
1986	27,0	26,1	26,0	26,5	26,3	27,8	26,8	26,6	26,2	26,8	27,6	28,4	28,0
1987	27,4	26,5	26,9	26,9	26,8	28,2	27,2	26,9	26,6	27,2	28,0	28,5	27,6
1988	27,6	26,6	27,2	27,0	27,1	28,5	27,4	27,1	26,9	27,4	28,2	28,8	28,1
1989	27,8	27,0	27,3	27,4	26,9	28,7	27,6	27,3	26,9	27,6	28,3	30,0	28,5
1990	27,9	27,0	27,4	27,6	27,1	28,2	27,9	27,5	27,4	27,8	28,5	30,5	28,6
1991	28,2	27,3	27,9	27,9	27,4	28,3	28,2	27,7	27,5	28,0	28,7	30,5	28,6
1992	28,5	27,6	28,0	28,3	27,5	28,8	28,5	28,0	27,8	28,1	29,1	30,8	28,9
1993	28,7	27,7	28,5	28,4	27,7	29,0	28,7	28,1	27,9	28,4	29,2	30,4	30,5
1994	28,8	27,9	28,3	28,7	28,0	29,3	28,9	28,2	27,9	28,4	29,2	31,1	29,9
1995	29,0	28,4	28,8	28,9	28,2	29,5	29,1	28,4	27,9	28,6	29,5	29,3	30,4
1996	29,3	28,7	28,6	29,1	28,4	29,9	29,3	28,6	28,0	28,7	29,8	32,3	31,5
Mariées													
1986	24,8	23,9	24,4	24,5	24,1	25,3	24,9	24,4	23,8	24,4	25,2	25,5	25,4
1987	25,2	24,2	24,7	24,9	24,7	25,7	25,3	24,7	24,2	24,7	25,6	24,9	24,9
1988	25,5	24,5	24,8	25,1	25,0	26,0	25,5	25,0	24,5	25,1	25,8	26,3	25,8
1989	25,7	24,9	25,3	25,4	24,9	26,3	25,8	25,2	24,7	25,3	26,0	26,7	25,6
1990	26,0	25,0	25,4	25,8	25,2	26,4	26,1	25,3	25,0	25,5	26,2	27,8	26,2
1991	26,2	25,2	25,5	26,0	25,4	26,6	26,4	25,6	25,2	25,8	26,6	27,4	26,5
1992	26,5	25,7	25,9	26,2	25,6	27,0	26,7	25,9	25,4	25,9	26,9	27,4	26,5
1993	26,8	25,9	26,2	26,6	25,7	27,3	26,9	26,1	25,5	26,1	27,0	28,7	27,6
1994	26,8	26,0	26,3	26,7	26,0	27,4	27,1	26,1	25,6	26,1	27,1	27,8	27,4
1995	27,1	26,4	26,8	27,0	26,1	27,7	27,2	26,2	25,6	26,3	27,4	27,7	28,0
1996	27,3	26,8	26,7	27,2	26,4	28,0	27,4	26,4	25,7	26,5	27,6	28,3	29,3



¹ Consulter le glossaire (p. 146) pour le calcul de l'âge moyen.



On observe l'âge moyen au premier mariage le plus élevé dans les territoires et au Québec (p. ex., 32,3 ans pour les mariés du Yukon et 29,3 ans pour les mariées des Territoires du Nord-Ouest) et le plus faible, en Saskatchewan (28,0 et 25,7 ans, respectivement). En moyenne, les hommes qui se mariaient pour la première fois étaient deux ans plus âgés que les femmes dans la même situation.

Tableau 2.5 Mariages et taux de nuptialité selon l'âge du marié, Canada, provinces et territoires, 1996



	Canada	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.
Âge du marié	Nombre de mariages												
<20	1 343	16	6	15	29	242	499	99	71	204	159	1	2
20-24	25 376	549	186	879	893	3 211	9 998	1 382	1 419	3 485	3 330	17	27
25-29	49 455	1 322	322	1 851	1 507	7 520	21 699	1 930	1 783	4 996	6 436	43	46
30-34	33 108	628	167	1 095	797	5 132	14 754	1 295	1 004	3 448	4 699	41	48
35-39	17 775	264	99	548	392	2 728	7 544	658	507	2 039	2 917	38	41
40-44	10 126	141	48	327	227	1 579	4 108	401	309	1 164	1 788	20	14
45-49	7 064	111	51	250	175	1 215	2 802	227	203	738	1 267	10	15
50-54	4 527	60	14	149	122	815	1 743	169	132	477	826	14	6
55-59	2 735	39	7	90	83	480	1 079	91	75	282	498	6	5
60-64	1 859	16	10	82	37	355	754	65	59	157	319	3	2
65-69	1 356	17	5	46	44	267	515	47	38	125	249	3	-
70-74	975	19	4	30	31	179	368	42	43	92	167	-	-
75+	891	11	5	30	29	150	340	42	28	76	179	1	-
Inconnu	101	1	-	-	-	95	5	-	-	-	-	-	-
Taux de nuptialité par âge (pour 1 000 hommes)													
<20	1,3	0,7	1,2	0,5	1,1	0,9	1,3	2,5	1,8	2,0	1,2	0,9	0,8
20-24	24,6	22,6	36,8	25,8	30,7	13,2	26,0	33,3	39,9	34,6	25,2	16,0	10,0
25-29	44,1	57,1	65,8	52,5	52,1	28,5	50,5	46,8	55,7	45,5	43,5	35,7	14,0
30-34	24,8	26,7	31,3	26,9	24,5	15,7	28,4	27,2	26,1	27,1	28,2	25,1	13,7
35-39	13,2	11,0	18,4	13,5	12,1	8,0	15,0	13,7	12,1	15,1	17,2	24,2	14,0
40-44	8,5	6,0	9,5	9,0	7,5	5,2	9,5	9,4	8,0	9,9	11,5	13,1	5,8
45-49	6,5	5,2	10,4	7,2	6,1	4,4	7,0	5,9	6,3	7,6	8,7	7,4	7,0
50-54	5,4	3,6	3,7	5,5	5,7	3,6	5,7	5,7	5,5	6,7	7,6	13,3	4,6
55-59	4,1	3,1	2,3	4,2	5,0	2,8	4,3	3,9	3,6	5,0	5,8	10,2	5,3
60-64	3,1	1,5	3,7	4,3	2,5	2,4	3,3	3,0	2,9	3,2	4,0	6,8	2,9
65-69	2,5	1,9	2,1	2,9	3,4	2,0	2,5	2,3	2,0	2,9	3,4	7,1	-
70-74	2,2	2,5	1,9	2,2	2,7	1,7	2,2	2,4	2,5	2,8	2,8	-	-
75+	1,6	1,1	1,6	1,4	1,8	1,2	1,6	1,5	1,0	1,7	2,1	6,5	-



Tant les dénombrements que les taux témoignent de la baisse de popularité du mariage chez les jeunes hommes. Par exemple, 54 400 hommes de 20 à 24 ans se sont mariés en 1986, mais seulement 25 400 en 1996; de façon similaire, le taux de nuptialité du groupe des 20 à 24 ans a diminué de façon très marquée durant ces 10 années, passant de 43,0 à 24,6 mariages pour 1 000 hommes.

Tableau 2.6 Mariages et taux de nuptialité selon l'âge de la mariée, Canada, provinces et territoires, 1996



	Canada	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.
Âge de la mariée	Nombre de mariages												
<20	5 130	81	18	89	131	741	1 974	314	281	838	651	6	6
20-24	40 992	950	296	1 467	1 444	5 696	16 478	2 055	2 129	5 135	5 270	38	34
25-29	47 872	1 219	292	1 741	1 299	7 283	21 414	1 800	1 463	4 700	6 548	44	69
30-34	26 146	469	125	857	580	4 041	11 549	935	725	2 677	4 107	43	38
35-39	14 442	166	90	466	339	2 256	6 113	517	412	1 639	2 391	22	31
40-44	8 619	117	49	297	202	1 410	3 427	346	269	967	1 504	15	16
45-49	5 711	90	24	199	155	1 015	2 239	190	158	600	1 022	14	5
50-54	3 174	37	11	113	76	623	1 221	114	88	313	565	9	4
55-59	1 705	22	10	69	46	344	671	53	51	158	276	3	2
60-64	1 085	9	4	34	26	212	440	44	27	99	187	2	1
65-69	792	12	4	36	27	137	307	33	32	72	132	-	-
70-74	560	10	-	16	20	95	230	21	23	54	90	1	-
75+	418	8	1	8	21	77	143	26	13	31	90	-	-
Inconnu	45	4	-	-	-	38	2	-	-	-	1	-	-
	Taux de nuptialité par âge (pour 1 000 femmes)												
<20	5,3	3,6	3,6	2,8	5,0	3,0	5,6	8,1	7,6	8,7	5,4	5,5	2,2
20-24	40,9	41,4	61,7	44,8	51,6	24,2	44,1	52,4	62,3	53,1	39,9	35,3	12,5
25-29	43,4	54,9	60,9	51,8	46,2	28,6	49,8	45,2	45,7	43,9	44,7	36,4	22,4
30-34	20,1	19,9	22,4	21,4	18,1	12,9	22,8	20,4	18,6	21,8	25,0	26,0	11,8
35-39	10,9	6,9	16,1	11,2	10,5	6,8	12,3	11,2	10,1	12,7	14,1	13,1	11,3
40-44	7,2	5,0	10,0	7,9	6,6	4,6	7,7	8,2	7,3	8,5	9,6	10,2	7,4
45-49	5,3	4,3	5,0	5,8	5,5	3,7	5,5	5,1	5,2	6,4	7,2	10,5	3,1
50-54	3,8	2,3	3,1	4,3	3,7	2,7	3,9	3,9	3,7	4,6	5,3	11,6	3,9
55-59	2,5	1,9	3,3	3,2	2,8	1,9	2,6	2,2	2,4	2,9	3,2	8,0	2,6
60-64	1,8	0,9	1,4	1,7	1,7	1,3	1,9	2,0	1,3	2,0	2,4	5,5	1,5
65-69	1,3	1,3	1,6	2,0	1,8	0,9	1,3	1,5	1,6	1,6	1,8	-	-
70-74	1,0	1,2	-	0,9	1,4	0,7	1,1	0,9	1,2	1,4	1,3	5,2	-
75+	0,4	0,5	0,2	0,2	0,8	0,3	0,4	0,6	0,3	0,4	0,7	-	-



Les tendances observées pour les hommes au tableau 2.5 s'appliquent également aux femmes : dans le groupe des 20 à 24 ans, 41 000 femmes seulement se sont mariées en 1996, comparativement à 74 000 dix ans plus tôt; durant cette période, le taux de nuptialité des femmes de ce groupe d'âge a diminué fortement, passant de 61,4 à 40,9 mariages pour 1 000 femmes. Les taux de nuptialité légèrement plus élevés observés chez les femmes plus âgées n'ont pas compensé cette baisse.

Tableau 2.7 Nombre et pourcentage de conjoints se mariant pour la première fois, Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996

	Canada	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.
Nombre de conjoints se mariant pour la première fois													
1986	276 188	6 037	1 641	10 062	8 086	54 965	110 947	12 557	11 104	28 780	31 327	252	430
1987	277 755	6 019	1 510	10 344	7 897	53 702	114 115	12 447	10 932	27 846	32 347	233	363
1988	286 899	6 394	1 610	10 581	8 520	54 674	118 258	12 259	10 760	28 690	34 506	299	348
1989	291 975	6 758	1 706	10 466	8 362	54 203	122 221	12 126	10 631	29 565	35 293	276	368
1990	288 987	6 518	1 584	9 768	7 978	52 341	122 866	12 006	9 906	29 621	35 731	292	376
1991	265 580	6 011	1 445	8 908	7 212	46 954	112 620	10 973	9 337	27 726	33 767	262	365
1992	252 460	5 585	1 356	8 466	6 819	40 960	107 866	10 820	8 946	26 990	34 011	301	340
1993	243 583	5 389	1 417	8 197	6 521	39 261	102 449	10 481	8 887	26 761	33 626	241	353
1994	244 138	5 672	1 346	8 159	6 548	39 539	101 743	10 318	8 991	27 064	34 138	230	390
1995	243 443	5 800	1 382	8 092	6 598	37 949	102 651	10 507	9 054	26 995	33 772	277	366
1996	235 859	5 362	1 476	8 119	6 762	37 005	100 064	9 950	8 868	25 411	32 247	258	337
Pourcentage de conjoints se mariant pour la première fois (%)													
1986	78,7	88,2	84,6	78,1	81,5	83,1	78,3	80,3	81,4	76,2	71,8	68,9	83,7
1987	76,2	86,5	81,7	77,2	80,2	82,3	74,9	77,9	79,8	74,7	69,1	61,6	76,6
1988	76,4	86,7	83,4	76,7	80,5	81,6	75,3	77,5	79,5	74,4	70,5	71,5	78,4
1989	76,6	86,5	83,7	76,6	79,6	81,3	76,0	77,7	80,1	74,3	70,1	64,5	82,5
1990	77,0	86,0	79,5	76,5	79,1	81,6	76,7	78,3	79,5	74,8	70,8	67,0	82,5
1991	77,1	86,4	82,5	76,2	79,8	81,2	77,2	78,0	78,8	74,5	71,3	66,8	84,9
1992	76,7	85,8	79,8	75,3	79,1	79,3	77,0	78,4	79,0	75,5	71,6	68,1	81,3
1993	76,4	85,2	80,1	75,9	78,1	78,5	76,9	77,6	78,8	74,9	71,7	66,9	81,7
1994	76,3	85,5	79,2	75,9	77,6	79,1	76,3	78,3	79,0	74,8	71,9	68,0	80,9
1995	76,0	85,2	78,8	75,9	77,6	78,3	75,9	78,4	78,1	74,8	71,6	66,9	83,9
1996	75,3	83,9	79,9	75,3	77,4	77,2	75,6	77,2	78,2	73,5	70,6	65,5	81,8




La proportion de conjoints se mariant pour la première fois a diminué notablement en 1987, en raison de la libéralisation de la *Loi sur le divorce*, et a diminué chaque année depuis 1991. (Les modifications apportées à la *Loi sur le divorce* en 1986 ont facilité la dissolution du mariage, situation qui a fait augmenter la proportion de nouveaux mariés classés dans la catégorie des personnes divorcées antérieurement.) C'est à Terre-Neuve qu'on observe la proportion la plus forte de conjoints se mariant pour la première fois et au Yukon qu'on observe la plus faible.

3. Divorces

Tableau 3.1 Divorces et taux bruts de divortialité, Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996

	Canada	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.
Nombre de divorces													
1986	78 304	687	199	2 609	1 729	19 026	27 549	2 982	2 479	9 556	11 299	94	95
1987	96 200	1 117	275	2 759	1 995	22 098	39 095	3 923	2 968	9 535	12 184	142	109
1988	83 507	906	269	2 494	1 673	20 340	32 524	3 102	2 501	8 744	10 760	82	112
1989	80 998	1 005	248	2 527	1 649	19 829	31 298	2 912	2 460	8 237	10 658	82	93
1990	78 463	1 016	281	2 419	1 699	20 474	28 977	2 798	2 364	8 489	9 773	81	92
1991	77 020	912	269	2 280	1 652	20 274	27 694	2 790	2 240	8 388	10 368	67	86
1992	79 034	867	227	2 304	1 633	19 695	30 463	2 657	2 325	8 217	10 431	117	98
1993	78 226	930	227	2 376	1 606	19 662	28 903	2 586	2 239	8 612	10 889	94	102
1994	78 880	933	249	2 286	1 570	18 224	30 718	2 746	2 354	8 174	11 437	97	92
1995	77 636	982	260	2 294	1 456	20 133	29 352	2 677	2 320	7 599	10 357	112	94
1996	71 528	1 060	237	2 228	1 450	18 078	25 035	2 603	2 216	7 509	10 898	115	99
Taux bruts de divortialité (nombre de divorces pour 1 000 habitants)													
1986	3,0	1,2	1,5	2,9	2,4	2,8	2,9	2,7	2,4	3,9	3,7	3,8	1,7
1987	3,6	1,9	2,1	3,1	2,7	3,2	4,0	3,6	2,9	3,9	4,0	5,5	2,0
1988	3,1	1,6	2,1	2,8	2,3	3,0	3,3	2,8	2,4	3,6	3,4	3,0	2,0
1989	3,0	1,7	1,9	2,8	2,2	2,9	3,1	2,6	2,4	3,3	3,3	3,0	1,6
1990	2,8	1,8	2,1	2,7	2,3	2,9	2,8	2,5	2,3	3,3	3,0	2,9	1,6
1991	2,7	1,6	2,1	2,5	2,2	2,9	2,6	2,5	2,2	3,2	3,1	2,3	1,4
1992	2,8	1,5	1,7	2,5	2,2	2,8	2,9	2,4	2,3	3,1	3,0	3,9	1,6
1993	2,7	1,6	1,7	2,6	2,1	2,7	2,7	2,3	2,2	3,2	3,0	3,1	1,6
1994	2,7	1,6	1,9	2,4	2,1	2,5	2,8	2,4	2,3	3,0	3,1	3,3	1,4
1995	2,6	1,7	1,9	2,4	1,9	2,7	2,6	2,4	2,3	2,8	2,7	3,7	1,4
1996	2,4	1,9	1,7	2,4	1,9	2,4	2,2	2,3	2,2	2,7	2,8	3,7	1,5





Le nombre de divorces a baissé de 8 % en 1996 pour s'établir à environ 71 500, ce qui représente le niveau le plus faible observé depuis les modifications apportées à la *Loi sur le divorce* en 1986, lesquelles permettent le divorce après une année de séparation au lieu de trois. L'Ontario et le Québec sont en grande partie à l'origine de la baisse globale du nombre de divorces en 1996. Le recul de 15 % observé en Ontario est lié aux compressions dans les programmes d'aide juridique dans cette province. Toutefois, contrairement à la tendance globale observée pour le Canada, le nombre de divorces a augmenté de 5 % en Colombie-Britannique et de 8 % à Terre-Neuve.

Tableau 3.2 Indices synthétiques de divortialité, Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996

	Canada	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.
Indices synthétiques de divortialité (pour 1 000 mariages)¹													
1986	414	164	217	379	301	401	401	348	317	540	549	513	378
1987	506	273	293	400	349	470	566	453	380	526	579	752	451
1988	437	223	294	362	290	439	463	359	320	478	505	429	439
1989	422	248	255	368	292	437	439	335	320	443	489	436	367
1990	407	252	293	348	299	458	402	323	306	453	441	409	371
1991	396	227	277	324	288	457	376	325	289	443	459	328	327
1992	405	214	227	329	289	454	408	308	305	427	453	582	405
1993	401	229	234	340	282	465	384	305	299	446	467	473	416
1994	405	230	257	329	276	438	406	324	318	422	482	464	382
1995	400	242	261	328	259	500	388	320	317	390	432	555	381
1996	369	263	240	324	259	457	329	309	306	383	450	561	389

¹ L'indice synthétique de divortialité représente la proportion de couples mariés qui sont susceptibles de divorcer avant leur 30^e anniversaire de mariage; par exemple, un indice synthétique de divortialité de 369 pour le Canada en 1996 indique que 36,9 % des mariages se solderont vraisemblablement par un divorce avant le 30^e anniversaire de mariage si les taux de divortialité par durée de mariage calculés pour 1996 au tableau 3.3 continuent de prévaloir (voir le glossaire [p. 151] pour plus de renseignements sur cette mesure).





À la suite des modifications apportées à la *Loi sur le divorce* en 1996, l'indice synthétique de divortialité a culminé en 1987, atteignant 506 divorces pour 1 000 mariages. La proportion de mariages qui se soldent par un divorce s'est stabilisée de 1992 à 1995, puis a diminué notablement en 1996. La baisse de 1996 est liée, en partie, aux compressions dans les programmes d'aide juridique de l'Ontario cette année-là.

Malgré la faible proportion de personnes qui se marient au Québec, l'indice synthétique de divortialité enregistré dans cette province continue de figurer parmi les plus élevés au Canada. C'est au Yukon que l'on observe l'indice le plus haut en 1996, et à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve que l'on enregistre les indices les plus faibles.

Tableau 3.3 Taux de divortialité selon l'année du mariage¹, Canada, provinces et territoires, 1996

	Canada	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.
Nombre de divorces en 1996 pour 1 000 mariages													
Année du mariage													
1996	0,4	-	-	0,7	-	0,7	0,3	0,3	-	0,4	0,5	-	-
1995	4,8	0,3	1,2	1,9	1,9	7,0	3,8	1,5	4,9	7,1	6,7	-	9,2
1994	18,0	10,2	2,4	9,2	8,4	23,5	15,3	14,2	14,5	21,2	24,5	30,7	8,3
1993	23,6	14,6	7,0	17,9	10,4	34,5	20,2	20,6	18,6	24,1	29,0	17,3	32,4
1992	25,3	16,7	9,7	19,0	12,2	36,7	21,6	21,9	21,4	26,8	29,7	51,6	38,3
1991	23,9	15,6	14,1	19,3	18,4	31,5	20,3	20,5	21,3	25,5	29,5	47,6	23,3
1990	22,3	17,5	19,6	19,8	15,7	27,0	19,2	20,1	18,3	24,7	28,9	19,0	35,1
1989	20,7	16,8	20,1	19,7	14,1	24,8	18,2	20,8	19,2	23,1	24,3	48,4	26,9
1988	18,3	17,5	12,8	15,8	16,5	21,8	16,1	16,1	16,1	19,7	22,4	24,8	9,0
1987	17,7	11,8	12,2	16,1	12,6	21,6	15,4	16,0	14,9	18,6	23,1	11,0	33,8
1986	16,5	7,5	9,5	16,5	12,7	18,9	14,8	14,5	14,0	18,4	20,7	39,6	15,6
1985	15,7	14,6	14,0	17,7	12,6	18,5	13,7	13,7	11,7	15,7	19,7	33,6	21,8
1984	14,3	10,6	5,8	15,1	10,5	17,4	12,9	11,9	12,0	13,5	17,6	39,1	7,7
1983	13,0	8,1	9,9	12,5	11,2	15,7	12,1	11,3	12,5	12,3	14,7	12,8	7,0
1982	12,9	9,5	13,2	11,9	9,7	15,2	12,1	11,6	12,8	11,4	14,9	18,4	19,2
1981	11,4	10,1	7,3	9,9	8,5	13,0	10,8	10,5	8,9	11,1	13,2	13,2	7,1
1980	10,8	8,9	4,4	9,0	9,0	12,3	10,3	9,3	8,2	10,1	12,5	20,7	22,3
1979	10,4	7,1	5,7	8,7	8,0	11,9	9,7	9,0	7,1	10,0	13,1	34,3	3,6
1978	9,6	6,1	4,4	9,8	5,9	11,9	9,2	6,5	6,3	9,9	9,5	10,7	9,3
1977	9,0	9,2	4,6	7,7	6,9	11,0	8,0	8,4	7,5	8,9	9,7	5,1	7,5
1976	8,8	7,8	7,4	9,8	6,5	10,4	8,3	5,1	7,4	8,6	9,3	5,4	7,6
1975	8,8	8,5	7,7	8,8	7,7	10,8	7,8	6,9	5,8	8,0	10,1	10,3	-
1974	8,0	6,2	4,1	6,5	6,0	9,3	7,2	7,1	7,0	10,0	8,6	16,4	3,9
1973	7,6	6,1	5,1	6,9	6,4	9,0	7,0	6,1	6,4	6,5	9,4	5,0	17,7
1972	7,3	4,2	9,1	6,8	3,1	8,7	6,5	4,2	7,0	7,8	10,2	5,7	-
1971	6,8	3,7	12,8	6,3	5,9	8,0	6,4	4,4	4,4	6,5	8,7	6,2	4,0


¹ Également appelé taux de divortialité par durée de mariage.



En 1996, le taux de divortialité a atteint un maximum après quatre années de mariage, comparativement à six années en 1986. Parmi les couples mariés depuis cinq ans et plus, le taux de divortialité était plus faible en 1996 que 10 ans plus tôt. Cette tendance est peut-être associée à la popularité croissante de l'union de fait, qui pourrait retarder ou supplanter le mariage.

4. Naissances

Nombre quotidien moyen de naissances vivantes selon le mois au Canada en 1996



Nombre quotidien moyen de naissances

Janvier	949	Juillet	1 047
Février	993	Août	1 010
Mars	1 026	Septembre	1 029
Avril	1 060	Octobre	963
Mai	1 068	Novembre	910
Juin	1 044	Décembre	908



En 1996, on a déclaré 366 200 naissances vivantes au Canada. Autrement dit, 1 001 bébés sont nés chaque jour, en moyenne. Toutefois, on constate des fluctuations saisonnières importantes. Le nombre quotidien de naissances était supérieur à la moyenne annuelle au printemps et en été, mais est tombé en-dessous de la moyenne en automne et au cours des premiers mois d'hiver. Plus précisément, le mois de mai est celui durant lequel on a observé le nombre le plus élevé de naissances (1 068 naissances par jour), suivi de près par le mois d'avril. Par contre, à peine plus de 900 bébés sont nés chaque jour en novembre et en décembre. Un léger redressement de la natalité est survenu en septembre.

Tableau 4.1 Naissances vivantes et taux bruts de natalité, Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996

	Canada ¹	T.-N. ²	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.
Nombre de naissances vivantes													
1986	372 858	8 100	1 925	12 353	9 787	84 604	133 875	17 008	17 513	43 741	41 965	483	1 504
1987	369 689	7 769	1 954	12 104	9 587	83 761	134 613	16 952	17 034	42 105	41 812	478	1 520
1988	376 755	7 487	1 976	12 176	9 616	86 590	138 060	17 030	16 763	42 053	42 930	521	1 553
1989	392 625	7 762	1 937	12 530	9 666	92 354	145 327	17 321	16 651	43 351	43 768	480	1 478
1990	405 417	7 604	2 014	12 864	9 819	98 015	150 909	17 350	16 090	43 002	45 614	556	1 580
1991	402 533	7 166	1 885	12 016	9 497	97 310	151 478	17 282	15 304	42 776	45 612	568	1 634
1992	398 643	6 918	1 850	11 874	9 389	96 146	150 593	16 590	15 004	42 039	46 156	529	1 554
1993	388 394	6 421	1 754	11 568	9 049	92 391	147 848	16 709	14 269	40 292	46 026	508	1 559
1994	385 114	6 339	1 716	11 099	8 978	90 578	147 068	16 480	14 038	39 796	46 998	442	1 580
1995	378 016	5 859	1 754	10 726	8 563	87 417	146 263	16 113	13 499	38 914	46 820	470	1 613
1996	366 200	5 747	1 694	10 573	8 176	85 226	140 012	15 478	13 300	37 851	46 138	443	1 562
Taux bruts de natalité (nombre de naissances vivantes pour 1 000 habitants)													
1986	14,2	14,0	14,9	13,8	13,4	12,6	14,1	15,5	17,0	17,9	13,9	19,5	27,2
1987	13,9	13,5	15,1	13,5	13,1	12,3	13,9	15,4	16,4	17,2	13,6	18,4	27,3
1988	14,0	13,0	15,2	13,5	13,1	12,6	14,0	15,4	16,2	17,1	13,7	19,4	27,6
1989	14,3	13,4	14,8	13,8	13,1	13,3	14,3	15,7	16,3	17,3	13,6	17,5	25,7
1990	14,6	13,1	15,4	14,1	13,2	14,0	14,6	15,7	15,9	16,8	13,8	19,8	26,6
1991	14,3	12,3	14,4	13,1	12,7	13,7	14,5	15,5	15,2	16,4	13,5	19,5	26,7
1992	14,0	11,9	14,1	12,8	12,5	13,4	14,1	14,8	14,9	15,9	13,3	17,5	24,8
1993	13,4	11,0	13,2	12,4	12,0	12,8	13,7	14,9	14,1	15,0	12,9	16,7	24,5
1994	13,2	10,9	12,8	11,9	11,8	12,4	13,4	14,6	13,9	14,7	12,8	14,9	24,4
1995	12,8	10,1	13,0	11,4	11,3	11,9	13,2	14,2	13,3	14,1	12,4	15,4	24,4
1996	12,2	10,1	12,4	11,2	10,7	11,5	12,4	13,6	13,0	13,6	12,0	14,1	23,4

¹ Comprend les naissances pour lesquelles on ne connaît pas la province ou le territoire de résidence de la mère.

² Les chiffres présentés pour Terre-Neuve ont été corrigés pour tenir compte de sous-dénombrements survenus de 1986 à 1990.





Le nombre de bébés mis au monde en 1996 (366 200 naissances vivantes) était inférieur de 3,1 % à celui observé l'année précédente. Effectivement, depuis 1990, le nombre de naissances vivantes a diminué chaque année (baisse de 9,7 % durant la période allant de 1990 à 1996). En 1996, les taux de natalité les plus faibles ont été observés à Terre-Neuve, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse (environ 10 à 11 naissances pour 1 000 habitants); par contre, le taux a été particulièrement élevé dans les Territoires du Nord-Ouest (23 naissances vivantes pour 1 000 habitants), suivi de loin par celui observé au Yukon (14 pour 1 000).

Tableau 4.2 Naissances vivantes selon l'âge de la mère et taux de fécondité par âge, Canada, provinces et territoires, 1996

	Canada	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.
Nombre de naissances vivantes													
Âge de la mère													
< 20	21 824	538	146	883	700	4 008	7 018	1 578	1 539	2 736	2 371	32	275
20-24	67 515	1 366	372	2 320	2 061	16 733	21 327	3 564	3 274	7 629	8 341	95	433
25-29	116 723	1 939	549	3 309	2 697	29 182	43 290	4 658	4 131	12 001	14 408	127	432
30-34	111 024	1 468	452	2 939	2 045	25 091	46 685	4 031	3 130	10 711	14 059	122	291
35-39	42 641	392	160	996	601	8 972	18 745	1 409	1 073	4 191	5 939	55	108
40-44	6 057	43	12	121	69	1 182	2 674	230	144	567	982	11	22
45+	210	1	3	2	3	45	88	6	6	16	38	1	1
Inconnu	206	-	-	3	-	13	185	2	3	-	-	-	-
Taux de fécondité par âge (naissances vivantes pour 1 000 femmes)													
< 20 ¹	22,4	24,2	29,0	28,1	26,9	16,3	20,0	40,8	41,9	28,5	19,6	29,4	102,8
20-24	67,3	59,5	77,6	70,9	73,7	71,1	57,1	91,0	95,8	78,9	63,1	88,4	159,1
25-29	105,9	87,2	114,6	98,5	95,9	114,6	100,8	117,0	129,1	112,2	98,3	105,0	140,2
30-34	85,6	62,2	81,1	73,5	63,9	79,7	92,4	88,0	80,5	87,4	85,5	73,7	90,1
35-39	32,2	16,3	28,6	24,0	18,6	26,8	37,9	30,6	26,4	32,4	35,0	32,7	39,2
40-44	5,1	1,8	2,5	3,2	2,2	3,9	6,1	5,4	3,9	5,0	6,3	7,5	10,2
45+ ²	0,2	0,0	0,6	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,7	0,6

¹ Naissances vivantes chez les femmes de moins de 20 ans pour 1 000 femmes de 15 à 19 ans.

² Naissances vivantes chez les femmes de 45 ans et plus pour 1 000 femmes de 45 à 49 ans.





Les taux de fécondité ont baissé chez les jeunes femmes, mais augmenté chez celles de 30 ans et plus. De 1986 à 1996, le taux de fécondité des femmes de 20 à 24 ans a baissé, pour passer de 78,8 à 67,3 naissances pour 1 000 habitantes. En revanche, le taux observé pour les femmes de 30 à 34 ans a augmenté, passant de 72,6 à 85,6 pour 1 000. Ces tendances contradictoires expliquent la stabilité relative des indices synthétiques de fécondité (tableau 4.3), et l'augmentation de l'âge moyen à la procréation (tableau 4.7).

Tableau 4.3 Indices synthétiques de fécondité, Canada¹, provinces et territoires, 1986 à 1996

	Canada	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.
Nombre moyen de naissances vivantes par femme au cours de la vie													
1986	1,59	..	1,78	1,58	1,53	1,38	1,60	1,83	2,02	1,85	1,61	1,92	2,82
1987	1,58	..	1,82	1,55	1,51	1,37	1,58	1,83	1,98	1,82	1,61	1,88	2,83
1988	1,61	..	1,85	1,57	1,53	1,43	1,59	1,85	1,99	1,84	1,64	1,99	2,91
1989	1,66	..	1,83	1,62	1,55	1,53	1,63	1,92	2,05	1,90	1,65	1,86	2,71
1990	1,71	..	1,93	1,68	1,58	1,64	1,67	1,95	2,07	1,89	1,69	2,16	2,80
1991	1,70	1,44	1,85	1,58	1,54	1,65	1,66	1,97	2,03	1,89	1,67	2,14	2,86
1992	1,69	1,40	1,82	1,58	1,54	1,65	1,67	1,92	2,03	1,86	1,65	1,93	2,70
1993	1,66	1,31	1,72	1,56	1,50	1,61	1,64	1,95	1,96	1,79	1,61	1,91	2,68
1994	1,66	1,32	1,68	1,53	1,51	1,61	1,65	1,95	1,96	1,80	1,63	1,73	2,74
1995	1,64	1,25	1,72	1,50	1,46	1,58	1,64	1,92	1,90	1,77	1,60	1,84	2,78
1996	1,59	1,26	1,67	1,49	1,41	1,56	1,57	1,86	1,89	1,72	1,54	1,69	2,71

¹ Les données couvrant la période de 1986 à 1990 ne comprennent pas les naissances survenues à Terre-Neuve ni les naissances de résidents de Terre-Neuve survenues à l'extérieur de la province.





En 1996, l'indice synthétique de fécondité (ISF) variait d'un minimum de 1,26 à Terre-Neuve à un maximum de 2,71 dans les Territoires du Nord-Ouest. En général, on a observé les taux les plus faibles dans les provinces de l'Atlantique, et les plus élevés dans les provinces de l'Ouest. Le taux de fécondité de remplacement, autrement dit le taux auquel la natalité compense la mortalité, est d'environ 2,1 naissances au cours de la vie d'une femme. Depuis au moins 1986, les ISF sont inférieurs aux taux de remplacement pour toutes les provinces. De surcroît, depuis 1990, le nombre moyen de naissances vivantes par femme au Canada a diminué chaque année (passant de 1,71 en 1990 à 1,59 en 1996). En 1996, l'ISF a atteint sa valeur chronologique la plus basse dans toutes les provinces, sauf Terre-Neuve, le Québec, le Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest.

Tableau 4.4 Naissances vivantes et taux de natalité chez les adolescentes, Canada¹, provinces et territoires, 1986 à 1996

	Canada	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.
Nombre de naissances chez les femmes de moins de 20 ans²													
1986	21 662	..	172	979	865	3 541	6 958	1 536	1 800	3 202	2 291	30	288
1987	21 216	..	167	947	749	3 608	6 757	1 573	1 732	3 103	2 216	49	315
1988	21 304	..	148	1 032	674	3 616	6 769	1 562	1 663	3 060	2 399	45	336
1989	22 697	..	157	1 031	874	3 871	7 267	1 716	1 710	3 188	2 558	39	286
1990	23 415	..	171	1 114	903	4 128	7 538	1 659	1 661	3 324	2 617	54	246
1991	24 445	814	166	1 030	898	3 954	7 615	1 766	1 718	3 457	2 706	42	279
1992	24 248	776	148	999	968	4 117	7 661	1 683	1 668	3 310	2 642	38	238
1993	23 693	661	153	976	875	4 076	7 705	1 734	1 632	3 042	2 539	41	259
1994	23 980	624	149	957	894	4 197	7 769	1 714	1 714	3 070	2 569	43	280
1995	23 657	562	150	873	847	4 140	7 816	1 654	1 632	3 035	2 634	36	278
1996	21 824	538	146	883	700	4 008	7 018	1 578	1 539	2 736	2 371	32	275
Taux de natalité chez les adolescentes (nombre de naissances pour 1 000 femmes de 15 à 19 ans)													
1986	23,0	..	32,5	27,6	29,2	14,9	19,8	36,8	45,9	34,8	21,5	31,6	111,9
1987	22,8	..	32,4	27,0	25,6	15,6	19,3	38,2	44,9	34,4	20,9	50,1	119,5
1988	23,0	..	29,3	29,7	23,1	16,0	19,3	38,2	43,9	34,2	22,5	44,6	128,1
1989	24,6	..	31,4	30,0	29,9	17,2	20,7	42,5	46,1	35,8	24,1	40,7	112,5
1990	25,5	..	34,6	33,1	30,8	18,2	21,6	41,6	45,5	37,4	24,5	57,4	97,9
1991	26,0	31,0	34,4	31,3	30,9	17,4	22,1	44,7	47,0	38,9	25,2	44,7	112,4
1992	25,7	30,4	30,4	31,1	33,9	17,8	22,3	43,0	45,5	36,9	24,3	39,2	96,5
1993	25,0	26,8	30,9	30,8	31,4	17,3	22,4	44,3	44,8	33,6	22,8	42,6	102,9
1994	25,0	26,3	29,5	30,5	32,9	17,5	22,5	43,8	47,0	33,4	22,5	44,0	107,4
1995	24,5	24,6	30,0	27,8	31,9	17,0	22,5	42,5	44,5	32,4	22,5	35,3	103,1
1996	22,3	24,2	29,0	28,1	26,9	16,3	20,0	40,8	41,8	28,5	19,6	29,4	102,8

¹ Les données couvrant la période de 1986 à 1990 ne comprennent pas les naissances survenues à Terre-Neuve ni les naissances de résidents de Terre-Neuve survenues à l'extérieur de la province.

² Comprend 210 à 265 bébés mis au monde chaque année (de 1986 à 1996) par des filles de 11 à 14 ans.





De 1991 à 1996, le taux de natalité chez les adolescentes a diminué, pour passer de 26,0 à 22,3 pour 1 000. En outre, le taux de 1996 est encore plus faible que les taux observés au milieu des années 80. Les taux de natalité chez les adolescentes observés au Manitoba et en Saskatchewan sont plus de deux fois plus élevés que ceux observés au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. À 103 naissances pour 1 000, les adolescentes vivant dans les Territoires du Nord-Ouest étaient, de loin, les plus susceptibles de connaître la maternité à un âge précoce.

Tableau 4.5 Naissances vivantes chez les femmes de 30 ans et plus, Canada¹, provinces et territoires, 1986 à 1996

	Canada	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.
Nombre de naissances chez les femmes de 30 ans et plus													
1986	106 474	..	536	3 245	2 094	23 167	42 788	4 642	3 853	12 059	13 607	156	327
1987	111 244	..	526	3 239	2 441	23 959	45 077	4 793	4 101	12 392	14 235	168	313
1988	118 512	..	556	3 375	2 562	25 936	48 245	4 881	4 118	13 014	15 289	182	354
1989	128 328	..	567	3 622	2 330	28 874	52 764	5 258	4 232	14 216	15 983	175	307
1990	138 371	..	607	4 008	2 479	32 223	56 728	5 349	4 444	14 560	17 414	212	347
1991	144 930	1 870	602	3 758	2 460	33 563	59 349	5 469	4 336	14 989	17 932	210	391
1992	150 891	1 842	621	3 910	2 605	34 920	62 122	5 533	4 518	15 467	18 760	208	385
1993	153 798	1 757	594	3 980	2 615	35 311	64 326	5 765	4 427	15 116	19 343	204	360
1994	157 585	1 849	621	3 938	2 616	35 873	65 980	5 796	4 457	15 416	20 408	196	434
1995	160 757	1 782	662	3 951	2 696	35 973	68 683	5 877	4 323	15 357	20 802	199	449
1996	159 932	1 904	627	4 058	2 718	35 290	68 192	5 676	4 353	15 485	21 018	189	422
Nombre de naissances chez les femmes de 30 ans et plus exprimé en proportion du total des naissances (%)													
1986	29	..	28	26	21	27	32	27	22	28	32	32	22
1987	31	..	27	27	25	29	33	28	24	29	34	35	21
1988	32	..	28	28	27	30	35	29	25	31	36	35	23
1989	33	..	29	29	24	31	36	30	25	33	37	36	21
1990	35	..	30	31	25	33	38	31	28	34	38	38	22
1991	37	26	32	31	26	35	40	32	28	35	39	37	24
1992	39	27	34	33	28	36	41	33	30	37	41	39	25
1993	40	27	34	34	29	38	44	35	31	38	42	40	23
1994	42	29	36	35	29	40	45	35	32	39	43	44	27
1995	43	30	38	37	31	41	47	36	32	39	44	42	28
1996	44	33	37	38	33	41	49	37	33	41	46	43	27

¹ Les données couvrant la période de 1986 à 1990 ne comprennent pas les naissances survenues à Terre-Neuve ni les naissances de résidents de Terre-Neuve survenues à l'extérieur de la province.



La proportion de naissances qu'on associe aux femmes plus âgées a augmenté régulièrement ces dernières années : en 1986, un peu moins de 3 naissances sur 10 sont survenues chez des femmes dans la trentaine ou plus âgées; en 1996, plus de 4 naissances sur 10 sont survenues chez les femmes de cet âge. Cette tendance pourrait tenir au fait que les taux de fécondité augmentent chez les femmes plus âgées et que la population féminine vieillit (par exemple, en 1986, 18 % de femmes avaient de 20 à 29 ans et 16 %, de 30 à 39 ans; en 1996, les proportions correspondantes étaient de 14 % et de 17 %).

Les prénoms les plus à la mode en 1996

Les prénoms les plus à la mode sont compilés pour l'ensemble du Canada et séparément pour le Québec, étant donné la prépondérance des noms français dans cette province. Certains des prénoms choisis le plus fréquemment à l'échelle nationale étaient également courants au Québec (p. ex., Nicholas/Nicolas, Sarah et Jessica). Plusieurs des prénoms choisis le plus fréquemment au Québec étaient bilingues ou purement anglais (p. ex., Samuel, Gabriel, William, Audrey et Alexandra).

Les prénoms à caractère religieux continuent d'avoir du succès (p. ex., Matthew/Mathieu, Daniel, Sarah, Catherine et Rachel). Un plus grand éventail de prénoms (y compris les variations) ont été donnés aux filles qu'aux garçons : pour l'ensemble du Canada, les parents ont choisi plus de 19 000 prénoms différents pour les filles, comparativement à plus de 14 000 pour les garçons.

Bien que les prénoms les plus courants dans l'ensemble soient généralement populaires dans chaque province et territoire, on observe certaines variations régionales. Par exemple, Rebecca, Courtney, Brittany et Kelsey ne figuraient pas sur la liste des 10 prénoms de fille les plus courants à l'échelle nationale, mais figuraient sur celles de plusieurs provinces et territoires; pareillement, Jacob, Jordan, Kyle et Justin ont été des prénoms fréquemment choisis pour les garçons.

Les prénoms les plus à la mode au Canada, selon le sexe¹

GARÇONS	Nombre	FILLES	Nombre
MATTHEW	3 617	SARAH	3 109
NICHOLAS	3 292	EMILY	2 776
MICHAEL	2 988	JESSICA	2 585
BRANDON	2 579	MEGAN	2 044
RYAN	2 338	SAMANTHA	1 840
JOSHUA	2 335	ASHLEY	1 629
TYLER	2 124	RACHEL	1 598
CHRISTOPHER	2 068	NICOLE	1 520
DANIEL	1 969	TAYLOR	1 499
ALEXANDER	1 965	ALEXANDRA	1 423
Les 10 premiers prénoms	25 275	Les 10 premiers prénoms	20 023
% de tous les prénoms		% de tous les prénoms	
de garçons ²	15 %	de filles ²	13 %

Les prénoms les plus à la mode au Québec, selon le sexe³

GARÇONS	Nombre	FILLES	Nombre
SAMUEL	846	CATHERINE	458
ALEXANDRE	634	SARAH	455
GABRIEL	590	AUDREY	443
MAXIME	542	ALEXANDRA	371
NICOLAS	476	ÉMILIE	356
KEVIN	451	JESSICA	346
WILLIAM	440	SABRINA	345
MARC	430	CAMILLE	334
MATHIEU	408	MAUDE	283
OLIVIER	407	AMÉLIE	260
Les 10 premiers prénoms	5 224	Les 10 premiers prénoms	3 651
% de tous les prénoms		% de tous les prénoms	
de garçons	25 %	de filles	18 %

¹ Inclut la plupart des variations orthographiques, comme Nickolas, Mikael, Kristopher, Sara, Emilie et Meaghan.

² Les pourcentages sont calculés en se fondant sur les prénoms connus uniquement. Les prénoms de 23 682 garçons et de 22 264 filles (y compris 22 682 et 21 318 au Québec, respectivement) étaient inconnus. Dans 125 cas, le sexe de l'enfant n'était pas indiqué (109 au Québec).


³ Inclut la plupart des variations orthographiques, comme Nicholas, Keven, Matthieu, Katherine, Jessika et Emily.

Tableau 4.6 Nombre et répartition en pourcentage des naissances vivantes selon la parité¹, Canada, provinces et territoires, 1986² et 1996

Parité	Canada	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.
Nombre de naissances vivantes, 1986													
1	158 491	..	710	5 292	4 181	40 324	58 743	6 892	6 450	17 634	17 516	208	541
2	130 036	..	686	4 383	3 573	30 437	47 844	5 784	5 725	15 562	15 449	159	434
3	53 364	..	343	1 900	1 499	10 342	19 661	2 746	3 242	6 935	6 387	73	236
4	15 589	..	129	547	372	2 484	5 465	928	1 275	2 357	1 874	24	134
5 +	7 272	..	57	229	161	1 017	2 161	657	821	1 253	739	19	158
Inconnue	6	..	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	1
Répartition en pourcentage, 1986 (%)													
1	43,5	..	36,9	42,8	42,7	47,7	43,9	40,5	36,8	40,3	41,7	43,1	36,0
2	35,7	..	35,6	35,5	36,5	36,0	35,7	34,0	32,7	35,6	36,8	32,9	28,9
3	14,6	..	17,8	15,4	15,3	12,2	14,7	16,1	18,5	15,9	15,2	15,1	15,7
4	4,3	..	6,7	4,4	3,8	2,9	4,1	5,5	7,3	5,4	4,5	5,0	8,9
5+	2,0	..	3,0	1,9	1,6	1,2	1,6	3,9	4,7	2,9	1,8	3,9	10,5
Nombre de naissances vivantes, 1996													
1	157 897	2 724	696	4 774	3 752	37 578	59 952	6 444	5 088	15 171	20 985	210	523
2	129 607	2 165	582	3 728	2 915	30 574	50 532	4 824	4 231	13 307	16 173	140	436
3	52 579	631	273	1 485	1 116	11 947	19 993	2 416	2 320	5 919	6 160	57	262
4	16 744	173	101	386	283	3 504	6 122	1 009	956	2 086	1 936	24	164
5+	9 132	54	42	191	110	1 621	3 211	761	704	1 368	884	12	174
Inconnue	241	-	-	9	-	2	202	24	1	-	-	-	3
Répartition en pourcentage, 1996 (%)													
1	43,1	47,4	41,1	45,2	45,9	44,1	42,9	41,7	38,3	40,1	45,5	47,4	33,5
2	35,4	37,7	34,4	35,3	35,7	35,9	36,1	31,2	31,8	35,2	35,1	31,6	28,0
3	14,4	11,0	16,1	14,1	13,6	14,0	14,3	15,6	17,4	15,6	13,4	12,9	16,8
4	4,6	3,0	6,0	3,7	3,5	4,1	4,4	6,5	7,2	5,5	4,2	5,4	10,5
5+	2,5	0,9	2,5	1,8	1,3	1,9	2,3	4,9	5,3	3,6	1,9	2,7	11,2

¹ La parité précise le nombre total d'enfants mis au monde vivants par une femme (p. ex., une femme dont la parité est égale à trois a mis trois enfants vivants au monde).

² Les données de 1986 ne comprennent pas les naissances survenues à Terre-Neuve ni les naissances de résidents de Terre-Neuve survenues en dehors de la province.




Au niveau national, le pourcentage de naissances vivantes correspondant à une première naissance n'a pour ainsi dire pas varié de 1986 à 1996 (environ 43 %). Toutefois, la proportion a augmenté légèrement dans la plupart des provinces durant cette période, mais elle a baissé au Québec, passant de 48 % à 44 %.

Tableau 4.7 Âge moyen à la procréation, toutes les naissances et premières naissances, Canada¹, provinces et territoires, 1986 à 1996

	Canada	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.
Toutes les naissances	Années												
1986	27,0	..	26,6	26,4	25,9	27,0	27,3	26,5	25,8	26,6	27,3	27,2	24,9
1987	27,2	..	26,4	26,6	26,4	27,2	27,5	26,6	26,0	26,9	27,5	27,1	24,6
1988	27,3	..	26,7	26,6	26,6	27,3	27,7	26,7	26,1	27,0	27,7	27,2	24,9
1989	27,5	..	26,8	26,7	26,1	27,4	27,9	26,7	26,2	27,2	27,7	27,3	24,9
1990	27,6	..	26,9	26,9	26,3	27,6	28,0	26,9	26,4	27,3	27,9	27,4	25,1
1991	27,7	26,1	27,1	27,0	26,3	27,7	28,2	26,8	26,4	27,3	28,0	27,6	25,3
1992	27,9	26,2	27,2	27,1	26,5	27,9	28,3	27,0	26,6	27,5	28,1	27,9	25,5
1993	28,0	26,4	27,3	27,2	26,6	28,0	28,5	27,1	26,6	27,6	28,3	27,8	25,2
1994	28,1	26,5	27,3	27,3	26,6	28,1	28,6	27,1	26,6	27,7	28,4	28,3	25,6
1995	28,2	26,6	27,5	27,4	26,7	28,2	28,8	27,2	26,6	27,8	28,5	28,1	25,7
1996	28,4	27,0	27,4	27,6	27,0	28,3	29,0	27,3	26,7	28,0	28,7	28,2	25,7
Premières naissances													
1986	25,7	..	24,3	24,9	24,2	25,9	26,0	24,9	24,0	25,3	26,0	25,6	22,4
1987	25,9	..	24,3	25,0	24,9	26,1	26,2	25,1	24,2	25,5	26,3	25,7	22,2
1988	26,1	..	24,9	25,1	25,1	26,2	26,5	25,2	24,4	25,7	26,4	25,8	22,2
1989	26,2	..	25,1	25,2	24,6	26,4	26,6	25,2	24,5	25,7	26,5	26,1	23,1
1990	26,3	..	24,9	25,4	24,9	26,5	26,8	25,6	24,6	25,8	26,6	25,7	23,4
1991	26,4	24,3	25,1	25,5	24,9	26,7	26,9	25,4	24,4	25,7	26,7	26,4	23,5
1992	26,6	24,7	25,2	25,7	24,9	26,8	27,1	25,7	24,6	26,0	26,9	26,4	23,6
1993	26,7	24,9	24,8	25,8	25,1	26,9	27,2	25,8	24,7	26,2	27,1	26,4	23,4
1994	26,8	25,0	25,4	25,7	25,2	26,9	27,3	25,8	24,6	26,3	27,3	26,8	23,1
1995	26,9	25,2	25,1	26,0	25,1	26,9	27,5	25,8	24,7	26,4	27,4	26,6	23,6
1996	27,1	25,6	25,5	26,1	25,6	26,9	27,7	25,9	24,8	26,6	27,7	27,2	23,6

¹ Les données couvrant la période de 1986 à 1990 ne comprennent pas les naissances survenues à Terre-Neuve ni les naissances de résidents de Terre-Neuve survenues à l'extérieur de la province.



L'âge moyen auquel les femmes mettent des enfants au monde est à la hausse depuis 1975, reflétant le fait qu'elles s'inscrivent plus fréquemment à des programmes d'études postsecondaires et que leur nombre augmente sur le marché du travail, ainsi que leur tendance croissante à retarder le mariage (tableau 2.4). Plus récemment, l'âge moyen à la procréation a augmenté, passant de 27,0 ans en 1986 à 28,4 ans en 1996. L'âge moyen à la première naissance suit la même tendance, mais aux âges moins avancés : il est passé de 25,7 à 27,1 ans de 1986 à 1996. Les femmes qui vivent dans les provinces les plus peuplées et urbanisées ont tendance à avoir des enfants à un âge plus avancé que leurs homologues des provinces de l'Atlantique et des Prairies (p. ex., 29,0 ans en Ontario en 1996 [toutes les naissances] contre 26,7 ans en Saskatchewan).



Tableau 4.8 Nombre et proportion de naissances chez les femmes non mariées, Canada¹, provinces et territoires, 1986 à 1996

	Canada	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.
Nombre de naissances vivantes chez les femmes non mariées^{2,3}													
1986	68 868	..	321	2 383	2 042	23 120	17 122	3 567	4 022	7 697	7 681	162	751
1987	72 853	..	370	2 425	2 156	25 194	17 553	3 826	4 080	7 947	8 326	152	824
1988	80 052	..	368	2 706	2 374	28 592	19 068	4 145	4 326	8 526	8 905	170	872
1989	89 048	..	383	2 880	2 524	33 135	20 514	4 516	4 535	9 160	10 382	175	844
1990	96 994	..	420	3 281	2 604	37 188	22 562	4 720	4 562	9 740	10 756	232	929
1991	106 064	2 273	445	3 355	2 836	39 628	24 907	5 023	4 686	10 256	11 459	229	967
1992	109 062	2 410	459	3 496	2 964	41 807	24 724	5 125	4 823	10 509	11 626	204	915
1993	106 838	2 296	464	3 566	2 976	42 973	24 148	5 383	4 766	10 388	8 667	224	987
1994	105 987	1 691	503	3 622	3 215	43 523	22 926	5 395	4 763	10 399	8 785	191	974
1995	105 621	1 466	527	3 557	3 128	43 885	22 045	5 503	4 783	10 398	9 097	221	1 010
1996	103 530	1 429	510	3 647	2 977	44 575	20 291	5 372	4 644	9 988	8 889	202	1 006
Proportion de naissances vivantes chez les femmes non mariées (%)²													
1986	18,9	..	16,7	19,3	20,9	27,4	12,8	21,0	23,0	17,6	18,3	34,1	50,2
1987	20,2	..	18,9	20,0	22,5	30,2	13,0	22,6	24,0	18,9	19,9	32,5	54,9
1988	21,7	..	18,6	22,2	24,7	33,0	13,8	24,3	25,8	20,3	20,9	33,7	56,7
1989	23,2	..	19,8	23,2	26,1	35,9	14,1	26,1	27,2	21,2	23,8	36,9	57,7
1990	24,4	..	20,9	25,5	26,5	37,9	15,0	27,2	28,4	22,7	23,6	41,7	58,9
1991	27,0	31,7	23,6	27,9	29,9	41,1	17,4	29,1	30,6	24,0	25,1	40,3	59,2
1992	28,2	34,8	24,8	29,4	31,6	43,9	17,7	30,9	32,1	25,0	25,2	38,6	58,9
1993	29,2	35,8	26,5	30,8	32,9	46,9	18,6	32,2	33,4	25,8	20,6	44,3	63,8
1994	29,6	29,8	29,3	32,6	35,8	48,1	18,2	32,8	35,1	26,2	20,8	43,5	62,0
1995	30,5	28,7	30,1	33,3	36,5	50,3	18,2	34,2	36,5	26,7	21,7	47,5	63,0
1996	30,9	28,4	30,2	34,5	36,4	52,7	17,6	34,7	36,0	26,4	21,7	45,6	65,0

¹ Les données couvrant la période de 1986 à 1990 ne comprennent pas les naissances survenues à Terre-Neuve ni les naissances de résidents de Terre-Neuve survenues à l'extérieur de la province.

² N'inclut pas les naissances pour lesquelles on ne connaît pas l'état matrimonial de la mère. Ces naissances étaient peu nombreuses avant 1991; depuis, leur nombre est à la hausse, particulièrement en Ontario (environ 25 000 en 1996) et en Colombie-Britannique (5 000).

³ Comprend les femmes célibataires (jamais mariées), séparées, divorcées et veuves.




Étant donné la popularité croissante de l'union de fait pour remplacer le mariage, un plus grand nombre d'enfants naissent dans une famille où les parents ne sont pas mariés légalement, particulièrement au Québec. La proportion de naissances chez les femmes non mariées au Québec est passée de 27 % en 1986 à 53 % en 1996, tandis qu'elle est passée de 16 % à 24 % dans le reste du Canada. La proportion de naissances chez les femmes non mariées est également élevée dans les deux territoires.

Naissances survenues en 1996 à l'extérieur de la province ou du territoire de résidence de la mère

Province ou territoire de résidence de la mère	Nombre total de naissances	Survenues dans la province ou le territoire	Survenues à l'extérieur de la province ou du territoire
T.-N.	5 747	5 730	17
Î.-P.-É.	1 694	1 655	39
N.-É.	10 753	10 487	86
N.-B.	8 176	8 134	42
QC	85 226	84 057	1 169
Ont.	140 012	139 781	231
Man.	15 478	15 359	119
Sask.	13 300	12 877	423
Alb.	37 851	37 466	385
C.-B.	46 138	45 972	166
Yn	443	416	27
T.N.-O.	1 562	1 313	249

% survenues à l'extérieur de la province ou du territoire





En 1996, dans la plupart des provinces, moins de 1 % des naissances sont survenues à l'extérieur de la province de résidence de la mère. Le cas échéant, la naissance a habituellement eu lieu dans une province ou un territoire voisin. La naissance était plus susceptible d'avoir lieu hors de la province ou du territoire de résidence de la mère si celle-ci vivait dans les Territoires du Nord-Ouest (16 %, principalement au Manitoba ou en Alberta) ou au Yukon (6 %, principalement en Colombie-Britannique ou en Alberta). Plus de 3 % des bébés dont la mère résidait en Saskatchewan sont nés en Alberta ou au Manitoba et un peu plus de 2 % de ceux dont la mère vivait à l'Île-du-Prince-Édouard sont nés en Nouvelle-Écosse.

Tableau 4.9 Nombre et proportion de naissances vivantes avec faible poids à la naissance (inférieur à 2 500 grammes), Canada¹, provinces et territoires, 1986 à 1996

	Canada	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.
Nombre de naissances vivantes avec faible poids à la naissance													
1986	20 032	..	94	693	500	5 242	7 202	903	864	2 404	2 001	32	97
1987	19 994	..	103	671	510	5 069	7 287	930	866	2 300	2 137	30	91
1988	20 809	..	118	727	511	5 384	7 587	927	853	2 429	2 159	16	98
1989	21 303	..	91	687	565	5 528	7 734	865	892	2 545	2 299	19	78
1990	21 963	..	95	755	493	5 817	8 120	951	789	2 532	2 296	29	86
1991	22 316	402	85	687	528	5 654	8 452	928	776	2 462	2 224	31	87
1992	21 818	389	96	663	507	5 422	8 365	837	730	2 447	2 229	32	101
1993	22 011	368	71	676	501	5 220	8 823	897	737	2 280	2 320	32	86
1994	22 168	396	104	613	531	5 360	8 784	871	749	2 242	2 385	26	107
1995	22 085	321	81	639	409	5 200	8 857	886	753	2 330	2 477	20	112
1996	21 025	349	90	571	419	4 920	8 361	845	664	2 300	2 401	19	86
Proportion de naissances vivantes avec faible poids à la naissance (%)²													
1986	5,5	..	4,9	5,6	5,1	6,2	5,4	5,3	4,9	5,5	4,8	6,6	6,5
1987	5,5	..	5,3	5,5	5,3	6,1	5,4	5,5	5,1	5,5	5,1	6,3	6,0
1988	5,7	..	6,0	6,0	5,3	6,3	5,5	5,4	5,1	5,8	5,0	3,1	6,3
1989	5,6	..	4,7	5,5	5,8	6,1	5,3	5,0	5,4	5,9	5,3	4,0	5,3
1990	5,5	..	4,7	5,9	5,0	6,0	5,4	5,5	4,9	5,9	5,0	5,2	5,4
1991	5,6	5,6	4,5	5,7	5,6	5,9	5,7	5,4	5,1	5,8	4,9	5,5	5,3
1992	5,5	5,6	5,2	5,6	5,4	5,7	5,6	5,0	4,9	5,8	4,8	6,0	6,5
1993	5,7	5,7	4,1	5,9	5,5	5,7	6,0	5,4	5,2	5,7	5,1	6,3	5,5
1994	5,8	6,3	6,1	5,5	5,9	5,9	6,0	5,3	5,3	5,6	5,1	5,9	6,8
1995	5,9	5,5	4,6	6,0	4,8	6,0	6,1	5,5	5,6	6,0	5,3	4,3	7,0
1996	5,8	6,1	5,3	5,4	5,1	5,9	6,0	5,5	5,0	6,1	5,2	4,3	5,5

¹ Les données couvrant la période de 1986 à 1990 ne comprennent pas les naissances survenues à Terre-Neuve ni les naissances de résidents de Terre-Neuve survenues à l'extérieur de la province.

² N'inclut pas les naissances pour lesquelles le poids à la naissance est inconnu.



La proportion de résidentes du Canada qui ont mis au monde un bébé vivant de faible poids à la naissance était légèrement plus élevée au milieu des années 90 que durant les années antérieures. Par exemple, en 1996, 5,8 % des bébés pesaient moins de 2 500 grammes à la naissance, comparativement à 5,5 % en 1986. En 1996, on a observé la proportion la plus forte de bébés de faible poids à la naissance en Alberta et à Terre-Neuve (6,1 %) et la plus faible, au Yukon (4,3 %), suivi par la Saskatchewan (5,0 %).

Tableau 4.10 Faible poids à la naissance (inférieur à 2 500 grammes), selon certaines caractéristiques de la mère et de l'enfant, Canada, 1996

	Naissances			
	Total	Pour lesquelles le poids à la naissance est connu	Pour lesquelles le poids à la naissance est faible	% pour lesquelles le poids à la naissance est connu et faible
Total	366 200	364 748	21 025	5,8
Sexe				
Garçons	188 145	187 405	10 008	5,3
Filles	177 930	177 228	11 013	6,2
Inconnu	125	115	4	3,5
Parité				
1	157 897	157 301	9 833	6,3
2	129 607	129 063	6 568	5,1
3+	78 455	78 148	4 609	5,9
Inconnue	241	236	15	6,4
Âge de la mère				
< 20	21 824	21 753	1 537	7,1
20-34	295 262	294 050	16 236	5,5
35+	48 908	48 743	3 240	6,6
Inconnu	206	202	12	5,9
État matrimonial de la mère				
Mariée	231 128	230 461	11 688	5,1
Non mariée ¹	103 530	102 796	6 800	6,6
Inconnu	31 542	31 491	2 537	8,1
Lieu de naissance de la mère				
Canada	283 683	282 438	15 752	5,6
Ailleurs	78 220	78 071	4 969	6,4
Inconnu	4 297	4 239	304	7,2

¹ Inclut les femmes qui étaient célibataires (c.-à-d. jamais mariées), séparées, divorcées ou veuves. Les femmes non mariées vivant en union de fait ont également été classées dans cette catégorie.

En moyenne, les filles pèsent moins que les garçons à la naissance. Elles sont aussi plus susceptibles d'avoir un faible poids à la naissance (c.-à-d. un poids inférieur à 2 500 grammes) : 6,2 % de filles nées en 1996 avaient un faible poids à la naissance comparativement à 5,3 % des garçons. Le taux de mortalité des bébés de faible poids à la naissance est plus élevé que celui des bébés de poids de naissance normal. Les bébés de faible poids à la naissance sont aussi plus susceptibles que les autres enfants d'avoir des problèmes de santé durant l'enfance.



On a observé un lien entre le faible poids à la naissance et plusieurs facteurs de risque, dont le comportement de la mère à l'égard du tabac durant la grossesse et le statut socioéconomique. Ce dernier, à son tour, est lié à l'âge, au régime alimentaire, à l'état matrimonial et au groupe ethnique. Dans le tableau qui précède, on constate qu'en 1996, les bébés de mères adolescentes étaient plus susceptibles que ceux de mères plus âgées d'avoir un faible poids à la naissance (7,1 % de bébés de faible poids à la naissance chez les mères adolescentes comparativement à 5,5 % chez les mères de 20 à 34 ans). Les bébés de mères non mariées étaient aussi plus susceptibles que ceux de leurs homologues mariées d'avoir un faible poids à la naissance (6,6 % contre 5,1 %), comme l'étaient ceux de femmes nées à l'étranger (6,4 %), comparativement à ceux de femmes nées au Canada (5,6 %).

Tableau 4.11 Nombre et proportion de naissances vivantes prématurées (moins de 37 semaines de gestation), Canada¹, provinces et territoires, 1986 à 1996

	Canada	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.
Nombre de naissances vivantes prématurées²													
1986	21 801	..	88	738	528	5 123	7 704	1 221	1 045	2 773	2 423	42	116
1987	22 148	..	97	704	616	5 239	7 837	1 215	1 057	2 688	2 545	41	109
1988	23 904	..	123	859	603	5 798	8 559	1 233	1 043	2 879	2 626	39	142
1989	23 979	..	119	868	679	5 683	8 657	1 176	1 033	2 848	2 757	39	120
1990	25 139	..	116	976	601	6 355	9 010	1 212	938	2 982	2 778	48	123
1991	16 405	449	101	852	638	6 300	..	1 242	1 039	2 839	2 773	38	134
1992	16 363	484	94	860	601	6 397	..	1 131	935	2 838	2 826	52	145
1993	15 685	420	96	818	630	6 039	..	1 168	894	2 665	2 788	35	132
1994	16 101	445	103	805	647	6 313	..	1 146	902	2 703	2 862	26	149
1995	16 124	418	97	777	515	6 196	..	1 184	960	2 736	3 073	25	143
1996	15 892	453	109	765	533	6 027	..	1 151	866	2 789	3 033	22	144
Proportion de naissances vivantes prématurées (%)²													
1986	6,0	..	4,6	6,0	5,4	6,1	5,8	7,2	6,0	6,3	5,8	8,7	7,7
1987	6,1	..	5,0	5,8	6,4	6,3	5,8	7,2	6,2	6,4	6,1	8,6	7,2
1988	6,5	..	6,2	7,1	6,3	6,8	6,2	7,2	6,2	6,8	6,1	7,5	9,2
1989	6,3	..	6,1	6,9	7,0	6,4	6,0	6,8	6,2	6,6	6,3	8,1	8,2
1990	6,4	..	5,8	7,6	6,1	6,7	6,0	7,0	5,8	6,9	6,1	8,6	7,8
1991	6,7	6,3	5,4	7,1	6,7	6,7	..	7,2	6,8	6,6	6,1	6,7	8,2
1992	6,7	7,0	5,1	7,3	6,4	6,9	..	6,8	6,2	6,8	6,1	9,8	9,3
1993	6,6	6,5	5,5	7,1	7,0	6,7	..	7,0	6,3	6,6	6,1	6,9	8,5
1994	6,8	7,0	6,0	7,3	7,2	7,0	..	7,0	6,4	6,8	6,1	5,9	9,4
1995	7,0	7,1	5,5	7,2	6,0	7,1	..	7,4	7,1	7,0	6,6	5,3	8,9
1996	7,1	7,9	6,4	7,2	6,5	7,2	..	7,4	6,5	7,4	6,6	5,0	9,3

¹ Sont exclues du total national toutes les naissances qui ont eu lieu à Terre-Neuve entre 1986 et 1990, toutes les naissances qui sont survenues en Ontario entre 1991 et 1996 et les naissances de résidents de ces deux provinces survenues dans une autre province ou un autre territoire ces années-là. (On est en train de réviser les données de l'Ontario afin de corriger un problème de déclaration.)

² Sont exclues les naissances pour lesquelles la durée de la gestation est inconnue.



La proportion de prématurés a augmenté lentement ces dernières années (passant de 6,0 % en 1986 à 7,1 % en 1996). En 1996, cette proportion était plus forte qu'il y a 10 ans dans chaque province et territoire, sauf au Yukon. Selon une étude récente (Joseph *et al.*, 1998), cette tendance tient principalement à l'augmentation du nombre de naissances multiples, aux interventions médicales et à la meilleure estimation de l'âge gestationnel par ultrasonographie.

Tableau 4.12 Naissances vivantes prématurées (moins de 37 semaines de gestation), selon certaines caractéristiques de la mère et de l'enfant, Canada (Ontario non compris¹), 1996

	Naissances ²			
	Total	Pour lesquelles on connaît l'âge gestationnel	Que l'on sait être prématurées	% pour lesquelles on connaît l'âge gestationnel et que l'on sait être prématurées
Total	226 188	224 520	15 892	7,1
Sexe				
Garçons	116 394	115 562	8 567	7,4
Filles	109 684	108 855	7 318	6,7
Inconnu	110	103	7	6,8
Parité				
1	97 945	97 217	7 073	7,3
2	79 075	78 519	5 097	6,5
3+	49 129	48 752	3 717	7,6
Inconnue	39	32	5	15,6
Âge de la mère				
< 20	14 806	14 735	1 227	8,3
20-34	183 960	182 560	12 471	6,8
35+	27 401	27 209	2 194	8,1
Inconnu	21	16	-	-
État matrimonial de la mère				
Mariée	135 984	135 141	8 671	6,4
Non mariée ³	83 239	82 446	6 521	7,9
Inconnu	6 965	6 933	700	10,1
Lieu de naissance de la mère				
Canada	187 744	186 390	13 180	7,1
Ailleurs	34 460	34 256	2 432	7,1
Inconnu	3 984	3 874	280	7,2

¹ Toutes les naissances survenues en Ontario et les naissances de résidents de l'Ontario survenues hors de la province sont exclues, car on est en train d'examiner les données pour corriger un problème de déclaration.

² Sont exclues les naissances pour lesquelles on ne connaît pas la durée de la gestation ou le poids à la naissance.

³ Inclut les femmes célibataires (c.-à-d. jamais mariées), séparées, divorcées ou veuves. Les femmes non mariées vivant en union de fait ont également été classées dans cette catégorie.



Les prématurés, c'est-à-dire les bébés nés avant la fin de la 37^e semaine de gestation ont souvent un faible poids à la naissance. En 1996, 53 % des prématurés pesaient moins de 2 500 grammes à la naissance, comparativement à 2 % pour toutes les autres catégories de naissances. Les caractéristiques sociodémographiques des mères de prématurés ressemblaient à celles des mères mettant au monde des bébés de faible poids à la naissance. Par exemple, 8,3 % des bébés mis au monde par des adolescentes étaient prématurés, comparativement à 6,8 % de ceux dont la mère avait de 20 à 34 ans. De même, les bébés de mères non mariées étaient plus susceptibles d'être prématurés (7,9 % des naissances) que ceux de mères mariées (6,4 %). Par contre, les bébés de mères nées à l'étranger étaient tout aussi susceptibles d'être prématurés que ceux de mères nées au Canada (7,1 % dans les deux cas). En 1996, une plus forte proportion de garçons que de filles sont nés prématurément (7,4 % de garçons comparativement à 6,7 % de filles).

Tableau 4.13 Nombre de naissances multiples et taux de naissances multiples, Canada¹, provinces et territoires, 1986 à 1996

	Canada	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.
Nombre de naissances multiples²													
1986	3 561	..	21	142	85	790	1 327	172	169	418	420	4	13
1987	3 769	..	20	124	87	867	1 396	182	174	447	452	7	13
1988	3 855	..	25	123	94	887	1 455	170	192	427	455	4	23
1989	4 071	..	20	139	108	884	1 646	155	189	467	448	4	11
1990	4 199	..	20	143	105	1 023	1 653	176	162	450	451	5	11
1991	4 107	81	33	130	105	1 007	1 493	182	143	450	466	6	11
1992	4 188	69	13	133	90	1 009	1 567	182	161	484	448	8	24
1993	4 090	65	19	131	89	958	1 509	192	145	444	518	7	13
1994	4 380	70	15	125	100	1 017	1 766	152	156	443	508	3	25
1995	4 362	70	16	117	80	984	1 765	186	150	460	506	7	21
1996	4 410	68	12	115	91	978	1 816	151	143	453	567	6	10
Taux de naissances multiples (pour 1 000 accouchements)²													
1986	9,8	..	11,0	11,5	8,7	9,4	9,9	10,2	9,7	9,6	10,0	8,3	8,6
1987	10,5	..	10,3	10,3	9,1	10,4	10,4	10,8	10,3	10,7	10,8	14,7	8,2
1988	10,5	..	12,7	10,1	9,8	10,3	10,6	10,0	11,5	10,2	10,6	7,7	14,8
1989	10,6	..	10,4	11,1	11,2	9,6	11,4	9,0	11,4	10,8	10,3	8,4	7,0
1990	10,6	..	10,0	11,2	10,7	10,5	11,0	10,2	10,1	10,5	9,9	9,1	6,9
1991	10,3	11,4	17,7	10,9	11,1	10,4	9,9	10,5	9,4	10,5	10,3	10,7	6,7
1992	10,6	10,0	7,0	11,2	9,6	10,6	10,4	11,0	10,7	11,6	9,7	15,3	15,6
1993	10,6	10,2	10,9	11,4	9,9	10,4	10,2	11,5	10,2	11,1	11,3	13,9	8,4
1994	11,4	11,0	8,8	11,4	11,2	11,3	12,1	9,2	11,2	11,2	10,8	6,8	15,9
1995	11,6	11,9	9,1	10,9	9,4	11,3	12,1	11,6	11,2	11,9	10,8	15,0	12,8
1996	12,1	11,8	7,1	10,9	11,1	11,6	13,1	9,8	10,8	12,0	12,4	13,7	6,4

¹ Les données couvrant la période de 1986 à 1990 ne comprennent pas les naissances survenues à Terre-Neuve ni les naissances de résidents de Terre-Neuve survenues à l'extérieur de la province.

² L'accouchement de plus d'un fœtus, vivant ou mort-né (p. ex., jumeaux, triplés).



Malgré la diminution du nombre de naissances observée entre 1986 et 1996 (tableau 4.1), le nombre de naissances multiples a augmenté de 22 % au Canada durant cette période (Terre-Neuve non comprise). Par conséquent, le taux de naissances multiples avait atteint 12,1 pour 1 000 accouchements en 1996. À l'échelle provinciale, on observe, en 1996, les taux les plus élevés en Ontario (13,1) et en Colombie-Britannique (12,4), et les plus faibles à l'Île-du-Prince-Édouard (7,1) et au Manitoba (9,8). Le recours aux méthodes de reproduction médicalement assistée et le succès de ces méthodes pourraient contribuer aux tendances récentes décrites ici.



5. Mortalité foetale et infantile

Tableau 5.1 Mortinaissances après au moins 20 semaines de gestation et taux de mortinatalité, Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996

	Canada	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.
Nombre de mortinaissances après au moins 20 semaines de gestation¹													
1986	2 318	45	10	98	72	439	850	98	108	262	310	4	22
1987	2 336	44	13	98	46	465	905	114	95	257	279	6	14
1988	2 301	40	17	69	41	402	923	99	94	300	294	3	19
1989	2 493	40	8	108	46	463	999	124	96	256	324	2	27
1990	2 425	39	11	80	62	433	969	113	102	298	302	1	15
1991	2 284	45	15	61	51	475	798	115	100	312	294	1	17
1992	2 515	37	14	85	52	432	1 068	139	97	279	298	3	11
1993	2 329	34	8	58	49	404	970	138	94	268	293	4	9
1994	2 299	37	13	66	59	369	945	132	82	267	306	1	22
1995	2 353	30	13	82	32	386	977	127	82	262	348	3	11
1996	2 121	25	8	74	42	342	905	119	59	239	295	2	11
Taux de mortinatalité après au moins 20 semaines de gestation (pour 1 000 naissances totales²)													
1986	6,2	5,5	5,2	7,9	7,3	5,2	6,3	5,7	6,1	6,0	7,3	8,2	14,4
1987	6,3	5,6	6,6	8,0	4,8	5,5	6,7	6,7	5,5	6,1	6,6	12,4	9,1
1988	6,1	5,3	8,5	5,6	4,2	4,6	6,6	5,8	5,6	7,1	6,8	5,7	12,1
1989	6,3	5,1	4,1	8,5	4,7	5,0	6,8	7,1	5,7	5,9	7,3	4,1	17,9
1990	5,9	5,1	5,4	6,2	6,3	4,4	6,4	6,5	6,3	6,9	6,6	1,8	9,4
1991	5,6	6,2	7,9	5,1	5,3	4,9	5,2	6,6	6,5	7,2	6,4	1,8	10,3
1992	6,3	5,3	7,5	7,1	5,5	4,5	7,0	8,3	6,4	6,6	6,4	5,6	7,0
1993	6,0	5,3	4,5	5,0	5,4	4,4	6,5	8,2	6,5	6,6	6,3	7,8	5,7
1994	5,9	5,8	7,5	5,9	6,5	4,1	6,4	7,9	5,8	6,7	6,5	2,3	13,7
1995	6,2	5,1	7,4	7,6	3,7	4,4	6,6	7,8	6,0	6,7	7,4	6,3	6,8
1996	5,8	4,3	4,7	7,0	5,1	4,0	6,4	7,6	4,4	6,3	6,4	4,5	7,0

¹ Inclut les mortinaissances pour lesquelles on ne connaît pas la durée de la gestation. Au Québec et en Saskatchewan, seules les mortinaissances pour lesquelles le poids du bébé est égal ou supérieur à 500 grammes doivent être déclarées.

² Les naissances totales comprennent les naissances vivantes et les mortinaissances survenues après au moins 20 semaines de gestation ou dont on ne connaît pas la durée de la gestation.





De 1986 à 1995, le nombre de mortinaissances survenues après au moins 20 semaines de gestation se chiffrait à 2 365 par année, en moyenne. En 1996, le nombre a diminué de 10 %, pour se fixer à 2 121. En général, les données sur les mortinaissances après au moins 20 semaines de gestation doivent être interprétées avec prudence. Les différences d'exigences de déclaration expliquent en partie les fluctuations d'années en années : la distinction entre un mort-né et un enfant né vivant qui ne survit que très peu de temps après la naissance est très ténue; la déclaration peut aussi varier selon la personne qui assiste à l'accouchement et l'installation hospitalière. Parfois, on peut relier une nouvelle tendance à une modification de la définition de la mortinaissance dans une province ou un territoire (voir le glossaire, p. 149). Enfin, les variations interprovinciales du taux de mortinatalité après au moins 20 semaines de gestation pourraient refléter la variation de la définition de la mortinaissance selon la province ou le territoire.

Tableau 5.2 Mortinaissances après au moins 28 semaines de gestation et taux de mortinatalité, Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996

	Canada	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.
Nombre de mortinaissances après au moins 28 semaines de gestation¹													
1986	1 574	40	8	64	57	299	594	62	70	178	185	2	15
1987	1 584	30	8	70	37	344	609	74	67	175	158	1	11
1988	1 435	25	11	42	35	265	590	63	62	163	164	2	13
1989	1 593	33	5	76	32	322	634	74	65	169	164	1	18
1990	1 559	35	7	57	47	305	615	76	62	175	168	1	11
1991	1 396	33	12	39	35	331	475	68	64	167	160	1	11
1992	1 512	24	11	59	42	291	623	65	59	165	166	2	5
1993	1 419	27	4	46	38	298	575	78	60	157	127	3	6
1994	1 371	22	9	43	37	256	558	62	63	156	151	1	13
1995	1 323	21	10	35	28	245	558	62	57	146	150	3	8
1996	1 246	14	5	32	31	240	531	59	36	137	151	2	8
Taux de mortinatalité après au moins 28 semaines de gestation (pour 1 000 naissances totales²)													
1986	4,2	4,9	4,1	5,2	5,8	3,5	4,4	3,6	4,0	4,1	4,4	4,1	9,9
1987	4,3	3,8	4,1	5,7	3,8	4,1	4,5	4,3	3,9	4,1	3,8	2,1	7,2
1988	3,8	3,3	5,5	3,4	3,6	3,1	4,3	3,7	3,7	3,9	3,8	3,8	8,3
1989	4,0	4,2	2,6	6,0	3,3	3,5	4,3	4,3	3,9	3,9	3,7	2,1	12,0
1990	3,8	4,6	3,5	4,4	4,8	3,1	4,1	4,4	3,8	4,1	3,7	1,8	6,9
1991	3,5	4,6	6,3	3,2	3,7	3,4	3,1	3,9	4,2	3,9	3,5	1,8	6,7
1992	3,8	3,5	5,9	4,9	4,5	3,0	4,1	3,9	3,9	3,9	3,6	3,8	3,2
1993	3,6	4,2	2,3	4,0	4,2	3,2	3,9	4,6	4,2	3,9	2,8	5,9	3,8
1994	3,5	3,5	5,2	3,9	4,1	2,8	3,8	3,7	4,5	3,9	3,2	2,3	8,2
1995	3,5	3,6	5,7	3,3	3,3	2,8	3,8	3,8	4,2	3,7	3,2	6,3	4,9
1996	3,4	2,4	2,9	3,0	3,8	2,8	3,8	3,8	2,7	3,6	3,3	4,5	5,1

¹ N'inclut pas les mortinaissances pour lesquelles on ne connaît pas la durée de la gestation.



² Les naissances totales incluent les naissances vivantes et les mortinaissances survenues après au moins 28 semaines de gestation.



Bien que le taux de mortinatalité après au moins 28 semaines de gestation ait fluctué de 1986 à 1996, la tendance générale est légèrement à la baisse, le taux étant passé d'un maximum de 4,3 mortinaissances pour 1 000 naissances en 1987 à 3,4 mortinaissances en 1996. Dans l'ensemble du Canada, les taux varient de 2,4 pour 1 000 à Terre-Neuve à 5,1 pour 1 000 dans les Territoires du Nord-Ouest. La tendance et les variations interprovinciales du taux de mortinatalité après au moins 28 semaines de gestation n'ont nullement été influencées par les différences tant dans les critères de déclaration que dans les définitions.

Tableau 5.3 Décès infantiles et taux de mortalité infantile, Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996



	Canada	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.
Nombre de décès infantiles													
1986	2 938	65	13	104	81	604	969	157	157	393	355	12	28
1987	2 706	59	13	90	67	594	888	142	155	315	359	5	19
1988	2 705	70	14	79	69	563	910	132	140	347	362	3	16
1989	2 795	64	12	73	69	632	985	115	134	325	360	2	24
1990	2 766	70	12	81	71	612	946	138	123	346	344	4	19
1991	2 573	56	13	69	58	578	953	111	126	285	298	6	20
1992	2 431	49	3	71	59	522	886	113	110	304	286	2	26
1993	2 448	50	16	82	65	529	922	118	115	268	264	4	15
1994	2 417	52	11	67	48	506	878	115	125	294	297	1	23
1995	2 321	46	8	52	41	477	870	123	123	274	280	6	21
1996	2 051	38	8	59	40	396	802	104	112	236	237	-	19
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes)													
1986	7,9	8,0	6,8	8,4	8,3	7,1	7,2	9,2	9,0	9,0	8,5	24,8	18,6
1987	7,3	7,6	6,7	7,4	7,0	7,1	6,6	8,4	9,1	7,5	8,6	10,5	12,5
1988	7,2	9,3	7,1	6,5	7,2	6,5	6,6	7,8	8,4	8,3	8,4	5,8	10,3
1989	7,1	8,2	6,2	5,8	7,1	6,8	6,8	6,6	8,0	7,5	8,2	4,2	16,2
1990	6,8	9,2	6,0	6,3	7,2	6,2	6,3	8,0	7,6	8,0	7,5	7,2	12,0
1991	6,4	7,8	6,9	5,7	6,1	5,9	6,3	6,4	8,2	6,7	6,5	10,6	12,2
1992	6,1	7,1	1,6	6,0	6,3	5,4	5,9	6,8	7,3	7,2	6,2	3,8	16,7
1993	6,3	7,8	9,1	7,1	7,2	5,7	6,2	7,1	8,1	6,7	5,7	7,9	9,6
1994	6,3	8,2	6,4	6,0	5,3	5,6	6,0	7,0	8,9	7,4	6,3	2,3	14,6
1995	6,1	7,9	4,6	4,8	4,8	5,5	5,9	7,6	9,1	7,0	6,0	12,8	13,0
1996	5,6	6,6	4,7	5,6	4,9	4,6	5,7	6,7	8,4	6,2	5,1	-	12,2



Depuis 1962, le taux de mortalité infantile a diminué chaque année, mis à part une légère augmentation en 1993 qui a été soutenue l'année suivante. En 1996, le taux national de mortalité infantile est tombé pour la première fois sous la barre des 6 décès infantiles pour 1 000 naissances vivantes. Cette année-là, les taux de mortalité infantile provinciaux ont varié d'un minimum de 4,6 décès pour 1 000 naissances vivantes au Québec à un maximum de 8,4 décès pour 1 000 naissances vivantes en Saskatchewan. Les taux de mortalité infantile sont systématiquement supérieurs à la moyenne dans les Territoires du Nord-Ouest.

Tableau 5.4 Décès néonataux précoces et taux de mortalité néonatale précoce, Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996



	Canada	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.
Nombre de décès néonataux précoces													
1986	1 577	34	6	59	42	379	539	92	73	168	174	5	6
1987	1 403	27	12	48	33	340	482	80	68	144	160	1	8
1988	1 440	40	9	39	33	328	500	68	68	155	192	1	7
1989	1 509	41	6	40	42	364	546	57	64	147	191	1	10
1990	1 530	45	5	42	43	350	553	71	52	168	195	1	5
1991	1 361	30	6	39	19	326	545	60	59	115	148	5	9
1992	1 342	34	-	41	35	293	503	61	47	164	155	1	8
1993	1 332	29	5	51	31	297	534	60	55	135	126	3	6
1994	1 347	27	7	35	28	284	509	61	63	144	180	1	8
1995	1 295	28	6	35	17	275	489	63	60	157	159	1	5
1996	1 204	26	8	34	20	246	483	59	60	128	136	-	4
Taux de mortalité néonatale précoce (pour 1 000 naissances vivantes)													
1986	4,2	4,2	3,1	4,8	4,3	4,5	4,0	5,4	4,2	3,8	4,1	10,4	4,0
1987	3,8	3,5	6,1	4,0	3,4	4,1	3,6	4,7	4,0	3,4	3,8	2,1	5,3
1988	3,8	5,3	4,6	3,2	3,4	3,8	3,6	4,0	4,1	3,7	4,5	1,9	4,5
1989	3,8	5,3	3,1	3,2	4,3	3,9	3,8	3,3	3,8	3,4	4,4	2,1	6,8
1990	3,8	5,9	2,5	3,3	4,4	3,6	3,7	4,1	3,2	3,9	4,3	1,8	3,2
1991	3,4	4,2	3,2	3,2	2,0	3,4	3,6	3,5	3,9	2,7	3,2	8,8	5,5
1992	3,4	4,9	-	3,5	3,7	3,0	3,3	3,7	3,1	3,9	3,4	1,9	5,1
1993	3,4	4,5	2,9	4,4	3,4	3,2	3,6	3,6	3,9	3,4	2,7	5,9	3,8
1994	3,5	4,3	4,1	3,2	3,1	3,1	3,5	3,7	4,5	3,6	3,8	2,3	5,1
1995	3,4	4,8	3,4	3,3	2,0	3,1	3,3	3,9	4,4	4,0	3,4	2,1	3,1
1996	3,3	4,5	4,7	3,2	2,4	2,9	3,4	3,8	4,5	3,4	2,9	-	2,6



Plus de la moitié des décès infantiles surviennent durant la première semaine de la vie, à la suite de complications périnatales ou d'anomalies congénitales. En 1996, le taux de mortalité néonatale précoce avait baissé pour s'établir à 3,3 décès infantiles pour 1 000 naissances vivantes. La baisse du taux de mortalité néonatale précoce pourrait refléter les progrès réalisés par la médecine dans le domaine des soins aux prématurés et la hausse des taux de survie des nouveau-nés présentant des anomalies. En 1996, c'est au Nouveau-Brunswick et dans les Territoires du Nord-Ouest qu'on a observé les taux de mortalité les plus faibles (2,4 et 2,6 décès pour 1 000 naissances vivantes, respectivement) et à l'Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve et en Saskatchewan qu'on a observé les taux les plus élevés (de 4,5 à 4,7 pour 1 000).

Tableau 5.5 Décès néonataux et taux de mortalité néonatale, Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996



	Canada	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.
Nombre de décès néonataux													
1986	1 909	43	9	76	56	444	645	105	96	214	205	5	11
1987	1 679	33	12	55	43	399	566	97	87	180	197	1	9
1988	1 719	49	10	51	41	390	594	81	84	189	222	1	7
1989	1 828	50	7	48	50	437	670	64	81	184	222	1	14
1990	1 869	47	8	50	51	430	672	85	68	217	234	1	6
1991	1 638	33	6	46	34	393	651	66	76	146	172	5	10
1992	1 579	39	2	44	44	344	596	70	56	194	178	1	11
1993	1 613	34	9	58	43	354	647	80	68	162	147	3	8
1994	1 634	36	7	45	33	347	618	72	76	188	203	1	8
1995	1 584	34	7	41	21	339	608	81	74	188	183	2	6
1996	1 441	32	8	37	24	290	584	67	76	153	165	-	5
Taux de mortalité néonatale (pour 1 000 naissances vivantes)													
1986	5,1	5,3	4,7	6,2	5,7	5,2	4,8	6,2	5,5	4,9	4,9	10,4	7,3
1987	4,5	4,2	6,1	4,5	4,5	4,8	4,2	5,7	5,1	4,3	4,7	2,1	5,9
1988	4,6	6,5	5,1	4,2	4,3	4,5	4,3	4,8	5,0	4,5	5,2	1,9	4,5
1989	4,7	6,4	3,6	3,8	5,2	4,7	4,6	3,7	4,9	4,2	5,1	2,1	9,5
1990	4,6	6,2	4,0	3,9	5,2	4,4	4,5	4,9	4,2	5,0	5,1	1,8	3,8
1991	4,1	4,6	3,2	3,8	3,6	4,0	4,3	3,8	5,0	3,4	3,8	8,8	6,1
1992	4,0	5,6	1,1	3,7	4,7	3,6	4,0	4,2	3,7	4,6	3,9	1,9	7,1
1993	4,2	5,3	5,1	5,0	4,8	3,8	4,4	4,8	4,8	4,0	3,2	5,9	5,1
1994	4,2	5,7	4,1	4,1	3,7	3,8	4,2	4,4	5,4	4,7	4,3	2,3	5,1
1995	4,2	5,8	4,0	3,8	2,5	3,9	4,2	5,0	5,5	4,8	3,9	4,3	3,7
1996	3,9	5,6	4,7	3,5	2,9	3,4	4,2	4,3	5,7	4,0	3,6	-	3,2



Les tendances du taux de mortalité néonatale observées au cours du temps et d'une province ou territoire à l'autre sont semblables à celles observées pour le taux de mortalité néonatale précoce (tableau 5.4). En 1996, 84 % des décès néonataux sont survenus la première semaine après la naissance (données non présentées).

Tableau 5.6 Décès postnéonataux et taux de mortalité postnéonatale, Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996



	Canada	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.
Nombre de décès postnéonataux													
1986	1 029	22	4	28	25	160	324	52	61	179	150	7	17
1987	1 027	26	1	35	24	195	322	45	68	135	162	4	10
1988	986	21	4	28	28	173	316	51	56	158	140	2	9
1989	967	14	5	25	19	195	315	51	53	141	138	1	10
1990	897	23	4	31	20	182	274	53	55	129	110	3	13
1991	935	23	7	23	24	185	302	45	50	139	126	1	10
1992	852	10	1	27	15	178	290	43	54	110	108	1	15
1993	835	16	7	24	22	175	275	38	47	106	117	1	7
1994	783	16	4	22	15	159	260	43	49	106	94	-	15
1995	737	12	1	11	20	138	262	42	49	86	97	4	15
1996	610	6	-	22	16	106	218	37	36	83	72	-	14
Taux de mortalité postnéonatale (pour 1 000 naissances vivantes)													
1986	2,8	2,7	2,1	2,3	2,6	1,9	2,4	3,1	3,5	4,1	3,6	14,5	11,3
1987	2,8	3,3	0,5	2,9	2,5	2,3	2,4	2,7	4,0	3,2	3,9	8,4	6,6
1988	2,6	2,8	2,0	2,3	2,9	2,0	2,3	3,0	3,3	3,8	3,3	3,8	5,8
1989	2,5	1,8	2,6	2,0	2,0	2,1	2,2	2,9	3,2	3,3	3,2	2,1	6,8
1990	2,2	3,0	2,0	2,4	2,0	1,9	1,8	3,1	3,4	3,0	2,4	5,4	8,2
1991	2,3	3,2	3,7	1,9	2,5	1,9	2,0	2,6	3,3	3,2	2,8	1,8	6,1
1992	2,1	1,4	0,5	2,3	1,6	1,9	1,9	2,6	3,6	2,6	2,3	1,9	9,7
1993	2,1	2,5	4,0	2,1	2,4	1,9	1,9	2,3	3,3	2,6	2,5	2,0	4,5
1994	2,0	2,5	2,3	2,0	1,7	1,8	1,8	2,6	3,5	2,7	2,0	-	9,5
1995	1,9	2,0	0,6	1,0	2,3	1,6	1,8	2,6	3,6	2,2	2,1	8,5	9,3
1996	1,7	1,0	-	2,1	2,0	1,2	1,6	2,4	2,7	2,2	1,6	-	9,0



De 1986 à 1996, le taux de mortalité postnéonatale a diminué, passant de 2,8 à 1,7 décès pour 1 000 naissances vivantes. Étant donné la quasi-disparition des décès infantiles dus aux maladies infectieuses, la mort soudaine du nourrisson, les anomalies congénitales, les affections périnatales et les traumatismes sont les causes principales de décès durant la période postnéonatale. En 1996, le taux de mortalité était assez faible à Terre-Neuve et au Québec, mais élevé dans les Territoires du Nord-Ouest (plus de cinq fois plus élevé que la moyenne nationale).

Tableau 5.7 Décès infantiles et taux de mortalité infantile (bébés de poids à la naissance inférieur à 500 grammes non compris), Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996

	Canada	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.
Nombre de décès infantiles (bébés de poids à la naissance inférieur à 500 grammes non compris)													
1986	2 718	65	13	90	77	557	908	145	149	356	320	11	27
1987	2 536	59	12	78	61	557	820	129	148	312	336	5	19
1988	2 549	70	12	72	66	537	857	117	132	343	325	3	15
1989	2 647	64	12	67	64	597	932	106	122	325	333	2	23
1990	2 537	70	12	74	62	549	894	126	111	304	315	3	17
1991	2 245	49	12	61	53	513	778	100	117	257	281	5	19
1992	2 229	46	3	64	52	481	820	97	105	275	258	2	26
1993	2 126	44	16	67	62	483	759	100	100	235	242	3	15
1994	2 196	47	11	57	44	470	808	90	117	252	277	-	23
1995	1 988	43	8	40	35	421	724	102	113	229	247	5	21
1996	1 758	34	5	49	37	327	700	82	102	200	204	-	18
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes)													
1986	7,3	8,0	6,8	7,3	7,9	6,6	6,8	8,5	8,5	8,1	7,6	22,8	18,0
1987	6,9	7,6	6,1	6,5	6,4	6,7	6,1	7,6	8,7	7,4	8,0	10,5	12,5
1988	6,8	9,3	6,1	5,9	6,9	6,2	6,2	6,9	7,9	8,2	7,6	5,8	9,7
1989	6,7	8,2	6,2	5,3	6,6	6,5	6,4	6,1	7,3	7,5	7,6	4,2	15,6
1990	6,3	9,2	6,0	5,8	6,3	5,6	5,9	7,3	6,9	7,1	6,9	5,4	10,8
1991	5,6	6,8	6,4	5,1	5,6	5,3	5,1	5,8	7,6	6,0	6,2	8,8	11,6
1992	5,6	6,7	1,6	5,4	5,5	5,0	5,4	5,9	7,0	6,5	5,6	3,8	16,7
1993	5,5	6,9	9,1	5,8	6,9	5,2	5,1	6,0	7,0	5,8	5,3	5,9	9,6
1994	5,7	7,4	6,4	5,1	4,9	5,2	5,5	5,5	8,3	6,3	5,9	0,0	14,6
1995	5,3	7,3	4,6	3,7	4,1	4,8	5,0	6,3	8,4	5,9	5,3	10,7	13,0
1996	4,8	5,9	3,0	4,6	4,5	3,8	5,0	5,3	7,7	5,3	4,4	0,0	11,5





Puisque auparavant l'enregistrement des naissances de bébés de poids extrêmement faible à la naissance (moins de 500 grammes) pouvait varier selon la province ou le territoire et que les chances de survie de ces nouveau-nés sont fort réduites, ces naissances peuvent avoir été exclues du calcul des taux de mortalité infantile (présentés au tableau 5.3) afin de faciliter les comparaisons au fil du temps et d'une province ou d'un territoire à l'autre. Cette exclusion fait baisser le taux de mortalité infantile d'une valeur variant de 0,4 à 0,8 décès pour 1 000 naissances vivantes, mais les tendances observées de 1986 à 1996 se maintiennent au même titre que les variations interprovinciales.

Tableau 5.8 Décès périnataux et taux de mortalité périnatale, Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996

	Canada	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.
Nombre de décès périnataux¹													
1986	3 151	74	14	123	99	678	1 133	154	143	346	359	7	21
1987	2 987	57	20	118	70	684	1 091	154	135	319	318	2	19
1988	2 875	65	20	81	68	593	1 090	131	130	318	356	3	20
1989	3 102	74	11	116	74	686	1 180	131	129	316	355	2	28
1990	3 089	80	12	99	90	655	1 168	147	114	343	363	2	16
1991	2 757	63	18	78	54	657	1 020	128	123	282	308	6	20
1992	2 854	58	11	100	77	584	1 126	126	106	329	321	3	13
1993	2 751	56	9	97	69	595	1 109	138	115	292	253	6	12
1994	2 718	49	16	78	65	540	1 067	123	126	300	331	2	21
1995	2 618	49	16	70	45	520	1 047	125	117	303	309	4	13
1996	2 450	40	13	66	51	486	1 014	118	96	265	287	2	12
Taux de mortalité périnatale (pour 1 000 naissances totales²)													
1986	8,4	9,1	7,2	9,9	10,1	8,0	8,4	9,0	8,1	7,9	8,5	14,4	13,8
1987	8,0	7,3	10,2	9,7	7,3	8,1	8,1	9,0	7,9	7,5	7,6	4,2	12,4
1988	7,6	8,7	10,1	6,6	7,0	6,8	7,9	7,7	7,7	7,5	8,3	5,7	12,8
1989	7,9	9,5	5,7	9,2	7,6	7,4	8,1	7,5	7,7	7,3	8,1	4,2	18,7
1990	7,6	10,5	5,9	7,7	9,1	6,7	7,7	8,4	7,1	7,9	7,9	3,6	10,1
1991	6,8	8,8	9,5	6,5	5,7	6,7	6,7	7,4	8,0	6,6	6,7	10,5	12,2
1992	7,1	8,4	5,9	8,4	8,2	6,1	7,4	7,6	7,0	7,8	6,9	5,6	8,3
1993	7,1	8,7	5,1	8,4	7,6	6,4	7,5	8,2	8,0	7,2	5,5	11,7	7,7
1994	7,0	7,7	9,3	7,0	7,2	5,9	7,2	7,4	8,9	7,5	7,0	4,5	13,2
1995	6,9	8,3	9,1	6,5	5,2	5,9	7,1	7,7	8,6	7,8	6,6	8,5	8,0
1996	6,7	6,9	7,7	6,2	6,2	5,7	7,2	7,6	7,2	7,0	6,2	4,5	7,6

¹ N'inclut pas les mortinaissances pour lesquelles la période de gestation est de moins de 28 semaines ou inconnue.

² Le nombre total de naissances comprend les naissances vivantes et les mortinaissances pour lesquelles la période de gestation est d'au moins 28 semaines.



La mortalité périnatale comprend les mortinaissances survenues après au moins 28 semaines de gestation et les décès néonataux précoces. La tendance à la baisse observée ici reflète les tendances similaires qui se dégagent des tableaux 5.2 et 5.4. En 1996, les mortinaissances représentaient 51 % des décès périnataux et la mortalité néonatale précoce, 49 %.

Tableau 5.9 Certaines causes de décès infantiles et de mortinaissances, Canada, 1996

	Décès infantiles		Décès infantiles selon l'âge			Mortinaissances ¹	
	Nombre	Taux de mortalité ²	0 à 6 jours (néonataux précoces)	de 7 à 27 jours (néonataux tardifs)	de 28 à 364 jours (post- néonataux)	Nombre	Taux de mortalité ³
Total	2 051	5,60	1 204	237	610	1 246	3,39
Affections périnatales (CIM-9 : 760-779.8)	943	2,58	797	98	48	830	2,26
Anomalies congénitales (740-759)	575	1,57	331	103	141	99	0,27
Mort soudaine du nourrisson (798.0)	166	0,45	3	6	157	..	..
Traumatismes (E800-E999)	47	0,13	1	4	42	-	-
Toutes les autres causes précisées	228	0,62	44	18	166	7	0,02
Causes non précisées, périnatales (779.9)	5	0,01	4	1	-	310	0,84
Causes inconnues et autres causes non précisées (799.9)	87	0,24	24	7	56	-	-

¹ Mortinaissances survenues après au moins 28 semaines de gestation; n'inclut pas les mortinaissances pour lesquelles on ne connaît pas la durée de la gestation.

² Pour 1 000 naissances vivantes.

³ Pour 1 000 naissances totales.

Les causes principales de mortalité infantile varient au cours de la première année de vie. En 1996, on a précisé la cause de décès pour 1 176 des 1 204 cas de décès néonataux précoces (décès infantiles entre 0 et 6 jours d'âge). La plupart (68 %) de ces causes rentrent dans la catégorie des affections périnatales. Ces dernières incluent le syndrome de détresse respiratoire et d'autres problèmes respiratoires, certains troubles associés à la courte durée de la gestation et au faible poids à la naissance, les complications touchant le placenta, le cordon ombilical et les membranes, ainsi que l'asphyxie à la naissance. Les anomalies congénitales représentent pratiquement toutes les autres causes de décès néonataux précoces.

Chez les nouveau-nés de 7 à 27 jours (néonataux tardifs), les anomalies congénitales sont la cause principale de décès; très souvent, ces anomalies touchent le cœur et l'appareil circulatoire. Les affections périnatales, comme les infections, suivent de près, étant la deuxième cause principale de décès pour ce groupe d'âge.


Parmi les enfants âgés de 28 à 364 jours (période postnéonatale), la mort soudaine du nourrisson devient la cause principale de décès, représentant 28 % des 554 décès postnéonataux de cause précisée déclarés en 1996. En outre, 25 % des décès postnéonataux de cause précisée ont été attribués à des anomalies congénitales. Dans 8 % des cas, le décès était dû à un traumatisme.

La plupart (89 %) des 936 mortinaissances de cause précisée étaient liées à des affections périnatales. Une part importante des mortinaissances après au moins 28 semaines de gestation se situe dans la catégorie des décès périnataux de cause non précisée (25 % des 1 246 mortinaissances observés en 1996).

Un seul nourrisson est mort du SIDA en 1996, alors que cinq avaient été emportés par cette maladie l'année précédente.

6. Mortalité globale

Nombre quotidien moyen de décès selon le mois au Canada en 1996



En 1996, 582 Canadiens sont décédés chaque jour, en moyenne. Toutefois, le nombre de décès fluctue selon la saison. Il a tendance à être un peu plus élevé en hiver (612 personnes par jour sont décédées, en moyenne, entre le 1^{er} décembre 1995 et le 31 mars 1996) qu'en été (543 décès quotidiens entre le 1^{er} juin et le 30 septembre 1996).



On a montré que durant l'hiver, au Canada, le nombre de décès culmine ordinairement en janvier (Trudeau, 1997). L'exposition à des sources d'infection pourrait être plus fréquente en hiver, quand les personnes passent plus de temps à l'intérieur, en contact étroit les unes avec les autres. Plus précisément, on attribue, du moins partiellement, la hausse de la mortalité en hiver à l'augmentation, à cette époque-là de l'année, de la prévalence de la grippe, de la pneumonie et d'autres maladies respiratoires qui pourraient être la cause directe de décès ou déclencher indirectement le décès (p. ex., insuffisance cardiaque).

Outre les fluctuations saisonnières, le nombre de personnes décédées varie légèrement selon le jour de la semaine : en 1996, le nombre quotidien moyen de décès variait de 575 les jeudis à 587 les samedis (données non présentées).

Tableau 6.1 Décès et taux bruts de mortalité, Canada, provinces et territoires, 1986 à 1996

	Canada	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.
Nombre de décès													
1986	184 224	3 540	1 121	7 255	5 458	46 892	67 865	8 911	8 061	13 560	21 213	113	235
1987 ¹	184 953	3 629	1 115	7 112	5 408	47 616	68 119	8 710	7 808	13 316	21 814	108	197
1988	190 011	3 591	1 112	7 412	5 450	47 771	70 679	9 100	8 100	13 894	22 546	136	220
1989	190 965	3 718	1 089	7 516	5 496	48 305	70 907	8 819	7 920	13 854	22 997	95	249
1990	191 973	3 884	1 143	7 388	5 426	48 420	70 818	8 863	8 044	14 068	23 577	115	227
1991 ¹	195 569	3 798	1 188	7 255	5 469	49 121	72 917	8 943	8 098	14 451	23 977	114	237
1992	196 535	3 798	1 114	7 544	5 609	48 824	73 206	8 980	7 793	14 679	24 615	117	256
1993	204 912	3 890	1 145	7 559	5 806	51 711	75 853	9 299	8 164	15 338	25 764	123	260
1994	207 077	4 050	1 114	7 770	5 917	51 366	77 487	9 148	8 308	15 613	25 939	124	241
1995	210 733	3 935	1 153	7 687	5 938	52 734	78 479	9 658	8 495	15 895	26 375	157	227
1996 ¹	212 880	3 928	1 268	7 751	5 896	52 336	79 099	9 497	8 765	16 391	27 536	120	272
Taux bruts de mortalité (nombre de décès pour 1 000 habitants)													
1986	7,0	6,1	8,7	8,1	7,5	7,0	7,2	8,1	7,8	5,6	7,0	4,6	4,2
1987	7,0	6,3	8,6	7,9	7,4	7,0	7,0	7,9	7,5	5,4	7,1	4,2	3,5
1988	7,1	6,2	8,6	8,2	7,4	7,0	7,2	8,2	7,9	5,6	7,2	5,1	3,9
1989	7,0	6,4	8,3	8,3	7,4	7,0	7,0	8,0	7,7	5,5	7,2	3,5	4,3
1990	6,9	6,7	8,7	8,1	7,3	6,9	6,8	8,0	8,0	5,5	7,1	4,1	3,8
1991	7,0	6,5	9,1	7,9	7,3	6,9	7,0	8,0	8,0	5,6	7,1	3,9	3,9
1992	6,9	6,5	8,5	8,2	7,4	6,8	6,9	8,0	7,7	5,5	7,1	3,9	4,1
1993	7,1	6,7	8,6	8,1	7,7	7,1	7,0	8,3	8,1	5,7	7,2	4,0	4,1
1994	7,1	7,0	8,3	8,3	7,8	7,0	7,1	8,1	8,2	5,7	7,1	4,2	3,7
1995	7,1	6,8	8,5	8,2	7,8	7,2	7,1	8,5	8,4	5,8	7,0	5,2	3,4
1996	7,1	6,9	9,3	8,2	7,7	7,1	7,0	8,3	8,6	5,9	7,1	3,8	4,1

¹ Le total national comprend les résidents du Canada décédés au Canada ou aux États-Unis et pour lesquels on ne connaît pas la province de résidence.



Le nombre annuel de décès augmente ordinairement chaque année, à cause de la croissance globale de la population ainsi que du nombre de personnes âgées. L'augmentation a été particulièrement importante en 1993 (hausse de 4 %), à la suite d'une épidémie de grippe chez les personnes âgées; comparativement, la mortalité n'a augmenté que de 1 % en 1996, grâce à l'augmentation de l'espérance de vie, particulièrement chez les hommes (tableau 6.4). En 1996, on a observé les taux bruts de mortalité les plus élevés à l'Île-du-Prince-Édouard, en Saskatchewan, au Manitoba et en Nouvelle-Écosse, et les plus faibles, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest (résultats qui reflètent la jeunesse de la population de ces deux régions du Nord).

Tableau 6.2 Décès et taux de mortalité des hommes selon l'âge, Canada, provinces et territoires, 1996¹

	Canada	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.
Nombre de décès²													
Tous les âges	111 404	2 164	678	4 007	3 125	27 407	40 673	4 809	4 701	8 796	14 763	88	175
<1	1 155	20	3	30	23	221	461	62	56	137	133	-	9
1-4	257	2	1	7	5	56	95	16	15	27	28	-	5
5-9	158	4	-	12	2	45	43	9	9	13	18	-	3
10-14	206	3	-	6	7	51	69	13	12	18	26	1	-
15-19	730	9	6	17	18	241	193	34	28	92	85	2	5
20-24	1 034	23	2	27	37	262	285	47	47	130	160	2	12
25-29	1 112	28	2	36	18	290	340	44	45	107	185	2	14
30-34	1 641	23	4	49	38	400	535	56	58	165	303	1	8
35-39	2 104	26	11	67	46	567	718	68	53	206	328	3	11
40-44	2 564	52	16	80	61	691	867	80	88	239	379	4	7
45-49	3 210	62	17	99	90	841	1 100	103	102	296	488	7	5
50-54	4 141	91	25	163	102	1 143	1 441	159	111	327	560	9	9
55-59	5 412	98	30	172	148	1 500	1 967	207	187	430	655	3	15
60-64	8 158	150	51	319	220	2 195	2 979	304	269	668	985	5	12
65-69	12 237	236	68	409	334	3 303	4 593	473	409	920	1 456	13	18
70-74	15 935	314	93	550	443	4 188	6 119	589	585	1 123	1 908	11	9
75-79	16 416	358	102	634	525	3 927	6 054	763	723	1 193	2 118	7	9
80-84	16 344	362	106	652	450	3 699	6 031	786	772	1 211	2 253	8	11
85-89	11 333	201	91	403	357	2 380	4 171	563	634	887	1 627	8	11
90+	7 254	101	49	275	201	1 407	2 611	433	498	607	1 068	2	2
Inconnu	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Taux de mortalité par âge (décès pour 1 000 hommes)													
Tous les âges	7,5	7,6	10,0	8,6	8,3	7,5	7,3	8,5	9,3	6,3	7,7	5,5	5,0
<1	6,1	6,7	3,4	5,5	5,5	5,1	6,4	7,8	8,1	7,0	5,6	-	11,1
1-4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,3	0,3	-	1,7
5-9	0,2	0,2	-	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	-	0,7
10-14	0,2	0,1	-	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,8	-
15-19	0,7	0,4	1,2	0,5	0,7	0,9	0,5	0,9	0,7	0,9	0,7	1,8	1,9
20-24	1,0	0,9	0,4	0,8	1,3	1,1	0,7	1,1	1,3	1,3	1,2	1,9	4,4
25-29	1,0	1,2	0,4	1,0	0,6	1,1	0,8	1,1	1,4	1,0	1,3	1,7	4,3
30-34	1,2	1,0	0,7	1,2	1,2	1,2	1,0	1,2	1,5	1,3	1,8	0,6	2,3
35-39	1,6	1,1	2,0	1,6	1,4	1,7	1,4	1,4	1,3	1,5	1,9	1,9	3,7
40-44	2,2	2,2	3,2	2,2	2,0	2,3	2,0	1,9	2,3	2,0	2,4	2,6	2,9
45-49	3,0	2,9	3,5	2,8	3,1	3,0	2,7	2,7	3,2	3,0	3,3	5,2	2,3
50-54	4,9	5,5	6,7	6,0	4,8	5,1	4,7	5,4	4,6	4,6	5,1	8,6	6,8
55-59	8,2	7,8	10,0	8,1	8,9	8,7	7,9	8,8	9,1	7,7	7,6	5,1	16,0
60-64	13,7	14,2	19,0	16,9	15,0	14,5	13,1	13,8	13,3	13,6	12,4	11,4	17,5
65-69	22,8	25,8	28,2	25,4	25,8	24,8	22,2	23,5	21,1	21,5	20,1	30,7	37,7
70-74	36,7	42,1	45,2	40,6	39,2	40,1	36,7	33,3	34,3	34,0	31,8	49,8	38,3
75-79	56,7	65,8	68,5	60,9	64,3	59,8	56,2	58,3	55,2	53,3	50,9	64,2	77,6
80-84	93,5	114,2	114,6	102,9	91,7	97,8	94,1	91,2	86,3	90,2	85,5	333,3	102,8
85-89	146,0	151,5	193,6	140,0	164,7	143,4	149,3	138,5	143,3	143,7	141,4	727,3	180,3
90+	227,3	220,0	251,3	253,2	228,1	208,8	233,5	256,8	248,0	206,0	226,8	222,2	125,0

¹ Les graphiques et les faits saillants figurent à la page 52.² Le nombre total national de décès pour certains groupes d'âge inclut les hommes pour lesquels on ne connaît pas la province ou le territoire où a eu lieu le décès.



Tableau 6.3 Décès et taux de mortalité des femmes selon l'âge, Canada, provinces et territoires, 1996¹

	Canada	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.
Nombre de décès²													
Tous les âges	101 476	1 764	590	3 744	2 771	24 929	38 426	4 688	4 064	7 595	12 773	32	97
<1	896	18	5	29	17	175	341	42	56	99	104	-	10
1-4	204	4	-	4	6	48	74	16	11	17	21	-	3
5-9	139	6	-	4	5	31	46	10	11	8	17	-	1
10-14	133	3	1	3	2	35	43	7	6	12	20	-	1
15-19	319	3	-	10	11	84	86	7	13	49	51	3	2
20-24	318	4	4	15	8	74	105	10	17	35	45	-	1
25-29	393	2	-	14	11	94	134	23	12	39	60	-	4
30-34	682	18	1	18	5	173	236	29	21	74	101	1	5
35-39	1 016	18	2	38	20	276	356	39	39	115	110	1	2
40-44	1 542	24	5	53	39	425	504	52	56	170	209	2	3
45-49	2 034	42	8	61	47	582	731	76	66	174	244	1	2
50-54	2 532	53	13	85	53	708	906	90	81	237	298	3	5
55-59	3 371	63	20	117	96	845	1 300	137	86	296	402	3	6
60-64	4 757	96	21	158	148	1 258	1 807	197	163	365	534	2	8
65-69	7 375	124	27	283	199	1 962	2 772	305	239	557	899	2	5
70-74	10 896	187	64	374	299	2 821	4 242	458	364	790	1 284	5	7
75-79	13 904	261	73	495	382	3 481	5 245	637	548	937	1 833	2	9
80-84	17 187	337	106	678	497	4 141	6 478	842	675	1 179	2 242	4	8
85-89	16 387	258	125	585	436	3 942	6 244	769	722	1 186	2 109	1	10
90+	17 390	243	115	720	490	3 774	6 775	942	878	1 256	2 190	2	5
Inconnu	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Taux de mortalité par âge (décès pour 1 000 femmes)													
Tous les âges	6,7	6,2	8,5	7,8	7,2	6,7	6,7	8,2	7,9	5,5	6,6	2,1	3,0
<1	5,0	6,5	6,1	5,6	4,3	4,2	5,0	5,5	8,7	5,4	4,7	-	13,4
1-4	0,3	0,3	-	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	0,4	0,2	0,2	-	1,1
5-9	0,1	0,3	-	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1	-	0,3
10-14	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	-	0,3
15-19	0,3	0,1	-	0,3	0,4	0,3	0,2	0,2	0,4	0,5	0,4	2,8	0,7
20-24	0,3	0,2	0,8	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,4	0,3	-	0,4
25-29	0,4	0,1	-	0,4	0,4	0,4	0,3	0,6	0,4	0,4	0,4	-	1,3
30-34	0,5	0,8	0,2	0,5	0,2	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	1,5
35-39	0,8	0,7	0,4	0,9	0,6	0,8	0,7	0,8	1,0	0,9	0,6	0,6	0,7
40-44	1,3	1,0	1,0	1,4	1,3	1,4	1,1	1,2	1,5	1,5	1,3	1,4	1,4
45-49	1,9	2,0	1,7	1,8	1,7	2,1	1,8	2,0	2,2	1,9	1,7	0,7	1,2
50-54	3,0	3,3	3,6	3,2	2,6	3,1	2,9	3,1	3,4	3,5	2,8	3,9	4,9
55-59	5,0	5,3	6,7	5,5	5,8	4,7	5,1	5,7	4,1	5,5	4,7	8,0	7,9
60-64	7,7	9,3	7,4	8,1	9,7	7,7	7,6	8,8	8,0	7,5	7,0	5,5	12,1
65-69	12,4	12,9	10,7	15,3	13,4	12,5	12,2	13,5	11,6	12,5	12,0	7,5	10,7
70-74	19,9	22,1	27,1	21,7	21,0	20,3	20,0	20,3	18,2	20,1	17,9	25,9	29,7
75-79	33,5	37,1	33,9	33,1	33,8	33,8	34,1	34,6	31,2	30,9	32,4	17,1	63,4
80-84	58,7	69,8	62,6	63,2	61,8	58,4	60,5	60,0	49,9	55,2	55,3	72,7	108,1
85-89	101,3	104,4	135,7	101,3	93,5	99,9	104,1	100,5	93,5	102,0	98,0	37,0	322,6
90+	197,3	204,5	200,0	210,3	200,1	184,0	202,6	202,0	203,6	195,2	198,0	95,2	119,0

¹ Les graphiques et les faits saillants figurent à la page 52.² Le nombre total national de décès pour certains groupes d'âge inclut les femmes pour lesquels on ne connaît pas la province ou le territoire où a eu lieu le décès.



Graphiques et faits saillants pour les tableaux 6.2 et 6.3

Décès et taux de mortalité chez les hommes et chez les femmes selon l'âge, Canada, provinces et territoires, 1996



En 1996, la moitié des femmes décédées appartenaient au groupe des 80 ans et plus, comparativement au tiers des hommes.

Chez les hommes et les femmes, le nombre de décès a augmenté considérablement de 1986 à 1996, reflétant le vieillissement de la population canadienne et l'augmentation du nombre de personnes vivant au Canada en général (due à l'immigration).




Chez les hommes et les femmes, le taux de mortalité est assez élevé durant la première année de vie, puis diminue rapidement et reste faible jusqu'à l'adolescence. De 15 à 39 ans, le taux de mortalité est plus de deux fois plus élevé pour les hommes que pour les femmes. Le taux de mortalité à l'âge adulte ne commence à excéder le taux de mortalité infantile qu'à la fin de la cinquantaine. Après, il augmente régulièrement pour culminer à 227 décès pour 1 000 hommes et 197 décès pour 1 000 femmes chez le groupe des 90 ans et plus.

Depuis 1986, on constate une baisse importante de la mortalité chez les nouveau-nés des deux sexes, les hommes de 55 ans et plus, ainsi que les femmes de 70 ans et plus. On observe aussi une baisse de moindre importance pour d'autres groupes d'âge.

Décès survenus en 1996 à l'extérieur de la province ou du territoire de résidence de la personne décédée

Province ou territoire de résidence de la personne décédée	Total des décès	Survenus dans la province ou le territoire	Survenus à l'extérieur de la province ou du territoire
T.-N.	3 928	3 888	40
Î.-P.-É.	1 268	1 233	35
N.-É.	7 751	7 697	54
N.-B.	5 896	5 818	78
QC	52 336	51 899	437
Ont.	79 099	78 627	472
Man.	9 497	9 411	86
Sask.	8 765	8 616	49
Alb.	16 391	16 188	203
C.-B.	27 536	27 356	180
Yn	120	108	12
T.N.-O.	272	222	50
Inconnu	21	..	..

% survenus à l'extérieur de la province ou du territoire



En 1996, pour la moitié des provinces, moins de 1 % des décès sont survenus à l'extérieur de la province de résidence de la personne décédée; pour les autres provinces, de 1 % à 3 % des décès ont eu lieu ailleurs – ordinairement dans une province ou un territoire avoisinant. Le décès était surtout susceptible de survenir à l'extérieur de la région de résidence quand la personne décédée résidait dans les Territoires du Nord-Ouest (plus de 18 % des personnes sont décédées hors de la région, principalement en Alberta, au Manitoba ou au Québec) ou au Yukon (10 %, principalement en Colombie-Britannique). Comme les territoires sont des régions peu peuplées, les personnes victimes d'une maladie ou d'un traumatisme grave sont souvent transportées par avion ou hélicoptère jusqu'à un centre hospitalier dans une province adjacente.



En 1996, 349 Canadiens sont décédés aux États-Unis. La plupart résidaient en Ontario (199, soit 42 % des décès survenus à l'extérieur de la province) ou au Québec (89, soit 20 % des décès survenus hors de la province); dans 21 cas, on ne connaissait pas le lieu de résidence de la personne décédée.

Tableau 6.4 Espérance de vie à la naissance¹, selon le sexe, Canada² et provinces, 1986 à 1996

	Canada	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.
Années											
Hommes											
1986	73,3	73,5	71,9	72,5	72,5	72,3	73,8	73,2	73,5	73,6	74,6
1987	73,6	72,7	73,8	72,8	73,0	72,3	74,2	73,6	74,4	74,2	74,6
1988	73,7	73,5	73,3	72,8	73,2	72,8	74,1	73,2	73,9	74,1	74,6
1989	74,0	73,3	73,0	72,9	73,7	72,9	74,5	74,0	74,7	74,6	74,8
1990	74,4	73,1	73,1	73,5	74,0	73,4	74,9	74,5	74,9	74,8	75,1
1991	74,6	73,9	72,5	73,9	74,4	73,7	75,0	74,6	75,0	75,0	75,3
1992	74,9	74,4	74,1	73,8	74,3	74,3	75,2	74,7	75,9	75,4	75,4
1993	74,9	73,9	74,3	74,3	74,4	74,0	75,3	74,6	75,4	75,6	75,4
1994	75,1	73,9	74,8	74,2	74,8	74,5	75,5	75,0	75,2	75,5	75,8
1995	75,4	74,4	74,1	74,9	74,2	74,6	75,8	74,8	74,9	75,8	76,2
1996	75,7	75,0	73,9	74,9	75,2	75,2	76,1	75,5	75,5	76,0	76,1
Femmes											
1986	80,0	79,1	80,1	79,6	80,0	79,6	80,0	79,9	80,6	80,0	80,8
1987	80,3	79,6	80,8	79,9	80,3	79,9	80,3	80,1	80,8	80,7	81,0
1988	80,4	79,2	81,2	79,6	80,7	80,1	80,4	80,4	81,1	80,5	80,9
1989	80,6	79,5	81,3	79,9	80,3	80,4	80,5	80,6	81,6	80,9	81,1
1990	80,8	79,3	80,5	79,9	80,7	80,7	80,9	80,5	81,2	81,2	81,1
1991	80,9	79,7	80,8	80,7	81,0	80,9	80,8	80,6	81,4	81,2	81,5
1992	81,2	79,7	81,3	80,4	81,1	81,2	81,2	81,2	82,1	81,2	81,7
1993	81,0	80,2	80,1	80,6	80,6	80,9	81,0	80,7	81,8	81,0	81,4
1994	81,1	79,8	81,3	80,4	80,6	81,2	81,1	80,8	81,8	81,4	81,4
1995	81,3	80,6	81,5	80,8	81,5	81,3	81,2	80,5	81,6	81,5	81,9
1996	81,4	80,5	80,7	80,7	81,2	81,5	81,4	80,8	81,4	81,3	81,9

¹ Calculée d'après les tables abrégées de mortalité en utilisant la méthode de Greville (Greville, 1943) et les données sur la mortalité d'une année particulière.

² Les données pour le Canada incluent le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.





De 1986 à 1996, l'espérance de vie à la naissance a augmenté de 2,4 années pour les hommes et de 1,4 année pour les femmes. Par conséquent, l'écart entre les espérances de vie des hommes et des femmes a diminué, passant de 6,7 à 5,7 années. L'espérance de vie à la naissance a tendance à être plus faible pour les résidents des provinces de l'Atlantique que pour les personnes qui vivent en Ontario et dans les provinces de l'Ouest. En 1996, l'espérance de vie à la naissance des hommes canadiens variait d'un minimum de 73,9 années à l'Île-du-Prince-Édouard à un maximum de 76,1 années en Ontario et en Colombie-Britannique. Les estimations correspondantes pour les femmes étaient de 80,5 années à Terre-Neuve et de 81,9 années en Colombie-Britannique.

Tableau 6.5 Espérance de vie à 65 ans¹, selon le sexe, Canada² et provinces, 1986 à 1996

	Canada	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.
Années											
Hommes											
1986	15,0	14,6	15,3	14,4	14,7	14,2	15,1	15,1	15,9	15,7	16,1
1987	15,2	14,5	14,5	14,9	15,2	14,4	15,2	15,4	16,6	15,9	16,2
1988	15,1	15,2	14,7	14,6	15,0	14,5	15,0	15,2	15,9	15,7	16,2
1989	15,4	14,7	15,2	14,6	15,3	14,7	15,4	15,7	16,1	15,9	16,4
1990	15,7	14,4	15,5	15,1	15,5	15,0	15,8	15,8	16,4	16,2	16,6
1991	15,8	15,0	14,3	15,3	15,5	15,1	15,8	16,0	16,4	16,2	16,6
1992	16,0	15,1	15,7	14,9	15,7	15,5	16,0	15,9	16,7	16,6	16,8
1993	15,9	14,8	15,2	15,0	15,7	15,3	16,0	15,8	16,5	16,4	16,7
1994	16,1	15,0	15,9	15,0	15,4	15,6	16,0	16,3	16,9	16,5	17,1
1995	16,2	15,1	15,4	15,3	15,6	15,7	16,2	15,9	16,7	16,7	17,2
1996	16,3	15,3	14,7	15,7	15,7	16,0	16,3	16,4	16,7	16,8	17,1
Femmes											
1986	19,3	18,3	19,5	18,9	19,3	18,9	19,1	19,7	20,3	19,6	20,2
1987	19,6	19,0	19,7	19,2	19,4	19,2	19,5	20,0	20,2	20,2	20,1
1988	19,5	18,5	19,9	19,2	19,7	19,3	19,4	19,8	20,6	19,8	20,1
1989	19,7	18,9	20,4	19,1	19,6	19,6	19,5	19,9	20,8	20,2	20,2
1990	19,9	18,4	19,4	19,2	19,9	19,8	19,8	20,0	20,5	20,4	20,2
1991	19,9	18,5	19,8	19,7	20,2	19,9	19,7	19,9	20,7	20,3	20,3
1992	20,2	18,8	19,6	19,5	20,1	20,2	20,0	20,2	21,3	20,6	20,5
1993	19,9	19,2	20,0	19,6	19,5	19,7	19,8	20,1	21,2	20,2	20,3
1994	20,0	18,9	20,1	19,5	19,7	20,1	19,7	20,3	20,9	20,5	20,4
1995	20,1	19,3	20,4	19,8	20,1	20,0	19,9	20,0	21,0	20,3	20,6
1996	20,2	19,5	19,3	19,6	20,0	20,3	20,0	19,9	20,8	20,4	20,5

¹ Calculée d'après les tables abrégées de mortalité en utilisant la méthode de Greville (Greville, 1943) et les données sur la mortalité d'une année particulière.

² Les données pour le Canada incluent le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.





Les tendances observées pour l'espérance de vie à la naissance s'appliquent à l'espérance de vie à 65 ans. De 1986 à 1996, l'espérance de vie à 65 ans a augmenté de 1,3 année pour les hommes et de 0,9 année pour les femmes. L'écart entre les hommes et les femmes a diminué, passant de 4,3 à 3,9 années durant cette période.

Tableau 6.6 Probabilité de survie¹ de la naissance jusqu'à 80 ans, selon le sexe, Canada² et provinces, 1986 à 1996

	Canada	T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.
	%										
Hommes											
1986	38,1	36,5	37,3	34,0	35,8	34,2	39,0	38,8	41,0	40,6	43,2
1987	39,1	35,8	39,1	37,0	37,7	34,4	39,6	40,1	44,1	42,5	43,9
1988	39,2	37,7	37,0	35,8	38,9	35,9	39,3	38,9	42,7	41,9	44,1
1989	40,4	38,1	38,2	36,0	40,1	36,7	40,9	41,7	43,8	43,1	45,0
1990	41,6	37,6	39,3	38,2	41,0	37,7	42,3	42,6	45,7	44,1	46,2
1991	42,2	38,4	34,5	39,1	40,3	38,6	43,0	43,1	45,4	45,2	46,3
1992	43,2	39,2	40,3	39,0	41,3	40,5	43,7	42,9	47,4	46,1	46,5
1993	43,1	38,1	40,8	39,8	42,1	39,8	43,8	42,8	46,2	45,6	47,1
1994	44,0	39,0	44,2	40,0	41,6	41,0	44,5	44,0	46,5	46,5	48,3
1995	44,7	40,3	39,5	41,0	41,4	41,7	45,5	43,6	45,7	47,5	48,8
1996	45,7	41,8	38,3	42,4	42,5	43,4	46,6	45,7	46,6	47,5	48,9
Femmes											
1986	59,9	55,8	60,3	57,7	60,2	58,6	59,5	61,2	63,7	60,7	63,0
1987	60,8	58,6	63,6	58,6	60,4	59,1	60,3	61,1	64,3	63,1	64,2
1988	61,1	57,3	62,8	57,4	62,1	59,9	60,8	61,3	65,7	62,5	63,3
1989	61,6	58,3	64,4	59,0	60,3	60,9	61,1	62,3	66,1	63,0	63,6
1990	62,4	58,2	62,7	59,5	62,4	61,7	62,3	61,8	65,6	64,3	63,6
1991	62,5	57,4	63,0	60,4	63,6	62,1	62,0	62,1	64,9	63,7	64,8
1992	63,3	58,2	60,3	59,9	62,7	62,6	63,0	63,3	67,0	65,0	65,8
1993	62,8	60,0	62,0	60,0	62,4	62,0	62,7	63,0	65,9	63,6	64,6
1994	63,2	59,4	62,3	60,0	61,6	63,3	62,8	62,2	66,6	64,6	64,8
1995	63,8	60,3	64,6	62,1	63,4	63,6	63,6	62,4	65,7	64,4	65,7
1996	64,1	61,4	62,1	62,3	62,9	63,9	64,2	62,5	65,2	64,4	65,7

¹ Calculée d'après les tables abrégées de mortalité en utilisant la méthode de Greville (Greville, 1943) et les données sur la mortalité d'une année particulière.

² Les données pour le Canada incluent le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.



La probabilité de survivre de la naissance à 80 ans a augmenté presque chaque année pour les deux sexes. Cependant, l'écart entre les espérances de vie des hommes et des femmes demeure important : presque deux femmes sur trois nées en 1996 avaient l'espérance de vivre jusqu'à leur neuvième décennie, comparativement à moins de la moitié des hommes.


7. Causes de décès

Les 10 premières causes principales de décès chez l'homme et chez la femme en 1996

Tant chez l'homme que chez la femme, les 10 premières causes principales de décès représentaient 84 % du nombre total de décès en 1996. Le classement des trois premières causes – le cancer et les cardiopathies, suivis de loin par les maladies cérébrovasculaires (principalement les accidents cérébrovasculaires) – est le même pour les deux sexes. Les proportions de décès dus au cancer et aux cardiopathies sont légèrement plus fortes chez l'homme (56 %) que chez la femme (54 %). Par contre, cette dernière est plus susceptible que l'homme d'être emportée par une maladie cérébrovasculaire (9 % pour la femme contre 6 % pour l'homme).

Six des sept autres causes principales énoncées plus bas sont aussi les mêmes pour les deux sexes, mais leur classement diffère. Par exemple, la pneumonie et la grippe occupent la quatrième place chez la femme, mais la sixième chez l'homme. La mortalité due aux affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central (comme la maladie d'Alzheimer) est également plus fréquente chez la femme.

Le suicide, qui est la septième cause principale de décès chez l'homme, ne figure pas parmi les 10 premières causes principales de décès chez la femme. En revanche, chez cette dernière, les décès causés par une psychose sont suffisamment fréquents pour figurer sur la liste.



¹ Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes.

² Inclut les maladies des artérioles et des capillaires.

³ Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central.

Faits saillants – Causes principales de décès et taux comparatifs de mortalité selon le sexe

- Depuis 1981, le nombre total de décès augmente chaque année au Canada, principalement à cause de la croissance et du vieillissement de la population.
- De 1995 à 1996, le nombre de décès a augmenté de 1 %, pour passer de 210 733 à 212 880 (tableau 6.1). Durant cette période, le nombre de décès n'a pour ainsi dire pas varié chez l'homme (environ 111 400 les deux années), mais il a augmenté de 2,2 % chez la femme (passant de 99 300 à 101 500).
- Malgré l'augmentation du nombre de décès chez la femme, les taux comparatifs de mortalité (TCM) ont baissé pour les deux sexes. Plus précisément, de 1995 à 1996, le TCM (corrigé pour tenir compte de l'effet de la proportion croissante de personnes âgées) est passé de 859 décès à 837 décès pour 100 000 hommes, d'une part, et de 523 décès à 517 décès pour 100 000 femmes, d'autre part (figure 7.1)¹.
- Ensemble, les décès dus au cancer et aux cardiopathies représentaient plus de la moitié (55 %) des décès déclarés en 1996². Plus de la moitié (52 %) des décès par cancer sont attribuables à des tumeurs malignes du poumon, du côlon, du sein chez la femme ou de la prostate.
- En 1996, chez l'homme, le taux comparatif de mortalité a baissé pour la plupart des causes principales de décès, y compris le cancer (surtout les cancers du poumon, de la prostate, et du côlon et du rectum), les cardiopathies, les maladies cérébrovasculaires, les traumatismes accidentels, les suicides et l'infection par le VIH. Néanmoins, les hommes demeurent plus susceptibles que les femmes de mourir de ces causes. Par exemple, 231 hommes sur 100 000 ont été emportés par le cancer, comparativement à 153 femmes (figure 7.2).
- En 1996, le tableau est un peu moins favorable pour la femme. Bien qu'on observe un recul de la mortalité due aux cardiopathies, aux maladies cérébrovasculaires et aux traumatismes accidentels, la mortalité par cancer (particulièrement le cancer du poumon) et par suicide a augmenté. Qui plus est, depuis 1993, un plus grand nombre de femmes ont été emportées par le cancer du poumon que par le cancer du sein (figures 7.3 et 7.5). L'incidence croissante du cancer du poumon chez la femme est associée à l'augmentation de la prévalence de l'usage du tabac chez cette dernière durant les décennies précédentes. Bien que le taux de mortalité par cancer du poumon soit deux fois plus élevé chez l'homme que chez la femme en 1996, les TCM selon le sexe convergent depuis la fin des années 70 (époque où le TCM était quatre fois plus élevé pour l'homme que pour la femme).

¹ Dans la présente publication, tous les taux comparatifs de mortalité sont calculés en prenant pour référence la population du Canada de 1991.

² La méthode de sélection des causes principales de décès est décrite à l'annexe 3 (p. 138).

- La tendance à long terme des taux de mortalité due aux maladies pulmonaires obstructives chroniques et aux affections connexes (MPOC) suit celle observée pour le cancer du poumon. Par exemple, chez l'homme, le taux de mortalité par MPOC est presque le même en 1996 qu'en 1979 (environ 43 décès pour 100 000), tandis que chez la femme, il a presque doublé durant cette période, pour passer de 10 à 19 (figure 7.16). Pour le cancer du poumon, le taux de mortalité est de 72 décès pour 100 000 hommes les deux années, mais il est passé de 16 à 33 décès pour 100 000 femmes de 1979 à 1996. Les MPOC, qui représentent la quatrième cause principale de décès, regroupent des maladies comme la bronchite chronique et l'emphysème (toutes deux associées à l'usage du tabac), ainsi que l'asthme.
- Les taux de mortalité associée aux maladies de l'appareil circulatoire (figure 7.8) ont baissé considérablement au cours du temps, surtout dans le cas des cardiopathies (figure 7.9), des maladies cérébrovasculaires (figure 7.14) et des maladies des artères, artérioles et capillaires (figure 7.25). Cette évolution s'explique par une meilleure connaissance des facteurs de risque modifiables (comme l'usage du tabac), une plus grande sensibilisation aux méthodes de prévention et l'amélioration des méthodes thérapeutiques.
- Bien que le taux de mortalité due aux cardiopathies ait toujours été plus fort chez l'homme que chez la femme, il a baissé considérablement pour les deux sexes depuis la fin des années 70. En 1996, presque 4 décès sur 10 imputables aux cardiopathies ont été causés par un infarctus aigu du myocarde (IAM). Chez l'homme, pour l'IAM, le TCM a baissé de 56 % de 1979 à 1996 (passant de 215 à 94 décès pour 100 000), tandis que chez la femme, il a diminué de 50 % (passant de 94 à 47 décès pour 100 000, figure 7.11). Par contre, dans le cas de l'insuffisance cardiaque, les TCM ont à peine varié durant cette période de référence (figure 7.12).
- Le taux de mortalité due aux maladies cérébrovasculaires a fléchi de 1979 à 1996, comme en témoigne la diminution de plus de 40 % du TCM tant chez l'homme que chez la femme, cette baisse s'étant respectivement soldée par 51 et 43 décès pour 100 000.
- Depuis 1979, les TCM calculés pour les maladies des artères, artérioles et capillaires ont baissé d'environ 50 % pour les deux sexes. En 1996, 4 de ces décès sur 10 ont été causés par un anévrisme de l'aorte et 3 sur 10, par l'athérosclérose (c.-à-d. le dépôt de cholestérol dans les artères). Le taux de mortalité due à l'athérosclérose a dégringolé chez l'homme et chez la femme au fil des ans (passant de 21 à 5 décès pour 100 000 hommes et de 16 à 4 décès pour 100 000 femmes, figure 7.27). En revanche, le taux de mortalité par anévrisme de l'aorte n'a baissé que légèrement chez l'homme et est resté stationnaire chez la femme (figure 7.26).
- En 1996, les traumatismes accidentels représentaient la cinquième cause principale de décès. Les deux tiers des décès accidentels (figure 7.18) ont été causés par un accident de véhicule à moteur (figure 7.19) ou une chute (figure 7.20). Même si, cette année-là, la majorité des victimes d'accidents mortels étaient des hommes (62 %), le taux comparatif de mortalité par traumatisme accidentel de ces derniers baisse depuis la fin des années 70 (étant passé de 73 à 38 décès pour 100 000 hommes de 1979 à 1996).

- Le taux de mortalité due à la pneumonie et à la grippe a été systématiquement plus fort chez l'homme que chez la femme au fil des ans (par exemple, 29 décès pour 100 000 hommes contre 18 pour 100 000 femmes en 1996; figure 7.21); cependant, les taux semblent baisser légèrement chez l'homme depuis la fin des années 80, tandis qu'ils demeurent stables chez la femme.
- En revanche, le TCM calculé pour le diabète sucré, qui était à peu près le même pour l'homme et pour la femme à la fin des années 70, augmente lentement pour l'homme depuis (passage de 15 à 20 décès pour 100 000 de 1979 à 1996), tandis qu'il reste stable pour la femme (figure 7.22).
- Les 4 900 décès causés par les affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central en 1996 ne représentaient que 2 % de l'ensemble des décès cette année-là. Cependant, le taux de mortalité a augmenté fortement pour les deux sexes depuis la fin des années 70, ayant pratiquement triplé chez l'homme et quadruplé chez la femme (figure 7.23). Les maladies classées dans cette catégorie incluent la maladie d'Alzheimer, la chorée de Huntington, les maladies de la moelle épinière, la maladie de Parkinson et d'autres dégénérescences cérébrales.
- En 1996, la maladie d'Alzheimer a provoqué plus de la moitié des décès dont la cause entre dans la catégorie des maladies du système nerveux central. Depuis 1979, le taux de mortalité due à la maladie d'Alzheimer a fait un bond, passant de 0,4 décès pour 100 000 pour les deux sexes à 7 décès chez l'homme et 8 décès chez la femme en 1996 (figure 7.24). Cette hausse des taux pourrait refléter l'amélioration des méthodes diagnostiques.
- Les taux de mortalité sont également à la hausse dans le cas des psychoses. Ce groupe de troubles mentaux englobe diverses formes de démence, la schizophrénie, les psychoses alcooliques, la psychose maniaque dépressive et la paranoïa. En 1979, seulement 3 hommes pour 100 000 et 2 femmes pour 100 000 ont été emportés par ces maladies. Par contre, en 1996, les TCM étaient passés à 11 et à 12 pour 100 000, respectivement (figure 7.28). En revanche, les taux de mortalité due à des troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques sont restés relativement stables durant cette période (figure 7.33). (La plupart des décès dus à ces troubles ont été causés par l'abus d'alcool, de tabac ou de drogue ou par une lésion cérébrale.)
- Les hommes sont plus susceptibles que les femmes de mourir de maladies chroniques du foie et de cirrhose. Néanmoins, l'écart entre les hommes et les femmes a diminué de 1979 à 1996, car le taux de mortalité due à ces maladies a baissé de façon plus marquée chez l'homme que chez la femme (passant de 17 à 10 pour 100 000 hommes, mais de 8 à 4 pour 100 000 femmes; figure 7.31).
- Récemment, le nombre de Canadiens qui succombent à l'infection par le VIH a diminué considérablement, passant de 1 764 en 1995 à 1 306 en 1996 (baisse de 26 %). Cette première réduction significative de la mortalité liée au VIH observée au Canada (figure 7.32) est vraisemblablement due aux progrès thérapeutiques. La majorité des décès continue d'être enregistrée chez les hommes (92 % en 1996).

Variations interprovinciales

En général, ce sont le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest qui ont les taux comparatifs de mortalité les plus élevés, suivis par l'Île-du-Prince-Édouard. Toutefois, il convient d'interpréter ces résultats avec prudence, car les faibles chiffres de population enregistrés dans ces régions, conjugués aux variations annuelles modestes du nombre de décès, peuvent donner lieu à une variation assez importante des TCM. Par conséquent, les faits saillants qui suivent (et les graphiques du présent chapitre) sont fondés uniquement sur les données recueillies pour les provinces.

- En 1996, de toutes les provinces, c'est au Québec qu'on a enregistré les taux de mortalité par cancer du poumon et du côlon et du rectum les plus élevés; les TCM les plus faibles pour ces maladies ont été observés en Alberta (poumon) et en Colombie-Britannique (côlon et rectum). Le taux comparatif de mortalité par cancer du sein était assez élevé au Nouveau-Brunswick et faible en Saskatchewan, tandis que le taux comparatif de mortalité par cancer de la prostate était légèrement supérieur à la moyenne en Saskatchewan et faible à Terre-Neuve.
- C'est à Terre-Neuve et à l'Île-du-Prince-Édouard que l'on observe les taux les plus élevés de mortalité liée aux maladies de l'appareil circulatoire, autrement dit les cardiopathies, les maladies cérébrovasculaires et les maladies des artères, artérioles et capillaires. Toutefois, le TCM calculé pour l'athérosclérose est nettement plus élevé en Alberta qu'ailleurs (7 pour 100 000 comparativement à 4 pour 100 000 pour l'ensemble du Canada).
- Le taux de mortalité liée à la maladie d'Alzheimer était inférieur à la moyenne nationale pour toutes les provinces situées à l'ouest de l'Ontario en 1995 et en 1996.
- Pour les troubles névrotiques, les troubles de la personnalité et les autres troubles mentaux non psychotiques, Terre-Neuve enregistre des TCM très faibles durant les deux années de référence.
- En 1996, le taux de mortalité par suicide a diminué dans toutes les provinces, sauf en Saskatchewan et au Québec. Le taux enregistré au Québec est non seulement resté plus élevé que ceux observés pour toutes les autres provinces, mais l'écart par rapport à ces derniers est devenu encore plus important qu'en 1995. Les taux comparatifs de mortalité liée aux psychoses étaient également plus élevés au Québec qu'ailleurs durant ces deux années.
- Les taux de mortalité liée au VIH les plus élevés s'observent en Colombie-Britannique, au Québec et en Ontario, résultats qui témoignent de la forte prévalence relative de cette maladie à Vancouver, à Montréal et à Toronto.

Tableau 7.1 Causes principales de décès et taux comparatifs de mortalité selon le sexe, Canada, 1996

Cause de décès (codes de la CIM-9)	Rang ¹	Nombre ²	%	Taux de mortalité ³		
				Total	Hommes	Femmes
Toutes les causes (001-799, E800-E999)		212 880	100,0	654,4	836,5	516,9
Tous les cancers (140-208)	1	59 241	27,8	184,8	231,3	153,0
Cancer de la trachée, des bronches et du poumon (162)		15 708	7,4	49,5	71,5	33,3
Cancer du côlon, du rectum, de la jonction rectosigmoïdienne et de l'anus (153-154)		6 158	2,9	19,1	23,8	15,5
Cancer du sein chez la femme (174)		5 074	2,4	15,7	...	28,6
Cancer de la prostate (185)		3 588	1,7	10,9	28,2	...
Cancer du pancréas (157)		2 991	1,4	9,3	10,7	8,2
Lymphome non-hodgkinien (200, 202)		2 200	1,0	6,9	8,3	5,7
Cancer de l'estomac (151)		2 077	1,0	6,4	9,3	4,3
Leucémie (204-208)		2 075	1,0	6,5	8,7	4,9
Cancer du foie, de la vésicule biliaire et des voies biliaires (155-156)		1 705	0,8	5,3	6,9	4,0
Cancer de l'encéphale et du système nerveux central (191-192)		1 491	0,7	4,8	5,8	3,9
Cancer de l'ovaire et des autres annexes de l'utérus (183)		1 419	0,7	4,4	...	8,1
Cancer du rein et d'autres organes urinaires (189)		1 290	0,6	4,0	5,5	2,8
Maladies de l'appareil circulatoire (390-459)		79 462	37,3	240,2	306,9	188,8
Cardiopathies (391, 392.0, 393-398, 402, 404, 410-416, 420-429)	2	57 932	27,2	175,6	232,6	131,7
Cardiopathies ischémiques (410-414)		44 024	20,7	133,7	183,6	95,2
Infarctus aigu du myocarde (410)		22 211	10,4	68,0	94,3	47,4
Infarctus ancien du myocarde et autres formes de cardiopathie ischémique chronique (412, 414)		20 936	9,8	63,1	85,7	45,9
Insuffisance cardiaque (428)		4 580	2,2	13,5	15,7	12,1
Troubles du rythme cardiaque (427)		3 538	1,7	10,6	12,4	9,3
Maladies cérébrovasculaires (430-438)	3	15 599	7,3	46,7	51,1	43,1
Hémorragie cérébrale et autres hémorragies intracrâniennes (431-432)		2 075	1,0	6,4	7,5	5,5
Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes (490-496)	4	9 348	4,4	28,4	43,4	19,5
Obstruction chronique des voies respiratoires, non classée ailleurs (496)		7 199	3,4	21,8	34,5	14,3
Traumatismes accidentels (E800-E949)	5	8 663	4,1	27,7	38,4	17,8
Accidents impliquant des véhicules à moteur (E810-E825, E929.0)		3 088	1,5	10,3	14,9	6,1
Chutes accidentelles (E880-E888, E929.3)		2 701	1,3	8,0	9,6	6,7
Pneumonie et grippe (480-487)	6	7 474	3,5	22,1	29,2	17,8
Pneumonie (480-486)		7 292	3,4	21,6	28,6	17,3
Diabète sucré (250)	7	5 450	2,6	16,7	20,4	14,0
Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central (330-337)	8	4 912	2,3	14,7	16,2	13,6
Maladie d'Alzheimer (331.0)		2 688	1,3	7,9	7,1	8,2
Maladies des artères, artérioles et capillaires (440-448)	9	4 728	2,2	14,3	19,3	10,7
Anévrisme de l'aorte (441)		2 085	1,0	6,4	10,0	3,8
Athérosclérose (440)		1 439	0,7	4,2	4,6	3,9
Psychoses (290-299)	10	4 023	1,9	11,7	11,4	11,7
États psychotiques organiques séniles et préséniles (290)		2 224	1,0	6,5	6,3	6,5
Suicide (E950-E959)	11	3 941	1,9	13,0	20,8	5,5
Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose (580-589)	12	2 692	1,3	8,1	10,8	6,5
Insuffisance rénale, troubles résultant de l'insuffisance rénale et hypoplasie rénale d'origine inconnue (584-586, 588-589)		2 561	1,2	7,7	10,3	6,1
Maladies chroniques et cirrhose du foie (571)	13	2 115	1,0	6,7	9,9	3,9
Infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) (042-044)	14	1 306	0,6	4,2	7,7	0,7
Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques (300-316)	15	1 237	0,6	3,8	5,1	2,5


¹ Voir l'annexe 3 (p. 138) pour la description de la méthode de classement.

² L'âge du défunt est inconnu pour quatre décès classés dans les catégories de causes comprenant les codes 410, E813, E860 et E968 de la CIM. Ces personnes sont incluses dans le nombre de décès présentés, mais sont exclues du calcul des taux comparatifs de mortalité pertinents.


³ Taux comparatifs de mortalité (TCM) pour 100 000 habitants (calculés en prenant pour référence la population du Canada de 1991). Voir l'annexe 4 (p. 141) pour la méthode de calcul.

Figure 7.1 Toutes les causes (CIM-9 : 001-799; E800-E999)
Taux comparatifs¹ de mortalité selon le sexe (nombre de décès pour 100 000 habitants)

Année	Hommes	Femmes
1979	1 083,0	627,0
1980	1 079,1	626,6
1981	1 054,1	606,7
1982	1 046,0	605,6
1983	1 023,5	591,4
1984	1 004,5	580,3
1985	1 013,1	583,6
1986	995,3	582,7
1987	970,7	566,1
1988	977,4	564,7
1989	948,7	553,3
1990	918,7	541,9
1991	906,4	537,6
1992	885,2	523,9
1993	890,7	535,0
1994	870,4	528,9
1995	859,4	522,7
1996	836,5	516,9





	1995	1996
Canada	667,5	654,4
T.-N.	736,2	718,1
Î.-P.-É.	708,9	755,3
N.-É.	707,4	700,2
N.-B.	699,8	680,9
QC	687,4	662,1
Ont.	663,4	648,5
Man.	695,5	669,9
Sask.	645,4	646,7
Alb.	644,3	643,4
C.-B.	624,8	628,2
Yn	1 050,7	877,2
T.N.-O.	874,0	981,8



¹ Calculés en prenant pour référence la population du Canada de 1991.


Figure 7.2 Tous les cancers (CIM-9 : 140-208)
Taux comparatifs¹ de mortalité selon le sexe (nombre de décès pour 100 000 habitants)




¹ Calculés en prenant pour référence la population du Canada de 1991.

Figure 7.3 Cancer de la trachée, des bronches et du poumon (CIM-9 : 162)
Taux comparatifs¹ de mortalité selon le sexe (nombre de décès pour 100 000 habitants)

Année	Hommes	Femmes
1979	71,6	16,3
1980	73,8	17,0
1981	73,1	17,9
1982	77,3	19,6
1983	78,3	19,9
1984	80,1	22,2
1985	77,9	23,7
1986	78,8	24,0
1987	78,4	25,3
1988	81,2	26,9
1989	81,0	27,0
1990	79,6	27,6
1991	78,8	29,6
1992	77,3	29,6
1993	77,3	31,6
1994	74,7	31,7
1995	72,1	31,1
1996	71,5	33,3





	1995	1996
Canada	48,6	49,5
T.-N.	49,6	50,8
Î.-P.-É.	62,6	57,6
N.-É.	58,1	58,0
N.-B.	54,3	55,1
QC	57,5	60,2
Ont.	44,4	44,6
Man.	49,0	48,0
Sask.	45,1	43,2
Alb.	44,0	42,9
C.-B.	43,1	45,9
Yn	69,8	86,7
T.N.-O.	86,0	58,2



¹ Calculés en prenant pour référence la population du Canada de 1991.

**Figure 7.4 Cancer du côlon, du rectum, de la jonction rectosigmoïdienne et de l'anus
(CIM-9 : 153-154)**

Taux comparatifs¹ de mortalité selon le sexe (nombre de décès pour 100 000 habitants)



¹ Calculés en prenant pour référence la population du Canada de 1991.

Figure 7.5 Cancer du sein chez la femme (CIM-9 : 174)
Taux comparatifs¹ de mortalité selon le sexe (nombre de décès pour 100 000 habitants)

Année Hommes Femmes²

1979	...	29,8
1980	...	29,7
1981	...	30,1
1982	...	29,7
1983	...	30,3
1984	...	30,7
1985	...	31,7
1986	...	32,0
1987	...	31,3
1988	...	31,4
1989	...	31,3
1990	...	31,3
1991	...	30,1
1992	...	30,4
1993	...	29,2
1994	...	29,8
1995	...	28,4
1996	...	28,6


Selon le sexe, Canada, 1979 à 1996



1995³ 1996³

Canada	15,6	15,7
T.-N.	14,2	15,1
Î.-P.-É.	14,6	13,4
N.-É.	18,4	16,5
N.-B.	16,3	18,1
QC	16,4	16,5
Ont.	16,6	16,0
Man.	15,2	16,4
Sask.	13,8	13,2
Alb.	14,2	15,4
C.-B.	13,0	13,7
Yn	13,2	4,6
T.N.-O.	8,5	5,5

Selon la province, 1995 et 1996



¹ Calculés en prenant pour référence la population du Canada de 1991.

² Nombre de décès pour 100 000 femmes.


³ Nombre de décès pour 100 000 habitants.

Figure 7.6 Cancer de la prostate (CIM-9 : 185)
Taux comparatifs¹ de mortalité selon le sexe (nombre de décès pour 100 000 habitants)

Année Hommes² Femmes

1979	26,7	...
1980	25,7	...
1981	27,2	...
1982	26,0	...
1983	26,7	...
1984	27,4	...
1985	28,9	...
1986	29,4	...
1987	29,4	...
1988	30,8	...
1989	29,9	...
1990	30,1	...
1991	31,3	...
1992	31,0	...
1993	30,9	...
1994	30,3	...
1995	30,4	...
1996	28,2	...


Selon le sexe, Canada, 1979 à 1996



1995³ 1996³

Canada	11,8	10,9
T.-N.	13,6	8,3
Î.-P.-É.	15,8	13,7
N.-É.	12,5	13,2
N.-B.	11,7	10,5
QC	11,1	9,7
Ont.	11,5	10,9
Man.	12,5	11,7
Sask.	14,6	14,2
Alb.	14,2	12,6
C.-B.	11,2	10,9
Yn	16,2	34,9
T.N.-O.	18,6	12,7

Selon la province, 1995 et 1996



¹ Calculés en prenant pour référence la population du Canada de 1991.


² Nombre de décès pour 100 000 hommes.

³ Nombre de décès pour 100 000 habitants.

Figure 7.7 Cancer du pancréas (CIM-9 : 157)Taux comparatifs¹ de mortalité selon le sexe (nombre de décès pour 100 000 habitants)

Année	Hommes	Femmes
1979	13,7	8,1
1980	12,6	8,2
1981	12,7	8,3
1982	13,6	8,1
1983	12,9	8,5
1984	12,4	8,4
1985	12,6	8,2
1986	12,7	8,5
1987	12,5	8,8
1988	11,8	8,1
1989	11,6	7,8
1990	11,3	8,2
1991	11,0	8,0
1992	11,2	8,0
1993	11,0	8,3
1994	10,8	8,3
1995	10,5	7,8
1996	10,7	8,2

Selon le sexe, Canada, 1979 à 1996



	1995	1996
Canada	9,0	9,3
T.-N.	8,7	7,2
Î.-P.-É.	7,4	12,8
N.-É.	9,8	10,9
N.-B.	11,2	9,8
QC	9,8	10,0
Ont.	8,4	8,7
Man.	8,8	8,2
Sask.	8,9	8,4
Alb.	9,6	10,4
C.-B.	8,5	9,2
Yn	7,6	17,3
T.N.-O.	10,6	41,8

Selon la province, 1995 et 1996




¹ Calculés en prenant pour référence la population du Canada de 1991.

Figure 7.8 Maladies de l'appareil circulatoire (CIM-9 : 390-459)
Taux comparatifs¹ de mortalité selon le sexe (nombre de décès pour 100 000 habitants)

Année	Hommes	Femmes
1979	526,4	311,7
1980	519,1	310,7
1981	500,2	295,6
1982	489,3	290,5
1983	470,6	276,4
1984	450,2	266,7
1985	442,2	258,8
1986	430,0	255,8
1987	409,1	241,8
1988	400,7	237,7
1989	384,8	227,6
1990	356,3	214,8
1991	348,1	211,0
1992	339,3	203,6
1993	339,7	204,4
1994	325,2	199,3
1995	317,6	193,9
1996	306,9	188,8




	1995	1996
Canada	247,3	240,2
T.-N.	310,6	305,0
Î.-P.-É.	280,8	300,0
N.-É.	265,8	249,0
N.-B.	264,1	252,0
QC	246,3	231,6
Ont.	248,7	243,6
Man.	271,6	254,5
Sask.	242,0	237,1
Alb.	244,0	247,5
C.-B.	223,3	222,2
Yn	414,6	255,1
T.N.-O.	194,4	241,6




¹ Calculés en prenant pour référence la population du Canada de 1991.

Figure 7.9 Cardiopathies (CIM-9 : 391, 392.0, 393-398, 402, 404, 410-416, 420-429)
Taux comparatifs¹ de mortalité selon le sexe (nombre de décès pour 100 000 habitants)

Année	Hommes	Femmes
1979	394,8	212,1
1980	392,6	213,3
1981	380,1	202,7
1982	374,0	201,5
1983	360,1	191,8
1984	345,3	187,6
1985	339,0	181,2
1986	330,0	179,3
1987	313,4	170,1
1988	307,6	165,4
1989	292,4	158,2
1990	269,1	150,1
1991	263,7	147,6
1992	256,8	140,8
1993	255,9	140,4
1994	244,8	137,9
1995	239,2	134,9
1996	232,6	131,7




	1995	1996
Canada	180,0	175,6
T.-N.	227,0	219,4
Î.-P.-É.	211,1	213,8
N.-É.	197,3	188,6
N.-B.	193,6	189,4
QC	184,5	173,9
Ont.	179,0	175,9
Man.	198,5	188,9
Sask.	176,7	175,9
Alb.	174,9	179,0
C.-B.	157,7	157,4
Yn	310,5	231,0
T.N.-O.	142,1	195,0




¹ Calculés en prenant pour référence la population du Canada de 1991.

Figure 7.10 Cardiopathies ischémiques (CIM-9 : 410-414)
Taux comparatifs¹ de mortalité selon le sexe (nombre de décès pour 100 000 habitants)

Année	Hommes	Femmes
1979	338,4	171,5
1980	333,4	170,5
1981	323,9	162,6
1982	315,4	159,8
1983	302,6	150,9
1984	288,9	148,0
1985	283,4	141,1
1986	273,0	139,6
1987	259,9	131,9
1988	254,0	127,8
1989	240,0	121,3
1990	220,2	115,3
1991	213,7	112,2
1992	207,9	105,9
1993	207,1	105,5
1994	196,8	102,0
1995	189,9	98,9
1996	183,6	95,2





	1995	1996
Canada	138,3	133,7
T.-N.	176,5	167,7
Î.-P.-É.	161,7	166,6
N.-É.	143,1	134,1
N.-B.	131,9	127,1
QC	142,9	133,9
Ont.	145,4	140,7
Man.	148,6	141,7
Sask.	124,8	124,2
Alb.	125,6	128,8
C.-B.	113,1	113,4
Yn	204,2	136,4
T.N.-O.	82,9	77,0





¹ Calculés en prenant pour référence la population du Canada de 1991.

Figure 7.11 Infarctus aigu du myocarde (CIM-9 : 410)
Taux comparatifs¹ de mortalité selon le sexe (nombre de décès pour 100 000 habitants)



¹ Calculés en prenant pour référence la population du Canada de 1991.

Figure 7.12 Insuffisance cardiaque (CIM-9 : 428)
Taux comparatifs¹ de mortalité selon le sexe (nombre de décès pour 100 000 habitants)




¹ Calculés en prenant pour référence la population du Canada de 1991.

Figure 7.13 Troubles du rythme cardiaque (CIM-9 : 427)
Taux comparatifs¹ de mortalité selon le sexe (nombre de décès pour 100 000 habitants)

Année Hommes Femmes

1979	10,4	6,3
1980	11,1	6,3
1981	11,3	6,8
1982	12,3	7,2
1983	12,3	7,8
1984	12,4	8,2
1985	14,3	8,8
1986	14,0	8,6
1987	12,9	8,5
1988	12,6	8,4
1989	12,9	8,5
1990	12,1	7,2
1991	11,9	8,1
1992	11,9	7,9
1993	11,9	8,1
1994	11,9	8,4
1995	12,5	8,8
1996	12,4	9,3


Selon le sexe, Canada, 1979 à 1996



1995 1996

Canada	10,4	10,6
T.-N.	12,0	11,2
Î.-P.-É.	18,3	13,9
N.-É.	17,7	18,9
N.-B.	22,7	25,1
QC	11,4	11,1
Ont.	8,3	8,8
Man.	10,1	9,7
Sask.	11,1	11,7
Alb.	7,9	7,4
C.-B.	10,9	11,4
Yn	12,1	0,0
T.N.-O.	12,7	37,0

Selon la province, 1995 et 1996




¹ Calculés en prenant pour référence la population du Canada de 1991.

Figure 7.14 Maladies cérébrovasculaires (CIM-9 : 430-438)
Taux comparatifs¹ de mortalité selon le sexe (nombre de décès pour 100 000 habitants)

Année Hommes Femmes

1979	87,7	73,3
1980	83,7	70,1
1981	81,0	67,5
1982	75,6	64,7
1983	71,1	61,0
1984	69,4	57,4
1985	66,1	56,0
1986	63,8	55,5
1987	62,6	51,7
1988	60,0	52,2
1989	61,1	50,6
1990	58,2	46,8
1991	55,8	46,3
1992	54,4	46,1
1993	56,2	47,3
1994	54,3	45,3
1995	53,6	44,0
1996	51,1	43,1


Selon le sexe, Canada, 1979 à 1996



1995 1996



Canada	48,2	46,7
T.-N.	59,3	61,9
Î.-P.-É.	50,3	63,5
N.-É.	46,2	42,5
N.-B.	49,2	44,2
QC	43,9	41,4
Ont.	49,7	48,3
Man.	54,4	51,2
Sask.	46,2	45,0
Alb.	47,6	48,8
C.-B.	49,3	48,4
Yn	63,9	9,8
T.N.-O.	43,6	45,2

Selon la province, 1995 et 1996



¹ Calculés en prenant pour référence la population du Canada de 1991.

Figure 7.15 Hémorragie cérébrale et autres hémorragies intracrâniennes (CIM-9 : 431-432)
Taux comparatifs¹ de mortalité selon le sexe (nombre de décès pour 100 000 habitants)




¹ Calculés en prenant pour référence la population du Canada de 1991.

**Figure 7.16 Maladies pulmonaires obstructives chroniques et affections connexes
(CIM-9 : 490-496)**
Taux comparatifs¹ de mortalité selon le sexe (nombre de décès pour 100 000 habitants)

Année Hommes Femmes

1979	43,1	10,4
1980	44,2	10,5
1981	45,1	10,7
1982	45,9	11,8
1983	47,8	12,6
1984	47,1	12,7
1985	51,0	14,1
1986	51,2	15,3
1987	49,1	14,6
1988	51,1	16,0
1989	49,1	17,2
1990	47,7	16,6
1991	48,3	17,0
1992	45,5	17,2
1993	48,0	18,6
1994	46,4	18,3
1995	44,8	19,3
1996	43,4	19,5


Selon le sexe, Canada, 1979 à 1996



1995 1996

Canada	28,8	28,4
T.-N.	28,7	26,1
Î.-P.-É.	28,6	32,2
N.-É.	30,8	33,0
N.-B.	31,7	34,3
QC	34,9	32,5
Ont.	26,3	25,7
Man.	24,5	23,3
Sask.	24,5	26,0
Alb.	27,8	29,2
C.-B.	27,4	28,3
Yn	58,1	28,1
T.N.-O.	103,4	73,9

Selon la province, 1995 et 1996




¹ Calculés en prenant pour référence la population du Canada de 1991.

Figure 7.17 Obstruction chronique des voies respiratoires, non classée ailleurs (CIM-9 : 496)
Taux comparatifs¹ de mortalité selon le sexe (nombre de décès pour 100 000 habitants)

Année Hommes Femmes

1979	20,0	4,5
1980	22,1	4,5
1981	23,0	4,6
1982	26,9	5,6
1983	30,1	6,4
1984	30,4	6,8
1985	33,9	8,0
1986	35,3	9,4
1987	34,0	9,2
1988	36,4	9,9
1989	35,3	11,2
1990	34,9	10,6
1991	35,4	11,5
1992	34,2	12,0
1993	37,0	13,2
1994	36,1	13,1
1995	35,2	14,4
1996	34,5	14,3


Selon le sexe, Canada, 1979 à 1996



1995 1996

Canada	22,1	21,8
T.-N.	25,8	21,6
Î.-P.-É.	20,4	22,1
N.-É.	24,6	27,2
N.-B.	24,6	29,6
QC	25,6	24,0
Ont.	21,2	20,2
Man.	19,8	18,2
Sask.	16,5	19,0
Alb.	21,3	22,2
C.-B.	19,7	21,4
Yn	58,1	18,3
T.N.-O.	91,2	61,3


Selon la province, 1995 et 1996




¹ Calculés en prenant pour référence la population du Canada de 1991.

Figure 7.18 Traumatismes accidentels (CIM-9 : E800-E949)
Taux comparatifs¹ de mortalité selon le sexe (nombre de décès pour 100 000 habitants)

Année	Hommes	Femmes
1979	73,3	29,0
1980	68,1	27,5
1981	65,5	25,3
1982	56,0	23,2
1983	54,3	22,1
1984	54,6	22,4
1985	52,1	22,1
1986	49,9	22,3
1987	51,7	22,2
1988	49,8	20,7
1989	49,6	21,4
1990	45,5	19,4
1991	43,8	19,5
1992	41,9	18,4
1993	42,6	19,5
1994	40,9	18,1
1995	39,9	18,5
1996	38,4	17,8



	1995	1996
Canada	29,0	27,7
T.-N.	23,3	27,7
Î.-P.-É.	35,6	32,9
N.-É.	28,9	29,9
N.-B.	32,9	28,8
QC	27,2	26,8
Ont.	25,9	25,4
Man.	31,5	28,5
Sask.	36,6	31,4
Alb.	34,7	32,8
C.-B.	33,5	29,1
Yn	72,6	91,3
T.N.-O.	69,7	81,9




¹ Calculés en prenant pour référence la population du Canada de 1991.

Figure 7.19 Accidents impliquant des véhicules à moteur (CIM-9 : E810-E825, E929.0)
Taux comparatifs¹ de mortalité selon le sexe (nombre de décès pour 100 000 habitants)

Année Hommes Femmes

1979	33,8	12,7
1980	31,2	12,0
1981	31,2	10,7
1982	23,4	9,0
1983	24,0	9,0
1984	22,7	8,6
1985	22,5	9,4
1986	21,6	8,8
1987	23,0	9,2
1988	22,1	8,3
1989	22,5	9,5
1990	19,6	8,0
1991	18,3	7,6
1992	17,1	7,3
1993	17,3	7,7
1994	15,8	6,3
1995	15,6	6,7
1996	14,9	6,1


Selon le sexe, Canada, 1979 à 1996



1995 1996



Canada	11,1	10,3
T.-N.	7,5	9,4
Î.-P.-É.	15,9	13,8
N.-É.	11,9	12,1
N.-B.	14,5	12,4
QC	11,5	11,6
Ont.	9,1	8,8
Man.	11,9	9,3
Sask.	17,7	12,2
Alb.	13,7	11,2
C.-B.	11,5	10,4
Yn	38,8	28,6
T.N.-O.	10,6	28,0

Selon la province, 1995 et 1996



¹ Calculés en prenant pour référence la population du Canada de 1991.


Figure 7.20 Chutes accidentelles (CIM-9 : E880-E888, E929.3)
Taux comparatifs¹ de mortalité selon le sexe (nombre de décès pour 100 000 habitants)




¹ Calculés en prenant pour référence la population du Canada de 1991.

Figure 7.21 Pneumonie et grippe (CIM-9 : 480-487)
Taux comparatifs¹ de mortalité selon le sexe (nombre de décès pour 100 000 habitants)

Année	Hommes	Femmes
1979	29,8	17,3
1980	33,9	19,3
1981	31,8	17,3
1982	35,4	20,2
1983	37,5	21,8
1984	35,0	18,9
1985	35,9	20,0
1986	37,0	21,4
1987	33,5	19,2
1988	37,0	20,6
1989	34,3	20,4
1990	33,6	19,5
1991	32,5	19,2
1992	30,7	18,2
1993	30,4	19,2
1994	30,6	18,9
1995	29,8	18,5
1996	29,2	17,8



	1995	1996
Canada	22,7	22,1
T.-N.	20,9	18,4
Î.-P.-É.	24,5	40,4
N.-É.	25,8	27,8
N.-B.	15,7	17,9
QC	17,2	15,4
Ont.	24,1	23,0
Man.	25,2	27,5
Sask.	24,0	28,3
Alb.	25,2	22,4
C.-B.	26,3	26,3
Yn	24,2	18,0
T.N.-O.	40,3	71,3




¹ Calculés en prenant pour référence la population du Canada de 1991.

Figure 7.22 Diabète sucré (CIM-9 : 250)
Taux comparatifs¹ de mortalité selon le sexe (nombre de décès pour 100 000 habitants)

Année Hommes Femmes

1979	14,8	14,0
1980	14,7	13,8
1981	14,8	13,6
1982	14,8	13,6
1983	14,9	13,3
1984	16,4	13,4
1985	16,2	14,0
1986	17,1	14,0
1987	16,4	13,8
1988	16,8	13,5
1989	16,8	13,1
1990	17,7	13,4
1991	17,4	13,6
1992	17,9	13,5
1993	19,1	15,0
1994	20,0	14,4
1995	20,9	14,6
1996	20,4	14,0


Selon le sexe, Canada, 1979 à 1996



1995 1996

Canada	17,4	16,7
T.-N.	27,8	23,7
Î.-P.-É.	18,0	16,6
N.-É.	17,3	13,8
N.-B.	18,3	21,8
QC	18,1	17,1
Ont.	18,9	18,7
Man.	17,1	16,6
Sask.	14,1	15,6
Alb.	12,8	12,4
C.-B.	14,3	12,5
Yn	26,6	23,3
T.N.-O.	7,7	3,1

Selon la province, 1995 et 1996




¹ Calculés en prenant pour référence la population du Canada de 1991.

Figure 7.23 Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central
(CIM-9 : 330-337)
 Taux comparatifs¹ de mortalité selon le sexe (nombre de décès pour 100 000 habitants)

Année Hommes Femmes

1979	6,2	3,7
1980	6,7	4,0
1981	7,3	4,7
1982	7,4	4,9
1983	9,0	5,3
1984	9,9	6,7
1985	11,7	8,0
1986	13,2	9,1
1987	14,5	10,3
1988	15,1	10,9
1989	15,3	11,1
1990	15,5	11,5
1991	15,2	12,0
1992	16,0	12,2
1993	16,0	13,3
1994	15,9	13,5
1995	16,4	13,6
1996	16,2	13,6


Selon le sexe, Canada, 1979 à 1996



1995 1996

Canada	14,8	14,7
T.-N.	18,6	18,5
Î.-P.-É.	14,9	23,1
N.-É.	16,2	16,9
N.-B.	18,5	15,9
QC	16,7	15,7
Ont.	15,3	15,3
Man.	10,3	12,7
Sask.	14,9	14,3
Alb.	9,7	10,9
C.-B.	12,9	12,7
Yn	18,8	35,2
T.N.-O.	9,8	6,1

Selon la province, 1995 et 1996



¹ Calculés en prenant pour référence la population du Canada de 1991.







Figure 7.24 Maladie d'Alzheimer (CIM-9 : 331.0)Taux comparatifs¹ de mortalité selon le sexe (nombre de décès pour 100 000 habitants)¹ Calculés en prenant pour référence la population du Canada de 1991.

Figure 7.25 Maladies des artères, artérioles et capillaires (CIM-9 : 440-448)
Taux comparatifs¹ de mortalité selon le sexe (nombre de décès pour 100 000 habitants)



¹ Calculés en prenant pour référence la population du Canada de 1991.

Figure 7.26 Anévrisme de l'aorte (CIM-9 : 441)
Taux comparatifs¹ de mortalité selon le sexe (nombre de décès pour 100 000 habitants)




¹ Calculés en prenant pour référence la population du Canada de 1991.

Figure 7.27 Athérosclérose (CIM-9 : 440)Taux comparatifs¹ de mortalité selon le sexe (nombre de décès pour 100 000 habitants)

Année Hommes Femmes

1979	20,6	16,0
1980	20,1	16,7
1981	17,3	15,0
1982	17,5	13,9
1983	16,2	12,8
1984	14,0	11,6
1985	14,3	11,2
1986	13,4	10,3
1987	11,5	9,8
1988	11,2	9,1
1989	9,8	8,4
1990	8,8	7,5
1991	8,1	6,6
1992	7,5	6,0
1993	7,3	5,7
1994	6,6	5,6
1995	5,6	4,3
1996	4,6	3,9

Selon le sexe, Canada, 1979 à 1996



1995 1996

Canada	4,8	4,2
T.-N.	2,7	2,9
Î.-P.-É.	3,0	1,5
N.-É.	3,6	2,4
N.-B.	3,7	2,7
QC	4,0	3,5
Ont.	5,8	5,2
Man.	2,6	2,0
Sask.	4,9	3,1
Alb.	8,2	7,3
C.-B.	3,4	3,2
Yn	0,0	0,0
T.N.-O.	0,0	0,0

Selon la province, 1995 et 1996




¹ Calculés en prenant pour référence la population du Canada de 1991.


Figure 7.28 Psychoses (CIM-9 : 290-299)
Taux comparatifs¹ de mortalité selon le sexe (nombre de décès pour 100 000 habitants)



¹ Calculés en prenant pour référence la population du Canada de 1991.

Figure 7.29 Suicide (CIM-9 : E950-E959)Taux comparatifs¹ de mortalité selon le sexe (nombre de décès pour 100 000 habitants)

Année	Hommes	Femmes
1979	21,6	7,2
1980	21,6	7,0
1981	21,5	7,0
1982	22,2	6,6
1983	23,5	7,1
1984	21,3	6,2
1985	20,3	5,5
1986	22,3	6,3
1987	21,5	6,1
1988	20,7	5,8
1989	20,1	5,8
1990	19,6	5,0
1991	20,8	5,1
1992	20,8	5,4
1993	21,1	5,3
1994	20,6	5,2
1995	21,5	5,3
1996	20,8	5,5



	1995	1996
Canada	13,3	13,0
T.-N.	7,1	6,6
Î.-P.-É.	14,0	8,6
N.-É.	12,8	12,0
N.-B.	15,9	12,1
QC	19,0	19,4
Ont.	9,7	9,4
Man.	10,7	10,6
Sask.	13,3	14,4
Alb.	16,7	16,3
C.-B.	11,2	9,7
Yn	25,3	31,1
T.N.-O.	21,3	32,0






¹ Calculés en prenant pour référence la population du Canada de 1991.

Figure 7.30 Néphrite, syndrome néphrotique et néphrose (CIM-9 : 580-589)
Taux comparatifs¹ de mortalité selon le sexe (nombre de décès pour 100 000 habitants)





¹ Calculés en prenant pour référence la population du Canada de 1991.

Figure 7.31 Maladies chroniques et cirrhose du foie (CIM-9 : 571)
Taux comparatifs¹ de mortalité selon le sexe (nombre de décès pour 100 000 habitants)





¹ Calculés en prenant pour référence la population du Canada de 1991.

Figure 7.32 Infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) (CIM-9 : 042-044)
Taux comparatifs¹ de mortalité selon le sexe (nombre de décès pour 100 000 habitants)



¹ Calculés en prenant pour référence la population du Canada de 1991.

**Figure 7.33 Troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques
(CIM-9 : 300-316)**
Taux comparatifs¹ de mortalité selon le sexe (nombre de décès pour 100 000 habitants)



¹ Calculés en prenant pour référence la population du Canada de 1991.

Faits saillants – Causes principales de décès selon l'âge et le sexe

Le tableau 7.2 énumère les causes principales de décès en 1996 pour les membres de huit groupes d'âge particulier¹. Le classement se fonde sur le nombre total de décès enregistré pour chaque tranche d'âge, hommes et femmes confondus.

- En 1996, on a observé un plus grand nombre de décès d'hommes que de femmes pour tous les groupes d'âge inférieur au groupe d'âge le plus avancé (85 ans et plus). En particulier, un beaucoup plus grand nombre d'hommes que de femmes de 45 à 74 ans sont décédés (49 100 hommes contre 31 000 femmes). Par contre, dans le groupe des 85 ans et plus, le nombre de femmes décédées excèdent largement celui des hommes décédés (33 800 contre 18 600).
- En 1996, environ 10 % des 111 400 décès déclarés parmi les hommes et 6 % des 101 500 décès déclarés parmi les femmes sont survenus chez des personnes de moins de 45 ans. Dans la plupart des cas, le défunt avait de 25 à 44 ans. Néanmoins, la mortalité chez les nourrissons (moins d'un an) était beaucoup plus élevée que chez les enfants de 1 à 14 ans (2 100 comparativement à 1 100).
- Les décès causés par certains états survenus durant la période périnatale (à la fin de la période fœtale ou la première semaine après la naissance) ou par des malformations congénitales représentent les trois quarts de la mortalité infantile.
- Les traumatismes accidentels (accidents) étaient la cause principale de décès chez les garçons (37 % des décès) ainsi que chez les filles (29 %) de 1 à 14 ans. Regroupés, le cancer et les malformations congénitales étaient la cause de 25 % de décès supplémentaires chez les garçons et de 30 % de décès supplémentaires chez les filles. Bien que les données ne soient pas présentées ici, le suicide, quatrième cause principale de décès pour ce groupe d'âge, s'observe principalement pour le groupe des 10 à 14 ans : 9 % des garçons et 7 % des filles de ce groupe d'âge qui sont morts se sont suicidés.
- Les traumatismes accidentels ont également causé le décès d'une proportion particulièrement élevée de personnes de 15 à 24 ans (45 % des décès chez les hommes et 42 % chez les femmes). Le suicide était la deuxième cause principale de décès pour ce groupe d'âge (28 % des décès chez les hommes et 14 % chez les femmes). Dans ce groupe d'âge, les trois quarts des personnes décédées étaient des hommes.
- Le cancer était la cause principale de décès parmi le groupe des 25 à 44 ans. Cependant, pour ce groupe d'âge, la majorité des décès par cancer sont survenus chez des femmes : presque 4 décès sur 10 de femmes de ce groupe d'âge ont été causés par le cancer, comparativement à 13 % seulement pour les hommes. Chez les hommes, les traumatismes accidentels ont continué d'être la cause prédominante de décès (plus d'un décès sur 5 observé pour ce groupe d'âge), suivi de près par le

¹ Le groupement des causes de décès est décrit à l'annexe 3 (p. 138).

suicide. Le nombre total de décès par suicide (1 770 pour l'ensemble des hommes et des femmes) est presque deux fois plus élevé que le nombre observé pour l'infection par le VIH (904), cinquième cause principale de décès pour le groupe des 25 à 44 ans.

- Chez les Canadiens d'âge moyen (de 45 à 64 ans) et chez les « jeunes » personnes du troisième âge (de 65 à 74 ans), le cancer était la cause la plus fréquente de décès pour les deux sexes, suivi par les cardiopathies. Bien qu'un plus grand nombre d'hommes que de femmes d'âge moyen aient été emportés par le cancer (7 900 contre 7 000), cette maladie a causé le décès d'une proportion beaucoup plus forte de femmes (55 %) que d'hommes (38 %). En revanche, les hommes d'âge moyen couraient un beaucoup plus grand risque que les femmes du même âge de mourir d'une maladie cardiaque : 27 % contre 14 %.
- Tant chez les femmes que chez les hommes de 75 ans et plus, les cardiopathies, sous une forme ou l'autre, étaient la principale cause de décès (environ un sur trois), supplantant le cancer qui s'est classé deuxième. Les maladies cérébrovasculaires (comme l'accident cérébrovasculaire) et les maladies pulmonaires étaient également des causes courantes de décès chez les personnes âgées.
- En 1996, chez les hommes, 17 % des décès sont survenus chez des personnes de 85 ans et plus, tandis que chez les femmes, la proportion correspondante était de 33 %. Cet écart tient au fait que la probabilité de vivre jusqu'à un âge avancé est plus forte pour la femme que pour l'homme.

Tableau 7.2 Causes principales de décès selon l'âge et le sexe, Canada, 1996

Rang ¹		Cause de décès (codes de la CIM-9) ²	Hommes		Femmes	
			Décès	%	Décès	%
Moins d'un an						
Total			1 155	100,0	896	100,0
1	Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (760-779)		544	47,1	404	45,1
2	Anomalies congénitales (740-759)		313	27,1	262	29,2
3	Cardiopathies (391, 392.0, 393-398, 402, 404, 410-416, 420-429)		12	1,0	21	2,3
4	Traumatismes accidentels (E800-E949)		17	1,5	11	1,2
5	Pneumonie et grippe (480-487)		8	0,7	13	1,5
6	Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central (330-337)		7	0,6	6	0,7
7	Cancer (140-208)		4	0,3	6	0,7
	Autres causes		250	21,6	173	19,3
De 1 à 14 ans						
Total			621	100,0	476	100,0
1	Traumatismes accidentels		228	36,7	140	29,4
2	Cancer		95	15,3	84	17,6
3	Anomalies congénitales		59	9,5	61	12,8
4	Suicide (E950-E959)		32	5,2	9	1,9
5	Cardiopathies		18	2,9	14	2,9
6	Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central		15	2,4	12	2,5
7	Pneumonie et grippe		13	2,1	6	1,3
	Autres causes		161	25,9	150	31,5
De 15 à 24 ans						
Total			1 764	100,0	637	100,0
1	Traumatismes accidentels		801	45,4	267	41,9
2	Suicide		490	27,8	91	14,3
3	Cancer		98	5,6	56	8,8
4	Cardiopathies		35	2,0	18	2,8
5	Anomalies congénitales		26	1,5	15	2,4
6	Infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) (042-044)		12	0,7	4	0,6
7	Maladies cérébrovasculaires (430-438)		10	0,6	5	0,8
	Autres causes		292	16,6	181	28,4
De 25 à 44 ans						
Total			7 421	100,0	3 633	100,0
1	Cancer		986	13,3	1 394	38,3
2	Traumatismes accidentels		1 594	21,5	442	12,2
3	Suicide		1 390	18,7	380	10,5
4	Cardiopathies		702	9,5	252	6,9
5	Infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH)		821	11,1	83	2,3
6	Maladies cérébrovasculaires		106	1,4	129	3,6
7	Maladies chroniques et cirrhose du foie (571)		128	1,7	55	1,5
	Autres causes		1 694	22,8	898	24,7

¹ Les causes sont classées selon le nombre total de décès pour les deux sexes au sein d'un groupe d'âge.² Trois hommes (CIM 410, E813 et E968) et une femme (CIM E860) sont exclus du présent tableau puisqu'on ne connaît pas leur âge.

Tableau 7.2 Causes principales de décès selon l'âge et le sexe, Canada, 1996 – fin

		Hommes		Femmes	
		Décès	%	Décès	%
Rang ¹	Cause de décès (codes de la CIM-9) ²				
De 45 à 64 ans					
	Total	20 921	100,0	12 694	100,0
1	Cancer	7 916	37,8	6 965	54,9
2	Cardiopathies	5 566	26,6	1 798	14,2
3	Traumatismes accidentels	988	4,7	377	3,0
4	Maladies cérébrovasculaires	673	3,2	489	3,9
5	Suicide	786	3,8	274	2,2
6	Maladies chroniques et cirrhose du foie	562	2,7	218	1,7
7	Diabète sucré (250)	471	2,3	307	2,4
	Autres causes	3 959	18,9	2 266	17,9
De 65 à 74 ans					
	Total	28 172	100,0	18 271	100,0
1	Cancer	10 464	37,1	7 603	41,6
2	Cardiopathies	8 236	29,2	4 236	23,2
3	Maladies cérébrovasculaires	1 490	5,3	1 162	6,4
4	Maladies pulmonaires chroniques obstructives et affections connexes (490-496)	1 440	5,1	932	5,1
5	Diabète sucré	819	2,9	631	3,5
6	Maladies des artères, artérioles et capillaires (440-448)	675	2,4	336	1,8
7	Pneumonie et grippe	521	1,8	336	1,8
	Autres causes	4 527	16,1	3 035	16,6
De 75 à 84 ans					
	Total	32 760	100,0	31 091	100,0
1	Cardiopathies	10 144	31,0	9 501	30,6
2	Cancer	8 887	21,7	7 609	24,5
3	Maladies cérébrovasculaires	2 558	7,8	3 159	10,2
4	Maladies pulmonaires chroniques obstructives et affections connexes	2 316	7,1	1 534	4,9
5	Pneumonie et grippe	1 301	4,0	1 088	3,5
6	Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central	856	2,6	1 062	3,4
7	Diabète sucré	903	2,8	983	3,2
	Autres causes	5 795	17,7	6 155	19,8
85 ans et plus					
	Total	18 587	100,0	33 777	100,0
1	Cardiopathie	5 831	31,4	11 547	34,2
2	Cancer	3 205	17,2	3 869	11,5
3	Maladies cérébrovasculaires	1 657	8,9	4 147	12,3
4	Pneumonie et grippe	1 343	7,2	2 301	6,8
5	Psychoses (290-299)	624	3,4	1 757	5,2
6	Maladies pulmonaires chroniques obstructives et affections connexes	1 324	7,1	1 022	3,0
7	Affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central	572	3,1	1 269	3,8
	Autres causes	4 031	31,7	7 865	23,3

¹ Les causes sont classées selon le nombre total de décès pour les deux sexes au sein d'un groupe d'âge.² Trois hommes (CIM 410, E813 et E968) et une femme (CIM E860) sont exclus du présent tableau puisqu'on ne connaît pas leur âge.

Faits saillants – Décès dus à des causes extérieures

Le tableau 7.3 montre le nombre de décès dus à des causes extérieures, y compris les traumatismes causés par les accidents de transport, les chutes, l'intoxication accidentelle, la suffocation, les armes à feu, les feux, les agents physiques naturels, les accidents et complications survenant au cours d'actes médicaux et d'autres facteurs¹. Ces décès représentent une proportion considérable de l'ensemble des décès enregistrés chaque année (plus de 6 % en 1996). De surcroît, ils sont classés selon le caractère intentionnel de la cause du traumatisme, autrement dit traumatisme accidentel, suicide, homicide, autre et intention indéterminée². Nombre de décès provoqués par des causes extérieures pourraient être prévenus grâce à des programmes publics d'information et de prévention des traumatismes. Par conséquent, les données sur ces décès seront utiles aux personnes chargées d'élaborer et d'évaluer ce genre de programmes.

- En 1996, près de 13 500 décès ont eu une cause extérieure. La plupart étaient accidentels (64 %), mais un nombre important résultaient d'un suicide (29 %). Un petit nombre ont été causés par homicide (4 %). Enfin, le nombre résultant d'une intervention de la force publique était « négligeable ». Dans moins de 3 % des cas, on n'a pu préciser si le décès était accidentel ou causé intentionnellement.
- Au moins un décès dû à des causes extérieures sur quatre était le résultat d'un accident de transport (3 200 décès). La plupart sont survenus sur la voie publique (2 900 décès dus à des accidents de circulation) et résultaient de collisions entre véhicules à moteur (automobiles, autobus, motocyclettes, machines de construction ou machines agricoles) et d'autres véhicules à moteur, des piétons, des cyclistes ou d'autres objets (comme des butées ou des animaux). Pratiquement tous les décès dus à un accident de transport étaient non intentionnels.
- Un peu plus de 2 900 personnes sont mortes à la suite d'une chute. Dans 45 % des cas, la nature de la blessure qui a entraîné la mort était une fracture de cause non précisée. Bien que la plupart des chutes soient involontaires, 7 % des personnes décédées de la sorte ont sauté délibérément d'un endroit élevé. En 1996, 86 % des décès non intentionnels résultant d'une chute sont survenus chez des personnes de 70 ans et plus. (Les chutes accidentelles ont tendance à être des chutes dans l'escalier, des chutes de plain-pied résultant de glissade, faux pas ou trébuchement, ou des chutes d'un niveau à un autre.)
- L'intoxication, qui a causé un décès dû à des causes extérieures sur sept (environ 1 900) vient en troisième position. La plupart des intoxications (63 %) sont en rapport avec la surdose d'une forme ou l'autre de drogue, y compris l'ingestion d'une dose mortelle d'analgésiques (p. ex. héroïne ou morphine), de médicaments contre les

¹ Les codes de la CIM-9 utilisés pour totaliser les données du tableau 7.3 figurent à l'annexe 5 (p. 142).

² Certains nombres de décès qui figurent au tableau 7.3 pourraient être sous-estimés parce que certains décès pourraient avoir été rangés dans la catégorie des décès de cause non précisée ou indéterminée. En outre, dans le cas de certains accidents, suicides ou homicides, la cause (ou l'intention) du décès est impossible à déterminer ou exige de nombreux mois d'enquête. Par conséquent, les nombres de décès présentés ici ne reflètent pas nécessairement les données les plus récentes des bureaux des coronaires (Young et Wagner, 1994).

troubles cardiovasculaires ou de médicaments agissant sur le système nerveux (p. ex. cocaïne). Environ 28 % des décès par intoxication sont causés par le monoxyde de carbone (provenant du système d'échappement d'un véhicule à moteur ou d'autres sources). On estime que plus de la moitié des intoxications mortelles ont été auto-infligées. Enfin, dans 10 % des cas, on n'a pu établir avec certitude si l'intoxication était volontaire ou non.

- Presque autant de personnes sont mortes par suffocation que par intoxication. Les trois quarts des victimes de suffocation sont mortes par pendaison ou par étranglement. Les décès par suffocation étaient, en grande majorité, auto-infligés. (Les décès par suffocation représentaient 36 % des cas de suicide en 1996.)
- L'utilisation d'armes à feu, comme les armes de poing, les fusils de chasse et les carabines, a été la cause de plus de 1 100 décès en 1996. La plupart de ces décès (78 %) ont été auto-infligés; cependant, dans 16 % des cas, il s'agissait d'un homicide.
- Bien que la plupart des noyades soient accidentelles (69 %), une proportion importante (24 %) des 648 décès de ce genre survenus en 1996 entre dans la catégorie du suicide. Les noyades accidentelles ont tendance à survenir durant les activités de loisirs, comme la natation, et comportent souvent une forme ou l'autre de transport aquatique (p. ex., submersion accidentelle d'un véhicule nautique ou chute par-dessus bord). Dans 30 cas, la noyade a eu lieu dans une baignoire.
- Environ 6 % des décès dus à des causes extérieures ont été provoqués par des feux ou des brûlures (principalement des incendies accidentels dans des résidences privées), des instruments tranchants ou perforants (surtout utilisés dans les cas d'homicide ou de suicide), des chocs accidentels ou intentionnels par ou contre des objets (p. ex., agression meurtrière), des agents physiques naturels ou des facteurs du milieu (p. ex., exposition à des températures excessivement basses), des machines (y compris les machines agricoles, et les machines de levage et d'excavation) et des mauvais traitements infligés à des enfants.
- Moins de 2 % des décès dus à des causes extérieures résultaient d'effets indésirables – c'est-à-dire de réactions anormales, de complications ou d'incidents – survenus durant des interventions chirurgicales ou médicales ou un traitement médicamenteux.

Tableau 7.3 Nombre de décès dus à des causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800-E999), Canada, 1996¹

Mécanisme ou cause du traumatisme	Total	Caractère intentionnel du traumatisme ²				
		Accidentel	Suicide	Homicide	Autre ³	Non déterminé ⁴
Toutes les causes extérieures	13 462	8 663	3 941	511	7	340
<i>Tous les traumatismes</i>	13 236	8 437	3 941	511	7	340
Accidents de transport	3 226	3 203	20	..	..	3
Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur ⁵	2 905	2 905	..	..	..	..
Occupant d'un véhicule à moteur ⁶ (autre qu'une motocyclette)	1 420	1 420	..	..	..	..
Piéton	447	447	..	..	..	..
Motocycliste ⁶	94	94	..	..	..	..
Cycliste ⁶	54	54	..	..	..	..
Autre personne ⁷	2	2	..	..	..	..
Personne non précisée ⁸	888	888	..	..	..	..
Autres accidents de transport ⁹	251	251	..	..	..	..
Véhicule à moteur spécial pour terrain enneigé	76	76	..	..	..	..
Transport aérien ou vol spatial	56	56	0	..	..	0
Piéton, autre ¹⁰	45	45	..	..	..	..
Autre véhicule à moteur hors de la voie publique	24	24	..	..	..	..
Transport par eau ¹¹	16	16	..	..	..	..
Chemin de fer	11	11	..	..	..	..
Cycliste, autre	6	6	..	..	..	..
Autre ou non précisé	17	17	..	..	..	..
Séquelles d'accidents occasionnés par des véhicules à moteur	47	47	..	..	..	..
Écrasement de véhicule à moteur	23	..	20	..	..	3
Chutes	2 930	2 701	204	2	..	23
Fracture, cause non précisée	1 297	1 297	..	..	..	..
Sauter/être poussé/tomber d'un endroit élevé	229	..	204	2	..	23
Autre ou non précisée	1 404	1 404	..	..	..	..
Intoxication	1 927	692	1 047	0	0	188
Par des médicaments et produits biologiques ¹²	1 217	548	525	0	..	144
Par des gaz d'échappement de véhicule à moteur	351	24	310	..	..	17
Par une autre source de monoxyde de carbone	203	23	167	..	..	13
Par l'alcool	60	60	..	..	..	..
Autre ou non précisée	96	37	45	..	..	14
Suffocation	1 859	387	1 414	45	..	13
Par pendaison/strangulation	1 483	76	1 355	45	..	7
Par inhalation/ingestion d'aliments	151	151	..	..	..	..
Par inhalation/ingestion d'un autre objet	132	132	..	..	..	..
Causée par un sac en plastique	42	2	40	..	..	0
Dans un lit ou un berceau	10	10	..	..	..	..
Autre ou non précisée	41	16	19	..	..	6
Armes à feu	1 131	46	881	177	6	21
Noyade/submersion	648	448	154	4	..	42
Noyade/submersion accidentelle	448	448	..	..	..	..
Durant des activités sportives/de loisirs	88	88	..	..	..	..
Accident de véhicule nautique causant une submersion	52	52	..	..	..	..
Autre submersion/noyade accidentelle durant le transport par eau	52	52	..	..	..	..
Dans une baignoire	30	30	..	..	..	..
Autre ou non précisée	226	226	..	..	..	..
Autre noyade/submersion	200	..	154	4	..	42

Tableau 7.3 Nombre de décès dus à des causes extérieures de traumatismes et empoisonnements (E800-E999), Canada, 1996¹ – fin

Mécanisme ou cause du traumatisme	Total	Caractère intentionnel du traumatisme ²				
		Accidentel	Suicide	Homicide	Autre ³	Non déterminé ⁴
Feux/brûlures	337	288	34	6	..	9
Feux/brûlures accidentels	288	288	...	...	..	...
Incendie dans une résidence privée	208	208	...	...	..	...
Incendie dans un autre immeuble ou bâtiment sans précision	71	71	...	...	..	...
Substance/objet brûlant, matière caustique/corrosive, vapeur d'eau	9	9	...	...	..	...
Autres feux/brûlures	49	...	34	6	..	9
Instruments tranchants/perforants	250	10	87	151	0	2
Choc accidentel par ou contre objets ou personnes	157	104	..	53	0	..
Agents physiques naturels/facteurs du milieu	145	140	1	..	..	4
Froid excessif	98	93	1	..	..	4
Morsures et piqûres	3	3	..	..	..	..
Autre ou non précisé	44	44	..	..	..	..
Machines	99	99	..	..	..	..
Agricoles	40	40	..	..	..	..
De levage	17	17	..	..	..	..
Pour le déplacement de la terre, le terrassement et d'autres tâches d'excavation	10	10	..	..	..	..
Autre ou non précisé	32	32	..	..	..	..
Enfant maltraité	14	..	..	14	..	..
Autres causes précisées et classifiables¹³	131	53	73	3	0	2
Autres causes précisées, non classées ailleurs	67	9	13	23	1	21
Causes non précisées	315	257	13	33	0	12
<i>Effets indésirables</i>	226	226	..	..	..	..
Actes chirurgicaux et médicaux responsables de réactions anormales du malade ou de complications ultérieures¹⁴	153	153	..	..	..	..
Incidents affectant le malade durant l'intervention chirurgicale ou médicale¹⁵	39	39	..	..	..	..
Médicaments au cours de leur usage thérapeutique	34	34	..	..	..	..

¹ L'annexe 5 (p. 142) contient la liste des codes de la CIM-9 utilisés pour totaliser les données du présent tableau.

² Le symbole « .. » indique qu'on ne possède pas les données en raison des contraintes de la CIM-9 ; « ... » indique que les données ne sont pas appropriées ou sont sans objet.

³ Décès résultant d'une intervention de la force publique ou d'un acte de guerre.

⁴ Le caractère accidentel ou intentionnel n'est pas déterminé.

⁵ Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur sur les voies publiques ; les accidents survenus sur les chemins privés, dans les parcs de stationnement, dans les champs, dans l'air, dans l'eau et sur les routes des exploitations agricoles, des champs d'aviation, des mines, etc. sont classés ailleurs.

⁶ Inclut les conducteurs et les passagers.

⁷ Inclut les occupants des tramways et des véhicules remorqués par des animaux, les personnes montant des animaux et d'autres personnes.

⁸ On utilise cette catégorie quand on ne sait pas si la personne décédée était conducteur ou passager.

⁹ Inclut les accidents de chemin de fer, les accidents de véhicule à moteur hors de la voie publique, les autres accidents de véhicule routier, certains accidents de transport par route, et les accidents de véhicule non classés ailleurs.

¹⁰ Inclut 23 piétons renversés par du matériel roulant (p. ex., trains) et 17 ayant subi un accident de véhicule à moteur hors de la circulation.

¹¹ Sont exclus les accidents de véhicules nautiques causant la submersion et d'autres submersions ou noyades accidentelles survenues lors d'accidents de transport par eau.

¹² Inclut la surdose de médicaments, l'administration ou la prise du mauvais médicament, la prise de médicaments par inadvertance et les accidents d'utilisation de médicaments durant les interventions chirurgicales/médicales. N'inclut pas les cas de médicament administré correctement mais causant des effets indésirables (repris sous les codes E930 à E949).

¹³ La plupart des décès ont été causés par le fait d'avoir sauté ou de s'être couché devant un objet en mouvement (67) et par des accidents provoqués par un courant électrique (27).

¹⁴ Par exemple, implantation chirurgicale d'un stimulateur ou d'une valve cardiaque, l'amputation d'un membre ou une opération de pontage.

¹⁵ Par exemple, une coupure, une perforation ou une hémorragie accidentelle durant une intervention chirurgicale.

8. Statistiques de l'état civil selon la division de recensement

INTRODUCTION

Les naissances, les décès et les mariages sont des événements démographiques importants. Toutefois, la courbe de répartition de ces événements n'est uniforme ni d'une région à l'autre du pays ni au sein de régions particulières. La géographie physique, les facteurs qui déterminent où s'installe l'homme, et les différences démographiques, socioéconomiques et culturelles entre membres de la population canadienne sont des éléments qui contribuent tous à ces variations. Les cartes présentées dans ce chapitre montrent les différences spatiales de la propension à se marier et à avoir des enfants. Elles révèlent aussi les tendances distinctes observées pour le faible poids à la naissance, le taux de mortalité infantile et le taux comparatif de mortalité.

Les données sont présentées selon la division de recensement (DR). Les DR sont des régions administratives, habituellement établies en vertu de lois provinciales, qui correspondent à des régions géographiques intermédiaires entre la municipalité et la province, comme les comtés, les districts régionaux et les municipalités régionales. Pour les provinces qui ne définissent aucune région de ce genre (Terre-Neuve, Manitoba, Saskatchewan et Alberta), Statistique Canada a créé des divisions de recensement, en collaboration avec ces provinces, aux fins de la diffusion des données statistiques. Au Yukon, la DR correspond à l'ensemble du territoire.

Six cartes choroplèthes (thématiques) (8.1 à 8.6), qui représentent les régions à forte densité de population du sud du pays, illustrent les variations spatiales des taux de nuptialité, ainsi que des taux de fécondité, de faible poids à la naissance et de mortalité observées de 1994 à 1996¹. Des faits saillants se rapportant au thème étudié sont intégrés à chaque carte. Le tableau 8.1 contient les données pour chacune des 288 DR du Canada. Les cartes 8.7 à 8.9 montrent l'emplacement géographique de ces DR (deux d'entre elles sont des cartes en cartouche, qui montrent la numérotation des DR pour les régions à forte densité de population)².

Cartes choroplèthes

Les cartes choroplèthes présentent des poncifs, c'est-à-dire des structures constituées par la répétition régulière d'un élément graphique (p. ex., zone ombrée claire par opposition à foncée) que l'on applique aux aires géographiques (ici, les écoumènes de population³) d'après la grandeur de la statistique (p. ex., taux de mortalité élevé par opposition à

¹ Comme les taux calculés pour les DR peu peuplées fluctuent fortement d'une année à l'autre, on se sert des données de trois années afin d'obtenir des chiffres plus stables. Les taux sont normalisés en prenant pour référence les chiffres estimatifs de population du Canada pour 1995.

² Les limites peuvent varier d'un recensement à l'autre. Les limites des DR utilisées dans la présente publication sont celles qui étaient en vigueur le 1^{er} janvier 1996.

³ Par écoumène de population, on entend une région terrestre inhabitée où des personnes ont établi leur domicile permanent. On regroupe en écoumène les régions dont la densité de population est d'au moins 0,4 habitant au kilomètre carré (environ 1 habitant au mille carré). Pour en savoir plus sur la géographie du Recensement, consulter le Dictionnaire du recensement de 1996 (n° 92-351 au catalogue), publié par Statistique Canada.


faible) dans la région. Cette technique est particulièrement utile pour représenter les taux, que l'on peut facilement regrouper en intervalles. En ce qui concerne les cartes présentées ici, les limites des intervalles correspondent à la moyenne canadienne dans un cas et aux « discontinuités naturelles » dans les autres.

L'une des limites de la cartographie choroplèthe selon la DR tient au fait que l'on suppose que la valeur de la statistique est uniforme dans toute la DR. Or, cette hypothèse peut donner une impression erronée, puisque nombre de DR contiennent de grandes régions très peu peuplées. Pour résoudre ce problème, dans les cartes 8.1 à 8.6, on n'a ombré que les écoumènes de population, plutôt que les DR complètes.

Sources des données cartographiques


On s'est servi de la projection cartographique de Mercator transverse universelle, fondée sur le système géodésique nord-américain de 1927, pour créer les cartes présentées ici. La Division de la géographie de Statistique Canada a fourni les Fichiers numériques cartographiques (FNC) pour les provinces, les territoires, les DR et les écoumènes de population. Les FNC, utilisés couramment pour la cartographie choroplèthe, sont des fichiers informatiques qui décrivent les limites des régions géographiques types, y compris les modifications du tracé du littoral et des rives des lacs. Conjugués aux données démographiques de recensement et aux statistiques de l'état civil, ces renseignements permettent de produire des cartes thématiques comme celles présentées ici.

Ouest canadien



Carte 8.1 Taux bruts de nuptialité selon la division de recensement, moyennes de 1994 à 1996, Canada

Nombre de mariages
pour 1 000 habitants



Moyenne canadienne : 5,4

Le taux brut de nuptialité (TBN) est égal au nombre annuel de mariages célébrés dans une région donnée pour 1 000 habitants*. De nombreux facteurs contribuent aux variations régionales observées, y compris la structure par âge de la population locale, les attitudes culturelles en regard du mariage, les convictions religieuses et les facteurs socioéconomiques.

Une tendance frappante se dégage au Québec, où le taux de nuptialité de 1994 à 1996 est faible dans la majorité des divisions de recensement (DR). Ce phénomène tient à la forte proportion de couples québécois vivant en union de fait (43 % en 1996).


Plusieurs régions touristiques ou de villégiature bien connues affichent des taux de nuptialité élevés, alors que leur population est faible. Ces endroits semblent être des lieux de mariage recherchés tant par les Canadiens que par les visiteurs étrangers. Par exemple, le TBN était particulièrement élevé dans la division n° 15 de l'Alberta, où se trouve le parc national de Banff (37 mariages pour 1 000 habitants), dans la zone de villégiature du mont Whistler situé dans le district régional de Squamish-Lilloet en Colombie-Britannique (10 pour 1 000) et dans le district de Muskoka en Ontario (8 pour 1 000).

Le TBN était également assez élevé dans la région métropolitaine de Toronto pendant la période d'observation de trois ans (7 pour 1 000). Ce résultat s'explique peut-être par la forte proportion d'immigrants vivant dans cette région.


* Les chiffres de population utilisés au dénominateur ont trait aux habitants de la région observée, mais les mariés et mariées ne résidaient pas nécessairement dans la DR où a eu lieu le mariage. Par conséquent, la statistique présentée ici est un rapport plutôt qu'un taux.

Sources : Fichiers numériques cartographiques de la Division de la géographie et données sur l'état civil de la Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada

Centre et est du Canada



Ouest canadien



Carte 8.2

Indices synthétiques de fécondité selon la division de recensement, moyennes de 1994 à 1996, Canada

Nombre moyen de naissances vivantes par femme

- 2,56 à 4,22
- 1,90 à 2,55
- 1,64 à 1,89
- 1,07 à 1,63
- Faible densité

Moyenne canadienne : 1,63


L'indice synthétique de fécondité (ISF) est égal au nombre total de naissances vivantes qu'une femme peut s'attendre à avoir au cours de sa vie (d'après les conditions de fécondité qui prévalaient entre 1994 et 1996). L'ISF est à la baisse au Canada car les femmes continuent de retarder le moment de la maternité (jusqu'à 27 ans, en moyenne, pour la première naissance en 1996) et choisissent d'avoir moins d'enfants. De 1994 à 1996, le taux de fertilité était égal ou inférieur à la moyenne canadienne de 1,63 naissance par femme dans 4 divisions de recensement sur 10.

En général, on enregistre les ISF les plus élevés dans l'ouest du pays, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba. En revanche, on enregistre des ISF inférieurs à la moyenne dans les provinces de l'est, particulièrement à Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse et, dans une moindre mesure, au Nouveau-Brunswick.


C'est dans le nord de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Québec, et au Manitoba, que l'on enregistre les ISF les plus élevés (de 2,56 à 4,22 naissances par femme). Ces taux relativement élevés semblent refléter la grande fécondité des populations autochtones de ces régions.

Sources : Fichiers numériques cartographiques de la Division de la géographie et données sur l'état civil de la Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada


Centre et est du Canada



Ouest canadien



Carte 8.3
Pourcentage de naissances vivantes
avec faible poids à la naissance
(moins de 2 500 grammes),
selon la division de recensement,
moyennes de 1994 à 1996, Canada



Moyenne canadienne : 5,8 %


On considère que les bébés qui pèsent moins de 2 500 grammes à la naissance ont un faible poids de naissance (FPN). La proportion de bébés dont le poids à la naissance est faible est un indicateur de l'état de santé reconnu à l'échelle internationale. Au Canada, le taux de FPN est assez bas, comparativement à celui de la plupart des autres pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (données non présentées).

Le FPN peut être dû à un retard de croissance intra-utérin et/ou à une naissance prématurée. Le poids de l'enfant à la naissance dépend de nombreux facteurs, dont l'âge, la parité, le niveau de scolarité, le revenu, le régime alimentaire et les antécédents d'usage du tabac de la mère.


De 1994 à 1996, la proportion de naissances vivantes où le bébé avait un faible poids à la naissance était supérieure à la moyenne nationale (5,8 %) pour le tiers des DR. Cependant, dans le sud du Canada, on observe un gradient net d'est en ouest. Ce sont les DR des régions rurales de l'Ontario, du Québec et des provinces de l'Atlantique qui ont les taux de FPN les plus élevés (de 7,1 % à 9,2 %).

Sources : Fichiers numériques cartographiques de la Division de la géographie et données sur l'état civil de la Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada

Centre et est du Canada



Ouest canadien



Carte 8.4 Taux de mortalité infantile selon la division de recensement, moyennes de 1994 à 1996, Canada

Nombre de décès infantiles
pour 1 000 naissances vivantes

- 9,3 à 24,0
- 6,1 à 9,2
- 2,6 à 6,0
- 0,0 à 2,5
- Faible densité


Moyenne canadienne : 6,0

En 1996, le taux de mortalité infantile (TMI) observé au Canada était l'un des plus faibles du monde. Néanmoins, il variait considérablement d'une région à l'autre du pays. Les taux les plus élevés ont principalement été observés au Manitoba, en Saskatchewan et au Québec. La plupart des DR pour lesquelles le TMI était inférieur à 2,6 étaient situées au Québec ou en Nouvelle-Écosse.


On a associé la mortalité infantile à plusieurs facteurs, dont le sexe et le poids à la naissance de l'enfant, ainsi que l'âge, l'état matrimonial, la situation socioéconomique et la parité de la mère. Le taux de mortalité infantile pourrait aussi dépendre de l'éloignement par rapport aux établissements de santé.

Sources : Fichiers numériques cartographiques de la Division de la géographie et données sur l'état civil de la Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada

Centre et est du Canada




Ouest canadien



Carte 8.5

Taux comparatifs de mortalité des hommes selon la division de recensement, moyennes de 1994 à 1996, Canada



Moyenne canadienne : 853,5

Le taux comparatif de mortalité (TCM) correspond à la moyenne pondérée des taux de mortalité selon l'âge observés durant une période de référence particulière dans un lieu géographique donné*. Les TCM permettent de faire des comparaisons entre périodes de référence et/ou entre régions.


Au milieu des années 90, les TCM observés pour 24 divisions de recensement (DR) tombaient dans la tranche la plus élevée (au moins 1 093,1 décès pour 100 000 hommes). Neuf de ces DR étaient situées au Québec, y compris Le-Haut-Saint-Maurice et Mirabel. Les taux étaient également élevés dans les régions du nord du Manitoba et de la Saskatchewan et dans le centre de l'Alberta.

Les DR auxquelles on associait les taux les plus faibles se situaient dans le sud du Manitoba et dans le nord-est de l'Alberta. Dans les régions plus peuplées du pays, on enregistre aussi de faibles taux pour les municipalités régionales de York et de Peel en Ontario, pour la région Stikine en Colombie-Britannique et pour la DR de La Jacques-Cartier au Québec.

* Les taux comparatifs qui figurent sur cette carte ont été calculés en prenant pour référence la population du Canada de 1991 (hommes et femmes confondus).


Sources : Fichiers numériques cartographiques de la Division de la géographie et données sur l'état civil de la Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada

Centre et est du Canada



Terre-Neuve

Ouest canadien



Carte 8.6

Taux comparatifs de mortalité des femmes selon la division de recensement, moyennes de 1994 à 1996, Canada

Nombre de décès pour 100 000 femmes

■	692,1 à 3416,9
■	522,7 à 692,0
■	460,1 à 522,6
■	309,8 à 460,0
□	Faible densité

Moyenne canadienne : 522,6

Le taux comparatif de mortalité (TCM) correspond à la moyenne pondérée des taux de mortalité selon l'âge observés durant une période de référence particulière dans un lieu géographique donné*.


Chez les femmes, c'est pour les divisions de recensement (DR) de Coaticook et de Rouyn-Noranda au Québec que l'on observe les TCM les plus élevés (plus de 1 000 décès pour 100 000 femmes). Les taux étaient également élevés dans le nord du Manitoba et de la Saskatchewan.

En revanche, c'est dans les DR du sud du Manitoba, dans la région Stikine de la Colombie-Britannique et dans les DR de Pontiac et de Bécancour au Québec que l'on observe les taux de mortalité féminine les plus faibles. Les TCM étaient également faibles dans le sud-est de l'Alberta et dans le sud de la Saskatchewan.

* Les taux comparatifs qui figurent sur cette carte ont été calculés en prenant pour référence la population du Canada de 1991 (hommes et femmes confondus).

Sources : Fichiers numériques cartographiques de la Division de la géographie et données sur l'état civil de la Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada

Centre et est du Canada



Terre-Neuve

Tableau 8.1 Certaines statistiques de l'état civil selon la division de recensement, Canada, 1996 et 1994 à 1996¹

Division de recensement (DR) ⁴	1996					Période de 1994 à 1996 ²						
	Nombre					Taux				TCM ³		
	Population ⁵	Mariages	Naissances	Décès	d'enfants	TBN ⁶	ISF ⁷	FPN ⁸	TMI ⁹	Total	Hommes	Femmes
Total	28 846 761	156 690	366 124	212 703	2 043	5,4	1,63	5,8	6,0	665,1	853,5	522,6
Terre-Neuve												
01 Division n° 1	251 523	1 470	2 702	1 792	12	5,8	1,26	5,9	6,7	742,8	984,6	569,1
02 Division n° 2	27 723	150	264	213	1	5,2	1,39	7,1	8,3	847,5	1015,4	716,6
03 Division n° 3	22 459	145	192	157	0	5,3	1,09	4,5	9,4	887,9	1127,6	689,0
04 Division n° 4	24 824	120	230	156	2	5,3	1,36	6,1	6,4	725,6	977,0	517,3
05 Division n° 5	44 319	272	468	313	3	6,6	1,36	5,7	9,1	727,8	942,7	567,7
06 Division n° 6	39 118	241	406	295	4	6,8	1,25	5,7	8,3	773,6	947,4	642,8
07 Division n° 7	41 534	246	372	343	2	5,6	1,20	7,8	6,8	677,8	868,0	501,4
08 Division n° 8	48 247	294	458	358	6	5,7	1,18	5,3	5,6	720,2	842,8	600,3
09 Division n° 9	22 855	111	212	165	1	4,3	1,07	5,5	7,5	733,0	871,1	587,6
10 Division n° 10	29 190	145	443	136	7	4,6	1,62	5,7	12,9	882,2	1085,1	679,1
Île-du-Prince-Édouard												
01 Cté de Kings	19 561	120	260	199	1	5,7	1,94	4,6	3,9	775,9	1040,4	551,3
02 Cté de Queens	70 430	461	880	661	4	6,6	1,62	5,5	5,6	733,7	982,0	569,3
03 Cté de Prince	44 566	343	554	407	3	6,8	1,71	5,4	5,3	667,7	957,7	466,5
Nouvelle-Écosse												
01 Cté de Shelburne	17 002	87	172	177	1	5,3	1,60	4,3	5,1	759,5	953,2	589,5
02 Cté de Yarmouth	27 310	188	347	253	6	6,7	1,68	6,6	10,7	652,0	906,9	493,9
03 Cté de Digby	20 500	114	202	226	0	5,9	1,35	6,0	3,4	675,2	911,3	485,0
04 Cté de Queens	12 417	80	112	145	0	6,0	1,44	7,3	0,0	790,6	996,1	630,6
05 Cté d'Annapolis	22 324	123	208	247	0	6,0	1,59	5,1	7,7	691,2	931,2	514,8
06 Cté de Lunenburg	47 561	310	445	492	5	5,8	1,36	5,3	7,5	711,3	939,5	548,9
07 Cté de Kings	59 193	363	718	428	1	6,1	1,57	4,9	2,3	612,9	801,7	478,3
08 Cté de Hants	39 483	196	494	292	3	5,0	1,60	6,6	5,6	720,8	928,0	568,0
09 Cté de Halifax	342 966	2 039	4 378	2 298	26	5,7	1,45	5,9	6,1	690,1	882,9	553,5
10 Cté de Colchester	49 262	300	574	409	4	5,8	1,62	5,1	4,5	686,2	886,2	545,2
11 Cté de Cumberland	33 804	221	354	403	1	6,1	1,58	5,8	6,7	765,0	1002,0	598,9
12 Cté de Pictou	48 718	296	526	488	3	6,1	1,56	5,2	3,1	700,1	909,8	536,7
13 Cté de Guysborough	10 917	56	93	101	0	5,3	1,43	7,1	0,0	764,1	1012,2	566,4
14 Cté d'Antigonish	19 554	108	217	138	3	4,9	1,62	5,0	8,8	677,0	902,6	521,3
15 Cté d'Inverness	20 918	131	250	203	0	6,2	1,61	4,3	5,9	784,3	1049,8	597,1
16 Cté de Richmond	11 022	77	98	104	0	5,8	1,47	5,0	6,2	648,6	772,9	535,1
17 Cté de Cap-Breton	117 849	648	1 284	1 202	4	5,3	1,58	5,3	4,0	826,7	1111,5	628,5
18 Cté de Victoria	8 482	55	101	91	1	5,7	1,75	3,7	6,6	702,3	963,7	514,5
Nouveau-Brunswick												
01 Cté de Saint John	79 302	551	980	793	3	6,9	1,57	5,5	4,1	774,5	1028,0	614,1
02 Cté de Charlotte	27 335	186	342	280	2	7,0	1,77	6,1	5,6	718,6	951,0	538,5
03 Cté de Sunbury	25 358	78	371	114	0	3,9	1,79	4,7	4,5	778,8	1067,9	672,1
04 Cté de Queens	12 470	81	119	149	2	5,7	1,35	5,6	8,8	803,1	1057,9	595,4
05 Cté de Kings	64 724	367	819	384	3	5,2	1,68	5,0	4,5	654,3	814,7	542,1
06 Cté d'Albert	26 492	139	269	176	1	5,3	1,37	5,1	2,5	682,1	869,5	547,3
07 Cté de Westmorland	120 531	768	1 305	964	7	6,1	1,36	5,7	5,0	637,8	864,1	486,7
08 Cté de Kent	32 094	141	324	248	2	4,4	1,43	4,6	2,9	601,3	782,9	431,6
09 Cté de Northumberland	52 153	363	592	422	3	6,3	1,47	4,3	10,1	752,9	990,1	558,8
10 Cté de York	85 719	678	1 018	666	4	7,1	1,49	5,1	2,8	681,1	879,8	537,5
11 Cté de Carleton	26 910	205	326	250	3	7,6	1,75	4,4	5,8	693,8	893,7	527,8
12 Cté de Victoria	21 929	139	280	204	2	5,5	1,69	5,9	7,1	843,7	1176,0	582,3
13 Cté de Madawaska	36 814	160	305	301	2	3,9	1,23	7,1	6,0	748,8	975,4	578,2
14 Cté de Restigouche	38 701	155	344	317	0	3,9	1,37	4,7	5,0	738,3	964,7	558,9
15 Cté de Gloucester	87 601	355	782	624	6	3,8	1,24	5,5	5,0	664,6	887,8	486,8

Tableau 8.1 Certaines statistiques de l'état civil selon la division de recensement, Canada, 1996 et 1994 à 1996¹ - suite

Division de recensement (DR) ⁴		1996					Période de 1994 à 1996 ²						
		Nombre					Taux				TCM ³		
		Population ⁵	Mariages	Naissances	Décès d'enfants	Décès	TBN ⁶	ISF ⁷	FPN ⁸	TMI ⁹	Total	Hommes	Femmes
Québec													
01	Les Îles-de-La-Madeleine	13 802	45	142	102	2	2,7	1,28	4,8	6,8	683,1	949,6	431,7
02	Pabok	21 340	69	209	161	1	3,1	1,36	6,7	9,4	685,1	861,1	525,5
03	La Côte-de-Gaspé	20 851	38	203	167	1	2,2	1,36	6,5	6,5	791,5	1028,1	581,4
04	Denis-Riverin	13 733	27	147	149	2	1,8	1,56	8,2	4,7	855,5	1153,1	620,4
05	Bonaventure	19 550	58	197	160	0	2,6	1,60	4,5	3,3	609,0	791,0	449,7
06	Avignon	15 898	26	171	132	1	1,8	1,73	4,9	3,6	722,2	874,7	600,3
07	La Matapédia	20 883	43	220	183	2	2,2	1,72	6,2	8,6	741,0	1198,8	566,7
08	Matane	23 723	43	201	209	0	2,1	1,36	5,2	1,6	763,5	995,9	577,6
09	La Mitis	20 160	57	222	168	2	2,5	1,70	4,7	10,9	724,1	972,2	530,2
10	Rimouski-Neigette	52 677	126	533	350	3	3,1	1,43	6,3	8,8	652,2	891,4	518,1
11	Les Basques	10 204	17	76	95	0	2,2	1,41	4,3	8,6	663,5	885,6	518,6
12	Rivière-du-Loup	32 120	98	286	242	1	3,0	1,52	5,3	5,4	653,3	926,4	484,3
13	Témiscouata	23 082	52	219	210	1	2,1	1,63	6,9	5,8	701,6	865,0	563,4
14	Kamouraska	23 215	41	214	195	0	2,1	1,68	5,6	2,8	671,9	816,5	558,5
15	Charlevoix-Est	16 941	68	199	135	0	3,8	1,53	6,4	2,0	763,1	1061,7	573,5
16	Charlevoix	13 437	41	99	122	1	2,6	1,23	6,6	12,3	707,3	989,1	537,2
17	L'Islet	19 823	44	200	157	1	2,2	1,66	5,9	1,6	665,4	961,7	470,7
18	Montmagny	23 794	82	263	220	3	3,9	1,69	8,9	8,0	763,8	1015,0	561,9
19	Bellechasse	29 674	62	298	258	3	2,2	1,66	6,2	4,3	646,2	839,4	485,6
20	L'Île-d'Orléans	6 892	37	78	56	0	4,0	1,63	2,3	4,5	667,0	858,4	588,4
21	La Côte-de-Beaupré	21 632	73	217	200	1	3,0	1,40	7,2	3,0	751,2	1070,8	551,3
22	La Jacques-Cartier	24 819	60	382	89	2	2,4	1,88	4,9	5,9	614,3	702,3	541,3
23	C-U-de-Québec	504 605	1 645	5 162	3 881	28	3,3	1,32	5,3	6,1	662,6	925,8	498,1
24	Desjardins	51 222	87	508	402	2	1,9	1,37	4,4	3,8	654,3	963,5	494,0
25	Les Chutes-de-la-Chaudière	75 598	75	1 053	284	3	1,2	1,72	5,1	3,1	596,7	827,9	432,3
26	La Nouvelle-Beauce	25 058	91	303	176	2	3,0	1,68	7,9	3,2	722,3	1092,4	488,9
27	Robert-Cliche	18 712	108	190	111	1	5,6	1,60	4,8	7,1	611,0	767,4	472,7
28	Les Etchemins	18 356	39	199	147	0	2,6	1,71	6,5	5,1	747,5	1024,0	544,0
29	Beauce-Sartigan	46 318	136	575	290	2	2,8	1,62	4,9	3,5	677,1	930,4	491,0
30	Le Granit	21 287	56	218	168	0	2,8	1,70	5,0	7,3	733,2	949,7	537,9
31	L'Amiante	45 020	125	374	386	3	2,9	1,51	6,5	6,1	694,1	933,9	508,8
32	L'Érable	24 684	53	279	217	3	2,2	1,88	5,6	7,8	707,6	988,8	541,2
33	Lotbinière	26 921	69	304	195	1	2,2	1,75	3,6	7,3	606,3	796,8	436,8
34	Portneuf	45 185	85	468	355	1	1,9	1,51	5,7	1,4	670,9	867,4	520,8
35	Mékinac	13 480	23	102	132	0	1,8	1,44	6,1	3,1	653,4	831,7	535,1
36	Le Centre-de-la-Mauricie	67 103	181	565	616	5	2,7	1,51	6,0	7,1	709,2	980,2	517,2
37	Franchville	140 541	378	1 452	1 078	7	2,8	1,54	6,2	5,3	671,0	918,9	500,2
38	Bécancour	19 683	42	189	146	2	1,8	1,88	7,6	11,9	601,7	836,7	396,1
39	Arthabaska	62 917	195	712	463	3	2,9	1,74	5,2	5,8	667,7	902,9	494,6
40	Asbestos	15 005	28	129	125	0	2,2	1,71	7,9	4,8	661,9	916,0	504,7
41	Le Haut-Saint-François	21 946	49	288	152	2	2,2	1,89	6,7	6,3	617,0	842,0	430,8
42	Le Val-Saint-François	33 422	76	360	228	2	2,4	1,86	5,8	4,8	640,0	910,2	459,8
43	Sherbrooke	132 430	519	1 690	979	6	4,0	1,56	5,8	4,1	646,8	876,0	508,6
44	Coaticook	15 919	25	178	130	3	1,8	1,98	6,3	6,9	793,6	890,5	3416,9
45	Memphrémagog	38 461	177	431	324	1	4,4	1,77	8,9	3,7	644,5	785,3	529,2
46	Brome-Missisquoi	45 987	220	445	433	2	4,5	1,55	5,1	4,9	756,3	1001,5	575,1
47	La Haute-Yamaska	77 006	299	877	506	2	3,5	1,64	5,7	6,4	692,9	905,3	547,4

Tableau 8.1 Certaines statistiques de l'état civil selon la division de recensement, Canada, 1996 et 1994 à 1996¹ - suite

Division de recensement (DR) ⁴		1996					Période de 1994 à 1996 ²						
		Nombre					Taux				TCM ³		
		Population ⁵	Mariages	Naissances	Décès d'enfants	Décès	TBN ⁶	ISF ⁷	FPN ⁸	TMI ⁹	Total	Hommes	Femmes
Québec, suite													
48	Acton	15 303	27	199	107	2	1,7	1,93	7,9	5,0	648,4	913,3	478,1
49	Drummond	84 250	274	908	677	5	3,1	1,70	5,6	4,4	705,4	919,7	540,4
50	Nicolet-Yamaska	23 673	46	246	229	2	2,1	1,60	6,5	7,9	714,3	1112,6	526,8
51	Maskinongé	23 791	52	209	203	0	1,9	1,46	5,5	6,1	681,7	940,9	495,6
52	D'Autray	37 553	61	465	349	1	1,7	1,75	4,7	5,1	810,7	1046,4	621,7
53	Le Bas-Richelieu	52 288	151	462	453	3	2,8	1,40	6,1	4,3	701,9	949,8	522,4
54	Les Maskoutains	78 754	250	936	639	3	3,4	1,66	6,3	2,9	675,5	909,4	531,6
55	Rouville	33 090	58	416	188	2	2,1	1,73	4,8	5,5	683,6	861,3	510,6
56	Le Haut-Richelieu	97 539	320	1 160	671	1	3,5	1,66	5,6	3,3	713,7	896,5	577,3
57	La Vallée-du-Richelieu	113 832	324	1 354	547	2	2,8	1,68	4,6	3,3	657,8	861,0	519,2
58	Champlain	314 306	1 046	3 620	1 896	17	3,2	1,44	6,1	4,0	669,2	889,7	529,2
59	Lajemmerais	95 618	190	1 225	376	5	1,8	1,68	5,0	5,6	575,3	761,9	452,5
60	L'Assomption	102 188	150	1 286	465	6	1,4	1,69	5,5	5,1	703,3	919,4	544,8
61	Joliette	52 845	350	553	454	4	6,5	1,62	7,9	5,8	770,9	1148,5	542,7
62	Matawinie	41 322	111	452	312	2	2,6	2,06	7,0	7,2	667,1	867,9	490,5
63	Montcalm	38 053	85	509	302	2	2,2	1,94	6,4	2,0	776,1	940,3	618,2
64	Les Moulins	103 213	153	1 445	362	7	1,4	1,76	5,5	5,1	707,6	867,9	574,7
65	Laval	330 393	1 094	3 983	2 133	13	3,1	1,60	5,8	3,8	635,7	841,5	502,3
66	C-U-de-Montréal	1 775 846	7 702	22 702	15 579	94	4,4	1,57	6,1	5,4	663,3	874,5	517,8
67	Roussillon	132 167	285	1 862	728	3	2,0	1,74	5,4	3,9	722,5	906,7	584,5
68	Les Jardins-de-Napierville	22 936	49	298	143	2	2,2	1,76	6,2	5,8	701,3	868,8	576,9
69	Le Haut-Saint-Laurent	22 007	76	268	220	3	3,1	1,75	6,0	6,3	746,1	861,5	637,8
70	Beauharnois-Salaberry	59 769	288	646	484	1	4,6	1,66	8,3	2,9	677,6	961,4	493,4
71	Vaudreuil-Soulanges	95 318	328	1 400	548	11	3,0	1,82	5,7	5,4	648,9	815,8	522,2
72	Deux-Montagnes	78 960	176	1 015	434	6	2,1	1,73	6,4	3,7	765,8	897,0	662,2
73	Thérèse-de-Blainville	119 240	197	1 771	492	8	1,8	1,84	5,0	3,4	678,6	942,4	517,1
74	Mirabel	22 689	68	414	120	3	2,6	1,97	4,4	5,8	818,5	1415,6	644,5
75	La Rivière-du-Nord	83 773	537	1 063	562	4	5,9	1,76	7,0	7,3	795,9	1024,4	627,2
76	Argenteuil	28 505	83	290	257	3	3,2	1,24	6,0	9,1	759,7	960,0	609,1
77	Les Pays-d'en-Haut	28 237	152	248	235	1	5,6	1,55	5,7	10,1	695,8	909,1	518,2
78	Les Laurentides	36 335	166	397	332	1	4,0	1,66	6,2	6,0	780,9	925,3	647,7
79	Antoine-Labelle	33 904	116	337	286	1	3,2	1,67	7,3	4,7	758,8	1022,6	535,8
80	Papineau	20 332	84	198	146	1	3,2	1,42	3,8	7,2	641,5	889,1	432,6
81	C-U-de-l'Outaouais	217 609	827	2 838	1 269	17	3,6	1,33	5,6	6,9	740,1	972,4	585,7
82	Les Collines-de-l'Outaouais	33 662	88	420	143	1	2,6	1,51	6,4	6,3	667,2	896,4	481,6
83	La Vallée-de-la-Gatineau	20 262	84	239	175	1	4,2	1,60	7,4	5,8	788,0	1037,7	585,9
84	Pontiac	15 576	104	155	148	1	6,2	1,26	3,4	10,6	641,1	924,5	394,0
85	Témiscamingue	18 027	63	224	142	2	3,2	1,53	4,6	6,4	729,3	917,3	557,2
86	Rouyn-Noranda	42 638	125	561	324	5	3,4	1,70	5,6	8,2	1018,6	1164,9	1010,4
87	Abitibi-Ouest	23 571	61	287	174	2	2,6	1,80	5,8	5,6	739,0	1289,2	519,8
88	Abitibi	25 280	89	352	156	2	2,9	1,87	6,1	3,8	740,0	959,1	551,6
89	Vallée-de-l'Or	44 389	117	578	304	2	2,8	1,78	5,4	4,6	766,1	1080,4	511,6
90	Le Haut-Saint-Maurice	16 293	45	222	124	1	2,4	1,97	5,4	3,1	909,9	2242,6	664,2
91	Le Domaine-du-Roy	33 860	90	381	229	3	2,7	1,74	6,5	6,7	723,5	980,3	531,2
92	Maria-Chapdelaine	28 045	81	298	192	1	3,1	1,72	5,2	4,3	748,1	1026,4	532,3
93	Lac-Saint-Jean-Est	52 401	180	559	375	2	3,3	1,63	5,9	4,1	769,5	983,7	601,3
94	Le Fjord-du-Saguenay	172 343	583	1 837	1 227	10	3,3	1,55	6,6	6,7	757,1	996,3	577,9
95	La Haute-Côte-Nord	13 439	29	141	107	3	2,3	1,45	7,6	8,9	752,5	948,9	576,7

Tableau 8.1 Certaines statistiques de l'état civil selon la division de recensement, Canada, 1996 et 1994 à 1996¹ - suite

Division de recensement (DR) ⁴		1996					Période de 1994 à 1996 ²						
		Nombre					Taux				TCM ³		
		Population ⁵	Mariages	Naissances	Décès d'enfants	Décès	TBN ⁶	ISF ⁷	FPN ⁸	TMI ⁹	Total	Hommes	Femmes
Québec, suite													
96	Manicouagan	36 271	73	432	171	2	2,2	1,52	8,1	8,3	750,4	983,3	568,1
97	Sept-Rivières - Caniapiscau	40 905	127	545	198	3	2,6	1,67	7,2	8,4	734,7	1032,6	495,5
98	Minganie - Basse-Côte-Nord	12 684	33	173	79	0	2,4	1,51	5,4	3,9	721,0	877,7	568,8
99	Nord-du-Québec	38 395	132	813	165	11	3,3	2,73	5,4	10,5	1019,4	1233,2	844,7
Ontario													
01	CU de Stormont Dundas et Glengarry	111 301	624	1 241	1 064	6	5,8	1,68	5,8	5,0	724,4	939,9	574,9
02	CU de Prescott et Russell	74 013	372	915	544	8	4,5	1,74	6,8	8,5	827,9	1011,2	672,8
06	MR d'Ottawa-Carleton	721 136	4 259	8 818	4 482	46	5,7	1,44	5,9	6,1	610,8	772,2	500,1
07	CU de Leeds et Grenville	96 284	649	1 041	996	8	6,4	1,63	6,1	6,7	800,9	994,5	649,1
09	Cité de Lanark	59 845	410	652	562	3	6,2	1,67	5,9	4,8	770,9	1027,3	594,4
10	Cité de Frontenac	136 365	898	1 522	1 154	10	6,5	1,49	6,2	5,6	707,8	919,1	558,5
11	Cité de Lennox et Addington	39 203	270	410	349	5	6,6	1,63	6,5	8,6	749,4	981,4	613,9
12	Cité de Hastings	118 744	826	1 478	1 160	14	6,3	1,68	6,1	9,0	751,3	976,2	587,0
13	Cité de Prince Edward	25 046	168	191	308	2	6,7	1,64	5,1	5,5	772,0	989,6	589,3
14	Cité de Northumberland	81 792	479	771	806	3	5,4	1,49	6,4	6,2	689,6	836,1	580,5
15	Cité de Peterborough	123 448	812	1 299	1 262	10	6,3	1,57	4,8	6,1	697,5	906,0	544,6
16	Cité de Victoria	67 926	358	712	628	6	4,8	1,54	5,4	5,4	617,1	743,6	498,8
18	MR de Durham	458 616	1 987	6 479	2 592	29	4,2	1,73	5,6	4,4	667,4	839,1	547,0
19	MR de York	592 445	3 201	7 400	2 676	25	5,2	1,53	5,5	4,3	568,0	674,9	486,5
20	MM de Toronto	2 385 421	16 673	33 782	17 586	216	7,2	1,62	7,0	6,3	605,9	773,6	476,8
21	MR de Peel	852 526	4 346	13 588	3 473	73	5,1	1,73	6,2	5,2	580,9	709,2	482,0
22	Cité de Dufferin	45 657	287	690	289	0	5,5	1,87	5,6	2,5	741,0	923,7	606,4
23	Cité de Wellington	171 395	957	2 297	1 215	18	5,6	1,63	4,6	5,9	642,2	828,2	512,5
24	MR de Halton	339 875	1 690	4 306	1 920	22	4,8	1,61	5,2	4,3	593,1	740,3	484,2
25	MR de Hamilton- Wentworth	467 799	3 004	5 855	3 907	26	6,2	1,61	6,3	6,9	700,9	882,2	564,4
26	MR de Niagara	403 504	2 919	4 516	3 702	23	6,8	1,56	5,2	5,8	696,0	876,7	561,3
28	MR de Haldimand- Norfolk	102 575	635	1 124	973	9	6,0	1,60	5,6	8,0	759,8	986,7	595,5
29	Cité de Brant	114 564	670	1 591	1 071	9	5,5	1,76	6,5	4,8	714,9	905,2	577,0
30	MR de Waterloo	405 435	2 545	5 749	2 713	20	5,9	1,67	5,0	4,9	653,5	846,8	520,1
31	Cité de Perth	72 106	493	935	631	4	6,7	1,85	4,3	3,4	667,2	884,7	519,7
32	Cité d'Oxford	97 142	615	1 319	854	8	6,4	1,85	5,4	6,5	690,2	897,3	553,7
34	Cité d'Elgin	79 159	493	1 017	748	11	5,9	1,73	6,6	7,2	714,2	938,2	554,2
36	Cité de Kent	109 650	772	1 403	1 119	11	6,7	1,73	6,2	6,3	805,1	1074,0	630,0
37	Cité d'Essex	350 329	2 257	4 584	2 935	20	6,3	1,69	5,7	4,8	714,0	928,6	560,6
38	Cité de Lambton	128 975	794	1 399	1 051	6	5,6	1,64	5,8	6,8	639,6	811,7	503,0
39	Cité de Middlesex	389 616	2 447	4 954	2 865	29	6,1	1,58	6,1	6,2	686,9	903,9	536,2
40	Cité de Huron	60 220	372	654	605	3	6,0	1,79	4,7	5,9	679,8	858,3	542,9
41	Cité de Bruce	65 680	400	726	646	4	6,1	1,88	4,8	6,6	808,1	1059,6	631,0
42	Cité de Grey	87 632	521	837	905	6	5,9	1,63	5,7	5,3	699,4	851,8	575,8
43	Cité de Simcoe	329 865	1 809	4 215	2 543	25	5,3	1,73	5,5	6,1	698,0	879,6	553,7
44	MD de Muskoka	50 463	465	487	507	6	8,4	1,65	5,3	10,6	738,3	953,5	569,2
46	Cité de Haliburton	15 321	101	98	155	0	6,3	1,70	7,1	5,1	648,7	776,4	538,4
47	Cité de Renfrew	96 224	638	1 194	883	6	6,1	1,71	4,6	5,7	703,5	907,7	551,5
48	District de Nipissing	84 832	579	920	801	7	6,4	1,52	5,6	4,4	791,6	1023,7	614,5
49	District de Parry Sound	39 906	282	394	439	4	6,4	1,70	5,0	7,3	719,9	957,2	530,6
51	District de Manitoulin	11 413	106	144	146	2	6,5	1,94	5,2	6,3	910,0	1234,4	647,5
52	District de Sudbury	25 457	134	268	181	2	4,7	1,67	6,1	9,8	815,6	1031,1	638,4

Tableau 8.1 Certaines statistiques de l'état civil selon la division de recensement, Canada, 1996 et 1994 à 1996¹ - suite

Division de recensement (DR) ⁴		1996					Période de 1994 à 1996 ²						
		Nombre					Taux				TCM ³		
		Population ⁵	Mariages	Naissances	Décès d'enfants	Décès	TBN ⁶	ISF ⁷	FPN ⁸	TMI ⁹	Total	Hommes	Femmes
Ontario, suite													
53	MR de Sudbury	164 049	1 002	1 782	1 243	14	6,0	1,38	6,1	7,7	768,8	993,2	603,4
54	District de Timiskaming	37 807	228	426	394	3	5,7	1,79	6,2	5,1	834,3	1036,5	691,9
56	District de Cochrane	93 240	501	1 149	710	2	5,4	1,68	5,6	4,1	808,3	1045,7	619,2
57	District d'Algoma	125 455	792	1 338	1 143	8	5,8	1,53	6,7	6,7	759,0	958,3	602,8
58	District de Thunder Bay	157 619	880	1 899	1 375	14	5,6	1,57	5,7	8,3	771,5	960,7	623,9
59	District de Rainy River	23 163	128	284	234	1	5,0	1,78	4,7	5,3	741,3	990,9	556,9
60	District de Kenora	63 335	360	1 134	503	9	5,5	2,21	4,7	10,2	830,6	1053,1	642,3
Manitoba													
01	Division n° 1	16 233	87	114	125	1	4,8	1,60	5,1	8,8	692,1	1011,9	498,5
02	Division n° 2	48 039	318	754	278	5	6,2	2,16	5,0	6,3	621,6	845,8	441,2
03	Division n° 3	40 485	279	610	364	6	6,5	2,27	3,6	10,7	589,4	711,0	489,7
04	Division n° 4	10 411	45	120	102	3	5,1	2,28	6,1	10,2	636,5	917,1	414,7
05	Division n° 5	14 766	86	157	192	1	5,6	1,92	5,2	8,4	690,3	884,0	521,8
06	Division n° 6	10 510	49	136	117	1	5,3	2,25	4,3	11,8	739,0	907,3	596,0
07	Division n° 7	57 219	370	718	542	2	6,2	1,73	4,6	4,5	634,4	788,2	521,5
08	Division n° 8	14 891	86	239	127	1	5,1	2,78	7,0	9,8	724,7	879,2	587,6
09	Division n° 9	23 195	128	345	231	3	5,6	2,04	4,5	9,6	744,2	938,4	604,5
10	Division n° 10	8 901	38	119	17	1	4,0	1,83	4,0	5,3	391,3	491,3	309,8
11	Division n° 11	620 064	3 663	8 221	5 226	53	6,0	1,71	5,9	6,0	665,4	858,0	533,9
12	Division n° 12	18 708	86	203	140	1	4,4	1,72	5,3	6,5	661,9	844,3	499,9
13	Division n° 13	39 422	224	438	411	5	5,0	1,63	5,1	7,4	853,1	1001,2	755,9
14	Division n° 14	17 054	99	194	100	0	5,6	1,87	4,5	5,2	544,5	650,8	444,3
15	Division n° 15	22 477	136	201	283	1	6,0	1,99	3,1	5,9	633,5	811,7	483,9
16	Division n° 16	10 690	49	144	143	2	4,8	2,43	4,3	16,7	742,7	1010,2	493,4
17	Division n° 17	23 975	114	254	321	1	5,0	1,95	5,6	3,8	677,0	879,5	518,3
18	Division n° 18	22 278	127	300	215	2	5,9	2,33	5,8	12,6	724,8	848,9	610,7
19	Division n° 19	14 722	63	408	74	3	4,2	4,22	5,5	7,7	927,6	1056,6	782,5
20	Division n° 20	11 446	86	137	136	1	6,5	2,07	4,3	7,2	717,2	941,1	530,9
21	Division n° 21	23 150	122	429	165	3	5,0	2,38	4,9	7,0	1043,6	1315,0	854,8
22	Division n° 22	35 584	170	1 004	141	7	4,9	3,17	4,8	9,1	1000,7	1359,8	798,6
23	Division n° 23	9 678	23	232	46	1	3,0	3,37	4,4	18,9	1124,2	1445,1	860,8
Saskatchewan													
01	Division n° 1	32 291	172	396	306	4	5,2	2,04	4,2	7,7	580,1	768,7	410,6
02	Division n° 2	23 121	119	240	304	4	4,8	1,80	4,9	8,2	621,3	820,6	454,8
03	Division n° 3	16 469	65	180	186	1	4,5	2,00	3,2	7,5	639,6	869,1	442,7
04	Division n° 4	12 313	59	144	127	0	4,9	1,99	5,7	2,3	639,0	889,7	489,3
05	Division n° 5	35 032	164	371	447	2	5,0	1,71	4,5	8,3	615,8	802,3	454,5
06	Division n° 6	220 602	1 236	2 787	1 674	26	5,6	1,69	5,2	9,6	629,4	851,2	475,1
07	Division n° 7	49 297	280	548	498	4	5,3	1,74	5,0	4,1	675,0	844,2	542,1
08	Division n° 8	31 643	169	349	312	2	5,5	1,76	4,2	7,1	610,1	771,8	472,4
09	Division n° 9	38 562	230	393	554	3	5,3	1,73	4,4	6,2	668,3	872,5	505,3
10	Division n° 10	20 770	102	213	237	1	4,3	1,91	3,7	4,6	617,4	761,6	479,2
11	Division n° 11	231 970	1 580	3 318	1 673	21	6,6	1,78	6,0	8,3	615,3	801,9	479,7
12	Division n° 12	24 454	110	278	213	2	4,5	1,91	5,7	10,8	605,1	736,5	488,1
13	Division n° 13	24 858	120	317	224	3	5,1	2,19	6,4	14,2	627,3	795,6	476,9
14	Division n° 14	40 799	232	459	461	3	5,1	2,12	4,5	6,7	670,3	844,3	515,8
15	Division n° 15	80 666	484	1 118	763	10	6,2	2,13	5,7	10,4	692,6	865,7	552,4
16	Division n° 16	37 758	220	576	367	6	5,7	2,23	5,5	10,3	661,1	803,1	533,5
17	Division n° 17	38 528	210	775	280	10	5,2	2,55	6,0	10,7	719,3	933,1	534,0
18	Division n° 18	31 104	118	838	136	10	4,2	3,54	4,6	10,0	998,8	1231,0	794,7

Tableau 8.1 Certaines statistiques de l'état civil selon la division de recensement, Canada, 1996 et 1994 à 1996¹ - suite

Division de recensement (DR) ⁴	1996					Période de 1994 à 1996 ²						
	Nombre					Taux				TCM ³		
	Population ⁵	Mariages	Naissances	Décès	d'enfants	TBN ⁶	ISF ⁷	FPN ⁸	TMI ⁹	Total	Hommes	Femmes
Alberta												
01 Division n° 1	62 330	424	804	479	5	6,7	1,78	5,3	5,7	626,9	780,9	499,5
02 Division n° 2	125 179	806	1 788	969	18	6,2	1,94	5,7	9,1	649,1	815,7	514,2
03 Division n° 3	37 764	454	595	320	0	12,1	2,46	5,4	5,4	732,5	899,6	592,9
04 Division n° 4	12 046	63	156	97	2	4,9	1,75	6,6	12,0	616,9	815,9	430,1
05 Division n° 5	43 565	265	637	344	6	6,1	2,21	5,3	9,5	693,9	849,7	560,9
06 Division n° 6	880 859	5 241	12 028	4 712	61	6,1	1,59	6,4	6,0	608,4	761,9	493,7
07 Division n° 7	41 169	228	568	367	1	5,9	2,08	4,6	6,9	684,2	889,9	504,3
08 Division n° 8	133 592	901	2 010	872	12	6,8	1,99	6,6	6,9	678,7	853,5	554,9
09 Division n° 9	18 196	119	272	111	3	6,2	2,10	5,6	12,4	668,5	843,2	523,5
10 Division n° 10	80 028	479	923	818	9	6,1	1,84	4,5	8,4	675,3	877,1	500,3
11 Division n° 11	898 888	5 439	12 003	5 209	71	6,1	1,67	6,0	7,0	630,0	799,8	499,1
12 Division n° 12	56 499	310	994	396	8	6,1	2,41	5,2	8,0	861,4	1124,3	652,7
13 Division n° 13	62 569	349	842	545	4	5,5	2,05	5,3	5,8	766,9	932,4	610,5
14 Division n° 14	27 452	177	403	135	1	6,0	2,01	5,1	7,3	775,1	1077,8	553,2
15 Division n° 15	30 800	1 071	408	153	1	36,5	1,58	3,8	5,6	767,5	946,8	660,1
16 Division n° 16	36 494	154	631	83	3	4,0	1,71	4,7	5,4	522,4	631,4	400,4
17 Division n° 17	54 709	285	1 282	252	18	5,2	3,06	5,2	9,0	779,9	928,1	634,6
18 Division n° 18	15 022	62	265	70	2	4,7	2,29	4,3	5,2	1276,6	2020,5	501,5
19 Division n° 19	79 665	456	1 202	445	11	6,2	1,94	5,1	7,9	723,1	925,4	544,7
Colombie-Britannique												
01 DR* d'East Kootenay	56 366	378	596	401	4	6,6	1,60	6,3	9,1	695,1	871,3	550,8
03 DR* de Central Kootenay	58 099	344	586	480	4	5,9	1,68	5,0	8,2	648,9	811,2	504,1
05 DR* de Kootenay Boundary	32 906	172	298	361	1	5,0	1,51	5,6	4,3	724,5	940,9	558,1
07 DR* d'Okanagan-Similkameen	75 933	485	723	919	8	6,1	1,73	5,7	7,5	624,3	770,0	503,7
09 DR* de Fraser Valley	222 397	1 296	3 250	1 774	9	5,8	2,05	5,0	5,0	652,2	774,6	543,0
15 DR* de Greater Vancouver	1 831 665	10 860	23 299	12 650	112	6,2	1,49	5,4	5,7	609,6	781,0	475,4
17 DR* de Capital	317 989	2 214	3 098	3 190	13	7,0	1,34	4,8	4,7	602,3	750,0	492,5
19 DR* de Cowichan Valley	70 978	453	894	558	6	6,4	1,85	5,9	8,2	644,1	828,7	492,0
21 DR* de Nanaimo	121 783	713	1 301	1 081	7	5,9	1,58	5,3	6,5	661,5	840,9	529,4
23 DR* d'Alberni-Clayoquot	31 652	258	406	242	3	7,5	1,87	4,3	6,3	794,9	975,8	640,9
25 DR* de Comox-Strathcona	97 666	600	1 131	681	4	6,1	1,65	4,6	5,0	668,1	829,5	532,9
27 DR* de Powell River	19 936	114	195	174	4	5,4	1,69	3,2	7,6	644,6	782,5	526,8
29 DR* de Sunshine Coast	24 914	149	276	252	2	5,9	1,85	4,2	7,5	664,3	908,8	500,3
31 DR* de Squamish-Lillooet	29 401	342	472	144	2	9,9	1,63	5,6	2,9	750,5	964,2	607,3
33 DR* de Thompson-Nicola	118 801	712	1 417	804	9	6,1	1,62	5,3	4,9	717,9	918,3	550,9
35 DR* de Central Okanagan	136 541	878	1 467	1 067	7	6,1	1,65	5,5	5,0	553,7	707,9	424,1
37 DR* de North Okanagan	71 607	452	793	627	5	6,1	1,69	3,4	5,0	634,5	782,0	513,2
39 DR* de Columbia-Shuswap	48 116	345	480	342	1	6,9	1,60	5,5	6,1	654,1	775,3	543,1
41 DR* de Cariboo	66 475	413	911	416	5	6,1	1,89	5,3	4,8	691,3	864,8	556,8
43 DR* de Mount Waddington	14 601	63	235	57	2	4,5	1,93	6,0	14,8	817,2	773,2	860,5
45 DR* de Central Coast	3 921	22	56	21	1	4,9	2,18	6,4	16,0	936,8	1239,8	687,8
47 DR* de Skeena-Queen Charlotte	24 795	112	393	119	3	4,9	2,09	4,9	5,4	781,2	1033,9	600,5
49 DR* de Kitimat-Stikine	43 618	230	710	179	2	4,9	1,91	4,9	5,9	721,6	911,3	603,9
51 DR* de Bulkley-Nechako	41 642	226	712	196	1	5,5	2,13	3,6	6,7	739,4	931,5	566,5
53 DR* de Fraser-Fort George	98 974	621	1 380	493	15	6,3	1,70	5,4	7,3	778,0	983,6	600,8
55 DR* de Peace River	56 477	341	900	274	4	6,2	2,02	4,4	4,7	716,2	832,4	598,9
57 Région Stikine	1 391	7	25	8	0	5,3	1,69	3,2	0,0	519,1	676,0	379,1
59 DR* de Fort Nelson-Liard	5 856	34	132	20	3	5,7	2,42	7,6	20,3	1024,5	1601,5	1189,7
Yukon												
01 Yukon	30 766	197	443	120	0	6,3	1,76	4,8	5,2	978,1	1389,4	631,8

Tableau 8.1 Certaines statistiques de l'état civil selon la division de recensement, Canada, 1996 et 1994 à 1996¹ - fin

Division de recensement (DR) ⁴		1996					Période de 1994 à 1996 ²						
		Nombre					Taux				TCM ³		
		Population ⁵	Mariages	Naissances	Décès	d'enfants	TBN ⁶	ISF ⁷	FPN ⁸	TMI ⁹	Total	Hommes	Femmes
Territoires du Nord-Ouest													
04	Région de Baffin	13 218	24	370	65	7	2,3	3,35	9,2	15,6	1515,6	1729,0	1353,5
05	Région du Keewatin	6 868	36	243	33	4	3,4	3,63	7,7	24,0	944,0	879,5	978,2
06	Région de Fort Smith	30 225	117	584	109	0	3,9	2,12	5,0	5,5	941,1	1147,2	751,5
07	Région d'Inuvik	9 024	23	219	41	3	3,7	2,82	4,2	15,7	849,0	1041,8	683,7
08	Région du Kitikmeot	5 067	6	145	23	4	1,9	3,13	5,7	17,3	783,9	1055,0	535,7

¹ Les données relatives aux mariages, naissances et décès excluent les cas où la DR de célébration (dans le cas des mariages) ou de résidence (naissances et décès) est inconnue.

² Les taux sont calculés à l'aide d'une moyenne sur trois ans au numérateur et de l'estimation de la population de 1995 au dénominateur.

³ Le taux comparatif de mortalité (TCM) est le nombre de décès pour 100 000 habitants (d'après la population de 1995).

⁴ Les abréviations de ce tableau sont reprises entre parenthèses : Division de recensement (DR), Comté (Cté), Communauté urbaine (C-U), Comtés unis (CU), Municipalité métropolitaine (MM), Municipalité régionale (MR), Municipalité de district (MD), District régional (DR*).

⁵ D'après les chiffres non corrigés du Recensement de la population de 1996.


⁶ Le taux brut de nuptialité (TBN) est le nombre de mariages pour 1 000 habitants.

⁷ L'indice synthétique de fécondité (ISF) est le nombre moyen d'enfants nés vivants qu'une femme peut s'attendre à avoir au cours de sa vie.


⁸ Le taux de faible poids à la naissance (FPN) est le pourcentage des enfants nés vivants qui pèsent moins de 2 500 grammes.

⁹ Le taux de mortalité infantile (TMI) est le nombre de décès infantiles pour 1 000 naissances vivantes.

Carte 8.7
Divisions de recensement de 1996,
Canada




Carte 8.8 - Divisions de recensement de 1996, Ouest canadien (cartouche 1)



Source : Fichiers numériques cartographiques de la Division de la géographie, Statistique Canada

Carte 8.9 - Divisions de recensement de 1996, centre et est du Canada
(cartouches 2 à 4)



9. Comparaisons internationales

FAITS SAILLANTS

Nuptialité

- Depuis 1970, le taux brut de nuptialité a diminué dans la plupart des pays industrialisés (passant, au Canada, de 8,8 mariages pour 1 000 personnes à 5,2 en 1996). Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de ce recul, y compris la prévalence accrue de l'union de fait, l'accès répandu aux méthodes de contraception, l'indépendance financière croissante des femmes et, dans un grand nombre de pays, le vieillissement de la population.
- Ces dernières années, les taux de nuptialité enregistrés au Canada ont été nettement plus faibles que ceux déclarés par les États-Unis, la Turquie, la Corée et le Mexique. En 1996, les taux bruts les plus faibles pour les pays de l'OCDE ont été enregistrés en Suède (3,8 seulement), en Grèce, en Irlande et en Italie.
- En ce qui concerne le taux brut de nuptialité, la position relative du Canada parmi les 29 pays de l'OCDE a fluctué considérablement au cours des ans, comme l'illustre le tableau 9.1. En 1980, le Canada était le quatrième pays de l'OCDE par ordre décroissant de taux de nuptialité. En 1993, il occupait la dix-septième place. Depuis, le classement du Canada parmi les pays de l'OCDE a grimpé (onzième position en 1996).

Fécondité

- L'indice synthétique de fécondité (ISF) correspond au nombre moyen de naissances vivantes par femme au cours de la vie, selon les taux courants de fécondité par âge. En 1996, tous les pays membres de l'OCDE énumérés au tableau 9.2, sauf le Mexique, l'Islande, et peut-être la Turquie, avaient un indice synthétique de fécondité inférieur au seuil de renouvellement de la population. (Dans les pays développés, on estime que la natalité compense la mortalité quand l'ISF est approximativement égal à 2,1.) Ce recul tient vraisemblablement aux transformations socioéconomiques qui ont eu lieu ces dernières décennies, y compris l'accès de plus en plus répandu aux méthodes de contraception, l'amélioration de la condition féminine et le retardement de la maternité.
- En 1996, l'indice synthétique de fécondité d'au moins 13 pays de l'OCDE excédait le taux enregistré au Canada (1,59). Des 29 pays de l'OCDE, l'Espagne (1,15), la République tchèque, l'Italie, l'Allemagne et la Grèce sont ceux auxquels on associait les taux de fécondité les plus faibles.

Mortalité infantile

- Bien que la mortalité infantile ait diminué spectaculairement dans les pays de l'OCDE depuis 1970, le taux de mortalité infantile demeure assez élevé en Turquie (42,2 décès pour 1 000 naissances vivantes en 1996), au Mexique, en Pologne, en

Hongrie et en Corée. En 1996, c'est en Islande (3,7), au Japon et dans les pays scandinaves que l'on a observé les taux les plus faibles (tableau 9.3).

- De 1970 à 1996, au Canada, le taux de mortalité infantile a baissé de 70 %, passant de 18,8 décès pour 1 000 naissances vivantes à 5,6 décès. Toutefois, la position relative du Canada parmi les pays de l'OCDE s'est détériorée depuis 1990. Cette année-là, le Canada occupait la cinquième place, en commençant par le taux le plus faible (le Japon, l'Islande et deux pays scandinaves avaient les plus faibles taux); en 1996, le Canada occupait la quinzième place (derrière le Japon et 13 pays européens).

Espérance de vie

- L'espérance de vie à la naissance continue d'augmenter dans la plupart des pays de l'OCDE. La diminution du taux de mortalité infantile et celle de la mortalité due à des maladies diagnostiquées principalement chez les hommes et les femmes âgés (comme les cardiopathies, les maladies cérébrovasculaires et certaines formes de cancer) sont deux facteurs qui ont contribué à l'augmentation de l'espérance de vie.
- Au Canada, de 1971 à 1996, l'espérance de vie des hommes à la naissance a augmenté de 6,3 ans et celle des femmes de 4,9 ans (tableau 9.4). Si l'espérance de vie des femmes est demeurée supérieure à celle des hommes pendant toute la période, l'écart entre les deux sexes a néanmoins diminué, passant de 7,4 ans en 1976 à 5,7 ans en 1996. Nombre de pays de l'OCDE connaissent une tendance similaire.
- En 1996, l'espérance de vie des hommes au Canada (75,7 ans) n'était inférieure qu'à celle des hommes vivant au Japon (77,0 ans), en Suède et en Islande; de même, l'espérance de vie des Canadiennes (81,4 ans) n'était inférieure qu'à celle des femmes vivant au Japon (83,6), en France, en Suisse, en Espagne et en Suède.
- Parmi les hommes, ce sont les Turcs, les Hongrois et les Polonais qui ont l'espérance de vie à la naissance la plus faible (variant de 65,9 à 67,8 ans) et parmi les femmes, ce sont les Turques, les Hongroises et les Mexicaines (de 70,5 à 76,5 ans).

Taux comparatif de mortalité

- Parmi les taux comparatifs de mortalité (TCM), toutes causes confondues, enregistrés pour les 28 pays de l'OCDE énumérés au tableau 9.5, celui du Canada était le quatrième, en commençant par le plus faible, pour les hommes (549,5 décès pour 100 000 hommes en 1995) et le septième, en commençant par le plus faible, pour les femmes (330,3 pour 100 000 femmes). Comparativement, les TCM enregistrés pour les hommes dans d'autres pays varient d'un minimum de 480,8 pour 100 000 en Islande (données de 1994) à un maximum de 1 136,1 en Hongrie (1995), tandis que pour les femmes, ils varient de 265,3 pour 100 000 au Japon (1994) à 588,8 en Hongrie. (Tous les taux mentionnés dans la présente section sont normalisés pour l'âge en prenant pour référence la population mondiale type.)

- Le tableau diffère quelque peu si l'on examine des causes de décès particulières. Par exemple, le taux comparatif de mortalité due au cancer de la trachée, des bronches et des poumons observé chez les Canadiennes est le troisième, par ordre décroissant, enregistré pour les pays de l'OCDE (22,6 pour 100 000), étant inférieur uniquement à ceux observés au Danemark (28,1 pour 100 000 en 1995) et aux États-Unis (26,4 en 1994). Ces chiffres sont un contraste marqué avec ceux enregistrés pour les femmes espagnoles (3,8 décès pour 100 000 en 1994). Chez les hommes, le taux de mortalité due à cette forme de cancer enregistré au Canada (48,9 décès pour 100 000) se situe au milieu de la fourchette observée pour les pays de l'OCDE.
- En ce qui concerne les maladies de l'appareil circulatoire, les TCM enregistrés au Canada comptent parmi les plus faibles pour les pays de l'OCDE, pour les hommes ainsi que pour les femmes. Le taux enregistré au Japon pour les hommes est certes le plus faible (139,9 pour 100 000), mais celui observé au Canada vient en quatrième position (185,7 décès pour 100 000 hommes). Ce sont les Hongrois qui ont le taux le plus élevé (483,4 pour 100 000). De façon comparable, le TCM observé pour les Canadiennes était le troisième, en commençant par le plus faible (106,5 pour 100 000), tandis que celui observé pour les Hongroises était le plus élevé (285,4); toutefois, ce sont les Françaises qui ont le taux le plus bas, soit 79,1 pour 100 000 (en 1994).
- Les taux comparatifs de suicide sont significativement plus élevés pour les hommes que pour les femmes dans tous les pays de l'OCDE; de surcroît, leur variabilité est plus forte chez l'homme que chez la femme. Chez l'homme, le taux varie d'un minimum de 4,6 pour 100 000 en Grèce (en 1995) à un maximum de 39,7 pour 100 000 en Hongrie. À 18,6, le taux observé pour les Canadiens se situe au milieu de la fourchette. Par contre, chez la femme, le taux de suicide est aussi faible que 0,9 pour 100 000 au Mexique (1995) et en Grèce et n'excède pas la valeur de 10,8 enregistrée en Hongrie. À 4,7, le taux observé pour les Canadiennes se situe au milieu de la fourchette pour les pays de l'OCDE. Il est intéressant de souligner que les taux de suicide observés au Canada, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, sont fort semblables à ceux enregistrés en Australie (en 1994) et en Nouvelle-Zélande (en 1993).

Tableau 9.1 Taux bruts de nuptialité dans les pays membres de l'OCDE¹, certaines années, 1970 à 1996

Pays	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Nombre de mariages pour 1 000 habitants											
Canada	8,8	8,5	7,8	7,1	6,8	6,1	5,8	5,5	5,5	5,4	5,2
Australie	9,3	7,5	7,4	7,2	6,9	6,6	6,6	6,4	6,2	6,1	5,8
Autriche	..	6,1	6,1	5,9	5,9	5,6	5,8	5,6	5,4	5,3	5,2
Belgique	7,6	7,3	6,7	5,8	6,5	6,1	5,8	5,4	5,1	5,1	5,0
République tchèque	..	..	..	..	..	7,0	7,2	6,4	5,7	5,3	5,2
Danemark	7,4	6,3	5,2	5,7	6,1	6,0	6,2	6,1	6,8	6,6	6,8
Finlande	8,8	6,7	6,1	5,3	5,0	4,7	4,6	4,9	4,9	4,6	4,8
France	7,8	7,3	6,2	4,9	5,1	4,9	4,7	4,4	4,4	4,4	4,8
Allemagne	7,3	6,3	5,9	6,0	6,5	5,7	5,6	5,5	5,4	5,3	5,2
Grèce	7,7	8,4	6,5	6,4	5,9	6,4	4,7	6,0	5,4	6,1	4,5
Hongrie	9,3	9,9	7,5	6,9	6,4	5,9	5,5	5,3	5,3	5,2	4,9
Islande	..	7,7	5,7	5,2	4,5	4,8	4,8	..	4,6	4,6	5,0
Irlande	7,1	6,7	6,4	5,3	5,1	4,9	4,7	4,7	4,5	4,3	4,6
Italie	7,4	6,7	5,7	5,2	5,4	5,5	5,5	5,3	5,0	4,9	4,7
Japon	10,0	8,4	6,6	6,1	5,8	6,0	6,1	6,4	6,3	6,3	6,3
Corée	..	8,0	9,7	9,1	8,9	9,3	9,4	8,6	8,2	7,1	..
Luxembourg	..	6,8	5,9	5,3	6,1	6,7	6,4	6,0	5,8	5,1	5,1
Mexique	7,0	7,8	7,2	7,3	7,5	7,4	7,5	7,2	7,2	7,3	7,7
Pays-Bas	9,5	7,3	6,4	5,7	6,4	6,3	6,2	5,8	5,4	5,3	5,4
Nouvelle-Zélande	9,2	8,0	7,4	7,6	6,9	6,8	6,4	6,4	6,3	..	5,8
Norvège	7,6	6,5	5,4	4,9	5,2	4,7	4,5	4,5	4,6	..	..
Pologne	8,6	9,7	8,6	7,2	6,7	6,1	5,7	5,4	5,4	5,4	5,3
Portugal	..	11,3	7,4	6,7	7,3	7,3	7,1	6,9	..	6,6	6,5
Espagne	7,4	7,6	6,8	5,0	5,6	5,6	5,6	5,2	5,0	5,0	5,0
Suède	5,4	5,4	4,5	4,6	4,7	4,3	4,3	3,9	3,9	3,8	3,8
Suisse	7,4	5,5	5,7	6,0	6,9	7,0	6,6	6,2	6,1	5,8	5,7
Turquie	..	3,4	3,7	7,3	8,2	8,0	7,5	7,7	7,6	7,5	..
Royaume-Uni	..	7,7	7,4	6,9	6,5	6,0	6,1	5,9	5,7	5,7	..
États-Unis	10,5	10,0	10,5	10,1	9,8	9,4	9,2	9,0	9,1	8,9	8,8

¹ Organisation de coopération et de développement économiques.

Sources : Nations Unies : Annuaire démographique, 1990, 1993, 1995 et 1996; Statistique Canada : n° 91-209 au catalogue, 1997, et n° 84-212 au catalogue, 1995.




Tableau 9.2 Indices synthétiques de fécondité dans les pays membres de l'OCDE¹, certaines années, 1970 à 1996

Pays	1970	1975	1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Nombre moyen de naissances vivantes par femme au cours de la vie											
Canada	2,33	1,81	1,68	1,61	1,71	1,70	1,69	1,66	1,66	1,64	1,59
Australie	2,86	2,22	1,90	1,89	1,91	1,86	1,90	1,87	1,85	1,82	1,79
Autriche	2,29	1,83	1,65	1,47	1,45	1,50	1,51	1,51	1,44	1,39	1,42
Belgique	2,25	1,74	1,67	1,51	1,62	1,57	1,56	1,61	1,55	1,57	1,59
République tchèque	1,93	2,43	2,07	1,95	1,89	1,86	1,72	1,67	1,44	1,28	1,18
Danemark	1,95	1,92	1,55	1,45	1,67	1,68	1,76	1,75	1,81	1,79	1,75
Finlande	1,83	1,69	1,63	1,64	1,79	1,79	1,85	1,81	1,85	1,84	1,76
France	2,47	1,93	1,95	1,82	1,80	1,77	1,73	1,65	1,65	1,66	1,72
Allemagne	2,02	1,45	1,44	1,28	1,45	1,33	1,29	1,28	1,24	1,25	1,29
Grèce	2,43	2,28	2,23	1,68	1,43	1,38	1,39	1,34	1,36	1,32	1,31
Hongrie	2,00	2,40	1,90	1,80	1,80	1,90	1,80	1,70	1,64	1,57	1,46
Islande	2,81	2,65	2,48	1,93	2,31	2,19	2,21	2,22	2,14	2,08	2,09
Irlande	4,03	3,53	3,23	2,50	2,12	2,08	1,99	1,92	1,86	1,87	1,91
Italie	2,43	2,21	1,69	1,41	1,31	1,30	1,26	1,21	1,19	1,22	1,22
Japon	2,13	1,91	1,75	1,76	1,54	1,53	1,50	1,46	1,45	1,43	1,43
Corée	4,50	3,40	2,80	1,70	1,60	1,70	1,80	1,70	1,70	1,70	..
Luxembourg	1,97	1,52	1,50	1,38	1,62	1,64	1,65	1,70	1,72	1,71	1,76
Mexique	6,63	5,84	4,80	3,95	3,31	3,20	3,08	2,99	2,90	2,81	2,73
Pays-Bas	2,57	1,66	1,59	1,51	1,62	1,61	1,59	1,57	1,56	1,58	1,52
Nouvelle-Zélande	3,17	2,37	2,03	1,93	2,18	2,16	2,12	2,10	2,04	2,03	..
Norvège	2,50	1,98	1,72	1,68	1,93	1,92	1,88	1,86	1,87	1,85	1,89
Pologne	2,20	2,27	2,28	2,33	2,04	2,05	1,93	1,85	1,80	1,61	1,60
Portugal	2,76	2,52	2,19	1,70	1,43	1,42	1,48	1,53	1,44	1,45	1,40
Espagne	2,84	2,79	2,22	1,63	1,36	1,28	1,23	1,24	1,22	1,24	1,15
Suède	1,94	1,78	1,68	1,73	2,14	2,12	2,09	2,00	1,89	1,74	1,61
Suisse	2,10	1,61	1,55	1,52	1,59	1,58	1,58	1,51	1,49	1,48	1,50
Turquie	5,05	4,53	4,22	3,93	3,64	3,58	3,50	2,70	2,69	..	..
Royaume-Uni	2,43	1,81	1,89	1,80	1,84	1,82	1,79	1,82	1,75	1,73	1,70
États-Unis	2,48	1,77	1,84	1,84	1,90	1,80	2,01	2,00	2,00	2,03	2,00

¹ Organisation de coopération et de développement économiques.

Sources : OCDE : Données sur la santé, 1998; Statistique Canada : n° 91-209 au catalogue, 1997, et n° 84-210 au catalogue, 1995 ; Institut national d'études démographiques (INSE) : Population, n° 5, 1997.




Tableau 9.3 Taux de mortalité infantile dans les pays membres de l'OCDE¹, certaines années, 1970 à 1996

Pays	1970	1975	1980 ²	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Nombre de décès pour 1 000 naissances vivantes											
Canada	18,8	13,6	10,4	7,9	6,8	6,4	6,1	6,3	6,3	6,1	5,6
Australie	17,9	14,3	10,7	9,9	8,2	7,1	7,0	6,1	5,9	5,7	5,8
Autriche	25,9	20,5	14,3	11,2	7,8	7,5	7,5	6,5	6,3	5,4	5,1
Belgique	21,1	16,1	12,1	9,8	8,0	8,4	8,2	8,0	7,6	7,0	6,0
République tchèque	20,2	19,4	16,9	12,5	10,8	10,4	9,9	8,5	7,9	7,7	6,0
Danemark	14,2	10,4	8,4	7,9	7,5	7,3	6,6	5,4	5,5	5,4	5,2
Finlande	13,2	10,0	7,6	6,3	5,6	5,8	5,2	4,4	4,6	4,0	4,0
France	18,2	13,8	10,0	8,3	7,3	7,3	6,8	6,5	5,9	4,9	4,9
Allemagne	23,6	19,8	12,6	8,9	7,0	6,9	6,2	5,8	5,6	5,3	5,0
Grèce	29,6	24,0	17,9	14,1	9,7	9,0	8,4	8,5	7,9	8,2	7,3
Hongrie	36,0	33,0	23,0	20,0	15,0	16,0	14,0	13,0	12,0	11,0	10,6
Islande	13,2	12,5	7,7	4,9	5,9	5,5	4,8	4,8	3,4	6,1	3,7
Irlande	19,5	17,5	11,1	8,9	8,2	8,2	6,6	5,9	5,9	6,3	5,5
Italie	29,6	21,2	14,6	10,5	8,2	8,1	7,9	7,3	6,6	6,2	5,8
Japon	13,1	10,0	7,5	5,5	4,6	4,4	4,5	4,3	4,2	4,3	3,8
Corée	45,0	..	17,0	13,0	13,0	10,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Luxembourg	24,9	14,8	11,5	9,0	7,4	9,2	8,5	6,0	5,3	5,0	4,9
Mexique	68,0	49,0	40,0	28,0	24,0	21,0	19,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Pays-Bas	12,7	10,6	8,6	8,0	7,1	6,5	6,3	6,3	5,7	5,5	5,2
Nouvelle-Zélande	16,8	15,9	12,9	10,8	8,4	8,3	7,3	7,3	7,2	7,0	7,4
Norvège	12,7	11,1	8,1	8,5	7,0	6,4	5,9	5,1	5,2	4,0	4,0
Pologne	..	..	25,5	..	19,3	18,2	17,3	16,1	15,1	13,6	12,3
Portugal	55,1	38,9	24,3	17,8	11,0	10,8	9,3	8,7	7,9	7,4	6,9
Espagne	26,3	18,8	12,3	8,9	7,6	7,2	7,1	6,8	6,0	5,5	5,0
Suède	11,0	8,6	6,9	6,8	6,0	6,1	5,3	4,8	4,4	4,1	4,0
Suisse	15,1	10,7	9,1	6,9	6,8	6,2	6,4	5,6	5,1	5,0	4,7
Turquie	151,0	128,6	95,3	75,3	59,3	56,5	54,0	52,6	46,8	44,4	42,2
Royaume-Uni	18,5	16,0	12,1	9,4	7,9	7,4	6,6	6,3	6,2	6,0	6,1
États-Unis	20,0	16,1	12,6	10,6	9,2	8,9	8,5	8,4	8,0	8,0	7,8

¹ Organisation de coopération et de développement économiques.

² Données de 1981 pour la Corée.

Sources : OCDE : Données sur la santé, 1998; Statistique Canada : n° 84-210 au catalogue, 1995.




Tableau 9.4 Espérance de vie à la naissance dans les pays membres de l'OCDE¹, selon le sexe, certaines années, 1971 à 1996

Pays	1971 ²		1976 ³		1981 ⁴		1986 ⁵		1991 ⁶		1996 ⁷	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
Années												
Canada ⁸	69,4	76,5	70,3	77,7	71,9	79,1	73,3	80,0	74,6	80,9	75,7	81,4
Australie	68,3	74,9	69,3	76,3	71,4	78,4	72,9	79,2	74,4	80,4	75,2	81,1
Autriche	66,6	73,7	68,2	75,0	69,3	76,4	71,0	77,7	72,4	79,1	73,9	80,2
Belgique	67,8	74,2	68,7	75,5	70,0	76,8	70,9	77,7	72,8	79,5	74,3	81,0
République tchèque	66,2	73,3	67,1	74,1	67,2	74,3	67,5	74,6	68,2	75,7	70,5	77,2
Danemark	70,7	76,1	71,2	77,1	71,4	77,4	71,6	77,5	72,2	77,7	72,8	78,0
Finlande	65,9	74,2	67,5	76,1	69,5	77,8	70,5	78,7	71,4	79,3	73,0	80,5
France	68,3	75,9	69,2	77,2	70,4	78,5	71,5	79,7	72,9	81,1	74,1	82,0
Allemagne	67,4	73,8	68,6	75,1	70,2	76,8	71,8	78,3	72,2	78,7	73,6	79,9
Grèce	70,1	73,6	..	..	72,2	76,6	74,1	78,7	74,6	79,7	75,1	80,4
Hongrie	66,1	72,0	66,6	72,5	65,5	72,9	65,3	73,2	65,0	73,8	66,6	74,7
Islande	..	..	73,0	79,2	73,9	79,4	75,0	80,4	75,1	80,8	76,2	80,6
Irlande	68,5	73,2	68,1	74,9	70,1	75,6	70,8	76,4	72,2	77,7	73,2	78,5
Italie	69,0	74,9	69,6	76,0	70,9	77,6	72,3	78,7	73,6	80,2	74,9	81,3
Japon	70,2	75,6	72,2	77,4	73,8	79,1	75,2	80,9	76,1	82,1	77,0	83,6
Corée	59,8	66,7	62,7	69,1	63,8	72,2	66,0	74,1	67,7	75,7	69,5	77,4
Luxembourg	67,0	73,9	68,0	75,1	70,0	76,7	70,6	77,9	72,0	79,1	73,0	80,0
Mexique	59,3	64,2	60,7	66,8	63,1	70,2	66,4	72,8	68,4	74,7	70,1	76,5
Pays-Bas	71,0	76,7	71,5	78,0	72,7	79,3	73,1	79,6	74,1	80,2	74,7	80,4
Nouvelle-Zélande	68,6	74,6	69,0	75,4	70,4	76,4	71,1	77,1	72,9	78,7	74,3	79,8
Norvège	71,2	77,4	72,0	78,2	72,6	79,3	72,9	79,8	74,0	80,1	75,4	81,1
Pologne	66,1	73,3	66,9	74,6	67,1	75,2	66,8	75,1	66,1	75,3	67,8	76,8
Portugal	65,3	71,0	65,4	73,0	68,9	76,6	70,2	77,1	69,8	77,3	71,2	78,5
Espagne	69,6	75,1	70,4	76,2	72,5	78,6	73,3	79,7	73,4	80,6	74,4	81,6
Suède	72,0	77,3	72,1	77,9	73,1	79,1	74,0	80,0	74,9	80,5	76,5	81,5
Suisse	70,1	76,6	71,6	78,1	72,4	79,0	73,6	80,3	74,1	80,9	75,7	81,9
Turquie	55,8	59,9	58,2	64,3	60,7	65,4	63,2	68,1	64,1	68,4	65,9	70,5
Royaume-Uni	68,8	75,0	70,0	75,5	70,8	76,8	71,9	77,6	73,2	78,7	74,4	79,3
États-Unis	67,4	75,0	69,1	76,8	70,4	77,8	71,2	78,2	72,0	78,9	72,7	79,4

¹ Organisation de coopération et de développement économiques.

² Espérance de vie en 1970 pour la Grèce, l'Irlande, la Corée, le Portugal et l'Espagne, et en 1973 pour la Turquie.

³ Espérance de vie en 1975 pour la Grèce et l'Espagne, en 1974 pour les femmes au Royaume-Uni, en 1978 pour l'Irlande et la Turquie et en 1979 pour la Corée.

⁴ Espérance de vie en 1980 pour l'Espagne et en 1983 pour la Corée et la Turquie.

⁵ Espérance de vie en 1985 pour l'Espagne, en 1987 pour les hommes en Grèce et en Corée et en 1988 pour la Turquie.

⁶ Espérance de vie en 1990 pour la Turquie.

⁷ Espérance de vie en 1995 pour la Corée.

⁸ Les estimations pour 1996 se fondent sur une année de données seulement.

Sources : OCDE : Données sur la santé, 1998; Statistique Canada : n° 84-210 au catalogue, 1995; données du R-U : <http://www.statistics.gov/stats/ukinfigs/pop.htm>.





Tableau 9.5 Taux comparatifs de mortalité dans les pays membres de l'OCDE¹, selon le sexe, certaines causes, 1992 à 1995

Pays (année)	Toutes les causes		Tous les cancers		Cancer de la trachée, des bronches et du poumon		Maladies de l'appareil circulatoire	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
Taux comparatifs de mortalité (décès pour 100 000 habitants) ²								
Canada (1995)	549,5	330,3	154,9	104,9	48,9	22,6	185,7	106,5
Australie (1994)	564,7	337,0	161,3	99,3	40,2	13,6	212,8	130,0
Autriche (1995)	638,6	363,9	162,2	102,0	40,8	9,6	278,5	171,0
Belgique (1992)	670,5	373,1	196,5	105,0	71,5	9,2	208,0	121,8
République tchèque (1995) ³	877,7	501,2	229,7	127,9	69,7	11,6	433,1	262,0
Danemark (1995) ³	692,9	451,7	178,7	142,5	49,7	28,1	245,3	142,1
Finlande (1995)	680,4	356,5	141,8	86,5	41,3	7,0	292,4	151,0
France (1994)	586,3	291,1	189,3	84,9	46,3	5,8	144,7	79,1
Allemagne (1995)	657,7	373,5	171,9	104,3	46,6	9,2	266,4	157,4
Grèce (1995)	555,6	352,5	147,2	77,4	49,4	7,2	229,6	169,7
Hongrie (1995)	1136,1	588,8	266,4	139,1	83,7	18,9	483,4	285,4
Islande (1994)	480,8	328,1	..	..	..	..	..	..
Irlande (1993)	724,6	442,2	177,5	120,7	47,2	17,5	316,0	178,5
Italie (1993)	591,7	337,0	182,7	96,4	55,3	7,7	208,6	132,3
Japon (1994)	492,7	265,3	149,0	74,1	31,2	8,4	139,9	88,2
Corée (1995) ³	811,9	420,1	189,9	76,0	40,0	9,1	199,0	129,1
Luxembourg (1995)	644,2	339,3	194,8	96,2	58,1	9,0	225,7	127,3
Mexique (1995)	795,9	554,3	85,4	78,9	16,2	5,9	191,7	159,7
Pays-Bas (1995)	605,6	354,8	181,0	106,8	61,2	13,8	216,8	118,3
Nouvelle-Zélande (1993)	637,7	405,8	170,3	122,3	40,0	17,7	258,0	156,1
Norvège (1994)	583,9	345,5	148,0	104,1	32,0	13,5	235,7	124,8
Pologne (1995)	963,8	508,5	206,3	108,0	72,2	11,3	428,2	245,9
Portugal (1995)	751,1	421,8	154,8	84,7	28,7	4,8	247,0	170,0
Espagne (1994)	589,0	313,4	172,9	80,3	48,5	3,8	176,5	115,4
Suède (1995)	521,8	317,5	123,0	95,8	22,4	12,2	233,7	123,8
Suisse (1994)	552,1	307,1	160,2	92,7	40,3	9,7	190,4	110,1
Turquie	..	..	..	..	..	..	..	..
Royaume Uni (1995)	626,2	395,5	166,8	117,5	47,7	20,6	253,2	144,0
États-Unis (1994)	669,4	402,5	160,6	109,9	54,2	26,4	241,2	144,7

¹ Organisation de coopération et de développement économiques.

² Les taux comparatifs de mortalité (TCM) sont calculés en prenant pour référence la répartition par âge de la population mondiale.

³ Le codage des causes de décès se fonde sur la Classification statistique internationale des maladies et problèmes de santé connexes, dixième révision (CIM-10).

Sources : Organisation mondiale de la santé : Statistiques sanitaires mondiales, 1996 et Statistiques sanitaires mondiales, 1995.




Tableau 9.5 Taux comparatifs de mortalité dans les pays membres de l'OCDE¹, selon le sexe, certaines causes, 1992 à 1995 - fin

Pays (année)	Maladies de l'appareil respiratoire		Causes extérieures ²		Suicide		Homicide	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
Taux comparatifs de mortalité (décès pour 100 000 habitants) ³								
Canada (1995)	45,3	24,5	54,5	20,3	18,6	4,7	2,1	1,0
Australie (1994)	45,4	23,1	51,5	17,9	18,5	4,0	2,2	1,3
Autriche (1995)	28,8	11,9	71,5	21,9	26,8	7,3	1,1	0,9
Belgique (1992)	63,5	20,9	67,1	27,5	20,8	7,8	2,0	1,0
République tchèque (1995) ⁴	39,0	19,3	86,1	33,6	21,0	5,8	2,3	1,1
Danemark (1995) ⁴	55,5	38,3	60,2	27,2	18,6	7,4	1,4	0,8
Finlande (1995)	52,3	21,0	100,8	29,1	35,8	9,7	3,5	1,9
France (1994)	35,2	15,4	75,1	29,5	24,4	7,8	1,4	0,7
Allemagne (1995)	43,1	17,2	50,5	18,8	17,5	5,6	1,4	0,8
Grèce (1995)	28,8	17,4	54,4	16,0	4,6	0,9	1,6	0,6
Hongrie (1995)	54,9	21,3	118,5	41,5	39,7	10,8	4,2	1,8
Islande (1994)	..	..	..	..	..	..	..	..
Irlande (1993)	91,3	54,7	47,7	16,9	13,9	3,5	1,0	0,3
Italie (1993)	35,8	13,3	48,4	17,3	9,3	2,7	2,5	0,5
Japon (1994)	66,0	27,1	51,3	19,7	17,3	7,2	..	..
Corée (1995) ⁴	44,0	18,8	109,8	40,3	14,2	5,9	2,0	1,2
Luxembourg (1995)	46,6	19,4	68,2	25,9	18,1	6,6	0,8	0,5
Mexique (1995)	82,4	56,1	114,6	25,9	6,0	0,9	32,9	3,4
Pays-Bas (1995)	56,0	24,3	32,7	15,3	10,5	5,1	1,4	0,9
Nouvelle-Zélande (1993)	57,7	34,3	67,0	23,9	18,7	4,9	..	..
Norvège (1994)	46,4	29,0	48,8	19,2	15,5	5,8	0,7	0,7
Pologne (1995)	38,0	13,7	103,2	26,3	21,5	3,9	3,7	1,3
Portugal (1995)	58,1	25,3	76,8	22,5	9,2	3,1	2,2	1,1
Espagne (1994)	54,6	19,5	51,5	14,5	9,7	2,5	1,2	0,4
Suède (1995)	33,6	20,5	46,6	18,4	16,8	6,8	1,2	0,7
Suisse (1994)	37,4	16,5	68,6	27,3	24,6	8,7	..	..
Turquie	..	..	..	..	..	..	..	..
Royaume-Uni (1995)	82,9	52,0	35,6	13,1	9,9	2,5	1,4	0,5
États-Unis (1994)	54,3	33,5	76,5	25,5	17,2	3,8	14,9	3,8


¹ Organisation de coopération et de développement économiques.

² Englobe les décès accidentels, les suicides, les homicides, les décès dus à des médicaments provoquant des effets adverses au cours de leur usage thérapeutique et à des incidents subis par des malades durant l'exécution d'actes médicaux.

³ Les taux comparatifs de mortalité (TCM) sont calculés en prenant pour référence la répartition par âge de la population mondiale.

⁴ Le codage des causes de décès se fonde sur la Classification internationale des maladies et problèmes de santé connexes, dixième révision (CIM-10).

Sources : Organisation mondiale de la santé : Statistiques sanitaires mondiales, 1996 et Statistiques sanitaires mondiales, 1995.



10. Annexes

Annexe 1 : Estimations démographiques corrigées, selon l'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, 1^{er} juillet 1996¹

Âge	Canada	T.-N.	Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.
Les deux sexes													
Total	29 969 209	571 657	136 743	943 219	762 031	7 388 028	11 258 391	1 140 402	1 019 632	2 793 263	3 857 595	31 402	66 846
< 1 ²	366 191	5 747	1 694	10 564	8 176	85 226	140 012	15 478	13 300	37 851	46 138	443	1 562
1 - 4 ²	1 585 107	25 638	7 240	45 357	36 662	374 664	604 032	66 517	57 677	162 321	197 086	2 101	5 812
5 - 9	2 016 687	36 726	9 975	63 115	49 247	462 449	762 077	82 884	79 435	212 170	248 209	2 350	8 050
10 - 14	2 020 407	42 919	10 125	63 715	52 138	466 075	746 949	80 912	81 920	213 320	253 729	2 418	6 187
15 - 19	2 003 701	44 987	10 026	63 479	53 350	502 771	721 648	78 377	76 430	196 943	248 151	2 226	5 313
20 - 24	2 037 410	47 284	9 845	66 730	57 044	479 478	757 521	80 725	69 712	197 351	264 157	2 138	5 425
25 - 29	2 225 374	45 398	9 686	68 835	57 013	519 856	859 537	81 072	64 011	216 754	294 431	2 414	6 367
30 - 34	2 633 304	47 150	10 911	80 655	64 558	643 223	1 024 709	93 500	77 386	249 969	331 222	3 292	6 729
35 - 39	2 668 159	48 044	10 962	82 110	64 626	675 419	997 797	94 188	82 674	264 157	339 240	3 251	5 691
40 - 44	2 388 840	46 962	9 928	73 845	61 076	610 024	875 483	84 975	75 486	231 305	312 180	3 000	4 576
45 - 49	2 159 929	42 590	9 707	69 274	56 885	553 417	805 011	75 775	62 745	190 385	287 703	2 696	3 741
50 - 54	1 672 611	32 389	7 339	53 521	42 187	455 197	617 120	58 695	47 846	139 202	214 947	1 824	2 344
55 - 59	1 333 144	24 388	6 006	42 647	33 225	349 889	503 965	47 643	41 821	109 679	171 218	966	1 697
60 - 64	1 214 630	20 899	5 529	38 410	29 984	315 596	463 389	44 505	40 627	97 676	155 863	805	1 347
65 - 69	1 130 336	18 713	4 925	34 559	27 765	290 411	434 743	42 670	39 921	87 308	147 685	691	945
70 - 74	981 384	15 908	4 421	30 810	25 517	243 490	378 980	40 261	37 028	72 232	131 852	414	471
75 - 79	704 909	12 472	3 646	25 364	19 470	168 782	261 699	31 516	30 670	52 703	98 103	226	258
80 - 84	467 590	7 998	2 617	17 063	12 947	108 765	171 182	22 642	22 478	34 761	66 877	79	181
85 - 89	239 453	3 798	1 391	8 656	6 831	56 044	87 916	11 717	12 145	17 794	33 031	38	92
90+	120 043	1 647	770	4 510	3 330	27 252	44 621	6 350	6 320	9 382	15 773	30	58
Hommes													
Total	14 847 259	285 983	67 552	464 756	377 213	3 642 219	5 563 341	565 721	506 611	1 405 899	1 917 135	16 126	34 703
< 1 ²	188 206	2 985	875	5 421	4 211	43 724	71 759	7 909	6 899	19 579	23 798	232	814
1 - 4 ²	811 949	13 088	3 769	23 387	18 621	191 705	309 568	33 904	29 174	83 159	101 571	1 014	2 989
5 - 9	1 031 772	18 809	5 082	32 424	25 297	236 621	390 017	42 718	40 465	108 584	126 355	1 278	4 122
10 - 14	1 032 343	21 805	5 220	32 395	26 544	237 797	382 071	41 682	41 634	109 227	129 529	1 231	3 208
15 - 19	1 026 720	22 714	4 999	32 058	27 369	257 369	370 776	39 672	39 651	100 861	127 476	1 136	2 639
20 - 24	1 033 876	24 334	5 049	34 016	29 072	244 138	383 831	41 544	35 521	100 655	131 950	1 063	2 703
25 - 29	1 122 296	23 166	4 895	35 228	28 900	265 077	429 698	41 268	32 012	109 757	147 805	1 205	3 285
30 - 34	1 334 993	23 537	5 336	40 674	32 573	328 377	518 949	47 675	38 489	127 424	166 822	1 636	3 501
35 - 39	1 344 889	23 984	5 367	40 625	32 348	340 887	502 685	48 137	41 983	134 985	169 381	1 570	2 937
40 - 44	1 192 488	23 492	5 049	36 209	30 277	305 473	433 204	42 537	38 758	117 996	155 545	1 527	2 421
45 - 49	1 085 246	21 514	4 923	34 759	28 855	277 056	401 368	38 288	32 197	97 107	145 690	1 359	2 130
50 - 54	838 538	16 487	3 755	27 080	21 455	225 808	307 955	29 479	24 044	70 990	109 118	1 049	1 318
55 - 59	662 392	12 502	3 002	21 257	16 669	171 915	249 445	23 586	20 630	55 845	86 013	590	938
60 - 64	597 106	10 568	2 684	18 859	14 660	151 652	226 865	22 012	20 239	49 056	79 387	439	685
65 - 69	536 934	9 136	2 409	16 107	12 930	133 312	207 318	20 138	19 385	42 712	72 586	423	478
70 - 74	433 918	7 463	2 058	13 548	11 312	104 477	166 881	17 707	17 057	33 019	59 940	221	235
75 - 79	289 300	5 443	1 490	10 410	8 163	65 663	107 727	13 095	13 094	22 403	41 587	109	116
80 - 84	174 754	3 170	925	6 334	4 909	37 839	64 099	8 618	8 946	13 421	26 362	24	107
85 - 89	77 624	1 327	470	2 879	2 167	16 592	27 944	4 066	4 425	6 172	11 510	11	61
90+	31 915	459	195	1 086	881	6 737	11 181	1 686	2 008	2 947	4 710	9	16
Femmes													
Total	15 121 950	285 674	69 191	478 463	384 818	3 745 809	5 695 050	574 681	513 021	1 387 364	1 940 460	15 276	32 143
< 1 ²	177 985	2 762	819	5 143	3 965	41 502	68 253	7 569	6 401	18 272	22 340	211	748
1 - 4 ²	773 158	12 550	3 471	21 970	18 041	182 959	294 464	32 613	28 503	79 162	95 515	1 087	2 823
5 - 9	984 915	17 917	4 893	30 691	23 950	225 828	372 060	40 166	38 970	103 586	121 854	1 072	3 928
10 - 14	988 064	21 114	4 905	31 320	25 594	228 278	364 878	39 230	40 286	104 093	124 200	1 187	2 979
15 - 19	976 981	22 273	5 027	31 421	25 981	245 402	350 872	38 705	36 779	96 082	120 675	1 090	2 674
20 - 24	1 003 534	22 950	4 796	32 714	27 972	235 340	373 690	39 181	34 191	96 696	132 207	1 075	2 722
25 - 29	1 103 078	22 232	4 791	33 607	28 113	254 779	429 839	39 804	31 999	106 997	146 626	1 209	3 082
30 - 34	1 298 311	23 613	5 575	39 981	31 985	314 846	505 760	45 825	38 897	122 545	164 400	1 656	3 228
35 - 39	1 323 270	24 060	5 595	41 485	32 278	334 532	495 112	46 051	40 691	129 172	169 859	1 681	2 754
40 - 44	1 196 352	23 470	4 879	37 636	30 799	304 551	442 279	42 438	36 728	113 309	156 635	1 473	2 155
45 - 49	1 074 683	21 076	4 784	34 515	28 030	276 361	403 643	37 487	30 548	93 278	142 013	1 337	1 611
50 - 54	834 073	15 902	3 584	26 441	20 732	229 389	309 165	29 216	23 802	68 212	105 829	775	1 026
55 - 59	670 752	11 886	3 004	21 390	16 556	177 974	254 520	24 057	21 191	53 834	85 205	376	759
60 - 64	617 524	10 331	2 845	19 551	15 324	163 944	236 524	22 493	20 388	48 620	76 476	366	662
65 - 69	593 402	9 577	2 516	18 452	14 835	157 099	227 425	22 532	20 536	44 596	75 099	268	467
70 - 74	547 466	8 445	2 363	17 262	14 205	139 013	212 099	22 554	19 971	39 213	71 912	193	236
75 - 79	415 609	7 029	2 156	14 954	11 307	103 119	153 972	18 421	17 576	30 300	56 516	117	142
80 - 84	292 836	4 828	1 692	10 729	8 038	70 926	107 083	14 024	13 532	21 340	40 515	55	74
85 - 89	161 829	2 471	921	5 777	4 664	39 452	59 972	7 651	7 720	11 622	21 521	27	31
90+	88 128	1 188	575	3 424	2 449	20 515	33 440	4 664	4 312	6 435	11 063	21	42

¹ Ces estimations démographiques, qui se fondent sur les données du Recensement de 1991, sont corrigées pour tenir compte du sous-dénombrement net du recensement et incluent les résidents non permanents.

² Les chiffres de population de 1996 pour les groupes d'âge « < 1 » et « 1-4 » ont été corrigés par la Division des statistiques sur la santé pour tenir compte des nouvelles naissances.

Sources : Statistiques démographiques trimestrielles, 1997 (n° 91-213-XPB au catalogue) et Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada.

Annexe 2 : Estimations démographiques corrigées, selon le sexe, Canada, provinces et territoires, 1^{er} juillet, 1986 à 1996¹

Année	Canada	T.-N.	Î.P.-É.	N.-É.	N.-B.	QC	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.-B.	Yn	T.N.-O.
Les deux sexes													
1986	26 203 819	578 083	128 832	892 140	727 660	6 733 782	9 477 181	1 094 049	1 032 879	2 438 703	3 020 374	24 761	55 375
1987	26 549 745	576 535	129 019	896 275	730 473	6 805 945	9 684 852	1 100 524	1 036 432	2 443 493	3 064 557	25 981	55 659
1988	26 894 785	576 200	129 744	900 237	733 060	6 860 428	9 884 365	1 104 668	1 031 717	2 463 022	3 128 197	26 886	56 261
1989	27 379 348	577 425	130 567	906 728	737 994	6 948 030	10 151 002	1 106 208	1 022 954	2 504 337	3 209 195	27 376	57 532
1990	27 790 593	578 884	131 037	912 510	742 955	7 020 654	10 341 419	1 108 382	1 010 825	2 556 405	3 300 142	28 026	59 354
1991	28 120 065	580 327	130 826	917 946	748 545	7 080 604	10 471 466	1 112 468	1 006 314	2 601 289	3 379 827	29 149	61 304
1992	28 542 213	583 382	131 631	924 623	752 962	7 161 244	10 646 359	1 117 563	1 008 004	2 646 752	3 476 868	30 268	62 557
1993	28 946 768	584 203	133 173	930 358	755 510	7 238 551	10 815 393	1 124 096	1 010 807	2 685 972	3 574 601	30 442	63 662
1994	29 255 599	581 242	134 554	933 857	757 661	7 288 815	10 937 058	1 129 486	1 012 156	2 715 554	3 670 825	29 658	64 733
1995	29 617 448	577 472	135 366	938 453	759 893	7 341 259	11 098 109	1 135 589	1 015 214	2 753 329	3 766 221	30 464	66 079
1996	29 969 209	571 657	136 743	943 219	762 031	7 388 028	11 258 391	1 140 402	1 019 632	2 793 263	3 857 595	31 402	66 846
Hommes													
1986	13 012 940	290 044	64 174	442 743	361 750	3 324 228	4 690 442	542 435	517 426	1 233 025	1 504 315	13 080	29 278
1987	13 179 630	289 269	64 182	444 369	362 981	3 358 707	4 791 619	545 787	518 716	1 234 790	1 526 156	13 697	29 357
1988	13 345 972	289 102	64 457	445 905	364 099	3 384 439	4 888 692	547 984	515 869	1 243 997	1 557 681	14 144	29 603
1989	13 581 439	289 718	64 780	448 689	366 381	3 426 486	5 018 887	548 890	511 005	1 264 191	1 597 841	14 372	30 199
1990	13 780 688	290 452	64 927	451 117	368 675	3 461 119	5 111 321	550 111	504 468	1 289 789	1 642 946	14 683	31 080
1991	13 939 408	291 220	64 746	453 361	371 256	3 489 555	5 173 825	552 299	501 760	1 311 692	1 682 437	15 239	32 018
1992	14 149 703	293 165	65 053	456 540	373 287	3 530 699	5 262 887	554 712	502 389	1 333 441	1 729 083	15 768	32 679
1993	14 349 472	293 559	65 894	459 358	374 544	3 569 960	5 346 846	557 843	503 648	1 352 009	1 776 817	15 844	33 150
1994	14 497 244	291 766	66 496	460 911	375 474	3 592 628	5 404 656	560 345	503 588	1 367 378	1 825 103	15 232	33 667
1995	14 676 631	289 448	66 846	462 717	376 311	3 619 055	5 485 149	563 445	504 590	1 386 316	1 872 780	15 623	34 351
1996	14 847 259	285 983	67 552	464 756	377 213	3 642 219	5 563 341	565 721	506 611	1 405 899	1 917 135	16 126	34 703
Femmes													
1986	13 190 879	288 039	64 658	449 397	365 910	3 409 554	4 786 739	551 614	515 453	1 205 678	1 516 059	11 681	26 097
1987	13 370 115	287 266	64 837	451 906	367 492	3 447 238	4 893 233	554 737	517 716	1 208 703	1 538 401	12 284	26 302
1988	13 548 813	287 098	65 287	454 332	368 961	3 475 989	4 995 673	556 684	515 848	1 219 025	1 570 516	12 742	26 658
1989	13 797 909	287 707	65 787	458 039	371 613	3 521 544	5 132 115	557 318	511 949	1 240 146	1 611 354	13 004	27 333
1990	14 009 905	288 432	66 110	461 393	374 280	3 559 535	5 230 098	558 271	506 357	1 266 616	1 657 196	13 343	28 274
1991	14 180 657	289 107	66 080	464 585	377 289	3 591 049	5 297 641	560 169	504 554	1 289 597	1 697 390	13 910	29 286
1992	14 392 510	290 217	66 578	468 083	379 675	3 630 545	5 383 472	562 851	505 615	1 313 311	1 747 785	14 500	29 878
1993	14 597 296	290 644	67 279	471 000	380 966	3 668 591	5 468 547	566 253	507 159	1 333 963	1 797 784	14 598	30 512
1994	14 758 355	289 476	68 058	472 946	382 187	3 696 187	5 532 402	569 141	508 568	1 348 176	1 845 722	14 426	31 066
1995	14 940 817	288 024	68 520	475 736	383 582	3 722 204	5 612 960	572 144	510 624	1 367 013	1 893 441	14 841	31 728
1996	15 121 950	285 674	69 191	478 463	384 818	3 745 809	5 695 050	574 681	513 021	1 387 364	1 940 460	15 276	32 143

¹ Ces estimations démographiques, qui se fondent sur les données du Recensement de 1991, sont corrigées pour tenir compte du sous-dénombrement net du recensement et incluent les résidents non permanents.
Source : Division de la démographie, Statistique Canada.

Annexe 3 : Méthode de classement des causes principales de décès

La plus grande difficulté que pose le classement des causes principales de décès consiste à décider du niveau souhaitable de spécificité ou d'agrégation des causes¹. Il faut que le nombre de catégories de causes à classer soit raisonnable et que leur nature soit significative. Toutefois, il est parfois intéressant de fournir des renseignements détaillés sur les composantes des catégories principales de causes de décès. Par exemple, en 1996, le cancer et les maladies de l'appareil circulatoire ont causé presque les deux tiers des décès. Comme ces deux grandes catégories contiennent des maladies fort différentes les unes des autres en ce qui concerne les causes, la conduite du traitement et l'issue, on doit présenter des données à un niveau plus poussé de détail. En règle générale, on devrait classer séparément les causes particulières de décès auxquelles est imputable une part importante de la mortalité globale durant la période de référence ou celles considérées comme particulièrement importantes pour d'autres raisons (comme l'infection par le VIH, qui est une maladie mortelle et contagieuse).

La méthode appliquée pour classer par ordre les causes principales de décès mentionnées dans la présente publication se résume ainsi : 1) déterminer les catégories de causes à prendre en considération pour le classement, 2) classer les causes sélectionnées selon le nombre de décès qui leur sont imputables et 3) déterminer le nombre de causes à retenir pour la publication.

Première étape – Groupement des causes

La détermination des catégories de causes de décès qu'il faut classer par ordre a pour point de départ la liste américaine de 72 causes sélectionnées de décès. On a choisi ce modèle car 1) il se fonde sur la liste abrégée des causes de décès (appelé liste A²) utilisée pour produire la publication intitulée *Mortalité – Liste sommaire des causes*³ de Statistique Canada, 2) il tient compte de tous les codes de la CIM-9, et 3) la plupart des 15 causes principales qui figurent dans le classement final correspondent à des agrégats identiques ou similaires de la liste américaine.

L'étape suivante consiste à désagréger certaines causes regroupées dans des catégories résiduelles dans la liste américaine, pour mieux refléter les besoins courants des utilisateurs canadiens de données sur la mortalité. (Par exemple, la liste américaine regroupe en une seule catégorie les cas de cancer du sein chez l'homme et chez la femme, tandis que le *Recueil* contient des données distinctes sur le cancer du sein chez la femme.) Des corrections mineures sont aussi apportées à plusieurs autres catégories. En bout de ligne, la liste américaine originale de 72 causes est étendue de façon à englober 114 causes plus précises de décès.

¹ Ici, le classement se fonde sur le nombre de décès imputables à une cause particulière ou à un groupe de causes. Pour chaque décès, on ne totalise qu'une seule cause initiale.

² La liste A regroupe environ 900 codes à trois chiffres de la Classification internationale des maladies, révision 1975 (CIM-9) en 282 groupes.

³ Cette publication (Statistique Canada, n° 84-209-XPB au catalogue) a été remplacée par un produit similaire pour les années 1996 et 1997 dont le numéro de catalogue est le suivant : 84F0209XPB.

Durant l'exercice, on s'efforce autant que possible de se conformer à la liste A, sans toutefois pouvoir le faire dans tous les cas. Voici la liste des changements intégrés dans le *Recueil* :

- 1) L'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) (codes 042 à 044 de la CIM-9) représente une catégorie distincte de la liste des causes principales de décès étant donné la découverte récente de ce syndrome et son importance croissante ces dernières années⁴. Sur la liste A, ces codes sont classés dans la catégorie résiduelle « autres maladies virales » (A23).
- 2) La catégorie « cancers d'autres parties de l'utérus » (code A66) de la liste A, qui se rapporte aux autres parties de l'utérus que le col, correspond aux codes 179, 181 et 182 de la CIM-9. Dans le *Recueil*, on exclut le code 181 de la CIM-9 (cancer du placenta) de ce groupe, ne retenant que les codes 179 et 182, qui représentent les cancers du corps de l'utérus. Cette exclusion rend les données plus comparables à celles qui figurent dans les publications de Statistique Canada sur le cancer⁵.
- 3) La liste A contient la catégorie « autres affections héréditaires et dégénératives du système nerveux central » (code A120), qui englobe la maladie d'Alzheimer (code 331.0 de la CIM-9). Une catégorie distincte pour cette maladie semble toutefois justifiée, étant donné le nombre assez élevé de décès qui lui sont attribuables et son importance croissante en tant qu'état morbide (à cause du vieillissement de la population et de l'amélioration des méthodes diagnostiques).
- 4) La liste A contient une catégorie résiduelle intitulée « Toute forme autre ou mal définie de maladie cardiaque » (A148), qui inclut les troubles du rythme cardiaque (code 427 de la CIM-9). Toutefois, la classification du *Recueil* comprend une catégorie particulière pour les troubles du rythme cardiaque, étant donné le nombre important de décès dont ils sont la cause.
- 5) La liste A comprend la catégorie « Accidents impliquant des véhicules à moteur » (AE235-AE241) qui est équivalente à la tranche de code E810-E825 de la CIM-9. La liste du *Recueil*, quant à elle, inclut aussi le code E929.0 « Séquelles d'accidents causés par des véhicules à moteur » par souci de complétude.
- 6) De la même façon, la catégorie « Chutes accidentelles » du *Recueil* (codes E880 à E888 de la CIM-9) inclut aussi la rubrique « Séquelles de chutes accidentelles » (code E929.3 de la CIM-9), qui ne figure pas sur la liste A (AE250-AE252).

⁴ L'infection par le VIH n'était pas reconnue comme une maladie au moment de la mise en œuvre de la CIM-9 en 1979.

⁵ Ce groupe de maladies ne figure pas sur la liste des causes principales de décès du *Recueil* (tableau 7.1) à cause du nombre assez faible de décès (620) déclarés en 1996.

Deuxième et troisième étapes – Classement et sélection des causes principales

D'après l'agrégat de 114 causes de décès obtenu à la première étape, on a sélectionné ou dérivé aux fins d'un examen plus approfondi 25 catégories de causes principales de décès jugées d'une importance comparable en ce qui concerne la morbidité, ainsi que 45 causes composantes. Plus précisément, 37 des 114 causes agrégées ont été éliminées de la classification, 14 ont été considérées comme étant des causes principales ne nécessitant aucune agrégation supplémentaire et 63 ont été regroupées en 11 causes principales, 45 causes composantes et 4 sous-composantes⁶.

On a retenu pour la publication 15 des 25 catégories de causes principales de décès définies plus haut, ainsi que 25 causes composantes et 2 sous-composantes⁷. Les causes principales de décès, dont le classement figure au tableau 7.1, vont du cancer, tous types et sièges confondus (qui ont causé 59 241 décès en 1996) aux troubles névrotiques, de la personnalité et autres non psychotiques (1 237 décès). Toutes les causes composantes et les sous-composantes du tableau sont associées à un plus grand nombre de décès que la 15^e cause principale⁸.

⁶ Étant donné le nombre élevé de décès associés à la cardiopathie ischémique, on a ventilé cette cause composante en quatre sous-composantes.

⁷ Le nombre total de décès dus à chaque cause principale figurant dans le tableau 7.1 est supérieur à la somme des décès attribuables aux causes composantes respectives, puisqu'on n'a retenu que les causes composantes les plus importantes.

⁸ Il est important de souligner que les catégories du tableau 7.1 sont, dans une certaine mesure, arbitraires. Autrement dit, le classement présenté ici pourrait varier si on adoptait une autre classification. Par exemple, certains utilisateurs de données pourraient regrouper les cardiopathies, les maladies cérébrovasculaires et les maladies des artères, artérioles et capillaires en une seule catégorie (c.-à-d. les maladies de l'appareil circulatoire); le cas échéant, le nouvel agrégat deviendrait la première cause de décès, refoulant le cancer à la deuxième place.

Annexe 4 : Calcul des taux comparatifs de mortalité (TCM)

La formule du taux comparatif de mortalité, r , s'exprime de la façon suivante :

$$r = \sum_{i=1}^{20} \left(\frac{d_i}{p_i} \right) w_i$$

où, pour le groupe d'âge i , d_i représente le nombre de décès selon l'âge et le sexe pour une cause de décès et une région géographique données, p_i représente la taille de la population du groupe âge-sexe observé dans la région géographique en question et w_i représente le coefficient de pondération pour ce groupe d'âge (calculé d'après la population type, hommes et femmes confondus). À noter que l'on utilise le même coefficient de pondération pour les hommes que pour les femmes. Pour produire un taux pour 100 000 habitants (ou pour 100 000 hommes ou femmes), on multiplie r par 100 000.

Population type par groupe d'âge, Canada, 1^{er} juillet 1991

Groupe d'âge (i)	Groupe d'âge (en années)	Population type (les deux sexes)	Coefficient de pondération (w_i)
	Tous âges confondus	28 120 065	1,0000
1	< 1	403 061	0,0143
2	1- 4	1 550 285	0,0552
3	5- 9	1 953 045	0,0695
4	10-14	1 913 115	0,0680
5	15-19	1 926 090	0,0685
6	20-24	2 109 452	0,0750
7	25-29	2 529 239	0,0899
8	30-34	2 598 289	0,0924
9	35-39	2 344 872	0,0834
10	40-44	2 138 891	0,0761
11	45-49	1 674 153	0,0595
12	50-54	1 339 902	0,0477
13	55-59	1 238 441	0,0440
14	60-64	1 190 217	0,0423
15	65-69	1 084 588	0,0386
16	70-74	834 024	0,0297
17	75-79	622 221	0,0221
18	80-84	382 303	0,0136
19	85-89	192 410	0,0068
20	90+	95 467	0,0034

Annexe 5 : Codes de la CIM-9 utilisés pour totaliser les décès dus à des causes extérieures de traumatismes et empoisonnements¹

Mécanisme ou cause du traumatisme	Caractère intentionnel du traumatisme				
	Accidentel	Suicide	Homicide	Autre ²	Non déterminé ³
Toutes les causes extérieures	E800-E949	E950-E959	E960-969	E970-E978, E990-E999	E980-E989
<i>Tous les traumatismes</i>	<i>E800-E869, E880-E929</i>	<i>E950-E959</i>	<i>E960-E969</i>	<i>E970-E978, E990-E999</i>	<i>E980-E989</i>
Accidents de transport	E800-E829, E831, E833-E848, E929.0	E958(.5,.6)	..	..	E988(.5,.6)
Accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur	E810-E819	..	..	..	..
Occupant d'un véhicule à moteur (autre qu'une motocyclette)	E810(.0,.1)-E819(.0,.1)	..	..	..	..
Piéton	E810(.7)-E819(.7)	..	..	..	..
Motocycliste	E810(.2,.3)-E819(.2,.3)	..	..	..	..
Cycliste	E810(.6)-E819(.6)	..	..	..	..
Autre personne	E810(.4,.5,.8)-E819(.4,.5,.8)	..	..	..	..
Personne non précisée	E810(.9)-E819(.9)	..	..	..	..
Autres accidents de transport	E800-E807, E820-E829, E831, E833-E848	..	..	..	..
Véhicule à moteur spécial pour terrain enneigé	E820(.0-.5,.8,.9)	..	..	..	..
Transport aérien ou vol spatial	E840-E845	E958.6	..	..	E988.6
Piéton, autre	E800(.2)-E807(.2), E820(.7)-E825(.7), E826(.0)-E829(.0)	..	..	..	..
Autre véhicule à moteur hors de la voie publique	E821(.0-.5,.8,.9)	..	..	..	..
Transport par eau	E831, E833-E838	..	..	..	..
Chemin de fer	E800(.0,.1,.8,.9)-E807(.0,.1,.8,.9)	..	..	..	..
Cycliste, autre	E800(.3)-E807(.3), E820(.6)-E825(.6), E826(.1,.9), E827(.1)-E829(.1)	..	..	..	..
Autre ou non précisé	E822(.0-.5,.8,.9)-E825(.0-.5,.8,.9), E826(.2-.8), E827(.2-.9)-E829(.2-.9), E846-E848	..	..	..	..
Séquelles d'accidents occasionnés par des véhicules à moteur	E929.0	..	..	..	..
Écrasement de véhicule à moteur	..	E958.5	..	..	E988.5
Chutes	E880-E888, E929.3	E957	E968.1	..	E987
Fracture, cause non précisée	E887	..	..	..	..
Sauter/être poussé/tomber d'un endroit élevé	..	E957	E968.1	..	E987
Autre ou non précisée	E880-E886, E888, E929.3	..	..	..	..
Intoxication	E850-E869, E929.2	E950-952	E962	E972	E980-E982
Par des médicaments et produits biologiques	E850-E858	E950(.0-.5)	E962.0	..	E980(.0-.5)
Par des gaz d'échappement de véhicule à moteur	E868.2	E952.0	..	..	E982.0
Par une autre source de monoxyde de carbone	E868(.3,.8,.9)	E952.1	..	..	E982.1
Par l'alcool	E860	..	..	..	..
Autre ou non précisée	E861-E867, E869, E868(.0,.1), E929.2	E950(.6-.9), E951(.0-.8), E952(.8,.9)	E962(.1-.9)	..	E980(.6-.9), E981, E982(.8,.9)
Suffocation	E911-E913	E953	E963	..	E983
Par pendaison/strangulation	E913.8	E953.0	E963	..	E983.0
Par inhalation/ingestion d'aliments	E911	..	..	..	..
Par inhalation/ingestion d'un autre objet	E912	..	..	..	..
Causée par un sac en plastique	E913.1	E953.1	..	..	E983.1
Dans un lit ou un berceau	E913.0	..	..	..	..
Autre ou non précisée	E913(.2-.7,.9)	E953(.8,.9)	..	..	E983(.8,.9)
Armes à feu	E922	E955(.0-.4)	E965(.0-.4)	E970	E985(.0-.4)

Annexe 5 : Codes de la CIM-9 utilisés pour totaliser les décès dus à des causes extérieures de traumatismes et empoisonnements¹ – suite

Mécanisme ou cause du traumatisme	Caractère intentionnel du traumatisme				
	Accidentel	Suicide	Homicide	Autre ²	Non déterminé ³
Noyade/submersion	E830, E832, E910	E954	E964	..	E984
Noyade/submersion accidentelle	E830, E832, E910	...	...	...	...
Durant des activités sportives/de loisirs	E910.0-E910.2	...	...	...	...
Accident de véhicule nautique causant une submersion	E830	...	...	...	...
Autre submersion/noyade accidentelle durant le transport par eau	E832	...	...	...	...
Dans une baignoire	E910.4	...	...	...	...
Autres ou non précisée	E910(.3,.8,.9)	...	...	...	...
Autre noyade/submersion	...	E954	E964	..	E984
Feux/brûlures	E890-E899, E924, E929.4	E958 (.1,.2,.7)	E961, E968(.0,.3)	..	E988(.1,.2,.7)
Feux/brûlures accidentels	E890-E899, E924, E929.4	...	...	...	...
Incendie dans une résidence privée	E890	...	...	...	...
Incendie dans un autre immeuble ou bâtiment sans précision	E891-E899, E929.4	...	...	...	...
Substance/objet brûlant, matière caustique/corrosive, vapeur d'eau	E924	...	...	...	...
Autres feux/brûlures	...	E958(.1,.2,.7)	E961, E968(.0,.3)	..	E988(.1,.2,.7)
Instruments tranchants/perforants	E920	E956	E966	E974	E986
Choc accidentel par ou contre objets ou personnes	E916-E917	..	E960.0, E968.2	E973, E975	..
Agents physiques naturels/facteurs du milieu	E900-E909, E928(.0-.2), E929.5	E958.3	..	..	E988.3
Froid excessif	E901	E958.3	..	..	E988.3
Morsures et piqûres	E905(.0-.6,.9), E906(.0-.4,.9)	..	..	..	..
Autre ou non précisé	E900, E902-E904, E905(.7,.8), E906.8, E907-E909, E928(.0-.2), E929.5	..	..	..	..
Machines	E919	..	..	..	..
Agricoles	E919.0	..	..	..	..
De levage	E919.2	..	..	..	..
Pour le déplacement de la terre, le terrassement et d'autres tâches d'excavation	E919.7	..	..	..	..
Autre ou non précisée	E919(.1,.3-.6,.8,.9)	..	..	..	..
Enfant maltraité	..	..	E967	..	..
Autres causes précisées et classifiables	E914, E915, E918, E921, E923, E925-E927, E929.1	E955(.5,.9), E958(.0,.4)	E960.1, E965(.5-.9), E968.4	E971, E978, E990-E994, E996, E997(.0-.2)	E985.5, E988(.0,.4)
Autres causes précisées, non classées ailleurs	E928.8, E929.8	E958.8, E959	E968.8, E969	E977, E995, E997.8, E998, E999	E988.8, E989
Causes non précisées	E928.9, E929.9	E958.9	E968.9	E976, E997.9	E988.9

Annexe 5 : Codes de la CIM-9 utilisés pour totaliser les décès dus à des causes extérieures de traumatismes et empoisonnements¹ – fin

Mécanisme ou cause du traumatisme	Caractère intentionnel du traumatisme				
	Accidentel	Suicide	Homicide	Autre ²	Non déterminé ³
<i>Effets indésirables</i>	E870-E879, E930-E949	..	..	..	..
Actes chirurgicaux et médicaux responsables de réactions anormales du malade ou de complications ultérieures	E878-E879	..	..	..	..
Incidents affectant le malade durant l'intervention chirurgicale ou médicale	E870-E876	..	..	..	..
Médicaments au cours de leur usage thérapeutique	E930-E949	..	..	..	..

¹ Codes de la CIM-9 utilisés pour totaliser les décès présentés au tableau 7.3. Les groupements de ce tableau sont adaptés d'après un cadre de référence élaboré par les U.S. Centers for Disease Control and Prevention en collaboration avec l'American Public Health Association. Les principales différences entre le cadre de référence original et celui utilisé dans la présente publication sont les suivantes : plusieurs catégories sommaires de causes ont été ventilées pour fournir des renseignements plus détaillés; la rubrique « fracture, cause non précisée » (E887) a été supprimée de la catégorie résiduelle « non précisée » et ajoutée à la catégorie « chutes » (la grande majorité des personnes décédées dont la cause de décès porte le code E887 sont des personnes âgées qui ont vraisemblablement subi leurs blessures au moment d'une chute); on a transféré les séquelles des accidents causés par des véhicules à moteur, d'empoisonnements accidentels, de chutes accidentelles, d'accidents provoqués par le feu et de ceux causés par des agents naturels ou des facteurs du milieu (E929.0, .2-.5) de la catégorie « autre cause précisée et classifiable » à des catégories plus explicites (p. ex. « incendie ou autre non précisé »); on a éliminé les suicides et les décès de cause non déterminée à la suite d'un « écrasement de véhicule à moteur » (E958.5 et E988.5) de la catégorie des accidents de la circulation impliquant des véhicules à moteur et on les a classés dans des catégories distinctes (parce que ce genre de décès ne survient pas nécessairement sur la voie publique et qu'ils peuvent impliquer des véhicules classés dans la catégorie « autres accidents de transport »); on a éliminé la rubrique « enfant maltraité » (E967) de la catégorie « autres causes précisées et classifiables » et on lui a attribué sa propre catégorie; de nouveaux agrégats ont été créés pour tous les accidents de transport, pour les décès par noyade/submersion accidentelle par opposition aux autres formes de noyade/submersion et pour les décès causés par des feux/brûlures accidentels par opposition aux autres feux/brûlures; les décès dus aux efforts excessifs (E927) ont été intégrés à la catégorie « autres causes précisées et classifiables » (seulement deux décès de ce genre en 1996).

² Décès consécutifs à l'intervention de la force publique ou d'un acte de guerre.

³ La nature accidentelle ou intentionnelle n'est pas déterminée.

« .. » indique que les codes de la CIM-9 n'existent pas pour ces catégories; par exemple, le décès d'un piéton qui se suicide en se jetant délibérément devant un autobus en mouvement dans la circulation recevrait le code E958.0 de la CIM (suicide et traumatisme auto-infligé par précipitation contre ou sous un objet en mouvement) plutôt que le code 814.7 (accident de la circulation par collision entre un véhicule à moteur et un piéton).

« ... » indique que les données ne sont pas appropriées ou sont sans objet.

11. Glossaire

GLOSSAIRE

Accouchement Un accouchement peut comprendre la mise au monde d'un ou de plusieurs enfants vivants ou mort-nés. Le nombre d'accouchements durant une période donnée sera égal ou inférieur au nombre total de naissances, car les naissances multiples (jumeaux, triplés ou naissances d'ordre plus élevé) sont comptées comme des accouchements uniques.

Âge Âge au dernier anniversaire avant l'événement. Dans le cas de la mortalité infantile, nombre de mois (ou d'heures, de minutes ou de jours) révolus depuis la naissance.

Âge moyen à la procréation La moyenne est une mesure de tendance centrale. Pour calculer l'âge moyen à la procréation dans une province ou un territoire, on ajoute une demi-année à l'âge de la mère au moment du dernier anniversaire et on multiplie ce chiffre par le nombre de naissances survenant à cet âge (p. ex., en 1996, 101 naissances ont été enregistrées chez les femmes de 40 ans au Manitoba, ce qui donne le produit $101 \times 40,5 = 4\,090,5$). Puis, on additionne ces valeurs et on divise la somme par le nombre total de naissances dans la province ou le territoire. On ajoute une demi-année à l'âge de la mère car, si l'on revient à l'exemple choisi, la plupart des femmes de 40 ans se seraient trouvées entre leurs 40^e et 41^e anniversaires au moment de la naissance de l'enfant; autrement dit, l'ajout d'une demi-année donne une meilleure approximation de l'âge moyen des femmes de 40 ans. L'*âge moyen à la procréation (premier accouchement)* est calculé de façon similaire, mais se fonde sur les premiers accouchements uniquement.

Âge moyen au mariage Pour calculer l'âge moyen au mariage des mariés ou des mariées d'une province ou d'un territoire donné, on ajoute une demi-année à l'âge du marié ou de la mariée au moment du dernier anniversaire et on multiplie le résultat par le nombre de mariages de personnes ayant l'âge du marié ou de la mariée, puis on additionne les produits obtenus et on divise la somme par le nombre total de mariages enregistrés dans la province ou le territoire concerné. L'*âge moyen au premier mariage* est calculé de la même façon, mais se fonde uniquement sur les premiers mariages.

Années révolues de mariage Temps écoulé (en années) entre la date où le mariage a été célébré et la date où le jugement de divorce a été rendu (p. ex., un couple qui s'est marié en 1986 et qui a divorcé en 1996 est considéré comme ayant été marié 10 ans). Cette mesure ne vise que les mariages qui se terminent par un divorce.

Cause initiale de décès Maladie ou traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès, ou circonstances de l'accident ou de la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel.

Causes principales de décès Causes de décès les plus importantes en ce qui concerne la fréquence de leur manifestation, quand on se fonde sur un agrégat significatif de causes particulières. (La catégorie « cardiopathies », qui englobe plusieurs états distincts, comme l'infarctus aigu du myocarde et la cardiomyopathie, est un exemple d'agrégat significatif de causes spécifiques de décès.) On ne procède pas au regroupement d'une cause particulière de décès avec d'autres quand le nombre de décès imputables à cette

cause est particulièrement élevée ou que l'importance de l'état morbide justifie la création d'une catégorie distincte (p. ex., suicide, infection par le VIH).

Codes de la CIM-9 Codes de la *Classification internationale des maladies* (CIM), 9^e révision, établie en 1975 par l'Organisation mondiale de la santé et utilisée au Canada depuis 1979 pour classer les causes de décès. Le manuel de la CIM (OMS, 1977) comprend la liste des codes particuliers attribués aux maladies, traumatismes et causes de décès. À partir de l'an 2000, au Canada, les causes de décès seront codées conformément à la 10^e révision de la Classification, appelée CIM-10 (OMS, 1992).

Décès Disparition permanente de tout signe de vie à tout moment après une naissance vivante. Le calcul des statistiques sur la mortalité ne tient pas compte des mortinaissances, sauf indication contraire. Dans la présente publication, la répartition des décès selon la région se fonde sur le lieu de résidence habituel de la personne.

- *Mort infantile* : Décès d'un enfant de moins d'un an.
- *Décès néonatal précoce* : Décès d'un enfant de moins d'une semaine (de 0 à 6 jours).
- *Décès néonatal* : Décès d'un enfant de moins de quatre semaines (de 0 à 27 jours).
- *Décès périnatal* : Décès d'un enfant de moins d'une semaine ou enfant mort-né après au moins 28 semaines de gestation. Ne comprend pas les mortinaissances pour lesquelles la durée de la gestation est inconnue.
- *Décès postnéonatal* : Décès d'un enfant de moins d'un an, mais d'au moins 28 jours.

Décès directement attribuable à l'alcool Décès pour lesquels la cause initiale est classée dans l'une des catégories suivantes (les codes de la CIM-9 figurent entre parenthèses) : psychoses alcooliques (291); syndrome de dépendance alcoolique (303); abus d'alcool sans dépendance (305.0); polynévrite alcoolique (357.5); myocardie éthylique (425.5); gastrite alcoolique (535.3); cirrhose alcoolique graisseuse du foie (571.0); hépatite aiguë alcoolique (571.1); cirrhose alcoolique du foie (571.2); lésion alcoolique du foie, sans précision (571.3); alcoolémie excessive (790.3); intoxication accidentelle par l'alcool, non classée ailleurs (E860).

Décès par AVM Décès causés par un accident de circulation impliquant un véhicule à moteur (codes E810 à E819 de la CIM-9), par un accident hors de la voie publique impliquant un véhicule à moteur (codes E820 à E825 de la CIM-9), ou par les séquelles d'accidents occasionnés par des véhicules à moteur. Comprend les collisions d'un véhicule à moteur avec un autre véhicule à moteur, un train, un autre véhicule ou un piéton; les accidents dus à une perte de maîtrise du véhicule; les accidents qui surviennent au moment où les passagers embarquent dans le véhicule à moteur; les chutes accidentelles à partir d'un véhicule en mouvement; l'intoxication accidentelle par les gaz d'échappement; et d'autres accidents impliquant des véhicules à moteur, y compris les véhicules à moteur spéciaux pour terrain enneigé et d'autres véhicules à moteur tout terrain.

Division de recensement (DR) Région géographique administrative, habituellement établie en vertu d'une loi provinciale, qui se situe entre les niveaux municipal et provincial. Les DR peuvent être des comtés, des districts régionaux, des municipalités régionales ou certains autres types de région géographique définis par les lois provinciales. Dans les provinces ne possédant pas ce genre de régions (Terre-Neuve, Manitoba, Saskatchewan et Alberta), Statistique Canada a créé des DR (en collaboration avec ces provinces) pour les besoins de la diffusion des données statistiques. Au Yukon, l'entière du territoire forme une division de recensement.

Divorce Dissolution légale d'un mariage légitime. Les données sur le divorce présentées ici se fondent sur la province ou sur le territoire où le jugement a été rendu.

Durée de la gestation Intervalle, en semaines révolues, entre le premier jour de la dernière période menstruelle de la mère et le jour de l'accouchement, ou toute estimation de cet intervalle fondée sur un examen par ultrasons, un examen médical ou toute autre méthode. La méthode de calcul de la durée de la gestation n'est pas précisée dans les documents canadiens sur l'enregistrement des naissances. *Avant terme* désigne une période de gestation de moins de 37 semaines entières, *à terme*, une période de 37 à 41 semaines entières et *après terme*, une période de 42 semaines entières ou davantage.

Espérance de vie Nombre moyen d'années qu'il reste à vivre, à la naissance ou à d'autres âges, déterminé d'après un ensemble de taux de mortalité par âge calculés pour une année donnée.

État matrimonial Situation conjugale légale au moment de l'événement. Les personnes qui vivent en union de fait sont classées dans la catégorie correspondant à leur état matrimonial légal. Une personne *célibataire* est une personne qui n'a jamais été mariée, ou dont le mariage a été annulé et qui ne s'est pas remariée. Une personne *séparée* est une personne qui est légalement mariée, mais qui ne vit pas avec son (sa) conjoint(e) parce que le couple ne veut plus vivre ensemble. Une personne *divorcée* est une personne qui est légalement divorcée et qui ne s'est pas remariée. Une personne *mariée* est une personne qui est légalement mariée et qui n'est pas séparée. Une personne *veuve* est une personne dont le (la) conjoint(e) est mort(e) et qui ne s'est pas remariée.

État matrimonial juste avant le mariage Utilisée dans le contexte des statistiques sur le divorce, cette variable correspond à l'état matrimonial d'une personne immédiatement avant le mariage auquel se rapporte le jugement de divorce. Les états possibles sont célibataires [jamais marié(e)], divorcé(e) ou veuf(ve).

Lieu de l'événement Province, territoire ou division de recensement (DR) où a eu lieu l'événement.

Mariage Union légale d'un homme et d'une femme. Les unions de fait sont exclues. Dans la présente publication, les données sur le mariage sont présentées selon le lieu de l'événement, autrement dit, selon la province, le territoire ou la division de recensement où a eu lieu le mariage.

Médiane La médiane, qui est une autre mesure de tendance centrale, est la valeur centrale d'un ensemble ordonné de valeurs (p. ex., les âges des mariées classés par ordre croissant). Si le nombre de valeurs est pair, la médiane correspond à la moyenne arithmétique des deux valeurs centrales.

Mortinaissance Produit de conception issu du corps de la mère et qui, après cette séparation, ne respire ni ne manifeste aucun signe de vie.

La plupart des provinces et les deux territoires exigent que soit déclarée toute mortinaissance qui survient après au moins 20 semaines de gestation, *ou* pour laquelle le poids de l'enfant mis au monde est d'au moins 500 grammes. Le Québec et la Saskatchewan (et le Nouveau-Brunswick, avant novembre 1996), exigent uniquement que soient déclarées les mortinaissances pour lesquelles le poids à la naissance est d'au moins 500 grammes, indépendamment de la durée de la gestation. Jusqu'à 1997, l'Île-du-Prince-Édouard exigeait que soit déclarée toute mortinaissance survenue après au moins 20 semaines de gestation, quel que soit le poids à la naissance.

Étant donné le manque d'uniformité des exigences de déclaration, les données sur les mortinaissances sont présentées pour une durée de gestation de 20 semaines ou plus (y compris les mortinaissances pour lesquelles on ne connaît pas la durée de la gestation) et pour une durée de gestation de 28 semaines ou plus (sans tenir compte des cas pour lesquels on ignore la durée de la gestation). Les données sur les mortinaissances sont totalisées selon le lieu de résidence habituel de la mère.

Naissance multiple Accouchement de plus d'un enfant, y compris les naissances vivantes et les mortinaissances.

Naissance prématurée (avant terme) Naissance qui survient avant la fin de la 37^e semaine de gestation.

Naissances totales Nombre total de naissances vivantes et de mortinaissances.

Naissance vivante Expulsion ou extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de la gestation, d'un produit de conception qui, après cette séparation, respire ou manifeste tout autre signe de vie, tel que battement du cœur, pulsation du cordon ombilical ou mouvement manifeste des muscles volontaires, que le cordon ombilical ait été coupé ou non ou que le placenta soit attaché ou non. Les données sur la natalité qui figurent dans la présente publication sont produites en se fondant sur le lieu de résidence habituel de la mère.

Parité Nombre total d'enfants vivants mis au monde par une femme (les mortinaissances sont exclues). Une femme dont la parité est nulle n'a mis aucun enfant vivant au monde; une femme dont la parité est égale à 1 a mis au monde un enfant vivant, celle dont la parité est égale à 2, deux enfants vivants, et ainsi de suite. Dans le cas d'un premier accouchement où naissent des jumeaux vivants, la parité de la femme est égale à 1 après la naissance du premier jumeau et elle est égale à 2 après la naissance du second.

Poids à la naissance Résultat de la première pesée du fœtus ou du nouveau-né effectuée immédiatement après la naissance et exprimée en grammes. Le *poids normal à la naissance* varie de 2 500 à 4 499 grammes.

- *Faible poids à la naissance* : Poids de naissance de moins de 2 500 grammes.
- *Très faible poids à la naissance* : Poids de naissance de moins de 1 500 grammes.
- *Poids extrêmement faible à la naissance* : Poids de naissance de moins de 1 000 grammes.
- *Poids élevé à la naissance* : Poids de naissance de 4 500 grammes ou plus.

Population Personnes dont le lieu de résidence habituel se situe au Canada, y compris les fonctionnaires canadiens en poste à l'étranger et les membres de leurs familles, les membres des Forces canadiennes stationnés à l'étranger et les membres de leurs familles, les équipages des navires marchands canadiens et les résidents non permanents au Canada.

Les statistiques de l'état civil se fondent sur des estimations démographiques corrigées pour mieux refléter la population du Canada; ces estimations sont obtenues par un rajustement à la hausse pour tenir compte du sous-dénombrement net du recensement et des résidents non permanents. La date de référence de ces estimations annuelles est le 1^{er} juillet.

Les estimations démographiques utilisées pour calculer les taux publiés ici figurent aux annexes 1 et 2 (p. 136-137) ainsi que dans la publication intitulée *Statistiques démographiques annuelles*, Statistique Canada, n° 91-213 au catalogue. Comme la Division de la démographie révisé fréquemment les estimations démographiques, celles qui sont présentées ici pourraient différer de celles publiées ailleurs.

Population type Population de référence dont on connaît la répartition par âge. Dans la présente publication, on s'est servi de la population estimative du Canada en 1991 pour calculer les taux comparatifs de mortalité (TCM, voir l'annexe 4 à la p. 141). L'utilisation d'une population type permet d'effectuer des comparaisons plus significatives de la mortalité, parce que l'on tient compte ainsi de la variation de la répartition par âge de la population au cours du temps et(ou) d'une région à l'autre.

Provinces et territoires Dans les tableaux et les graphiques, les noms des provinces et des territoires du Canada sont abrégés de la façon suivante : T.-N. (Terre-Neuve), Î.-P.-É. (Île-du-Prince-Édouard), N.-É. (Nouvelle-Écosse), N.-B. (Nouveau-Brunswick), QC (Québec), Ont. (Ontario), Man. (Manitoba), Sask. (Saskatchewan), Alb. (Alberta), C.-B. (Colombie-Britannique), Yn (Yukon) et T.N.-O. (Territoires du Nord-Ouest). Les estimations pour l'ensemble du Canada (CAN) incluent les territoires, même si les données pour ceux-ci ne sont pas présentées séparément. Les données sur les mariages et sur les divorces sont présentées selon le lieu de l'événement et celles sur les naissances, les mortinaissances et les décès, selon le lieu de résidence habituel (de la mère en cas de naissances et de mortinaissances).

Rang de naissance vivante Le rang de naissance vivante d'un nouveau-né est égal au

nombre d'enfants vivants auxquels la mère a donné naissance antérieurement plus un (le rang de naissance du premier enfant né est égal à 1, celui du deuxième est égal à 2, etc.). Les enfants nés vivants, mais qui sont décédés gardent leur rang de naissance. Les mortinaissances sont exclues.

Statistiques de l'état civil Renseignements recueillis, compilés et publiés sur les événements démographiques, comme les naissances vivantes, les mortinaissances, les décès, les mariages et les divorces. La plupart de ces renseignements sont recueillis en vertu de l'enregistrement obligatoire de ces événements à l'échelle tant provinciale que territoriale. Cependant, les statistiques sur le divorce sont fournies par le ministère de la Justice du Canada.

Taux de divortialité

- *Taux brut de divortialité* : Nombre de divorces pour 1 000 habitants.
- *Taux de divortialité par durée de mariage* : Taux de divortialité une année particulière pour une cohorte particulière de mariage. Par exemple, on calcule le taux de divortialité en 1996 pour les personnes qui se sont mariées en 1986 (c.-à-d. la cohorte des mariages de 1986) en divisant le nombre de divorces accordés en 1996 aux personnes qui se sont mariées en 1986 par le nombre de mariages célébrés en 1986. Si on multiplie le résultat par 1 000, on obtient le nombre de divorces en 1996 pour 1 000 mariages de 1986. (Ce taux est entaché d'un biais de grandeur inconnue qui résulte du décès de certains conjoints durant la période, ainsi que de l'immigration et de l'émigration [c.-à-d. les personnes qui immigreront d'une province ou d'un territoire à un autre ou qui immigreront au Canada ou en émigreront]. Les cas de divorce pour lesquels on ne connaît pas le nombre d'années de mariage sont ventilés en se fondant sur la répartition des divorces pour lesquels on connaît la durée du mariage.)
- *Indice synthétique de divortialité (ISD)* : Somme des taux de divortialité par durée de mariage. Dans la présente publication, la somme remonte 30 ans en arrière; autrement dit, elle correspond à la somme des taux de divortialité en rapport avec les mariages qui ont eu lieu de 1967 à 1996. On exprime cette mesure comme étant la proportion de couples mariés qui, en principe, divorceront avant leur 30^e anniversaire de mariage, compte tenu des taux de divortialité par durée de mariage calculés pour 1996 (p. ex., pour le Québec en 1996, l'ISD est de 457 pour 1 000 mariages, ce qui signifie que 45,7 % de mariages célébrés au Québec se solderont par un divorce avant le 30^e anniversaire de mariage si les conditions observées en 1996 se maintiennent).

Taux de fécondité

- *Taux de fécondité par âge (TFA)* : Nombre de naissances vivantes pour 1 000 femmes dans un intervalle d'âge donné. On s'est servi de groupes d'âge de cinq ans (allant de 15 à 19 ans à 45 à 49 ans) pour les totalisations. Les naissances enregistrées chez les femmes de moins de 15 ans ont été imputées au groupe des 15 à 19 ans et celles enregistrées chez les femmes de plus de 49 ans, au groupe des 45 à 49 ans.
- *Indice synthétique de fécondité (ISF)* : Nombre moyen de naissances vivantes qu'une

femme peut s'attendre à avoir au cours de sa vie, selon les taux de fécondité par âge (TFA) d'une année donnée. Pour 1996, l'ISF = [(TFA₁₉₉₆ des femmes de 15 à 19 ans + TFA₁₉₉₆ des femmes de 20 à 24 ans + ... + TFA₁₉₉₆ des femmes de 45 à 49 ans)] multiplié par 5 (c.-à-d. le nombre d'années d'âge dans chaque groupe).

Taux de mortalité

- *Taux brut de mortalité* : Nombre de décès pour 1 000 habitants.
- *Taux de mortalité par âge* : Nombre de décès pour 1 000 habitants observés une année donnée pour un groupe d'âge particulier. Les taux calculés séparément pour les hommes et pour les femmes sont appelés taux de mortalité selon l'âge et le sexe.
- *Taux comparatif de mortalité (TCM)* : Moyenne pondérée des taux de mortalité par âge qui permet d'effectuer des comparaisons plus significatives entre régions et(ou) entre périodes de référence. Dans la présente publication, les poids sont calculés d'après la répartition par âge de la population du Canada de 1991 (qui sert de norme), hommes et femmes confondus, entre 20 groupes d'âge. Les taux comparatifs de mortalité sont présentés selon la province ou le territoire, pour 100 000 habitants (hommes et femmes confondus) et selon l'année pour chaque sexe (c'est-à-dire pour 100 000 hommes ou femmes). (Les chiffres de population type, les poids et la formule utilisés pour calculer les taux comparatifs de mortalité figurent à l'annexe 4 [p. 141].)
- *Taux de mortalité infantile* : Nombre de décès infantiles pour 1 000 naissances vivantes.
- *Taux de mortalité néonatale précoce* : Nombre de décès néonataux précoces pour 1 000 naissances vivantes.
- *Taux de mortalité néonatale* : Nombre de décès néonataux pour 1 000 naissances vivantes.
- *Taux de mortalité périnatale* : Nombre de décès périnataux pour 1 000 naissances totales (c.-à-d. naissances vivantes et mortinaissances).
- *Taux de mortalité postnéonatale* : Nombre de décès postnéonataux pour 1 000 naissances vivantes.
- *Taux de mortinaissance* : Nombre de mortinaissances pour 1 000 naissances totales (naissances vivantes et mortinaissances).

Taux de mortinaissance Voir *Taux de mortalité*.

Taux de natalité Le *taux brut de natalité* est le nombre de naissances vivantes pour 1 000 habitants. Le *taux de natalité chez les adolescentes* est le nombre de naissances vivantes enregistrées chez les femmes de moins de 20 ans pour 1 000 femmes de 15 à 19 ans.

Taux de nuptialité

- *Taux brut de nuptialité* : Nombre de mariages pour 1 000 habitants.
- *Taux de nuptialité par âge (TNA)* : Nombre de mariages pour 1 000 hommes ou femmes appartenant à un groupe d'âge particulier. Chez les personnes de moins de 20 ans, on exprime le taux pour 1 000 personnes de 15 à 19 ans. (Les cas pour lesquels on ignore l'âge du marié ou de la mariée sont ventilés conformément à la répartition par âge des cas pour lesquels on possède les données.)
- *Indice synthétique de primonuptialité (ISP)* : Somme des taux de nuptialité par âge (TNA) calculée pour les personnes de 15 à 49 ans qui ne se sont jamais mariées. Pour 1996, $ISP = [(TNA_{1996} \text{ des personnes de 15 à 19 ans qui ne se sont jamais mariées} + TNA_{1996} \text{ des personnes de 20 à 24 ans qui ne se sont jamais mariées} + \dots + TNA_{1996} \text{ des personnes de 45 à 49 ans qui ne se sont jamais mariées})]$ multiplié par 5 (c.-à-d. le nombre d'années dans chaque groupe d'âge). On peut interpréter cette mesure comme étant la proportion d'hommes (ou de femmes) qui, en principe, se marieront pour la première fois avant leur 50^e anniversaire (selon les taux de nuptialité calculés pour une année particulière). (Les cas pour lesquels on ne connaît pas l'âge de la mariée ou du marié sont ventilés entre les catégories d'âge connu.)

12. Références

Références

British Columbia Vital Statistics Agency (BCVSA). *Selected Vital Statistics and Health Status Indicators, Annual Report 1996*, Victoria, 1997.

Fair, M. « Historique de la statistique de l'état civil au Canada : première partie – de 1605 à 1945 », *Rapports sur la santé* (Statistique Canada, n° 82-003 au catalogue), 1994, 6(3), p. 355-375.

Grebenik, E. et A. Hill. *International Demographic Terminology: Fertility, Family Planning and Nuptiality*, Union internationale pour l'étude scientifique de la population (UIESP), Liège (Belgique), 1974.

Greville, T.N.E. Short methods of constructing abridged life tables, *The Record of the American Institute of Actuaries*, 1943, 32(65), p. 29-62.

Joseph, K.S., M.S. Kramer, S. Marcoux *et al.* Determinants of preterm birth rates in Canada from 1981 through 1983 and from 1992 through 1994, *New England Journal of Medicine*, 1998, 339, p. 1434-1439.

Millar, W.J., S. Wadhera et C. Nimrod. « Naissances multiples : tendances et comportements au Canada, 1974-1990 », *Rapports sur la santé* (Statistique Canada, n° 82-003 au catalogue), 1992, 4(3), p. 223-250.

Nagnur, D. *Longevity and Historical Life Tables (Abridged), Canada and the Provinces, 1921-1981* (Statistique Canada, non catalogué), Ottawa, 1986.

Nagnur, D.G. *et al. Quality Assessment Study of Cause of Death Coding, Data Years 1979 and 1980* (Statistique Canada, non catalogué), Ottawa.

Nagnur, D.G., S.G. Currie et B. Heath. *Évaluation de la qualité des statistiques de l'état civil – étude pilote* (Statistique Canada, non catalogué), Ottawa, 1981.

Nations Unies. *Principes et recommandations pour un système de statistiques de l'état civil*, Études statistiques, Série M, n° 19, rev. 1, New York, 1974.

Nault, F. et A. Bélanger. *Le déclin du mariage au Canada de 1981 à 1991* (Statistique Canada, n° 84-536 au catalogue), Ottawa, 1996.

Organisation mondiale de la Santé (OMS). *Annuaire de statistiques sanitaires, 1996*, Genève, 1998.

Organisation mondiale de la Santé (OMS). *Annuaire de statistiques sanitaires, 1995*, Genève, 1995.

Organisation mondiale de la Santé (OMS). *Classification internationale des maladies, révision 1975, vol. 1 (CIM-9)*, Genève, 1977.

Organisation mondiale de la Santé (OMS). *Classification statistique internationale des maladies et problèmes de santé connexes, 10^e révision, vol. 1*, Genève, 1992.

Statistique Canada. *Causes de décès, 1995* (n° 84-208 au catalogue), Ottawa, 1997.

Statistique Canada. *Classification géographique type, 1971, 1976, 1981, 1986, 1991, 1996* (n° 12-571 au catalogue), Ottawa.

Statistique Canada. *Dictionnaire du recensement de 1996* (n° 92-351 au catalogue), Ottawa, 1997.

Statistique Canada. *Divorces, 1995* (n° 84-213 au catalogue), Ottawa, 1997.

Statistique Canada. *Indicateurs sur la santé* (n° 82-221XCB au catalogue), Ottawa, 1999.

Statistique Canada. *Les principales causes de décès à différents âges, Canada, 1995* (n° 84-503 au catalogue), Ottawa, 1997.

Statistique Canada. *Mariages, 1995* (n° 84-212 au catalogue), Ottawa, 1996.

Statistique Canada. *Mortalité — Liste sommaire des causes, 1995* (n° 84-209 au catalogue), Ottawa, 1997.

Statistique Canada. *Naissances et décès, 1995* (n° 84-210 au catalogue), Ottawa, 1997.

Statistique Canada. *Sommaire statistique de l'état civil, 1995* (article n° 84F0001), Ottawa, 1997.

Statistique Canada. *Statistique démographique annuelle, 1997* (n° 91-213 au catalogue), Ottawa, 1998.

Statistique Canada. *Tables de mortalité, Canada et provinces* (n° 84-537 au catalogue pour 1990-1992 [publiées en 1995], n° 84-532 au catalogue pour 1975-1977, 1980-1982 et 1985-1987), Ottawa.

Trudeau R. « Profil mensuel et quotidien de décès », *Rapports sur la santé* (Statistique Canada, n° 82-003 au catalogue), 1997, 9(1), p. 43-50.

Wadhera, S. *Statistiques choisies sur la mortalité, Canada, 1921-1990* (Statistique Canada, n° 82-548 au catalogue), Ottawa, 1994.

Wadhera, S. *Statistiques choisies sur la mortalité infantile et statistiques connexes, Canada, 1921-1990* (Statistique Canada, n° 82-549 au catalogue), Ottawa, 1993.

Wadhera, S. *Statistiques choisies sur la natalité et la fécondité, Canada, 1921 à 1990* (Statistique Canada, n° 82-553 au catalogue), Ottawa, 1993.

Wilkins, K. Commentaires sur « Le rôle du coroner en Ontario : interroger la mort pour protéger la vie », *Rapports sur la santé* (Statistique Canada, n° 82-003 au catalogue), 1994, 6(3), p. 353.

Young, J.G. et J.M. Wagner. « Le rôle du coroner en Ontario : interroger la mort pour protéger la vie », *Rapports sur la santé* (Statistique Canada, n° 82-003 au catalogue), 1994, 6(3), p. 339-352.