

**Canadian
Pari-Mutuel
Agency**



**Agence
canadienne du
pari mutuel**

L'Annexe des drogues 2006



Canada



**Agriculture et
Agroalimentaire Canada**

**Agriculture and
Agri-Food Canada**

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, (2006), représentée par l'Agence canadienne du pari mutuel. Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, ou par photocopie, ou autre, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable du Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux, Ottawa, Ontario, Canada K1A 1M4 ou à <copyright.droitdauteur@communication.gc.ca>.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	4
DONNÉES SUR L'ADMINISTRATION DES DROGUES	9
ANNEXE	102
INDEX	108

AVERTISSEMENT

Les informations sur les taux d'excrétion des drogues ne constituent pas une attestation, une garantie, une assurance, une promesse ou autre, que l'usage d'une de ces drogues selon les instructions donnera les résultats prévus. L'Agriculture et Agroalimentaire Canada n'est nullement responsable si les résultats ne sont pas les mêmes que ceux qui sont présentés ici.

L'emploi des informations continues dans le présent document n'annule ni ne réduit la responsabilité d'un entraîneur de s'assurer qu'avant une course, le cheval n'a reçu aucune des drogues énumérées à l'Annexe du *Règlement sur la surveillance du pari mutuel* et de se plier aux dispositions de ce Règlement et des règlements provinciaux sur les courses.

Les propriétaires, entraîneurs ou toute autre personne responsable ou prenant soin d'un cheval de course sont fortement encouragés à consulter leur propre vétérinaire pour obtenir des conseils et des instructions sur l'usage de toutes les drogues.

Les directives contenues dans la présente brochure ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

IMPORTANT
Chaque drogue qui a reçu l'autorisation de vente au Canada a un « numéro d'identification de drogue » (N.I.D.) qui est inscrit sur l'étiquette du produit.
L'étiquette des médicaments pour utilisation en médecine vétérinaire porte la mention: « (Pour) Usage vétérinaire seulement » ou « (Pour) Usage agricole seulement ».
LISEZ ATTENTIVEMENT LES ÉTIQUETTES DES PRODUITS

NOTES GÉNÉRALES

1. La présente brochure est fournie aux vétérinaires et aux propriétaires de chevaux à titre de renseignement. **L'Annexe des drogues est à jour jusqu'au 14^e juin, 2006.**
2. Le *Règlement sur la surveillance du pari mutuel* et l'Annexe peuvent être modifiés en tout temps.
3. Le dépistage et la corroboration, dans un échantillon officiel, d'une des drogues répertoriées dans l'Annexe doivent être considérés comme des épreuves positives en vertu du *Règlement sur la surveillance du pari mutuel*.
4. Cette édition remplace toutes les éditions précédentes.

<http://www.cpma-acpm.gc.ca>

1-800-326-3344 (Français)

1-800-268-8835 (Anglais)

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, (2006), représentée par l'Agence canadienne du pari mutuel. Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, ou par photocopie, ou autre, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable du Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux, Ottawa, Ontario, Canada K1A 1M4 ou à <copyright.droitdauteur@communication.gc.ca>.

N^o de catalogue A22-147/2006 F-PDF

ISBN 0-662-72064-4

BUREAU DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

Directrice exécutive
Agence canadienne du pari mutuel
1130 Morrison
Suite 100
Ottawa (ON) K2N 9N6
Téléphone : 613-949-0735
Télécopieur : 613-949-0750

ADRESSE POSTALE:
C.P. 5904
LCD Merivale
Ottawa (ON) K2C 3X7

CENTRE D'ÉTUDES DES DROGUES À USAGE ÉQUESTRE

Gestionnaire, Services vétérinaires
Agence canadienne du pari mutuel
Agriculture et Agroalimentaire
Canada
115, Sunnyridge Road
R.R. 1
Jerseyville (ON) L0R 1R0
Téléphone : 905-648-3033
Fax : 905-648-8425

LABORATOIRE DE RÉFÉRENCE ET RECHERCHE

Gestionnaire, Recherche et Analyse
1130 Morrison
Suite 100
Ottawa (ON) K2N 9N6
Téléphone : 613-949-0744
Télécopieur : 613-949-1538

BUREAUX RÉGIONAUX

Montréal

Gestionnaire régional
Agence canadienne du pari mutuel
Agriculture et Agroalimentaire
Canada
8150, boul. Métropolitain est
Pièce 330
Ville d'Anjou (QC) H1K 1A1
Téléphone : 514-351-1132
Fax : 514-351-1182

Toronto

Gestionnaire régional
Agence canadienne du pari mutuel
Agriculture et Agroalimentaire
Canada
135, promenade Queens Plate
Unité 550
Toronto (ON) M9W 6V1
Téléphone : 416-743-2250
Fax : 416-743-7613

Vancouver

Gestionnaire régional
Agence canadienne du pari mutuel
Agriculture et Agroalimentaire
Canada
7337, rue 137^e, Pièce 406
Surrey (BC) V3W 1A4
Téléphone : 604-502-5831
Fax : 604-502-5834

INTRODUCTION

L'Agriculture et Agroalimentaire Canada, par l'entremise du Programme de surveillance du contrôle des drogues de l'Agence canadienne du pari mutuel, fait des recherches sur l'administration de médicaments et drogues à usage équin. Les sujets expérimentaux sont les juments Standardbred logées dans les écuries du Centre d'études des drogues à usage équestre du ministère. Les analyses ont été effectuées par les laboratoires officiels de courses au Canada selon les mêmes méthodes que pour les échantillons habituels.

Ces recherches ont mené, entre autres, à la préparation de tableaux, donnant le temps **approximatif** durant lequel certaines substances peuvent être dépistées dans le sang et l'urine des chevaux. Ces données, répétons-le, sont approximatives. En effet, l'absorption et l'élimination des drogues dépendent de nombreux facteurs, notamment de la bête (âge, sexe, etc.), de son milieu (alimentation, entraînement, etc.) et de la substance (dose, mélange, etc.). À noter que la dose varie parfois selon la préparation et le fabricant. Lisez bien le mode d'emploi au préalable. Tous ces facteurs considérés, chaque cheval a une vitesse de métabolisme qui lui est propre. Consultez votre vétérinaire pour obtenir des conseils et des instructions sur l'administration de drogues à votre cheval.

Les tableaux ne sont fournis qu'à titre d'information et ne remplacent ni n'annulent d'aucune façon le principe de la responsabilité de se plier au *Règlement sur la surveillance du pari mutuel* et aux règlements provinciaux sur les courses. Si ce n'est déjà fait, assurez-vous de bien connaître ces règlements.

L'Agriculture et Agroalimentaire Canada et les laboratoires officiels de contrôle des chevaux de courses déclinent toute responsabilité advenant que l'administration de drogues selon les quantités et les délais donnés dans la présente publication, conduite à une épreuve positive.

La page suivante décrit des renseignements semblables à ceux qu'on retrouve dans la brochure pour décrire une drogue en particulier.

Nom générique (ou courant) du médicament
p. ex. **LIDOCAÏNE**

Marques de commerce et autres noms

p. ex. Octocaïne, Lignocaïne, Xylocaïne, Duracaïne, Lido

Type

p. ex. anesthésique local (voire glossaire)

Voies d'administration


p. ex. Inhalateur Aeromask (AER)	Injection intraveineuse (IV)
Infiltration (INFIL)	Nébulisation (NEB)
Injection intra-articulaire (IA)	Orale (PO)
Injection intramusculaire (IM)	Injection sous-cutanée (SC)
Injection intrasynoviale (ISY)	Topique (TOP)
Intratrachéale (IT)	

Posologie

Nombre de chevaux	Marque de commerce du	Dose: p. ex. 500 mg
(juments	produit administré	(milligrammes)
Standardbred)		1 g (1 gramme = 1 000 mg)
		0,5 mg/kg (1 kilogramme = 1 000 g)

Limite de dépistage

Exemple de délai (suite à l'administration finale) après lequel aucun médicament ni métabolite n'a été dépisté par les méthodes courantes.



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

GLOSSAIRE – TYPE DE MÉDICAMENTS

Adjuvant :	qui favorise l'absorption d'autres drogues.
Analgésique :	qui soulage la douleur.
Anesthésique général :	qui produit la perte de sensibilité et le niveau de sédation nécessaires aux fins d'une intervention chirurgicale importante.
Anesthésique local :	médicament qui atténue les sensations (toucher, douleur) dans une certaine partie du corps.
Antagonist du récepteur H ₂ de l'histamine :	drogue qui empêche la sécrétion d'acide gastrique et aide à soigner les ulcères peptiques.
Antiallergique respiratoire :	drogue qui aide à lutter contre les maladies allergiques respiratoires et la toux et qui réduit l'hyperactivité pulmonaire.
Antibactérien :	médicament qui détruit les bactéries ou en prévient la croissance.
Anticholinergique :	drogue qui combat les spasmes des bronches réduit les sécrétions durant la respiration ainsi que l'hypermotilité gastro-intestinale.
Anticongestion :	drogue qui soulage la congestion nasale.
Anticonvulsif :	qui bloque ou soulage les contractions involontaires des muscles.
Antidépresseur :	qui soulage la dépression et qui peut modifier le comportement.
Antifibrinolytique :	qui empêche la lyse des fibrines qui sont essentielles à la coagulation du sang.
Anthelminthique :	agent antiparasitaire ou vermifuge.

GLOSSAIRE – TYPE DE MÉDICAMENTS (suite)

Antihistaminique :	qui soulage les symptômes d'allergie. De nombreux antihistaminiques ont un effet sédatif.
Antihypertenseur :	qui abaisse la pression sanguine anormalement élevée et la tension émotive.
Antiinflammatoire :	qui réduit l'enflure, la rougeur et la douleur locales causées par une blessure ou une infection.
Antipyrétique :	qui combat la fièvre.
Antitussif :	qui combat la toux.
Bronchodilatateur :	qui augmente la diamètre des tubes bronchiques, facilitant ainsi la respiration.
Corticostéroïde synthétique :	médicament qui produit un effet semblable à celui d'une hormone corticoïde mais distinct de celui de l'hormone naturelle du point de vue chimique.
D.A.I.N.S. :	drogue antiinflammatoire non stéroïde.
Diurétique :	qui stimule la production et l'excrétion d'urine.
Expectorant :	qui favorise l'expulsion du mucus des bronches.
Inhibiteur de sécrétion d'acide gastrique :	qui prévient la sécrétion d'acide gastrique et qui facilite le traitement des ulcères.
Kératolitique :	qui provoque une escarrification des couches superficielles de la peau.
Mucolytique :	médicament qui décompose ou liquéfie le mucus.

GLOSSAIRE – TYPE DE MÉDICAMENTS (suite)

Ocytocique :	drogue qui produit des contractions rythmiques de l'utérus.
Relaxant musculaire :	qui détend les muscles locomoteurs.
Révulsif :	qui provoque une légère irritation superficielle de la peau dans le but de soulager une inflammation profonde.
Sédatif :	qui calme et réduit l'excitation nerveuse.
Sympathométique :	drogue qui a des effets similaires à ceux que l'on obtient en stimulant le système nerveux sympathique.
Tranquillisant :	qui abaisse l'anxiété et autres symptômes liés au stress.
Vasodilatateur :	médicament qui dilate les vaisseaux sanguins.

Marques de commerce et autres noms

Acétylpromazine, Acétazine, Atravat, Anatron, Acéprozine, Tranzoline, Tranquavet

Type

Tranquillisant


Voies d'administration

IM, IV, Orale

Posologie

2 chevaux	Atravat	10 mg	IM	(une seule administration)
6 chevaux	Atravat	25 mg	IM	(une seule administration)
4 chevaux	Atravat	25 mg	IV	(une seule administration)
2 chevaux	Atravat	10 mg	PO	(une seule administration)
4 chevaux	Atravat	50 mg	PO	(une seule administration)
2 chevaux	Atravat	10 mg	PO	(une fois par jour, 3 jours)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

ACÉTAMINOPHÈNE

Marques de commerce et autres noms

Paracétamol, Atasol, Tylenol, Exdol, Dolophen, Paraphen, Robigesic; autres

Type

Analgésique; Antipyrétique

Voies d'administration


Orale

Posologie

4 chevaux Atasol 20 mg/kg (une seule administration)

4 chevaux Tylenol 10 g (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

ACIDE AMINOCAPROÏQUE

Marques de commerce et autres noms

Amicar

Type

Antifibrinolytique

Voies d'administration


IV

Posologie

4 chevaux Amicar 2,5 g (une seule administration)

4 chevaux Amicar 5,0 g (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

ACIDE ÉTHACRYNIQUE

Marques de commerce et autres noms

Edecrin

Type

Diurétique


Voies d'administration

IV, Orale

Posologie

8 chevaux	Edecrin	50 mg	IV	(une seule administration)
4 chevaux	Edecrin	200 mg	PO	(une seule administration)
4 chevaux	Edecrin	400 mg	PO	(une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

ACIDE MÉCLOFÉNAMIQUE

Marques de commerce et autres noms

Arquel

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)

Voies d'administration


Orale

Posologie

4 chevaux Arquel 1 g (une seule administration)

4 chevaux Arquel 1 g (une fois par jour, 3 jours)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

ACIDE MÉFÉNAMIQUE

Marques de commerce et autres noms

Ponstan

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)


Voies d'administration

Orale

Posologie

8 chevaux Ponstan 2 g (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

ACIDE THIOSALICYLIQUE

Marques de commerce et autres noms

Thiosalicylate de Sodium

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)


Voies d'administration

IV, IM

Posologie

4 chevaux	Thiosalicylate de Sodium	1 g	IV	(une seule administration)
4 chevaux	Thiosalicylate de Sodium	1 g	IM	(une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

ACIDE TIAPROFÉNIQUE

Marques de commerce et autres noms

Surgam

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)


Voies d'administration

Orale

Posologie

4 chevaux Surgam 2,4 g (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Marques de commerce et autres noms

Sulfure d'Atropine

Type

Anticholinergique


Voies d'administration

IV

Posologie

4 chevaux Sulfure d'Atropine 15 mg (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

AZAPÉRONE

Marques de commerce et autres noms

Stresnil

Type

Tranquillisant


Voies d'administration

IM

Posologie

8 chevaux Stresnil 40 mg (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

BÉTAMÉTHASONE

Marques de commerce et autres noms

Bétasone

Type

Antiinflammatoire; Corticostéroïde synthétique


Voies d'administration

IM

Posologie

4 chevaux Bétasone 35 mg (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

BUPIVACAÏNE

Marques de commerce et autres noms

Marcaïne

Type

Anesthésique local


Voies d'administration

IM

Posologie

8 chevaux Marcaïne 50 mg (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Marques de commerce et autres noms

Torbugesic

Type

Analgésique/Antitussif

Voies d'administration

IV


Posologie

4 chevaux Torbugesic 5 mg (une seule administration)

4 chevaux Torbugesic 20 mg (une seule administration)

4 chevaux Torbugesic 50 mg (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

CARPROFÈNE

Marques de commerce et autres noms

Rimadyl

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S)


Voies d'administration

Orale

Posologie

4 chevaux Rimadyl 1 g (deux fois par jour, 5 jours)

Limite de dépistage



À cette dose, le dépistage chez la plupart des chevaux serait positif au-delà de 120 heures après le dernier traitement.

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Marques de commerce et autres noms

Nesacaïne

Type

Anesthésique local


Voies d'administration

Infiltration

Posologie

4 chevaux Nesacaïne 80 mg (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

CHLORPHÉNIRAMINE

Marques de commerce et autres noms

Chlortripolon, Histalon, Novopheniram, Chlorophen, Inactihist

Type

Antihistaminique


Voies d'administration

IM

Posologie

8 chevaux Inactihist 75 mg (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

CHLORPROMAZINE

Marques de commerce et autres noms

Largactil, Chlorpromanyl, Chlorprom, G-Promazine, Apo
Chlorpromazine, Novochlorpromazine

Type

Tranquillisant


Voies d'administration

IM

Posologie

4 chevaux Largactil 100 mg (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

CIMÉTIDINE

Marques de commerce et autres noms

Tagamet, Peptol; autres

Type

Antagoniste du récepteur H_2 de l'histamine


Voies d'administration

Orale

Posologie

4 chevaux Tagamet 4 g (deux fois par jour, 3 jours)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Marques de commerce et autres noms

Ventipulmin

Type

Bronchodilatateur

Voies d'administration

IV, Orale


Posologie

4 chevaux Ventipulmin 0,30 mg IV (une seule administration)

4 chevaux Ventipulmin 0,32 mg PO (une seule administration)

4 chevaux Ventipulmin 0,40 mg PO (deux fois par jour, 5 jours)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

CLOMIPRAMINE

Marques de commerce et autres noms

Clomicalm

Type

Antidépresseur


Voies d'administration

Orale

Posologie

4 chevaux Clomicalm 500 mg (deux fois par jour, 4 jours)

Limite de dépistage



À cette dose, le dépistage chez la plupart des chevaux serait positif au-delà de 120 heures après le dernier traitement.

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Marques de commerce et autres noms

Cromovet, Cromolyn, Intal

Type

Antiallergique respiratoire


Voies d'administration

NEB, IT, AER

Posologie

4 chevaux	Cromovet	80 mg	NEB	(une seule administration)
2 chevaux	Cromovet	80 mg	NEB	(une fois par jour, 3 jours)
4 chevaux	Cromovet	80 mg	IT	(une seule administration)
2 chevaux	Cromovet	80 mg	IT	(une fois par jour, 3 jours)
4 chevaux	Intal	10 mg	AER	(une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

CYPROHEPTADINE

Marques de commerce et autres noms

Periactin

Type

Antihistaminique


Voies d'administration

Orale

Posologie

4 chevaux Periactin 40 mg (une fois par jour, 5 jours)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Marques de commerce et autres noms

Dantrium

Type

Relaxant musculaire


Voies d'administration

Orale

Posologie

8 chevaux	Dantrium	1 g	(une seule administration)
4 chevaux	suspension orale de Dantrolène	80 mg	(une fois par jour, 5 jours)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

DEMBREXINE

Marques de commerce et autres noms

Sputolysin

Type

Mucolytique/Expectorant

Voies d'administration


Orale

Posologie

4 chevaux Sputolysin 150 mg (une seule administration)

4 chevaux Sputolysin 150 mg (deux fois par jour, 4 jours)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Marques de commerce et autres noms

Dormosedan

Type

Analgésique, sédatif


Voies d'administration

IV

Posologie

4 chevaux	Dormosedan	5 mg (une seule administration)
4 chevaux	Dormosedan	20 mg (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

DEXAMÉTHASONE

Marques de commerce et autres noms

Azium, Decadron T.B.A.

Type

Antiinflammatoire/Corticostéroïde synthétique


Voies d'administration

IM, IV, ISY, Orale, Nébulation

Posologie

4 chevaux	Azium	20 mg	IM	(une seule administration)
4 chevaux	Azium	20 mg	IV	(une seule administration)
4 chevaux	Azium	25 mg	IV	(une seule administration)
4 chevaux	Azium SP	25 mg	IV	(une seule administration)
4 chevaux	Decadron			
	T.B.A.	40 mg	ISY	(une seule administration)
4 chevaux	Azium	10 mg	PO	(une fois par jour, 5 jours)
1 cheval	Azium SP	80 mg	NEB	(une seule administration)
1 cheval	Azium SP	160 mg	NEB	(une seule administration)
2 chevaux	Azium SP	220 mg	NEB	(une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

DEXTROMÉTHORPHANE

Marques de commerce et autres noms

Demo-Cinéol, Sedatuss, Broncho-Grippol, Tussorphan, Robidex, Balminil; autres

Type

Antitussif


Voies d'administration

Orale

Posologie

4 chevaux	Sirop de dextrométhorphan	300 mg	(une seule administration)
-----------	---------------------------	--------	----------------------------

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

DIAZÉPAM

Marques de commerce et autres noms

Valium

Type

Tranquillisant

Voies d'administration


IM, PO

Posologie

4 chevaux Valium 10 mg IM (une seule administration)

4 chevaux Apo Diazépam 30 mg PO (une fois par jour, 5 jours)

Limite de dépistage



À cette dose, le dépistage chez la plupart des chevaux serait positif au-delà de 120 heures après le dernier traitement.

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Marques de commerce et autres noms

Voltaren; Diclofénac Sodium Gel

Type


Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)

Voies d'administration

Orale, Topique (friction de la patte)

Posologie

8 chevaux	Voltaren	500 mg	PO	(une seule administration)
4 chevaux	Diclofénac Sodium gel	180 mg	TOP	(deux fois par jour, 5 jours)

Limite de dépistage

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

DIFLUNISAL

Marques de commerce et autres noms

Dolobid

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)


Voies d'administration

Orale

Posologie

8 chevaux Dolobid 5 g (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

DIMÉTHYLSULFOXYDE

Marques de commerce et autres noms

DMSO, Domoso, Rimso, Kemsol

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.); Adjuvant


Voies d'administration

Topique (friction de la patte), IV

Posologie

4 chevaux	Gel Domoso 90 %	19,8 g	TOP	(une seule administration)
2 chevaux	Solution Domoso	19,8 g	IV	(une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

DIPHÉNHYDRAMINE

Marques de commerce et autres noms

Banadryl, Sominex, Compoz, Nytol; autres

Type

Antihistaminique

Voies d'administration


IM, Orale

Posologie

4 chevaux Benadryl 250 mg IM (une seule administration)

4 chevaux Benadryl 500 mg PO (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Marques de commerce et autres noms

Methampyrone, Novolate, Diprone, Novin, Myovin, Dipyrone 50 %, Metamizol; autres

Type

Analgésique, Antipyrétique


Voies d'administration

IM, IV

Posologie

8 chevaux	Dipyrone 50 %	7,5 g	IM	(une seule administration)
4 chevaux	Dipyrone 50 %	10 g	IM	(deux fois par jour, 5 jours)
4 chevaux	Novolate	7,5 g	IV	(une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

DYPHYLLINE

Marques de commerce et autres noms

Protophylline

Type

Bronchodilatateur


Voies d'administration

Orale

Posologie

4 chevaux Protophylline 5 g (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Marques de commerce et autres noms

Antiphrine, Anti-Histamine

Type

Sympathomimétique, anticongestif


Voies d'administration

IM, Orale

Posologie

4 chevaux	Antiphrine	200 mg	PO (une seule administration)
4 chevaux	Anti-Histamine	200 mg	IM (une seule administration)
4 chevaux	Anti-Histamine	300 mg	PO (deux fois par jour, 6 jours)
	Orale		

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

ERGONOVINE

Marques de commerce et autres noms

Ergonovine (maléate)

Type

Ocytocique

Voies d'administration


IV

Posologie

4 chevaux Ergonovine Maléate 2 mg (une seule administration)

4 chevaux Ergonovine Maléate 4 mg (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Marques de commerce et autres noms

Ultradol

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S)


Voies d'administration

Orale

Posologie

4 chevaux Ultradol 2 g (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

FAMOTIDINE

Marques de commerce et autres noms

Pepcid, Ulcidine

Type

Antagoniste du récepteur H₂ de l'histamine


Voies d'administration

Orale

Posologie

4 chevaux Pepcid 200 mg (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Marques de commerce et autres noms

Berotec

Type

Bronchodilatateur


Voies d'administration

AER

Posologie

4 chevaux Berotec 1 mg (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

FLOCTAFÉNINE

Marques de commerce et autres noms

Idarac

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)


Voies d'administration

Orale

Posologie

4 chevaux Idarac 2 g (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Marques de commerce et autres noms

Flucort

Type

Antiinflammatoire/ Corticostéroïde synthétique


Voies d'administration

IM, IV

Posologie

4 chevaux	Flucort	5 mg	IM	(une seule administration)
8 chevaux	Flucort	5 mg	IV	(une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

FLUNIXINE

Marques de commerce et autres noms

Banamine

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)


Voies d'administration

IV, IM, Orale

Posologie

4 chevaux	Banamine	500 mg	PO	(une seule administration)
6 chevaux	Banamine	500 mg	IV	(une seule administration)
2 chevaux	Banamine	500 mg	IM	(une seule administration)
2 chevaux	Banamine	500 mg	IM	(une fois par jour, 3 jours)
2 chevaux	Banamine	500 mg	IM	(une fois par jour, 5 jours)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Marques de commerce et autres noms

Ansaid

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)


Voies d'administration

Orale

Posologie

4 chevaux Ansaid 2 g (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

FUROSÉMIDE

Marques de commerce et autres noms

Lasix, Frusémide

Type

Diurétique; Antihypertenseur


Voies d'administration

IV, IM, Orale

Posologie

12 chevaux	Lasix	150 mg	IV	(une seule administration)
2 chevaux	Lasix	200 mg	IV	(une seule administration)
12 chevaux	Lasix	250 mg	IV	(une seule administration)
4 chevaux	Lasix	400 mg	IV	(une seule administration)
2 chevaux	Lasix	200 mg	IV	(une fois par jour, 3 jours)
2 chevaux	Lasix	200 mg	IM	(une seule administration)
4 chevaux	Lasix	400 mg	IM	(une seule administration)
2 chevaux	Lasix	200 mg	IM	(une fois par jour, 3 jours)
4 chevaux	Lasix	2 g	PO	(une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Marques de commerce et autres noms

Robinul

Type

Anticholinergique


Voies d'administration

IV, IM

Posologie

4 chevaux	Robinul	2 mg	IV	(une seule administration)
4 chevaux	Robinul	2 mg	IM	(une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

GUAIFÉNÉSINE

Marques de commerce et autres noms

Éther de Gaiacol et de Glycéryle, Gaiacolate de Glycéryle, Gecolate, Robitussin; autres

Type

Expectorant

Voies d'administration


IV, Orale

Posologie

4 chevaux Gecolate 2 g IV (une seule administration)

4 chevaux Sirop de
Guaifénésine 2 g PO (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

HYDROCHLOROTHIAZIDE

Marques de commerce et autres noms

Vetazide, Hydro Aquil, Hydrodiril, Urozide, Edemol; autres

Type

Diurétique; Antihypertenseur


Voies d'administration

IV, Orale

Posologie

4 chevaux	Vetazide	100 mg	IV	(une seule administration)
4 chevaux	Hydro Aquil	225 mg	PO	(une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

IBUPROFÈNE

Marques de commerce et autres noms

Motrin

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)


Voies d'administration

Orale

Posologie

4 chevaux Motrin 12 g (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Marques de commerce et autres noms

Lozide

Type


Diurétique, Antihypertenseur

Voies d'administration

Orale

Posologie

4 chevaux Lozide 40 mg (une seule administration)

Limite de dépistage

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

INDOMÉTHACINE

Marques de commerce et autres noms

Indocid, Infrocin, Novométhacine

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)


Voies d'administration

Orale

Posologie

4 chevaux Indocid 1,0 g (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Marques de commerce et autres noms

Predef 2X, 9-Fluoroprednisolone

Type

Antiinflammatoire/Corticostéroïde synthétique


Voies d'administration

IM

Posologie

4 chevaux	Predef 2X	15 mg	(une seule administration)
4 chevaux	Predef 2X	24 mg	(une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

ISOXSUPRINE

Marques de commerce et autres noms

Vasodilan

Type

Vasodilateur


Voies d'administration

Orale

Posologie

4 chevaux Vasodilan 300 mg (deux fois par jour, 4 jours)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Marques de commerce et autres noms

Ketaset, Ketalar, Vetalar

Type

Anesthésique général


Voies d'administration

IV

Posologie

4 chevaux Ketaset 700 mg (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

KÉTOPROFÈNE

Marques de commerce et autres noms

Ketofen, Anafen

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)


Voies d'administration

IV

Posologie

4 chevaux Anafen 1,2 g (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Marques de commerce et autres noms

Zaditen

Type

Antiallergique respiratoire


Voies d'administration

Orale

Posologie

4 chevaux Zaditen 20 mg (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

LIDOCAÏNE

Marques de commerce et autres noms

Lignocaïne, Xylocaïne, Duracaïne, Lido, Octocaïne, Lignospan

Type

Anesthésique local

Voies d'administration

Topique (friction de la patte), Infiltration


Posologie

4 chevaux Lidocaïne 150 mg INFIL (une seule administration)
pure

4 chevaux Lidocaïne 500 mg TOP (une seule administration)
pure

(Nota : Le traitement topique contient aussi 18 g DMSO)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Marques de commerce et autres noms

Metacam

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S)


Voies d'administration

Orale

Posologie

4 chevaux Metacam 90 mg (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

MEPIVACAÏNE

Marques de commerce et autres noms

Carbocaïne

Type

Anesthésique local

Voies d'administration


IA, SC

Posologie

4 chevaux Carbocaïne 300 mg IA (une seule administration)

4 chevaux Carbocaïne 300 mg SC (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Marques de commerce et autres noms

Robaxin

Type

Relaxant musculaire


Voies d'administration

IV, Orale

Posologie

4 chevaux	Robaxin	5 g	IV	(une seule administration)
4 chevaux	Robaxin	5 g	PO	(une seule administration)
4 chevaux	Robaxin	3 g	PO	(deux fois par jour, 4 jours, une fois par jour, 5 ^e jour)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

MÉTHYLPREDNISOLONE

Marques de commerce et autres noms

Dépo Medrol, Méthysone, Dépocoïde; autres

Type

Antiinflammatoire/Corticostéroïde synthétique


Voies d'administration

IA, IM, ISY

Posologie

4 chevaux	Dépo Medrol	100 mg	IA	(une seule administration) vétérinaire
4 chevaux	Dépo Medrol	200 mg	IA	(une seule administration) vétérinaire
4 chevaux	Dépo Medrol	200 mg	IM	(une seule administration) vétérinaire
4 chevaux	Dépo Medrol	200 mg	ISY	(une seule administration) vétérinaire
4 chevaux	Dépo Medrol	640 mg	ISY	(une seule administration) vétérinaire

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Marques de commerce et autres noms

Relafen

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S)


Voies d'administration

Orale

Posologie

4 chevaux Relafen 5 g (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

NAPROXÈNE

Marques de commerce et autres noms

Naprosyn, Anaprox, Equiproxen

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)

Voies d'administration


Orale

Posologie

4 chevaux Naprosyn 4,5 g (une seule administration)

4 chevaux Equiproxen 2 g (deux fois par jour, 5 jours)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Marques de commerce et autres noms

Tilade, Alocril

Type

Antiinflammatoire bronchiale; Antiallergique respiratoire


Voies d'administration

Aeromask

Posologie

4 chevaux Tilade 16 mg (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

OXAPROZIN

Marques de commerce et autres noms

Daypro

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S)


Voies d'administration

Orale

Posologie

4 chevaux Daypro 4,8 g (une seule administration)

Limite de dépistage



À cette dose, le dépistage chez la plupart des chevaux serait positif au-delà de 120 heures après le dernier traitement.

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

OXYPHENBUTAZONE

Marques de commerce et autres noms

Tandearil, Oxybutazone

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)


Voies d'administration

Orale

Posologie

4 chevaux Tandearil 4 g (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

PENTAZOCINE

Marques de commerce et autres noms

Talwin

Type

Analgésique


Voies d'administration

IM

Posologie

4 chevaux Talwin 0,68 mg/kg (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Marques de commerce et autres noms

Trental, Navicon, Oxpentifylline, Vazofirin

Type

Vasodilateur


Voies d'administration

Orale

Posologie

4 chevaux	Trental	4 g	(une seule administration)
4 chevaux	Navicon	2 g	(deux fois par jour, 4 jours)
4 chevaux	Navicon	2 g	(trois fois par jour, 5 jours)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

PHÉNOTIAZINE

Marques de commerce et autres noms

Phénotiazine Drench Grade en poudre, Pheno Sweet, Gardo n° 163

Type

Antihelminthique


Voies d'administration

Orale

Posologie

4 chevaux	Phénotiazine Drench Grade en poudre	4,75 g	(une seule administration)
-----------	---	--------	----------------------------

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Marques de commerce et autres noms

Bute, Butazolidin, Dinz, Butazone, Equipalazone, Azrabute, Centrabute

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)

Voies d'administration


IV, Orale

Posologie

2 chevaux	Phénylbutazone injectable	3 g	IV	(une seule administration)
2 chevaux	Phénylbutazone injectable	3 g	IV	(une fois par jour, 3 jours)
2 chevaux	Bute	3 g	PO	(une seule administration)
2 chevaux	Bute	3 g	PO	(une fois par jour, 3 jours)

Limite de dépistage

Voir aussi p.106



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

PHÉNYTOÏNE

Marques de commerce et autres noms

Dilantin, Suspension Phénytoïne

Type

Anticonvulsif


Voies d'administration

Orale

Posologie

4 chevaux	Suspension Phénytoïne	3 g	(deux fois par jour, 3 jours)
-----------	--------------------------	-----	-------------------------------

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Marques de commerce et autres noms

Feldene

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)


Voies d'administration

Orale

Posologie

4 chevaux Feldene 100 mg (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

PREDNISOLONE

Marques de commerce et autres noms

Solu Delta Cortef; acétate de prednisolone

Type

Antiinflammatoire/Corticostéroïde synthétique

Voies d'administration

IV, Orale


Posologie

4 chevaux Solu Delta Cortef 75 mg IV (une seule administration)

4 chevaux Solu Delta Cortef 150 mg IV (une seule administration)

4 chevaux Acétate de 400 mg PO (deux fois par jour, 5 jours)
prednisolone

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Marques de commerce et autres noms

Deltasone

Type

Antiinflammatoire/Corticostéroïde synthétique

Voies d'administration


Orale

Posologie

4 chevaux Deltasone 0,5 g (une seule administration)

4 chevaux Deltasone 1,0 g (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

HYDROCHLORURE DE PROCAÏNE

Marques de commerce et autres noms

Novocaïne

Type

Anesthésique local


Voies d'administration

Infiltration

Posologie

4 chevaux	Novocaïne	80 mg	(une seule administration)
4 chevaux	Novocaïne	120 mg	(une seule administration)
4 chevaux	Novocaïne	160 mg	(une seule administration)
4 chevaux	Novocaïne	200 mg	(une seule administration)
4 chevaux	Novocaïne	1600 mg	(une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

PÉNICILLINE G PROCAÏNE

Marques de commerce et autres noms

Derapen-A, Azimycine, Cillimycine, Penamycine, Suspension Pen-Strep, Pen DI Strep, Éthacilline, Diathal, Prémélange Pro-Pen, Formule spéciale 17900; autres

Type

Antibiotique (contient un anesthésique local : Procaïne)

Voies d'administration

IM, Orale, Topique

Posologie


4 chevaux	Derapen-A	2 million UI*	IM	(une seule admin.)
4 chevaux	Azimycine	4 million UI	IM	(une seule admin.)
4 chevaux	Cillimycine	4 million UI	IM	(une seule admin.)
4 chevaux	Penamycine	4 million UI	IM	(une seule admin.)
4 chevaux	Suspension Pen-Strep	4 million UI	IM	(une seule admin.)
4 chevaux	Pen DI Strep	4 million UI	IM	(une seule admin.)
4 chevaux	Pen DI Strep	4 million UI	IM	(une fois par jour, 5 jours)
4 chevaux	Éthacilline	6 million UI	IM	(une seule admin.)
4 chevaux	Diathol	2 million UI	IM	(une seule admin.)
4 chevaux	(contient aussi 200 mg hydrochlorure de procaïne) Prémélange Pro-Pen	4 million UI	PO	(une seule admin.)
4 chevaux	Formule spéciale 17900	0,2 million UI	TOP	(une seule admin.)

*UI = Unités internationales (1 million UI pénicilline G procaïne contiennent 424 mg procaïne)

PÉNICILLINE G PROCAÏNE (suite)

Limite de dépistage

Voir aussi p.106



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Marques de commerce et autres noms

Promanyl, Sparine

Type

Tranquillisant

Voies d'administration


IM

Posologie

4 chevaux Promanyl 250 mg (une seule administration)

4 chevaux Promanyl 450 mg (une seule administration))

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

PYRILAMINE

Marques de commerce et autres noms

Histosol, Mépyramine, Anti-Histamine (contient éphédrine)

Type

Antihistaminique

Voies d'administration


IM, Orale

Posologie

4 chevaux Histosol 500 mg IM (une seule administration)

4 chevaux Anti-Histamine 750 mg PO (deux fois par jour, 6 jours)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Marques de commerce et autres noms

Zantac

Type

Antagoniste du récepteur H₂ de l'histamine


Voies d'administration

Orale

Posologie

4 chevaux Zantac 3 g (deux fois par jour, 4 jours)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

ROMIFIDINE

Marques de commerce et autres noms

Sedivet

Type

Sédatif

Voies d'administration


IV

Posologie

4 chevaux Sedivet 20 mg (une seule administration)

4 chevaux Sedivet 50 mg (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Marques de commerce et autres noms

Ventolin

Type

Bronchodilatateur


Voies d'administration

AER

Posologie

4 chevaux Ventolin 0,8 mg (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

SALMÉTÉROL

Marques de commerce et autres noms

Serevent

Type

Bronchodilatateur


Voies d'administration

AER

Posologie

4 chevaux Serevent 0,25 mg (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Marques de commerce et autres noms

Clinoril

Type


Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)

Voies d'administration

Orale

Posologie

4 chevaux Clinoril 1,0 g (une seule administration)

Limite de dépistage

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

TÉNOXICAME

Marques de commerce et autres noms

Mobiflex

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S)


Voies d'administration

Orale

Posologie

4 chevaux Mobiflex 200 mg (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Marques de commerce et autres noms

Brethine, Bricanyl

Type

Bronchodilatateur


Voies d'administration

Orale, SC

Posologie

4 chevaux	Brethine	1 mg	SC	(une seule administration)
4 chevaux	Bricanyl	40 mg	PO	(une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

THÉOPHYLLINE

Marques de commerce et autres noms

Aminophylline : Somophyllin, Aminophyl, Corophyllin, Phyllocontin

Théophylline : Acet-Am, Quibron, Asthmophylline, Theolair; autres

Type

Bronchodilatateur


Voies d'administration

IV

Posologie

4 chevaux Aminophylline 1,5 g (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

TRIAMCINOLONE (ACÉTONIDE)

Marques de commerce et autres noms

Vetalog

Type

Antiinflammatoire/Corticostéroïde synthétique


Voies d'administration

IM, IA

Posologie

4 chevaux	Vetalog	24 mg	IM	(une seule administration)
4 chevaux	Vetalog	30 mg	IA	(une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

TRICHLORMÉTHIAZIDE

Marques de commerce et autres noms

Naquasone

Type

Diurétique; Antihypertenseur


Voies d'administration

Orale, IM, IV

Posologie

4 chevaux	Naquasone	100 mg	PO	(une seule administration)
4 chevaux	Naquasone	200 mg	PO	(une seule administration)
4 chevaux	Naquasone	100 mg	IM	(une seule administration)
4 chevaux	Naquasone	100 mg	IV	(une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Marques de commerce et autres noms

Vetastim

Type

Antihistaminique


Voies d'administration

IM

Posologie

4 chevaux Vetastim 400 mg (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

VÉDAPROFÈNE

Marques de commerce et autres noms

Quadrisol

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S)

Voies d'administration


Orale, IV

Posologie

4 chevaux Quadrisol 1 g PO (une fois par jour le premier et le cinquième jour; 0,5 g deux fois par jour, les deuxième, troisième et quatrième jours du traitement)

4 chevaux Quadrisol 1 g IV (une seule administration)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

Marques de commerce et autres noms

Rompun

Type


Relaxant musculaire; Analgésique; Sédatif

Voies d'administration

IM

Posologie

4 chevaux Rompun 1 g (une seule administration)

Limite de dépistage

Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

ZOMÉPIRAC

Marques de commerce et autres noms

Zomax

Type

Analgésique/Anti-inflammatoire (D.A.I.N.S.)


Voies d'administration

Orale

Posologie

2 chevaux	Zomax	0,5 g	(une seule administration)
2 chevaux	Zomax	0,5 g	(une fois par jour, 3 jours)
2 chevaux	Zomax	1,0 g	(une seule administration)
2 chevaux	Zomax	1,0 g	(une fois par jour, 3 jours)

Limite de dépistage



Souvenez-vous que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament.

ACIDE SALICYLIQUE

DROGUE : Acide salicylique
Acide acétylsalicylique (AAS, Aspirine)
Salicylate de méthyle

TYPE DE DROGUE : Antipyrétique/analgésique/antiinflammatoire (D.A.I.N.S.) : AAS; Révulsif : Salicylate de méthyle;
kératolytique : acide salicylique

MARQUES DE COMMERCE : Acetophen, Entrophen, Aspir (AAS); Gel Baumodyne, Equine Blue Lotion, autres (salicylate de méthyle)

ADMINISTRATION DU MÉDICAMENT	PRÉSENTATION	POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION	NOMBRE DE CHEVAUX	TAUX D'ACIDE SALICYLIQUE SANG > 6,5 µg/mL URINE > 750 µg/mL
Acide acétylsalicylique	Acetophen	11,7 g Orale	12	24 h*
Salicylate de méthyle	Gel Baumodyne	8,38 g Topique	8	6 h
Salicylate de méthyle	Gel Baumodyne	3,35 g Topique	8	taux nil

* Au cours de cette expérience, on a également détecté de l'acide acétylsalicylique dans l'urine de cheval jusqu'à 14 heures après l'administration.

On n'a observé aucun taux supérieur à 750 µg/mL dans l'urine ou à 6,5 µg/mL dans le sang à la suite de l'administration d'aliments pour bétail.

Tous les résultats ci-dessus ont été obtenus au cours d'expériences et d'analyses d'urine de cheval effectuées en utilisant les méthodes courantes. Nous soulignons que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré une drogue métabolisée en acide salicylique.

ANNEXE

Liste des drogues

1. Toute substance ou tout métabolite, préparation, dérivé, isomère ou sel de cette substance :
 - a) étiqueté pour usage vétérinaire en application du *Règlement sur les aliments et drogues* durant une période de 240 jours suivant la date d'attribution de l'identification numérique aux termes de ce règlement;
 - b) non étiqueté pour usage vétérinaire en application du *Règlement sur les aliments et drogues*;
 - c) qui entrave l'analyse d'une drogue visée dans la présente annexe;
 - d) qui figure dans la liste suivante :

Acépromazine (<i>Acepromazine</i>)	Benzocaïne (<i>Benzocaine</i>)
Acétanilide (<i>Acetanilide</i>)	Bétaméthasone (<i>Betamethasone</i>)
Acétonide de fluocinolone (<i>Fluocinolone acetonide</i>)	Boldénone (<i>Boldenone</i>)
Acide acétylsalicylique (<i>Acetylsalicylic acid</i>)	Butacaïne (<i>Butacaine</i>)
Acide méclofénamique (<i>Meclofenamic acid</i>)	Butorphanol (<i>Butorphanol</i>)
Acide tolfénamique (<i>Tolfenamic acid</i>)	Caféine (<i>Caffeine</i>)
Aconit (<i>Aconite</i>)	Camphre (<i>Camphor</i>)
Aconitine (<i>Aconitine</i>)	Carbachol (<i>Carbachol</i>)
Alphadolone (<i>Alphadolone</i>)	Carfentanil (<i>Carfentanil</i>)
Alphaxalone (<i>Alphaxalone</i>)	Carprofène (<i>Carprofen</i>)
Aminophylline (<i>Aminophylline</i>)	Chlorphéniramine (<i>Chlorpheniramine</i>)
Antipyrine (<i>Antipyrine</i>)	Clenbutérol (<i>Clenbuterol</i>)
Arécoline (<i>Arecoline</i>)	Clomipramine (<i>Clomipramine</i>)
Atipamézole (<i>Atipamezole</i>)	Cromoglycate (<i>Cromoglycate</i>)
Atropine (<i>Atropine</i>)	Dembrexine (<i>Dembrexine</i>)
Azapérone (<i>Azaperone</i>)	Déracoxib (<i>Deracoxib</i>)
Belladone (<i>Belladonna</i>)	Désoxycorticostérone (<i>Desoxycorticosterone</i>)
Benazépril (<i>Benazepril</i>)	Détomidine (<i>Detomidine</i>)
	Dexaméthasone

<i>(Dexamethasone)</i>	Lobéline (<i>Lobeline</i>)
Dibucaïne (<i>Dibucaine</i>)	Mébézonium (<i>Mebezonium</i>)
Diéthylstilbestrol	Médetomidine
<i>(Diethylstilbestrol)</i>	<i>(Medetomidine)</i>
Digitaline (<i>Digitalis</i>)	Méloxicam (<i>Meloxicam</i>)
Digitoxine (<i>Digitoxin</i>)	Mépivacaïne (<i>Mepivacaine</i>)
Digoxine (<i>Digoxin</i>)	Méthapyrilène
Diméthylsulfoxyde	<i>(Methapyrilene)</i>
<i>(Dimethylsulfoxide)</i>	Méthotriméprazine
Diphémanil (<i>Diphemanil</i>)	<i>(Methotrimprazine)</i>
Diprénorphine	Methscopolamine
<i>(Diprenorphine)</i>	<i>(Methscopolamine)</i>
Dipyrone (<i>Dipyrone</i>)	Méthylprednisolone
Doxapram (<i>Doxapram</i>)	<i>(Methylprednisolone)</i>
Dropéridol (<i>Droperidol</i>)	Méthyltestostérone
Énalapril (<i>Enalapril</i>)	<i>(Methyltestosterone)</i>
Éphédrine (<i>Ephedrine</i>)	Métomidate (<i>Metomidate</i>)
Épinéphrine (<i>Epinephrine</i>)	Naloxone (<i>Naloxone</i>)
Ergonovine (<i>Ergonovine</i>)	Nandrolone (<i>Nandrolone</i>)
Étorphine (<i>Etorphine</i>)	Néostigmine (<i>Neostigmine</i>)
Fentanyl (<i>Fentanyl</i>)	Nicotine (<i>Nicotine</i>)
Fluméthasone	Nikéthamide (<i>Nikethamide</i>)
<i>(Flumethasone)</i>	Nux Vomica (<i>Nux Vomica</i>)
Flunixin (<i>Flunixin</i>)	Pénicilline G Procaïne
Fomépizole (<i>Fomepizole</i>)	<i>(Penicillin G Procaine)</i>
Furosémide (<i>Furosemide</i>)	Pentazocine (<i>Pentazocine</i>)
Guaifénésine (<i>Guaifenesin</i>)	Pentobarbital
Hydrate de chloral (<i>Chloral Hydrate</i>)	<i>(Pentobarbital)</i>
Hydrochlorothiazide	Pentoxifylline
<i>(Hydrochlorothiazide)</i>	<i>(Pentoxifylline)</i>
Hyoscine (<i>Hyoscine</i>)	Phénacaïne (<i>Phenacaine</i>)
Hyoscyamine	Phéniramine (<i>Pheniramine</i>)
<i>(Hyoscyamine)</i>	Phénothiazine
Isofluprédone	<i>(Phenothiazine)</i>
<i>(Isoflupredone)</i>	Phénylbutazone
Isopropamide	<i>(Phenylbutazone)</i>
<i>(Isopropamide)</i>	Phényléphrine
Kétamine (<i>Ketamine</i>)	<i>(Phenylephrine)</i>
Kétanserine (<i>Ketanserine</i>)	Pimobendane
Kétoprofène (<i>Ketoprofen</i>)	<i>(Pimobendan)</i>
Lidocaïne (<i>Lidocaine</i>)	Prednisolone
Lobelia (<i>Lobelia</i>)	<i>(Prednisolone)</i>
	Prednisone (<i>Prednisone</i>)

Primidone (<i>Primidone</i>)	Tétracaïne (<i>Tetracaine</i>)
Prochlorpérazine (<i>Prochlorperazine</i>).52	Théophylline (<i>Theophylline</i>)
Propionylpromazine (<i>Propionylpromazine</i>)	Thiamylal (<i>Thiamylal</i>)
Propofol (<i>Propofol</i>)	Thiopental (<i>Thiopental</i>)
Pyrilamine (<i>Pyrilamine</i>)	Tolazoline (<i>Tolazoline</i>)
Quinine (<i>Quinine</i>)	Trenbolone (<i>Trenbolone</i>)
Ractopamine (<i>Ractopamine</i>)	Triamcinolone (<i>Triamcinolone</i>)
Romifidine (<i>Romifidine</i>)	Tricaïne (<i>Tricaine</i>)
Salicylamide (<i>Salicylamide</i>)	Trichlorméthiazide (<i>Trichlormethiazide</i>)
Salicylate de méthyle (<i>Methyl Salicylate</i>)	Triméprazine (<i>Trimeprazine</i>)
Scopolamine (<i>Scopolamine</i>)	Tripélenamine (<i>Tripelennamine</i>)
Sécobarbital (<i>Secobarbital</i>)	Védaprofène (<i>Vedaprofen</i>)
Sélégiline (<i>Selegiline</i>)	Xylazine (<i>Xylazine</i>)
Sputolysine (<i>Sputolysin</i>)	Yohimbine (<i>Yohimbine</i>)
Stanozolol (<i>Stanozolol</i>)	Zéranol (<i>Zeranol</i>)
Strychnine (<i>Strychnine</i>)	
Tabac (<i>Tobacco</i>)	

2. Drogue

Acide salicylique (*Salicylic acid*)

Seuil quantitatif

750 µg/mL dans l'urine

6,5 µg/mL dans le sang

3. Drogue

Procaïne (*Procaine*)

Seuil quantitatif

0,025 µg/mL dans le sang

NOTES EXPLICATIVES

A. ANNEXE

La présence des substances suivantes est interdite dans un échantillon officiel.

1. Toute substance pour laquelle les autorités n'ont pas autorisé l'utilisation en médecine vétérinaire (y compris tous les médicaments humains et tous les produits de l'étranger).
2. Toute substance de la liste (y compris certaines substances pour lesquelles les autorités ont autorisé l'utilisation en médecine vétérinaire).
3. Toute substance qui peut compromettre l'analyse des échantillons officiels visant le dépistage des substances mentionnées en annexe.
4. Toute substance pour laquelle les autorités ont délivré récemment une autorisation de 240 jours, et toute substance dont l'autorisation a été annulée.

IMPORTANT
Chaque drogue qui a reçu l'autorisation de vente au Canada a un « numéro d'identification de drogue » (N.I.D.) qui est inscrit sur l'étiquette du produit.
L'étiquette des médicaments pour utilisation en médecine vétérinaire porte la mention: « (Pour) Usage vétérinaire seulement » ou « (Pour) Usage agricole seulement ».
LISEZ ATTENTIVEMENT LES ÉTIQUETTES DES PRODUITS

Les directives contenues dans la présente brochure ne sont pas nécessairement compatibles avec la réglementation ou les méthodes de laboratoire des pays étrangers.

Un seuil quantitatif a été établi pour certaines substances. Un échantillon officiel ne sera positif que si la concentration de ces substances est supérieure au seuil quantitatif et qu'il se conforme à tout autre règlement pertinent. Par exemple, voir l'alinéa C (ci-dessous).

B. PHÉNYLBUTAZONE

On peut dépister la présence du phénylbutazone et de ses métabolites jusqu'à 96 heures suivant la plupart des traitements au phénylbutazone.

Toutefois, la période de confirmation de la présence du phénylbutazone et d'un métabolite, l'hydroxyphénylbutazone, est limitée à 48 heures dans le cas de l'administration de 2 g de phénylbutazone IV, soit en dose unique ou en dose quotidienne pendant 5 jours.

L'ajustement des conditions de confirmation par analyse de la présence du phénylbutazone dans un échantillon officiel ne s'applique qu'à la dose, à la voie d'administration et à la posologie décrites ci-dessus.

Nous soulignons que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament. Agriculture et Agroalimentaire Canada n'est nullement responsable si les résultats ne sont pas les mêmes que ceux qui sont présentés ici.

C. PÉNICILLINE G PROCAÏNE

Dans certaines conditions, l'analyse quantitative d'un échantillon de sang peut servir à classer un résultat positif ou négatif du dépistage de la procaine suite à l'administration de produits contenant de la pénicilline G procaine.

Les conditions sont les suivantes :

1. Si l'administration finale d'un produit contenant de la pénicilline G procaine à une dose allant jusqu'à 6 millions UI a eu lieu au moins 48 heures avant l'heure prévue du début de la course à laquelle doit participer le cheval. Les dosages excédant 6 millions UI peuvent exiger un plus long retrait que 48 heures.
2. Si des procédures autorisées ont été mises en place pour avertir les agents provinciaux et le personnel de prélèvement.
3. Si des procédures autorisées ont été mises en place pour prélever un échantillon de sang.

4. Si une déclaration a été faite et un échantillon de sang fourni conformément à l'article 170 du *Règlement sur la surveillance du pari mutuel*.

Si toutes les conditions sont respectées, l'échantillon positif ne sera pas reconnu comme contenant de la procaine, à moins que la concentration dans le sang n'excède 0,025 µg/mL, tel que décrit au paragraphe 3, de l'annexe.

Nous soulignons que ces résultats ne sont fournis qu'à titre d'indications. Ils ne s'appliquent pas nécessairement à chaque cheval auquel est administré ce médicament. Agriculture et Agroalimentaire Canada n'est nullement responsable si les résultats ne sont pas les mêmes que ceux qui sont présentés ici.

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
Acépromazine	9	Fénotérol	47
Acétaminophène	10	Floctafénine	48
Acide acétylsalicylique	101	Fluméthasone	49
Acide aminocaproïque	11	Flunixin	50
Acide éthacrynique	12	Flurbiprofène	51
Acide méclofénamique	13	Furosémide	52
Acide méfénamique	14	Glycopyrrolate	53
Acide salicylique	101	Guaifénésine	54
Acide thiosalicylique	15	Hydrochlorothiazide	55
Acide tiaprofénique	16	Hydrochlorure de Procaine	82
Atropine	17	Ibuprofène	56
Azapérone	18	Indapamide	57
Bétaméthasone	19	Indométhacine	58
Bupivacaïne	20	Isofluprédone	59
Butorphanol	21	Isoxsuprine	60
Carprofène	22	Kétamine	61
Chloroprocaïne	23	Kétoprofène	62
Chlorphéniramine	24	Kétotifène	63
Chlorpromazine	25	Lidocaïne	64
Cimétidine	26	Méloxicam	65
Clenbutérol	27	Mépivacaïne	66
Clomipramine	28	Methocarbamol	67
Cromoglycate	29	Méthylprednchantillon	68
Cyprohéptadine	30	Nabumétone	69
Dantrolène	31	Naproxène	70
Dembrexine	32	Nédocromil	71
Détomidine	33	Oxaprozin	72
Dexaméthasone	34	Oxyphenbutazone	73
Dextrométhorphan	35	Pénicilline	
Diazepam	36	G Procaine	83, 84, 106
Diclofénac	37	Pentazocine	74
Diffunisal	38	Pentoxifylline	75
Diméthylsulfoxyde	39	Phénothiazine	76
Diphénhydramine	40	Phénylbutazone	77, 106
Dipyron	41	Phenytoin	78
Dyphylline	42	Piroxicame	79
Éphédrine	43	Prednisolone	80
Ergonovine	44	Prednisone	81
Étodolac	45	Promazine	85
Famotidine	46	Pyrilamine	86

INDEX

NOM	PAGE	NOM	PAGE
Ranitidine	87	Terbutaline	93
Romifidine	88	Théophylline	94
Salbutamol	89	Triamcinolone (acétonide)	95
Salicylate de méthyle	101	Trichlorméthiazide	96
Salméterol	90	Tripélenamine	97
Sulindac	91	Védaprofène	98
Ténoxicame	92	Xylazine	99
		Zomépirac	100

REMARQUES

REMARQUES

REMARQUES