



N° 82-231-XIF au catalogue

Incidence du cancer au Canada

2004 à 2005



Statistique
Canada

Statistics
Canada

Canada

Comment obtenir d'autres renseignements

Toute demande de renseignements au sujet du présent produit ou au sujet de statistiques ou de services connexes doit être adressée à : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 (téléphone : 1 800 263-1136; 613 951-1746 (*hd-ds@statcan.ca*)). Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, veuillez communiquer avec Michel Cormier (613 951-1775; *michel.cormier@statcan.ca*).

Pour obtenir des informations sur l'ensemble des données de Statistique Canada qui sont disponibles, veuillez composer l'un des numéros sans frais suivants. Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel ou visiter notre site Web à www.statcan.ca.

Service national de renseignements **1-800-263-1136**

Service national d'appareils de télécommunication pour les malentendants **1-800-363-7629**

Renseignements concernant le Programme des services de dépôt **1-800-700-1033**

Télécopieur pour le Programme des services de dépôt **1-800-889-9734**

Renseignements par courriel [*infostats@statcan.ca*](mailto:infostats@statcan.ca)

Site Web [**www.statcan.ca**](http://www.statcan.ca)

Renseignements pour accéder au produit

Le produit n° 82-231-XIF au catalogue est disponible gratuitement sous format électronique. Pour obtenir un exemplaire, il suffit de visiter notre site Web à www.statcan.ca et de choisir la rubrique Publications.

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s'est doté de normes de *service à la clientèle* qui doivent être observées par les employés lorsqu'ils offrent des services à la clientèle.

Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi publiées dans le site www.statcan.ca sous À propos de nous > Offrir des services aux Canadiens.



Statistique Canada
Division de la statistique de la santé

Incidence du cancer au Canada

2004 à 2005

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2007

Tous droits réservés. Le contenu de la présente publication électronique peut être reproduit en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, sans autre permission de Statistique Canada, sous réserve que la reproduction soit effectuée uniquement à des fins d'étude privée, de recherche, de critique, de compte rendu ou en vue d'en préparer un résumé destiné aux journaux et/ou à des fins non commerciales. Statistique Canada doit être cité comme suit : Source (ou « Adapté de », s'il y a lieu) : Statistique Canada, année de publication, nom du produit, numéro au catalogue, volume et numéro, période de référence et page(s). Autrement, il est interdit de reproduire le contenu de la présente publication, ou de l'emmagasiner dans un système d'extraction, ou de le transmettre sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, reproduction électronique, mécanique, photographique, pour quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable des Services d'octroi de licences, Division des services à la clientèle, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Juillet 2007

N° 82-231-XIF au catalogue

ISSN 1715-8176

Périodicité : annuelle

Ottawa

This publication is available in English upon request (catalogue no. 82-231-XIE).

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

Informations pour l'utilisateur

Signes conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada :

- . indisponible pour toute période de référence
- .. indisponible pour une période de référence précise
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- 0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
- 0^s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie
- p provisoire
- r révisé
- x confidentiel en vertu des dispositions de la *Loi sur la statistique*
- E à utiliser avec prudence
- F trop peu fiable pour être publié

Remerciements

Les données du Registre canadien du cancer utilisées dans la préparation des tableaux sur l'incidence du cancer ont été fournies à Statistique Canada par les registres provinciaux et territoriaux du cancer. Nous les remercions vivement de leur coopération.

Table des matières

Faits saillants	5
Aperçu du Registre canadien du cancer	6
Buts	6
Couverture	7
Produits connexes	8
Tableaux statistiques	
1 Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie	10
1-1 Canada	10
1-2 Terre-Neuve-et-Labrador	11
1-3 Île-du-Prince-Édouard	12
1-4 Nouvelle-Écosse	13
1-5 Nouveau-Brunswick	14
1-6 Québec	15
1-7 Ontario	16
1-8 Manitoba	17
1-9 Saskatchewan	18
1-10 Alberta	19
1-11 Colombie-Britannique	20
1-12 Territoire du Yukon	21
1-13 Territoires du Nord-Ouest	22
1-14 Nunavut	23
2 Personnes diagnostiquées avec une tumeur primaire invasive pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie	24
2-1 Canada	24
2-2 Terre-Neuve-et-Labrador	25
2-3 Île-du-Prince-Édouard	26
2-4 Nouvelle-Écosse	27
2-5 Nouveau-Brunswick	28
2-6 Québec	29
2-7 Ontario	30

Table des matières – suite

2-8	Manitoba	31
2-9	Saskatchewan	32
2-10	Alberta	33
2-11	Colombie-Britannique	34
2-12	Territoire du Yukon	35
2-13	Territoires du Nord-Ouest	36
2-14	Nunavut	37
3	Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie	38
3-1	Canada	38
3-2	Terre-Neuve-et-Labrador	40
3-3	Île-du-Prince-Édouard	43
3-4	Nouvelle-Écosse	46
3-5	Nouveau-Brunswick	49
3-6	Québec	52
3-7	Ontario	54
3-8	Manitoba	57
3-9	Saskatchewan	60
3-10	Alberta	63
3-11	Colombie-Britannique	66
3-12	Territoire du Yukon	69
3-13	Territoires du Nord-Ouest	72
3-14	Nunavut	75

Qualité des données, concepts et méthodologie

Registre canadien du cancer (RCC)	78
Notes explicatives pour les tableaux	83

Appendice

I Sièges de cancer	85
--------------------	----

Faits saillants

Les tableaux dans cette publication présentent des données sur l'incidence du cancer pour les cas diagnostiqués en 2004 et en 2005 au Canada, dans les provinces et les territoires. Les données de 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et le Québec. Les données sur l'incidence du cancer de 1992 à 2005 sont disponibles sur CANSIM. Les tendances relatives à l'incidence du cancer et les estimations pour l'an 2007 basées sur ces données ont été diffusées en avril 2007 par l'institut national du cancer du Canada et la Société canadienne du cancer dans la monographie Statistique canadiennes sur le cancer.

Aperçu du Registre canadien du cancer

Le Registre canadien du cancer, qui est une base de données axée sur le patient, émane du Système national de déclaration des cas de cancer établi en 1969. Le Registre canadien du cancer est une enquête administrative. Les registres provinciaux et territoriaux du cancer transmettent au Registre canadien du cancer toutes les données qu'ils recueillent pour les cas de cancer diagnostiqués depuis 1992. Le Registre canadien du cancer a été élaboré afin de produire l'information requise sur l'incidence et le taux de survie au Canada, aux fins de la lutte contre le cancer. Le Registre canadien du cancer correspond à une banque de données personnelles qui figure dans la publication annuelle Info Source à Sources de renseignements fédéraux.

Le Registre canadien du cancer est le fruit d'une collaboration entre les treize registres provinciaux et territoriaux du cancer du Canada et de la Division de la statistique de la santé de Statistique Canada où les données sont entreposées. Les données transmises décrivent la personne atteinte du cancer ainsi que les caractéristiques de la tumeur. Le Conseil canadien des registres du cancer collabore avec les registres du cancer afin d'établir des normes nationales. L'autorité et la responsabilité finales en ce qui a trait à la complétude et à la qualité des données incombent aux provinces et territoires.

Le Registre canadien du cancer est une base de données dynamique sur tous les résidents du Canada en vie ou décédés chez lesquels on a diagnostiqué un cancer. Sa fonction est de produire des données normalisées et comparables sur l'incidence du cancer pour chaque siège primaire de tumeur. Le Registre canadien du cancer est un système axé sur la personne, conçu pour enregistrer le type et le nombre (incidence) de tumeurs primaires diagnostiquées chez une personne pendant un certain nombre d'années jusqu'au décès. L'avantage de ce système est qu'il fournit des données longitudinales pour chaque personne atteinte d'un cancer. Il permet de repérer les nouvelles tumeurs primaires qui se manifestent chez des patients déjà atteints d'un cancer. Les données sur les patients sont couplées régulièrement aux données sur la mortalité de sorte qu'on connaisse, en dernière analyse, la date et la cause du décès de tous les patients enregistrés dans la base de données.

En plus de l'information sur l'incidence du cancer, le Registre canadien du cancer contient des données sur les caractéristiques des patients atteints d'une tumeur unique ou de tumeurs multiples, ainsi que sur la nature et la fréquence de ces tumeurs. Puisque les enregistrements patient demeurent actifs dans le Registre canadien du cancer jusqu'à la confirmation du décès, il est possible de calculer des taux de survie aux diverses formes de cancer.

Le Registre canadien du cancer emploie aussi un logiciel spécialisé de couplage interne des enregistrements pour dépister les enregistrements en double et pour procéder à la confirmation des décès. Ces procédures sont exécutées annuellement. Les questions concernant les renseignements contradictoires et d'autres problèmes de données découverts lors de ces traitements annuels sont résolus en consultation avec les provinces et les territoires déclarants.

Buts

L'objectif du RCC est avant tout de créer une grande base de données permettant d'observer les profils et les tendances du cancer et d'étudier les variations du risque de cancer et la survie chez diverses populations au Canada.

Les statistiques sur la santé servent à fournir des renseignements précis, actuels et pertinents concernant la santé des Canadiens et le système de soins de santé. Statistique Canada fournit des analyses statistiques et d'autres renseignements concernant la santé de la population, les déterminants de la santé, ainsi que la portée et l'utilisation des ressources en soins de santé au Canada. Ces données servent à aider et à appuyer les planificateurs et les décideurs de tous les niveaux de gouvernement dans le domaine de la santé, à soutenir les recherches démographiques et épidémiologiques, et à tenir le public canadien au courant de l'état de santé de la population et du système de soins de santé.

Couverture

Chaque registre provincial ou territorial du cancer enregistre tous les cas de cancer survenus dans la population de sa province ou de son territoire en combinant l'information provenant de diverses sources, comme les dossiers des centres de traitement anticancéreux et les rapports de radiothérapie, les dossiers médicaux d'hospitalisation, les dossiers médicaux des services de consultations externes et des hôpitaux privés, les rapports d'anatomopathologie et d'autres rapports de laboratoire ou d'autopsie, les rapports de radiologie et de programmes de dépistage, les rapports des médecins exerçant dans le privé et les certificats de décès par cancer émis par les bureaux de la statistique de l'état civil.

Chaque année, environ 145 000 nouveaux enregistrements de tumeur sont chargés dans la base de données du Registre canadien du cancer. Les modifications subséquentes qu'il convient d'apporter aux enregistrements en raison d'erreurs ou d'omissions sont également communiquées à Statistique Canada aussitôt que l'information est disponible.

Le Conseil canadien des registres du cancer recommande que les tumeurs qui suivent soient déclarées au Registre canadien du cancer à :

- toutes les tumeurs malignes primaires (CIM-O-3, codes de topographie C00.0 à C80.9) dont le code de comportement est 3 (sauf les carcinomes spinocellulaires (CIM-O-3, codes de morphologie 805_ à 808_) et les carcinomes basocellulaires (CIM-O-3, codes de morphologie 809_ à 811_) ayant les codes de topographie C44.0 à C44.9;
- les carcinomes in situ/intraépithéliaux/non infiltrants/non invasifs (tous les codes de topographie de la CIM-O-3 avec code de comportement de 2, sauf les tumeurs in situ du col utérin (C53.0 à C53.9) ou les néoplasies intraépithéliales du col (CIN III) à cause d'un manque d'uniformité des règles de collecte et de déclaration);
- les tumeurs primaires bénignes du cerveau et du système nerveux central (codes de topographie C70.0 à C72.9 avec code de comportement de la CIM-O-3 de 0);
- les tumeurs à la limite de la malignité (tous les codes de topographie de la CIM-O-3 avec code de comportement de 1).

Les enregistrements patient comprennent les données nominales, démographiques et sur la mortalité concernant la personne. Les enregistrements tumeur comprennent des renseignements sur les caractéristiques de la tumeur et son diagnostic.

Produits connexes

Choisis parmi les publications de Statistique Canada

82-221-X	Indicateurs de la santé
82-226-X	Statistiques sur la survie au cancer
82-401-X	Indicateurs de la santé comparables, Canada, provinces et territoires

Choisis parmi les tableaux de CANSIM de Statistique Canada

103-0551	Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, annuel
103-0552	Personnes diagnostiquées avec une tumeur primaire invasive pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, annuel
103-0553	Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, Canada, provinces et territoires, annuel

Choisis parmi les enquêtes de Statistique Canada

3207	Registre canadien du cancer
------	-----------------------------

Choisis parmi les tableaux sommaires de Statistique Canada

- *Cancer, nouveaux cas selon les sièges primaires choisis du cancer, selon le sexe*
- *Décès et taux de mortalité, par province et territoire*

Tableaux statistiques

Tableau 1-1

Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie — Canada¹

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2004												
Tous les âges	147 108	460,1	457,7	462,4	77 042	486,5	483,1	490,0	70 066	434,1	430,9	437,3
0 à 4 ans	368	21,6	19,5	23,9	200	23,0	19,9	26,3	168	20,2	17,3	23,4
5 à 9 ans	x	x	x	x	122	12,4	10,4	14,8	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	99	9,6	7,8	11,6
15 à 19 ans	445	20,9	19,0	22,9	237	21,7	19,1	24,6	208	20,1	17,5	22,9
20 à 24 ans	709	31,9	29,6	34,3	358	31,5	28,3	34,9	351	32,3	29,0	35,8
25 à 29 ans	1 042	48,2	45,4	51,2	463	42,3	38,6	46,3	579	54,4	50,1	58,9
30 à 34 ans	1 717	77,1	73,5	80,8	635	56,5	52,2	61,0	1 082	98,1	92,4	104,1
35 à 39 ans	2 707	112,2	108,0	116,4	913	75,2	70,5	80,2	1 794	149,5	142,7	156,6
40 à 44 ans	5 085	185,0	180,0	190,1	1 609	116,5	110,9	122,3	3 476	254,2	245,9	262,8
45 à 49 ans	7 876	306,5	299,8	313,3	3 015	235,5	227,2	244,0	4 861	377,0	366,5	387,7
50 à 54 ans	10 982	491,4	482,3	500,7	4 876	440,8	428,5	453,2	6 106	541,1	527,7	554,8
55 à 59 ans	15 060	781,1	768,7	793,6	7 951	832,8	814,7	851,1	7 109	730,4	713,6	747,5
60 à 64 ans	17 246	1 184,5	1 167,0	1 202,2	9 955	1 394,0	1 367,0	1 421,4	7 291	982,8	960,5	1 005,4
65 à 69 ans	18 827	1 606,9	1 584,2	1 629,7	11 392	2 020,5	1 984,0	2 057,5	7 435	1 223,2	1 195,8	1 251,0
70 à 74 ans	20 685	1 981,4	1 954,8	2 008,2	12 483	2 556,2	2 512,2	2 600,8	8 202	1 476,1	1 444,7	1 508,1
75 à 79 ans	18 946	2 226,3	2 195,1	2 257,8	10 702	2 906,3	2 852,4	2 960,9	8 244	1 707,6	1 671,3	1 744,4
80 à 84 ans	14 425	2 367,3	2 329,3	2 405,7	7 411	3 175,6	3 105,0	3 247,3	7 014	1 865,5	1 822,7	1 909,2
85 ans et plus	10 555	2 262,9	2 220,5	2 305,9	4 612	3 236,7	3 145,8	3 329,5	5 943	1 834,5	1 788,7	1 881,2
Groupe d'âge, non déclaré	x	.	.	.	x	.	.	.	x	.	.	.

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0551).

Tableau 1-2
Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie — Terre-Neuve-et-Labrador¹

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2005												
Tous les âges	2 328	453,0	434,9	471,6	1 243	492,2	465,5	520,1	1 085	415,0	390,9	440,2
0 à 4 ans	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25 à 29 ans	16	51,9	30,7	82,2	10	65,1	33,1	115,7	6	38,7	15,7	80,0
30 à 34 ans	29	89,1	60,8	126,1	15	95,1	55,2	152,9	14	83,4	47,5	136,2
35 à 39 ans	37	96,7	69,1	131,7	11	59,4	31,2	102,8	26	131,7	87,8	189,9
40 à 44 ans	79	182,8	145,7	226,5	22	103,8	66,7	154,3	57	258,9	197,9	332,7
45 à 49 ans	102	235,1	192,7	284,1	33	153,6	107,4	212,8	69	315,2	247,2	396,1
50 à 54 ans	211	498,5	434,6	568,9	95	454,8	370,0	552,9	116	541,0	449,2	645,9
55 à 59 ans	296	777,4	692,7	869,3	144	763,6	646,6	895,4	152	790,9	672,7	923,5
60 à 64 ans	325	1 186,5	1 063,2	1 319,8	178	1 309,0	1 127,8	1 510,3	147	1 065,8	904,2	1 247,4
65 à 69 ans	316	1 508,9	1 350,2	1 680,6	196	1 896,7	1 646,5	2 172,9	120	1 131,2	942,6	1 345,8
70 à 74 ans	328	1 931,9	1 732,7	2 147,0	213	2 603,9	2 274,7	2 965,4	115	1 307,1	1 085,0	1 560,4
75 à 79 ans	290	2 155,2	1 919,6	2 410,6	168	2 839,8	2 438,3	3 285,6	122	1 618,0	1 350,8	1 921,3
80 à 84 ans	167	1 872,2	1 605,7	2 168,9	92	2 584,3	2 099,3	3 143,4	75	1 399,3	1 109,5	1 740,0
85 ans et plus	107	1 443,4	1 189,8	1 733,8	56	2 425,3	1 853,5	3 111,9	51	999,2	752,4	1 300,2
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.
2004												
Tous les âges	2 213	427,8	410,3	445,9	1 202	472,6	446,5	499,8	1 011	384,5	361,3	408,7
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	x	x	x	x	6	33,2	13,5	68,6	x	x	x	x
25 à 29 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30 à 34 ans	22	65,3	42,0	97,1	9	55,5	27,1	101,5	13	74,4	41,4	123,7
35 à 39 ans	56	140,8	107,3	181,3	19	98,3	60,9	150,4	37	180,9	129,2	246,4
40 à 44 ans	72	165,1	130,1	206,5	22	102,1	65,6	151,8	50	226,5	169,9	295,9
45 à 49 ans	139	318,6	268,8	374,7	58	268,7	205,9	344,6	81	367,3	293,6	453,8
50 à 54 ans	180	429,8	370,4	495,9	90	435,2	352,1	531,9	90	424,6	343,5	519,0
55 à 59 ans	257	705,6	623,4	795,4	144	795,9	673,9	933,3	113	616,4	510,5	737,5
60 à 64 ans	296	1 132,5	1 009,4	1 266,1	175	1 345,8	1 158,1	1 554,6	121	921,2	768,1	1 095,4
65 à 69 ans	310	1 521,2	1 359,8	1 696,1	195	1 944,7	1 687,6	2 228,7	115	1 111,0	922,0	1 326,6
70 à 74 ans	299	1 771,7	1 580,6	1 978,9	167	2 067,6	1 773,6	2 394,8	132	1 500,2	1 261,3	1 770,0
75 à 79 ans	274	2 080,5	1 846,7	2 334,6	165	2 842,4	2 437,1	3 292,8	109	1 480,0	1 222,2	1 774,7
80 à 84 ans	165	1 815,8	1 555,8	2 105,5	88	2 445,8	1 977,0	2 988,3	77	1 402,8	1 115,8	1 739,6
85 ans et plus	108	1 539,8	1 270,5	1 847,8	50	2 285,2	1 717,9	2 974,1	58	1 201,8	921,8	1 538,7
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0551).

Tableau 1-3
Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie — Île-du-Prince-Édouard¹

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2005												
Tous les âges	745	539,2	501,6	578,8	406	603,9	547,4	664,6	339	477,8	429,0	530,6
0 à 4 ans	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
10 à 14 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15 à 19 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25 à 29 ans	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
30 à 34 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
35 à 39 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40 à 44 ans	18	164,9	100,8	255,0	11	204,5	107,6	353,9	7	126,5	55,4	248,6
45 à 49 ans	35	327,4	231,6	449,6	14	269,9	153,7	440,5	21	381,7	242,6	571,8
50 à 54 ans	46	458,3	339,5	605,0	23	468,7	304,4	690,2	23	448,3	291,2	660,2
55 à 59 ans	65	661,5	514,9	836,5	34	696,2	490,1	959,3	31	627,3	433,9	877,1
60 à 64 ans	109	1 579,7	1 304,7	1 894,1	70	2 075,9	1 633,3	2 598,0	39	1 105,4	797,7	1 491,2
65 à 69 ans	119	2 100,6	1 750,3	2 498,2	75	2 710,5	2 151,8	3 364,3	44	1 518,3	1 118,2	2 012,3
70 à 74 ans	98	2 077,2	1 697,9	2 513,2	66	2 949,1	2 305,0	3 709,8	32	1 290,3	898,7	1 792,3
75 à 79 ans	94	2 557,8	2 082,5	3 105,0	42	2 600,6	1 903,2	3 461,2	52	2 524,3	1 909,1	3 267,8
80 à 84 ans	80	2 809,0	2 247,1	3 462,9	42	3 984,8	2 920,8	5 288,5	38	2 118,2	1 523,5	2 861,8
85 ans et plus	58	2 181,3	1 674,7	2 788,2	20	2 587,3	1 630,0	3 884,9	38	2 014,8	1 449,0	2 722,9
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.
2004												
Tous les âges	749	543,3	505,5	583,1	416	619,9	562,5	681,4	333	470,7	422,2	523,1
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
20 à 24 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25 à 29 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30 à 34 ans	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
35 à 39 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	11	236,2	124,3	408,6
40 à 44 ans	24	217,5	142,5	318,0	13	242,3	134,8	402,4	11	193,9	102,0	335,6
45 à 49 ans	36	339,9	241,7	464,8	13	251,5	139,9	417,6	23	424,4	275,6	624,9
50 à 54 ans	50	501,6	376,3	654,9	24	494,8	324,5	723,0	26	507,9	338,9	731,6
55 à 59 ans	83	896,7	719,2	1 104,2	46	993,1	736,1	1 309,7	37	800,2	572,0	1 088,4
60 à 64 ans	100	1 500,4	1 228,4	1 813,2	59	1 812,6	1 394,4	2 313,7	41	1 202,3	875,1	1 610,1
65 à 69 ans	106	1 908,2	1 572,1	2 292,8	68	2 499,1	1 959,9	3 135,5	38	1 340,9	963,6	1 814,7
70 à 74 ans	99	2 136,8	1 748,6	2 582,8	68	3 075,5	2 413,2	3 855,4	31	1 279,9	886,1	1 786,9
75 à 79 ans	97	2 640,9	2 157,4	3 196,1	57	3 596,2	2 758,4	4 595,5	40	1 915,7	1 389,6	2 570,6
80 à 84 ans	66	2 354,6	1 839,3	2 964,7	33	3 257,7	2 287,6	4 482,5	33	1 843,6	1 292,4	2 545,3
85 ans et plus	57	2 246,7	1 721,0	2 877,6	23	3 079,0	2 006,5	4 498,4	34	1 899,4	1 339,0	2 610,1
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0551).

Tableau 1-4
Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie — Nouvelle-Écosse¹

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2005												
Tous les âges	5 241	559,9	544,9	575,1	2 775	606,0	583,8	628,7	2 466	515,7	495,7	536,3
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	13	20,6	11,5	34,3	7	21,7	9,5	42,7	6	19,5	7,9	40,3
20 à 24 ans	17	26,8	16,1	42,0	11	34,1	18,0	59,1	6	19,3	7,8	39,8
25 à 29 ans	34	59,3	41,7	81,8	16	57,0	33,7	90,4	18	61,5	37,6	95,1
30 à 34 ans	41	68,0	49,4	91,3	15	50,7	29,5	81,6	26	84,7	56,5	122,1
35 à 39 ans	82	126,4	101,2	156,0	31	96,5	66,7	135,1	51	155,9	117,3	203,1
40 à 44 ans	176	219,7	189,0	253,9	54	135,2	102,5	174,9	122	303,8	253,4	361,2
45 à 49 ans	265	343,5	304,0	386,7	100	262,9	215,0	318,1	165	422,0	361,3	489,9
50 à 54 ans	373	531,9	480,0	587,7	186	542,3	468,5	624,1	187	522,0	451,2	600,6
55 à 59 ans	544	833,0	765,4	904,9	296	912,3	813,1	1 020,1	248	754,7	665,3	852,6
60 à 64 ans	633	1 294,4	1 197,0	1 397,4	364	1 511,0	1 362,5	1 670,8	269	1 084,2	960,8	1 218,7
65 à 69 ans	705	1 840,9	1 709,8	1 979,1	430	2 315,1	2 105,9	2 538,6	275	1 394,4	1 237,5	1 565,1
70 à 74 ans	718	2 214,8	2 058,6	2 379,1	440	2 923,8	2 663,2	3 201,7	278	1 600,5	1 421,5	1 795,0
75 à 79 ans	667	2 602,6	2 412,8	2 802,7	369	3 352,7	3 028,0	3 700,9	298	2 038,0	1 818,0	2 276,4
80 à 84 ans	524	2 669,0	2 450,2	2 901,2	282	3 672,4	3 268,2	4 109,9	242	2 024,4	1 783,0	2 288,3
85 ans et plus	437	2 435,6	2 217,4	2 668,7	167	3 091,4	2 653,6	3 577,5	270	2 153,1	1 909,6	2 418,0
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.
2004												
Tous les âges	5 207	555,4	540,5	570,6	2 822	614,5	592,2	637,4	2 385	498,7	479,0	519,0
0 à 4 ans	16	35,8	21,2	56,7	8	35,0	16,3	66,2	8	36,6	17,0	69,2
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	x	x	x	x	7	21,6	9,5	42,6	x	x	x	x
20 à 24 ans	x	x	x	x	10	31,3	15,9	55,6	x	x	x	x
25 à 29 ans	31	54,0	37,3	75,6	18	63,9	39,1	98,8	13	44,5	24,7	73,9
30 à 34 ans	56	90,7	69,1	116,8	20	65,7	41,2	99,4	36	115,0	81,7	157,3
35 à 39 ans	78	114,9	91,4	142,5	30	89,0	61,1	125,3	48	140,4	104,7	184,4
40 à 44 ans	153	189,3	161,0	221,0	49	121,3	90,7	158,9	104	257,2	211,2	310,2
45 à 49 ans	228	297,4	260,7	337,9	102	269,4	220,8	325,4	126	324,9	271,8	385,2
50 à 54 ans	368	534,5	482,0	591,0	179	528,2	455,1	609,6	189	540,5	467,6	621,5
55 à 59 ans	519	825,4	756,8	898,3	278	890,9	791,0	999,7	241	760,8	669,4	860,9
60 à 64 ans	628	1 339,6	1 238,4	1 446,6	367	1 597,9	1 441,5	1 766,0	261	1 091,5	965,4	1 229,0
65 à 69 ans	676	1 798,0	1 667,3	1 936,0	441	2 404,6	2 190,0	2 633,6	235	1 220,3	1 072,3	1 382,7
70 à 74 ans	754	2 357,0	2 194,9	2 527,4	470	3 186,0	2 911,3	3 478,3	284	1 647,5	1 465,2	1 845,5
75 à 79 ans	678	2 649,8	2 458,1	2 851,8	367	3 364,8	3 038,1	3 715,2	311	2 118,5	1 894,6	2 360,7
80 à 84 ans	541	2 738,4	2 517,4	2 972,7	274	3 636,8	3 230,9	4 076,8	267	2 184,6	1 936,2	2 454,8
85 ans et plus	445	2 599,9	2 369,1	2 846,1	198	3 834,2	3 334,8	4 382,9	247	2 066,6	1 822,6	2 333,0
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0551).

Tableau 1-5
Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie — Nouveau-Brunswick¹

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2005												
Tous les âges	3 976	529,1	512,9	545,7	2 153	580,5	556,4	605,3	1 823	479,0	457,4	501,3
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	6	31,2	12,7	64,4
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	12	24,4	13,2	41,3	6	23,6	9,6	48,7	6	25,2	10,2	52,1
20 à 24 ans	19	37,4	23,2	57,2	8	30,5	14,2	57,6	11	44,8	23,6	77,6
25 à 29 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	12	50,7	27,5	85,9
30 à 34 ans	32	63,6	44,2	88,6	17	67,1	40,4	105,1	15	60,1	34,9	96,6
35 à 39 ans	54	101,9	77,3	131,9	20	75,3	47,3	114,0	34	128,8	90,6	177,7
40 à 44 ans	119	187,7	156,2	223,7	37	117,3	83,8	159,9	82	257,3	206,0	317,5
45 à 49 ans	211	338,9	295,5	386,9	73	235,2	185,7	293,8	138	442,1	372,8	520,3
50 à 54 ans	281	486,3	431,9	545,5	139	487,8	411,7	573,7	142	484,8	409,9	569,3
55 à 59 ans	466	886,3	808,8	969,1	240	919,0	808,5	1 040,2	226	853,9	748,2	970,1
60 à 64 ans	494	1 285,5	1 176,4	1 401,7	308	1 615,3	1 443,4	1 801,4	186	960,6	830,2	1 105,3
65 à 69 ans	551	1 855,8	1 706,8	2 014,0	348	2 400,5	2 160,4	2 658,9	203	1 336,1	1 162,4	1 527,9
70 à 74 ans	529	2 121,3	1 947,7	2 305,5	321	2 805,2	2 514,0	3 119,4	208	1 541,3	1 343,4	1 759,4
75 à 79 ans	498	2 412,9	2 209,9	2 628,8	285	3 263,1	2 905,2	3 650,7	213	1 789,2	1 562,2	2 038,8
80 à 84 ans	387	2 440,9	2 208,9	2 689,5	208	3 446,0	3 006,9	3 927,8	179	1 823,0	1 571,9	2 101,6
85 ans et plus	292	2 142,8	1 909,4	2 395,9	133	3 188,7	2 686,0	3 753,5	159	1 681,5	1 436,4	1 955,3
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.
2004												
Tous les âges	3 761	500,1	484,3	516,2	2 037	548,6	525,2	572,8	1 724	452,8	431,8	474,4
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	6	25,0	10,1	51,6
20 à 24 ans	13	25,4	14,1	42,3	7	26,5	11,6	52,1	6	24,3	9,9	50,2
25 à 29 ans	21	43,9	27,9	65,8	8	33,4	15,5	63,1	13	54,4	30,3	90,4
30 à 34 ans	46	90,3	66,9	119,3	15	58,5	34,0	94,1	31	122,6	84,8	171,6
35 à 39 ans	41	74,1	53,8	99,4	13	46,8	26,0	77,8	28	101,5	68,8	144,5
40 à 44 ans	105	164,8	135,5	198,6	32	101,0	70,2	140,7	73	228,0	180,0	284,8
45 à 49 ans	209	337,0	293,7	385,0	69	223,5	175,2	281,0	140	449,6	379,7	528,5
50 à 54 ans	293	516,8	460,2	578,3	133	474,8	399,2	560,4	160	557,8	476,3	648,9
55 à 59 ans	416	828,5	751,9	910,6	223	889,3	778,5	1 011,2	193	767,8	665,3	881,3
60 à 64 ans	446	1 206,6	1 099,0	1 321,7	278	1 517,6	1 347,9	1 702,2	168	901,1	772,7	1 044,3
65 à 69 ans	480	1 661,6	1 518,8	1 813,7	301	2 153,7	1 922,5	2 404,1	179	1 200,4	1 034,6	1 384,6
70 à 74 ans	492	1 974,7	1 807,3	2 152,9	325	2 826,1	2 534,5	3 140,5	167	1 244,9	1 067,3	1 443,0
75 à 79 ans	483	2 324,7	2 126,1	2 536,1	279	3 198,8	2 844,2	3 583,2	204	1 692,2	1 473,0	1 933,9
80 à 84 ans	371	2 376,1	2 145,6	2 623,6	194	3 291,5	2 857,6	3 769,2	177	1 821,0	1 568,8	2 101,0
85 ans et plus	319	2 430,7	2 177,2	2 704,4	148	3 686,2	3 134,7	4 301,3	171	1 877,3	1 613,1	2 171,1
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0551).

Tableau 1-6
Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie — Québec^{1,2}

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2004												
Tous les âges	37 508	496,9	491,9	502,0	19 490	523,2	516,0	530,6	18 018	471,3	464,5	478,2
0 à 4 ans	92	24,8	20,1	30,2	50	26,2	19,7	34,3	42	23,2	17,0	31,1
5 à 9 ans	62	14,8	11,4	18,8	33	15,4	10,8	21,3	29	14,2	9,7	20,1
10 à 14 ans	43	8,9	6,5	11,8	21	8,5	5,4	12,7	22	9,3	6,0	13,8
15 à 19 ans	96	21,0	17,1	25,6	55	23,5	17,9	30,4	41	18,4	13,4	24,7
20 à 24 ans	160	31,3	26,7	36,4	93	35,5	28,8	43,2	67	26,9	21,0	33,9
25 à 29 ans	211	40,7	35,5	46,5	106	40,0	32,9	48,1	105	41,5	34,1	50,0
30 à 34 ans	343	69,5	62,5	77,2	135	53,4	45,0	63,0	208	86,4	75,3	98,8
35 à 39 ans	550	99,3	91,3	107,8	178	63,0	54,3	72,8	372	137,0	123,6	151,5
40 à 44 ans	1 206	185,4	175,1	196,1	388	118,0	106,7	130,2	818	254,2	237,2	272,0
45 à 49 ans	1 843	291,4	278,4	304,9	710	225,2	209,1	242,2	1 133	357,3	337,0	378,5
50 à 54 ans	2 801	503,1	484,8	522,0	1 173	426,8	402,9	451,6	1 628	577,6	550,1	606,1
55 à 59 ans	3 989	808,4	783,7	833,7	2 059	850,1	814,1	887,2	1 930	768,3	734,7	803,0
60 à 64 ans	4 688	1 221,1	1 186,7	1 256,2	2 724	1 459,8	1 406,1	1 514,9	1 964	995,4	952,3	1 039,9
65 à 69 ans	4 817	1 627,8	1 582,7	1 673,9	2 882	2 062,7	1 989,1	2 138,1	1 935	1 238,8	1 184,8	1 294,6
70 à 74 ans	5 216	1 964,1	1 911,8	2 017,3	3 038	2 540,3	2 452,3	2 630,6	2 178	1 492,0	1 430,7	1 555,1
75 à 79 ans	4 799	2 273,7	2 210,8	2 338,0	2 664	3 046,8	2 934,4	3 162,3	2 135	1 727,0	1 655,4	1 800,7
80 à 84 ans	3 695	2 595,6	2 513,9	2 679,1	1 921	3 756,0	3 593,7	3 923,3	1 774	1 944,9	1 856,7	2 036,0
85 ans et plus	2 897	2 692,1	2 596,6	2 790,0	1 260	4 258,8	4 032,9	4 493,1	1 637	2 098,0	1 999,2	2 200,3
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.

2. Ne sont pas inclus les cas de cancer pour 2003 à 2004 chez les résidents du Québec diagnostiqués ou traités uniquement en Ontario.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0551).

Tableau 1-7
Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie — Ontario^{1,2}

	Les deux sexes			Hommes			Femmes					
	Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %			
			Limite inférieure			Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure	Limite inférieure	Limite supérieure
2005												
Tous les âges	58 645	467,0	463,2	470,8	30 427	490,6	485,2	496,2	28 218	443,9	438,7	449,1
0 à 4 ans	137	20,3	17,1	23,9	60	17,4	13,4	22,2	77	23,3	18,5	29,0
5 à 9 ans	x	x	x	x	52	13,3	10,0	17,3	x	x	x	x
10 à 14 ans	99	11,8	9,7	14,3	44	10,3	7,5	13,6	55	13,5	10,2	17,4
15 à 19 ans	183	21,8	18,8	25,1	97	22,5	18,4	27,3	86	21,0	16,9	25,8
20 à 24 ans	315	36,6	32,7	40,8	141	32,2	27,2	37,8	174	41,1	35,3	47,6
25 à 29 ans	489	58,2	53,2	63,5	200	47,5	41,2	54,4	289	69,0	61,4	77,3
30 à 34 ans	782	87,0	81,0	93,2	283	62,9	55,9	70,5	499	111,1	101,7	121,1
35 à 39 ans	1 253	129,7	122,6	137,0	358	74,2	66,8	82,2	895	184,9	173,1	197,3
40 à 44 ans	2 165	197,8	189,6	206,3	696	126,6	117,5	136,3	1 469	269,6	256,0	283,6
45 à 49 ans	3 302	332,1	320,9	343,5	1 214	245,3	231,8	259,4	2 088	418,0	400,4	436,2
50 à 54 ans	4 538	529,9	514,7	545,4	2 076	493,0	472,2	514,5	2 462	565,6	543,6	588,2
55 à 59 ans	6 189	823,1	802,8	843,7	3 235	873,8	844,2	904,1	2 954	773,9	746,5	802,1
60 à 64 ans	6 774	1 208,4	1 180,0	1 237,2	3 941	1 437,9	1 393,9	1 483,0	2 833	988,8	953,1	1 025,5
65 à 69 ans	7 610	1 668,0	1 631,1	1 705,4	4 619	2 114,8	2 055,0	2 175,7	2 991	1 257,6	1 213,4	1 303,0
70 à 74 ans	7 988	1 996,4	1 953,4	2 040,1	4 773	2 543,1	2 472,6	2 615,0	3 215	1 513,4	1 462,1	1 566,0
75 à 79 ans	7 520	2 250,6	2 200,7	2 301,3	4 214	2 870,7	2 786,2	2 957,0	3 306	1 764,6	1 705,7	1 825,0
80 à 84 ans	5 502	2 271,6	2 212,8	2 331,5	2 782	2 950,9	2 844,3	3 060,4	2 720	1 838,6	1 771,1	1 908,0
85 ans et plus	3 710	2 086,4	2 020,7	2 153,6	1 642	2 948,7	2 810,6	3 091,6	2 068	1 693,2	1 621,9	1 766,7
Groupe d'âge, non déclaré	x	.	.	.	0	.	.	.	x	.	.	.
2004												
Tous les âges	55 936	450,8	447,1	454,6	29 062	474,3	468,9	479,7	26 874	427,9	422,9	433,1
0 à 4 ans	154	22,7	19,3	26,5	84	24,2	19,4	29,8	70	21,0	16,5	26,4
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	47	12,3	9,1	16,2
10 à 14 ans	x	x	x	x	48	11,2	8,4	14,8	x	x	x	x
15 à 19 ans	193	23,3	20,2	26,7	98	23,0	18,8	27,9	95	23,5	19,1	28,6
20 à 24 ans	292	34,5	30,7	38,6	139	32,3	27,2	38,0	153	36,8	31,3	43,0
25 à 29 ans	456	54,9	50,0	60,1	191	45,7	39,6	52,6	265	64,1	56,7	72,1
30 à 34 ans	779	86,4	80,5	92,7	270	59,8	53,0	67,3	509	113,1	103,6	123,3
35 à 39 ans	1 209	123,3	116,5	130,3	384	78,3	70,8	86,5	825	168,1	156,9	179,9
40 à 44 ans	2 112	195,0	186,8	203,4	660	121,3	112,3	130,8	1 452	269,2	255,7	283,3
45 à 49 ans	3 105	321,2	310,0	332,6	1 180	245,9	232,2	260,2	1 925	395,4	378,0	413,3
50 à 54 ans	4 193	505,1	490,0	520,5	1 883	461,7	441,2	482,9	2 310	547,1	525,1	569,6
55 à 59 ans	5 743	797,9	777,5	818,6	3 060	861,1	831,1	891,8	2 683	736,2	708,8	764,3
60 à 64 ans	6 413	1 182,9	1 154,4	1 211,9	3 668	1 385,7	1 341,7	1 430,7	2 745	989,4	953,1	1 026,7
65 à 69 ans	7 342	1 633,5	1 596,8	1 670,9	4 449	2 065,5	2 006,0	2 126,2	2 893	1 236,0	1 191,8	1 281,4
70 à 74 ans	7 941	1 983,0	1 940,2	2 026,5	4 776	2 543,8	2 473,3	2 615,7	3 165	1 488,0	1 437,2	1 540,1
75 à 79 ans	7 113	2 157,9	2 108,7	2 207,9	3 999	2 793,4	2 708,9	2 879,7	3 114	1 670,0	1 612,6	1 728,9
80 à 84 ans	5 265	2 245,9	2 186,5	2 306,5	2 669	2 945,7	2 837,0	3 057,2	2 596	1 805,1	1 737,2	1 874,8
85 ans et plus	3 433	2 052,1	1 985,0	2 120,9	1 454	2 814,4	2 674,4	2 959,6	1 979	1 711,6	1 638,0	1 787,5
Groupe d'âge, non déclaré	x	.	.	.	x	.	.	.	x	.	.	.

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.
 2. Les données de 2003, 2004 et 2005 pour l'Ontario sont provisoires. Elles n'incluent pas les cas identifiés par certificat de décès seulement, lesquels sont estimés à environ 2 %. Les sièges in situ pour la vessie diagnostiqués en Ontario ne sont pas déclarés au Registre canadien du cancer.
Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».
Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0551).

Tableau 1-8
Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie — Manitoba^{1,2}

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2005												
Tous les âges	5 248	447,0	435,0	459,1	2 602	446,2	429,3	463,5	2 646	447,7	430,9	465,0
0 à 4 ans	18	25,8	15,8	40,0	9	25,3	12,4	46,3	9	26,4	12,9	48,2
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	16	18,9	11,2	30,0	6	13,9	5,7	28,8	10	24,1	12,2	42,8
20 à 24 ans	22	26,4	16,9	39,2	13	30,3	16,8	50,3	9	22,2	10,8	40,6
25 à 29 ans	39	50,0	36,0	67,6	17	42,7	25,7	66,8	22	57,6	37,0	85,6
30 à 34 ans	55	71,3	54,2	92,0	28	70,8	47,9	100,8	27	71,8	48,3	102,9
35 à 39 ans	67	86,0	67,2	108,5	27	68,0	45,7	97,5	40	104,6	75,7	140,9
40 à 44 ans	154	165,4	140,8	193,1	57	121,0	92,5	155,6	97	210,9	171,9	256,0
45 à 49 ans	260	290,2	256,6	327,1	83	182,5	146,3	224,9	177	401,4	345,5	463,7
50 à 54 ans	385	482,5	436,2	532,4	155	392,7	334,5	458,0	230	570,5	500,4	647,6
55 à 59 ans	508	728,8	667,6	794,0	255	736,9	650,8	831,1	253	720,8	636,2	813,3
60 à 64 ans	560	1 091,2	1 003,9	1 183,8	282	1 112,6	988,8	1 247,2	278	1 070,3	950,4	1 200,8
65 à 69 ans	668	1 648,0	1 527,4	1 775,4	377	1 935,9	1 749,2	2 136,4	291	1 381,8	1 230,6	1 546,1
70 à 74 ans	709	1 932,3	1 795,1	2 076,9	420	2 444,7	2 221,4	2 683,4	289	1 481,1	1 318,5	1 657,7
75 à 79 ans	717	2 200,3	2 045,1	2 363,7	384	2 709,8	2 451,6	2 986,5	333	1 808,3	1 623,1	2 008,2
80 à 84 ans	539	2 068,3	1 900,6	2 246,3	254	2 543,6	2 247,8	2 865,8	285	1 773,0	1 577,3	1 985,6
85 ans et plus	518	2 242,8	2 057,6	2 439,6	228	3 228,1	2 834,0	3 658,9	290	1 808,8	1 610,8	2 023,6
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.
2004												
Tous les âges	5 472	467,6	455,4	480,1	2 786	479,6	462,0	497,6	2 686	455,8	438,8	473,2
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	6	13,9	5,6	28,7	x	x	x	x
15 à 19 ans	15	17,9	10,4	28,7	9	21,0	10,3	38,4	6	14,6	5,9	30,2
20 à 24 ans	31	37,6	26,0	52,7	13	30,7	17,1	51,0	18	45,1	27,5	69,7
25 à 29 ans	36	46,2	32,9	63,3	13	32,7	18,2	54,4	23	60,4	39,2	89,0
30 à 34 ans	60	77,6	59,7	99,1	21	53,1	33,7	79,6	39	103,3	74,4	139,6
35 à 39 ans	94	117,0	95,1	142,5	38	92,9	66,7	126,1	56	142,1	108,3	183,0
40 à 44 ans	146	154,9	131,3	181,6	53	110,7	83,8	143,6	93	200,5	162,7	244,3
45 à 49 ans	282	319,7	284,0	358,6	116	260,3	216,1	310,9	166	380,4	325,8	441,4
50 à 54 ans	395	507,5	459,4	559,3	154	400,2	340,7	467,0	241	612,5	538,9	693,2
55 à 59 ans	511	764,6	700,6	832,7	261	784,3	693,6	883,4	250	745,0	657,1	841,3
60 à 64 ans	597	1 204,5	1 111,2	1 303,3	320	1 316,2	1 178,5	1 465,1	277	1 096,9	973,8	1 230,9
65 à 69 ans	614	1 523,9	1 407,6	1 646,9	377	1 944,7	1 757,2	2 146,1	237	1 133,7	996,7	1 283,9
70 à 74 ans	751	2 015,9	1 876,7	2 162,2	425	2 444,8	2 222,7	2 682,1	326	1 640,7	1 470,8	1 824,2
75 à 79 ans	777	2 381,0	2 219,6	2 550,5	433	3 080,8	2 804,3	3 375,8	344	1 851,7	1 665,0	2 052,9
80 à 84 ans	674	2 612,3	2 422,7	2 812,1	344	3 523,1	3 170,5	3 902,1	330	2 057,7	1 846,3	2 285,9
85 ans et plus	466	2 088,6	1 906,9	2 282,3	195	2 859,7	2 483,0	3 274,8	271	1 749,2	1 551,3	1 964,5
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.

2. Les données de 2005 pour le Manitoba sont provisoires. L'incidence des cancers de la prostate et de l'appareil génito-urinaire mâle sont sous-estimés. Cette situation sera rectifiée lors de la prochaine diffusion annuelle.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0551).

Tableau 1-9
Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie — Saskatchewan¹

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2005												
Tous les âges	4 659	470,6	457,3	484,3	2 571	522,7	502,8	543,1	2 088	419,2	401,6	437,5
0 à 4 ans	x	x	x	x	10	32,7	16,6	58,1	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	17	22,1	13,3	34,6	11	27,8	14,6	48,2	6	16,1	6,5	33,2
20 à 24 ans	24	32,4	21,2	47,4	16	41,5	24,6	65,8	8	22,5	10,5	42,6
25 à 29 ans	30	47,5	32,6	66,8	9	28,1	13,7	51,3	21	67,5	42,9	101,2
30 à 34 ans	32	54,9	38,2	76,5	13	44,4	24,7	73,8	19	65,4	40,6	100,1
35 à 39 ans	54	90,2	68,4	116,8	16	53,4	31,6	84,7	38	127,0	91,2	172,4
40 à 44 ans	132	176,0	147,9	208,0	50	133,4	100,0	174,2	82	218,7	175,1	269,9
45 à 49 ans	194	254,7	220,7	292,4	73	189,4	149,5	236,6	121	321,6	268,1	382,7
50 à 54 ans	307	453,9	405,3	506,7	129	377,1	316,1	446,3	178	532,5	458,6	614,8
55 à 59 ans	388	699,2	632,4	771,1	206	741,4	645,4	847,3	182	656,9	566,7	757,2
60 à 64 ans	539	1 272,9	1 169,4	1 383,0	317	1 516,0	1 356,8	1 688,3	222	1 035,8	906,6	1 177,9
65 à 69 ans	621	1 724,9	1 594,1	1 863,2	393	2 256,5	2 043,5	2 484,9	228	1 226,7	1 075,7	1 392,5
70 à 74 ans	639	1 904,5	1 762,2	2 054,8	411	2 601,9	2 361,9	2 858,6	228	1 284,1	1 126,1	1 457,5
75 à 79 ans	678	2 237,3	2 075,1	2 408,2	420	3 106,0	2 823,2	3 408,2	258	1 537,3	1 359,1	1 731,7
80 à 84 ans	543	2 286,5	2 102,0	2 482,3	293	3 086,5	2 752,1	3 448,3	250	1 753,8	1 547,6	1 978,9
85 ans et plus	434	1 842,7	1 676,6	2 020,2	199	2 559,5	2 225,2	2 927,8	235	1 489,4	1 308,9	1 687,2
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.
2004												
Tous les âges	4 909	493,7	480,1	507,6	2 750	556,8	536,3	577,8	2 159	431,5	413,6	449,9
0 à 4 ans	x	x	x	x	7	22,9	10,0	45,0	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	15	19,3	11,2	31,0	8	20,0	9,3	37,8	7	18,5	8,1	36,5
20 à 24 ans	18	24,3	14,9	37,7	9	23,5	11,5	42,9	9	25,3	12,3	46,2
25 à 29 ans	22	35,0	22,5	52,0	9	28,1	13,7	51,3	13	42,2	23,5	70,1
30 à 34 ans	39	66,6	48,0	90,0	21	71,6	45,5	107,4	18	61,6	37,6	95,2
35 à 39 ans	43	68,6	50,2	91,4	13	41,4	23,0	68,9	30	95,7	65,7	134,7
40 à 44 ans	144	186,9	158,2	219,3	46	119,1	88,2	157,3	98	255,2	208,3	309,4
45 à 49 ans	231	303,5	266,2	344,5	84	218,6	175,5	269,1	147	390,1	330,8	456,8
50 à 54 ans	296	454,3	404,8	508,1	151	457,6	389,0	534,8	145	450,9	381,9	528,6
55 à 59 ans	410	772,0	700,1	849,1	228	856,0	750,5	972,0	182	687,4	593,1	792,4
60 à 64 ans	509	1 229,5	1 126,6	1 339,0	301	1 476,1	1 317,1	1 648,4	208	990,2	862,7	1 130,8
65 à 69 ans	646	1 796,2	1 662,7	1 937,3	415	2 383,8	2 164,8	2 618,1	231	1 244,9	1 092,7	1 412,0
70 à 74 ans	739	2 155,3	2 005,4	2 312,9	482	2 993,8	2 738,6	3 265,2	257	1 413,0	1 248,9	1 592,2
75 à 79 ans	741	2 424,8	2 256,7	2 601,7	440	3 243,6	2 955,0	3 551,4	301	1 771,2	1 580,7	1 977,6
80 à 84 ans	538	2 267,5	2 083,6	2 462,6	293	3 113,4	2 776,1	3 478,3	245	1 711,4	1 508,2	1 933,4
85 ans et plus	498	2 174,2	1 991,1	2 369,0	236	3 112,6	2 738,7	3 520,9	262	1 709,8	1 513,3	1 924,1
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0551).

Tableau 1-10
Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie — Alberta^{1,2}

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2005												
Tous les âges	12 361	377,1	370,5	383,8	6 510	393,1	383,6	402,7	5 851	360,9	351,7	370,2
0 à 4 ans	32	16,0	11,1	22,3	24	23,5	15,4	34,3	8	8,2	3,8	15,4
5 à 9 ans	27	13,1	8,8	18,8	20	18,9	11,9	28,6	7	7,0	3,1	13,8
10 à 14 ans	21	9,5	6,0	14,2	11	9,6	5,1	16,6	10	9,3	4,7	16,5
15 à 19 ans	49	20,7	15,5	27,2	30	24,7	17,0	34,8	19	16,5	10,2	25,3
20 à 24 ans	76	29,9	23,7	37,1	43	32,7	24,0	43,6	33	26,8	18,7	37,1
25 à 29 ans	129	50,5	42,4	59,8	52	39,2	29,6	51,0	77	62,8	49,9	78,0
30 à 34 ans	179	73,4	63,2	84,8	61	48,3	37,2	61,6	118	100,4	83,5	119,8
35 à 39 ans	239	98,9	87,0	112,0	92	73,9	59,9	90,2	147	125,4	106,3	146,9
40 à 44 ans	496	178,9	163,6	195,1	176	125,3	107,8	144,8	320	233,9	209,3	260,6
45 à 49 ans	767	285,4	265,7	306,1	308	225,7	201,5	251,9	459	347,0	316,3	379,7
50 à 54 ans	1 027	460,0	432,6	488,8	462	407,9	372,0	446,3	565	513,7	472,8	557,3
55 à 59 ans	1 340	748,5	709,4	789,2	751	831,1	773,4	891,8	589	664,4	612,4	719,4
60 à 64 ans	1 433	1 122,7	1 066,0	1 181,6	796	1 243,7	1 160,0	1 331,8	637	1 000,9	925,7	1 080,5
65 à 69 ans	1 544	1 556,6	1 480,9	1 635,0	932	1 919,9	1 800,6	2 044,7	612	1 208,4	1 116,0	1 306,3
70 à 74 ans	1 648	1 933,6	1 842,7	2 027,6	984	2 406,9	2 261,6	2 558,8	664	1 497,2	1 387,3	1 613,4
75 à 79 ans	1 485	2 150,3	2 044,1	2 260,5	869	2 777,0	2 599,1	2 963,3	616	1 631,1	1 506,9	1 762,5
80 à 84 ans	1 066	2 194,3	2 066,8	2 327,4	547	2 818,1	2 592,0	3 057,8	519	1 779,2	1 632,1	1 935,6
85 ans et plus	803	2 014,6	1 880,0	2 155,9	352	2 762,3	2 487,9	3 057,3	451	1 663,2	1 515,9	1 820,4
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.
2004												
Tous les âges	12 867	401,5	394,6	408,5	6 757	417,3	407,4	427,3	6 110	385,4	375,8	395,1
0 à 4 ans	31	15,9	11,0	22,2	15	15,0	8,7	24,2	16	16,8	9,9	26,6
5 à 9 ans	23	11,2	7,3	16,5	14	13,2	7,5	21,6	9	9,0	4,4	16,5
10 à 14 ans	28	12,5	8,5	17,9	16	13,9	8,2	22,1	12	11,1	6,0	18,8
15 à 19 ans	50	21,5	16,1	28,1	25	20,9	13,8	30,3	25	22,1	14,6	32,1
20 à 24 ans	74	29,9	23,7	37,3	31	24,3	16,8	34,0	43	35,9	26,3	47,9
25 à 29 ans	121	49,4	41,2	58,8	47	36,9	27,4	48,6	74	63,1	49,9	78,7
30 à 34 ans	172	72,1	61,9	83,5	64	51,7	40,2	65,6	108	94,0	77,5	113,0
35 à 39 ans	306	126,9	113,3	141,8	119	96,3	80,1	114,7	187	159,2	137,6	183,3
40 à 44 ans	517	185,8	170,3	202,3	159	112,7	96,1	131,2	358	260,9	235,0	289,0
45 à 49 ans	805	307,3	286,7	329,1	296	222,1	197,9	248,5	509	395,6	362,4	431,0
50 à 54 ans	1 063	500,5	471,1	531,2	486	451,3	412,6	492,7	577	551,1	507,5	597,3
55 à 59 ans	1 292	765,7	724,9	808,1	711	836,1	776,5	899,0	581	694,2	639,6	752,1
60 à 64 ans	1 503	1 231,7	1 170,9	1 294,7	885	1 449,4	1 356,8	1 546,4	618	1 013,6	936,4	1 095,5
65 à 69 ans	1 573	1 624,0	1 545,8	1 705,0	935	1 973,3	1 850,9	2 101,4	638	1 289,5	1 192,8	1 391,7
70 à 74 ans	1 777	2 098,7	2 003,8	2 196,9	1 093	2 691,3	2 537,2	2 852,0	684	1 552,5	1 440,1	1 671,1
75 à 79 ans	1 556	2 333,7	2 221,1	2 450,3	904	3 026,3	2 836,4	3 225,0	652	1 771,5	1 640,4	1 910,0
80 à 84 ans	1 144	2 414,9	2 279,4	2 555,9	597	3 186,5	2 941,9	3 445,0	547	1 910,0	1 756,2	2 073,3
85 ans et plus	832	2 227,6	2 081,5	2 380,9	360	3 035,4	2 737,5	3 355,3	472	1 851,8	1 691,5	2 022,6
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.

2. Les données de 2005 pour l'Alberta sont provisoires. Approximativement 2 % des nouveaux cas du cancer n'ont pas été inclus afin de respecter le délai établi par le Conseil canadien des registres du cancer.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0551).

Tableau 1-11

Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie — Colombie-Britannique¹

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2005												
Tous les âges	18 635	437,7	431,4	444,0	9 784	463,4	454,3	472,7	8 851	412,3	403,8	421,0
0 à 4 ans	48	23,3	17,4	30,6	27	25,5	17,1	36,5	21	21,0	13,3	31,4
5 à 9 ans	19	8,3	5,1	12,7	13	11,0	6,1	18,3	6	5,4	2,2	11,1
10 à 14 ans	29	11,1	7,6	15,8	20	14,9	9,4	22,6	9	7,1	3,5	13,0
15 à 19 ans	36	12,9	9,1	17,6	20	13,9	8,7	21,1	16	11,7	6,9	18,6
20 à 24 ans	89	29,3	23,7	35,9	45	28,9	21,3	38,3	44	29,8	21,9	39,6
25 à 29 ans	120	43,1	35,9	51,3	52	37,2	28,0	48,3	68	49,1	38,4	61,8
30 à 34 ans	185	63,5	54,9	73,2	79	54,4	43,4	67,4	106	72,6	59,7	87,4
35 à 39 ans	320	101,9	91,1	113,5	108	69,4	57,2	83,4	212	133,7	116,6	152,7
40 à 44 ans	607	170,1	156,9	184,0	210	118,2	103,0	135,0	397	221,4	200,4	243,9
45 à 49 ans	934	266,8	250,1	284,3	336	194,3	174,3	215,9	598	337,5	311,3	365,3
50 à 54 ans	1 357	427,0	404,8	450,2	599	379,8	350,3	411,1	758	473,6	440,8	508,1
55 à 59 ans	1 896	682,0	651,9	713,1	987	714,3	670,9	759,7	909	650,0	608,9	693,2
60 à 64 ans	2 161	1 051,6	1 008,2	1 096,4	1 206	1 186,4	1 121,1	1 254,3	955	919,8	863,0	979,2
65 à 69 ans	2 340	1 441,1	1 384,0	1 499,9	1 378	1 722,2	1 633,8	1 814,1	962	1 168,0	1 096,3	1 243,0
70 à 74 ans	2 607	1 829,7	1 761,0	1 900,2	1 588	2 268,8	2 160,3	2 381,0	1 019	1 405,7	1 321,9	1 493,3
75 à 79 ans	2 497	2 101,2	2 020,7	2 183,8	1 410	2 586,8	2 455,9	2 722,5	1 087	1 689,7	1 592,2	1 791,4
80 à 84 ans	1 875	2 100,1	2 007,6	2 195,7	999	2 755,2	2 590,3	2 927,3	876	1 652,2	1 546,2	1 763,3
85 ans et plus	1 515	2 063,2	1 962,2	2 167,9	707	2 885,4	2 681,1	3 100,3	808	1 651,5	1 541,3	1 767,2
Groupe d'âge, non déclaré	0				0				0			
2004												
Tous les âges	18 269	434,8	428,5	441,1	9 602	461,0	451,9	470,3	8 667	409,0	400,5	417,7
0 à 4 ans	43	20,9	15,3	27,8	21	19,8	12,6	29,7	22	22,0	14,1	32,6
5 à 9 ans	17	7,3	4,4	11,4	10	8,3	4,2	14,8	7	6,2	2,7	12,1
10 à 14 ans	16	6,1	3,6	9,7	8	6,0	2,8	11,3	8	6,3	2,9	11,9
15 à 19 ans	49	17,5	13,1	22,9	29	20,2	13,7	28,5	20	14,7	9,2	22,3
20 à 24 ans	92	31,1	25,2	38,0	48	31,8	23,7	41,7	44	30,4	22,4	40,5
25 à 29 ans	124	45,6	38,1	54,1	60	43,9	33,8	56,1	64	47,3	36,7	59,9
30 à 34 ans	194	65,8	57,0	75,6	80	54,5	43,5	67,4	114	77,1	63,8	92,2
35 à 39 ans	309	98,4	87,8	109,8	114	73,1	60,6	87,5	195	123,2	106,8	141,4
40 à 44 ans	590	165,1	152,2	178,8	181	101,9	87,9	117,6	409	227,5	206,3	250,4
45 à 49 ans	978	284,2	266,9	302,4	381	224,6	202,9	248,0	597	342,2	315,6	370,5
50 à 54 ans	1 321	427,7	405,2	451,2	593	386,0	355,9	417,9	728	469,1	436,0	504,0
55 à 59 ans	1 805	687,3	656,3	719,5	923	706,4	662,0	752,9	882	668,5	625,5	713,5
60 à 64 ans	2 036	1 032,2	988,3	1 077,6	1 157	1 183,5	1 117,1	1 252,7	879	883,6	826,8	943,1
65 à 69 ans	2 242	1 411,4	1 354,2	1 470,2	1 312	1 673,2	1 585,1	1 764,7	930	1 156,1	1 084,0	1 231,7
70 à 74 ans	2 586	1 820,4	1 751,9	1 890,9	1 621	2 326,9	2 216,8	2 440,8	965	1 333,1	1 251,4	1 418,5
75 à 79 ans	2 414	2 071,7	1 991,0	2 154,6	1 384	2 624,1	2 490,2	2 763,0	1 030	1 614,9	1 519,2	1 714,8
80 à 84 ans	1 958	2 225,7	2 129,7	2 324,7	995	2 806,1	2 637,8	2 981,7	963	1 833,8	1 721,6	1 951,1
85 ans et plus	1 495	2 171,0	2 064,1	2 281,8	685	3 013,2	2 796,7	3 241,3	810	1 756,0	1 639,0	1 878,8
Groupe d'âge, non déclaré	0				0				0			

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0551).

Tableau 1-12
Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie — Territoire du Yukon¹

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2005												
Tous les âges	98	314,9	257,0	381,8	41	261,5	190,1	350,8	57	369,2	282,2	474,3
0 à 4 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
5 à 9 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
10 à 14 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15 à 19 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
20 à 24 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
25 à 29 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
30 à 34 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
35 à 39 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40 à 44 ans	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
45 à 49 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	11	702,9	370,1	1 213,4
50 à 54 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	7	559,1	245,2	1 095,9
55 à 59 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	12	1 265,8	687,2	2 132,8
60 à 64 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
65 à 69 ans	x	x	x	x	8	1 606,4	748,8	3 005,7	x	x	x	x
70 à 74 ans	16	2 631,6	1 563,3	4 131,3	9	2 803,7	1 374,3	5 041,6	7	2 439,0	1 072,9	4 717,8
75 à 79 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80 à 84 ans	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
85 ans et plus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.
2004												
Tous les âges	84	272,2	218,5	335,1	49	314,0	234,9	411,3	35	229,5	162,3	315,1
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
5 à 9 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
10 à 14 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15 à 19 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
20 à 24 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
25 à 29 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
30 à 34 ans	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
35 à 39 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40 à 44 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45 à 49 ans	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
50 à 54 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
55 à 59 ans	16	804,4	476,6	1 271,7	8	738,7	343,9	1 389,7	8	883,0	411,1	1 659,7
60 à 64 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
65 à 69 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
70 à 74 ans	x	x	x	x	11	3 606,6	1 907,5	6 136,0	x	x	x	x
75 à 79 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80 à 84 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85 ans et plus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0551).

Tableau 1-13

Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie — Territoires du Nord-Ouest¹

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2005												
Tous les âges	69	161,9	126,9	203,5	33	150,0	105,0	208,0	36	174,5	124,0	238,6
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
5 à 9 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
10 à 14 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15 à 19 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
20 à 24 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
25 à 29 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
30 à 34 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
35 à 39 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40 à 44 ans	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
45 à 49 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
50 à 54 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
55 à 59 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
60 à 64 ans	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
65 à 69 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
70 à 74 ans	x	x	x	x	6	2 222,2	906,5	4 513,3	x	x	x	x
75 à 79 ans	x	x	x	x	8	4 678,4	2 191,5	8 584,8	x	x	x	x
80 à 84 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85 ans et plus	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.
2004												
Tous les âges	85	198,4	159,4	243,9	44	199,2	146,5	264,7	41	197,5	143,6	265,0
0 à 4 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
5 à 9 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
10 à 14 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15 à 19 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
20 à 24 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
25 à 29 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
30 à 34 ans	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
35 à 39 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40 à 44 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45 à 49 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
50 à 54 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	7	570,0	250,0	1 117,2
55 à 59 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
60 à 64 ans	x	x	x	x	9	1 355,4	662,9	2 457,9	x	x	x	x
65 à 69 ans	x	x	x	x	8	2 030,5	947,1	3 788,8	0	0,0	0,0	0,0
70 à 74 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
75 à 79 ans	x	x	x	x	6	3 703,7	1 514,4	7 434,8	x	x	x	x
80 à 84 ans	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
85 ans et plus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0551).

Tableau 1-14
Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie — Nunavut¹

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2005												
Tous les âges	70	233,0	183,0	292,4	36	231,4	164,5	316,4	34	234,8	165,2	323,9
0 à 4 ans	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
10 à 14 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15 à 19 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
20 à 24 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
25 à 29 ans	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
30 à 34 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
35 à 39 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
40 à 44 ans	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
45 à 49 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
50 à 54 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
55 à 59 ans	x	x	x	x	8	1 941,7	905,6	3 625,3	x	x	x	x
60 à 64 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	7	2 287,6	1 006,0	4 429,5
65 à 69 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
70 à 74 ans	x	x	x	x	6	4 838,7	1 982,1	9 627,2	x	x	x	x
75 à 79 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80 à 84 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85 ans et plus	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.
2004												
Tous les âges	48	161,8	120,6	212,5	25	162,8	107,7	236,3	23	160,7	104,3	236,8
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
5 à 9 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
10 à 14 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15 à 19 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
20 à 24 ans	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
25 à 29 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
30 à 34 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
35 à 39 ans	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
40 à 44 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45 à 49 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
50 à 54 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
55 à 59 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
60 à 64 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
65 à 69 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
70 à 74 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
75 à 79 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
80 à 84 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
85 ans et plus	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien de cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0551).

Tableau 2-1
Personnes diagnostiquées avec une tumeur primaire invasive pour tous les sièges primaires de cancer combinés
(d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie — Canada¹

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2004												
Tous les âges	144 660	452,4	450,1	454,8	75 517	476,9	473,5	480,3	69 143	428,4	425,2	431,6
0 à 4 ans	368	21,6	19,5	23,9	200	23,0	19,9	26,3	168	20,2	17,3	23,4
5 à 9 ans	220	11,5	10,0	13,1	121	12,3	10,3	14,7	99	10,6	8,6	12,8
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	444	20,9	19,0	22,9	236	21,6	19,0	24,5	208	20,1	17,5	22,9
20 à 24 ans	704	31,6	29,4	34,0	355	31,2	28,1	34,6	349	32,1	28,9	35,6
25 à 29 ans	1 037	48,0	45,2	51,0	460	42,0	38,3	46,0	577	54,2	49,9	58,7
30 à 34 ans	1 710	76,8	73,2	80,5	634	56,4	52,1	60,9	1 076	97,5	91,8	103,5
35 à 39 ans	2 687	111,3	107,2	115,6	908	74,8	70,1	79,8	1 779	148,3	141,5	155,3
40 à 44 ans	5 044	183,5	178,5	188,6	1 600	115,9	110,3	121,6	3 444	251,9	243,6	260,4
45 à 49 ans	7 793	303,2	296,6	310,0	2 979	232,7	224,4	241,1	4 814	373,3	362,9	384,0
50 à 54 ans	10 877	486,7	477,7	495,9	4 829	436,5	424,4	448,9	6 048	536,0	522,6	549,5
55 à 59 ans	14 859	770,7	758,4	783,1	7 835	820,6	802,7	838,9	7 024	721,7	705,0	738,6
60 à 64 ans	16 945	1 163,8	1 146,5	1 181,3	9 769	1 368,0	1 341,3	1 395,1	7 176	967,3	945,2	989,7
65 à 69 ans	18 485	1 577,7	1 555,2	1 600,4	11 150	1 977,6	1 941,5	2 014,2	7 335	1 206,7	1 179,5	1 234,4
70 à 74 ans	20 258	1 940,5	1 914,1	1 967,1	12 172	2 492,5	2 449,1	2 536,5	8 086	1 455,3	1 424,0	1 487,0
75 à 79 ans	18 534	2 177,8	2 147,0	2 209,0	10 431	2 832,7	2 779,5	2 886,7	8 103	1 678,4	1 642,4	1 714,9
80 à 84 ans	14 129	2 318,7	2 281,1	2 356,7	7 233	3 099,3	3 029,5	3 170,2	6 896	1 834,2	1 791,6	1 877,4
85 ans et plus	10 356	2 220,2	2 178,2	2 262,8	4 498	3 156,7	3 066,9	3 248,4	5 858	1 808,3	1 762,8	1 854,6
Groupe d'âge, non déclaré	x	.	.	.	x	.	.	.	x	.	.	.

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0552).

Tableau 2-2
Personnes diagnostiquées avec une tumeur primaire invasive pour tous les sièges primaires de cancer combinés
(d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie —
Terre-Neuve-et-Labrador¹

	Les deux sexes			Hommes			Femmes					
	Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2005												
Tous les âges	2 295	446,5	428,6	465,0	1 218	482,3	455,8	509,9	1 077	412,0	388,0	437,1
0 à 4 ans	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25 à 29 ans	16	51,9	30,7	82,2	10	65,1	33,1	115,7	6	38,7	15,7	80,0
30 à 34 ans	29	89,1	60,8	126,1	15	95,1	55,2	152,9	14	83,4	47,5	136,2
35 à 39 ans	37	96,7	69,1	131,7	11	59,4	31,2	102,8	26	131,7	87,8	189,9
40 à 44 ans	79	182,8	145,7	226,5	22	103,8	66,7	154,3	57	258,9	197,9	332,7
45 à 49 ans	102	235,1	192,7	284,1	33	153,6	107,4	212,8	69	315,2	247,2	396,1
50 à 54 ans	209	493,7	430,2	563,9	94	450,0	365,7	547,7	115	536,4	444,9	640,8
55 à 59 ans	294	772,1	687,8	863,8	142	753,0	636,8	883,9	152	790,9	672,7	923,5
60 à 64 ans	315	1 150,0	1 028,7	1 281,4	172	1 264,9	1 086,9	1 463,0	143	1 036,8	877,5	1 216,0
65 à 69 ans	311	1 485,1	1 327,6	1 655,5	192	1 857,9	1 610,4	2 131,6	119	1 121,8	934,0	1 335,5
70 à 74 ans	323	1 902,5	1 704,8	2 116,0	208	2 542,8	2 217,6	2 900,3	115	1 307,1	1 085,0	1 560,4
75 à 79 ans	287	2 132,9	1 898,6	2 387,1	166	2 805,9	2 406,9	3 249,3	121	1 604,8	1 338,7	1 906,9
80 à 84 ans	163	1 827,4	1 564,2	2 120,7	89	2 500,0	2 023,4	3 050,9	74	1 380,6	1 092,9	1 719,3
85 ans et plus	105	1 416,4	1 165,4	1 704,3	54	2 338,7	1 778,0	3 014,5	51	999,2	752,4	1 300,2
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.
2004												
Tous les âges	2 193	423,9	406,5	441,9	1 190	467,9	441,9	495,0	1 003	381,4	358,4	405,5
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	x	x	x	x	6	33,2	13,5	68,6	x	x	x	x
25 à 29 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30 à 34 ans	22	65,3	42,0	97,1	9	55,5	27,1	101,5	13	74,4	41,4	123,7
35 à 39 ans	56	140,8	107,3	181,3	19	98,3	60,9	150,4	37	180,9	129,2	246,4
40 à 44 ans	72	165,1	130,1	206,5	22	102,1	65,6	151,8	50	226,5	169,9	295,9
45 à 49 ans	139	318,6	268,8	374,7	58	268,7	205,9	344,6	81	367,3	293,6	453,8
50 à 54 ans	179	427,4	368,2	493,4	90	435,2	352,1	531,9	89	419,9	339,2	513,8
55 à 59 ans	255	700,1	618,2	789,6	143	790,4	668,9	927,3	112	610,9	505,5	731,6
60 à 64 ans	293	1 121,0	998,5	1 254,0	173	1 330,5	1 143,8	1 538,1	120	913,6	761,1	1 087,1
65 à 69 ans	305	1 496,7	1 336,6	1 670,2	191	1 904,9	1 650,5	2 186,1	114	1 101,3	913,3	1 316,1
70 à 74 ans	294	1 742,1	1 552,6	1 947,7	165	2 042,8	1 750,6	2 368,3	129	1 466,1	1 230,1	1 733,1
75 à 79 ans	271	2 057,7	1 825,3	2 310,5	163	2 807,9	2 405,2	3 255,9	108	1 466,4	1 209,9	1 759,9
80 à 84 ans	165	1 815,8	1 555,8	2 105,5	88	2 445,8	1 977,0	2 988,3	77	1 402,8	1 115,8	1 739,6
85 ans et plus	107	1 525,5	1 257,6	1 832,3	49	2 239,5	1 678,4	2 922,4	58	1 201,8	921,8	1 538,7
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0552).

Tableau 2-3
Personnes diagnostiquées avec une tumeur primaire invasive pour tous les sièges primaires de cancer combinés
(d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie —
Île-du-Prince-Édouard¹

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2005												
Tous les âges	729	527,6	490,4	566,8	394	586,1	530,4	645,9	335	472,2	423,7	524,6
0 à 4 ans	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
10 à 14 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15 à 19 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25 à 29 ans	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
30 à 34 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
35 à 39 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40 à 44 ans	18	164,9	100,8	255,0	11	204,5	107,6	353,9	7	126,5	55,4	248,6
45 à 49 ans	35	327,4	231,6	449,6	14	269,9	153,7	440,5	21	381,7	242,6	571,8
50 à 54 ans	45	448,3	331,0	593,6	22	448,3	288,2	665,7	23	448,3	291,2	660,2
55 à 59 ans	65	661,5	514,9	836,5	34	696,2	490,1	959,3	31	627,3	433,9	877,1
60 à 64 ans	107	1 550,7	1 278,4	1 862,5	69	2 046,3	1 607,0	2 565,0	38	1 077,1	773,8	1 458,5
65 à 69 ans	115	2 030,0	1 685,9	2 421,5	72	2 602,1	2 055,4	3 244,2	43	1 483,8	1 088,7	1 972,9
70 à 74 ans	96	2 034,8	1 659,6	2 466,8	64	2 859,7	2 226,1	3 610,2	32	1 290,3	898,7	1 792,3
75 à 79 ans	91	2 476,2	2 009,0	3 015,5	40	2 476,8	1 797,8	3 319,6	51	2 475,7	1 866,9	3 213,0
80 à 84 ans	78	2 738,8	2 184,4	3 385,4	40	3 795,1	2 758,8	5 072,4	38	2 118,2	1 523,5	2 861,8
85 ans et plus	57	2 143,7	1 641,8	2 746,0	19	2 458,0	1 528,4	3 729,0	38	2 014,8	1 449,0	2 722,9
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.
2004												
Tous les âges	736	533,9	496,4	573,4	410	610,9	554,0	672,0	326	460,8	412,8	512,7
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
20 à 24 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25 à 29 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30 à 34 ans	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
35 à 39 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	11	236,2	124,3	408,6
40 à 44 ans	24	217,5	142,5	318,0	13	242,3	134,8	402,4	11	193,9	102,0	335,6
45 à 49 ans	35	330,5	233,8	453,8	13	251,5	139,9	417,6	22	405,9	260,9	602,7
50 à 54 ans	50	501,6	376,3	654,9	24	494,8	324,5	723,0	26	507,9	338,9	731,6
55 à 59 ans	83	896,7	719,2	1 104,2	46	993,1	736,1	1 309,7	37	800,2	572,0	1 088,4
60 à 64 ans	98	1 470,4	1 201,3	1 780,3	59	1 812,6	1 394,4	2 313,7	39	1 143,7	825,4	1 542,7
65 à 69 ans	104	1 872,2	1 539,4	2 253,5	67	2 462,3	1 927,4	3 094,6	37	1 305,6	933,8	1 773,9
70 à 74 ans	95	2 050,5	1 670,6	2 488,3	66	2 985,1	2 333,2	3 754,9	29	1 197,4	818,0	1 690,1
75 à 79 ans	94	2 559,2	2 083,7	3 106,7	55	3 470,0	2 648,0	4 454,1	39	1 867,8	1 349,0	2 515,6
80 à 84 ans	65	2 318,9	1 807,9	2 924,9	32	3 158,9	2 205,2	4 368,2	33	1 843,6	1 292,4	2 545,3
85 ans et plus	57	2 246,7	1 721,0	2 877,6	23	3 079,0	2 006,5	4 498,4	34	1 899,4	1 339,0	2 610,1
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0552).

Tableau 2-4
Personnes diagnostiquées avec une tumeur primaire invasive pour tous les sièges primaires de cancer combinés
(d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie —
Nouvelle-Écosse¹

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2005												
Tous les âges	5 165	551,7	536,9	566,9	2 733	596,8	574,8	619,4	2 432	508,6	488,7	529,0
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	13	20,6	11,5	34,3	7	21,7	9,5	42,7	6	19,5	7,9	40,3
20 à 24 ans	17	26,8	16,1	42,0	11	34,1	18,0	59,1	6	19,3	7,8	39,8
25 à 29 ans	34	59,3	41,7	81,8	16	57,0	33,7	90,4	18	61,5	37,6	95,1
30 à 34 ans	41	68,0	49,4	91,3	15	50,7	29,5	81,6	26	84,7	56,5	122,1
35 à 39 ans	81	124,9	99,8	154,3	31	96,5	66,7	135,1	50	152,8	114,6	199,7
40 à 44 ans	175	218,5	187,9	252,6	54	135,2	102,5	174,9	121	301,3	251,1	358,5
45 à 49 ans	261	338,3	299,1	381,2	99	260,2	212,6	315,3	162	414,3	354,2	481,7
50 à 54 ans	368	524,8	473,2	580,3	183	533,5	460,4	614,8	185	516,4	446,0	594,6
55 à 59 ans	536	820,8	753,7	892,1	292	900,0	801,4	1 007,1	244	742,6	653,9	839,7
60 à 64 ans	622	1 271,9	1 175,4	1 374,1	358	1 486,1	1 338,9	1 644,6	264	1 064,0	941,8	1 197,3
65 à 69 ans	693	1 809,6	1 679,6	1 946,7	425	2 288,1	2 080,2	2 510,4	268	1 358,9	1 204,1	1 527,5
70 à 74 ans	702	2 165,4	2 011,0	2 328,0	426	2 830,8	2 574,4	3 104,5	276	1 588,9	1 410,7	1 782,9
75 à 79 ans	660	2 575,3	2 386,5	2 774,4	365	3 316,4	2 993,5	3 662,8	295	2 017,5	1 798,7	2 254,7
80 à 84 ans	516	2 628,2	2 411,1	2 858,8	277	3 607,2	3 206,7	4 041,2	239	1 999,3	1 759,5	2 261,7
85 ans et plus	434	2 418,9	2 201,4	2 651,2	167	3 091,4	2 653,6	3 577,5	267	2 129,2	1 887,0	2 392,7
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.
2004												
Tous les âges	5 110	545,1	530,3	560,1	2 765	602,1	580,0	624,7	2 345	490,3	470,8	510,4
0 à 4 ans	16	35,8	21,2	56,7	8	35,0	16,3	66,2	8	36,6	17,0	69,2
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	x	x	x	x	7	21,6	9,5	42,6	x	x	x	x
20 à 24 ans	x	x	x	x	10	31,3	15,9	55,6	x	x	x	x
25 à 29 ans	31	54,0	37,3	75,6	18	63,9	39,1	98,8	13	44,5	24,7	73,9
30 à 34 ans	55	89,1	67,7	115,0	20	65,7	41,2	99,4	35	111,8	79,1	153,6
35 à 39 ans	77	113,4	90,1	140,9	30	89,0	61,1	125,3	47	137,5	102,2	181,1
40 à 44 ans	152	188,0	159,9	219,7	49	121,3	90,7	158,9	103	254,7	209,0	307,5
45 à 49 ans	224	292,2	255,8	332,3	100	264,1	216,0	319,6	124	319,7	267,0	379,6
50 à 54 ans	364	528,7	476,5	584,9	177	522,3	449,6	603,3	187	534,8	462,3	615,4
55 à 59 ans	516	820,6	752,3	893,3	278	890,9	791,0	999,7	238	751,3	660,5	850,9
60 à 64 ans	620	1 322,5	1 222,0	1 428,9	363	1 580,5	1 425,0	1 747,8	257	1 074,7	949,7	1 211,3
65 à 69 ans	662	1 760,8	1 631,4	1 897,4	429	2 339,1	2 127,6	2 565,2	233	1 209,9	1 062,5	1 371,6
70 à 74 ans	729	2 278,8	2 119,4	2 446,6	453	3 070,8	2 801,1	3 358,1	276	1 601,1	1 421,5	1 796,5
75 à 79 ans	662	2 587,3	2 397,8	2 787,0	358	3 282,3	2 959,7	3 628,7	304	2 070,8	1 849,5	2 310,5
80 à 84 ans	530	2 682,7	2 464,0	2 914,8	269	3 570,5	3 168,3	4 006,7	261	2 135,5	1 890,0	2 402,9
85 ans et plus	436	2 547,3	2 318,9	2 791,2	192	3 718,0	3 226,4	4 259,1	244	2 041,5	1 799,0	2 306,4
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0552).

Tableau 2-5
Personnes diagnostiquées avec une tumeur primaire invasive pour tous les sièges primaires de cancer combinés
(d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie —
Nouveau-Brunswick¹

	Les deux sexes			Hommes			Femmes					
	Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2005												
Tous les âges	3 918	521,4	505,3	537,8	2 112	569,4	545,6	594,0	1 806	474,6	453,1	496,8
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	6	31,2	12,7	64,4
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	12	24,4	13,2	41,3	6	23,6	9,6	48,7	6	25,2	10,2	52,1
20 à 24 ans	19	37,4	23,2	57,2	8	30,5	14,2	57,6	11	44,8	23,6	77,6
25 à 29 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	12	50,7	27,5	85,9
30 à 34 ans	32	63,6	44,2	88,6	17	67,1	40,4	105,1	15	60,1	34,9	96,6
35 à 39 ans	53	100,1	75,7	129,8	19	71,5	44,3	109,4	34	128,8	90,6	177,7
40 à 44 ans	119	187,7	156,2	223,7	37	117,3	83,8	159,9	82	257,3	206,0	317,5
45 à 49 ans	210	337,3	294,0	385,2	72	232,0	182,8	290,2	138	442,1	372,8	520,3
50 à 54 ans	279	482,8	428,7	541,8	139	487,8	411,7	573,7	140	478,0	403,7	561,9
55 à 59 ans	459	873,0	796,0	955,1	236	903,7	794,2	1 023,9	223	842,6	737,6	958,1
60 à 64 ans	489	1 272,4	1 163,9	1 388,1	304	1 594,3	1 423,5	1 779,3	185	955,5	825,5	1 099,8
65 à 69 ans	539	1 815,4	1 668,1	1 971,9	340	2 345,3	2 108,0	2 601,0	199	1 309,8	1 137,9	1 499,8
70 à 74 ans	516	2 069,1	1 897,8	2 251,2	312	2 726,6	2 439,5	3 036,6	204	1 511,7	1 315,7	1 727,8
75 à 79 ans	488	2 364,5	2 163,5	2 578,3	277	3 171,5	2 818,7	3 554,1	211	1 772,4	1 546,5	2 020,9
80 à 84 ans	383	2 415,6	2 184,9	2 663,1	204	3 379,7	2 944,9	3 857,3	179	1 823,0	1 571,9	2 101,6
85 ans et plus	289	2 120,8	1 888,6	2 372,7	131	3 140,7	2 642,0	3 701,7	158	1 670,9	1 426,6	1 943,9
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.
2004												
Tous les âges	3 715	494,0	478,3	510,0	2 009	541,1	517,9	565,1	1 706	448,0	427,2	469,6
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	6	25,0	10,1	51,6
20 à 24 ans	13	25,4	14,1	42,3	7	26,5	11,6	52,1	6	24,3	9,9	50,2
25 à 29 ans	21	43,9	27,9	65,8	8	33,4	15,5	63,1	13	54,4	30,3	90,4
30 à 34 ans	46	90,3	66,9	119,3	15	58,5	34,0	94,1	31	122,6	84,8	171,6
35 à 39 ans	41	74,1	53,8	99,4	13	46,8	26,0	77,8	28	101,5	68,8	144,5
40 à 44 ans	105	164,8	135,5	198,6	32	101,0	70,2	140,7	73	228,0	180,0	284,8
45 à 49 ans	209	337,0	293,7	385,0	69	223,5	175,2	281,0	140	449,6	379,7	528,5
50 à 54 ans	291	513,2	456,9	574,6	133	474,8	399,2	560,4	158	550,8	469,9	641,4
55 à 59 ans	415	826,5	750,0	908,5	222	885,3	774,8	1 006,9	193	767,8	665,3	881,3
60 à 64 ans	441	1 193,1	1 086,1	1 307,6	278	1 517,6	1 347,9	1 702,2	163	874,3	747,9	1 015,5
65 à 69 ans	469	1 623,5	1 482,4	1 774,0	294	2 103,6	1 875,1	2 351,2	175	1 173,6	1 009,7	1 355,8
70 à 74 ans	482	1 934,6	1 768,9	2 111,1	317	2 756,5	2 468,6	3 067,3	165	1 230,0	1 053,5	1 426,9
75 à 79 ans	474	2 281,4	2 084,7	2 490,9	272	3 118,6	2 768,5	3 498,4	202	1 675,7	1 457,6	1 916,2
80 à 84 ans	366	2 344,1	2 115,2	2 590,0	191	3 240,6	2 810,2	3 714,9	175	1 800,4	1 549,7	2 078,9
85 ans et plus	316	2 407,8	2 155,5	2 680,3	146	3 636,4	3 088,7	4 247,7	170	1 866,3	1 602,9	2 159,3
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0552).

Tableau 2-6
Personnes diagnostiquées avec une tumeur primaire invasive pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie — Québec^{1,2}

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2004												
Tous les âges	36 445	482,9	477,9	487,8	18 795	504,6	497,4	511,8	17 650	461,7	454,9	468,5
0 à 4 ans	92	24,8	20,1	30,2	50	26,2	19,7	34,3	42	23,2	17,0	31,1
5 à 9 ans	61	14,6	11,2	18,6	32	14,9	10,4	20,8	29	14,2	9,7	20,1
10 à 14 ans	41	8,5	6,1	11,4	20	8,1	5,1	12,2	21	8,9	5,6	13,3
15 à 19 ans	95	20,8	16,9	25,3	54	23,1	17,5	29,9	41	18,4	13,4	24,7
20 à 24 ans	159	31,1	26,5	36,2	92	35,1	28,4	42,8	67	26,9	21,0	33,9
25 à 29 ans	208	40,1	35,0	45,9	105	39,6	32,5	47,7	103	40,7	33,4	49,1
30 à 34 ans	342	69,3	62,3	77,0	135	53,4	45,0	63,0	207	86,0	74,9	98,3
35 à 39 ans	544	98,2	90,2	106,7	176	62,3	53,6	72,0	368	135,5	122,2	149,9
40 à 44 ans	1 189	182,8	172,6	193,4	383	116,5	105,3	128,6	806	250,4	233,6	268,1
45 à 49 ans	1 813	286,7	273,7	300,1	691	219,1	203,3	235,9	1 122	353,8	333,6	374,9
50 à 54 ans	2 763	496,3	478,1	515,0	1 155	420,2	396,5	444,9	1 608	570,5	543,2	598,8
55 à 59 ans	3 898	790,0	765,6	815,0	2 004	827,4	791,9	864,0	1 894	754,0	720,7	788,4
60 à 64 ans	4 549	1 184,9	1 151,0	1 219,5	2 627	1 407,8	1 355,0	1 462,0	1 922	974,2	931,5	1 018,2
65 à 69 ans	4 674	1 579,5	1 535,0	1 624,9	2 780	1 989,7	1 917,4	2 063,8	1 894	1 212,6	1 159,2	1 267,7
70 à 74 ans	5 049	1 901,2	1 849,7	1 953,6	2 916	2 438,3	2 352,0	2 526,9	2 133	1 461,1	1 400,5	1 523,6
75 à 79 ans	4 613	2 185,6	2 123,9	2 248,6	2 544	2 909,6	2 799,7	3 022,5	2 069	1 673,6	1 603,2	1 746,2
80 à 84 ans	3 563	2 502,8	2 422,6	2 584,9	1 832	3 582,0	3 423,4	3 745,6	1 731	1 897,7	1 810,7	1 987,8
85 ans et plus	2 792	2 594,5	2 500,8	2 690,7	1 199	4 052,6	3 832,2	4 281,6	1 593	2 041,7	1 944,1	2 142,6
Groupe d'âge, non déclaré	0				0				0			

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.

2. Ne sont pas inclus les cas de cancer pour 2003 à 2004 chez les résidents du Québec diagnostiqués ou traités uniquement en Ontario.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0552).

Tableau 2-7
Personnes diagnostiquées avec une tumeur primaire invasive pour tous les sièges primaires de cancer combinés
(d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie — Ontario^{1,2}

	Les deux sexes			Hommes			Femmes					
	Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2005												
Tous les âges	57 920	461,2	457,5	465,0	30 003	483,8	478,4	489,3	27 917	439,1	434,0	444,3
0 à 4 ans	135	20,0	16,8	23,6	60	17,4	13,4	22,2	75	22,7	18,0	28,3
5 à 9 ans	x	x	x	x	52	13,3	10,0	17,3	x	x	x	x
10 à 14 ans	98	11,7	9,5	14,2	44	10,3	7,5	13,6	54	13,2	10,0	17,1
15 à 19 ans	181	21,5	18,6	24,9	95	22,0	17,9	26,8	86	21,0	16,9	25,8
20 à 24 ans	314	36,4	32,6	40,6	141	32,2	27,2	37,8	173	40,9	35,1	47,3
25 à 29 ans	487	58,0	53,0	63,3	200	47,5	41,2	54,4	287	68,5	60,9	76,8
30 à 34 ans	776	86,3	80,4	92,5	280	62,2	55,2	69,8	496	110,4	101,0	120,4
35 à 39 ans	1 243	128,6	121,6	135,9	353	73,2	65,8	81,1	890	183,9	172,1	196,3
40 à 44 ans	2 144	195,9	187,7	204,3	689	125,4	116,3	135,0	1 455	267,0	253,5	281,0
45 à 49 ans	3 269	328,8	317,6	340,1	1 202	242,9	229,5	256,9	2 067	413,8	396,3	431,9
50 à 54 ans	4 490	524,3	509,2	539,8	2 059	489,0	468,3	510,4	2 431	558,4	536,6	580,9
55 à 59 ans	6 109	812,4	792,3	832,9	3 188	861,1	831,7	891,2	2 921	765,2	738,0	793,3
60 à 64 ans	6 705	1 196,1	1 167,9	1 224,8	3 895	1 421,1	1 377,3	1 466,0	2 810	980,8	945,2	1 017,3
65 à 69 ans	7 501	1 644,1	1 607,5	1 681,3	4 547	2 081,8	2 022,5	2 142,3	2 954	1 242,1	1 198,1	1 287,2
70 à 74 ans	7 872	1 967,4	1 924,7	2 010,8	4 694	2 501,0	2 431,1	2 572,4	3 178	1 496,0	1 445,0	1 548,3
75 à 79 ans	7 407	2 216,7	2 167,2	2 267,1	4 139	2 819,6	2 735,8	2 905,2	3 268	1 744,4	1 685,8	1 804,4
80 à 84 ans	5 425	2 239,8	2 181,4	2 299,3	2 742	2 908,5	2 802,6	3 017,2	2 683	1 813,6	1 746,5	1 882,5
85 ans et plus	3 675	2 066,7	2 001,3	2 133,6	1 623	2 914,6	2 777,2	3 056,7	2 052	1 680,1	1 609,1	1 753,3
Groupe d'âge, non déclaré	x	.	.	.	0	.	.	.	x	.	.	.
2004												
Tous les âges	55 346	446,1	442,4	449,8	28 717	468,7	463,3	474,1	26 629	424,0	419,0	429,1
0 à 4 ans	154	22,7	19,3	26,5	84	24,2	19,4	29,8	70	21,0	16,5	26,4
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	47	12,3	9,1	16,2
10 à 14 ans	x	x	x	x	48	11,2	8,4	14,8	x	x	x	x
15 à 19 ans	193	23,3	20,2	26,7	98	23,0	18,8	27,9	95	23,5	19,1	28,6
20 à 24 ans	288	34,0	30,3	38,1	137	31,8	26,8	37,5	151	36,4	30,9	42,5
25 à 29 ans	455	54,7	49,9	59,9	190	45,5	39,4	52,3	265	64,1	56,7	72,1
30 à 34 ans	775	86,0	80,1	92,2	269	59,6	52,8	67,0	506	112,5	103,0	122,6
35 à 39 ans	1 200	122,3	115,6	129,4	381	77,7	70,2	85,8	819	166,9	155,8	178,6
40 à 44 ans	2 095	193,4	185,2	201,8	657	120,8	111,8	130,3	1 438	266,6	253,1	280,7
45 à 49 ans	3 077	318,3	307,2	329,6	1 170	243,8	230,1	258,0	1 907	391,7	374,4	409,5
50 à 54 ans	4 161	501,3	486,2	516,6	1 865	457,3	436,9	478,4	2 296	543,7	521,9	566,3
55 à 59 ans	5 680	789,1	768,9	809,7	3 028	852,1	822,2	882,7	2 652	727,7	700,5	755,7
60 à 64 ans	6 341	1 169,6	1 141,2	1 198,5	3 626	1 369,8	1 326,0	1 414,6	2 715	978,6	942,5	1 015,7
65 à 69 ans	7 258	1 614,8	1 578,3	1 652,0	4 391	2 038,6	1 979,5	2 098,9	2 867	1 224,9	1 180,9	1 270,1
70 à 74 ans	7 840	1 957,8	1 915,2	2 001,0	4 700	2 503,3	2 433,4	2 574,7	3 140	1 476,2	1 425,6	1 528,1
75 à 79 ans	7 020	2 129,7	2 080,8	2 179,4	3 937	2 750,1	2 666,3	2 835,7	3 083	1 653,4	1 596,2	1 712,0
80 à 84 ans	5 206	2 220,8	2 161,7	2 281,0	2 644	2 918,1	2 809,9	3 029,1	2 562	1 781,4	1 714,0	1 850,7
85 ans et plus	3 410	2 038,4	1 971,5	2 106,9	1 442	2 791,2	2 651,7	2 935,8	1 968	1 702,0	1 628,6	1 777,8
Groupe d'âge, non déclaré	x	.	.	.	x	.	.	.	x	.	.	.

1. Les données pour 2004 ne sont pas disponibles pour le Canada, Terre-Neuve-et-Labrador et Québec.
 2. Les données de 2003, 2004 et 2005 pour l'Ontario sont provisoires. Elles n'incluent pas les cas identifiés par certificat de décès seulement, lesquels sont estimés à environ 2 %. Les sièges in situ pour la vessie diagnostiqués en Ontario ne sont pas déclarés au Registre canadien du cancer.
Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».
Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0552).

Tableau 2-8
Personnes diagnostiquées avec une tumeur primaire invasive pour tous les sièges primaires de cancer combinés
(d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie — Manitoba^{1,2}

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2005												
Tous les âges	5 155	439,0	427,2	451,1	2 546	436,6	419,9	453,8	2 609	441,5	424,8	458,6
0 à 4 ans	18	25,8	15,8	40,0	9	25,3	12,4	46,3	9	26,4	12,9	48,2
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	16	18,9	11,2	30,0	6	13,9	5,7	28,8	10	24,1	12,2	42,8
20 à 24 ans	22	26,4	16,9	39,2	13	30,3	16,8	50,3	9	22,2	10,8	40,6
25 à 29 ans	39	50,0	36,0	67,6	17	42,7	25,7	66,8	22	57,6	37,0	85,6
30 à 34 ans	54	70,0	53,1	90,6	28	70,8	47,9	100,8	26	69,2	46,1	99,7
35 à 39 ans	67	86,0	67,2	108,5	27	68,0	45,7	97,5	40	104,6	75,7	140,9
40 à 44 ans	154	165,4	140,8	193,1	57	121,0	92,5	155,6	97	210,9	171,9	256,0
45 à 49 ans	258	288,0	254,5	324,7	82	180,3	144,3	222,5	176	399,1	343,4	461,3
50 à 54 ans	384	481,3	435,0	531,1	155	392,7	334,5	458,0	229	568,0	498,1	644,9
55 à 59 ans	503	721,6	660,8	786,5	253	731,2	645,3	825,0	250	712,2	628,2	804,2
60 à 64 ans	556	1 083,4	996,5	1 175,7	280	1 104,7	981,3	1 238,9	276	1 062,6	943,1	1 192,7
65 à 69 ans	647	1 596,2	1 477,5	1 721,6	363	1 864,0	1 680,9	2 061,0	284	1 348,6	1 199,2	1 511,0
70 à 74 ans	692	1 886,0	1 750,4	2 028,9	410	2 386,5	2 165,9	2 622,6	282	1 445,3	1 284,7	1 619,8
75 à 79 ans	703	2 157,4	2 003,7	2 319,3	375	2 646,2	2 391,2	2 919,9	328	1 781,2	1 597,4	1 979,6
80 à 84 ans	524	2 010,7	1 845,4	2 186,4	243	2 433,4	2 144,3	2 749,1	281	1 748,2	1 553,8	1 959,3
85 ans et plus	505	2 186,5	2 003,6	2 381,0	221	3 129,0	2 741,1	3 553,7	284	1 771,3	1 575,5	1 984,1
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.
2004												
Tous les âges	5 379	459,7	447,5	472,0	2 730	469,9	452,6	487,8	2 649	449,5	432,7	466,9
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	6	13,9	5,6	28,7	x	x	x	x
15 à 19 ans	15	17,9	10,4	28,7	9	21,0	10,3	38,4	6	14,6	5,9	30,2
20 à 24 ans	31	37,6	26,0	52,7	13	30,7	17,1	51,0	18	45,1	27,5	69,7
25 à 29 ans	35	45,0	31,8	61,8	12	30,2	16,4	51,2	23	60,4	39,2	89,0
30 à 34 ans	60	77,6	59,7	99,1	21	53,1	33,7	79,6	39	103,3	74,4	139,6
35 à 39 ans	94	117,0	95,1	142,5	38	92,9	66,7	126,1	56	142,1	108,3	183,0
40 à 44 ans	146	154,9	131,3	181,6	53	110,7	83,8	143,6	93	200,5	162,7	244,3
45 à 49 ans	280	317,4	281,9	356,2	114	255,8	212,0	306,0	166	380,4	325,8	441,4
50 à 54 ans	393	504,9	456,9	556,6	154	400,2	340,7	467,0	239	607,4	534,1	687,8
55 à 59 ans	501	749,6	686,3	817,1	254	763,3	673,9	861,1	247	736,1	648,7	831,8
60 à 64 ans	587	1 184,3	1 091,8	1 282,3	315	1 295,6	1 159,0	1 443,5	272	1 077,1	955,2	1 210,0
65 à 69 ans	602	1 494,1	1 379,0	1 616,0	369	1 903,4	1 717,9	2 102,8	233	1 114,6	978,7	1 263,6
70 à 74 ans	739	1 983,7	1 845,7	2 128,9	419	2 410,3	2 189,8	2 646,0	320	1 610,5	1 442,2	1 792,4
75 à 79 ans	760	2 328,9	2 169,3	2 496,7	422	3 002,5	2 729,5	3 294,0	338	1 819,4	1 634,3	2 018,9
80 à 84 ans	655	2 538,7	2 351,8	2 735,8	333	3 410,5	3 063,5	3 783,8	322	2 007,9	1 799,0	2 233,4
85 ans et plus	458	2 052,7	1 872,6	2 244,8	190	2 786,3	2 414,7	3 196,5	268	1 729,8	1 533,1	1 944,0
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.

2. Les données de 2005 pour le Manitoba sont provisoires. L'incidence des cancers de la prostate et de l'appareil génito-urinaire mâle sont sous-estimés. Cette situation sera rectifiée lors de la prochaine diffusion annuelle.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0552).

Tableau 2-9
Personnes diagnostiquées avec une tumeur primaire invasive pour tous les sièges primaires de cancer combinés
(d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie —
Saskatchewan¹

	Les deux sexes			Hommes			Femmes					
	Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2005												
Tous les âges	4 586	463,3	450,0	476,8	2 529	514,1	494,4	534,4	2 057	413,0	395,5	431,1
0 à 4 ans	x	x	x	x	10	32,7	16,6	58,1	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	17	22,1	13,3	34,6	11	27,8	14,6	48,2	6	16,1	6,5	33,2
20 à 24 ans	24	32,4	21,2	47,4	16	41,5	24,6	65,8	8	22,5	10,5	42,6
25 à 29 ans	30	47,5	32,6	66,8	9	28,1	13,7	51,3	21	67,5	42,9	101,2
30 à 34 ans	32	54,9	38,2	76,5	13	44,4	24,7	73,8	19	65,4	40,6	100,1
35 à 39 ans	54	90,2	68,4	116,8	16	53,4	31,6	84,7	38	127,0	91,2	172,4
40 à 44 ans	130	173,4	145,4	205,1	50	133,4	100,0	174,2	80	213,4	170,3	264,0
45 à 49 ans	194	254,7	220,7	292,4	73	189,4	149,5	236,6	121	321,6	268,1	382,7
50 à 54 ans	304	449,5	401,1	502,0	129	377,1	316,1	446,3	175	523,5	450,2	605,2
55 à 59 ans	384	692,0	625,5	763,5	204	734,2	638,7	839,6	180	649,7	560,0	749,5
60 à 64 ans	534	1 261,1	1 158,0	1 370,7	313	1 496,9	1 338,7	1 668,1	221	1 031,1	902,2	1 172,9
65 à 69 ans	613	1 702,7	1 572,8	1 840,1	388	2 227,8	2 016,2	2 454,8	225	1 210,6	1 060,6	1 375,3
70 à 74 ans	625	1 862,8	1 722,1	2 011,5	402	2 544,9	2 307,6	2 799,0	223	1 255,9	1 099,7	1 427,6
75 à 79 ans	663	2 187,8	2 027,4	2 356,9	411	3 039,5	2 759,7	3 338,6	252	1 501,5	1 325,5	1 693,8
80 à 84 ans	533	2 244,4	2 061,6	2 438,5	289	3 044,3	2 712,3	3 403,9	244	1 711,7	1 508,1	1 934,3
85 ans et plus	422	1 791,7	1 628,0	1 966,9	190	2 443,7	2 117,3	2 804,3	232	1 470,4	1 291,1	1 667,0
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.
2004												
Tous les âges	4 836	486,4	472,8	500,2	2 703	547,2	526,9	568,1	2 133	426,3	408,5	444,6
0 à 4 ans	x	x	x	x	7	22,9	10,0	45,0	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	15	19,3	11,2	31,0	8	20,0	9,3	37,8	7	18,5	8,1	36,5
20 à 24 ans	18	24,3	14,9	37,7	9	23,5	11,5	42,9	9	25,3	12,3	46,2
25 à 29 ans	22	35,0	22,5	52,0	9	28,1	13,7	51,3	13	42,2	23,5	70,1
30 à 34 ans	39	66,6	48,0	90,0	21	71,6	45,5	107,4	18	61,6	37,6	95,2
35 à 39 ans	43	68,6	50,2	91,4	13	41,4	23,0	68,9	30	95,7	65,7	134,7
40 à 44 ans	144	186,9	158,2	219,3	46	119,1	88,2	157,3	98	255,2	208,3	309,4
45 à 49 ans	229	300,9	263,8	341,7	84	218,6	175,5	269,1	145	384,8	325,9	451,1
50 à 54 ans	294	451,2	401,9	504,9	150	454,6	386,2	531,5	144	447,8	379,1	525,3
55 à 59 ans	408	768,2	696,6	845,1	227	852,3	747,0	968,0	181	683,7	589,6	788,3
60 à 64 ans	501	1 210,2	1 108,2	1 318,9	296	1 451,5	1 294,0	1 622,5	205	975,9	849,4	1 115,6
65 à 69 ans	638	1 774,0	1 641,3	1 914,2	410	2 355,1	2 137,4	2 588,1	228	1 228,8	1 077,5	1 394,8
70 à 74 ans	722	2 105,7	1 957,6	2 261,6	467	2 900,6	2 649,4	3 168,1	255	1 402,0	1 238,5	1 580,5
75 à 79 ans	728	2 382,3	2 215,6	2 557,6	431	3 177,3	2 891,6	3 482,1	297	1 747,7	1 558,5	1 952,8
80 à 84 ans	528	2 225,3	2 043,2	2 418,7	289	3 070,9	2 736,0	3 433,5	239	1 669,5	1 468,9	1 889,0
85 ans et plus	487	2 126,2	1 945,1	2 318,9	229	3 020,3	2 652,0	3 423,0	258	1 683,7	1 488,7	1 896,5
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0552).

Tableau 2-10
Personnes diagnostiquées avec une tumeur primaire invasive pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie — Alberta^{1,2}

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2005												
Tous les âges	12 165	371,2	364,6	377,8	6 384	385,4	376,1	395,0	5 781	356,6	347,5	365,8
0 à 4 ans	32	16,0	11,1	22,3	24	23,5	15,4	34,3	8	8,2	3,8	15,4
5 à 9 ans	27	13,1	8,8	18,8	20	18,9	11,9	28,6	7	7,0	3,1	13,8
10 à 14 ans	21	9,5	6,0	14,2	11	9,6	5,1	16,6	10	9,3	4,7	16,5
15 à 19 ans	49	20,7	15,5	27,2	30	24,7	17,0	34,8	19	16,5	10,2	25,3
20 à 24 ans	76	29,9	23,7	37,1	43	32,7	24,0	43,6	33	26,8	18,7	37,1
25 à 29 ans	129	50,5	42,4	59,8	52	39,2	29,6	51,0	77	62,8	49,9	78,0
30 à 34 ans	179	73,4	63,2	84,8	61	48,3	37,2	61,6	118	100,4	83,5	119,8
35 à 39 ans	239	98,9	87,0	112,0	92	73,9	59,9	90,2	147	125,4	106,3	146,9
40 à 44 ans	492	177,4	162,3	193,6	174	123,9	106,4	143,3	318	232,5	207,9	259,0
45 à 49 ans	764	284,3	264,6	304,9	307	224,9	200,8	251,1	457	345,5	314,9	378,2
50 à 54 ans	1 019	456,5	429,1	485,1	460	406,1	370,3	444,4	559	508,3	467,5	551,6
55 à 59 ans	1 320	737,3	698,5	777,8	736	814,5	757,4	874,7	584	658,7	607,0	713,6
60 à 64 ans	1 416	1 109,4	1 053,0	1 167,9	781	1 220,3	1 137,4	1 307,5	635	997,8	922,7	1 077,2
65 à 69 ans	1 512	1 524,4	1 449,5	1 602,0	910	1 874,5	1 756,7	1 998,0	602	1 188,7	1 097,0	1 285,8
70 à 74 ans	1 614	1 893,7	1 803,8	1 986,8	960	2 348,2	2 204,7	2 498,3	654	1 474,7	1 365,6	1 590,0
75 à 79 ans	1 447	2 095,3	1 990,4	2 204,1	848	2 709,9	2 534,1	2 894,0	599	1 586,1	1 463,6	1 715,7
80 à 84 ans	1 046	2 153,1	2 026,8	2 285,0	535	2 756,3	2 532,7	2 993,5	511	1 751,8	1 605,8	1 907,0
85 ans et plus	783	1 964,4	1 831,5	2 104,0	340	2 668,1	2 398,5	2 958,4	443	1 633,7	1 487,7	1 789,6
Groupe d'âge, non déclaré	0				0				0			
2004												
Tous les âges	12 670	395,3	388,5	402,3	6 633	409,6	399,9	419,5	6 037	380,8	371,3	390,5
0 à 4 ans	31	15,9	11,0	22,2	15	15,0	8,7	24,2	16	16,8	9,9	26,6
5 à 9 ans	23	11,2	7,3	16,5	14	13,2	7,5	21,6	9	9,0	4,4	16,5
10 à 14 ans	28	12,5	8,5	17,9	16	13,9	8,2	22,1	12	11,1	6,0	18,8
15 à 19 ans	50	21,5	16,1	28,1	25	20,9	13,8	30,3	25	22,1	14,6	32,1
20 à 24 ans	74	29,9	23,7	37,3	31	24,3	16,8	34,0	43	35,9	26,3	47,9
25 à 29 ans	121	49,4	41,2	58,8	47	36,9	27,4	48,6	74	63,1	49,9	78,7
30 à 34 ans	172	72,1	61,9	83,5	64	51,7	40,2	65,6	108	94,0	77,5	113,0
35 à 39 ans	306	126,9	113,3	141,8	119	96,3	80,1	114,7	187	159,2	137,6	183,3
40 à 44 ans	513	184,3	168,9	200,8	159	112,7	96,1	131,2	354	258,0	232,2	285,9
45 à 49 ans	795	303,5	283,0	325,1	293	219,9	195,8	246,1	502	390,2	357,2	425,4
50 à 54 ans	1 054	496,3	467,0	526,8	484	449,5	410,8	490,7	570	544,4	501,1	590,3
55 à 59 ans	1 275	755,6	715,1	797,8	700	823,2	764,1	885,6	575	687,0	632,7	744,6
60 à 64 ans	1 476	1 209,5	1 149,3	1 272,0	869	1 423,2	1 331,4	1 519,4	607	995,6	919,0	1 076,7
65 à 69 ans	1 543	1 593,0	1 515,5	1 673,3	913	1 926,9	1 805,9	2 053,5	630	1 273,3	1 177,2	1 374,9
70 à 74 ans	1 748	2 064,5	1 970,3	2 161,9	1 072	2 639,6	2 486,9	2 798,8	676	1 534,3	1 422,6	1 652,2
75 à 79 ans	1 520	2 279,7	2 168,4	2 395,0	877	2 936,0	2 748,9	3 131,8	643	1 747,1	1 616,9	1 884,7
80 à 84 ans	1 120	2 364,2	2 230,2	2 503,9	581	3 101,1	2 859,8	3 356,4	539	1 882,1	1 729,4	2 044,3
85 ans et plus	821	2 198,2	2 053,0	2 350,5	354	2 984,8	2 689,5	3 302,2	467	1 832,2	1 672,8	2 002,2
Groupe d'âge, non déclaré	0				0				0			

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.

2. Les données de 2005 pour l'Alberta sont provisoires. Approximativement 2 % des nouveaux cas du cancer n'ont pas été inclus afin de respecter le délai établi par le Conseil canadien des registres du cancer.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0552).

Tableau 2-11
Personnes diagnostiquées avec une tumeur primaire invasive pour tous les sièges primaires de cancer combinés
(d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie —
Colombie-Britannique¹

	Les deux sexes			Hommes			Femmes					
	Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2005												
Tous les âges	18 378	431,6	425,4	437,9	9 621	455,7	446,7	464,9	8 757	407,9	399,5	416,5
0 à 4 ans	48	23,3	17,4	30,6	27	25,5	17,1	36,5	21	21,0	13,3	31,4
5 à 9 ans	19	8,3	5,1	12,7	13	11,0	6,1	18,3	6	5,4	2,2	11,1
10 à 14 ans	29	11,1	7,6	15,8	20	14,9	9,4	22,6	9	7,1	3,5	13,0
15 à 19 ans	36	12,9	9,1	17,6	20	13,9	8,7	21,1	16	11,7	6,9	18,6
20 à 24 ans	89	29,3	23,7	35,9	45	28,9	21,3	38,3	44	29,8	21,9	39,6
25 à 29 ans	120	43,1	35,9	51,3	52	37,2	28,0	48,3	68	49,1	38,4	61,8
30 à 34 ans	185	63,5	54,9	73,2	79	54,4	43,4	67,4	106	72,6	59,7	87,4
35 à 39 ans	316	100,6	89,9	112,1	105	67,5	55,4	81,3	211	133,1	116,0	152,0
40 à 44 ans	605	169,5	156,4	183,4	210	118,2	103,0	135,0	395	220,3	199,3	242,8
45 à 49 ans	929	265,3	248,7	282,8	334	193,1	173,2	214,6	595	335,8	309,7	363,6
50 à 54 ans	1 344	423,0	400,8	446,0	594	376,6	347,3	407,8	750	468,6	436,0	502,9
55 à 59 ans	1 873	673,7	643,8	704,6	973	704,1	661,1	749,3	900	643,6	602,7	686,5
60 à 64 ans	2 139	1 040,9	997,7	1 085,5	1 192	1 172,6	1 107,8	1 240,1	947	912,1	855,5	971,2
65 à 69 ans	2 301	1 417,1	1 360,4	1 475,4	1 350	1 687,2	1 599,7	1 778,2	951	1 154,6	1 083,3	1 229,3
70 à 74 ans	2 560	1 796,7	1 728,7	1 866,6	1 551	2 215,9	2 108,7	2 326,9	1 009	1 391,9	1 308,5	1 479,1
75 à 79 ans	2 464	2 073,4	1 993,5	2 155,5	1 388	2 546,4	2 416,6	2 681,1	1 076	1 672,6	1 575,6	1 773,8
80 à 84 ans	1 836	2 056,5	1 964,9	2 151,1	975	2 689,0	2 526,1	2 859,1	861	1 623,9	1 518,8	1 734,1
85 ans et plus	1 485	2 022,4	1 922,4	2 126,0	693	2 828,2	2 626,0	3 041,2	792	1 618,8	1 509,7	1 733,4
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.
2004												
Tous les âges	18 014	428,7	422,5	435,0	9 448	453,6	444,5	462,8	8 566	404,2	395,8	412,9
0 à 4 ans	43	20,9	15,3	27,8	21	19,8	12,6	29,7	22	22,0	14,1	32,6
5 à 9 ans	17	7,3	4,4	11,4	10	8,3	4,2	14,8	7	6,2	2,7	12,1
10 à 14 ans	16	6,1	3,6	9,7	8	6,0	2,8	11,3	8	6,3	2,9	11,9
15 à 19 ans	49	17,5	13,1	22,9	29	20,2	13,7	28,5	20	14,7	9,2	22,3
20 à 24 ans	92	31,1	25,2	38,0	48	31,8	23,7	41,7	44	30,4	22,4	40,5
25 à 29 ans	124	45,6	38,1	54,1	60	43,9	33,8	56,1	64	47,3	36,7	59,9
30 à 34 ans	193	65,5	56,7	75,2	80	54,5	43,5	67,4	113	76,4	63,2	91,4
35 à 39 ans	305	97,1	86,6	108,4	114	73,1	60,6	87,5	191	120,7	104,4	138,7
40 à 44 ans	588	164,6	151,7	178,2	180	101,4	87,3	117,0	408	227,0	205,8	249,8
45 à 49 ans	972	282,5	265,2	300,7	381	224,6	202,9	248,0	591	338,8	312,3	366,9
50 à 54 ans	1 306	422,9	400,4	446,2	587	382,1	352,1	413,9	719	463,3	430,4	498,0
55 à 59 ans	1 793	682,8	651,8	714,8	915	700,3	656,1	746,6	878	665,4	622,6	710,4
60 à 64 ans	2 009	1 018,6	974,9	1 063,6	1 142	1 168,2	1 102,2	1 237,0	867	871,5	815,1	930,7
65 à 69 ans	2 209	1 390,6	1 333,9	1 449,0	1 289	1 643,8	1 556,6	1 734,6	920	1 143,7	1 071,9	1 218,9
70 à 74 ans	2 530	1 781,0	1 713,2	1 850,8	1 580	2 268,0	2 159,4	2 380,5	950	1 312,4	1 231,3	1 397,2
75 à 79 ans	2 378	2 040,8	1 960,7	2 123,1	1 362	2 582,4	2 449,5	2 720,3	1 016	1 592,9	1 497,9	1 692,2
80 à 84 ans	1 923	2 185,9	2 090,8	2 284,0	971	2 738,4	2 572,2	2 912,0	952	1 812,8	1 701,3	1 929,5
85 ans et plus	1 467	2 130,4	2 024,5	2 240,2	671	2 951,7	2 737,3	3 177,5	796	1 725,6	1 609,7	1 847,4
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0552).

Tableau 2-12
Personnes diagnostiquées avec une tumeur primaire invasive pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie — Territoire du Yukon¹

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2005												
Tous les âges	96	308,5	251,2	374,8	40	255,1	184,7	343,5	56	362,7	276,6	467,0
0 à 4 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
5 à 9 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
10 à 14 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15 à 19 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
20 à 24 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
25 à 29 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
30 à 34 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
35 à 39 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40 à 44 ans	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
45 à 49 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	11	702,9	370,1	1 213,4
50 à 54 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	6	479,2	195,0	986,8
55 à 59 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	12	1 265,8	687,2	2 132,8
60 à 64 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
65 à 69 ans	x	x	x	x	8	1 606,4	748,8	3 005,7	x	x	x	x
70 à 74 ans	15	2 467,1	1 438,4	3 929,3	8	2 492,2	1 163,4	4 636,9	7	2 439,0	1 072,9	4 717,8
75 à 79 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80 à 84 ans	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
85 ans et plus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.
2004												
Tous les âges	83	269,0	215,6	331,5	48	307,6	229,4	404,0	35	229,5	162,3	315,1
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
5 à 9 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
10 à 14 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15 à 19 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
20 à 24 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
25 à 29 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
30 à 34 ans	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
35 à 39 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40 à 44 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45 à 49 ans	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
50 à 54 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
55 à 59 ans	16	804,4	476,6	1 271,7	8	738,7	343,9	1 389,7	8	883,0	411,1	1 659,7
60 à 64 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
65 à 69 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
70 à 74 ans	x	x	x	x	10	3 278,7	1 674,6	5 721,3	x	x	x	x
75 à 79 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80 à 84 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85 ans et plus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0552).

Tableau 2-13

Personnes diagnostiquées avec une tumeur primaire invasive pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie — Territoires du Nord-Ouest¹

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2005												
Tous les âges	69	161,9	126,9	203,5	33	150,0	105,0	208,0	36	174,5	124,0	238,6
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
5 à 9 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
10 à 14 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15 à 19 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
20 à 24 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
25 à 29 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
30 à 34 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
35 à 39 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40 à 44 ans	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
45 à 49 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
50 à 54 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
55 à 59 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
60 à 64 ans	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
65 à 69 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
70 à 74 ans	x	x	x	x	6	2 222,2	906,5	4 513,3	x	x	x	x
75 à 79 ans	x	x	x	x	8	4 678,4	2 191,5	8 584,8	x	x	x	x
80 à 84 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85 ans et plus	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.
2004												
Tous les âges	85	198,4	159,4	243,9	44	199,2	146,5	264,7	41	197,5	143,6	265,0
0 à 4 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
5 à 9 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
10 à 14 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15 à 19 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
20 à 24 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
25 à 29 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
30 à 34 ans	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
35 à 39 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40 à 44 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45 à 49 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
50 à 54 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	7	570,0	250,0	1 117,2
55 à 59 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
60 à 64 ans	x	x	x	x	9	1 355,4	662,9	2 457,9	x	x	x	x
65 à 69 ans	x	x	x	x	8	2 030,5	947,1	3 788,8	0	0,0	0,0	0,0
70 à 74 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
75 à 79 ans	x	x	x	x	6	3 703,7	1 514,4	7 434,8	x	x	x	x
80 à 84 ans	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
85 ans et plus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0552).

Tableau 2-14
Personnes diagnostiquées avec une tumeur primaire invasive pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie — Nunavut¹

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2005												
Tous les âges	70	233,0	183,0	292,4	36	231,4	164,5	316,4	34	234,8	165,2	323,9
0 à 4 ans	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
10 à 14 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15 à 19 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
20 à 24 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
25 à 29 ans	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
30 à 34 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
35 à 39 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
40 à 44 ans	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
45 à 49 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
50 à 54 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
55 à 59 ans	x	x	x	x	8	1 941,7	905,6	3 625,3	x	x	x	x
60 à 64 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	7	2 287,6	1 006,0	4 429,5
65 à 69 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
70 à 74 ans	x	x	x	x	6	4 838,7	1 982,1	9 627,2	x	x	x	x
75 à 79 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80 à 84 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85 ans et plus	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.
2004												
Tous les âges	48	161,8	120,6	212,5	25	162,8	107,7	236,3	23	160,7	104,3	236,8
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
5 à 9 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
10 à 14 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
15 à 19 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
20 à 24 ans	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
25 à 29 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
30 à 34 ans	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
35 à 39 ans	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
40 à 44 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45 à 49 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
50 à 54 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
55 à 59 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
60 à 64 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
65 à 69 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
70 à 74 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
75 à 79 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
80 à 84 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
85 ans et plus	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Groupe d'âge, non déclaré	0	.	.	.	0	.	.	.	0	.	.	.

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ».

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0552).

**Tableau 3-1
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie — Canada¹**

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2004												
Total, tous les sièges primaires de cancer	147 108	393,2	391,2	395,3	77 042	456,2	452,9	459,4	70 066	347,2	344,6	349,9
Lèvre (C00.0-C00.9)	362	0,9	0,8	1,0	267	1,6	1,4	1,8	95	0,4	0,3	0,5
Langue (C01.9-C02.9)	751	2,0	1,9	2,1	516	2,9	2,6	3,2	235	1,2	1,0	1,3
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	378	1,0	0,9	1,1	222	1,3	1,2	1,5	156	0,8	0,7	0,9
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	214	0,6	0,5	0,6	147	0,8	0,7	1,0	67	0,3	0,2	0,4
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	421	1,1	1,0	1,2	232	1,3	1,2	1,5	189	0,9	0,8	1,1
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	231	0,6	0,5	0,7	153	0,9	0,7	1,0	78	0,4	0,3	0,5
Oropharynx (C10.0-C10.9)	113	0,3	0,2	0,4	84	0,5	0,4	0,6	29	0,1	0,1	0,2
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	212	0,6	0,5	0,6	177	1,0	0,9	1,2	35	0,2	0,1	0,2
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	535	1,4	1,3	1,5	397	2,1	1,9	2,3	138	0,7	0,6	0,8
Oesophage (C15.0-C15.9)	1 376	3,6	3,4	3,8	1 020	6,0	5,6	6,4	356	1,6	1,4	1,8
Estomac (C16.0-C16.9)	2 951	7,7	7,4	8,0	1 890	11,2	10,7	11,7	1 061	4,9	4,6	5,2
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	531	1,4	1,3	1,5	297	1,7	1,5	1,9	234	1,1	1,0	1,3
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	12 740	33,3	32,8	33,9	6 389	37,9	37,0	38,9	6 351	29,5	28,8	30,3
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	6 263	16,5	16,1	16,9	3 887	22,7	21,9	23,4	2 376	11,4	10,9	11,8
Anus (C21.0-C21.8)	515	1,3	1,2	1,5	250	1,4	1,3	1,6	265	1,3	1,1	1,5
Foie (C22.0)	1 182	3,1	3,0	3,3	892	5,1	4,8	5,5	290	1,4	1,3	1,6
Vésicule biliaire (C23.9)	413	1,1	1,0	1,2	138	0,8	0,7	1,0	275	1,3	1,1	1,4
Pancréas (C25.0-C25.9)	3 470	9,1	8,8	9,4	1 734	10,2	9,7	10,7	1 736	8,0	7,6	8,4
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	1 434	3,8	3,6	4,0	671	4,0	3,7	4,3	763	3,6	3,3	3,9
Larynx (C32.0-C32.9)	1 097	2,9	2,8	3,1	905	5,2	4,9	5,6	192	1,0	0,8	1,1
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	20 874	55,6	54,8	56,4	11 724	69,6	68,3	70,8	9 150	45,1	44,1	46,0
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	329	0,9	0,8	1,0	203	1,2	1,0	1,4	126	0,6	0,5	0,8
Os et articulations (C40.0-C41.9)	295	0,9	0,8	1,0	166	1,0	0,9	1,2	129	0,7	0,6	0,9
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	882	2,5	2,3	2,7	463	2,8	2,5	3,0	419	2,3	2,0	2,5
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	4 096	11,2	10,8	11,5	2 155	12,5	12,0	13,0	1 941	10,2	9,8	10,7
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	332	0,9	0,8	1,0	173	1,0	0,9	1,2	159	0,8	0,7	0,9
Sein (C50.0-C50.9)	19 428	50,8	50,1	51,5	153	0,9	0,7	1,0	19 275	95,9	94,5	97,3
Col utérin (C53.0-C53.9)	1 321	3,8	3,6	4,1	1 321	7,5	7,1	7,9
Corps utérin (C54.0-C54.9)	3 774	9,9	9,6	10,3	3 774	18,9	18,3	19,5
Utérus, sans autre indication (C55.9)	87	0,2	0,2	0,3	87	0,4	0,3	0,5
Ovaire (C56.9)	2 214	5,9	5,6	6,1	2 214	11,1	10,6	11,5
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	682	1,8	1,7	1,9	682	3,3	3,1	3,6
Prostate (C61.9)	20 387	55,3	54,5	56,0	20 387	120,9	119,3	122,6
Testicule (C62.0-C62.9)	806	2,7	2,5	2,9	806	5,4	5,1	5,8
Verge (C60.0-C60.9)	129	0,3	0,3	0,4	129	0,8	0,6	0,9
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	48	0,1	0,1	0,2	48	0,3	0,2	0,4
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	6 339	16,7	16,3	17,1	4 730	28,3	27,5	29,1	1 609	7,5	7,1	7,9
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	3 930	10,4	10,1	10,8	2 398	13,7	13,2	14,3	1 532	7,6	7,2	8,0
Urètre (C66.9)	191	0,5	0,4	0,6	115	0,7	0,6	0,8	76	0,4	0,3	0,4
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	252	0,7	0,6	0,8	187	1,1	1,0	1,3	65	0,3	0,2	0,4
Oeil (C69.0-C69.9)	229	0,6	0,6	0,7	127	0,7	0,6	0,9	102	0,6	0,5	0,7
Cerveau (C71.0-C71.9)	2 064	5,8	5,6	6,1	1 198	7,1	6,7	7,5	866	4,7	4,4	5,0
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	132	0,4	0,3	0,5	66	0,4	0,3	0,5	66	0,4	0,3	0,5
Thyroïde (C73.9)	3 233	9,5	9,1	9,8	672	3,9	3,6	4,2	2 561	15,0	14,4	15,6
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	255	0,7	0,6	0,8	124	0,8	0,6	0,9	131	0,7	0,6	0,8
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	891	2,8	2,6	3,0	500	3,2	2,9	3,5	391	2,4	2,2	2,7
Lymphomes non hodgkiniens	6 189	16,6	16,2	17,0	3 316	19,4	18,8	20,1	2 873	14,2	13,7	14,7

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-1 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie — Canada¹

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	1 876	4,9	4,7	5,1	1 020	6,0	5,6	6,4	856	4,1	3,8	4,3
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	297	1,0	0,9	1,1	172	1,2	1,0	1,4	125	0,9	0,7	1,0
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	1 777	4,6	4,4	4,8	1 046	6,2	5,8	6,5	731	3,4	3,1	3,6
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	951	2,6	2,4	2,8	523	3,1	2,8	3,4	428	2,2	2,0	2,4
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	395	1,1	0,9	1,2	236	1,5	1,3	1,6	159	0,8	0,6	0,9
Autres leucémies	672	1,9	1,7	2,0	406	2,5	2,2	2,7	266	1,3	1,2	1,5
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	6 092	15,7	15,3	16,1	3 126	18,7	18,1	19,4	2 966	13,5	13,0	14,0
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	406	1,1	1,0	1,2	351	2,1	1,9	2,3	55	0,3	0,2	0,3
Sarcome de Kaposi (M-9140)	64	0,2	0,1	0,2	54	0,3	0,2	0,4	10	0,0	0,0	0,1

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que les tableaux CANSIM fournissent aussi les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 3-2
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie — Terre-Neuve-et-Labrador¹

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2005												
Total, tous les sièges primaires de cancer	2 328	366,2	351,0	381,4	1 243	424,7	400,6	448,8	1 085	321,1	301,4	340,7
Lèvre (C00.0-C00.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	x	x	x	x	10	3,1	1,1	5,0	x	x	x	x
Oesophage (C15.0-C15.9)	x	x	x	x	22	7,6	4,4	10,9	x	x	x	x
Estomac (C16.0-C16.9)	79	12,3	9,6	15,1	55	19,2	14,1	24,4	24	6,8	4,0	9,5
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	300	46,5	41,2	51,8	153	52,5	44,1	61,0	147	41,3	34,5	48,1
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	135	20,5	17,0	24,0	89	29,5	23,3	35,8	46	12,7	8,9	16,4
Anus (C21.0-C21.8)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Foie (C22.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vésicule biliaire (C23.9)	6	1,0	0,2	1,8	0	0,0	0,0	0,0	6	1,8	0,4	3,3
Pancréas (C25.0-C25.9)	29	4,6	2,9	6,3	20	6,7	3,7	9,7	9	2,6	0,9	4,3
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	6	1,6	0,3	2,9
Larynx (C32.0-C32.9)	x	x	x	x	28	9,4	5,9	12,9	x	x	x	x
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	309	48,0	42,6	53,5	183	61,3	52,3	70,3	126	36,9	30,4	43,4
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	15	2,8	1,3	4,2	9	3,8	1,2	6,4	6	1,7	0,3	3,0
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	66	10,6	8,0	13,3	29	9,6	6,0	13,2	37	11,7	7,8	15,6
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	12	2,1	0,9	3,3	6	2,3	0,5	4,2	6	2,2	0,3	4,0
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	316	91,5	81,2	101,8
Col utérin (C53.0-C53.9)	10	2,1	0,7	3,5	10	4,0	1,4	6,7
Corps utérin (C54.0-C54.9)	57	8,5	6,2	10,7	57	16,5	12,1	20,9
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ovaire (C56.9)	20	2,9	1,6	4,2	20	5,6	3,1	8,2
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	14	2,2	1,0	3,4	14	3,9	1,8	6,0
Prostate (C61.9)	288	45,3	40,0	50,6	288	96,0	84,7	107,2
Testicule (C62.0-C62.9)	10	2,4	0,9	3,9	10	4,9	1,7	8,0
Verge (C60.0-C60.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	107	16,9	13,6	20,1	71	26,1	19,9	32,3	36	10,3	6,9	13,7
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	70	11,2	8,5	13,9	42	13,9	9,6	18,1	28	8,9	5,5	12,3
Urètre (C66.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oeil (C69.0-C69.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	x	x	x	x	29	10,1	6,3	13,9	x	x	x	x
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	67	10,8	8,1	13,5	19	5,8	3,1	8,6	48	15,5	10,9	20,1
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-2 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie — Terre-Neuve-et-Labrador¹

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	14	3,0	1,4	4,6	7	3,1	0,7	5,5	7	2,9	0,7	5,1
Lymphomes non hodgkiniens	69	11,3	8,6	14,0	45	15,7	11,1	20,4	24	7,5	4,4	10,6
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	x	x	x	x	7	2,5	0,5	4,4	x	x	x	x
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres leucémies	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	79	12,3	9,6	15,0	46	15,8	11,1	20,4	33	10,0	6,5	13,4
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Sarcome de Kaposi (M-9140)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
2004												
Total, tous les sièges primaires de cancer	2 213	355,3	340,2	370,3	1 202	415,9	391,9	439,8	1 011	306,3	287,0	325,6
Lèvre (C00.0-C00.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	x	x	x	x	8	2,6	0,8	4,4	x	x	x	x
Oesophage (C15.0-C15.9)	x	x	x	x	11	3,7	1,4	6,0	x	x	x	x
Estomac (C16.0-C16.9)	96	15,2	12,2	18,3	64	22,3	16,7	27,8	32	9,8	6,4	13,3
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	15	2,4	1,2	3,6	8	2,9	0,9	4,9	7	2,0	0,5	3,5
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	301	47,6	42,1	53,0	162	56,9	48,0	65,7	139	40,3	33,5	47,1
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	140	22,1	18,4	25,8	96	31,7	25,2	38,1	44	13,6	9,5	17,7
Anus (C21.0-C21.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Foie (C22.0)	x	x	x	x	8	3,0	0,9	5,1	x	x	x	x
Vésicule biliaire (C23.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Pancréas (C25.0-C25.9)	27	4,3	2,7	6,0	15	5,1	2,5	7,7	12	3,6	1,5	5,7
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	15	2,5	1,2	3,7	6	2,0	0,4	3,6	9	2,9	1,0	4,9
Larynx (C32.0-C32.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	262	42,1	36,9	47,2	173	59,2	50,3	68,1	89	27,1	21,4	32,8
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	54	8,5	6,2	10,9	26	8,4	5,0	11,7	28	8,7	5,4	12,0
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	8	2,8	0,8	4,9
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	294	87,0	76,9	97,1
Col utérin (C53.0-C53.9)	32	6,1	3,9	8,3	32	11,8	7,5	16,1
Corps utérin (C54.0-C54.9)	61	9,2	6,8	11,5	61	17,7	13,2	22,2
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ovaire (C56.9)	28	4,8	3,0	6,6	28	9,3	5,8	12,9
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	17	2,9	1,5	4,3	17	5,4	2,8	8,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-2 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie — Terre-Neuve-et-Labrador¹

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
Prostate (C61.9)	270	43,8	38,6	49,1	270	93,3	82,0	104,5
Testicule (C62.0-C62.9)	10	2,3	0,8	3,8	10	4,7	1,7	7,7
Verge (C60.0-C60.9)	7	1,2	0,3	2,1	7	2,5	0,6	4,4
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	105	16,9	13,6	20,2	83	30,2	23,6	36,8	22	6,5	3,7	9,2
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	x	x	x	x	50	15,7	11,3	20,1	x	x	x	x
Urètre (C66.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Oeil (C69.0-C69.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cerveau (C71.0-C71.9)	30	5,5	3,5	7,6	17	6,7	3,4	9,9	13	4,4	1,9	7,0
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	31	5,3	3,4	7,2	8	3,1	0,8	5,3	23	7,3	4,2	10,4
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	x	x	x	x	9	3,6	1,2	6,1	x	x	x	x
Lymphomes non hodgkiniens	72	11,5	8,8	14,2	38	12,8	8,6	17,0	34	10,3	6,8	13,9
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	21	3,3	1,8	4,7	11	3,4	1,4	5,5	10	3,0	1,1	4,9
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	x	x	x	x	9	2,8	0,9	4,7	x	x	x	x
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres leucémies	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	85	13,7	10,8	16,6	41	14,5	10,0	19,1	44	13,5	9,4	17,5
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que les tableaux CANSIM fournissent aussi les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 3-3
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie — Île-du-Prince-Édouard¹

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2005												
Total, tous les sièges primaires de cancer	745	431,7	400,1	463,3	406	519,7	468,7	570,7	339	356,9	317,4	396,3
Lèvre (C00.0-C00.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Langue (C01.9-C02.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oropharynx (C10.0-C10.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Oesophage (C15.0-C15.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Estomac (C16.0-C16.9)	13	7,3	3,3	11,3	6	7,2	1,4	13,0	7	7,3	1,8	12,7
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	78	44,3	34,3	54,3	34	43,7	29,0	58,5	44	44,1	30,6	57,5
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	30	16,7	10,6	22,9	16	21,5	10,8	32,2	14	13,8	6,3	21,3
Anus (C21.0-C21.8)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Foie (C22.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Vésicule biliaire (C23.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Pancréas (C25.0-C25.9)	18	9,6	5,1	14,1	9	10,7	3,6	17,8	9	7,9	2,5	13,2
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Larynx (C32.0-C32.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	108	62,6	50,7	74,5	61	76,6	57,3	95,9	47	50,5	35,7	65,3
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	x	x	x	x	x	x	x	x	18	20,8	10,5	31,1
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	78	83,3	64,3	102,3
Col utérin (C53.0-C53.9)	6	3,9	0,5	7,3	6	7,0	0,6	13,4
Corps utérin (C54.0-C54.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ovaire (C56.9)	11	6,1	2,5	9,8	11	11,3	4,5	18,1
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Prostate (C61.9)	107	62,9	50,9	74,9	107	135,3	109,6	161,0
Testicule (C62.0-C62.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Verge (C60.0-C60.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	31	17,2	11,0	23,4	21	28,1	16,1	40,0	10	9,1	3,3	14,9
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	x	x	x	x	20	25,3	14,2	36,5	x	x	x	x
Urètre (C66.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oeil (C69.0-C69.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	x	x	x	x	11	16,1	6,2	26,0	x	x	x	x
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	6	8,8	1,4	16,1
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-3 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie — Île-du-Prince-Édouard¹

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Lymphomes non hodgkiniens	31	17,8	11,5	24,1	18	23,1	12,4	33,9	13	13,1	5,8	20,4
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres leucémies	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	x	x	x	x	22	27,9	16,2	39,6	x	x	x	x
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Sarcome de Kaposi (M-9140)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
2004												
Total, tous les sièges primaires de cancer	749	443,1	410,7	475,4	416	542,7	490,1	595,3	333	362,2	321,8	402,5
Lèvre (C00.0-C00.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Langue (C01.9-C02.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oropharynx (C10.0-C10.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oesophage (C15.0-C15.9)	x	x	x	x	6	6,9	1,3	12,5	x	x	x	x
Estomac (C16.0-C16.9)	x	x	x	x	11	14,0	5,7	22,3	x	x	x	x
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	71	40,4	30,9	49,9	33	43,4	28,5	58,2	38	36,3	24,3	48,3
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	38	22,4	15,1	29,6	22	28,4	16,4	40,4	16	16,7	8,1	25,3
Anus (C21.0-C21.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Foie (C22.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Vésicule biliaire (C23.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Pancréas (C25.0-C25.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Larynx (C32.0-C32.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	114	67,3	54,8	79,8	62	81,8	61,4	102,2	52	58,8	42,5	75,1
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Os et articulations (C40.0-C41.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	x	x	x	x	x	x	x	x	15	19,2	9,2	29,1
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Sein (C50.0-C50.9)	97	56,2	44,8	67,7	0	0,0	0,0	0,0	97	105,6	83,9	127,2
Col utérin (C53.0-C53.9)	6	3,8	0,6	7,1	6	7,3	1,1	13,5
Corps utérin (C54.0-C54.9)	19	10,4	5,6	15,2	19	19,4	10,4	28,4
Utérus, sans autre indication (C55.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Ovaire (C56.9)	8	4,0	1,2	6,9	8	7,4	2,2	12,6
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	x	x	x	x	x	x	x	x

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-3 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie — Île-du-Prince-Édouard¹

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
Prostate (C61.9)	126	75,4	62,1	88,7	126	162,8	134,2	191,3
Testicule (C62.0-C62.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Verge (C60.0-C60.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	x	x	x	x	26	34,4	21,1	47,6	x	x	x	x
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	x	x	x	x	14	19,4	9,2	29,6	x	x	x	x
Urètre (C66.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Oeil (C69.0-C69.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	6	7,8	1,3	14,3
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Lymphomes non hodgkiniens	33	19,8	12,8	26,7	19	24,0	13,0	35,0	14	16,4	7,5	25,3
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	x	x	x	x	8	10,2	3,1	17,4	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	x	x	x	x	9	11,8	4,1	19,6	x	x	x	x
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres leucémies	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	x	x	x	x	13	17,1	7,7	26,4	x	x	x	x
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Sarcome de Kaposi (M-9140)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que les tableaux CANSIM fournissent aussi les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 3-4
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie — Nouvelle-Écosse*

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2005												
Total, tous les sièges primaires de cancer	5 241	436,7	424,7	448,8	2 775	511,5	492,2	530,7	2 466	378,7	363,2	394,2
Lèvre (C00.0-C00.9)	x	x	x	x	7	1,2	0,3	2,1	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	x	x	x	x	15	2,6	1,3	3,9	x	x	x	x
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	8	1,3	0,4	2,2	x	x	x	x
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	15	1,1	0,5	1,7	8	1,4	0,4	2,4	7	0,8	0,2	1,5
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	x	x	x	x	6	1,2	0,2	2,2	x	x	x	x
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	x	x	x	x	14	2,4	1,1	3,6	x	x	x	x
Oesophage (C15.0-C15.9)	60	5,0	3,7	6,3	44	8,1	5,7	10,5	16	2,2	1,1	3,4
Estomac (C16.0-C16.9)	94	7,6	6,0	9,1	64	11,6	8,7	14,5	30	4,3	2,7	5,9
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	18	1,5	0,8	2,2	10	1,9	0,7	3,1	8	1,2	0,3	2,0
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	492	39,3	35,7	42,8	241	44,1	38,5	49,7	251	34,7	30,2	39,2
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	246	20,3	17,7	22,9	141	25,8	21,5	30,1	105	15,6	12,5	18,7
Anus (C21.0-C21.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	10	1,3	0,5	2,2
Foie (C22.0)	18	1,5	0,8	2,1	12	2,1	0,9	3,4	6	0,8	0,1	1,5
Vésicule biliaire (C23.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	8	1,2	0,3	2,1
Pancréas (C25.0-C25.9)	130	10,5	8,7	12,3	61	11,1	8,3	14,0	69	9,8	7,4	12,2
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	52	4,2	3,1	5,4	22	4,1	2,4	5,8	30	4,5	2,9	6,2
Larynx (C32.0-C32.9)	x	x	x	x	31	5,5	3,5	7,4	x	x	x	x
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	815	67,8	63,1	72,6	469	86,6	78,7	94,4	346	54,0	48,2	59,8
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	8	1,4	0,4	2,4
Os et articulations (C40.0-C41.9)	x	x	x	x	6	1,4	0,2	2,5	x	x	x	x
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	38	3,5	2,3	4,6	21	3,9	2,2	5,6	17	3,2	1,6	4,8
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	170	14,4	12,1	16,6	82	14,9	11,6	18,2	88	14,0	11,0	17,1
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	22	1,5	0,9	2,2	7	1,3	0,3	2,3	15	1,7	0,8	2,6
Sein (C50.0-C50.9)	672	55,2	51,0	59,5	14	2,6	1,2	4,0	658	102,1	94,1	110,1
Col utérin (C53.0-C53.9)	45	4,7	3,2	6,1	45	9,0	6,2	11,8
Corps utérin (C54.0-C54.9)	124	10,3	8,5	12,2	124	19,7	16,2	23,3
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ovaire (C56.9)	69	5,6	4,3	7,0	69	10,6	8,0	13,1
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	26	2,1	1,3	3,0	26	3,8	2,2	5,3
Prostate (C61.9)	719	60,5	56,1	65,0	719	131,5	121,9	141,2
Testicule (C62.0-C62.9)	24	3,0	1,8	4,3	24	6,2	3,6	8,7
Verge (C60.0-C60.9)	7	0,6	0,1	1,0	7	1,2	0,3	2,2
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	236	19,0	16,5	21,4	179	32,9	28,1	37,8	57	8,2	6,0	10,5
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	182	14,7	12,5	16,8	114	20,4	16,6	24,2	68	9,8	7,4	12,1
Urètre (C66.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Oeil (C69.0-C69.9)	x	x	x	x	6	1,0	0,2	1,9	x	x	x	x
Cerveau (C71.0-C71.9)	77	6,9	5,3	8,5	52	9,5	6,8	12,2	25	4,3	2,5	6,0
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	97	9,4	7,5	11,4	29	5,6	3,5	7,7	68	13,2	9,9	16,5
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	9	1,8	0,6	3,0	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	25	2,7	1,6	3,8	16	3,5	1,7	5,3	9	1,9	0,6	3,3
Lymphomes non hodgkiniens	198	16,9	14,5	19,4	93	17,6	13,9	21,2	105	16,4	13,1	19,6

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-4 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie — Nouvelle-Écosse¹

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	54	4,4	3,2	5,6	30	5,6	3,6	7,6	24	3,5	2,0	4,9
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	47	3,8	2,7	4,9	24	4,2	2,5	5,9	23	3,5	2,0	5,0
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	29	2,4	1,5	3,3	19	3,4	1,8	5,0	10	1,6	0,6	2,6
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	13	1,1	0,5	1,7	7	1,2	0,3	2,1	6	1,0	0,2	1,9
Autres leucémies	x	x	x	x	10	2,0	0,7	3,2	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	198	15,9	13,6	18,1	116	21,9	17,8	25,9	82	10,9	8,4	13,4
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
2004												
Total, tous les sièges primaires de cancer	5 207	441,8	429,6	454,1	2 822	534,2	514,3	554,1	2 385	370,4	355,0	385,8
Lèvre (C00.0-C00.9)	x	x	x	x	23	4,3	2,5	6,1	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	29	2,6	1,6	3,6	21	4,0	2,3	5,8	8	1,2	0,3	2,1
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	x	x	x	x	6	1,2	0,2	2,3	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	10	1,6	0,6	2,6
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	x	x	x	x	6	1,1	0,2	2,0	x	x	x	x
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	x	x	x	x	19	3,2	1,8	4,7	x	x	x	x
Oesophage (C15.0-C15.9)	54	4,5	3,3	5,7	41	7,7	5,3	10,1	13	1,8	0,8	2,9
Estomac (C16.0-C16.9)	102	8,4	6,7	10,0	64	12,0	9,0	15,0	38	5,5	3,7	7,4
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	21	2,0	1,1	2,8	7	1,4	0,4	2,5	14	2,5	1,1	3,8
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	506	40,9	37,3	44,5	228	43,0	37,4	48,7	278	39,5	34,7	44,3
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	226	19,0	16,5	21,6	158	29,6	25,0	34,3	68	10,7	8,1	13,3
Anus (C21.0-C21.8)	17	1,4	0,7	2,1	8	1,3	0,4	2,2	9	1,6	0,5	2,6
Foie (C22.0)	26	2,2	1,3	3,0	18	3,2	1,7	4,6	8	1,4	0,4	2,4
Vésicule biliaire (C23.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	6	0,9	0,2	1,6
Pancréas (C25.0-C25.9)	138	11,4	9,5	13,4	65	12,4	9,4	15,4	73	10,6	8,0	13,1
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	36	3,0	2,0	4,0	19	3,7	2,0	5,4	17	2,3	1,2	3,5
Larynx (C32.0-C32.9)	x	x	x	x	35	6,4	4,3	8,6	x	x	x	x
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	792	66,8	62,1	71,5	461	86,9	78,9	94,8	331	51,4	45,8	57,1
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	6	1,2	0,2	2,3
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	12	1,7	0,7	2,7
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	192	16,7	14,3	19,1	94	17,5	13,9	21,1	98	16,0	12,7	19,3
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	28	2,3	1,4	3,1	13	2,5	1,1	3,8	15	2,2	1,1	3,4
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	604	94,5	86,7	102,2
Col utérin (C53.0-C53.9)	63	5,8	4,3	7,3	63	11,4	8,4	14,3
Corps utérin (C54.0-C54.9)	119	9,8	8,0	11,6	119	18,6	15,2	22,1
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ovaire (C56.9)	53	4,3	3,1	5,4	53	7,9	5,7	10,1
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	25	2,1	1,3	2,9	25	3,9	2,3	5,5
Prostate (C61.9)	734	63,4	58,8	68,1	734	137,7	127,7	147,7
Testicule (C62.0-C62.9)	34	4,2	2,8	5,7	34	8,5	5,6	11,5
Verge (C60.0-C60.9)	x	x	x	x	x	x	x	x

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-4 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie — Nouvelle-Écosse¹

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	242	19,9	17,3	22,4	181	34,2	29,2	39,2	61	9,0	6,7	11,4
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	163	13,7	11,6	15,9	99	18,1	14,5	21,7	64	10,1	7,5	12,7
Uretere (C66.9)	x	x	x	x	6	1,2	0,2	2,1	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cerveau (C71.0-C71.9)	73	6,3	4,8	7,8	36	6,7	4,4	8,9	37	6,0	4,0	8,1
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	67	6,5	4,9	8,1	17	3,3	1,7	4,9	50	9,5	6,7	12,3
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	33	3,6	2,4	4,9	18	4,2	2,2	6,2	15	3,0	1,4	4,7
Lymphomes non hodgkiniens	202	17,4	14,9	19,9	122	23,0	18,8	27,2	80	12,5	9,6	15,3
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	46	3,9	2,7	5,0	27	5,1	3,2	7,0	19	3,0	1,6	4,4
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	x	x	x	x	x	x	x	x	6	1,7	0,3	3,1
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	x	x	x	x	28	5,2	3,3	7,1	x	x	x	x
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	33	2,9	1,9	3,9	17	3,4	1,8	5,1	16	2,4	1,1	3,7
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	x	x	x	x	7	1,3	0,3	2,2	x	x	x	x
Autres leucémies	37	3,3	2,2	4,3	23	4,6	2,7	6,5	14	2,1	1,0	3,3
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	214	17,1	14,7	19,4	115	22,1	18,0	26,1	99	13,4	10,7	16,2
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	x	x	x	x	11	2,0	0,8	3,2	x	x	x	x
Sarcome de Kaposi (M-9140)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que les tableaux CANSIM fournissent aussi les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 3-5
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie — Nouveau-Brunswick¹

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2005												
Total, tous les sièges primaires de cancer	3 976	418,5	405,3	431,8	2 153	502,5	481,0	523,9	1 823	355,2	338,3	372,1
Lèvre (C00.0-C00.9)	x	x	x	x	10	2,6	1,0	4,2	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	x	x	x	x	9	2,0	0,7	3,4	x	x	x	x
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	15	1,5	0,7	2,3	8	2,1	0,6	3,6	7	1,0	0,2	1,8
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	x	x	x	x	7	1,6	0,4	2,7	x	x	x	x
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	8	1,9	0,6	3,2	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	x	x	x	x	12	2,5	1,1	3,9	x	x	x	x
Oesophage (C15.0-C15.9)	46	4,8	3,4	6,2	33	7,4	4,8	10,0	13	2,5	1,1	3,9
Estomac (C16.0-C16.9)	78	7,8	6,1	9,6	55	12,8	9,4	16,2	23	4,2	2,4	6,0
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	311	31,8	28,2	35,4	157	36,3	30,6	42,1	154	28,2	23,6	32,8
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	188	19,3	16,5	22,1	118	27,4	22,4	32,4	70	13,2	10,0	16,4
Anus (C21.0-C21.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Foie (C22.0)	x	x	x	x	6	1,3	0,3	2,4	x	x	x	x
Vésicule biliaire (C23.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Pancréas (C25.0-C25.9)	93	9,6	7,6	11,6	43	10,1	7,1	13,2	50	8,9	6,3	11,4
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	32	3,1	2,0	4,2	10	2,3	0,9	3,7	22	3,7	2,1	5,2
Larynx (C32.0-C32.9)	x	x	x	x	26	6,1	3,7	8,5	x	x	x	x
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	611	64,3	59,2	69,5	337	79,8	71,2	88,4	274	53,4	46,9	59,9
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	x	x	x	x	16	3,6	1,8	5,3	x	x	x	x
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	129	14,0	11,5	16,4	81	18,7	14,6	22,9	48	10,0	7,1	12,9
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	x	x	x	x	10	2,5	0,9	4,1	x	x	x	x
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	515	99,1	90,3	107,9
Col utérin (C53.0-C53.9)	30	3,5	2,2	4,8	30	6,7	4,2	9,3
Corps utérin (C54.0-C54.9)	89	9,3	7,3	11,3	89	17,7	13,9	21,4
Utérus, sans autre indication (C55.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Ovaire (C56.9)	56	6,0	4,4	7,6	56	11,2	8,2	14,3
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	20	2,2	1,2	3,1	20	4,0	2,2	5,9
Prostate (C61.9)	620	66,3	61,0	71,6	620	143,7	132,3	155,1
Testicule (C62.0-C62.9)	15	2,2	1,0	3,3	15	4,3	2,1	6,5
Verge (C60.0-C60.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	190	19,7	16,8	22,5	141	32,8	27,3	38,3	49	9,2	6,6	11,9
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	125	13,2	10,8	15,6	79	17,6	13,7	21,6	46	9,5	6,7	12,3
Urètre (C66.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Oeil (C69.0-C69.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cerveau (C71.0-C71.9)	55	5,9	4,3	7,5	31	6,7	4,3	9,1	24	5,2	2,9	7,4
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	112	12,6	10,2	15,0	22	5,1	2,9	7,4	90	19,9	15,6	24,2
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-5 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie – Nouveau-Brunswick¹

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	27	4,0	2,5	5,5	18	5,2	2,8	7,6	9	2,8	0,9	4,7
Lymphomes non hodgkiniens	171	17,7	15,0	20,4	84	19,7	15,4	24,0	87	16,2	12,7	19,7
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	49	5,2	3,7	6,7	30	6,9	4,4	9,5	19	3,9	2,1	5,7
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	33	3,3	2,2	4,4	25	5,4	3,3	7,6	8	1,5	0,4	2,5
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	18	2,2	1,1	3,2	9	2,3	0,8	3,8	9	2,1	0,6	3,5
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres leucémies	17	1,8	0,9	2,7	10	2,5	0,9	4,1	7	1,2	0,3	2,2
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	94	9,3	7,4	11,2	53	12,3	8,9	15,6	41	7,2	4,9	9,4
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	x	x	x	x	8	1,7	0,5	2,8	x	x	x	x
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2004												
Total, tous les sièges primaires de cancer	3 761	400,5	387,5	413,6	2 037	485,2	463,9	506,5	1 724	338,3	321,7	354,9
Lèvre (C00.0-C00.9)	x	x	x	x	8	2,0	0,6	3,4	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	15	1,5	0,7	2,3	9	1,9	0,6	3,1	6	1,4	0,2	2,5
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	x	x	x	x	9	2,3	0,8	3,8	x	x	x	x
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	x	x	x	x	9	1,8	0,6	3,1	x	x	x	x
Oesophage (C15.0-C15.9)	42	4,4	3,0	5,7	31	7,4	4,8	10,0	11	1,8	0,7	2,8
Estomac (C16.0-C16.9)	75	7,8	6,0	9,6	48	11,5	8,2	14,8	27	4,6	2,8	6,5
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	x	x	x	x	9	2,1	0,7	3,5	0	0,0	0,0	0,0
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	277	28,7	25,2	32,1	130	31,0	25,6	36,4	147	26,4	22,0	30,8
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	167	17,3	14,6	20,0	106	24,7	20,0	29,5	61	11,0	8,1	13,8
Anus (C21.0-C21.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Foie (C22.0)	x	x	x	x	12	2,8	1,2	4,4	x	x	x	x
Vésicule biliaire (C23.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Pancréas (C25.0-C25.9)	120	12,5	10,3	14,8	68	16,3	12,4	20,2	52	9,5	6,8	12,1
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	41	4,1	2,8	5,4	21	5,1	2,9	7,3	20	3,8	2,1	5,5
Larynx (C32.0-C32.9)	37	3,8	2,5	5,0	30	6,9	4,4	9,5	7	1,4	0,4	2,5
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	622	66,3	61,0	71,6	364	87,4	78,3	96,4	258	50,9	44,5	57,2
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Os et articulations (C40.0-C41.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	x	x	x	x	14	3,7	1,7	5,7	x	x	x	x
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	105	11,8	9,5	14,1	55	13,4	9,8	16,9	50	10,9	7,8	14,1
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	18	1,9	1,0	2,8	11	2,8	1,1	4,4	7	1,2	0,3	2,2
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	435	85,1	76,9	93,3
Col utérin (C53.0-C53.9)	40	4,9	3,3	6,4	40	9,4	6,4	12,5
Corps utérin (C54.0-C54.9)	81	8,6	6,7	10,5	81	16,2	12,5	19,8
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ovaire (C56.9)	66	6,9	5,2	8,6	66	13,0	9,8	16,3
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	x	x	x	x	x	x	x	x

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-5 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie — Nouveau-Brunswick¹

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
Prostate (C61.9)	550	59,7	54,7	64,8	550	130,7	119,7	141,7
Testicule (C62.0-C62.9)	8	1,2	0,4	2,1	8	2,4	0,7	4,1
Verge (C60.0-C60.9)	12	1,2	0,5	1,9	12	2,8	1,2	4,4
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	177	18,4	15,7	21,2	128	30,7	25,3	36,0	49	9,1	6,5	11,8
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	142	14,8	12,3	17,3	92	20,5	16,3	24,8	50	9,8	6,9	12,6
Urètre (C66.9)	x	x	x	x	6	1,4	0,3	2,6	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oeil (C69.0-C69.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cerveau (C71.0-C71.9)	53	6,1	4,4	7,8	33	8,1	5,3	10,9	20	4,3	2,3	6,2
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	77	8,9	6,8	11,0	9	1,9	0,6	3,2	68	15,8	11,9	19,7
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	20	2,8	1,5	4,0	10	2,8	1,0	4,6	10	2,8	1,0	4,6
Lymphomes non hodgkiniens	180	19,0	16,2	21,9	102	23,7	19,1	28,4	78	14,9	11,5	18,4
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	52	5,3	3,9	6,8	26	6,2	3,8	8,6	26	4,9	2,9	6,8
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	46	4,7	3,4	6,1	26	6,1	3,7	8,5	20	3,6	1,9	5,2
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	x	x	x	x	x	x	x	x	12	2,8	1,2	4,5
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres leucémies	15	1,6	0,8	2,4	8	2,1	0,6	3,6	7	1,2	0,3	2,2
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	82	8,1	6,3	9,9	41	9,6	6,6	12,6	41	6,9	4,7	9,1
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sarcome de Kaposi (M-9140)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que les tableaux CANSIM fournissent aussi les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 3-6
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie — Québec^{1,2}

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2004												
Total, tous les sièges primaires de cancer	37 508	402,4	398,3	406,5	19 490	480,5	473,6	487,3	18 018	351,9	346,6	357,2
Lèvre (C00.0-C00.9)	69	0,7	0,5	0,9	48	1,3	0,9	1,6	21	0,4	0,2	0,5
Langue (C01.9-C02.9)	203	2,2	1,9	2,5	156	3,7	3,1	4,3	47	0,9	0,6	1,2
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	85	0,9	0,7	1,1	50	1,3	0,9	1,7	35	0,7	0,5	1,0
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	59	0,6	0,5	0,8	45	1,0	0,7	1,3	14	0,3	0,1	0,5
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	99	1,1	0,8	1,3	52	1,2	0,9	1,6	47	0,9	0,6	1,2
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	37	0,4	0,3	0,6	23	0,6	0,3	0,8	14	0,3	0,1	0,5
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	28	0,6	0,4	0,9	x	x	x	x
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	55	0,6	0,4	0,8	47	1,1	0,8	1,4	8	0,2	0,1	0,3
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	152	1,6	1,3	1,8	109	2,4	1,9	2,9	43	0,8	0,6	1,1
Oesophage (C15.0-C15.9)	293	3,1	2,8	3,5	222	5,4	4,7	6,1	71	1,3	1,0	1,6
Estomac (C16.0-C16.9)	771	8,1	7,5	8,7	490	12,2	11,1	13,3	281	5,1	4,5	5,7
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	129	1,4	1,1	1,6	67	1,6	1,2	2,0	62	1,2	0,9	1,5
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	3 224	34,0	32,8	35,2	1 572	39,3	37,3	41,2	1 652	30,1	28,6	31,6
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	1 778	18,8	17,9	19,7	1 082	26,0	24,5	27,6	696	13,1	12,1	14,1
Anus (C21.0-C21.8)	73	0,8	0,6	0,9	34	0,9	0,6	1,2	39	0,7	0,5	1,0
Foie (C22.0)	322	3,4	3,0	3,8	246	6,0	5,2	6,7	76	1,4	1,1	1,8
Vésicule biliaire (C23.9)	115	1,2	1,0	1,4	32	0,8	0,5	1,1	83	1,5	1,2	1,8
Pancréas (C25.0-C25.9)	987	10,4	9,7	11,0	515	12,6	11,5	13,7	472	8,5	7,7	9,3
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	402	4,3	3,9	4,7	188	4,8	4,1	5,5	214	4,0	3,4	4,5
Larynx (C32.0-C32.9)	365	3,9	3,5	4,3	300	7,1	6,3	7,9	65	1,3	1,0	1,6
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	6 538	69,4	67,7	71,1	3 868	94,8	91,8	97,8	2 670	51,6	49,6	53,6
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	97	1,1	0,9	1,3	61	1,5	1,1	1,9	36	0,7	0,5	1,0
Os et articulations (C40.0-C41.9)	95	1,2	0,9	1,4	53	1,4	1,0	1,8	42	1,0	0,7	1,3
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	188	2,2	1,9	2,5	94	2,4	1,9	2,9	94	2,1	1,6	2,5
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	502	5,6	5,1	6,1	277	6,6	5,8	7,4	225	4,9	4,2	5,6
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	121	1,3	1,1	1,5	64	1,6	1,2	2,1	57	1,1	0,8	1,4
Sein (C50.0-C50.9)	4 914	51,7	50,3	53,2	38	0,9	0,6	1,2	4 876	96,4	93,7	99,2
Col utérin (C53.0-C53.9)	277	3,2	2,8	3,6	277	6,2	5,5	7,0
Corps utérin (C54.0-C54.9)	834	8,7	8,1	9,3	834	16,3	15,2	17,4
Utérus, sans autre indication (C55.9)	36	0,4	0,3	0,5	36	0,7	0,4	0,9
Ovaire (C56.9)	548	5,8	5,3	6,3	548	10,7	9,8	11,6
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	141	1,5	1,2	1,7	141	2,7	2,2	3,1
Prostate (C61.9)	4 087	43,8	42,4	45,1	4 087	100,2	97,0	103,3
Testicule (C62.0-C62.9)	167	2,4	2,0	2,7	167	4,7	4,0	5,4
Verge (C60.0-C60.9)	30	0,3	0,2	0,4	30	0,8	0,5	1,0
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	13	0,1	0,1	0,2	13	0,3	0,1	0,5
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	2 045	21,8	20,8	22,8	1 510	37,5	35,6	39,4	535	9,9	9,0	10,7
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	1 145	12,3	11,5	13,0	696	16,6	15,3	17,8	449	8,7	7,9	9,6
Urètre (C66.9)	87	0,9	0,7	1,1	50	1,3	0,9	1,6	37	0,7	0,5	0,9
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	27	0,3	0,2	0,4	16	0,4	0,2	0,6	11	0,2	0,1	0,3
Oeil (C69.0-C69.9)	52	0,6	0,4	0,7	28	0,6	0,4	0,9	24	0,5	0,3	0,8
Cerveau (C71.0-C71.9)	540	6,2	5,7	6,7	318	7,8	6,9	8,7	222	4,9	4,2	5,6
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	45	0,6	0,4	0,7	24	0,6	0,4	0,9	21	0,5	0,3	0,7
Thyroïde (C73.9)	710	8,4	7,8	9,1	158	3,8	3,2	4,4	552	13,1	12,0	14,2
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	83	1,0	0,8	1,2	41	1,1	0,7	1,4	42	0,9	0,6	1,2
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	235	3,2	2,8	3,6	134	3,7	3,0	4,3	101	2,7	2,2	3,3
Lymphomes non hodgkiniens	1 473	16,0	15,2	16,8	754	18,2	16,9	19,5	719	14,1	13,0	15,2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-6 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie — Québec^{1,2}

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	460	4,9	4,4	5,3	221	5,5	4,8	6,3	239	4,4	3,8	5,0
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	96	1,5	1,2	1,8	53	1,7	1,2	2,1	43	1,4	0,9	1,8
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	426	4,4	4,0	4,9	242	6,1	5,3	6,9	184	3,2	2,7	3,7
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	207	2,3	2,0	2,6	116	2,9	2,3	3,4	91	1,9	1,5	2,3
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	93	1,0	0,8	1,2	55	1,5	1,1	2,0	38	0,7	0,5	1,0
Autres leucémies	160	1,8	1,5	2,0	88	2,3	1,8	2,8	72	1,4	1,1	1,7
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	1 625	17,1	16,2	17,9	797	20,7	19,3	22,2	828	14,8	13,8	15,9
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	135	1,5	1,2	1,7	113	2,8	2,3	3,3	22	0,4	0,3	0,6
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	18	0,5	0,2	0,7	x	x	x	x

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.

2. Ne sont pas inclus les cas de cancer pour 2003 à 2004 chez les résidents du Québec diagnostiqués ou traités uniquement en Ontario.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que les tableaux CANSIM fournissent aussi les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 3-7
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie — Ontario^{1,2}

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2005												
Total, tous les sièges primaires de cancer	58 645	404,4	401,0	407,7	30 427	461,0	455,7	466,2	28 218	362,6	358,3	367,0
Lèvre (C00.0-C00.9)	130	0,9	0,7	1,0	93	1,4	1,1	1,7	37	0,4	0,3	0,6
Langue (C01.9-C02.9)	332	2,2	2,0	2,5	214	3,1	2,6	3,5	118	1,5	1,2	1,8
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	188	1,3	1,1	1,4	118	1,8	1,4	2,1	70	0,9	0,7	1,2
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	75	0,5	0,4	0,6	58	0,8	0,6	1,0	17	0,2	0,1	0,3
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	188	1,3	1,1	1,5	99	1,4	1,2	1,7	89	1,1	0,9	1,3
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	106	0,8	0,6	0,9	75	1,1	0,8	1,3	31	0,5	0,3	0,6
Oropharynx (C10.0-C10.9)	42	0,3	0,2	0,4	33	0,5	0,3	0,6	9	0,1	0,0	0,2
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	75	0,5	0,4	0,6	61	0,9	0,7	1,1	14	0,2	0,1	0,3
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	240	1,6	1,4	1,8	173	2,4	2,0	2,7	67	0,9	0,6	1,1
Oesophage (C15.0-C15.9)	550	3,7	3,4	4,0	405	6,0	5,4	6,6	145	1,7	1,4	2,0
Estomac (C16.0-C16.9)	1 077	7,3	6,8	7,7	689	10,5	9,7	11,3	388	4,7	4,2	5,2
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	212	1,4	1,2	1,6	123	1,8	1,5	2,2	89	1,1	0,9	1,4
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	5 054	34,2	33,2	35,1	2 581	39,1	37,6	40,7	2 473	29,9	28,7	31,1
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	2 227	15,1	14,5	15,8	1 355	20,2	19,1	21,3	872	10,7	10,0	11,5
Anus (C21.0-C21.8)	259	1,8	1,5	2,0	114	1,7	1,4	2,0	145	1,8	1,5	2,1
Foie (C22.0)	506	3,4	3,1	3,7	384	5,5	5,0	6,1	122	1,6	1,3	1,8
Vésicule biliaire (C23.9)	124	0,8	0,7	1,0	40	0,6	0,4	0,8	84	1,0	0,8	1,2
Pancréas (C25.0-C25.9)	1 201	8,1	7,7	8,6	587	8,8	8,1	9,6	614	7,4	6,8	8,0
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	528	3,6	3,3	3,9	276	4,1	3,7	4,6	252	3,1	2,7	3,5
Larynx (C32.0-C32.9)	419	2,9	2,6	3,2	345	5,1	4,6	5,7	74	1,0	0,7	1,2
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	7 394	50,7	49,5	51,9	3 965	60,4	58,5	62,3	3 429	43,3	41,9	44,8
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	149	1,1	0,9	1,2	91	1,4	1,1	1,7	58	0,8	0,6	1,0
Os et articulations (C40.0-C41.9)	141	1,1	0,9	1,3	77	1,2	0,9	1,5	64	1,0	0,7	1,2
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	445	3,2	2,9	3,5	240	3,6	3,1	4,1	205	2,8	2,4	3,2
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	1 967	13,7	13,1	14,4	1 035	15,6	14,6	16,5	932	12,4	11,6	13,3
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Sein (C50.0-C50.9)	7 753	52,5	51,3	53,7	66	1,0	0,7	1,2	7 687	99,2	97,0	101,5
Col utérin (C53.0-C53.9)	507	3,7	3,4	4,0	507	7,3	6,6	7,9
Corps utérin (C54.0-C54.9)	1 483	10,1	9,6	10,6	1 483	19,2	18,2	20,1
Utérus, sans autre indication (C55.9)	42	0,3	0,2	0,4	42	0,5	0,4	0,7
Ovaire (C56.9)	1 006	6,9	6,5	7,4	1 006	13,2	12,4	14,0
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	366	2,5	2,2	2,7	366	4,6	4,1	5,1
Prostate (C61.9)	8 997	63,1	61,8	64,5	8 997	137,0	134,2	139,9
Testicule (C62.0-C62.9)	328	2,9	2,5	3,2	328	5,7	5,1	6,4
Verge (C60.0-C60.9)	31	0,2	0,1	0,3	31	0,5	0,3	0,6
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	24	0,2	0,1	0,2	24	0,4	0,2	0,5
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	1 845	12,4	11,8	12,9	1 354	20,7	19,6	21,8	491	5,8	5,2	6,3
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	1 451	10,0	9,4	10,5	875	12,8	12,0	13,7	576	7,4	6,8	8,0
Urètre (C66.9)	69	0,5	0,3	0,6	40	0,6	0,4	0,8	29	0,3	0,2	0,5
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	185	1,3	1,1	1,5	148	2,3	1,9	2,7	37	0,5	0,3	0,6
Oeil (C69.0-C69.9)	105	0,8	0,6	0,9	58	0,9	0,7	1,1	47	0,6	0,5	0,8
Cerveau (C71.0-C71.9)	829	6,0	5,6	6,4	441	6,7	6,0	7,3	388	5,4	4,8	5,9
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	73	0,5	0,4	0,7	37	0,6	0,4	0,7	36	0,5	0,4	0,7
Thyroïde (C73.9)	1 906	14,0	13,4	14,7	395	5,8	5,2	6,4	1 511	22,1	20,9	23,2
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	116	0,9	0,7	1,0	51	0,8	0,5	1,0	65	0,9	0,7	1,2
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	345	2,7	2,4	3,0	186	3,0	2,5	3,4	159	2,5	2,1	2,9
Lymphomes non hodgkiniens	2 529	17,4	16,7	18,1	1 394	20,9	19,8	22,0	1 135	14,5	13,6	15,4

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-7 – suite

 Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie — Ontario^{1,2}

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	806	5,4	5,0	5,8	444	6,7	6,1	7,3	362	4,4	4,0	4,9
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	113	1,0	0,8	1,2	62	1,1	0,8	1,3	51	0,9	0,6	1,2
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	732	4,9	4,6	5,3	445	6,7	6,1	7,4	287	3,6	3,1	4,0
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	402	2,8	2,5	3,1	205	3,2	2,7	3,6	197	2,5	2,2	2,9
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	153	1,1	0,9	1,3	89	1,4	1,1	1,7	64	0,8	0,6	1,0
Autres leucémies	288	2,0	1,8	2,3	168	2,6	2,2	3,0	120	1,5	1,2	1,8
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	2 384	16,0	15,4	16,7	1 239	19,0	17,9	20,0	1 145	13,8	13,0	14,6
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	136	0,9	0,8	1,1	107	1,6	1,3	1,9	29	0,4	0,2	0,5
Sarcome de Kaposi (M-9140)	12	0,1	0,0	0,1	12	0,2	0,1	0,3	0	0,0	0,0	0,0
2004												
Total, tous les sièges primaires de cancer	55 936	394,9	391,6	398,2	29 062	451,7	446,4	456,9	26 874	352,8	348,5	357,2
Lèvre (C00.0-C00.9)	141	1,0	0,8	1,1	106	1,6	1,3	1,9	35	0,4	0,3	0,6
Langue (C01.9-C02.9)	294	2,0	1,8	2,3	196	2,8	2,4	3,3	98	1,3	1,0	1,6
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	180	1,3	1,1	1,5	111	1,7	1,4	2,1	69	0,9	0,7	1,1
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	80	0,6	0,4	0,7	55	0,8	0,6	1,1	25	0,3	0,2	0,4
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	181	1,3	1,1	1,5	107	1,6	1,3	1,9	74	1,0	0,7	1,2
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	107	0,8	0,6	0,9	76	1,1	0,9	1,4	31	0,4	0,3	0,6
Oropharynx (C10.0-C10.9)	31	0,2	0,1	0,3	24	0,4	0,2	0,5	7	0,1	0,0	0,2
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	70	0,5	0,4	0,6	60	0,9	0,7	1,1	10	0,1	0,0	0,2
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	182	1,2	1,1	1,4	130	1,8	1,5	2,2	52	0,7	0,5	0,9
Oesophage (C15.0-C15.9)	548	3,8	3,5	4,2	400	6,2	5,6	6,8	148	1,8	1,5	2,1
Estomac (C16.0-C16.9)	1 109	7,7	7,2	8,2	700	10,9	10,1	11,7	409	5,0	4,5	5,5
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	217	1,5	1,3	1,7	123	1,9	1,5	2,2	94	1,2	1,0	1,5
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	4 953	34,4	33,4	35,3	2 533	39,4	37,8	40,9	2 420	30,1	28,8	31,3
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	2 055	14,3	13,7	14,9	1 254	19,3	18,2	20,4	801	10,1	9,4	10,8
Anus (C21.0-C21.8)	274	1,9	1,7	2,1	152	2,3	1,9	2,7	122	1,6	1,3	1,9
Foie (C22.0)	431	3,1	2,8	3,4	330	5,0	4,4	5,5	101	1,4	1,1	1,6
Vésicule biliaire (C23.9)	152	1,1	0,9	1,2	55	0,9	0,6	1,1	97	1,2	0,9	1,4
Pancréas (C25.0-C25.9)	1 122	7,8	7,3	8,2	554	8,6	7,9	9,3	568	7,0	6,4	7,5
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	496	3,4	3,1	3,7	252	3,9	3,4	4,4	244	3,0	2,7	3,4
Larynx (C32.0-C32.9)	413	2,9	2,6	3,2	337	5,1	4,6	5,7	76	1,0	0,8	1,2
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	6 914	48,7	47,5	49,8	3 793	59,2	57,3	61,1	3 121	40,6	39,1	42,0
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	125	0,9	0,8	1,1	75	1,2	0,9	1,5	50	0,7	0,5	0,9
Os et articulations (C40.0-C41.9)	94	0,7	0,6	0,9	58	1,0	0,7	1,2	36	0,6	0,4	0,7
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	420	3,1	2,8	3,4	221	3,4	2,9	3,8	199	2,8	2,4	3,2
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	1 863	13,3	12,7	13,9	978	15,0	14,0	15,9	885	12,1	11,3	13,0
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Sein (C50.0-C50.9)	7 519	51,9	50,7	53,1	75	1,2	0,9	1,4	7 444	97,6	95,3	99,8
Col utérin (C53.0-C53.9)	520	3,9	3,6	4,3	520	7,7	7,1	8,4
Corps utérin (C54.0-C54.9)	1 539	10,7	10,2	11,3	1 539	20,4	19,3	21,4
Utérus, sans autre indication (C55.9)	26	0,2	0,1	0,2	26	0,3	0,2	0,4
Ovaire (C56.9)	894	6,2	5,8	6,7	894	11,8	11,1	12,6
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	316	2,2	2,0	2,5	316	4,2	3,7	4,6
Prostate (C61.9)	8 439	60,4	59,1	61,7	8 439	131,7	128,8	134,5
Testicule (C62.0-C62.9)	325	2,9	2,6	3,2	325	5,8	5,1	6,4
Verge (C60.0-C60.9)	35	0,2	0,2	0,3	35	0,6	0,4	0,7

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-7 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie — Ontario^{1,2}

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	19	0,1	0,1	0,2	19	0,3	0,2	0,4
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	1 886	13,1	12,5	13,7	1 404	22,1	20,9	23,2	482	6,0	5,4	6,5
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	1 343	9,4	8,9	9,9	783	11,7	10,8	12,5	560	7,3	6,7	7,9
Urètre (C66.9)	56	0,4	0,3	0,5	34	0,6	0,4	0,7	22	0,3	0,1	0,4
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	206	1,5	1,3	1,7	155	2,5	2,1	2,8	51	0,7	0,5	0,8
Oeil (C69.0-C69.9)	93	0,7	0,5	0,8	54	0,8	0,6	1,0	39	0,6	0,4	0,8
Cerveau (C71.0-C71.9)	774	5,7	5,3	6,2	438	6,8	6,2	7,5	336	4,8	4,3	5,3
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	55	0,4	0,3	0,5	27	0,4	0,3	0,6	28	0,4	0,2	0,6
Thyroïde (C73.9)	1 648	12,6	12,0	13,2	333	5,1	4,5	5,6	1 315	20,0	18,9	21,1
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	104	0,8	0,6	0,9	53	0,8	0,6	1,0	51	0,7	0,5	0,9
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	341	2,8	2,5	3,1	188	3,1	2,6	3,5	153	2,5	2,1	2,9
Lymphomes non hodgkiniens	2 457	17,3	16,7	18,0	1 300	20,1	19,0	21,2	1 157	15,1	14,2	16,0
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	782	5,4	5,0	5,8	422	6,5	5,9	7,2	360	4,4	4,0	4,9
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	79	0,7	0,5	0,8	44	0,8	0,5	1,0	35	0,6	0,4	0,8
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	772	5,3	4,9	5,7	448	6,9	6,2	7,5	324	4,0	3,6	4,4
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	409	2,9	2,6	3,2	224	3,5	3,0	4,0	185	2,5	2,2	2,9
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	129	0,9	0,7	1,0	72	1,1	0,9	1,4	57	0,7	0,5	0,9
Autres leucémies	298	2,3	2,0	2,5	185	3,0	2,5	3,4	113	1,6	1,3	1,9
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	2 297	15,7	15,1	16,4	1 217	19,0	17,9	20,1	1 080	13,2	12,4	14,0
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	113	0,8	0,7	0,9	98	1,5	1,2	1,8	15	0,2	0,1	0,3
Sarcome de Kaposi (M-9140)	10	0,1	0,0	0,1	10	0,1	0,1	0,2	0	0,0	0,0	0,0

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.
2. Les données de 2003, 2004 et 2005 pour l'Ontario sont provisoires. Elles n'incluent pas les cas identifiés par certificat de décès seulement, lesquels sont estimés à environ 2 %. Les sièges in situ pour la vessie diagnostiqués en Ontario ne sont pas déclarés au Registre canadien du cancer.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que les tableaux CANSIM fournissent aussi les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 3-8

 Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie — Manitoba^{1,2}

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2005												
Total, tous les sièges primaires de cancer	5 248	376,2	365,8	386,7	2 602	415,3	399,2	431,5	2 646	350,8	336,8	364,7
Lèvre (C00.0-C00.9)	43	3,1	2,1	4,0	32	5,1	3,3	6,9	11	1,3	0,5	2,1
Langue (C01.9-C02.9)	37	2,8	1,9	3,7	20	3,1	1,7	4,5	17	2,5	1,2	3,7
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	8	1,0	0,3	1,6
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	x	x	x	x	7	1,1	0,3	2,0	x	x	x	x
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oesophage (C15.0-C15.9)	55	4,0	2,9	5,1	39	6,3	4,3	8,3	16	2,0	1,0	3,1
Estomac (C16.0-C16.9)	118	8,3	6,7	9,8	71	11,2	8,6	13,8	47	6,1	4,3	7,9
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	32	2,2	1,4	3,0	18	2,9	1,5	4,3	14	1,7	0,7	2,6
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	467	30,7	27,8	33,6	230	35,2	30,6	39,8	237	27,4	23,7	31,1
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	230	16,5	14,3	18,7	142	22,2	18,5	25,9	88	11,5	9,0	14,0
Anus (C21.0-C21.8)	17	1,3	0,7	1,9	7	1,2	0,3	2,0	10	1,4	0,5	2,4
Foie (C22.0)	41	2,9	2,0	3,9	29	4,6	2,9	6,2	12	1,6	0,6	2,5
Vésicule biliaire (C23.9)	19	1,3	0,7	1,9	7	1,1	0,3	2,0	12	1,6	0,7	2,5
Pancréas (C25.0-C25.9)	114	7,8	6,3	9,3	59	9,2	6,9	11,6	55	6,7	4,8	8,5
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	47	3,4	2,4	4,4	27	4,5	2,8	6,2	20	2,5	1,3	3,6
Larynx (C32.0-C32.9)	x	x	x	x	18	2,9	1,5	4,2	x	x	x	x
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	807	58,0	53,9	62,1	425	67,8	61,3	74,3	382	50,6	45,4	55,9
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	x	x	x	x	9	1,4	0,5	2,4	x	x	x	x
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	29	2,2	1,4	3,0	16	2,5	1,3	3,8	13	2,0	0,9	3,1
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	135	10,2	8,4	12,0	71	11,0	8,4	13,6	64	9,9	7,3	12,4
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	6	0,5	0,1	0,9
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	723	96,1	88,8	103,3
Col utérin (C53.0-C53.9)	52	4,4	3,1	5,6	52	8,7	6,2	11,1
Corps utérin (C54.0-C54.9)	157	11,3	9,5	13,1	157	21,9	18,4	25,3
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ovaire (C56.9)	82	5,9	4,6	7,2	82	11,3	8,8	13,8
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	26	2,0	1,2	2,8	26	3,9	2,3	5,4
Prostate (C61.9)	559	41,5	38,0	45,1	559	90,9	83,3	98,5
Testicule (C62.0-C62.9)	28	2,7	1,7	3,8	28	5,4	3,3	7,4
Verge (C60.0-C60.9)	6	0,3	0,1	0,6	6	0,9	0,2	1,6
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	257	17,8	15,6	20,0	180	28,6	24,4	32,8	77	9,4	7,2	11,6
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	190	13,9	11,9	15,9	111	17,7	14,4	21,1	79	10,3	7,9	12,6
Urètre (C66.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cerveau (C71.0-C71.9)	74	5,6	4,3	7,0	39	6,3	4,3	8,4	35	5,0	3,3	6,7
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	63	5,2	3,9	6,5	15	2,4	1,2	3,6	48	8,0	5,6	10,3
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	31	2,7	1,7	3,7	17	3,1	1,6	4,5	14	2,4	1,1	3,7
Lymphomes non hodgkiniens	236	17,1	14,8	19,3	135	21,7	18,0	25,4	101	13,1	10,4	15,8

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-8 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie — Manitoba^{1,2}

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	63	4,4	3,3	5,5	36	5,6	3,8	7,5	27	3,3	2,0	4,6
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	14	1,3	0,6	1,9	8	1,5	0,4	2,6	6	1,0	0,2	1,8
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	68	4,6	3,5	5,8	33	5,2	3,4	7,0	35	4,1	2,7	5,6
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	23	1,7	1,0	2,4	13	2,2	1,0	3,4	10	1,3	0,4	2,2
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	x	x	x	x	x	x	x	x	6	1,0	0,2	1,8
Autres leucémies	16	1,2	0,6	1,9	6	1,1	0,2	1,9	10	1,4	0,5	2,3
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	220	15,0	12,9	17,0	113	17,6	14,3	20,9	107	13,0	10,4	15,6
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	x	x	x	x	17	2,7	1,4	3,9	x	x	x	x
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
2004												
Total, tous les sièges primaires de cancer	5 472	395,0	384,3	405,7	2 786	447,9	431,1	464,7	2 686	358,4	344,2	372,5
Lèvre (C00.0-C00.9)	35	2,5	1,6	3,3	24	3,8	2,2	5,3	11	1,3	0,5	2,2
Langue (C01.9-C02.9)	32	2,4	1,6	3,3	18	2,9	1,5	4,2	14	2,0	0,9	3,2
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	15	1,1	0,5	1,7	7	1,2	0,3	2,0	8	1,0	0,3	1,8
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	15	1,1	0,5	1,7	7	1,0	0,3	1,8	8	1,1	0,3	1,9
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	x	x	x	x	7	1,1	0,3	2,0	x	x	x	x
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	25	1,8	1,1	2,5	19	2,9	1,6	4,2	6	0,7	0,1	1,3
Oesophage (C15.0-C15.9)	33	2,4	1,6	3,3	24	4,0	2,4	5,6	9	0,9	0,3	1,5
Estomac (C16.0-C16.9)	118	8,1	6,6	9,6	80	12,6	9,8	15,4	38	4,4	2,9	5,9
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	x	x	x	x	10	1,6	0,6	2,6	x	x	x	x
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	480	33,1	30,1	36,2	246	39,5	34,5	44,5	234	27,9	24,1	31,6
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	249	18,0	15,7	20,3	140	22,3	18,5	26,0	109	14,1	11,3	16,9
Anus (C21.0-C21.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	9	1,2	0,4	2,0
Foie (C22.0)	38	2,8	1,9	3,7	26	4,2	2,6	5,8	12	1,5	0,6	2,4
Vésicule biliaire (C23.9)	19	1,3	0,7	2,0	9	1,5	0,5	2,4	10	1,3	0,4	2,1
Pancréas (C25.0-C25.9)	152	10,6	8,9	12,3	80	12,6	9,8	15,4	72	9,2	7,0	11,4
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	54	3,7	2,7	4,7	22	3,6	2,1	5,1	32	3,7	2,3	5,0
Larynx (C32.0-C32.9)	x	x	x	x	26	4,2	2,6	5,9	x	x	x	x
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	803	57,3	53,3	61,4	422	67,7	61,2	74,2	381	49,8	44,6	55,0
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	8	1,2	0,4	2,1	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	6	0,7	0,1	1,3
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	36	2,9	1,9	3,8	21	3,5	2,0	5,1	15	2,3	1,1	3,6
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	125	9,4	7,7	11,0	72	11,5	8,8	14,3	53	7,3	5,2	9,3
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	15	1,0	0,5	1,6	8	1,2	0,4	2,1	7	0,9	0,2	1,7
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	716	98,7	91,3	106,2
Col utérin (C53.0-C53.9)	49	4,2	3,0	5,5	49	8,4	6,0	10,9
Corps utérin (C54.0-C54.9)	177	13,0	11,1	15,0	177	24,9	21,1	28,7
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ovaire (C56.9)	100	7,3	5,9	8,8	100	13,8	11,0	16,6
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	17	1,3	0,7	1,9	17	2,4	1,2	3,7
Prostate (C61.9)	692	50,9	47,0	54,7	692	112,4	104,0	120,9
Testicule (C62.0-C62.9)	36	3,3	2,2	4,4	36	6,6	4,4	8,8
Verge (C60.0-C60.9)	x	x	x	x	x	x	x	x

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-8 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie — Manitoba^{1,2}

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	236	16,1	14,0	18,2	171	26,8	22,8	30,9	65	8,0	6,0	10,1
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	193	13,9	11,9	15,9	131	20,4	16,8	23,9	62	8,4	6,2	10,5
Uretrère (C66.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Oeil (C69.0-C69.9)	x	x	x	x	7	1,1	0,3	1,9	x	x	x	x
Cerveau (C71.0-C71.9)	66	5,3	4,0	6,6	34	5,7	3,7	7,6	32	5,0	3,2	6,7
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	81	6,8	5,3	8,3	14	2,4	1,1	3,6	67	11,3	8,5	14,1
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	30	2,5	1,6	3,4	13	2,3	1,0	3,6	17	2,6	1,3	3,9
Lymphomes non hodgkiniens	247	17,7	15,5	20,0	113	18,4	14,9	21,8	134	16,8	13,8	19,8
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	67	4,5	3,4	5,6	40	6,2	4,3	8,2	27	3,2	1,9	4,5
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	x	x	x	x	13	2,2	1,0	3,4	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	62	4,3	3,2	5,3	35	5,4	3,6	7,2	27	3,5	2,2	4,9
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	30	2,1	1,3	2,8	16	2,6	1,3	3,8	14	1,7	0,8	2,7
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	x	x	x	x	7	1,1	0,3	2,0	x	x	x	x
Autres leucémies	25	1,7	1,0	2,4	15	2,4	1,2	3,6	10	1,1	0,4	1,8
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	223	15,1	13,1	17,2	123	19,8	16,2	23,3	100	11,6	9,2	14,0
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	x	x	x	x	11	1,9	0,8	3,1	x	x	x	x
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.

2. Les données de 2005 pour le Manitoba sont provisoires. L'incidence des cancers de la prostate et de l'appareil génito-urinaire mâle sont sous-estimés. Cette situation sera rectifiée lors de la prochaine diffusion annuelle.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que les tableaux CANSIM fournissent aussi les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 3-9

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie — Saskatchewan

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2005												
Total, tous les sièges primaires de cancer (C00.0-C00.9)	4 659	381,1	369,8	392,4	2 571	456,6	438,7	474,5	2 088	320,6	306,0	335,1
Lèvre (C00.0-C00.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	24	2,1	1,2	3,0	15	2,8	1,3	4,2	9	1,5	0,5	2,4
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	x	x	x	x	11	2,0	0,8	3,3	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	x	x	x	x	10	1,8	0,7	2,9	x	x	x	x
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Oropharynx (C10.0-C10.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	x	x	x	x	11	1,8	0,7	2,9	x	x	x	x
Oesophage (C15.0-C15.9)	x	x	x	x	30	5,0	3,2	6,7	x	x	x	x
Estomac (C16.0-C16.9)	75	5,8	4,5	7,2	50	8,6	6,2	11,1	25	3,4	1,9	4,8
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	7	1,0	0,2	1,8
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	413	32,3	29,0	35,5	215	37,4	32,3	42,5	198	28,2	24,0	32,4
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	228	18,5	16,0	21,0	153	27,2	22,8	31,6	75	10,9	8,3	13,5
Anus (C21.0-C21.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Foie (C22.0)	x	x	x	x	13	2,4	1,1	3,8	x	x	x	x
Vésicule biliaire (C23.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	9	1,3	0,4	2,3
Pancréas (C25.0-C25.9)	120	9,2	7,5	10,8	51	8,8	6,4	11,2	69	9,5	7,1	11,9
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	47	3,5	2,5	4,6	20	3,2	1,8	4,7	27	3,9	2,3	5,4
Larynx (C32.0-C32.9)	x	x	x	x	21	3,8	2,2	5,4	x	x	x	x
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	627	51,0	46,9	55,1	346	60,9	54,4	67,4	281	43,6	38,3	48,9
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	21	1,6	0,9	2,3	11	2,0	0,8	3,2	10	1,2	0,4	2,0
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	129	10,6	8,7	12,5	74	13,0	10,0	16,0	55	8,4	6,0	10,7
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	25	2,3	1,3	3,2	11	2,1	0,8	3,4	14	2,4	1,0	3,8
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	571	91,0	83,2	98,7
Col utérin (C53.0-C53.9)	33	3,4	2,2	4,6	33	6,7	4,3	9,1
Corps utérin (C54.0-C54.9)	108	8,8	7,1	10,5	108	16,9	13,6	20,3
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ovaire (C56.9)	65	5,2	3,9	6,6	65	10,0	7,4	12,5
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	21	1,5	0,8	2,2	21	2,8	1,5	4,1
Prostate (C61.9)	827	69,2	64,3	74,0	827	148,3	138,1	158,5
Testicule (C62.0-C62.9)	15	1,8	0,9	2,7	15	3,5	1,7	5,4
Verge (C60.0-C60.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	192	14,6	12,5	16,8	144	24,3	20,2	28,3	48	6,7	4,7	8,7
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	124	10,5	8,6	12,4	82	15,3	11,9	18,6	42	6,1	4,1	8,0
Urètre (C66.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cerveau (C71.0-C71.9)	61	5,4	4,0	6,7	31	5,8	3,7	7,8	30	4,9	3,1	6,8
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	55	10,2	7,4	13,1
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	8	1,6	0,5	2,8	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	28	3,0	1,8	4,2	14	2,9	1,4	4,5	14	3,0	1,3	4,7
Lymphomes non hodgkiniens	185	14,9	12,7	17,2	95	16,5	13,1	19,9	90	13,7	10,7	16,8

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-9 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie — Saskatchewan

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	51	4,1	3,0	5,3	30	5,3	3,4	7,2	21	3,2	1,8	4,6
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	22	2,3	1,3	3,3	13	2,7	1,2	4,2	9	1,9	0,6	3,1
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	74	5,8	4,4	7,1	43	7,5	5,2	9,8	31	4,3	2,7	5,9
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	31	2,6	1,7	3,6	16	2,9	1,5	4,4	15	2,3	1,1	3,6
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres leucémies	x	x	x	x	13	2,3	1,0	3,7	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	221	16,4	14,2	18,7	128	22,0	18,1	25,8	93	11,9	9,3	14,5
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	x	x	x	x	7	1,3	0,3	2,3	x	x	x	x
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
2004												
Total, tous les sièges primaires de cancer	4 909	400,3	388,7	411,9	2 750	489,5	471,0	508,1	2 159	328,2	313,6	342,7
Lèvre (C00.0-C00.9)	26	1,7	1,0	2,4	20	3,2	1,8	4,6	6	0,6	0,1	1,2
Langue (C01.9-C02.9)	x	x	x	x	10	1,8	0,7	2,9	x	x	x	x
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	7	1,3	0,3	2,3
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	9	1,3	0,4	2,2
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	x	x	x	x	10	1,8	0,6	2,9	x	x	x	x
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	11	0,9	0,4	1,5	11	1,9	0,8	3,1	0	0,0	0,0	0,0
Oesophage (C15.0-C15.9)	41	3,1	2,1	4,1	32	5,5	3,5	7,4	9	1,2	0,4	2,0
Estomac (C16.0-C16.9)	81	6,1	4,7	7,5	53	9,1	6,6	11,6	28	3,4	2,0	4,8
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	19	1,5	0,8	2,2	10	1,9	0,7	3,0	9	1,1	0,3	1,8
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	438	33,9	30,6	37,2	219	38,4	33,2	43,5	219	29,9	25,7	34,2
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	229	18,3	15,9	20,8	139	24,5	20,4	28,6	90	12,8	10,0	15,6
Anus (C21.0-C21.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	7	0,9	0,2	1,6
Foie (C22.0)	x	x	x	x	13	2,5	1,1	3,8	x	x	x	x
Vésicule biliaire (C23.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	12	1,7	0,7	2,7
Pancréas (C25.0-C25.9)	115	8,5	6,9	10,2	52	8,9	6,4	11,3	63	8,2	6,0	10,3
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	38	3,1	2,1	4,1	19	3,4	1,9	5,0	19	2,8	1,5	4,2
Larynx (C32.0-C32.9)	x	x	x	x	24	4,1	2,5	5,8	x	x	x	x
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	622	50,5	46,4	54,6	343	60,3	53,8	66,7	279	43,0	37,7	48,2
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	27	2,0	1,3	2,8	13	2,2	1,0	3,4	14	2,0	0,9	3,0
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	110	9,2	7,4	11,0	51	8,9	6,4	11,4	59	9,6	7,0	12,2
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	25	1,7	1,0	2,4	11	1,8	0,7	2,8	14	1,7	0,6	2,7
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	585	93,1	85,2	101,0
Col utérin (C53.0-C53.9)	45	4,2	2,9	5,5	45	8,3	5,8	10,9
Corps utérin (C54.0-C54.9)	122	10,7	8,8	12,6	122	20,6	16,9	24,4
Utérus, sans autre indication (C55.9)	7	0,6	0,1	1,0	7	1,1	0,3	1,9
Ovaire (C56.9)	67	5,6	4,2	7,0	67	10,7	8,1	13,3
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	23	1,6	0,9	2,3	23	3,0	1,7	4,3
Prostate (C61.9)	951	80,0	74,8	85,2	951	172,3	161,3	183,3
Testicule (C62.0-C62.9)	17	1,9	0,9	2,8	17	3,7	1,9	5,5
Verge (C60.0-C60.9)	8	0,8	0,2	1,4	8	1,7	0,5	2,9

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-9 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie — Saskatchewan1

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	223	17,0	14,7	19,4	179	30,8	26,2	35,3	44	5,9	4,0	7,7
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	136	11,4	9,4	13,4	82	14,9	11,6	18,1	54	8,6	6,2	11,0
Uretere (C66.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Oeil (C69.0-C69.9)	x	x	x	x	7	1,3	0,3	2,3	x	x	x	x
Cerveau (C71.0-C71.9)	57	5,2	3,8	6,6	34	6,6	4,3	8,8	23	3,8	2,2	5,5
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	45	4,0	2,8	5,2	11	1,9	0,8	3,0	34	6,1	3,9	8,2
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	x	x	x	x	15	3,2	1,5	4,9	x	x	x	x
Lymphomes non hodgkiniens	197	16,3	14,0	18,7	117	20,6	16,8	24,4	80	12,8	9,8	15,7
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	63	5,0	3,8	6,3	33	5,6	3,7	7,6	30	4,6	2,9	6,4
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	x	x	x	x	8	1,7	0,5	2,9	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	84	6,4	5,0	7,9	56	9,8	7,2	12,5	28	3,4	2,1	4,8
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	37	3,2	2,1	4,3	23	4,4	2,6	6,3	14	2,1	0,9	3,2
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	15	1,3	0,6	2,0	8	1,6	0,5	2,8	7	1,1	0,2	1,9
Autres leucémies	30	2,4	1,5	3,3	19	3,2	1,7	4,7	11	1,8	0,6	2,9
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	188	13,6	11,6	15,6	95	15,9	12,7	19,2	93	11,8	9,3	14,4
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	x	x	x	x	12	2,1	0,9	3,3	x	x	x	x
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que les tableaux CANSIM fournissent aussi les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 3-10

 Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie — Alberta^{1,2}

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2005												
Total, tous les sièges primaires de cancer	12 361	374,3	367,6	381,0	6 510	427,0	416,5	437,6	5 851	333,1	324,4	341,8
Lèvre (C00.0-C00.9)	28	0,8	0,5	1,2	21	1,4	0,8	2,0	7	0,4	0,1	0,6
Langue (C01.9-C02.9)	56	1,5	1,1	1,9	37	2,1	1,4	2,7	19	1,0	0,5	1,5
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	21	0,6	0,4	0,9	12	0,7	0,3	1,1	9	0,5	0,2	0,8
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	24	0,7	0,4	1,0	13	0,8	0,4	1,3	11	0,6	0,2	1,0
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	36	1,1	0,7	1,5	15	1,0	0,5	1,6	21	1,2	0,7	1,7
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	13	0,7	0,3	1,1	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	6	0,4	0,1	0,7	x	x	x	x
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	x	x	x	x	13	0,9	0,4	1,3	x	x	x	x
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	46	1,4	1,0	1,8	37	2,3	1,5	3,0	9	0,5	0,2	0,9
Oesophage (C15.0-C15.9)	107	3,3	2,7	4,0	89	5,8	4,6	7,0	18	1,1	0,6	1,6
Estomac (C16.0-C16.9)	217	6,6	5,7	7,4	144	9,6	8,0	11,2	73	4,0	3,1	5,0
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	58	1,8	1,3	2,2	42	2,7	1,9	3,5	16	0,9	0,5	1,4
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	926	28,2	26,3	30,0	479	32,0	29,1	34,9	447	24,6	22,3	27,0
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	563	17,1	15,7	18,5	352	22,8	20,4	25,2	211	12,0	10,4	13,7
Anus (C21.0-C21.8)	21	0,6	0,3	0,9	7	0,5	0,1	0,8	14	0,7	0,3	1,1
Foie (C22.0)	111	3,3	2,6	3,9	86	5,2	4,1	6,4	25	1,4	0,9	2,0
Vésicule biliaire (C23.9)	39	1,2	0,8	1,6	13	0,9	0,4	1,4	26	1,5	0,9	2,1
Pancréas (C25.0-C25.9)	303	9,2	8,1	10,2	144	9,7	8,1	11,3	159	8,9	7,5	10,4
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	130	3,8	3,2	4,5	56	3,6	2,7	4,6	74	4,2	3,2	5,1
Larynx (C32.0-C32.9)	63	1,9	1,4	2,3	54	3,4	2,4	4,3	9	0,5	0,2	0,8
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	1 474	46,1	43,7	48,5	773	53,0	49,2	56,7	701	41,2	38,1	44,3
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	17	0,5	0,3	0,8	10	0,6	0,2	1,0	7	0,4	0,1	0,7
Os et articulations (C40.0-C41.9)	18	0,6	0,3	0,8	8	0,5	0,1	0,8	10	0,6	0,2	1,0
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	90	2,7	2,1	3,2	52	3,3	2,4	4,2	38	2,1	1,4	2,7
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	380	10,9	9,8	12,1	189	11,5	9,9	13,2	191	10,7	9,1	12,2
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	59	1,8	1,3	2,2	33	2,1	1,4	2,9	26	1,5	0,9	2,0
Sein (C50.0-C50.9)	1 638	47,2	44,9	49,6	12	0,8	0,4	1,3	1 626	90,7	86,2	95,2
Col utérin (C53.0-C53.9)	135	4,1	3,4	4,8	135	8,2	6,8	9,7
Corps utérin (C54.0-C54.9)	384	11,4	10,3	12,6	384	22,3	20,0	24,5
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	6	0,3	0,1	0,6
Ovaire (C56.9)	179	5,2	4,4	5,9	179	9,9	8,4	11,4
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	51	1,5	1,1	1,9	51	2,8	2,0	3,5
Prostate (C61.9)	1 859	58,2	55,5	60,9	1 859	123,2	117,5	128,8
Testicule (C62.0-C62.9)	117	3,7	3,0	4,3	117	7,1	5,8	8,4
Verge (C60.0-C60.9)	15	0,5	0,2	0,7	15	1,0	0,5	1,6
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	6	0,2	0,0	0,4	6	0,4	0,1	0,8
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	574	17,7	16,2	19,2	415	28,2	25,5	30,9	159	8,9	7,5	10,4
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	334	10,0	8,9	11,1	225	14,3	12,4	16,2	109	6,3	5,1	7,5
Urètre (C66.9)	x	x	x	x	9	0,6	0,2	1,0	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	6	0,4	0,1	0,7	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	17	0,5	0,3	0,8	9	0,6	0,2	0,9	8	0,5	0,1	0,8
Cerveau (C71.0-C71.9)	180	5,4	4,6	6,2	108	6,3	5,1	7,5	72	4,5	3,5	5,6
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	336	10,1	9,0	11,2	70	4,2	3,2	5,2	266	16,0	14,1	18,0
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	23	0,7	0,4	1,0	12	0,7	0,3	1,1	11	0,6	0,3	1,0
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	84	2,6	2,1	3,2	55	3,4	2,5	4,3	29	1,9	1,2	2,6
Lymphomes non hodgkiniens	546	16,4	15,0	17,8	314	19,9	17,7	22,1	232	13,3	11,5	15,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-10 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie — Alberta^{1,2}

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	156	4,8	4,0	5,5	93	6,2	4,9	7,5	63	3,5	2,6	4,4
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	38	1,2	0,8	1,6	25	1,6	1,0	2,3	13	0,8	0,4	1,3
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	180	5,4	4,6	6,3	109	7,1	5,8	8,5	71	4,0	3,0	4,9
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	83	2,6	2,0	3,2	46	3,1	2,2	4,0	37	2,2	1,5	2,9
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	51	1,5	1,1	2,0	30	1,9	1,2	2,5	21	1,3	0,7	1,8
Autres leucémies	28	0,8	0,5	1,1	21	1,3	0,8	1,9	7	0,4	0,1	0,7
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	442	13,4	12,1	14,7	220	14,7	12,8	16,7	222	12,3	10,6	13,9
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	41	1,3	0,9	1,7	31	2,1	1,4	2,9	10	0,6	0,2	1,0
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2004												
Total, tous les sièges primaires de cancer	12 867	402,4	395,4	409,5	6 757	461,0	449,9	472,2	6 110	357,4	348,3	366,6
Lèvre (C00.0-C00.9)	28	0,9	0,5	1,2	22	1,5	0,9	2,2	6	0,3	0,1	0,6
Langue (C01.9-C02.9)	62	1,9	1,4	2,3	38	2,3	1,6	3,1	24	1,4	0,8	1,9
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	30	0,9	0,6	1,3	12	0,9	0,4	1,4	18	1,1	0,6	1,5
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	14	0,5	0,2	0,7	6	0,4	0,1	0,7	8	0,5	0,2	0,9
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	27	0,8	0,5	1,2	13	0,9	0,4	1,5	14	0,8	0,4	1,3
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	16	0,4	0,2	0,7	10	0,5	0,2	0,8	6	0,4	0,1	0,7
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	8	0,5	0,1	0,8	x	x	x	x
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	x	x	x	x	16	1,1	0,5	1,6	x	x	x	x
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	45	1,3	0,9	1,7	37	2,1	1,4	2,9	8	0,4	0,1	0,8
Oesophage (C15.0-C15.9)	112	3,5	2,8	4,1	84	5,6	4,3	6,8	28	1,6	1,0	2,2
Estomac (C16.0-C16.9)	228	7,1	6,2	8,1	144	10,1	8,4	11,7	84	4,6	3,6	5,6
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	45	1,4	1,0	1,8	27	1,8	1,1	2,5	18	1,0	0,5	1,5
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	949	29,9	28,0	31,8	494	34,3	31,2	37,4	455	26,3	23,8	28,8
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	561	17,4	16,0	18,9	355	24,2	21,6	26,7	206	11,6	10,0	13,3
Anus (C21.0-C21.8)	30	0,9	0,6	1,3	9	0,6	0,2	1,0	21	1,2	0,7	1,7
Foie (C22.0)	126	3,8	3,1	4,5	93	6,0	4,7	7,2	33	1,8	1,2	2,4
Vésicule biliaire (C23.9)	31	1,0	0,6	1,3	8	0,6	0,2	0,9	23	1,3	0,8	1,9
Pancréas (C25.0-C25.9)	302	9,4	8,4	10,5	135	9,2	7,7	10,8	167	9,5	8,0	10,9
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	160	4,9	4,1	5,7	64	4,3	3,3	5,4	96	5,5	4,4	6,6
Larynx (C32.0-C32.9)	59	1,9	1,4	2,4	46	3,2	2,3	4,1	13	0,8	0,4	1,2
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	1 559	50,1	47,6	52,6	833	57,9	53,9	61,9	726	44,1	40,8	47,3
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	19	0,6	0,3	0,9	13	0,9	0,4	1,3	6	0,4	0,1	0,7
Os et articulations (C40.0-C41.9)	40	1,2	0,9	1,6	25	1,6	1,0	2,3	15	0,9	0,4	1,3
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	68	2,2	1,7	2,8	39	2,7	1,8	3,5	29	1,8	1,1	2,5
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	451	13,6	12,3	14,9	229	14,7	12,8	16,7	222	12,9	11,1	14,6
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	52	1,7	1,2	2,1	30	2,2	1,4	2,9	22	1,4	0,8	1,9
Sein (C50.0-C50.9)	1 763	52,6	50,1	55,1	11	0,7	0,3	1,2	1 752	101,4	96,6	106,3
Col utérin (C53.0-C53.9)	146	4,4	3,7	5,2	146	8,9	7,4	10,4
Corps utérin (C54.0-C54.9)	346	10,5	9,4	11,6	346	20,5	18,3	22,6
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	7	0,4	0,1	0,7
Ovaire (C56.9)	183	5,6	4,8	6,4	183	10,7	9,1	12,2
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	60	1,8	1,4	2,3	60	3,5	2,6	4,4
Prostate (C61.9)	1 989	64,8	62,0	67,7	1 989	137,9	131,8	144,1
Testicule (C62.0-C62.9)	100	3,2	2,6	3,9	100	6,3	5,0	7,5
Verge (C60.0-C60.9)	19	0,6	0,3	0,9	19	1,2	0,7	1,8

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-10 – suite

 Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie — Alberta^{1,2}

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	569	18,2	16,7	19,7	438	30,8	27,9	33,8	131	7,7	6,4	9,1
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	362	11,2	10,0	12,4	219	14,2	12,3	16,1	143	8,6	7,2	10,0
Urètre (C66.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	8	0,6	0,2	1,0	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	10	0,6	0,2	1,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	181	5,6	4,8	6,5	112	7,1	5,8	8,5	69	4,1	3,1	5,1
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	328	9,8	8,7	10,8	68	4,0	3,0	5,0	260	15,7	13,8	17,7
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	21	0,7	0,4	1,0	9	0,6	0,2	1,0	12	0,7	0,3	1,2
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	95	2,9	2,3	3,5	51	3,1	2,2	3,9	44	2,8	1,9	3,6
Lymphomes non hodgkiniens	525	16,4	15,0	17,8	304	20,3	18,0	22,6	221	12,9	11,1	14,6
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	168	5,4	4,5	6,2	103	7,2	5,8	8,6	65	4,0	3,0	5,0
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	28	0,9	0,6	1,3	15	1,0	0,5	1,5	13	0,9	0,4	1,4
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	142	4,5	3,8	5,3	85	5,9	4,7	7,2	57	3,4	2,5	4,2
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	72	2,2	1,7	2,8	39	2,5	1,7	3,3	33	2,0	1,3	2,7
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	50	1,5	1,1	1,9	34	2,3	1,5	3,1	16	0,8	0,4	1,2
Autres leucémies	38	1,2	0,8	1,5	25	1,6	1,0	2,2	13	0,7	0,3	1,1
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	533	16,6	15,2	18,0	272	19,1	16,8	21,4	261	14,6	12,8	16,4
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	x	x	x	x	42	3,0	2,1	3,9	x	x	x	x
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	6	0,4	0,1	0,7	x	x	x	x

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.

2. Les données de 2005 pour l'Alberta sont provisoires. Approximativement 2 % des nouveaux cas du cancer n'ont pas été inclus afin de respecter le délai établi par le Conseil canadien des registres du cancer.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que les tableaux CANSIM fournissent aussi les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 3-11

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie — Colombie-Britannique¹

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2005												
Total, tous les sièges primaires de cancer	18 635	354,0	348,8	359,2	9 784	399,1	391,1	407,1	8 851	318,2	311,3	325,0
Lèvre (C00.0-C00.9)	x	x	x	x	12	0,5	0,2	0,8	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	108	2,1	1,7	2,5	78	3,1	2,4	3,8	30	1,2	0,7	1,6
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	44	0,9	0,6	1,2	27	1,2	0,7	1,6	17	0,6	0,3	1,0
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	30	0,5	0,3	0,7	15	0,6	0,3	0,9	15	0,5	0,2	0,7
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	60	1,1	0,8	1,4	28	1,1	0,7	1,6	32	1,1	0,7	1,5
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	43	0,8	0,6	1,1	30	1,2	0,7	1,6	13	0,5	0,2	0,8
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	13	0,5	0,2	0,8	x	x	x	x
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	34	0,6	0,4	0,8	26	1,0	0,6	1,4	8	0,3	0,1	0,5
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	76	1,4	1,1	1,7	53	2,0	1,5	2,5	23	0,8	0,5	1,2
Oesophage (C15.0-C15.9)	212	3,9	3,4	4,5	139	5,5	4,6	6,5	73	2,4	1,8	2,9
Estomac (C16.0-C16.9)	358	6,6	5,9	7,3	239	9,6	8,4	10,8	119	4,1	3,3	4,9
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	64	1,2	0,9	1,5	35	1,4	0,9	1,8	29	1,1	0,7	1,4
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	1 603	29,6	28,2	31,1	841	34,1	31,8	36,4	762	25,9	24,0	27,8
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	794	14,9	13,8	15,9	479	19,4	17,6	21,1	315	10,8	9,6	12,0
Anus (C21.0-C21.8)	78	1,4	1,1	1,7	29	1,1	0,7	1,5	49	1,6	1,2	2,1
Foie (C22.0)	194	3,7	3,2	4,2	142	5,6	4,7	6,6	52	1,8	1,3	2,3
Vésicule biliaire (C23.9)	58	1,0	0,8	1,3	17	0,7	0,4	1,0	41	1,3	0,9	1,8
Pancréas (C25.0-C25.9)	449	8,1	7,3	8,8	226	8,9	7,7	10,0	223	7,3	6,3	8,3
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	162	3,0	2,5	3,4	74	3,0	2,3	3,7	88	2,9	2,3	3,6
Larynx (C32.0-C32.9)	93	1,7	1,4	2,1	83	3,3	2,6	4,0	10	0,4	0,1	0,6
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	2 533	47,6	45,7	49,5	1 334	53,9	51,0	56,8	1 199	42,5	40,1	45,0
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	36	0,7	0,5	1,0	22	0,9	0,5	1,3	14	0,5	0,3	0,8
Os et articulations (C40.0-C41.9)	32	0,7	0,5	1,0	19	0,8	0,5	1,2	13	0,6	0,3	0,9
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	122	2,5	2,0	2,9	63	2,7	2,0	3,4	59	2,2	1,6	2,8
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	662	13,0	12,0	14,1	348	14,2	12,7	15,7	314	12,0	10,7	13,4
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	42	0,8	0,5	1,0	24	1,0	0,6	1,4	18	0,5	0,3	0,8
Sein (C50.0-C50.9)	2 583	48,4	46,5	50,3	12	0,5	0,2	0,7	2 571	93,0	89,3	96,7
Col utérin (C53.0-C53.9)	144	3,0	2,5	3,6	144	6,0	5,0	7,0
Corps utérin (C54.0-C54.9)	516	9,8	9,0	10,7	516	19,1	17,4	20,8
Utérus, sans autre indication (C55.9)	9	0,1	0,0	0,2	9	0,3	0,1	0,4
Ovaire (C56.9)	306	5,8	5,1	6,4	306	11,1	9,8	12,4
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	70	1,2	0,9	1,5	70	2,3	1,8	2,9
Prostate (C61.9)	2 647	50,9	48,9	52,8	2 647	108,1	103,9	112,2
Testicule (C62.0-C62.9)	125	3,2	2,7	3,8	125	6,5	5,3	7,7
Verge (C60.0-C60.9)	16	0,3	0,2	0,5	16	0,7	0,3	1,0
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	857	15,8	14,7	16,8	660	26,7	24,7	28,8	197	6,7	5,7	7,7
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	362	6,9	6,2	7,6	223	9,1	7,9	10,3	139	4,9	4,0	5,7
Uretere (C66.9)	22	0,4	0,2	0,6	13	0,5	0,2	0,8	9	0,3	0,1	0,5
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	38	0,8	0,5	1,1	23	1,0	0,6	1,4	15	0,7	0,3	1,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	259	5,2	4,6	5,9	155	6,5	5,4	7,5	104	4,1	3,3	4,9
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	229	5,0	4,4	5,7	62	2,7	2,0	3,4	167	7,3	6,2	8,5
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	19	0,4	0,2	0,7	11	0,5	0,2	0,9	8	0,4	0,1	0,6

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-11 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie — Colombie-Britannique¹

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	102	2,4	1,9	2,8	55	2,5	1,8	3,1	47	2,3	1,6	3,0
Lymphomes non hodgkiniens	853	16,4	15,3	17,5	487	20,0	18,2	21,8	366	13,2	11,8	14,6
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	209	3,9	3,3	4,4	126	5,1	4,2	6,0	83	2,9	2,3	3,6
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	39	1,0	0,7	1,4	21	1,1	0,6	1,6	18	1,0	0,5	1,5
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	192	3,5	3,0	4,0	120	4,7	3,9	5,6	72	2,5	1,9	3,1
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	103	2,1	1,6	2,5	61	2,5	1,9	3,2	42	1,6	1,1	2,2
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	48	0,9	0,7	1,2	23	1,0	0,6	1,4	25	0,9	0,5	1,2
Autres leucémies	63	1,2	0,9	1,5	38	1,5	1,0	2,0	25	0,9	0,5	1,3
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	804	14,7	13,6	15,7	426	17,1	15,4	18,7	378	12,9	11,5	14,2
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	63	1,2	0,9	1,4	52	2,1	1,5	2,7	11	0,4	0,2	0,6
Sarcome de Kaposi (M-9140)	18	0,4	0,2	0,6	18	0,8	0,4	1,2	0	0,0	0,0	0,0
2004												
Total, tous les sièges primaires de cancer	18 269	354,9	349,6	360,1	9 602	402,5	394,4	410,7	8 667	317,0	310,1	323,8
Lèvre (C00.0-C00.9)	20	0,4	0,2	0,6	11	0,5	0,2	0,8	9	0,3	0,1	0,5
Langue (C01.9-C02.9)	92	1,8	1,4	2,2	59	2,4	1,8	3,0	33	1,3	0,8	1,7
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	37	0,7	0,5	0,9	26	1,1	0,6	1,5	11	0,4	0,2	0,7
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	26	1,1	0,7	1,5	x	x	x	x
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	53	1,0	0,7	1,3	32	1,3	0,9	1,8	21	0,7	0,4	1,1
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	41	0,8	0,6	1,1	24	0,9	0,6	1,3	17	0,7	0,4	1,0
Oropharynx (C10.0-C10.9)	25	0,5	0,3	0,7	18	0,7	0,4	1,1	7	0,3	0,1	0,4
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	30	0,6	0,4	0,8	24	1,0	0,6	1,4	6	0,2	0,0	0,3
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	71	1,4	1,0	1,7	51	2,0	1,4	2,5	20	0,8	0,4	1,1
Oesophage (C15.0-C15.9)	230	4,4	3,8	4,9	166	6,9	5,8	7,9	64	2,1	1,6	2,6
Estomac (C16.0-C16.9)	352	6,6	5,9	7,4	234	9,6	8,4	10,9	118	4,0	3,3	4,8
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	60	1,1	0,9	1,4	36	1,5	1,0	2,0	24	0,8	0,5	1,2
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	1 514	28,5	27,0	29,9	752	31,2	29,0	33,5	762	26,1	24,2	28,1
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	803	15,6	14,5	16,6	524	21,7	19,8	23,6	279	10,1	8,9	11,4
Anus (C21.0-C21.8)	78	1,5	1,1	1,8	32	1,3	0,8	1,7	46	1,6	1,2	2,1
Foie (C22.0)	190	3,6	3,1	4,1	142	5,7	4,7	6,6	48	1,8	1,3	2,3
Vésicule biliaire (C23.9)	54	1,0	0,7	1,2	17	0,7	0,4	1,0	37	1,2	0,8	1,6
Pancréas (C25.0-C25.9)	483	9,1	8,3	10,0	236	9,8	8,5	11,1	247	8,4	7,3	9,5
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	186	3,5	3,0	4,0	77	3,2	2,5	3,9	109	3,9	3,1	4,6
Larynx (C32.0-C32.9)	108	2,1	1,7	2,5	89	3,6	2,8	4,3	19	0,7	0,4	1,1
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	2 615	50,4	48,4	52,3	1 388	58,2	55,1	61,3	1 227	44,5	41,9	47,0
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	51	1,0	0,7	1,3	30	1,3	0,8	1,8	21	0,8	0,4	1,1
Os et articulations (C40.0-C41.9)	31	0,7	0,4	1,0	14	0,6	0,3	1,0	17	0,8	0,4	1,1
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	86	1,8	1,4	2,2	45	2,0	1,4	2,5	41	1,6	1,1	2,1
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	663	13,3	12,2	14,3	359	15,0	13,4	16,6	304	12,0	10,6	13,4
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	59	1,2	0,9	1,5	33	1,4	0,9	1,9	26	1,0	0,6	1,4
Sein (C50.0-C50.9)	2 454	47,0	45,1	48,9	14	0,6	0,3	0,9	2 440	90,0	86,3	93,6
Col utérin (C53.0-C53.9)	140	3,1	2,5	3,6	140	6,0	5,0	7,0
Corps utérin (C54.0-C54.9)	470	9,0	8,2	9,8	470	17,4	15,8	19,0
Utérus, sans autre indication (C55.9)	6	0,1	0,0	0,2	6	0,1	0,0	0,2
Ovaire (C56.9)	265	5,1	4,5	5,7	265	9,8	8,6	11,0
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	69	1,3	1,0	1,6	69	2,4	1,8	3,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-11 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie — Colombie-Britannique¹

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
Prostate (C61.9)	2 530	49,7	47,8	51,7	2 530	105,8	101,7	110,0
Testicule (C62.0-C62.9)	104	2,6	2,1	3,1	104	5,2	4,2	6,2
Verge (C60.0-C60.9)	8	0,2	0,0	0,3	8	0,3	0,1	0,6
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	815	15,4	14,3	16,4	607	25,5	23,4	27,5	208	7,0	6,0	7,9
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	361	7,1	6,4	7,9	232	9,7	8,4	10,9	129	4,9	4,0	5,7
Uretere (C66.9)	x	x	x	x	9	0,4	0,1	0,6	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	37	0,8	0,5	1,1	18	0,8	0,4	1,1	19	0,8	0,4	1,2
Cerveau (C71.0-C71.9)	279	5,8	5,1	6,5	170	7,4	6,3	8,6	109	4,4	3,5	5,2
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	6	0,3	0,1	0,6
Thyroïde (C73.9)	229	5,2	4,5	5,8	48	2,1	1,5	2,8	181	8,1	6,9	9,3
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	26	0,6	0,3	0,8	12	0,5	0,2	0,8	14	0,6	0,3	0,9
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	105	2,6	2,1	3,1	62	3,0	2,2	3,8	43	2,1	1,4	2,7
Lymphomes non hodgkiniens	794	15,6	14,5	16,7	440	18,5	16,7	20,2	354	12,9	11,5	14,3
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	204	3,9	3,3	4,4	127	5,2	4,3	6,1	77	2,7	2,1	3,4
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	44	1,2	0,8	1,5	28	1,5	0,9	2,1	16	0,8	0,4	1,3
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	192	3,6	3,1	4,1	114	4,7	3,8	5,6	78	2,6	2,0	3,2
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	130	2,6	2,1	3,0	70	3,0	2,3	3,7	60	2,3	1,7	2,9
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	67	1,4	1,0	1,7	43	1,8	1,3	2,4	24	1,0	0,6	1,4
Autres leucémies	53	1,0	0,7	1,2	35	1,5	1,0	2,0	18	0,5	0,3	0,8
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	820	15,2	14,2	16,3	409	17,0	15,4	18,7	411	13,5	12,1	14,8
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	x	x	x	x	55	2,3	1,7	2,9	x	x	x	x
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	15	0,7	0,3	1,0	x	x	x	x

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que les tableaux CANSIM fournissent aussi les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 3-12

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie — Territoire du Yukon¹

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2005												
Total, tous les sièges primaires de cancer	98	363,4	284,5	442,2	41	345,6	230,9	460,3	57	379,5	271,1	487,8
Lèvre (C00.0-C00.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Langue (C01.9-C02.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oropharynx (C10.0-C10.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oesophage (C15.0-C15.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Estomac (C16.0-C16.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	9	69,2	20,4	118,0
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Anus (C21.0-C21.8)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Foie (C22.0)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Vésicule biliaire (C23.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Pancréas (C25.0-C25.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Larynx (C32.0-C32.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	x	x	x	x	6	46,2	6,6	85,8	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Os et articulations (C40.0-C41.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	19	120,7	60,4	181,0
Col utérin (C53.0-C53.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Corps utérin (C54.0-C54.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Utérus, sans autre indication (C55.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Ovaire (C56.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Prostate (C61.9)	13	65,1	29,1	101,2	13	131,6	55,4	207,8
Testicule (C62.0-C62.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Verge (C60.0-C60.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Urètre (C66.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oeil (C69.0-C69.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-12 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie — Territoire du Yukon¹

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Lymphomes non hodgkiniens	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres leucémies	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Sarcome de Kaposi (M-9140)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
2004												
Total, tous les sièges primaires de cancer	84	318,4	244,4	392,4	49	378,8	261,1	496,4	35	253,5	162,2	344,7
Lèvre (C00.0-C00.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Langue (C01.9-C02.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oropharynx (C10.0-C10.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Oesophage (C15.0-C15.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Estomac (C16.0-C16.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Anus (C21.0-C21.8)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Foie (C22.0)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Vésicule biliaire (C23.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Pancréas (C25.0-C25.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Larynx (C32.0-C32.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Os et articulations (C40.0-C41.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Col utérin (C53.0-C53.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Corps utérin (C54.0-C54.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Utérus, sans autre indication (C55.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Ovaire (C56.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-12 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie — Territoire du Yukon¹

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
Prostate (C61.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Testicule (C62.0-C62.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Verge (C60.0-C60.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Urètre (C66.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oeil (C69.0-C69.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Lymphomes non hodgkiniens	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres leucémies	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Sarcome de Kaposi (M-9140)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que les tableaux CANSIM fournissent aussi les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 3-13

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie — Territoires du Nord-Ouest¹

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2005												
Total, tous les sièges primaires de cancer	69	264,7	194,4	335,0	33	288,1	180,1	396,1	36	239,6	151,8	327,5
Lèvre (C00.0-C00.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Langue (C01.9-C02.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oropharynx (C10.0-C10.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oesophage (C15.0-C15.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Estomac (C16.0-C16.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	6	31,4	5,2	57,5
Anus (C21.0-C21.8)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Foie (C22.0)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Vésicule biliaire (C23.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Pancréas (C25.0-C25.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Larynx (C32.0-C32.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	x	x	x	x	7	73,4	14,8	132,0	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Os et articulations (C40.0-C41.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Sein (C50.0-C50.9)	11	34,6	11,3	58,0	0	0,0	0,0	0,0	11	70,4	23,4	117,5
Col utérin (C53.0-C53.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Corps utérin (C54.0-C54.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ovaire (C56.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Prostate (C61.9)	10	49,9	16,7	83,0	10	94,5	31,8	157,1
Testicule (C62.0-C62.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Verge (C60.0-C60.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Urètre (C66.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oeil (C69.0-C69.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-13 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie — Territoires du Nord-Ouest¹

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Lymphomes non hodgkiniens	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Autres leucémies	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
2004												
Total, tous les sièges primaires de cancer	85	339,0	258,6	419,4	44	366,7	248,5	484,9	41	305,1	197,9	412,3
Lèvre (C00.0-C00.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Langue (C01.9-C02.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oesophage (C15.0-C15.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Estomac (C16.0-C16.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	x	x	x	x	8	78,0	20,9	135,2	x	x	x	x
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Anus (C21.0-C21.8)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Foie (C22.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Vésicule biliaire (C23.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Pancréas (C25.0-C25.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Larynx (C32.0-C32.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	7	70,6	14,9	126,2
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Os et articulations (C40.0-C41.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Sein (C50.0-C50.9)	15	41,4	16,7	66,2	0	0,0	0,0	0,0	15	86,4	35,7	137,1
Col utérin (C53.0-C53.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Corps utérin (C54.0-C54.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Utérus, sans autre indication (C55.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Ovaire (C56.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-13 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie — Territoires du Nord-Ouest¹

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
Prostate (C61.9)	9	47,2	15,4	79,0	9	89,0	28,7	149,3
Testicule (C62.0-C62.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Verge (C60.0-C60.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Urètre (C66.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oeil (C69.0-C69.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Lymphomes non hodgkiniens	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres leucémies	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Sarcome de Kaposi (M-9140)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que les tableaux CANSIM fournissent aussi les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 3-14

 Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie — Nunavut¹

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
2005												
Total, tous les sièges primaires de cancer	70	662,1	473,4	850,8	36	665,2	418,8	911,6	34	648,9	361,0	936,8
Lèvre (C00.0-C00.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Langue (C01.9-C02.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oesophage (C15.0-C15.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Estomac (C16.0-C16.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	x	x	x	x	6	100,7	9,1	192,4	x	x	x	x
Anus (C21.0-C21.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Foie (C22.0)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Vésicule biliaire (C23.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Pancréas (C25.0-C25.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Larynx (C32.0-C32.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	21	246,5	129,3	363,7	13	265,2	113,8	416,6	8	227,5	31,1	423,8
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Os et articulations (C40.0-C41.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Sein (C50.0-C50.9)	10	60,0	18,1	101,9	0	0,0	0,0	0,0	10	135,4	36,0	234,8
Col utérin (C53.0-C53.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Corps utérin (C54.0-C54.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Utérus, sans autre indication (C55.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Ovaire (C56.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Prostate (C61.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Testicule (C62.0-C62.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Verge (C60.0-C60.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Urètre (C66.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oeil (C69.0-C69.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Lymphomes non hodgkiniens	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-14 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie — Nunavut¹

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres leucémies	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
2004												
Total, tous les sièges primaires de cancer	48	352,7	227,8	477,7	25	347,2	184,5	509,9	23	374,4	178,4	570,3
Lèvre (C00.0-C00.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Langue (C01.9-C02.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oesophage (C15.0-C15.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Estomac (C16.0-C16.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Anus (C21.0-C21.8)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Foie (C22.0)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Vésicule biliaire (C23.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Pancréas (C25.0-C25.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Larynx (C32.0-C32.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	x	x	x	x	8	157,3	35,3	279,3	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Col utérin (C53.0-C53.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Corps utérin (C54.0-C54.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Utérus, sans autre indication (C55.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Ovaire (C56.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Prostate (C61.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Testicule (C62.0-C62.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Verge (C60.0-C60.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 3-14 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juin 2007), selon le sexe, structure démographique du Recensement de 1991, selon la géographie — Nunavut¹

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Nombre	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Urètre (C66.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oeil (C69.0-C69.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Lymphomes non hodgkiniens	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres leucémies	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Sarcome de Kaposi (M-9140)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0

1. Les données pour 2005 ne sont pas disponibles pour le Canada et Québec.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que les tableaux CANSIM fournissent aussi les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juin 2007) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Registre canadien du cancer (RCC)

Aperçu de l'enquête

Le Registre canadien du cancer (RCC) est une enquête administrative conçue pour recueillir des données sur l'incidence du cancer au Canada.

Le RCC est le fruit d'une collaboration entre les treize registres provinciaux et territoriaux du cancer du Canada et de la Division de la statistique de la santé de Statistique Canada, où les données sont entreposées. L'autorité et la responsabilité finales en ce qui a trait à la complétude et à la qualité des données incombent aux provinces et territoires. Les registres provinciaux et territoriaux du cancer transmettent au RCC toutes les données qu'ils recueillent pour les cas de cancer diagnostiqués depuis 1992. Les données transmises décrivent la personne atteinte du cancer ainsi que les caractéristiques de la tumeur.

L'objectif du RCC est avant tout de créer une grande base de données permettant d'observer les profils et les tendances du cancer et d'étudier les variations du risque de cancer chez diverses populations. Les données sur l'incidence du cancer et sur la survie au cancer au Canada sont produites par le RCC. Elles servent à la réalisation d'études épidémiologiques descriptives et analytiques ayant pour but de déterminer les facteurs de risque de cancer, de planifier, surveiller et évaluer une gamme variée de programmes de lutte contre le cancer (par exemple, dépistage) et d'effectuer des recherches dans les domaines des services de santé et de l'économie de la santé.

Le RCC est une base de données dynamique, tenue à jour par Statistique Canada, sur tous les résidents du Canada en vie ou décédés chez lesquels on a diagnostiqué un cancer. Sa fonction est de produire des données normalisées et comparables sur l'incidence du cancer et des statistiques sur la survie pour chaque siège primaire de tumeur. Le RCC est un système axé sur la personne, conçu pour enregistrer le type et le nombre (incidence) de tumeurs primaires diagnostiquées chez une personne pendant un certain nombre d'années jusqu'au décès. L'avantage de ce système est qu'il fournit des données longitudinales pour chaque personne atteinte d'un cancer. Il permet de repérer les nouvelles tumeurs primaires qui se manifestent chez des patients déjà atteints d'un cancer. Les données sur les patients sont couplées régulièrement aux données sur la mortalité de sorte qu'on connaisse, en dernière analyse, la date et la cause du décès de tous les patients enregistrés dans la base de données.

En plus de l'information sur l'incidence du cancer, le RCC contient des données sur les caractéristiques des patients atteints d'une tumeur unique ou de tumeurs multiples, ainsi que sur la nature et la fréquence de ces tumeurs. Puisque les enregistrements patient demeurent actifs dans le RCC jusqu'à la confirmation du décès, il est possible de calculer des taux de survie aux diverses formes de cancer. En outre, le RCC a la capacité de repérer et d'éliminer les tumeurs déclarées en double.

Le RCC emploie aussi un logiciel spécialisé de couplage interne des enregistrements pour dépister les enregistrements en double et pour procéder à la confirmation des décès. Ces procédures sont exécutées annuellement. Les questions concernant les renseignements contradictoires et d'autres problèmes de données découverts lors de ces traitements annuels sont résolus en consultation avec les provinces et les territoires déclarants.

Le Registre canadien du cancer (RCC), qui est une base de données axée sur le patient, émane du Système national de déclaration des cas de cancer (SNDCC), qui étaient une base de données axée sur l'événement, c'est-à-dire la manifestation d'une tumeur.

Le SNDCC a été créé en 1969 par Statistique Canada en collaboration avec l'Institut national du cancer du Canada et neuf des dix registres provinciaux du cancer existants.

Le dixième registre, celui de l'Ontario, s'est joint au système national en 1981.

À partir de l'année de référence 1992, Statistique Canada a remplacé le SNDCC par le RCC qui est devenu l'instrument utilisé pour recueillir l'information sur le cancer au Canada.

Aujourd'hui, tous les registres provinciaux et territoriaux du cancer transmettent leurs données au RCC.

Nota : Les données du RCC sont utilisées par l'Agence de santé publique du Canada et par Santé Canada, la North American Association of Central Cancer Registries (NAACCR), l'Institut national du cancer du Canada, la Société canadienne du cancer, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), les ministres provinciaux et territoriaux de la Santé, les sociétés pharmaceutiques, les spécialistes de la recherche médicale et de la recherche dans le domaine de la santé, ainsi que le grand public.

Sources de données et méthodologie

Population cible

L'univers conceptuel de la base de données du Registre canadien du cancer comprend les personnes dont le lieu de résidence habituel est le Canada ou qui sont des résidents non permanents au Canada. La résidence au moment du diagnostic est généralement le lieu de résidence habituel, tel que déclaré par le patient ou, tel que déclaré par le Bureau du recensement, « le logement au Canada où une personne habite la plupart du temps ». La résidence est leur lieu d'habitation habituel, peu importe où ils se trouvent lors de leur diagnostic. Pour les patients avec des tumeurs multiples, l'adresse peut être différente pour chaque tumeur primaire.

Échantillonnage

Il s'agit d'un recensement.

Aucun échantillonnage n'est fait, les données étant recueillies pour toutes les unités de la population cible.

Sources des données

Les données sont tirées de fichiers administratifs.

Le Registre canadien du cancer (RCC) contient des données administratives. Chaque registre provincial ou territorial du cancer fournit des données sur les personnes atteintes d'un cancer (patients) et sur les tumeurs dans un format normalisé, pré-vérifié, sur disquette ou sur disque compact. Chaque année, environ 145 000 nouveaux enregistrements de tumeur sont chargés dans la base de données axée sur les patients du RCC qui est installé et tenu à jour à Statistique Canada. Les modifications subséquentes qu'il convient d'apporter aux enregistrements en raison d'erreurs ou d'omissions sont également communiquées à Statistique Canada aussitôt que l'information est disponible. Les enregistrements sont chargés dans la base de données du RCC et ceux rejetés à la vérification pour s'assurer de la validité de chaque zone de données et pour confirmer la compatibilité des divers éléments de données d'un enregistrement particulier sont retournés aux registres provinciaux ou territoriaux déclarants pour vérification ou correction. Chaque registre provincial ou territorial du cancer a la capacité d'ajouter, de mettre à jour, de supprimer ou de modifier la propriété (par une province ou un territoire) des enregistrements. Le RCC peut être mis à jour au moyen d'enregistrements de nouveaux cas ou de modifications apportées aux enregistrements antérieurs dans le cadre des envois ordinaires d'enregistrement à Statistique Canada. Les trois modules suivants du système logiciel exécutent les tâches de création et de tenue à jour des données dans la base de données du RCC : le module de validation de base, le module de couplage interne des enregistrements et le module de confirmation des décès. Chaque année, le module de couplage interne des enregistrements et le module de confirmation nationale des décès sont exécutés sur l'ensemble des enregistrements couvrant les cas diagnostiqués depuis 1992.

- Le Conseil canadien des registres du cancer (CCRC) recommande que les tumeurs suivantes soient déclarées au RCC;

- Toutes les tumeurs primaires, malignes (CIM-O-3, codes de topographie C00.0-C80.9) avec des codes de comportement de 3 à l'exception des carcinomes spinocellulaires (CIM-O-3, codes de morphologie 805_-808_) et des carcinomes basocellulaires (CIM-O-3, codes de morphologie 809_-811_ avec des topographies C44.0-C44.9);
- Les carcinomes in situ/intraépithéliaux/non infiltrants/non invasifs (tous les codes de topographie de la CIM-O-3 avec code de comportement de 2, sauf les tumeurs in situ du col utérin (C53.0 à C53-9) ou les néoplasies intraépithéliales du col (CIN III) à cause d'un manque d'uniformité des règles de collecte et de déclaration);
- Tumeurs primaires, bénignes du cerveau et du système nerveux central (topographies C70.0-C72.9 avec des codes de comportement de 0 de la CIM-O-3); et,
- À la limite de la malignité (toutes les topographies de la CIM-O-3 avec des codes de comportement de 1).

Des renseignements détaillés concernant la soumission des données sont disponibles dans le Guide du système du Registre canadien du cancer.

Détection des erreurs

Chaque registre provincial ou territorial du cancer fournit au Registre canadien du cancer (RCC) des renseignements sur chaque nouveau patient et chaque nouvelle tumeur dans un format normalisé, pré-vérifié, sur bande magnétique ou sur disquette. Les contrôles de validation visent à confirmer que les zones contiennent des données d'entrée valides et les contrôles de cohésion, que les relations entre les données des enregistrements patient et tumeur sont logiques. Les enregistrements rejetés à la vérification sont retournés aux registres provinciaux et territoriaux déclarants pour vérification ou correction. Les enregistrements transmis régulièrement par les registres à Statistique Canada pour la mise à jour du RCC peuvent contenir de nouveaux enregistrements ou des enregistrements transmis antérieurement modifiés. Les données sont vérifiées par ordinateur pour s'assurer de la validité de chaque zone et pour confirmer la compatibilité des divers éléments de données à l'intérieur d'un enregistrement. Annuellement, Statistique Canada exécute le module de couplage interne des enregistrements et le module de confirmation nationale des décès sur les enregistrements couvrant les cas diagnostiqués depuis 1992. Bien que le RCC soit une application basée sur des données administratives, les vérifications exécutées par Statistique Canada assurent la cohérence des vérifications faites par les registres provinciaux et territoriaux du cancer.

Imputation

Statistique Canada n'impute pas des données manquantes.

Évaluation de la qualité

Au moyen du module de validation de base du RCC, Statistique Canada produit un rapport sur la qualité des données du Registre canadien du cancer (RCC) qui fournit aux registres provinciaux et territoriaux du cancer des renseignements rétroactifs détaillés sur la qualité des données transmises chaque année. Le rapport contient des indicateurs de qualité des données, exprimés en pourcentage, pour tous les enregistrements de tumeur invasive transmis durant une année de référence particulière, y compris le nombre de tumeurs du sein et le nombre de décès déclarés chaque année, et donne le pourcentage de valeurs manquantes pour l'ensemble d'enregistrements de tumeur invasive et pour l'ensemble des enregistrements patient, ainsi que le nombre de décès déclarés chaque année.

Les rapports sur la qualité des données du RCC sont utilisés par les registres provinciaux et territoriaux du cancer pour surveiller la qualité de l'information leur appartenant dans la base de données du RCC. Ainsi, ils peuvent repérer des erreurs éventuelles dans des situations où l'information fournie satisfait à toutes les règles de

vérification, mais manque de complétude ou d'exactitude. Le respect de ces lignes directrices aide les registres provinciaux et territoriaux du cancer à se conformer aux normes d'acceptation des données établies par des publications internationales comme *Cancer Incidence in Five Continents* et *Cancer Incidence in North America*.

Avant que la publication des statistiques sur le cancer soit annoncée dans *Le Quotidien*, tous les registres provinciaux et territoriaux du cancer examinent les fichiers de données destinés à la publication afin d'en approuver la diffusion officielle.

Contrôle de la divulgation

La loi interdit à Statistique Canada de rendre publique toute donnée susceptible de révéler des renseignements recueillis en vertu de la Loi sur la statistique au sujet d'une personne, d'une entreprise ou d'un organisme reconnaissable sans que cette personne, cette entreprise ou cet organisme le sache ou y consente par écrit. Diverses règles de protection du secret statistique sont appliquées à toutes les données diffusées ou publiées, afin d'empêcher la publication ou la divulgation de toute information jugée confidentielle. Au besoin, des données sont supprimées pour empêcher la divulgation directe ou par recoupement de données reconnaissables.

Pour accroître l'intégrité globale des données sur le cancer qui sont publiées, Statistique Canada a conçu le programme de suppression Merrigan pour éliminer les cellules ne contenant qu'un petit nombre de cas dans les données sur le cancer. Le programme supprime les cellules dont le nombre de cas est faible, ainsi que toute cellule susceptible de donner lieu à la divulgation d'une cellule supprimée antérieurement d'après le total de colonne ou de ligne. Si les variables qui définissent les lignes et les colonnes sont la province ou le territoire et le groupe d'âge, le programme commence par supprimer les cellules où le nombre de cas est faible dans chaque province ou territoire. S'il n'est supprimé qu'une seule cellule pour une province ou un territoire, le programme supprime la cellule contenant le nombre le plus faible suivant pour cette province ou ce territoire. Puis, il fait la même chose pour chaque groupe d'âge.

Exactitude des données

Couverture

Puisque chaque province et territoire du Canada est doté d'une loi sur le cancer l'obligeant à recueillir et à vérifier les données sur le cancer, la déclaration est virtuellement complète. Toutes les tumeurs primaires malignes (sauf l'épithélioma spinocellulaire et l'épithélioma basocellulaire de la peau) sont déclarées au Registre canadien du cancer (RCC). Chaque registre provincial ou territorial du cancer enregistre tous les cas de cancer survenus dans la population de sa province ou de son territoire en combinant l'information provenant de diverses sources, comme les dossiers des centres de traitement anticancéreux et les rapports de radiothérapie, les dossiers médicaux d'hospitalisation, les dossiers médicaux des services de consultations externes et des hôpitaux privés, les rapports d'anatomopathologie et d'autres rapports de laboratoire ou d'autopsie, les rapports de radiologie et de programmes de dépistage, les rapports des médecins exerçant dans le privé et les certificats de décès par cancer émis par les bureaux de la statistique de l'état civil. Périodiquement, certains registres provinciaux et territoriaux du cancer ont de la difficulté à transmettre leurs données à Statistique Canada dans les délais prévus.

Pour éviter le surdénombrement des cas, le RCC n'accepte les enregistrements tumeur que si le registre provincial ou territorial déclarant est le même que celui mentionné dans l'enregistrement patient qui correspond à l'enregistrement tumeur. Chaque registre provincial ou territorial du cancer est tenu de retourner les enregistrements qu'il a établis pour des résidents d'une autre province ou d'un autre territoire au registre provincial ou territorial pertinent. Le sous dénombrement demeure un problème plus préoccupant que le surdénombrement pour plusieurs raisons : certains registres provinciaux et territoriaux du cancer n'utilisent pas, ou n'ont pas utilisé durant certaines périodes par le passé, les certificats de décès comme source de données sur l'incidence du cancer; la définition d'un cancer ou d'une tumeur maligne peut varier selon le registre du cancer déclarant; certains cancers sont difficiles à diagnostiquer à cause de leur emplacement (ou siège) dans l'organisme; les méthodes de codage, de saisie et de traitement des données ne sont pas les mêmes pour tous les registres; enfin, certains

registres omettent de déclarer les cas de cancer traités dans une province/un territoire/un pays autre que la province ou le territoire de résidence.

Des études ont été conçues pour permettre aux registres provinciaux et territoriaux du cancer d'évaluer la complétude de la détermination des cas (c'est à dire déterminer s'il y a sous ou surdénombrement). Les registres procèdent à la réextraction des données pour évaluer l'exactitude et la complétude des éléments de données déclarés.

Notes explicatives pour les tableaux

Tableau 1 Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC d'août 2006)

L'incidence du cancer se rapporte aux nouveaux sièges primaires des tumeurs malignes. L'incidence du cancer peut varier d'une diffusion à l'autre en raison du caractère dynamique de la base de données du Registre canadien du cancer (RCC) qui peut être mise à jour par l'ajout d'enregistrements ou par la modification d'enregistrements existants.

L'intervalle de confiance (IC) de 95 % témoigne du degré de variabilité d'un taux. La variabilité des taux présentés est d'autant plus forte que l'intervalle de confiance est grand; aussi faut-il interpréter et comparer ces taux avec prudence.

Tableau 2 Personnes diagnostiquées avec une tumeur primaire invasive pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC d'août 2006)

L'incidence du cancer se rapporte aux nouveaux sièges primaires des tumeurs malignes. L'incidence du cancer peut varier d'une diffusion à l'autre en raison du caractère dynamique de la base de données du Registre canadien du cancer (RCC) qui peut être mise à jour par l'ajout d'enregistrements ou par la modification d'enregistrements existants.

L'intervalle de confiance (IC) de 95 % témoigne du degré de variabilité d'un taux. La variabilité des taux présentés est d'autant plus forte que l'intervalle de confiance est grand; aussi faut-il interpréter et comparer ces taux avec prudence.

Tableau 3 Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC d'août 2006)

Organisation mondiale de la santé, Classification internationale des maladies, Troisième édition (CIM-O-3) et les règles du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) pour déterminer les sièges primaires multiples.

L'incidence du cancer se rapporte aux nouveaux sièges primaires des tumeurs malignes. L'incidence du cancer peut varier d'une diffusion à l'autre en raison du caractère dynamique de la base de données du Registre canadien du cancer (RCC) qui peut être mise à jour par l'ajout d'enregistrements ou par la modification d'enregistrements existants.

Le tableau a été préparé en se servant des groupes du Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) pour les sièges primaires selon la Classification internationale des maladies, Troisième édition (CIM-O-3). Tous les sièges invasifs et in situ pour la vessie sont compris.

À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.

Le Comité de la qualité des données du Conseil canadien des registres du cancer (CCRC) a demandé que les types morphologiques M-8000 à M-8004 et M-8010 à M-8045 soient inclus dans « Autres localisations de la peau » (C44.0 à C44.9).

Les taux d'incidence du cancer sont normalisés selon l'âge par la méthode directe en prenant pour référence la structure par âge de la population qui prévalait lors du Recensement de la population du Canada de 1991.

Les intervalles de confiance associés aux taux normalisés selon l'âge de l'incidence du cancer ont été calculés selon la méthode de Spiegelman, dont voici la référence : M. Spiegelman, « Introduction to Demography », Revised edition, Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 1968, page 113, formule 4.29.

L'intervalle de confiance (IC) de 95 % témoigne du degré de variabilité d'un taux. La variabilité des taux présentés est d'autant plus forte que l'intervalle de confiance est grand; aussi faut-il interpréter et comparer ces taux avec prudence.

Appendice I

Sièges de cancer

Liste des sièges de cancer diagnostiqués au Canada, noms et codes de la Classification internationale des maladies, Troisième édition (CIM-O-3)¹

Sièges primaires	Codes de la CIM-O-3
Lèvre	C00.0 à C00.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Langue	C01.9 à C02.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Glandes salivaires principales	C07.9 à C08.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Plancher de la bouche	C04.0 à C04.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Gencive et autres localisations de la bouche	C03.0 à C03.9, C05.0 à C05.9, C06.0 à C06.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Nasopharynx	C11.0 à C11.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Oropharynx	C10.0 à C10.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Hypopharynx	C12.9, C13.0 à C13.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx	C09.0 à C09.9, C14.0, C14.2 à C14.8 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Oesophage	C15.0 à C15.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Estomac	C16.0 à C16.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Intestin grêle	C17.0 à C17.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Côlon à l'exclusion du rectum	C18.0 à C18.9, C26.0 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)

1. **Source :** Organisation mondiale de la santé, *Classification internationale des maladies pour l'oncologie, Troisième édition (CIM-O-3) et Surveillance, Epidemiology, and End Results Program (SEER)*.

Rectum et recto-sigmoïde	C19.9, C20.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Anus	C21.0 à C21.2, C21.8 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Foie	C22.0 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Vésicule biliaire	C23.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Pancréas	C25.0 à C25.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Autres localisations de l'appareil digestif	C22.1, C24.0 à C24.9, C26.8 à C26.9, C48.0, C48.1 à C48.2, C48.8 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Larynx	C32.0 à C32.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Poumon et bronche	C34.0 à C34.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Autres localisations de l'appareil respiratoire	C30.0 à C30.1, C31.0 à C31.9, C33.9, C38.1 à C38.3, C38.4, C38.8, C39.0, C39.8, C39.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Os et articulations	C40.0 à C41.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Tissus mous (y compris le coeur)	C38.0, C47.0 à C47.9, C49.0 à C49.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Mélanomes de la peau	C44.0 à C44.9, M-8720 à M-8790
Autres localisations de la peau	C44.0 à C44.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-8050 à M-8084, M-8090 à M-8110, M-8720 à M-8790, M-9050 à M-9055, M-9140, M-9590 à M-9989.)
Sein	C50.0 à C50.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Col utérin	C53.0 à C53.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Corps utérin	C54.0 à C54.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Utérus, sans autre indication	C55.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)

Ovaire	C56.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Autres organes génitaux féminins	C51.0 à C51.9, C52.9, C57.0 à -C58.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Prostate	C61.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Testicule	C62.0 à C62.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Verge	C60.0 à C60.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Autres organes génitaux masculins	C63.0 à C63.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Vessie (y compris in situ)	C67.0 à C67.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Rein et bassinnet du rein	C64.9, C65.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Urètre	C66.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Autres localisations de l'appareil urinaire	C68.0 à C68.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Oeil	C69.0 à C69.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Cerveau	C71.0 à C71.9 (Excluding morphology types M-9530 à M-9539, M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.))
Autres localisations du système nerveux	C71.0 à C71.9, M-9530 à M-9539; C70.0 à C70.9, C72.0 à C72.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Thyroïde	C73.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Autre endocrine	C37.9, C74.0 à C74.9, C75.0 à C75.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Maladie de Hodgkin	M-9650 à M-9667
Lymphomes non hodgkiniens	M-9590 à M-9596, M-9670 à M-9719, M-9727 à M-9729; M-9823, tous les sièges sauf C42.0, C42.1, C42.4; M-9827, tous les sièges sauf C42.0, C42.1, C42.4
Myélome multiple	M-9731, M-9732, M-9734

Leucémie lymphocytaire aiguë	M-9826, M-9835 à M-9837
Leucémie lymphocytaire chronique	C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823
Leucémie myéloïde aiguë	M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871 à M-9874, M-9895 à M-9897, M-9910, M-9920
Leucémie myéloïde chronique	M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946
Autres leucémies	M-9733, M-9742, M-9800, M-9801, M-9805, M-9820, M-9831, M-9832 à M-9834, M-9860, M-9870, M-9891, M-9930, M-9931, M-9940, M-9948, M-9963, M-9964; C42.0, M-9827; C42.1, M-9827; C42.4, M-9827
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	C42.0 à C42.4, M-8000 à M-9049, M-9056 à M-9139, M-9141 à M-9589; C76.0 à C76.8, M-8000 à M-9049, M-9056 à M-9139, M-9141 à M-9589; C77.0 à C77.9, M-8000 à M-9049, M-9056 à M-9139, M-9141 à M-9589; C80.9, M-8000 à M-9049, M-9056 à M-9139, M-9141 à M-9589; M-9740, M-9741, M-9750 à M-9758, M-9760 à M-9769, M-9950 à M-9962, M-9970 à M-9989
Mésothéliome	M-9050 à M-9055
Sarcome de Kaposi	M-9140