


N° 82-231-X au catalogue

Incidence du cancer au Canada

2005 et 2006, Deuxième édition



Statistique
Canada

Statistics
Canada

Canada

Comment obtenir d'autres renseignements

Toute demande de renseignements au sujet du présent produit ou au sujet de statistiques ou de services connexes doit être adressée à : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 (téléphone : 1 800 263-1136; 613 951-1746 (*hd-ds@statcan.gc.ca*)).

Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l'ensemble des données et des services de Statistique Canada, visiter notre site Web à *www.statcan.gc.ca*. Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel à *infostats@statcan.gc.ca* ou par téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros suivants :

Centre de contact national de Statistique Canada

Numéros sans frais (Canada et États-Unis) :

Service de renseignements	1-800-263-1136
Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants	1-800-363-7629
Télécopieur	1-877-287-4369

Appels locaux ou internationaux :

Service de renseignements	1-613-951-8116
Télécopieur	1-613-951-0581

Programme des services de dépôt

Service de renseignements	1-800-635-7943
Télécopieur	1-800-565-7757

Comment accéder à ce produit

Le produit n° 82-231-X au catalogue est disponible gratuitement sous format électronique. Pour obtenir un exemplaire, il suffit de visiter notre site Web à *www.statcan.gc.ca* et de choisir la rubrique « Publications ».

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s'est doté de *normes de service à la clientèle* que les employés observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi publiées sur le site *www.statcan.gc.ca* sous « À propos de nous » > « Offrir des services aux Canadiens ».

Incidence du cancer au Canada

2005 et 2006, Deuxième édition

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2009

Tous droits réservés. Le contenu de la présente publication électronique peut être reproduit en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, sans autre permission de Statistique Canada, sous réserve que la reproduction soit effectuée uniquement à des fins d'étude privée, de recherche, de critique, de compte rendu ou en vue d'en préparer un résumé destiné aux journaux et/ou à des fins non commerciales. Statistique Canada doit être cité comme suit : Source (ou « Adapté de », s'il y a lieu) : Statistique Canada, année de publication, nom du produit, numéro au catalogue, volume et numéro, période de référence et page(s). Autrement, il est interdit de reproduire le contenu de la présente publication, ou de l'emmagasiner dans un système d'extraction, ou de le transmettre sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, reproduction électronique, mécanique, photographique, pour quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable des Services d'octroi de licences, Division des services à la clientèle, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Juillet 2009

N° 82-231-X au catalogue

ISSN 1715-8176

Périodicité : annuelle

Ottawa

This publication is also available in English.

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

Information pour l'utilisateur

Signes conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada :

- . indisponible pour toute période de référence
- .. indisponible pour une période de référence précise
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- 0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
- 0^s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie
- p provisoire
- r révisé
- x confidentiel en vertu des dispositions de la *Loi sur la statistique*
- E à utiliser avec prudence
- F trop peu fiable pour être publié

Remerciements

Les données du Registre canadien du cancer utilisées dans la préparation des tableaux sur l'incidence du cancer ont été fournies à Statistique Canada par les registres provinciaux et territoriaux du cancer. Nous les remercions vivement de leur coopération.

Table des matières

Faits saillants	5
Aperçu du Registre canadien du cancer	6
Buts	6
Couverture	7
Produits connexes	8
Tableaux statistiques	
1 Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie	10
1-1 Canada	10
1-2 Terre-Neuve-et-Labrador	11
1-3 Île-du-Prince-Édouard	12
1-4 Nouvelle-Écosse	13
1-5 Nouveau-Brunswick	14
1-6 Québec	15
1-7 Ontario	16
1-8 Manitoba	17
1-9 Saskatchewan	18
1-10 Alberta	19
1-11 Colombie-Britannique	20
1-12 Yukon	21
1-13 Territoires du Nord-Ouest	22
1-14 Nunavut	23
2 Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie	24
2-1 Canada	24
2-2 Terre-Neuve-et-Labrador	27
2-3 Île-du-Prince-Édouard	30
2-4 Nouvelle-Écosse	33
2-5 Nouveau-Brunswick	36
2-6 Québec	39
2-7 Ontario	42

Table des matières – suite

2-8	Manitoba	45
2-9	Saskatchewan	48
2-10	Alberta	51
2-11	Colombie-Britannique	54
2-12	Yukon	57
2-13	Territoires du Nord-Ouest	60
2-14	Nunavut	63

Qualité des données, concepts et méthodologie

Notes explicatives pour les tableaux	66
--------------------------------------	----

Appendice

I Sièges de cancer	68
--------------------	----

Faits saillants

Les tableaux dans cette publication présentent des données sur l'incidence du cancer pour les cas diagnostiqués en 2005 et en 2006 au Canada, dans les provinces et les territoires. Les tableaux contiennent des données mises à jour (tirées du fichier de totalisations du RCC de juillet 2009) et cette publication remplace la précédente parue en août 2008 (qui était fondée sur le fichier de totalisations du RCC de juillet 2008). Les données sur l'incidence du cancer de 1992 à 2006 sont disponibles sur CANSIM. Les tendances relatives à l'incidence du cancer et les estimations pour l'an 2009 basées sur ces données ont été diffusées en avril 2009 par la Société canadienne du cancer dans la monographie Statistique canadiennes sur le cancer.

Aperçu du Registre canadien du cancer

Le Registre canadien du cancer, qui est une base de données axée sur le patient, émane du Système national de déclaration des cas de cancer établi en 1969. Le Registre canadien du cancer est une enquête administrative. Les registres provinciaux et territoriaux du cancer transmettent au Registre canadien du cancer toutes les données qu'ils recueillent pour les cas de cancer diagnostiqués depuis 1992. Le Registre canadien du cancer a été élaboré afin de produire l'information requise sur l'incidence et le taux de survie au Canada, aux fins de la lutte contre le cancer. Le Registre canadien du cancer correspond à une banque de données personnelles qui figure dans la publication annuelle Info Source à Sources de renseignements fédéraux.

Le Registre canadien du cancer est le fruit d'une collaboration entre les treize registres provinciaux et territoriaux du cancer du Canada et de la Division de la statistique de la santé de Statistique Canada où les données sont entreposées. Les données transmises décrivent la personne atteinte du cancer ainsi que les caractéristiques de la tumeur. Le Conseil canadien des registres du cancer collabore avec les registres du cancer afin d'établir des normes nationales. L'autorité et la responsabilité finales en ce qui a trait à la complétude et à la qualité des données incombent aux provinces et territoires.

Le Registre canadien du cancer est une base de données dynamique sur tous les résidents du Canada en vie ou décédés chez lesquels on a diagnostiqué un cancer. Sa fonction est de produire des données normalisées et comparables sur l'incidence du cancer pour chaque siège primaire de tumeur. Le Registre canadien du cancer est un système axé sur la personne, conçu pour enregistrer le type et le nombre (incidence) de tumeurs primaires diagnostiquées chez une personne pendant un certain nombre d'années jusqu'au décès. L'avantage de ce système est qu'il fournit des données longitudinales pour chaque personne atteinte d'un cancer. Il permet de repérer les nouvelles tumeurs primaires qui se manifestent chez des patients déjà atteints d'un cancer. Les données sur les patients sont couplées régulièrement aux données sur la mortalité de sorte qu'on connaisse, en dernière analyse, la date et la cause du décès de tous les patients enregistrés dans la base de données.

En plus de l'information sur l'incidence du cancer, le Registre canadien du cancer contient des données sur les caractéristiques des patients atteints d'une tumeur unique ou de tumeurs multiples, ainsi que sur la nature et la fréquence de ces tumeurs. Puisque les enregistrements patient demeurent actifs dans le Registre canadien du cancer jusqu'à la confirmation du décès, il est possible de calculer des taux de survie aux diverses formes de cancer.

Le Registre canadien du cancer emploie aussi un logiciel spécialisé de couplage interne des enregistrements pour dépister les enregistrements en double et pour procéder à la confirmation des décès. Ces procédures sont exécutées annuellement. Les questions concernant les renseignements contradictoires et d'autres problèmes de données découverts lors de ces traitements annuels sont résolus en consultation avec les provinces et les territoires déclarants.

Buts

L'objectif du RCC est avant tout de créer une grande base de données permettant d'observer les profils et les tendances du cancer et d'étudier les variations du risque de cancer et la survie chez diverses populations au Canada.

Les statistiques sur la santé servent à fournir des renseignements précis, actuels et pertinents concernant la santé des Canadiens et le système de soins de santé. Statistique Canada fournit des analyses statistiques et d'autres renseignements concernant la santé de la population, les déterminants de la santé, ainsi que la portée et l'utilisation des ressources en soins de santé au Canada. Ces données servent à aider et à appuyer les planificateurs et les décideurs de tous les niveaux de gouvernement dans le domaine de la santé, à soutenir les recherches démographiques et épidémiologiques, et à tenir le public canadien au courant de l'état de santé de la population et du système de soins de santé.

Couverture

Chaque registre provincial ou territorial du cancer enregistre tous les cas de cancer survenus dans la population de sa province ou de son territoire en combinant l'information provenant de diverses sources, comme les dossiers des centres de traitement anticancéreux et les rapports de radiothérapie, les dossiers médicaux d'hospitalisation, les dossiers médicaux des services de consultations externes et des hôpitaux privés, les rapports d'anatomopathologie et d'autres rapports de laboratoire ou d'autopsie, les rapports de radiologie et de programmes de dépistage, les rapports des médecins exerçant dans le privé et les certificats de décès par cancer émis par les bureaux de la statistique de l'état civil.

Chaque année, environ 145 000 nouveaux enregistrements de tumeur sont chargés dans la base de données du Registre canadien du cancer. Les modifications subséquentes qu'il convient d'apporter aux enregistrements en raison d'erreurs ou d'omissions sont également communiquées à Statistique Canada aussitôt que l'information est disponible.

Le Conseil canadien des registres du cancer recommande que les tumeurs qui suivent soient déclarées au Registre canadien du cancer à :

- toutes les tumeurs malignes primaires (C00.0-C80.9) dont le code de comportement est 3, sauf les carcinomes spinocellulaires (805_-808_) et les carcinomes basocellulaires (809_-811_) dont le code de topographie est C44._;
- tous les carcinomes in situ/intraépithéliaux/non infiltrants/non invasifs dont le code de comportement est 2, sauf les tumeurs in situ du col utérin ou les néoplasies intraépithéliales du col (CIN III) dont le code de topographie est C53._ et sauf les cas de dysplasie de haut degré de malignité, de dysplasie sévère et de néoplasie intraépithéliale glandulaire (PIN III) de la prostate (C61.9);
- toutes les tumeurs à la limite de la malignité dont le code de comportement est 1;
- les tumeurs primaires bénignes du cerveau et du système nerveux central (codes de topographie C70.0-C72.9 avec code de comportement de 0).

Les enregistrements patient comprennent les données nominales, démographiques et sur la mortalité concernant la personne. Les enregistrements tumeur comprennent des renseignements sur les caractéristiques de la tumeur et son diagnostic.

Produits connexes

Choisis parmi les publications de Statistique Canada

82-221-X	Indicateurs de la santé
82-226-X	Statistiques sur la survie au cancer
82-401-X	Indicateurs de la santé comparables, Canada, provinces et territoires

Choisis parmi les tableaux de CANSIM de Statistique Canada

103-0550	Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, annuel
103-0553	Nouveaux cas et taux normalisé selon l'âge pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, Canada, provinces et territoires, annuel

Choisis parmi les enquêtes de Statistique Canada

3207	Registre canadien du cancer (www.statcan.ca/francais/sdds/3207_f.htm)
------	--

Choisis parmi les tableaux sommaires de Statistique Canada

- *Cancer, nouveaux cas selon les sièges primaires choisis du cancer, selon le sexe*
- *Décès et taux de mortalité, par province et territoire*

Tableaux statistiques

Tableau 1-1
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie — Canada

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
	nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux		
2006												
Tous les âges	157 194	481,5	479,1	483,8	82 133	507,9	504,4	511,4	75 061	455,5	452,2	458,8
0 à 4 ans	379	22,1	19,9	24,3	205	23,3	20,2	26,5	174	20,8	17,7	23,9
5 à 9 ans	207	11,2	9,7	12,7	121	12,8	10,5	15,1	86	9,5	7,5	11,6
10 à 14 ans	261	12,5	11,0	14,0	140	13,1	10,9	15,2	121	11,9	9,8	14,0
15 à 19 ans	450	20,7	18,8	22,6	232	20,9	18,2	23,5	218	20,6	17,9	23,3
20 à 24 ans	742	32,8	30,4	35,2	374	32,3	29,0	35,6	368	33,3	29,9	36,7
25 à 29 ans	1 164	52,1	49,1	55,0	500	44,3	40,4	48,1	664	60,0	55,5	64,6
30 à 34 ans	1 787	80,2	76,5	84,0	636	56,6	52,2	61,0	1 151	104,3	98,3	110,4
35 à 39 ans	2 739	116,2	111,8	120,5	878	74,0	69,1	78,9	1 861	158,9	151,6	166,4
40 à 44 ans	5 022	185,7	180,5	190,8	1 560	114,7	109,0	120,4	3 462	257,4	248,9	266,0
45 à 49 ans	8 252	308,3	301,6	315,0	3 048	228,0	219,9	236,0	5 204	388,5	377,9	399,1
50 à 54 ans	12 168	513,8	504,7	522,9	5 532	471,8	459,3	484,2	6 636	555,0	541,7	568,4
55 à 59 ans	16 626	797,1	785,0	809,2	8 665	840,8	823,1	858,5	7 961	754,4	737,8	771,0
60 à 64 ans	18 985	1 197,8	1 180,8	1 214,9	10 908	1 400,1	1 373,8	1 426,4	8 077	1 002,3	980,4	1 024,1
65 à 69 ans	20 449	1 663,7	1 640,9	1 686,5	12 384	2 092,3	2 055,4	2 129,1	8 065	1 265,6	1 237,9	1 293,2
70 à 74 ans	20 815	1 988,2	1 961,2	2 015,2	12 437	2 529,3	2 484,8	2 573,7	8 378	1 509,0	1 476,7	1 541,4
75 à 79 ans	19 741	2 241,1	2 209,8	2 272,3	11 148	2 864,5	2 811,4	2 917,7	8 593	1 747,6	1 710,6	1 784,5
80 à 84 ans	15 298	2 386,8	2 349,0	2 424,6	8 007	3 194,9	3 124,9	3 264,8	7 291	1 867,9	1 825,1	1 910,8
85 ans et plus	12 103	2 306,6	2 265,5	2 347,7	5 354	3 262,5	3 175,1	3 349,9	6 749	1 871,5	1 826,9	1 916,2
Groupe d'âge, non déclaré
2005												
Tous les âges	154 637	478,6	476,2	481,0	80 367	502,2	498,7	505,6	74 270	455,4	452,1	458,7
0 à 4 ans	372	21,8	19,6	24,1	199	22,8	19,7	26,0	173	20,8	17,7	23,9
5 à 9 ans	223	11,8	10,3	13,4	129	13,4	11,1	15,7	94	10,2	8,1	12,3
10 à 14 ans	257	12,2	10,7	13,7	126	11,7	9,6	13,7	131	12,8	10,6	14,9
15 à 19 ans	455	21,2	19,2	23,1	247	22,4	19,6	25,2	208	19,9	17,2	22,6
20 à 24 ans	743	33,1	30,7	35,5	362	31,5	28,3	34,7	381	34,7	31,2	38,2
25 à 29 ans	1 128	51,3	48,3	54,3	476	42,8	38,9	46,6	652	60,1	55,4	64,7
30 à 34 ans	1 751	78,6	74,9	82,3	671	59,7	55,2	64,2	1 080	97,9	92,0	103,7
35 à 39 ans	2 726	115,1	110,8	119,4	866	72,7	67,9	77,6	1 860	158,1	150,9	165,2
40 à 44 ans	5 230	190,4	185,2	195,5	1 722	124,7	118,8	130,6	3 508	256,7	248,2	265,2
45 à 49 ans	8 148	310,9	304,1	317,6	2 944	225,1	217,0	233,2	5 204	396,3	385,6	407,1
50 à 54 ans	11 480	498,6	489,5	507,7	5 195	455,8	443,4	468,2	6 285	540,5	527,1	553,8
55 à 59 ans	16 040	796,9	784,6	809,2	8 382	841,8	823,8	859,9	7 658	752,9	736,1	769,8
60 à 64 ans	18 124	1 195,8	1 178,4	1 213,2	10 355	1 391,1	1 364,3	1 417,8	7 769	1 007,3	984,9	1 029,7
65 à 69 ans	19 823	1 659,2	1 636,1	1 682,3	11 952	2 077,7	2 040,4	2 114,9	7 871	1 270,5	1 242,5	1 298,6
70 à 74 ans	20 853	1 996,3	1 969,2	2 023,4	12 470	2 545,6	2 500,9	2 590,3	8 383	1 511,2	1 478,8	1 543,5
75 à 79 ans	19 882	2 296,1	2 264,2	2 328,0	11 125	2 936,6	2 882,0	2 991,2	8 757	1 797,9	1 760,2	1 835,6
80 à 84 ans	15 271	2 436,1	2 397,5	2 474,8	7 848	3 236,4	3 164,8	3 308,0	7 423	1 931,2	1 887,3	1 975,2
85 ans et plus	12 129	2 456,3	2 412,5	2 500,0	5 298	3 470,8	3 377,4	3 564,3	6 831	2 002,3	1 954,8	2 049,8
Groupe d'âge, non déclaré	2	0	2

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2009) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 1-2
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie — Terre-Neuve-et-Labrador

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
	nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux		
2006												
Tous les âges	2 503	490,8	471,6	510,1	1 425	570,0	540,4	599,6	1 078	414,7	390,0	439,5
0 à 4 ans	7	30,3	12,2	62,4	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	6	17,9	6,6	38,9	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	12	35,4	18,3	61,9	x	x	x	x	x	x	x	x
25 à 29 ans	11	36,0	18,0	64,5	x	x	x	x	x	x	x	x
30 à 34 ans	23	73,1	46,3	109,7	8	52,3	22,5	103,0	15	92,8	52,0	153,0
35 à 39 ans	43	117,1	84,8	157,8	13	73,7	39,2	126,0	30	157,2	106,1	224,5
40 à 44 ans	67	158,4	120,5	196,3	21	101,7	63,0	155,5	46	212,4	155,5	283,4
45 à 49 ans	123	283,8	233,6	333,9	47	218,7	160,7	290,9	76	347,7	269,5	425,9
50 à 54 ans	229	540,3	470,3	610,3	114	544,3	444,4	644,3	115	536,4	438,3	634,4
55 à 59 ans	319	821,5	731,3	911,6	176	918,1	782,4	1 053,7	143	727,3	608,1	846,5
60 à 64 ans	338	1 142,3	1 020,5	1 264,1	226	1 549,3	1 347,3	1 751,3	112	746,5	608,3	884,8
65 à 69 ans	381	1 767,0	1 589,6	1 944,4	241	2 265,3	1 979,3	2 551,2	140	1 281,7	1 069,4	1 494,0
70 à 74 ans	366	2 137,1	1 918,2	2 356,0	235	2 828,6	2 466,9	3 190,3	131	1 485,6	1 231,2	1 740,0
75 à 79 ans	297	2 193,2	1 943,7	2 442,6	170	2 840,4	2 413,4	3 267,4	127	1 680,6	1 388,3	1 972,8
80 à 84 ans	181	1 957,4	1 672,2	2 242,6	98	2 656,5	2 130,6	3 182,5	83	1 493,3	1 172,1	1 814,6
85 ans et plus	97	1 274,1	1 020,6	1 527,7	52	2 209,9	1 609,3	2 810,6	45	855,5	624,0	1 144,7
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0
2005												
Tous les âges	2 327	452,6	434,2	471,0	1 242	491,8	464,4	519,1	1 085	414,8	390,1	439,4
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	6	19,6	7,2	42,6	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	6	17,3	6,4	37,8	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	7	19,9	8,0	41,0	x	x	x	x	x	x	x	x
25 à 29 ans	16	51,9	29,7	84,2	10	65,2	31,3	119,8	6	38,7	14,2	84,2
30 à 34 ans	29	89,1	59,7	128,0	15	95,2	53,3	157,0	14	83,4	45,6	140,0
35 à 39 ans	37	96,7	68,1	133,3	11	59,4	29,6	106,3	26	131,7	86,0	193,0
40 à 44 ans	79	182,9	142,6	223,2	22	103,9	65,1	157,3	57	259,0	191,7	326,2
45 à 49 ans	102	235,2	189,5	280,8	33	153,6	105,8	215,7	69	315,2	240,8	389,6
50 à 54 ans	211	498,4	431,2	565,7	95	454,5	363,1	545,9	116	541,2	442,7	639,7
55 à 59 ans	296	776,6	688,1	865,0	144	762,5	638,0	887,1	152	790,3	664,7	916,0
60 à 64 ans	325	1 185,8	1 056,9	1 314,8	178	1 309,4	1 117,0	1 501,8	147	1 064,2	892,2	1 236,3
65 à 69 ans	316	1 510,2	1 343,7	1 676,7	196	1 894,6	1 629,4	2 159,9	120	1 134,3	931,4	1 337,3
70 à 74 ans	327	1 918,6	1 710,6	2 126,5	212	2 578,8	2 231,6	2 925,9	115	1 303,4	1 065,2	1 541,6
75 à 79 ans	290	2 153,1	1 905,3	2 400,9	168	2 840,2	2 410,7	3 269,7	122	1 615,0	1 328,4	1 901,6
80 à 84 ans	167	1 870,3	1 586,6	2 154,0	92	2 598,1	2 067,2	3 129,0	75	1 392,0	1 076,9	1 707,0
85 ans et plus	107	1 443,8	1 170,2	1 717,4	56	2 435,8	1 797,9	3 073,8	51	997,7	723,8	1 271,5
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2009) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 1-3
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie — Île-du-Prince-Édouard

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
	nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux		
2006												
Tous les âges	765	554,2	515,0	593,5	447	665,5	603,8	727,2	318	448,8	399,4	498,1
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25 à 29 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30 à 34 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
35 à 39 ans	6	70,3	25,8	153,1	x	x	x	x	x	x	x	x
40 à 44 ans	16	152,3	87,1	247,3	x	x	x	x	x	x	x	x
45 à 49 ans	34	316,0	218,9	441,6	14	267,0	145,9	448,0	20	362,6	221,5	560,0
50 à 54 ans	59	574,0	427,5	720,4	30	593,6	400,5	847,4	29	555,0	371,7	797,1
55 à 59 ans	83	815,1	639,7	990,4	50	996,2	720,1	1 272,4	33	639,0	440,0	897,4
60 à 64 ans	106	1 467,1	1 187,8	1 746,4	71	1 981,0	1 520,2	2 441,8	35	961,3	669,6	1 337,0
65 à 69 ans	125	2 171,3	1 790,6	2 551,9	78	2 764,0	2 150,6	3 377,4	47	1 601,4	1 176,5	2 129,5
70 à 74 ans	102	2 094,9	1 688,3	2 501,4	68	2 937,4	2 239,2	3 635,5	34	1 331,2	922,1	1 860,2
75 à 79 ans	84	2 307,1	1 813,7	2 800,4	51	3 157,9	2 291,2	4 024,6	33	1 628,8	1 121,4	2 287,3
80 à 84 ans	61	2 115,9	1 584,9	2 646,8	30	2 710,0	1 828,4	3 869,0	31	1 745,5	1 185,8	2 477,5
85 ans et plus	71	2 708,9	2 078,8	3 339,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0
2005												
Tous les âges	755	546,4	507,4	585,3	412	612,6	553,4	671,7	343	483,6	432,4	534,8
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25 à 29 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30 à 34 ans	10	116,8	56,1	214,9	x	x	x	x	x	x	x	x
35 à 39 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40 à 44 ans	18	164,8	97,7	260,4	x	x	x	x	x	x	x	x
45 à 49 ans	35	326,6	227,5	454,3	14	269,2	147,1	451,7	21	380,8	235,7	582,0
50 à 54 ans	46	458,4	335,6	611,5	23	468,1	296,7	702,3	23	449,1	284,7	673,9
55 à 59 ans	65	660,2	499,7	820,7	34	694,4	481,0	970,4	31	626,4	425,5	889,1
60 à 64 ans	109	1 578,8	1 282,4	1 875,2	70	2 072,2	1 586,8	2 557,7	39	1 106,1	786,4	1 511,9
65 à 69 ans	121	2 140,8	1 759,4	2 522,3	76	2 750,6	2 132,2	3 369,1	45	1 557,6	1 136,0	2 084,1
70 à 74 ans	100	2 127,2	1 710,3	2 544,1	68	3 042,5	2 319,3	3 765,7	32	1 297,6	887,7	1 831,7
75 à 79 ans	97	2 630,2	2 106,7	3 153,6	44	2 702,7	1 963,8	3 628,4	53	2 572,8	1 880,1	3 265,5
80 à 84 ans	81	2 852,1	2 231,0	3 473,2	43	4 064,3	2 941,4	5 474,5	38	2 132,4	1 509,0	2 927,0
85 ans et plus	60	2 323,8	1 735,8	2 911,8	20	2 713,7	1 658,1	4 191,3	40	2 168,0	1 549,1	2 952,3
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2009) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 1-4
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie — Nouvelle-Écosse

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
	nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux		
2006												
Tous les âges	5 759	615,9	600,0	631,8	3 134	685,2	661,2	709,2	2 625	549,6	528,5	570,6
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	7	12,5	5,0	25,7	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	12	19,1	9,9	33,4	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	25	39,6	25,6	58,4	11	34,1	17,0	61,0	14	45,4	24,8	76,1
25 à 29 ans	29	50,5	33,8	72,5	9	32,1	14,7	60,9	20	68,0	41,5	105,0
30 à 34 ans	49	83,6	61,9	110,6	17	59,2	34,5	94,7	32	107,2	73,3	151,3
35 à 39 ans	88	138,0	109,2	166,9	29	91,9	61,6	132,0	59	183,2	136,4	229,9
40 à 44 ans	167	214,7	182,1	247,3	61	157,6	118,0	197,1	106	271,3	219,7	323,0
45 à 49 ans	255	326,0	286,0	366,0	100	258,4	207,8	309,1	155	392,1	330,4	453,8
50 à 54 ans	405	567,3	512,0	622,5	195	559,8	481,3	638,4	210	574,4	496,7	652,1
55 à 59 ans	609	907,0	835,0	979,1	350	1 053,2	942,9	1 163,5	259	763,8	670,7	856,8
60 à 64 ans	802	1 571,3	1 462,5	1 680,0	483	1 921,0	1 749,7	2 092,3	319	1 231,8	1 096,6	1 366,9
65 à 69 ans	801	2 030,1	1 889,5	2 170,6	490	2 566,8	2 339,5	2 794,1	311	1 527,0	1 357,3	1 696,7
70 à 74 ans	734	2 252,0	2 089,1	2 414,9	440	2 892,8	2 622,5	3 163,1	294	1 691,3	1 498,0	1 884,6
75 à 79 ans	707	2 723,5	2 522,8	2 924,3	420	3 732,3	3 375,4	4 089,3	287	1 951,6	1 725,8	2 177,4
80 à 84 ans	582	2 991,8	2 748,8	3 234,9	310	4 026,5	3 578,3	4 474,7	272	2 314,1	2 039,1	2 589,1
85 ans et plus	479	2 581,2	2 350,1	2 812,4	203	3 601,2	3 105,8	4 096,6	276	2 136,2	1 884,2	2 388,3
Groupe d'âge, non déclaré	1	0	1
2005												
Tous les âges	5 341	570,6	555,3	585,9	2 828	617,6	594,8	640,3	2 513	525,7	505,1	546,2
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	13	20,6	11,0	35,3	7	21,7	8,7	44,8	6	19,5	7,2	42,5
20 à 24 ans	17	26,8	15,6	42,9	11	34,1	17,0	61,1	6	19,3	7,1	41,9
25 à 29 ans	34	59,3	41,0	82,8	16	56,9	32,6	92,5	18	61,5	36,4	97,1
30 à 34 ans	41	68,0	48,8	92,2	15	50,7	28,4	83,6	26	84,6	55,3	124,0
35 à 39 ans	84	129,5	101,8	157,2	31	96,4	65,5	136,9	53	162,0	118,4	205,6
40 à 44 ans	177	220,9	188,4	253,4	55	137,6	101,2	174,0	122	303,8	249,9	357,7
45 à 49 ans	270	350,2	308,4	392,0	102	268,3	216,2	320,4	168	429,8	364,8	494,8
50 à 54 ans	375	534,6	480,5	588,7	187	545,2	467,0	623,3	188	524,5	449,6	599,5
55 à 59 ans	554	848,1	777,5	918,7	302	931,3	826,2	1 036,3	252	766,1	671,5	860,7
60 à 64 ans	645	1 321,7	1 219,7	1 423,7	375	1 562,6	1 404,4	1 720,7	270	1 088,6	958,7	1 218,4
65 à 69 ans	713	1 861,6	1 725,0	1 998,3	438	2 355,7	2 135,1	2 576,3	275	1 395,4	1 230,5	1 560,4
70 à 74 ans	730	2 249,3	2 086,2	2 412,5	448	2 981,3	2 705,2	3 257,4	282	1 618,2	1 429,3	1 807,0
75 à 79 ans	676	2 638,3	2 439,4	2 837,1	371	3 370,3	3 027,3	3 713,2	305	2 086,9	1 852,7	2 321,1
80 à 84 ans	540	2 756,5	2 524,0	2 989,0	287	3 746,7	3 313,3	4 180,2	253	2 120,7	1 859,4	2 382,0
85 ans et plus	460	2 566,5	2 332,0	2 801,1	176	3 257,4	2 776,2	3 738,7	284	2 268,4	2 004,5	2 532,2
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2009) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 1-5
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie — Nouveau-Brunswick

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
	nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux		
2006												
Tous les âges	4 254	567,8	550,7	584,8	2 320	627,8	602,3	653,4	1 934	509,3	486,6	532,0
0 à 4 ans	6	17,3	6,3	37,6	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	6	15,6	5,7	33,9	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	9	18,0	8,2	34,1	x	x	x	x	x	x	x	x
25 à 29 ans	21	44,6	27,6	68,2	8	33,8	14,6	66,5	13	55,6	29,6	95,1
30 à 34 ans	33	66,9	46,1	94,0	6	24,2	8,9	52,6	27	110,2	72,6	160,4
35 à 39 ans	57	110,7	81,9	139,4	23	89,1	56,5	133,7	34	132,3	91,6	184,8
40 à 44 ans	127	204,8	169,2	240,4	42	136,4	98,3	184,4	85	272,2	214,3	330,1
45 à 49 ans	211	336,3	290,9	381,6	86	275,5	217,3	333,7	125	396,4	326,9	465,9
50 à 54 ans	307	523,0	464,5	581,5	148	511,0	428,7	593,3	159	534,7	451,6	617,8
55 à 59 ans	469	864,2	786,0	942,4	250	927,7	812,7	1 042,7	219	801,6	695,4	907,8
60 à 64 ans	531	1 321,6	1 209,2	1 434,0	327	1 642,4	1 464,4	1 820,4	204	1 006,5	868,3	1 144,6
65 à 69 ans	607	1 969,6	1 812,9	2 126,3	401	2 667,6	2 406,5	2 928,7	206	1 304,9	1 126,7	1 483,1
70 à 74 ans	604	2 414,4	2 221,8	2 606,9	385	3 319,5	2 987,9	3 651,1	219	1 632,0	1 415,9	1 848,2
75 à 79 ans	526	2 553,3	2 335,1	2 771,5	302	3 451,8	3 062,5	3 841,1	224	1 890,0	1 642,5	2 137,5
80 à 84 ans	411	2 555,3	2 308,3	2 802,4	203	3 257,9	2 809,7	3 706,1	208	2 111,0	1 824,1	2 397,9
85 ans et plus	319	2 273,4	2 023,9	2 522,9	128	2 999,1	2 479,5	3 518,6	191	1 956,2	1 678,7	2 233,6
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0
2005												
Tous les âges	4 155	553,0	536,2	569,8	2 248	606,0	580,9	631,0	1 907	501,4	478,9	523,9
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	9	22,6	10,3	42,9	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	13	26,4	14,1	45,1	7	27,5	11,0	56,7	6	25,2	9,2	54,9
20 à 24 ans	19	37,4	22,5	58,4	8	30,5	13,2	60,1	11	44,8	22,4	80,2
25 à 29 ans	16	33,6	19,2	54,5	x	x	x	x	x	x	x	x
30 à 34 ans	32	63,6	43,5	89,8	16	63,2	36,1	102,6	16	64,1	36,7	104,1
35 à 39 ans	55	103,8	76,4	131,3	20	75,3	46,0	116,3	35	132,6	92,3	184,4
40 à 44 ans	120	189,3	155,4	223,2	38	120,5	85,3	165,4	82	257,4	201,7	313,1
45 à 49 ans	217	348,7	302,3	395,1	74	238,6	184,2	292,9	143	458,0	383,0	533,1
50 à 54 ans	286	495,1	437,7	552,5	142	498,5	416,5	580,4	144	491,8	411,5	572,2
55 à 59 ans	479	909,8	828,3	991,3	250	954,9	836,6	1 073,3	229	865,2	753,1	977,2
60 à 64 ans	504	1 309,4	1 195,0	1 423,7	311	1 625,5	1 444,9	1 806,2	193	996,9	856,3	1 137,5
65 à 69 ans	565	1 900,8	1 744,0	2 057,5	361	2 483,7	2 227,5	2 739,9	204	1 343,0	1 158,7	1 527,3
70 à 74 ans	548	2 201,2	2 016,9	2 385,5	334	2 922,6	2 609,2	3 236,1	214	1 589,1	1 376,2	1 802,0
75 à 79 ans	520	2 520,6	2 304,0	2 737,3	300	3 438,0	3 049,0	3 827,0	220	1 848,1	1 603,9	2 092,3
80 à 84 ans	412	2 589,9	2 339,8	2 840,0	217	3 549,2	3 077,0	4 021,5	195	1 991,0	1 711,6	2 270,5
85 ans et plus	350	2 590,5	2 319,1	2 861,9	158	3 870,7	3 267,1	4 474,2	192	2 036,3	1 748,2	2 324,3
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2009) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 1-6

 Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie — Québec¹

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
	nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux		
2006												
Tous les âges	39 257	513,1	508,0	518,2	20 144	533,3	525,9	540,7	19 113	493,4	486,4	500,4
0 à 4 ans	83	21,9	17,2	26,6	41	21,1	15,1	28,6	42	22,7	16,3	30,6
5 à 9 ans	48	12,2	9,0	16,1	24	11,8	7,6	17,6	24	12,5	8,0	18,7
10 à 14 ans	54	11,5	8,5	14,6	28	11,7	7,8	16,9	26	11,4	7,4	16,6
15 à 19 ans	97	20,4	16,4	24,5	49	20,2	14,9	26,7	48	20,7	15,3	27,4
20 à 24 ans	152	30,9	26,0	35,8	87	34,5	27,3	41,8	65	27,1	20,5	33,7
25 à 29 ans	265	49,1	43,2	55,1	137	49,8	41,5	58,2	128	48,4	40,0	56,8
30 à 34 ans	350	69,4	62,1	76,6	138	53,5	44,6	62,4	212	86,0	74,4	97,5
35 à 39 ans	569	108,7	99,8	117,7	201	75,1	64,7	85,5	368	143,9	129,2	158,6
40 à 44 ans	1 079	171,9	161,6	182,1	337	105,7	94,4	117,0	742	240,1	222,8	257,4
45 à 49 ans	2 115	325,8	311,9	339,7	757	233,2	216,6	249,8	1 358	418,5	396,3	440,8
50 à 54 ans	3 025	519,6	501,1	538,2	1 308	454,7	430,0	479,3	1 717	583,1	555,5	610,7
55 à 59 ans	4 148	798,4	774,1	822,7	2 076	813,5	778,5	848,5	2 072	783,9	750,2	817,7
60 à 64 ans	4 979	1 181,7	1 148,9	1 214,5	2 749	1 340,2	1 290,1	1 390,4	2 230	1 031,3	988,5	1 074,1
65 à 69 ans	5 049	1 603,9	1 559,7	1 648,2	3 038	2 029,5	1 957,4	2 101,7	2 011	1 218,1	1 164,8	1 271,3
70 à 74 ans	5 181	1 953,0	1 899,8	2 006,2	2 995	2 480,8	2 391,9	2 569,6	2 186	1 512,2	1 448,9	1 575,6
75 à 79 ans	5 036	2 284,7	2 221,6	2 347,8	2 755	2 971,0	2 860,0	3 081,9	2 281	1 786,3	1 713,0	1 859,6
80 à 84 ans	3 964	2 578,8	2 498,5	2 659,1	2 067	3 648,6	3 491,3	3 805,9	1 897	1 954,4	1 866,4	2 042,3
85 ans et plus	3 063	2 533,7	2 444,0	2 623,5	1 357	3 963,2	3 752,3	4 174,1	1 706	1 968,9	1 875,4	2 062,3
Groupe d'âge, non déclaré
2005												
Tous les âges	40 021	526,7	521,6	531,9	20 516	547,0	539,5	554,5	19 505	506,9	499,8	514,1
0 à 4 ans	107	28,6	23,2	34,1	62	32,4	24,3	40,4	45	24,7	18,0	33,1
5 à 9 ans	58	14,3	10,6	17,9	29	13,9	9,3	20,0	29	14,7	9,8	21,1
10 à 14 ans	74	15,5	11,9	19,0	34	13,9	9,6	19,4	40	17,1	12,2	23,3
15 à 19 ans	116	25,0	20,5	29,6	61	25,7	19,3	32,2	55	24,3	17,8	30,7
20 à 24 ans	164	32,7	27,7	37,7	81	31,5	24,7	38,4	83	33,9	26,6	41,2
25 à 29 ans	246	46,4	40,6	52,2	111	40,9	33,3	48,5	135	52,1	43,3	60,9
30 à 34 ans	394	79,2	71,4	87,0	152	59,7	50,2	69,2	242	99,5	87,0	112,1
35 à 39 ans	580	108,5	99,7	117,4	194	71,1	61,1	81,1	386	147,7	132,9	162,4
40 à 44 ans	1 226	190,3	179,6	200,9	391	119,7	107,9	131,6	835	262,7	244,9	280,6
45 à 49 ans	1 974	308,3	294,7	321,9	672	210,3	194,4	226,2	1 302	406,0	383,9	428,0
50 à 54 ans	2 843	497,9	479,6	516,2	1 276	452,7	427,8	477,5	1 567	542,0	515,1	568,8
55 à 59 ans	4 173	822,7	797,8	847,7	2 133	855,9	819,5	892,2	2 040	790,7	756,4	825,0
60 à 64 ans	4 904	1 217,5	1 183,4	1 251,6	2 777	1 416,7	1 364,0	1 469,4	2 127	1 028,7	985,0	1 072,4
65 à 69 ans	5 117	1 686,8	1 640,6	1 733,0	3 045	2 119,1	2 043,9	2 194,4	2 072	1 297,7	1 241,8	1 353,5
70 à 74 ans	5 311	2 002,9	1 949,0	2 056,7	3 097	2 579,7	2 488,9	2 670,6	2 214	1 525,6	1 462,1	1 589,2
75 à 79 ans	5 073	2 351,8	2 287,0	2 416,5	2 760	3 066,5	2 952,1	3 180,9	2 313	1 840,0	1 765,0	1 915,0
80 à 84 ans	4 162	2 809,1	2 723,8	2 894,5	2 150	3 993,9	3 825,1	4 162,7	2 012	2 133,0	2 039,8	2 226,2
85 ans et plus	3 499	3 095,8	2 993,2	3 198,4	1 491	4 724,8	4 485,0	4 964,6	2 008	2 464,8	2 357,0	2 572,6
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0

1. Pour aider à l'interprétation des résultats, il est important de souligner que les cancers déclarés au Fichier des tumeurs du Québec (FITQ) sont ceux ayant fait l'objet d'une hospitalisation ou d'une chirurgie d'un jour. Certains cancers ne sont donc pas déclarés au FITQ s'ils sont diagnostiqués et traités uniquement sur une base externe ou ambulatoire, ou encore ils sont déclarés à un stade plus avancé de la maladie qui requiert une hospitalisation. Une étude d'exhaustivité produite en 2003 évalue entre autres que plus du tiers des cancers de la prostate et des mélanomes ne sont pas déclarés au FITQ en raison de notre source de déclaration. Globalement, 90 % des cas de cancer confirmés par histopathologie seraient déclarés au FITQ. Une étude est en cours pour évaluer la faisabilité d'ajouter les rapports de laboratoires de pathologie comme source de déclaration des cas, ce qui assurerait une exhaustivité plus complète.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondants.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2009) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 1-7
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie — Ontario¹

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
	nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux		
2006												
Tous les âges	61 069	480,7	476,8	484,5	31 711	505,6	500,0	511,2	29 358	456,3	451,1	461,6
0 à 4 ans	150	22,2	18,7	25,8	86	24,9	19,6	30,1	64	19,5	14,7	24,2
5 à 9 ans	77	10,2	7,9	12,5	47	12,2	9,0	16,3	30	8,1	5,5	11,5
10 à 14 ans	108	12,9	10,5	15,3	57	13,3	9,8	16,8	51	12,5	9,1	15,9
15 à 19 ans	206	24,2	20,9	27,5	103	23,6	19,0	28,1	103	24,8	20,0	29,6
20 à 24 ans	328	37,5	33,5	41,6	149	33,5	28,1	38,9	179	41,7	35,6	47,8
25 à 29 ans	504	59,3	54,2	64,5	198	46,7	40,2	53,1	306	72,0	64,0	80,1
30 à 34 ans	839	94,1	87,7	100,5	293	65,7	58,2	73,2	546	122,5	112,3	132,8
35 à 39 ans	1 267	131,6	124,4	138,9	372	77,6	69,7	85,4	895	185,3	173,2	197,4
40 à 44 ans	2 236	205,7	197,2	214,2	693	127,0	117,6	136,5	1 543	285,0	270,8	299,3
45 à 49 ans	3 327	324,5	313,5	335,5	1 225	239,8	226,4	253,2	2 102	408,6	391,2	426,1
50 à 54 ans	4 807	544,6	529,2	560,0	2 182	502,5	481,4	523,5	2 625	585,4	563,0	607,8
55 à 59 ans	6 580	843,4	823,0	863,8	3 515	917,3	887,0	947,6	3 065	772,1	744,8	799,4
60 à 64 ans	7 155	1 221,6	1 193,3	1 249,9	4 145	1 445,1	1 401,1	1 489,1	3 010	1 007,2	971,2	1 043,1
65 à 69 ans	7 856	1 684,9	1 647,6	1 722,1	4 775	2 138,8	2 078,1	2 199,4	3 081	1 267,9	1 223,1	1 312,6
70 à 74 ans	8 126	2 022,6	1 978,6	2 066,5	4 896	2 597,5	2 524,7	2 670,2	3 230	1 514,5	1 462,2	1 566,7
75 à 79 ans	7 477	2 197,4	2 147,6	2 247,2	4 180	2 762,7	2 679,0	2 846,5	3 297	1 744,8	1 685,2	1 804,3
80 à 84 ans	5 718	2 297,4	2 237,9	2 357,0	2 946	3 015,8	2 906,9	3 124,7	2 772	1 833,3	1 765,1	1 901,6
85 ans et plus	4 302	2 239,4	2 172,5	2 306,4	1 845	3 014,0	2 876,5	3 151,5	2 457	1 877,2	1 803,0	1 951,4
Groupe d'âge, non déclaré	6	4	2
2005												
Tous les âges	59 407	472,8	469,0	476,6	30 741	495,4	489,9	500,9	28 666	450,7	445,5	455,9
0 à 4 ans	137	20,3	16,9	23,7	60	17,4	13,0	21,7	77	23,3	18,1	28,5
5 à 9 ans	88	11,4	9,0	13,8	53	13,5	9,9	17,2	35	9,2	6,4	12,8
10 à 14 ans	100	11,9	9,6	14,3	45	10,5	7,6	14,0	55	13,5	9,9	17,0
15 à 19 ans	184	21,9	18,7	25,1	98	22,7	18,2	27,2	86	21,0	16,6	25,4
20 à 24 ans	315	36,6	32,5	40,6	141	32,2	26,9	37,5	174	41,1	35,0	47,2
25 à 29 ans	489	58,2	53,0	63,4	200	47,5	40,9	54,1	289	69,0	61,0	76,9
30 à 34 ans	781	86,8	80,8	92,9	283	62,9	55,6	70,2	498	110,9	101,1	120,6
35 à 39 ans	1 252	129,6	122,4	136,7	358	74,2	66,5	81,9	894	184,8	172,6	196,9
40 à 44 ans	2 171	198,4	190,0	206,7	701	127,6	118,1	137,0	1 470	269,7	256,0	283,5
45 à 49 ans	3 315	333,3	322,0	344,7	1 222	246,9	233,0	260,7	2 093	419,0	401,1	437,0
50 à 54 ans	4 553	531,7	516,2	547,1	2 086	495,4	474,1	516,6	2 467	566,8	544,4	589,1
55 à 59 ans	6 217	826,4	805,9	847,0	3 252	877,9	847,8	908,1	2 965	776,5	748,5	804,4
60 à 64 ans	6 795	1 211,3	1 182,5	1 240,1	3 950	1 439,7	1 394,8	1 484,6	2 845	992,7	956,2	1 029,2
65 à 69 ans	7 653	1 676,3	1 638,8	1 713,9	4 643	2 124,1	2 063,0	2 185,2	3 010	1 265,0	1 219,8	1 310,2
70 à 74 ans	8 037	2 004,4	1 960,6	2 048,3	4 789	2 544,1	2 472,1	2 616,2	3 248	1 526,9	1 474,4	1 579,4
75 à 79 ans	7 631	2 278,7	2 227,5	2 329,8	4 266	2 896,9	2 809,9	2 983,8	3 365	1 793,5	1 732,9	1 854,1
80 à 84 ans	5 650	2 324,3	2 263,7	2 385,0	2 842	3 004,1	2 893,6	3 114,5	2 808	1 891,2	1 821,3	1 961,2
85 ans et plus	4 037	2 253,1	2 183,6	2 322,6	1 752	3 115,7	2 969,8	3 261,6	2 285	1 858,6	1 782,4	1 934,8
Groupe d'âge, non déclaré	2	0	2

1. Les sièges in situ pour la vessie diagnostiqués en Ontario ne sont pas déclarés au Registre canadien du cancer. Les cancers cutanés sans mélanome ne sont pas répertoriés en Ontario. Les sarcomes de Kaposi sont considérablement sous-estimés.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondants.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2009) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 1-8

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie — Manitoba

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
	nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux		
2006												
Tous les âges	5 457	463,0	450,8	475,3	2 764	472,1	454,5	489,7	2 693	454,1	436,9	471,2
0 à 4 ans	18	25,7	15,3	40,7	8	22,5	9,7	44,3	10	29,1	14,0	53,6
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	12	14,3	7,4	25,1	6	14,0	5,1	30,5	6	14,7	5,4	32,0
15 à 19 ans	17	20,0	11,6	32,0	7	16,2	6,5	33,4	10	23,9	11,5	44,0
20 à 24 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	13	31,8	16,9	54,4
25 à 29 ans	42	53,7	38,7	72,6	x	x	x	x	x	x	x	x
30 à 34 ans	54	70,0	51,4	88,7	18	45,4	26,9	71,8	36	96,1	67,3	133,0
35 à 39 ans	86	111,8	88,1	135,4	28	71,2	47,3	103,0	58	154,1	114,4	193,7
40 à 44 ans	147	162,8	136,5	189,1	43	94,4	68,3	127,2	104	232,4	187,7	277,1
45 à 49 ans	251	275,1	241,1	309,2	94	202,7	161,7	243,7	157	350,1	295,3	404,8
50 à 54 ans	410	503,2	454,5	551,9	193	476,3	409,1	543,5	217	529,7	459,2	600,2
55 à 59 ans	501	695,7	634,8	756,6	240	673,0	587,9	758,2	261	717,9	630,8	805,0
60 à 64 ans	644	1 207,3	1 114,1	1 300,5	361	1 369,3	1 228,0	1 510,5	283	1 049,0	926,8	1 171,2
65 à 69 ans	667	1 617,4	1 494,7	1 740,2	387	1 958,4	1 763,3	2 153,5	280	1 303,7	1 151,0	1 456,4
70 à 74 ans	693	1 903,8	1 762,0	2 045,5	417	2 438,3	2 204,3	2 672,3	276	1 430,1	1 261,4	1 598,8
75 à 79 ans	717	2 214,3	2 052,2	2 376,4	389	2 739,1	2 466,9	3 011,2	328	1 804,4	1 609,1	1 999,7
80 à 84 ans	612	2 352,8	2 166,4	2 539,2	302	2 988,6	2 651,5	3 325,7	310	1 948,8	1 731,9	2 165,8
85 ans et plus	558	2 339,5	2 145,4	2 533,6	243	3 320,6	2 903,1	3 738,1	315	1 905,3	1 694,9	2 115,7
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0
2005												
Tous les âges	5 421	461,7	449,4	474,0	2 703	463,5	446,0	481,0	2 718	459,9	442,6	477,2
0 à 4 ans	17	24,3	14,2	39,0	8	22,5	9,7	44,3	9	26,3	12,0	49,8
5 à 9 ans	6	7,8	2,9	17,0	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	7	8,3	3,3	17,1	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	16	18,9	10,8	30,7	6	13,9	5,1	30,3	10	24,1	11,6	44,3
20 à 24 ans	21	25,2	15,6	38,5	13	30,3	16,1	51,8	8	19,8	8,5	38,9
25 à 29 ans	39	50,0	35,6	68,4	17	42,7	24,9	68,4	22	57,6	36,1	87,2
30 à 34 ans	56	72,6	53,6	91,7	28	70,8	47,1	102,4	28	74,5	49,5	107,7
35 à 39 ans	70	89,9	68,8	110,9	28	70,6	46,9	102,0	42	109,9	79,2	148,6
40 à 44 ans	155	166,6	140,4	192,8	58	123,3	91,5	155,0	97	210,9	168,9	252,9
45 à 49 ans	265	295,8	260,2	331,4	87	191,3	151,1	231,5	178	403,7	344,4	463,0
50 à 54 ans	394	493,9	445,1	542,7	159	402,7	340,1	465,3	235	583,3	508,7	657,8
55 à 59 ans	515	738,7	674,9	802,5	258	745,8	654,8	836,8	257	731,8	642,3	821,2
60 à 64 ans	568	1 105,4	1 014,5	1 196,3	289	1 139,0	1 007,6	1 270,3	279	1 072,6	946,8	1 198,5
65 à 69 ans	688	1 696,8	1 570,0	1 823,6	393	2 016,8	1 817,4	2 216,2	295	1 400,7	1 240,9	1 560,5
70 à 74 ans	719	1 961,1	1 817,8	2 104,5	425	2 477,4	2 241,9	2 712,9	294	1 507,1	1 334,8	1 679,3
75 à 79 ans	753	2 309,1	2 144,2	2 474,0	403	2 836,0	2 559,1	3 112,9	350	1 902,2	1 702,9	2 101,5
80 à 84 ans	572	2 196,4	2 016,4	2 376,4	274	2 748,2	2 422,8	3 073,7	298	1 854,0	1 643,5	2 064,5
85 ans et plus	560	2 426,1	2 225,2	2 627,1	250	3 529,1	3 091,6	3 966,5	310	1 937,7	1 722,0	2 153,5
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2009) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 1-9
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie — Saskatchewan

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
	nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux		
2006												
Tous les âges	4 757	481,7	468,0	495,4	2 471	503,8	484,0	523,7	2 286	459,9	441,0	478,7
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	12	17,3	8,9	30,1	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	15	19,7	11,0	32,5	7	17,9	7,2	36,9	8	21,6	9,3	42,6
20 à 24 ans	23	31,1	19,7	46,7	16	41,6	23,8	67,5	7	19,7	7,9	40,7
25 à 29 ans	23	36,1	22,9	54,2	10	30,9	14,8	56,8	13	41,6	22,1	71,1
30 à 34 ans	46	78,9	57,7	105,2	16	54,8	31,4	89,1	30	102,9	69,4	146,9
35 à 39 ans	66	113,0	85,7	140,2	21	71,9	44,5	110,0	45	154,0	112,3	206,0
40 à 44 ans	109	151,5	123,0	179,9	34	94,8	65,6	132,4	75	207,8	160,8	254,8
45 à 49 ans	193	253,5	217,7	289,2	73	189,5	146,0	232,9	120	319,0	261,9	376,1
50 à 54 ans	324	464,6	414,0	515,2	148	419,4	351,9	487,0	176	510,8	435,3	586,3
55 à 59 ans	448	776,3	704,4	848,2	228	790,9	688,3	893,6	220	761,6	661,0	862,3
60 à 64 ans	534	1 227,0	1 122,9	1 331,0	292	1 351,7	1 196,6	1 506,7	242	1 104,1	965,0	1 243,2
65 à 69 ans	653	1 792,1	1 654,7	1 929,6	377	2 146,1	1 929,4	2 362,7	276	1 462,6	1 290,1	1 635,2
70 à 74 ans	634	1 920,6	1 771,1	2 070,1	361	2 316,8	2 077,8	2 555,8	273	1 566,4	1 380,5	1 752,2
75 à 79 ans	665	2 202,1	2 034,8	2 369,5	385	2 839,2	2 555,6	3 122,8	280	1 682,9	1 485,8	1 880,0
80 à 84 ans	531	2 218,1	2 029,5	2 406,8	283	2 898,1	2 560,4	3 235,8	248	1 749,7	1 531,9	1 967,4
85 ans et plus	469	1 951,3	1 774,7	2 127,9	210	2 636,9	2 280,2	2 993,5	259	1 611,6	1 415,3	1 807,9
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0
2005												
Tous les âges	4 805	485,3	471,6	499,1	2 651	538,7	518,2	559,2	2 154	432,6	414,3	450,8
0 à 4 ans	15	25,3	14,2	41,7	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	17	22,1	12,9	35,4	11	27,8	13,9	49,7	6	16,1	5,9	35,0
20 à 24 ans	24	32,4	20,8	48,2	16	41,5	23,7	67,4	8	22,5	9,7	44,4
25 à 29 ans	30	47,5	32,0	67,8	10	31,2	15,0	57,3	20	64,3	39,3	99,3
30 à 34 ans	32	54,9	37,6	77,5	13	44,4	23,6	75,9	19	65,5	39,4	102,2
35 à 39 ans	55	91,9	67,6	116,2	17	56,8	33,1	90,9	38	127,1	90,0	174,5
40 à 44 ans	137	182,7	152,1	213,3	53	141,4	103,3	179,4	84	224,1	176,2	272,0
45 à 49 ans	200	262,7	226,3	299,2	73	189,6	146,1	233,0	127	337,7	279,0	396,4
50 à 54 ans	317	469,0	417,4	520,7	134	392,0	325,6	458,4	183	547,9	468,5	627,2
55 à 59 ans	396	712,9	642,6	783,1	209	751,6	649,7	853,4	187	674,1	577,5	770,7
60 à 64 ans	550	1 297,6	1 189,1	1 406,0	322	1 537,6	1 369,6	1 705,5	228	1 063,2	925,2	1 201,2
65 à 69 ans	629	1 745,5	1 609,1	1 881,9	398	2 279,6	2 055,7	2 503,6	231	1 243,5	1 083,2	1 403,9
70 à 74 ans	651	1 941,6	1 792,5	2 090,8	420	2 653,5	2 399,7	2 907,3	231	1 305,0	1 136,7	1 473,3
75 à 79 ans	696	2 295,2	2 124,7	2 465,7	429	3 168,4	2 868,6	3 468,2	267	1 590,8	1 400,0	1 781,6
80 à 84 ans	565	2 363,3	2 168,4	2 558,2	307	3 174,8	2 819,6	3 529,9	258	1 812,2	1 591,0	2 033,3
85 ans et plus	477	2 025,6	1 843,9	2 207,4	222	2 856,8	2 481,0	3 232,6	255	1 616,3	1 417,9	1 814,7
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2009) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 1-10
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie — Alberta

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
	nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux		
2006												
Tous les âges	13 643	404,8	398,0	411,6	7 242	424,4	414,7	434,2	6 401	384,6	375,2	394,0
0 à 4 ans	52	25,0	18,2	31,7	26	24,4	16,0	35,8	26	25,5	16,7	37,4
5 à 9 ans	27	13,1	8,6	19,1	18	17,0	10,1	26,9	9	9,0	4,1	17,0
10 à 14 ans	25	11,2	7,3	16,6	14	12,2	6,7	20,5	11	10,2	5,1	18,3
15 à 19 ans	45	18,8	13,7	25,2	24	19,5	12,5	29,0	21	18,1	11,2	27,6
20 à 24 ans	85	32,1	25,3	38,9	43	31,4	22,7	42,3	42	32,9	23,7	44,5
25 à 29 ans	133	49,5	41,1	58,0	56	40,1	29,6	50,5	77	59,8	46,5	73,2
30 à 34 ans	202	80,3	69,2	91,4	67	51,4	39,1	63,6	135	111,5	92,7	130,3
35 à 39 ans	246	98,9	86,5	111,2	85	65,9	51,9	79,9	161	134,4	113,6	155,1
40 à 44 ans	493	179,8	163,9	195,7	153	109,6	92,3	127,0	340	252,6	225,8	279,5
45 à 49 ans	802	290,9	270,7	311,0	320	228,6	203,6	253,7	482	355,1	323,4	386,8
50 à 54 ans	1 135	482,2	454,2	510,3	577	483,3	443,8	522,7	558	481,1	441,2	521,1
55 à 59 ans	1 540	815,5	774,8	856,2	804	841,2	783,1	899,4	736	789,2	732,1	846,2
60 à 64 ans	1 602	1 189,4	1 131,2	1 247,7	934	1 379,6	1 291,1	1 468,1	668	997,2	921,6	1 072,8
65 à 69 ans	1 710	1 665,7	1 586,8	1 744,7	1 044	2 075,8	1 949,8	2 201,7	666	1 271,9	1 175,3	1 368,5
70 à 74 ans	1 710	1 989,4	1 895,1	2 083,7	1 034	2 515,2	2 361,9	2 668,5	676	1 507,4	1 393,7	1 621,0
75 à 79 ans	1 616	2 263,0	2 152,7	2 373,3	939	2 869,8	2 686,2	3 053,4	677	1 749,8	1 618,0	1 881,6
80 à 84 ans	1 207	2 412,7	2 276,6	2 548,9	650	3 200,6	2 954,5	3 446,6	557	1 874,3	1 718,7	2 030,0
85 ans et plus	1 013	2 395,3	2 247,8	2 542,8	454	3 312,4	3 007,7	3 617,1	559	1 955,6	1 793,5	2 117,7
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0
2005												
Tous les âges	13 075	398,5	391,7	405,4	6 884	415,2	405,3	425,0	6 191	381,6	372,1	391,1
0 à 4 ans	34	16,9	11,7	23,7	26	25,4	16,6	37,2	8	8,1	3,5	16,0
5 à 9 ans	27	13,1	8,6	19,1	20	18,9	11,6	29,2	7	7,0	2,8	14,4
10 à 14 ans	21	9,5	5,9	14,4	11	9,6	4,8	17,2	10	9,3	4,5	17,1
15 à 19 ans	50	21,1	15,3	27,0	30	24,7	16,7	35,3	20	17,4	10,6	26,9
20 à 24 ans	79	31,0	24,2	37,8	43	32,7	23,7	44,0	36	29,2	20,4	40,4
25 à 29 ans	132	51,6	42,8	60,4	53	39,9	29,1	50,6	79	64,4	50,2	78,6
30 à 34 ans	182	74,5	63,7	85,4	61	48,2	36,1	60,3	121	102,9	84,5	121,2
35 à 39 ans	255	105,4	92,5	118,4	97	77,9	62,4	93,4	158	134,7	113,7	155,7
40 à 44 ans	514	185,2	169,2	201,2	178	126,6	108,0	145,2	336	245,5	219,2	271,7
45 à 49 ans	789	293,4	272,9	313,9	317	232,1	206,6	257,7	472	356,6	324,4	388,8
50 à 54 ans	1 059	474,3	445,7	502,9	477	421,1	383,3	458,9	582	529,1	486,1	572,1
55 à 59 ans	1 378	769,5	728,9	810,2	775	857,2	796,8	917,5	603	680,1	625,8	734,4
60 à 64 ans	1 493	1 168,8	1 109,5	1 228,1	832	1 298,0	1 209,8	1 386,2	661	1 038,6	959,4	1 117,8
65 à 69 ans	1 612	1 624,2	1 544,9	1 703,5	977	2 009,8	1 883,7	2 135,8	635	1 254,0	1 156,5	1 351,6
70 à 74 ans	1 742	2 041,7	1 945,9	2 137,6	1 037	2 534,4	2 380,1	2 688,7	705	1 587,8	1 470,6	1 705,0
75 à 79 ans	1 573	2 271,4	2 159,2	2 383,7	921	2 924,7	2 735,8	3 113,6	652	1 726,6	1 594,1	1 859,2
80 à 84 ans	1 169	2 400,5	2 262,9	2 538,1	602	3 081,3	2 835,2	3 327,5	567	1 944,4	1 784,3	2 104,4
85 ans et plus	966	2 420,8	2 268,1	2 573,5	427	3 343,3	3 026,1	3 660,4	539	1 986,6	1 818,9	2 154,3
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2009) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 1-11
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie — Colombie-Britannique

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2006												
Tous les âges	19 484	451,0	444,7	457,3	10 354	483,4	474,1	492,7	9 130	419,2	410,6	427,8
0 à 4 ans	48	23,1	17,0	30,7	26	24,4	15,9	35,8	22	21,8	13,6	33,0
5 à 9 ans	33	14,6	10,1	20,6	18	15,5	9,2	24,5	15	13,7	7,7	22,7
10 à 14 ans	35	13,5	9,4	18,7	25	18,7	12,1	27,6	10	7,9	3,8	14,6
15 à 19 ans	44	15,6	11,4	21,0	26	18,1	11,8	26,5	18	13,1	7,8	20,7
20 à 24 ans	82	26,6	20,8	32,4	48	30,4	22,4	40,3	34	22,6	15,7	31,6
25 à 29 ans	132	46,1	38,3	54,0	63	43,8	33,0	54,6	69	48,5	37,1	59,9
30 à 34 ans	184	63,9	54,6	73,1	71	49,5	37,9	61,0	113	78,2	63,8	92,6
35 à 39 ans	303	95,1	84,4	105,9	100	63,4	50,9	75,8	203	126,4	109,0	143,8
40 à 44 ans	567	160,6	147,4	173,8	166	94,6	80,2	109,0	401	225,8	203,7	248,0
45 à 49 ans	910	255,4	238,8	271,9	320	181,6	161,7	201,5	590	327,6	301,1	354,0
50 à 54 ans	1 446	441,4	418,6	464,1	628	387,0	356,7	417,3	818	494,7	460,8	528,6
55 à 59 ans	1 887	646,4	617,2	675,5	957	660,0	618,2	701,8	930	632,9	592,2	673,6
60 à 64 ans	2 259	1 051,4	1 008,1	1 094,8	1 301	1 223,9	1 157,4	1 290,4	958	882,5	826,6	938,4
65 à 69 ans	2 564	1 526,4	1 467,3	1 585,5	1 530	1 854,5	1 761,5	1 947,4	1 034	1 209,8	1 136,0	1 283,5
70 à 74 ans	2 640	1 839,9	1 769,7	1 910,0	1 588	2 251,2	2 140,5	2 362,0	1 052	1 442,1	1 354,9	1 529,2
75 à 79 ans	2 598	2 136,3	2 054,2	2 218,5	1 551	2 739,2	2 602,8	2 875,5	1 047	1 611,1	1 513,5	1 708,7
80 à 84 ans	2 024	2 243,8	2 146,0	2 341,5	1 113	2 997,5	2 821,4	3 173,6	911	1 716,4	1 605,0	1 827,9
85 ans et plus	1 728	2 204,3	2 100,3	2 308,2	823	3 101,3	2 889,4	3 313,2	905	1 745,2	1 631,5	1 858,9
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0
2005												
Tous les âges	19 054	447,3	440,9	453,6	10 001	473,4	464,1	482,6	9 053	421,6	412,9	430,3
0 à 4 ans	46	22,3	16,3	29,7	25	23,6	15,2	34,8	21	21,0	13,0	32,0
5 à 9 ans	21	9,1	5,7	14,0	14	11,9	6,5	19,9	7	6,3	2,5	12,9
10 à 14 ans	30	11,5	7,8	16,4	21	15,7	9,7	24,0	9	7,1	3,3	13,5
15 à 19 ans	37	13,2	9,3	18,2	20	13,9	8,5	21,5	17	12,5	7,3	20,0
20 à 24 ans	92	30,3	24,1	36,5	46	29,5	21,6	39,4	46	31,1	22,8	41,5
25 à 29 ans	122	43,8	36,0	51,5	53	37,8	27,7	48,0	69	49,7	38,0	61,5
30 à 34 ans	188	64,5	55,3	73,7	80	55,0	43,0	67,1	108	73,9	59,9	87,8
35 à 39 ans	322	102,4	91,2	113,6	106	68,0	55,1	81,0	216	136,1	118,0	154,3
40 à 44 ans	620	173,6	160,0	187,3	212	119,3	103,3	135,4	408	227,4	205,3	249,5
45 à 49 ans	953	272,0	254,8	289,3	342	197,7	176,7	218,6	611	344,6	317,3	371,9
50 à 54 ans	1 373	432,0	409,1	454,8	606	384,1	353,6	414,7	767	479,1	445,2	513,0
55 à 59 ans	1 925	692,4	661,4	723,3	1 006	727,9	682,9	772,9	919	657,2	614,7	699,7
60 à 64 ans	2 201	1 070,8	1 026,1	1 115,6	1 233	1 213,0	1 145,3	1 280,7	968	931,7	873,0	990,4
65 à 69 ans	2 379	1 465,0	1 406,2	1 523,9	1 407	1 757,5	1 665,7	1 849,4	972	1 180,6	1 106,4	1 254,8
70 à 74 ans	2 650	1 859,6	1 788,8	1 930,4	1 617	2 308,6	2 196,1	2 421,1	1 033	1 425,6	1 338,7	1 512,5
75 à 79 ans	2 545	2 139,9	2 056,8	2 223,1	1 440	2 635,4	2 499,3	2 771,6	1 105	1 718,8	1 617,4	1 820,1
80 à 84 ans	1 944	2 178,3	2 081,5	2 275,2	1 030	2 839,8	2 666,4	3 013,2	914	1 725,4	1 613,6	1 837,3
85 ans et plus	1 606	2 190,4	2 083,3	2 297,6	743	3 022,8	2 805,4	3 240,1	863	1 770,7	1 652,5	1 888,8
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2009) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 1-12
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie — Yukon

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
	nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux		
2006												
Tous les âges	88	282,0	223,0	340,9	36	229,1	160,4	317,1	52	335,6	244,4	426,8
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25 à 29 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30 à 34 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
35 à 39 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40 à 44 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45 à 49 ans	13	422,9	225,1	723,2	x	x	x	x	x	x	x	x
50 à 54 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
55 à 59 ans	11	497,5	248,3	890,1	x	x	x	x	x	x	x	x
60 à 64 ans	9	589,8	270,0	1 119,3	x	x	x	x	x	x	x	x
65 à 69 ans	9	969,8	444,0	1 840,5	x	x	x	x	x	x	x	x
70 à 74 ans	15	2 340,1	1 310,5	3 859,6	x	x	x	x	x	x	x	x
75 à 79 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80 à 84 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85 ans et plus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0
2005												
Tous les âges	100	322,1	258,9	385,2	42	268,6	193,6	363,0	58	376,3	279,4	473,1
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25 à 29 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30 à 34 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
35 à 39 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40 à 44 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45 à 49 ans	13	426,8	227,2	729,8	x	x	x	x	x	x	x	x
50 à 54 ans	10	376,5	180,7	692,4	x	x	x	x	x	x	x	x
55 à 59 ans	15	723,9	405,4	1 194,0	x	x	x	x	x	x	x	x
60 à 64 ans	9	641,0	293,4	1 216,5	x	x	x	x	x	x	x	x
65 à 69 ans	10	1 148,1	551,1	2 111,4	x	x	x	x	x	x	x	x
70 à 74 ans	16	2 623,0	1 500,0	4 259,0	9	2 786,4	1 275,5	5 287,9	7	2 439,0	979,1	5 024,4
75 à 79 ans	10	2 824,9	1 355,9	5 194,9	x	x	x	x	x	x	x	x
80 à 84 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85 ans et plus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2009) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 1-13
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie — Territoires du Nord-Ouest

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
	nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux		
2006												
Tous les âges	99	233,5	187,5	279,5	57	260,6	192,9	328,2	42	204,6	147,5	276,5
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25 à 29 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30 à 34 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
35 à 39 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40 à 44 ans	6	170,7	62,6	371,7	x	x	x	x	x	x	x	x
45 à 49 ans	10	323,6	155,3	595,1	x	x	x	x	x	x	x	x
50 à 54 ans	9	348,7	159,6	661,8	x	x	x	x	x	x	x	x
55 à 59 ans	21	1 012,0	626,5	1 547,0	11	976,0	487,1	1 746,2	10	1 054,9	506,3	1 939,9
60 à 64 ans	19	1 436,1	864,7	2 242,6	11	1 394,2	695,8	2 494,3	8	1 498,1	646,1	2 951,3
65 à 69 ans	16	1 970,4	1 126,8	3 199,5	x	x	x	x	x	x	x	x
70 à 74 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
75 à 79 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80 à 84 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85 ans et plus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0
2005												
Tous les âges	103	241,1	194,5	287,6	60	272,1	203,2	340,9	43	208,0	150,5	280,2
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25 à 29 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30 à 34 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
35 à 39 ans	7	191,5	76,9	394,5	x	x	x	x	x	x	x	x
40 à 44 ans	8	219,4	94,6	432,3	x	x	x	x	x	x	x	x
45 à 49 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
50 à 54 ans	7	267,9	107,5	551,9	x	x	x	x	x	x	x	x
55 à 59 ans	16	805,2	460,5	1 307,5	8	729,9	314,8	1 438,0	8	897,9	387,2	1 768,8
60 à 64 ans	9	740,1	338,8	1 404,6	x	x	x	x	x	x	x	x
65 à 69 ans	12	1 552,4	802,1	2 711,5	6	1 411,8	517,6	3 072,9	6	1 724,1	632,2	3 752,9
70 à 74 ans	11	2 079,4	1 037,8	3 720,2	x	x	x	x	x	x	x	x
75 à 79 ans	10	2 967,4	1 424,3	5 457,0	x	x	x	x	x	x	x	x
80 à 84 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85 ans et plus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2009) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 1-14
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le groupe d'âge, le sexe et la géographie — Nunavut

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
	nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux		
2006												
Tous les âges	59	194,1	144,6	243,6	28	179,0	119,0	258,7	31	210,0	142,7	298,1
0 à 4 ans	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25 à 29 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30 à 34 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
35 à 39 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40 à 44 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45 à 49 ans	8	507,0	218,6	998,7	x	x	x	x	x	x	x	x
50 à 54 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
55 à 59 ans	10	1 062,7	510,1	1 954,3	x	x	x	x	x	x	x	x
60 à 64 ans	7	1 065,4	427,7	2 194,8	x	x	x	x	x	x	x	x
65 à 69 ans	11	2 417,6	1 206,6	4 325,3	x	x	x	x	x	x	x	x
70 à 74 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
75 à 79 ans	7	6 796,1	2 728,2	14 000,0	x	x	x	x	x	x	x	x
80 à 84 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85 ans et plus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0
2005												
Tous les âges	73	243,2	187,4	299,0	39	251,3	178,7	343,5	34	234,6	162,5	327,8
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25 à 29 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30 à 34 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
35 à 39 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40 à 44 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45 à 49 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
50 à 54 ans	6	511,1	187,4	1 112,4	x	x	x	x	x	x	x	x
55 à 59 ans	11	1 199,6	598,7	2 146,1	x	x	x	x	x	x	x	x
60 à 64 ans	12	1 851,9	956,8	3 234,6	6	1 785,7	654,8	3 886,9	6	1 923,1	705,1	4 185,9
65 à 69 ans	8	1 980,2	854,0	3 901,0	x	x	x	x	x	x	x	x
70 à 74 ans	11	5 116,3	2 553,5	9 153,5	x	x	x	x	x	x	x	x
75 à 79 ans	8	8 888,9	3 833,3	17 511,1	x	x	x	x	x	x	x	x
80 à 84 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85 ans et plus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2009) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 2-1
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Canada

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2006												
Total, tous les sièges primaires de cancer	157 194	449,5	447,3	451,6	82 133	519,6	516,2	522,9	75 061	396,7	393,9	399,4
Lèvre (C00.0-C00.9)	333	0,8	0,7	0,9	244	1,4	1,2	1,6	89	0,4	0,3	0,5
Langue (C01.9-C02.9)	860	2,2	2,0	2,3	581	3,1	2,8	3,3	279	1,3	1,2	1,5
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	358	0,9	0,8	1,0	201	1,1	1,0	1,3	157	0,8	0,6	0,9
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	231	0,6	0,5	0,7	155	0,8	0,7	1,0	76	0,4	0,3	0,4
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	445	1,1	1,0	1,2	227	1,2	1,1	1,4	218	1,0	0,9	1,1
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	207	0,5	0,5	0,6	132	0,7	0,6	0,8	75	0,4	0,3	0,5
Oropharynx (C10.0-C10.9)	99	0,2	0,2	0,3	84	0,4	0,3	0,5	15	0,1	0,0	0,1
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	207	0,5	0,5	0,6	165	0,9	0,8	1,1	42	0,2	0,1	0,3
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	566	1,4	1,3	1,5	427	2,2	2,0	2,4	139	0,7	0,5	0,8
Oesophage (C15.0-C15.9)	1 492	3,7	3,5	3,9	1 092	5,9	5,6	6,3	400	1,8	1,6	1,9
Estomac (C16.0-C16.9)	2 977	7,4	7,1	7,7	1 910	10,6	10,2	11,1	1 067	4,8	4,5	5,1
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	622	1,6	1,4	1,7	330	1,8	1,6	2,0	292	1,3	1,2	1,5
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9-C26.0)	19 679	49,1	48,4	49,8	10 754	59,9	58,8	61,1	8 925	40,0	39,1	40,8
Célon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	13 226	32,9	32,3	33,5	6 754	37,9	37,0	38,8	6 472	28,8	28,0	29,5
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	6 453	16,2	15,8	16,6	4 000	22,0	21,3	22,7	2 453	11,2	10,8	11,7
Anus (C21.0-C21.8)	515	1,3	1,2	1,4	220	1,2	1,0	1,3	295	1,4	1,2	1,5
Foie (C22.0)	1 423	3,6	3,4	3,7	1 048	5,6	5,3	6,0	375	1,7	1,5	1,9
Vésicule biliaire (C23.9)	407	1,0	0,9	1,1	128	0,7	0,6	0,9	279	1,3	1,1	1,4
Pancréas (C25.0-C25.9)	3 572	8,9	8,6	9,1	1 763	9,8	9,3	10,2	1 809	8,0	7,6	8,4
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	1 571	3,9	3,7	4,1	760	4,2	3,9	4,6	811	3,7	3,5	4,0
Larynx (C32.0-C32.9)	1 009	2,6	2,4	2,7	843	4,6	4,3	5,0	166	0,8	0,7	0,9
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	22 085	55,8	55,1	56,6	12 053	67,7	66,5	68,9	10 032	47,1	46,2	48,0
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	342	0,9	0,8	1,0	215	1,2	1,1	1,4	127	0,6	0,5	0,7
Os et articulations (C40.0-C41.9)	301	0,9	0,8	1,0	161	1,0	0,8	1,1	140	0,8	0,7	0,9
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	1 050	2,9	2,7	3,1	610	3,5	3,3	3,8	440	2,3	2,1	2,5
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	4 549	11,9	11,6	12,3	2 433	13,4	12,9	14,0	2 116	10,9	10,4	11,4
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	349	0,9	0,8	1,0	166	1,0	0,8	1,1	183	0,8	0,7	1,0
Sein (C50.0-C50.9)	20 484	51,3	50,6	52,0	147	0,8	0,7	1,0	20 337	97,3	95,9	98,6
Col utérin (C53.0-C53.9)	1 314	3,7	3,5	3,9	1 314	7,4	6,9	7,8
Corps utérin (C54.0-C54.9)	4 095	10,2	9,9	10,5	4 095	19,5	18,9	20,1
Utérus, sans autre indication (C55.9)	132	0,3	0,3	0,4	132	0,6	0,5	0,7
Ovaire (C56.9)	2 405	6,1	5,8	6,3	2 405	11,5	11,0	12,0
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	699	1,7	1,6	1,9	699	3,2	3,0	3,5
Prostate (C61.9)	22 480	57,9	57,1	58,6	22 480	125,4	123,8	127,1
Testicule (C62.0-C62.9)	844	2,8	2,6	3,0	844	5,6	5,2	5,9
Verge (C60.0-C60.9)	133	0,3	0,3	0,4	133	0,7	0,6	0,9
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	43	0,1	0,1	0,1	43	0,2	0,2	0,3
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	6 534	16,3	15,9	16,7	4 862	27,4	26,6	28,2	1 672	7,5	7,1	7,9
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	4 379	11,0	10,7	11,4	2 710	14,7	14,1	15,2	1 669	7,9	7,5	8,3
Urètre (C66.9)	177	0,4	0,4	0,5	109	0,6	0,5	0,7	68	0,3	0,2	0,4
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	249	0,6	0,5	0,7	161	0,9	0,8	1,1	88	0,4	0,3	0,5
Oeil (C69.0-C69.9)	258	0,7	0,6	0,8	152	0,9	0,7	1,0	106	0,5	0,4	0,7
Cerveau (C71.0-C71.9)	2 295	6,2	5,9	6,5	1 316	7,4	7,0	7,8	979	5,1	4,8	5,4

Tableau 2-1 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Canada

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	118	0,3	0,3	0,4	53	0,3	0,2	0,4	65	0,4	0,3	0,5
Thyroïde (C73.9)	3 879	10,8	10,5	11,2	882	5,0	4,6	5,3	2 997	16,7	16,1	17,3
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	269	0,8	0,7	0,8	139	0,8	0,7	0,9	130	0,7	0,6	0,8
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	877	2,7	2,5	2,9	481	3,0	2,7	3,2	396	2,4	2,2	2,7
Lymphomes non hodgkiniens	6 492	16,7	16,3	17,1	3 470	19,3	18,7	20,0	3 022	14,4	13,9	14,9
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	1 995	4,9	4,7	5,2	1 106	6,2	5,8	6,5	889	4,0	3,7	4,2
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	371	1,3	1,1	1,4	209	1,4	1,2	1,6	162	1,1	0,9	1,2
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	1 913	4,7	4,5	5,0	1 151	6,4	6,0	6,8	762	3,4	3,2	3,6
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	1 053	2,8	2,6	3,0	567	3,3	3,0	3,6	486	2,4	2,2	2,6
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	447	1,2	1,1	1,3	248	1,4	1,2	1,6	199	1,0	0,8	1,1
Autres leucémies	655	1,7	1,6	1,8	352	2,0	1,8	2,2	303	1,4	1,2	1,6
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	6 831	16,8	16,4	17,2	3 373	19,1	18,4	19,7	3 458	15,0	14,4	15,5
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	461	1,2	1,1	1,3	389	2,2	2,0	2,5	72	0,3	0,3	0,4
Sarcome de Kaposi (M-9140)	63	0,2	0,1	0,2	54	0,3	0,2	0,4	9	0,0	0,0	0,1
2005												
Total, tous les sièges primaires de cancer	154 637	453,8	451,6	455,9	80 367	524,5	521,1	527,9	74 270	401,1	398,3	403,9
Lèvre (C00.0-C00.9)	296	0,8	0,7	0,8	221	1,3	1,1	1,5	75	0,3	0,3	0,4
Langue (C01.9-C02.9)	816	2,1	2,0	2,3	552	3,0	2,8	3,3	264	1,3	1,1	1,5
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	402	1,1	1,0	1,2	241	1,4	1,2	1,6	161	0,8	0,7	0,9
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	219	0,6	0,5	0,6	148	0,8	0,7	1,0	71	0,3	0,3	0,4
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	463	1,2	1,1	1,3	242	1,4	1,2	1,5	221	1,0	0,9	1,2
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	228	0,6	0,5	0,7	158	0,9	0,7	1,0	70	0,4	0,3	0,5
Oropharynx (C10.0-C10.9)	123	0,3	0,3	0,4	98	0,5	0,4	0,6	25	0,1	0,1	0,2
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	214	0,6	0,5	0,6	178	1,0	0,8	1,1	36	0,2	0,1	0,2
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	609	1,5	1,4	1,7	440	2,3	2,1	2,5	169	0,8	0,7	0,9
Oesophage (C15.0-C15.9)	1 492	3,8	3,6	4,0	1 104	6,2	5,9	6,6	388	1,7	1,6	1,9
Estomac (C16.0-C16.9)	3 021	7,7	7,4	8,0	1 918	11,0	10,5	11,5	1 103	5,0	4,7	5,4
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	575	1,5	1,4	1,6	323	1,8	1,6	2,0	252	1,2	1,0	1,3
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9-C26.0)	19 721	50,5	49,8	51,2	10 651	61,2	60,0	62,3	9 070	41,4	40,6	42,3
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	13 314	33,9	33,4	34,5	6 722	38,8	37,9	39,7	6 592	29,9	29,1	30,6
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	6 407	16,5	16,1	16,9	3 929	22,4	21,7	23,1	2 478	11,6	11,1	12,0
Anus (C21.0-C21.8)	513	1,3	1,2	1,4	208	1,2	1,0	1,3	305	1,4	1,3	1,6
Foie (C22.0)	1 386	3,6	3,4	3,8	1 043	5,8	5,4	6,2	343	1,6	1,4	1,8
Vésicule biliaire (C23.9)	405	1,0	0,9	1,1	125	0,7	0,6	0,9	280	1,3	1,1	1,4
Pancréas (C25.0-C25.9)	3 771	9,5	9,2	9,9	1 794	10,2	9,8	10,7	1 977	8,8	8,4	9,2
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	1 554	3,9	3,7	4,1	740	4,3	4,0	4,6	814	3,7	3,4	3,9
Larynx (C32.0-C32.9)	1 112	2,9	2,7	3,1	924	5,2	4,9	5,5	188	0,9	0,8	1,0
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	22 187	57,6	56,8	58,3	12 237	70,8	69,5	72,1	9 950	47,6	46,6	48,5
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	357	1,0	0,9	1,1	210	1,2	1,1	1,4	147	0,7	0,6	0,9
Os et articulations (C40.0-C41.9)	328	1,0	0,9	1,1	181	1,1	0,9	1,2	147	0,9	0,7	1,0
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	1 030	2,8	2,6	3,0	568	3,3	3,0	3,6	462	2,4	2,2	2,6

Tableau 2-1 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Canada

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes						Hommes			Femmes		
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	4 298	11,5	11,1	11,8	2 233	12,7	12,1	13,2	2 065	10,6	10,2	11,1
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	290	0,8	0,7	0,8	143	0,9	0,7	1,0	147	0,7	0,6	0,8
Sein (C50.0-C50.9)	20 249	51,9	51,1	52,6	157	0,9	0,7	1,0	20 092	98,1	96,7	99,5
Col utérin (C53.0-C53.9)	1 285	3,7	3,5	3,9	1 285	7,2	6,8	7,6
Corps utérin (C54.0-C54.9)	3 846	9,9	9,5	10,2	3 846	18,8	18,2	19,4
Utérus, sans autre indication (C55.9)	157	0,4	0,3	0,5	157	0,7	0,6	0,8
Ovaire (C56.9)	2 464	6,4	6,1	6,7	2 464	12,1	11,6	12,6
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	766	1,9	1,8	2,1	766	3,6	3,3	3,9
Prostate (C61.9)	21 075	55,7	54,9	56,4	21 075	121,6	119,9	123,2
Testicule (C62.0-C62.9)	853	2,9	2,7	3,1	853	5,8	5,4	6,2
Verge (C60.0-C60.9)	119	0,3	0,3	0,4	119	0,7	0,6	0,8
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	66	0,2	0,1	0,2	66	0,4	0,3	0,5
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	6 475	16,5	16,1	16,9	4 770	27,6	26,8	28,4	1 705	7,8	7,4	8,1
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	4 129	10,7	10,4	11,1	2 545	14,3	13,7	14,9	1 584	7,6	7,2	8,0
Urètre (C66.9)	208	0,5	0,5	0,6	124	0,7	0,6	0,9	84	0,4	0,3	0,4
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	232	0,6	0,5	0,7	182	1,1	0,9	1,2	50	0,2	0,2	0,3
Oeil (C69.0-C69.9)	256	0,7	0,6	0,8	141	0,8	0,7	1,0	115	0,6	0,5	0,7
Cerveau (C71.0-C71.9)	2 317	6,4	6,2	6,7	1 299	7,5	7,1	7,9	1 018	5,4	5,1	5,8
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	143	0,4	0,3	0,5	66	0,4	0,3	0,5	77	0,4	0,3	0,5
Thyroïde (C73.9)	3 752	10,7	10,3	11,1	827	4,7	4,4	5,0	2 925	16,7	16,0	17,3
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	296	0,9	0,8	1,0	144	0,9	0,7	1,0	152	0,8	0,7	1,0
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	873	2,7	2,5	2,9	489	3,0	2,8	3,3	384	2,4	2,2	2,6
Lymphomes non hodgkiniens	6 383	16,7	16,3	17,1	3 488	19,9	19,2	20,6	2 895	14,0	13,5	14,5
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	1 937	4,9	4,7	5,2	1 094	6,3	5,9	6,6	843	3,9	3,6	4,2
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	367	1,3	1,1	1,4	211	1,4	1,2	1,6	156	1,1	0,9	1,2
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	1 883	4,8	4,6	5,0	1 128	6,5	6,1	6,9	755	3,4	3,2	3,7
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	997	2,7	2,5	2,9	546	3,2	2,9	3,5	451	2,3	2,1	2,5
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	439	1,2	1,1	1,3	251	1,5	1,3	1,7	188	0,9	0,8	1,1
Autres leucémies	643	1,7	1,6	1,8	370	2,2	2,0	2,4	273	1,3	1,1	1,5
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	6 495	16,3	15,9	16,7	3 325	19,4	18,7	20,1	3 170	14,0	13,5	14,5
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	464	1,2	1,1	1,3	365	2,1	1,9	2,3	99	0,5	0,4	0,6
Sarcome de Kaposi (M-9140)	58	0,2	0,1	0,2	52	0,3	0,2	0,4	6	0,0	0,0	0,1

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2009) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 2-2

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Terre-Neuve-et-Labrador

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2006												
Total, tous les sièges primaires de cancer	2 503	452,5	435,8	469,1	1 425	551,9	525,0	578,8	1 078	369,1	348,2	390,0
Lèvre (C00.0-C00.9)	13	2,2	1,0	3,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	7	1,1	0,2	2,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	8	1,1	0,3	1,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	6	0,9	0,2	1,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	8	1,1	0,3	1,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Oesophage (C15.0-C15.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Estomac (C16.0-C16.9)	72	11,3	8,6	13,9	48	15,9	11,3	20,5	24	7,6	4,5	10,7
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	17	2,4	1,2	3,5	7	2,1	0,5	3,8	10	2,6	1,0	4,2
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9-C26.0)	446	67,1	60,8	73,4	256	83,2	72,8	93,5	190	54,0	46,2	61,8
Célon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	301	45,7	40,5	51,0	159	53,0	44,6	61,3	142	40,5	33,7	47,2
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	145	21,3	17,8	24,8	97	30,2	24,1	36,3	48	13,5	9,6	17,4
Anus (C21.0-C21.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Foie (C22.0)	14	2,1	1,0	3,2	x	x	x	x	x	x	x	x
Vésicule biliaire (C23.9)	9	1,4	0,5	2,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Pancréas (C25.0-C25.9)	35	5,3	3,5	7,1	26	8,2	5,0	11,4	9	2,8	0,9	4,7
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	20	3,1	1,7	4,5	11	3,7	1,5	5,9	9	2,6	0,9	4,4
Larynx (C32.0-C32.9)	20	2,9	1,6	4,2	x	x	x	x	x	x	x	x
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	339	52,4	46,7	58,0	200	66,2	56,9	75,5	139	40,8	33,9	47,7
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Os et articulations (C40.0-C41.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	14	2,4	1,1	3,6	7	2,4	0,5	4,3	7	2,2	0,6	3,9
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	68	10,8	8,1	13,4	37	12,5	8,4	16,7	31	9,8	6,2	13,3
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	15	2,5	1,2	3,8	7	2,8	0,7	4,9	8	2,0	0,6	3,4
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	281	79,6	70,1	89,2
Col utérin (C53.0-C53.9)	25	5,2	3,1	7,3	25	10,1	6,0	14,2
Corps utérin (C54.0-C54.9)	59	8,6	6,3	10,8	59	16,6	12,2	20,9
Utérus, sans autre indication (C55.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Ovaire (C56.9)	25	3,8	2,3	5,4	25	7,5	4,5	10,6
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Prostate (C61.9)	416	63,7	57,5	69,9	416	133,9	120,9	146,9
Testicule (C62.0-C62.9)	15	3,4	1,6	5,2	15	7,1	3,4	10,8
Verge (C60.0-C60.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	127	19,7	16,3	23,2	95	33,4	26,6	40,2	32	8,9	5,8	12,1
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	76	11,3	8,7	13,8	51	15,5	11,2	19,8	25	7,2	4,4	10,1
Urètre (C66.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oeil (C69.0-C69.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Tableau 2-2 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Terre-Neuve-et-Labrador

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	38	6,2	4,1	8,4	9	2,5	0,8	4,2	29	9,8	6,0	13,6
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	10	2,0	0,7	3,2	x	x	x	x	x	x	x	x
Lymphomes non hodgkiniens	109	17,2	13,9	20,6	46	15,8	11,1	20,5	63	18,6	13,9	23,4
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	7	0,9	0,2	1,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	8	1,2	0,4	2,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres leucémies	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	52	7,7	5,6	9,9	17	5,6	2,9	8,4	35	9,5	6,3	12,7
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Sarcome de Kaposi (M-9140)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
2005												
Total, tous les sièges primaires de cancer	2 327	432,7	416,2	449,1	1 242	506,2	479,9	532,4	1 085	374,7	353,6	395,8
Lèvre (C00.0-C00.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	10	1,7	0,6	2,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	9	1,4	0,5	2,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	8	1,2	0,3	2,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	11	1,6	0,6	2,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Oesophage (C15.0-C15.9)	24	3,7	2,2	5,2	x	x	x	x	x	x	x	x
Estomac (C16.0-C16.9)	79	12,3	9,6	15,0	55	19,2	14,1	24,4	24	6,7	4,0	9,5
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	8	1,4	0,4	2,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)	435	67,0	60,6	73,3	242	82,0	71,5	92,5	193	53,9	46,2	61,7
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	300	46,5	41,1	51,8	153	52,5	44,1	61,0	147	41,2	34,5	48,0
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	135	20,5	17,0	24,0	89	29,5	23,3	35,8	46	12,7	8,9	16,4
Anus (C21.0-C21.8)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Foie (C22.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vésicule biliaire (C23.9)	6	1,0	0,2	1,8	0	0,0	0,0	0,0	6	1,8	0,4	3,3
Pancréas (C25.0-C25.9)	29	4,6	2,9	6,3	20	6,7	3,7	9,7	9	2,6	0,9	4,3
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	14	2,0	0,9	3,0	8	2,6	0,7	4,4	6	1,6	0,3	2,9
Larynx (C32.0-C32.9)	33	5,1	3,3	6,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	309	48,0	42,6	53,4	183	61,2	52,2	70,2	126	36,8	30,3	43,4
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Tableau 2-2 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Terre-Neuve-et-Labrador

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	15	2,8	1,3	4,2	9	3,8	1,2	6,4	6	1,7	0,3	3,0
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	66	10,6	8,0	13,3	29	9,6	6,0	13,2	37	11,7	7,8	15,6
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	12	2,1	0,9	3,3	6	2,3	0,5	4,2	6	2,1	0,3	4,0
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	316	91,4	81,1	101,7
Col utérin (C53.0-C53.9)	10	2,1	0,7	3,5	10	4,0	1,4	6,7
Corps utérin (C54.0-C54.9)	57	8,5	6,2	10,7	57	16,5	12,1	20,8
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ovaire (C56.9)	20	2,9	1,6	4,2	20	5,6	3,1	8,1
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	14	2,2	1,0	3,4	14	3,9	1,8	6,0
Prostate (C61.9)	288	45,3	40,0	50,6	288	95,9	84,7	107,1
Testicule (C62.0-C62.9)	10	2,4	0,9	3,9	10	4,9	1,7	8,0
Verge (C60.0-C60.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	107	16,8	13,6	20,1	71	26,1	19,9	32,3	36	10,3	6,9	13,7
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	70	11,2	8,5	13,8	42	13,9	9,6	18,1	28	8,9	5,5	12,3
Uretrère (C66.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oeil (C69.0-C69.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	51	8,4	6,0	10,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	67	10,8	8,1	13,5	19	5,8	3,1	8,6	48	15,5	10,9	20,1
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	x	x	x	x	x	x	x	x	7	2,9	0,7	5,1
Lymphomes non hodgkiniens	69	11,3	8,6	14,0	45	15,7	11,1	20,4	24	7,5	4,4	10,6
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	15	2,5	1,2	3,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	9	1,5	0,5	2,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	6	0,9	0,2	1,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres leucémies	6	0,9	0,2	1,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	79	12,3	9,5	15,0	46	15,8	11,1	20,4	33	9,9	6,5	13,4
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2009) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 2-3

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Île-du-Prince-Édouard

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2006												
Total, tous les sièges primaires de cancer	765	484,0	450,9	517,1	447	610,3	555,8	664,8	318	383,4	342,5	424,3
Lèvre (C00.0-C00.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Langue (C01.9-C02.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Oesophage (C15.0-C15.9)	x	x	x	x	7	9,0	2,3	15,7	x	x	x	x
Estomac (C16.0-C16.9)	7	4,5	1,0	7,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	6	2,9	0,5	5,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9-C26.0)	94	52,6	41,6	63,5	45	55,6	39,2	71,9	49	50,4	35,3	65,5
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	63	35,5	26,4	44,5	30	37,1	23,7	50,5	33	34,3	21,7	46,9
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	31	17,1	10,9	23,3	15	18,5	9,1	27,9	16	16,1	7,7	24,4
Anus (C21.0-C21.8)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Foie (C22.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vésicule biliaire (C23.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Pancréas (C25.0-C25.9)	15	7,8	3,8	11,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Larynx (C32.0-C32.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	109	61,2	49,6	72,8	56	70,9	52,3	89,6	53	55,7	40,4	71,1
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Os et articulations (C40.0-C41.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	30	16,4	10,4	22,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	77	82,0	63,3	100,7
Col utérin (C53.0-C53.9)	6	3,3	0,6	6,0	6	6,5	1,2	11,8
Corps utérin (C54.0-C54.9)	17	8,6	4,5	12,8	17	16,1	8,2	24,0
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ovaire (C56.9)	9	4,9	1,7	8,2	9	9,4	3,2	15,6
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Prostate (C61.9)	148	82,5	69,1	96,0	148	175,2	146,8	203,7
Testicule (C62.0-C62.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Verge (C60.0-C60.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	39	21,7	14,8	28,6	31	39,6	25,6	53,5	8	8,9	2,5	15,2
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	28	15,7	9,8	21,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Urètre (C66.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oeil (C69.0-C69.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Tableau 2-3 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Île-du-Prince-Édouard

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	9	5,4	1,8	9,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Lymphomes non hodgkiniens	23	13,4	7,8	19,0	12	15,0	6,5	23,5	11	11,4	4,3	18,6
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	9	6,3	2,0	10,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres leucémies	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	38	21,6	14,6	28,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Sarcome de Kaposi (M-9140)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
2005												
Total, tous les sièges primaires de cancer	755	499,4	465,4	533,3	412	593,7	539,1	648,3	343	419,4	376,8	462,1
Lèvre (C00.0-C00.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Langue (C01.9-C02.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oropharynx (C10.0-C10.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Oesophage (C15.0-C15.9)	10	5,7	2,2	9,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Estomac (C16.0-C16.9)	14	7,9	3,7	12,1	7	8,5	2,2	14,9	7	7,3	1,8	12,7
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)	108	61,2	49,4	72,9	50	65,4	47,1	83,7	58	58,1	42,6	73,5
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	78	44,4	34,4	54,4	34	43,8	29,0	58,5	44	44,2	30,7	57,7
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	30	16,8	10,6	23,0	16	21,6	10,9	32,4	14	13,9	6,4	21,4
Anus (C21.0-C21.8)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Foie (C22.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Vésicule biliaire (C23.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Pancréas (C25.0-C25.9)	19	10,1	5,5	14,7	10	12,0	4,5	19,5	9	7,9	2,6	13,2
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	9	5,8	2,0	9,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Larynx (C32.0-C32.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	111	64,4	52,3	76,4	62	77,9	58,4	97,4	49	52,6	37,5	67,7
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0

Tableau 2-3 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Île-du-Prince-Édouard

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	31	18,0	11,4	24,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	78	83,5	64,4	102,5
Col utérin (C53.0-C53.9)	6	3,9	0,5	7,3	6	7,0	0,6	13,4
Corps utérin (C54.0-C54.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ovaire (C56.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Prostate (C61.9)	108	63,6	51,5	75,7	108	136,7	110,8	162,5
Testicule (C62.0-C62.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Verge (C60.0-C60.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	32	17,9	11,6	24,1	22	29,6	17,2	41,9	10	9,1	3,3	15,0
Rein et bassin du rein (C64.9, C65.9)	28	16,6	10,4	22,8	20	25,4	14,2	36,6	8	8,2	2,4	14,1
Uretrère (C66.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oeil (C69.0-C69.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	8	6,3	1,8	10,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Lymphomes non hodgkiniens	31	17,8	11,5	24,2	18	23,1	12,4	33,8	13	13,2	5,9	20,5
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	12	6,7	2,9	10,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	11	6,5	2,6	10,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	9	5,5	1,7	9,2	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres leucémies	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	42	22,9	15,9	30,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Sarcome de Kaposi (M-9140)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2009) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 2-4

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Nouvelle-Écosse

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2006												
Total, tous les sièges primaires de cancer	5 759	534,1	520,9	547,3	3 134	636,0	614,8	657,2	2 625	454,0	437,1	470,9
Lèvre (C00.0-C00.9)	6	0,5	0,1	1,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	20	1,6	0,9	2,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	9	0,7	0,2	1,2	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	10	0,8	0,3	1,2	10	1,6	0,6	2,6	0	0,0	0,0	0,0
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	15	1,2	0,6	1,8	7	1,2	0,3	2,1	8	1,1	0,3	1,9
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	19	1,4	0,8	2,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Oesophage (C15.0-C15.9)	67	5,3	4,0	6,5	50	8,9	6,4	11,4	17	2,4	1,2	3,6
Estomac (C16.0-C16.9)	96	7,5	6,0	9,0	60	10,5	7,8	13,2	36	4,8	3,2	6,5
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	25	2,0	1,2	2,8	13	2,3	1,0	3,6	12	1,7	0,7	2,7
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9-C26.0)	780	62,3	57,8	66,7	405	72,6	65,5	79,8	375	53,8	48,2	59,5
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	515	40,8	37,2	44,4	234	42,6	37,1	48,1	281	39,6	34,8	44,5
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	265	21,5	18,9	24,1	171	30,1	25,5	34,6	94	14,2	11,2	17,2
Anus (C21.0-C21.8)	20	1,6	0,9	2,3	7	1,2	0,3	2,1	13	2,0	0,9	3,1
Foie (C22.0)	38	3,1	2,1	4,0	32	5,7	3,7	7,6	6	0,7	0,1	1,4
Vésicule biliaire (C23.9)	16	1,2	0,6	1,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Pancréas (C25.0-C25.9)	128	9,9	8,1	11,6	57	10,1	7,5	12,7	71	9,7	7,4	12,1
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	50	4,0	2,9	5,1	22	4,0	2,3	5,6	28	4,0	2,5	5,6
Larynx (C32.0-C32.9)	36	2,9	1,9	3,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	849	69,2	64,5	73,9	479	86,2	78,4	93,9	370	56,4	50,5	62,2
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	12	1,0	0,4	1,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	28	2,8	1,7	3,9	13	2,6	1,1	4,1	15	2,9	1,3	4,4
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	206	18,0	15,5	20,6	113	20,7	16,8	24,6	93	15,9	12,5	19,3
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	22	1,7	1,0	2,5	13	2,4	1,1	3,7	9	1,2	0,4	2,0
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	705	108,1	99,9	116,4
Col utérin (C53.0-C53.9)	49	4,9	3,5	6,3	49	9,6	6,8	12,4
Corps utérin (C54.0-C54.9)	118	9,6	7,8	11,3	118	18,2	14,9	21,6
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ovaire (C56.9)	62	4,8	3,6	6,0	62	8,9	6,6	11,1
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	27	2,1	1,3	2,9	27	3,9	2,4	5,5
Prostate (C61.9)	910	74,8	69,9	79,7	910	162,4	151,8	173,0
Testicule (C62.0-C62.9)	26	3,3	2,0	4,6	26	6,6	4,0	9,2
Verge (C60.0-C60.9)	6	0,5	0,1	0,9	6	1,0	0,2	1,8
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	269	21,3	18,8	23,9	212	38,2	33,0	43,3	57	7,7	5,6	9,7
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	210	16,9	14,6	19,2	131	22,7	18,8	26,7	79	12,1	9,3	14,8
Urètre (C66.9)	13	1,0	0,4	1,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	12	1,0	0,4	1,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Cerveau (C71.0-C71.9)	70	6,4	4,8	7,9	36	6,8	4,5	9,1	34	6,0	3,8	8,2

Tableau 2-4 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Nouvelle-Écosse

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	6	0,7	0,1	1,2	x	x	x	x	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	112	10,4	8,4	12,4	30	5,4	3,4	7,4	82	15,1	11,7	18,6
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	31	3,6	2,3	4,9	10	2,2	0,8	3,6	21	4,9	2,7	7,1
Lymphomes non hodgkiniens	206	16,7	14,4	19,0	107	18,6	15,1	22,2	99	15,0	12,0	18,1
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	68	5,2	3,9	6,4	43	7,6	5,3	9,9	25	3,2	1,9	4,5
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	8	0,8	0,2	1,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	53	4,2	3,0	5,3	26	4,6	2,8	6,3	27	3,9	2,4	5,4
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	44	3,8	2,6	5,0	30	5,7	3,6	7,7	14	2,1	0,9	3,3
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	12	0,9	0,4	1,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres leucémies	17	1,4	0,7	2,1	10	1,9	0,7	3,1	7	0,9	0,2	1,6
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	225	17,5	15,2	19,9	128	23,0	19,0	27,0	97	13,1	10,4	15,9
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	14	1,2	0,5	1,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
2005												
Total, tous les sièges primaires de cancer	5 341	504,0	491,1	516,9	2 828	591,7	571,0	612,4	2 513	434,5	418,0	451,0
Lèvre (C00.0-C00.9)	9	0,7	0,2	1,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	23	1,9	1,1	2,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	12	0,9	0,4	1,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	14	1,1	0,5	1,7	7	1,2	0,3	2,1	7	0,8	0,2	1,5
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	11	1,0	0,4	1,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	17	1,4	0,7	2,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Oesophage (C15.0-C15.9)	61	5,1	3,8	6,4	45	8,3	5,8	10,7	16	2,2	1,1	3,4
Estomac (C16.0-C16.9)	94	7,6	6,0	9,1	65	11,8	8,9	14,7	29	4,3	2,7	5,9
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	18	1,5	0,8	2,2	10	1,9	0,7	3,1	8	1,1	0,3	2,0
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)	739	59,4	55,1	63,8	384	70,2	63,1	77,3	355	49,9	44,5	55,3
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	488	38,8	35,3	42,3	238	43,5	37,9	49,0	250	34,4	30,0	38,9
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	251	20,6	18,0	23,2	146	26,7	22,3	31,1	105	15,4	12,3	18,5
Anus (C21.0-C21.8)	16	1,2	0,6	1,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Foie (C22.0)	20	1,6	0,9	2,3	13	2,4	1,1	3,7	7	1,0	0,2	1,7
Vésicule biliaire (C23.9)	15	1,2	0,6	1,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Pancréas (C25.0-C25.9)	137	11,0	9,1	12,9	66	12,1	9,1	15,0	71	10,0	7,6	12,4
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	54	4,4	3,2	5,6	24	4,5	2,7	6,3	30	4,5	2,8	6,1
Larynx (C32.0-C32.9)	34	2,8	1,9	3,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	843	69,9	65,2	74,7	480	88,7	80,7	96,6	363	56,1	50,2	62,0
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	10	0,8	0,3	1,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	9	0,9	0,3	1,6	x	x	x	x	x	x	x	x

Tableau 2-4 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Nouvelle-Écosse

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	39	3,6	2,4	4,8	22	4,1	2,3	5,8	17	3,2	1,6	4,8
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	174	14,7	12,5	17,0	85	15,4	12,0	18,7	89	14,3	11,2	17,4
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	21	1,5	0,8	2,1	7	1,3	0,3	2,3	14	1,6	0,7	2,5
Sein (C50.0-C50.9)	676	55,6	51,3	59,8	14	2,6	1,2	4,0	662	102,7	94,7	110,8
Col utérin (C53.0-C53.9)	46	4,8	3,3	6,2	46	9,2	6,4	12,0
Corps utérin (C54.0-C54.9)	124	10,3	8,5	12,2	124	19,7	16,2	23,3
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ovaire (C56.9)	69	5,6	4,3	7,0	69	10,6	8,0	13,1
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	26	2,1	1,3	3,0	26	3,7	2,2	5,3
Prostate (C61.9)	729	61,4	56,9	65,9	729	133,4	123,7	143,1
Testicule (C62.0-C62.9)	24	3,0	1,8	4,3	24	6,2	3,6	8,7
Verge (C60.0-C60.9)	7	0,6	0,1	1,0	7	1,2	0,3	2,2
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	237	19,0	16,6	21,5	179	32,9	28,0	37,8	58	8,4	6,1	10,6
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	185	14,9	12,7	17,0	115	20,5	16,7	24,3	70	10,0	7,6	12,3
Uretrère (C66.9)	9	0,8	0,3	1,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Oeil (C69.0-C69.9)	8	0,6	0,2	1,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Cerveau (C71.0-C71.9)	80	7,2	5,6	8,9	53	9,7	7,0	12,4	27	4,7	2,9	6,6
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	98	9,5	7,6	11,5	29	5,6	3,5	7,7	69	13,5	10,2	16,8
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	13	1,2	0,5	1,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	26	2,8	1,7	3,9	17	3,7	1,9	5,5	9	1,9	0,6	3,3
Lymphomes non hodgkiniens	203	17,3	14,9	19,8	95	18,0	14,3	21,7	108	16,8	13,5	20,1
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	57	4,7	3,5	5,9	31	5,8	3,7	7,9	26	3,7	2,2	5,1
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	9	1,0	0,3	1,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	58	4,7	3,4	5,9	32	5,7	3,7	7,7	26	3,9	2,4	5,5
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	29	2,4	1,5	3,3	18	3,3	1,7	4,8	11	1,7	0,6	2,7
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	13	1,1	0,5	1,7	7	1,2	0,3	2,1	6	1,0	0,2	1,9
Autres leucémies	17	1,4	0,7	2,1	11	2,2	0,9	3,4	6	0,7	0,1	1,3
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	202	16,2	13,9	18,5	116	21,9	17,9	25,9	86	11,4	8,9	13,9
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2009) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 2-5
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Nouveau-Brunswick

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2006												
Total, tous les sièges primaires de cancer	4 254	490,4	476,2	504,7	2 320	594,2	571,1	617,3	1 934	407,2	389,3	425,2
Lèvre (C00.0-C00.9)	18	1,8	1,0	2,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	14	1,5	0,7	2,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	9	0,9	0,3	1,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	9	0,9	0,3	1,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	6	0,5	0,1	1,0	6	1,2	0,2	2,2	0	0,0	0,0	0,0
Oropharynx (C10.0-C10.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	18	1,7	0,9	2,5	11	2,1	0,8	3,3	7	1,3	0,3	2,3
Oesophage (C15.0-C15.9)	35	3,5	2,3	4,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Estomac (C16.0-C16.9)	89	9,3	7,3	11,2	55	12,8	9,3	16,2	34	6,4	4,2	8,6
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	14	1,5	0,7	2,2	8	2,0	0,6	3,3	6	0,9	0,2	1,7
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9-C26.0)	496	49,3	44,9	53,7	284	63,6	56,1	71,1	212	37,5	32,2	42,7
Célon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	303	30,0	26,5	33,4	158	36,1	30,4	41,8	145	24,8	20,6	28,9
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	193	19,4	16,6	22,2	126	27,5	22,6	32,4	67	12,7	9,5	15,9
Anus (C21.0-C21.8)	12	1,1	0,5	1,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Foie (C22.0)	24	2,4	1,4	3,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Vésicule biliaire (C23.9)	7	0,8	0,2	1,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Pancréas (C25.0-C25.9)	110	11,1	9,0	13,3	51	12,3	8,9	15,7	59	9,7	7,1	12,3
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	31	3,1	2,0	4,2	13	3,1	1,4	4,9	18	3,1	1,6	4,6
Larynx (C32.0-C32.9)	24	2,5	1,5	3,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	689	71,0	65,7	76,4	371	85,8	77,0	94,6	318	60,0	53,3	66,7
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	7	0,7	0,2	1,2	x	x	x	x	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	6	0,8	0,1	1,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	27	2,9	1,8	4,0	18	4,2	2,2	6,2	9	1,7	0,6	2,9
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	142	15,1	12,6	17,7	69	15,6	11,9	19,4	73	14,8	11,2	18,4
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	17	1,8	0,9	2,6	8	2,0	0,6	3,3	9	1,7	0,5	2,9
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	488	92,2	83,8	100,6
Col utérin (C53.0-C53.9)	27	3,0	1,8	4,2	27	5,8	3,5	8,1
Corps utérin (C54.0-C54.9)	115	11,3	9,2	13,4	115	21,5	17,5	25,4
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ovaire (C56.9)	59	6,0	4,4	7,5	59	11,2	8,2	14,1
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	13	1,3	0,6	2,1	13	2,5	1,1	3,9
Prostate (C61.9)	725	76,7	71,0	82,3	725	164,6	152,6	176,7
Testicule (C62.0-C62.9)	12	1,7	0,7	2,6	12	3,3	1,4	5,3
Verge (C60.0-C60.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	201	20,1	17,3	22,9	154	35,2	29,6	40,8	47	8,9	6,3	11,5
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	134	14,1	11,6	16,5	81	18,3	14,2	22,3	53	10,2	7,4	13,0
Urètre (C66.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	7	0,7	0,2	1,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Cerveau (C71.0-C71.9)	68	7,7	5,8	9,6	32	7,2	4,6	9,8	36	8,2	5,4	11,0

Tableau 2-5 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Nouveau-Brunswick

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	119	14,5	11,8	17,2	32	7,6	4,9	10,3	87	21,4	16,6	26,1
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	23	2,9	1,7	4,2	10	2,6	0,9	4,2	13	3,3	1,4	5,2
Lymphomes non hodgkiniens	184	19,3	16,4	22,2	98	22,2	17,7	26,7	86	16,6	13,0	20,3
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	47	4,8	3,4	6,2	26	6,0	3,7	8,3	21	3,8	2,2	5,5
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	32	3,2	2,1	4,4	17	3,7	1,9	5,5	15	2,7	1,3	4,1
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	21	2,5	1,4	3,7	14	3,4	1,5	5,3	7	1,8	0,4	3,2
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	13	1,4	0,6	2,2	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres leucémies	11	1,0	0,4	1,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	116	11,6	9,5	13,8	57	13,0	9,6	16,5	59	10,6	7,7	13,4
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	8	0,9	0,3	1,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Sarcome de Kaposi (M-9140)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
2005												
Total, tous les sièges primaires de cancer	4 155	488,3	474,0	502,6	2 248	591,1	567,9	614,4	1 907	410,6	392,6	428,7
Lèvre (C00.0-C00.9)	12	1,4	0,6	2,2	x	x	x	x	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	12	1,3	0,6	2,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	13	1,3	0,6	2,1	7	1,9	0,5	3,3	6	0,9	0,2	1,7
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	9	0,9	0,3	1,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	9	1,0	0,3	1,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	17	1,7	0,9	2,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Oesophage (C15.0-C15.9)	48	5,0	3,5	6,4	34	7,5	4,9	10,1	14	2,6	1,2	4,0
Estomac (C16.0-C16.9)	76	7,7	5,9	9,4	53	12,4	9,0	15,8	23	4,3	2,5	6,2
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	9	1,0	0,3	1,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)	516	52,4	47,8	57,0	286	66,1	58,4	73,9	230	41,7	36,1	47,3
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	323	32,8	29,1	36,4	163	37,7	31,9	43,6	160	28,9	24,3	33,5
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	193	19,6	16,8	22,5	123	28,4	23,4	33,5	70	12,8	9,7	16,0
Anus (C21.0-C21.8)	11	1,1	0,4	1,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Foie (C22.0)	10	1,0	0,4	1,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Vésicule biliaire (C23.9)	7	0,7	0,2	1,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Pancréas (C25.0-C25.9)	115	11,6	9,4	13,7	53	12,6	9,2	16,0	62	10,5	7,8	13,2
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	35	3,4	2,2	4,5	11	2,4	1,0	3,9	24	4,1	2,4	5,8
Larynx (C32.0-C32.9)	31	3,2	2,1	4,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	661	69,0	63,7	74,3	364	86,1	77,2	95,0	297	56,8	50,2	63,4
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	8	0,9	0,2	1,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	6	0,7	0,1	1,3	x	x	x	x	x	x	x	x

Tableau 2-5 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Nouveau-Brunswick

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	25	2,6	1,6	3,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	131	14,1	11,7	16,6	82	19,0	14,8	23,1	49	10,1	7,2	13,1
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	15	1,6	0,8	2,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	520	100,0	91,2	108,8
Col utérin (C53.0-C53.9)	32	3,6	2,3	4,9	32	6,9	4,4	9,4
Corps utérin (C54.0-C54.9)	90	9,4	7,4	11,3	90	17,7	14,0	21,5
Utérus, sans autre indication (C55.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Ovaire (C56.9)	57	6,1	4,4	7,7	57	11,4	8,3	14,4
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	22	2,4	1,4	3,5	22	4,6	2,6	6,6
Prostate (C61.9)	639	68,3	63,0	73,7	639	148,4	136,8	160,0
Testicule (C62.0-C62.9)	16	2,2	1,1	3,3	16	4,6	2,3	6,8
Verge (C60.0-C60.9)	6	0,7	0,1	1,3	6	1,6	0,3	2,8
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	197	20,4	17,5	23,2	146	34,0	28,4	39,6	51	9,7	7,0	12,4
Rein et bassin du rein (C64.9, C65.9)	134	14,4	11,9	16,9	85	19,1	14,9	23,2	49	10,5	7,5	13,6
Uretrère (C66.9)	6	0,6	0,1	1,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Oeil (C69.0-C69.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cerveau (C71.0-C71.9)	57	6,2	4,5	7,8	32	7,0	4,5	9,4	25	5,5	3,2	7,8
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	113	12,6	10,2	15,0	20	4,5	2,4	6,5	93	20,5	16,1	24,9
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	27	4,0	2,5	5,5	18	5,2	2,8	7,6	9	2,8	0,9	4,7
Lymphomes non hodgkiniens	178	18,5	15,7	21,2	90	21,2	16,7	25,6	88	16,5	13,0	20,0
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	48	5,1	3,6	6,6	28	6,5	4,0	8,9	20	4,0	2,2	5,8
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	10	1,7	0,6	2,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	34	3,4	2,2	4,5	25	5,4	3,2	7,5	9	1,6	0,5	2,7
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	22	2,6	1,5	3,7	11	2,7	1,1	4,4	11	2,5	0,9	4,0
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	9	1,0	0,3	1,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres leucémies	16	1,7	0,8	2,6	9	2,2	0,7	3,7	7	1,2	0,3	2,1
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	104	10,2	8,2	12,2	53	12,4	9,0	15,8	51	8,6	6,1	11,0
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	12	1,2	0,5	1,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2009) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 2-6

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Québec¹

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2006												
Total, tous les sièges primaires de cancer	39 257	451,1	446,8	455,3	20 144	530,2	523,3	537,2	19 113	398,5	393,0	404,0
Lèvre (C00.0-C00.9)	67	0,7	0,5	0,8	51	1,2	0,9	1,5	16	0,3	0,1	0,4
Langue (C01.9-C02.9)	184	1,9	1,6	2,2	125	2,8	2,3	3,3	59	1,1	0,8	1,4
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	90	1,0	0,8	1,2	44	1,1	0,8	1,4	46	1,0	0,7	1,3
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	60	0,6	0,4	0,8	48	1,0	0,7	1,3	12	0,2	0,1	0,3
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	96	1,0	0,8	1,2	52	1,2	0,9	1,5	44	0,8	0,6	1,1
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	40	0,4	0,3	0,6	24	0,6	0,3	0,8	16	0,3	0,2	0,5
Oropharynx (C10.0-C10.9)	39	0,4	0,3	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	59	0,6	0,4	0,8	49	1,1	0,8	1,4	10	0,2	0,1	0,3
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	150	1,5	1,2	1,7	110	2,3	1,8	2,7	40	0,7	0,5	1,0
Oesophage (C15.0-C15.9)	337	3,4	3,0	3,7	248	5,5	4,8	6,2	89	1,6	1,2	1,9
Estomac (C16.0-C16.9)	820	8,2	7,7	8,8	526	12,3	11,2	13,3	294	5,2	4,6	5,8
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	150	1,5	1,2	1,7	84	1,9	1,5	2,3	66	1,2	0,9	1,5
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9-C26.0)	5 030	50,5	49,1	52,0	2 748	63,6	61,2	66,0	2 282	40,3	38,6	42,0
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	3 298	33,0	31,9	34,2	1 697	39,7	37,8	41,6	1 601	28,0	26,6	29,4
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	1 732	17,5	16,7	18,3	1 051	23,9	22,4	25,3	681	12,3	11,4	13,3
Anus (C21.0-C21.8)	96	1,0	0,8	1,2	49	1,1	0,8	1,4	47	0,9	0,6	1,2
Foie (C22.0)	364	3,7	3,3	4,1	258	5,8	5,1	6,6	106	1,8	1,5	2,2
Vésicule biliaire (C23.9)	94	0,9	0,7	1,1	26	0,6	0,4	0,9	68	1,2	0,9	1,5
Pancréas (C25.0-C25.9)	995	10,0	9,3	10,6	478	10,9	9,9	11,9	517	9,1	8,3	9,9
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	455	4,5	4,1	5,0	216	5,1	4,4	5,8	239	4,3	3,7	4,8
Larynx (C32.0-C32.9)	349	3,6	3,2	3,9	294	6,5	5,8	7,3	55	1,1	0,8	1,4
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	6 667	67,0	65,3	68,6	3 809	88,0	85,2	90,9	2 858	52,6	50,7	54,6
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	107	1,1	0,9	1,3	72	1,7	1,3	2,1	35	0,6	0,4	0,8
Os et articulations (C40.0-C41.9)	82	1,0	0,8	1,2	42	1,1	0,8	1,4	40	0,9	0,6	1,2
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	218	2,4	2,1	2,8	112	2,7	2,2	3,2	106	2,2	1,8	2,7
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	541	5,9	5,4	6,4	273	6,3	5,5	7,1	268	5,8	5,1	6,5
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	146	1,5	1,3	1,8	64	1,6	1,2	2,0	82	1,5	1,2	1,9
Sein (C50.0-C50.9)	5 146	51,9	50,5	53,3	34	0,8	0,5	1,1	5 112	97,7	94,9	100,4
Col utérin (C53.0-C53.9)	307	3,6	3,2	4,0	307	7,0	6,1	7,8
Corps utérin (C54.0-C54.9)	915	9,0	8,4	9,6	915	17,0	15,8	18,1
Utérus, sans autre indication (C55.9)	47	0,5	0,3	0,6	47	0,9	0,6	1,1
Ovaire (C56.9)	602	6,1	5,6	6,5	602	11,2	10,3	12,2
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	139	1,3	1,1	1,6	139	2,4	2,0	2,8
Prostate (C61.9)	4 184	42,3	41,0	43,6	4 184	95,4	92,4	98,3
Testicule (C62.0-C62.9)	183	2,7	2,3	3,1	183	5,3	4,5	6,0
Verge (C60.0-C60.9)	25	0,3	0,2	0,4	25	0,6	0,3	0,8
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	11	0,1	0,0	0,2	11	0,3	0,1	0,4
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	2 117	21,4	20,4	22,3	1 554	36,1	34,3	37,9	563	10,0	9,2	10,8
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	1 201	12,1	11,4	12,8	738	16,3	15,1	17,5	463	8,5	7,7	9,3
Urètre (C66.9)	71	0,7	0,5	0,9	40	0,9	0,6	1,2	31	0,5	0,3	0,7
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	21	0,2	0,1	0,3	12	0,3	0,1	0,4	9	0,2	0,1	0,3
Oeil (C69.0-C69.9)	58	0,6	0,5	0,8	34	0,8	0,5	1,1	24	0,5	0,3	0,7
Cerveau (C71.0-C71.9)	654	7,2	6,6	7,7	368	8,5	7,7	9,4	286	5,9	5,2	6,6

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-6 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Québec¹

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	26	0,3	0,2	0,5	11	0,3	0,1	0,4	15	0,4	0,2	0,6
Thyroïde (C73.9)	860	9,7	9,0	10,4	202	4,6	3,9	5,2	658	14,7	13,5	15,9
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	80	0,9	0,7	1,1	38	0,9	0,6	1,2	42	0,9	0,6	1,2
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	216	2,8	2,4	3,2	133	3,5	2,9	4,2	83	2,1	1,6	2,5
Lymphomes non hodgkiniens	1 519	15,8	15,0	16,6	822	19,2	17,8	20,5	697	13,1	12,1	14,1
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	512	5,1	4,6	5,5	294	6,8	6,0	7,6	218	3,8	3,3	4,3
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	84	1,2	1,0	1,5	43	1,3	0,9	1,7	41	1,2	0,8	1,6
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	418	4,1	3,7	4,5	253	6,1	5,3	6,9	165	2,7	2,3	3,1
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	247	2,7	2,4	3,0	126	3,0	2,5	3,6	121	2,5	2,1	3,0
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	94	1,0	0,8	1,2	52	1,3	0,9	1,6	42	0,8	0,5	1,0
Autres leucémies	157	1,6	1,4	1,9	82	2,0	1,5	2,4	75	1,4	1,0	1,7
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	1 967	19,4	18,5	20,3	943	22,8	21,3	24,3	1 024	17,1	16,1	18,2
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	142	1,5	1,2	1,7	111	2,6	2,1	3,1	31	0,6	0,4	0,8
Sarcome de Kaposi (M-9140)	18	0,2	0,1	0,3	x	x	x	x	x	x	x	x
2005												
Total, tous les sièges primaires de cancer	40 021	473,0	468,6	477,5	20 516	559,4	552,1	566,6	19 505	416,5	410,8	422,2
Lèvre (C00.0-C00.9)	47	0,5	0,3	0,6	34	0,8	0,5	1,1	13	0,2	0,1	0,4
Langue (C01.9-C02.9)	196	2,0	1,8	2,3	140	3,2	2,6	3,7	56	1,1	0,8	1,4
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	99	1,1	0,9	1,3	52	1,3	0,9	1,6	47	1,0	0,7	1,3
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	54	0,6	0,4	0,7	35	0,8	0,5	1,1	19	0,4	0,2	0,5
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	113	1,2	1,0	1,4	66	1,6	1,2	1,9	47	0,9	0,6	1,1
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	37	0,4	0,3	0,5	19	0,4	0,2	0,6	18	0,4	0,2	0,6
Oropharynx (C10.0-C10.9)	43	0,5	0,3	0,6	34	0,8	0,5	1,0	9	0,2	0,1	0,3
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	57	0,6	0,4	0,7	50	1,1	0,8	1,5	7	0,1	0,0	0,2
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	171	1,7	1,5	2,0	116	2,5	2,0	3,0	55	1,1	0,8	1,3
Oesophage (C15.0-C15.9)	371	3,8	3,4	4,2	288	6,8	6,0	7,6	83	1,5	1,2	1,8
Estomac (C16.0-C16.9)	866	8,9	8,3	9,5	515	12,4	11,3	13,5	351	6,2	5,6	6,9
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	158	1,6	1,4	1,9	80	1,9	1,5	2,3	78	1,4	1,1	1,7
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)	5 186	53,6	52,1	55,1	2 763	66,3	63,8	68,8	2 423	43,6	41,8	45,4
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	3 484	35,8	34,6	37,0	1 720	41,7	39,7	43,6	1 764	31,5	30,0	33,0
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	1 702	17,8	16,9	18,6	1 043	24,7	23,2	26,2	659	12,1	11,2	13,1
Anus (C21.0-C21.8)	94	1,0	0,8	1,2	35	0,8	0,5	1,1	59	1,1	0,8	1,4
Foie (C22.0)	405	4,2	3,8	4,6	300	7,1	6,3	7,9	105	1,9	1,5	2,3
Vésicule biliaire (C23.9)	110	1,1	0,9	1,3	33	0,8	0,5	1,0	77	1,4	1,1	1,7
Pancréas (C25.0-C25.9)	1 098	11,2	10,5	11,9	504	11,9	10,8	12,9	594	10,5	9,6	11,3
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	468	4,7	4,3	5,2	212	5,2	4,5	5,9	256	4,4	3,8	5,0
Larynx (C32.0-C32.9)	375	3,9	3,5	4,3	303	7,0	6,2	7,8	72	1,4	1,0	1,7
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	6 932	71,7	70,0	73,4	4 041	96,8	93,8	99,8	2 891	54,1	52,1	56,1
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	109	1,2	1,0	1,4	64	1,6	1,2	2,0	45	0,9	0,6	1,2
Os et articulations (C40.0-C41.9)	91	1,1	0,9	1,4	48	1,2	0,8	1,5	43	1,1	0,7	1,4

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-6 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Québec¹

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	223	2,5	2,2	2,9	126	3,1	2,6	3,7	97	2,0	1,6	2,4
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	581	6,5	5,9	7,0	288	6,9	6,0	7,7	293	6,3	5,6	7,1
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	113	1,2	1,0	1,4	53	1,4	1,0	1,8	60	1,1	0,8	1,4
Sein (C50.0-C50.9)	5 185	53,6	52,1	55,1	40	1,0	0,7	1,3	5 145	100,1	97,3	102,9
Col utérin (C53.0-C53.9)	293	3,4	3,0	3,8	293	6,7	5,9	7,5
Corps utérin (C54.0-C54.9)	903	9,1	8,5	9,7	903	17,0	15,9	18,2
Utérus, sans autre indication (C55.9)	79	0,8	0,6	1,0	79	1,5	1,1	1,8
Ovaire (C66.9)	630	6,6	6,1	7,1	630	12,1	11,2	13,1
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	157	1,6	1,4	1,9	157	2,9	2,4	3,4
Prostate (C61.9)	4 218	43,9	42,5	45,2	4 218	100,8	97,7	103,9
Testicule (C62.0-C62.9)	182	2,7	2,3	3,1	182	5,3	4,5	6,1
Verge (C60.0-C60.9)	28	0,3	0,2	0,4	28	0,6	0,4	0,9
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	21	0,2	0,1	0,3	21	0,5	0,3	0,8
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	2 122	21,8	20,9	22,8	1 568	37,7	35,8	39,6	554	10,1	9,2	10,9
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	1 174	12,2	11,5	12,9	724	16,8	15,6	18,1	450	8,4	7,6	9,2
Uretrère (C66.9)	68	0,7	0,5	0,8	44	1,1	0,7	1,4	24	0,4	0,2	0,6
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	26	0,3	0,2	0,4	18	0,4	0,2	0,6	8	0,1	0,0	0,2
Oeil (C69.0-C69.9)	60	0,7	0,5	0,9	28	0,7	0,4	1,0	32	0,7	0,4	0,9
Cerveau (C71.0-C71.9)	657	7,6	7,0	8,2	376	9,2	8,3	10,2	281	6,2	5,5	7,0
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	40	0,5	0,3	0,6	13	0,4	0,2	0,5	27	0,6	0,4	0,9
Thyroïde (C73.9)	843	10,0	9,3	10,7	195	4,5	3,8	5,1	648	15,4	14,1	16,6
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	93	1,1	0,9	1,4	44	1,1	0,8	1,5	49	1,1	0,8	1,4
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	208	2,7	2,3	3,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Lymphomes non hodgkiniens	1 492	15,8	15,0	16,6	789	18,6	17,3	20,0	703	13,5	12,5	14,5
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	488	5,0	4,6	5,5	276	6,5	5,7	7,3	212	3,8	3,3	4,4
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	109	1,6	1,3	2,0	65	2,0	1,5	2,5	44	1,3	0,9	1,7
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	436	4,4	4,0	4,8	257	6,4	5,6	7,1	179	3,0	2,6	3,5
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	257	2,8	2,4	3,1	146	3,5	3,0	4,1	111	2,3	1,9	2,8
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	125	1,3	1,1	1,6	74	1,9	1,4	2,3	51	1,0	0,7	1,3
Autres leucémies	167	1,8	1,5	2,1	88	2,2	1,7	2,6	79	1,5	1,1	1,8
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	1 783	18,0	17,2	18,9	865	21,7	20,3	23,2	918	15,7	14,6	16,7
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	165	1,8	1,5	2,0	128	3,2	2,6	3,7	37	0,7	0,5	0,9
Sarcome de Kaposi (M-9140)	15	0,2	0,1	0,3	x	x	x	x	x	x	x	x

1. Pour aider à l'interprétation des résultats, il est important de souligner que les cancers déclarés au Fichier des tumeurs du Québec (FITQ) sont ceux ayant fait l'objet d'une hospitalisation ou d'une chirurgie d'un jour. Certains cancers ne sont donc pas déclarés au FITQ s'ils sont diagnostiqués et traités uniquement sur une base externe ou ambulatoire, ou encore ils sont déclarés à un stade plus avancé de la maladie qui requiert une hospitalisation. Une étude d'exhaustivité produite en 2003 évalue entre autres que plus du tiers des cancers de la prostate et des mélanomes ne sont pas déclarés au FITQ en raison de notre source de déclaration. Globalement, 90 % des cas de cancer confirmés par histopathologie seraient déclarés au FITQ. Une étude est en cours pour évaluer la faisabilité d'ajouter les rapports de laboratoires de pathologie comme source de déclaration des cas, ce qui assurerait une exhaustivité plus complète.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2009) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 2-7

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Ontario¹

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2006												
Total, tous les sièges primaires de cancer	61 069	458,9	455,4	462,4	31 711	525,4	519,9	530,9	29 358	407,9	403,3	412,4
Lèvre (C00.0-C00.9)	139	0,9	0,8	1,1	98	1,4	1,1	1,7	41	0,5	0,3	0,6
Langue (C01.9-C02.9)	368	2,4	2,2	2,7	249	3,5	3,0	3,9	119	1,5	1,2	1,7
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	163	1,1	0,9	1,3	100	1,5	1,2	1,8	63	0,8	0,6	1,0
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	96	0,6	0,5	0,8	59	0,8	0,6	1,0	37	0,4	0,3	0,6
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	177	1,2	1,0	1,4	91	1,3	1,1	1,6	86	1,0	0,8	1,3
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	88	0,6	0,5	0,7	58	0,8	0,6	1,0	30	0,4	0,3	0,5
Oropharynx (C10.0-C10.9)	27	0,2	0,1	0,2	x	x	x	x	x	x	x	x
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	63	0,4	0,3	0,5	52	0,8	0,6	1,0	11	0,1	0,1	0,2
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	217	1,4	1,2	1,6	168	2,3	1,9	2,6	49	0,6	0,5	0,8
Oesophage (C15.0-C15.9)	572	3,7	3,4	4,0	409	5,8	5,3	6,4	163	1,9	1,6	2,2
Estomac (C16.0-C16.9)	1 104	7,2	6,8	7,6	698	10,2	9,5	11,0	406	4,8	4,3	5,3
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	225	1,5	1,3	1,7	112	1,6	1,3	1,9	113	1,4	1,1	1,7
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9-C26.0)	7 419	48,8	47,6	49,9	4 035	59,1	57,2	60,9	3 384	39,9	38,5	41,3
Célon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	5 191	34,1	33,2	35,1	2 658	39,2	37,7	40,7	2 533	29,7	28,5	30,9
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	2 228	14,6	14,0	15,3	1 377	19,9	18,8	21,0	851	10,2	9,5	10,9
Anus (C21.0-C21.8)	240	1,6	1,4	1,8	115	1,7	1,3	2,0	125	1,5	1,2	1,8
Foie (C22.0)	547	3,6	3,3	3,9	411	5,8	5,3	6,4	136	1,7	1,4	2,0
Vésicule biliaire (C23.9)	173	1,1	1,0	1,3	54	0,8	0,6	1,0	119	1,4	1,2	1,7
Pancréas (C25.0-C25.9)	1 202	7,9	7,4	8,3	610	8,8	8,1	9,6	592	6,9	6,4	7,5
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	587	3,9	3,5	4,2	315	4,5	4,0	5,1	272	3,3	2,9	3,7
Larynx (C32.0-C32.9)	347	2,3	2,1	2,6	280	4,1	3,6	4,5	67	0,8	0,6	1,0
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	7 660	51,1	49,9	52,2	4 136	61,1	59,2	62,9	3 524	43,3	41,9	44,8
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	128	0,9	0,7	1,0	77	1,1	0,9	1,4	51	0,6	0,5	0,8
Os et articulations (C40.0-C41.9)	123	0,9	0,8	1,1	72	1,1	0,9	1,4	51	0,7	0,5	1,0
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	496	3,5	3,2	3,9	307	4,7	4,1	5,2	189	2,6	2,2	3,0
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	2 176	14,9	14,2	15,5	1 163	16,9	15,9	17,8	1 013	13,5	12,7	14,4
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sein (C50.0-C50.9)	8 031	52,9	51,7	54,0	65	1,0	0,7	1,2	7 966	99,9	97,7	102,1
Col utérin (C53.0-C53.9)	517	3,8	3,4	4,1	517	7,4	6,8	8,1
Corps utérin (C54.0-C54.9)	1 677	11,1	10,6	11,7	1 677	21,2	20,2	22,2
Utérus, sans autre indication (C55.9)	61	0,4	0,3	0,5	61	0,8	0,6	1,0
Ovaire (C56.9)	1 013	6,8	6,4	7,3	1 013	13,0	12,2	13,8
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	346	2,3	2,0	2,5	346	4,3	3,8	4,7
Prostate (C61.9)	9 553	65,0	63,7	66,4	9 553	140,5	137,6	143,3
Testicule (C62.0-C62.9)	333	2,8	2,5	3,1	333	5,6	5,0	6,2
Verge (C60.0-C60.9)	61	0,4	0,3	0,5	61	0,9	0,7	1,1
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	22	0,2	0,1	0,2	22	0,3	0,2	0,5
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	1 727	11,3	10,8	11,8	1 257	18,7	17,6	19,7	470	5,4	4,9	5,9
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	1 577	10,5	10,0	11,1	964	13,8	12,9	14,7	613	7,6	7,0	8,2
Uretere (C66.9)	54	0,4	0,3	0,4	36	0,5	0,4	0,7	18	0,2	0,1	0,3
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	199	1,3	1,1	1,5	131	2,0	1,6	2,3	68	0,8	0,6	1,0
Oeil (C69.0-C69.9)	x	x	x	x	55	0,8	0,6	1,1	x	x	x	x
Cerveau (C71.0-C71.9)	881	6,3	5,8	6,7	530	7,9	7,2	8,6	351	4,8	4,3	5,3

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-7 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Ontario¹

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	67	0,5	0,4	0,6	33	0,5	0,3	0,7	34	0,5	0,3	0,6
Thyroïde (C73.9)	1 999	14,5	13,9	15,2	413	6,1	5,5	6,7	1 586	22,8	21,6	23,9
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	116	0,8	0,7	1,0	63	1,0	0,7	1,2	53	0,7	0,5	0,9
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	357	2,8	2,5	3,1	191	3,0	2,6	3,5	166	2,6	2,2	3,0
Lymphomes non hodgkiniens	2 533	17,1	16,4	17,8	1 348	19,7	18,6	20,8	1 185	14,9	14,1	15,8
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	866	5,7	5,3	6,0	455	6,6	6,0	7,2	411	4,9	4,4	5,3
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	122	1,0	0,9	1,2	76	1,3	1,0	1,6	46	0,7	0,5	1,0
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	777	5,1	4,7	5,4	485	7,1	6,4	7,7	292	3,5	3,0	3,9
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	396	2,7	2,5	3,0	214	3,2	2,8	3,7	182	2,4	2,0	2,7
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	x	x	x	x	94	1,4	1,1	1,7	x	x	x	x
Autres leucémies	324	2,2	2,0	2,4	172	2,6	2,2	2,9	152	1,9	1,6	2,2
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	2 697	17,6	17,0	18,3	1 326	19,6	18,6	20,7	1 371	16,0	15,1	16,9
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	148	1,0	0,8	1,2	129	2,0	1,6	2,3	19	0,2	0,1	0,4
Sarcome de Kaposi (M-9140)	16	0,1	0,1	0,2	x	x	x	x	x	x	x	x
2005												
Total, tous les sièges primaires de cancer	59 407	458,1	454,6	461,7	30 741	524,6	519,1	530,2	28 666	407,8	403,2	412,4
Lèvre (C00.0-C00.9)	130	0,9	0,7	1,0	93	1,4	1,1	1,7	37	0,4	0,3	0,6
Langue (C01.9-C02.9)	336	2,3	2,0	2,5	218	3,1	2,7	3,5	118	1,5	1,2	1,8
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	188	1,3	1,1	1,4	118	1,7	1,4	2,1	70	0,9	0,7	1,2
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	75	0,5	0,4	0,6	58	0,8	0,6	1,0	17	0,2	0,1	0,3
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	188	1,3	1,1	1,5	99	1,4	1,2	1,7	89	1,1	0,9	1,3
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	107	0,8	0,6	0,9	75	1,1	0,8	1,3	32	0,5	0,3	0,6
Oropharynx (C10.0-C10.9)	42	0,3	0,2	0,4	33	0,5	0,3	0,6	9	0,1	0,0	0,2
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	75	0,5	0,4	0,6	61	0,9	0,7	1,1	14	0,2	0,1	0,3
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	241	1,6	1,4	1,8	173	2,4	2,0	2,7	68	0,9	0,7	1,1
Oesophage (C15.0-C15.9)	556	3,7	3,4	4,0	407	6,0	5,4	6,6	149	1,7	1,5	2,0
Estomac (C16.0-C16.9)	1 094	7,4	6,9	7,8	697	10,6	9,8	11,4	397	4,8	4,3	5,3
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	211	1,4	1,2	1,6	123	1,8	1,5	2,2	88	1,1	0,9	1,4
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9-C26.0)	7 365	49,7	48,5	50,8	3 968	59,7	57,9	61,6	3 397	41,1	39,7	42,5
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	5 134	34,6	33,6	35,5	2 612	39,5	38,0	41,1	2 522	30,3	29,1	31,5
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	2 231	15,1	14,5	15,8	1 356	20,2	19,1	21,3	875	10,8	10,0	11,5
Anus (C21.0-C21.8)	260	1,8	1,5	2,0	114	1,7	1,4	2,0	146	1,8	1,5	2,1
Foie (C22.0)	524	3,5	3,2	3,8	400	5,8	5,2	6,3	124	1,6	1,3	1,9
Vésicule biliaire (C23.9)	127	0,8	0,7	1,0	41	0,6	0,4	0,8	86	1,0	0,8	1,3
Pancréas (C25.0-C25.9)	1 271	8,5	8,1	9,0	609	9,2	8,4	9,9	662	7,9	7,3	8,5
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Larynx (C32.0-C32.9)	420	2,9	2,6	3,2	346	5,1	4,6	5,7	74	1,0	0,7	1,2
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	7 577	51,8	50,6	53,0	4 064	61,8	59,9	63,7	3 513	44,2	42,7	45,7
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	150	1,1	0,9	1,2	92	1,4	1,1	1,7	58	0,8	0,6	1,0
Os et articulations (C40.0-C41.9)	143	1,1	0,9	1,3	78	1,2	0,9	1,5	65	1,0	0,7	1,2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-7 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Ontario¹

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	451	3,2	2,9	3,5	243	3,6	3,2	4,1	208	2,9	2,5	3,3
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	1 972	13,8	13,1	14,4	1 037	15,6	14,6	16,5	935	12,5	11,6	13,3
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Sein (C50.0-C50.9)	7 804	52,7	51,5	53,9	68	1,0	0,7	1,2	7 736	99,6	97,4	101,9
Col utérin (C53.0-C53.9)	509	3,7	3,4	4,1	509	7,3	6,6	7,9
Corps utérin (C54.0-C54.9)	1 484	10,1	9,6	10,6	1 484	19,1	18,2	20,1
Utérus, sans autre indication (C55.9)	52	0,3	0,2	0,4	52	0,6	0,5	0,8
Ovaire (C56.9)	1 021	7,0	6,6	7,5	1 021	13,3	12,5	14,2
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	373	2,5	2,2	2,7	373	4,7	4,2	5,1
Prostate (C61.9)	9 041	63,3	62,0	64,6	9 041	137,4	134,6	140,3
Testicule (C62.0-C62.9)	328	2,9	2,5	3,2	328	5,7	5,1	6,4
Verge (C60.0-C60.9)	31	0,2	0,1	0,3	31	0,5	0,3	0,6
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	24	0,2	0,1	0,2	24	0,4	0,2	0,5
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	1 850	12,4	11,8	12,9	1 350	20,6	19,5	21,7	500	5,8	5,3	6,4
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	1 470	10,1	9,6	10,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Uretrère (C66.9)	69	0,5	0,3	0,6	40	0,6	0,4	0,8	29	0,3	0,2	0,5
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	184	1,3	1,1	1,4	148	2,3	1,9	2,7	36	0,4	0,3	0,6
Oeil (C69.0-C69.9)	107	0,8	0,6	0,9	59	0,9	0,7	1,1	48	0,7	0,5	0,8
Cerveau (C71.0-C71.9)	849	6,1	5,7	6,5	449	6,8	6,1	7,4	400	5,5	5,0	6,1
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	74	0,5	0,4	0,7	37	0,6	0,4	0,7	37	0,5	0,4	0,7
Thyroïde (C73.9)	1 906	14,0	13,4	14,7	396	5,8	5,3	6,4	1 510	22,1	20,9	23,2
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	65	0,9	0,7	1,2
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	347	2,7	2,5	3,0	186	3,0	2,5	3,4	161	2,5	2,1	2,9
Lymphomes non hodgkiniens	2 540	17,5	16,8	18,2	1 398	20,9	19,8	22,0	1 142	14,6	13,7	15,4
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	817	5,5	5,1	5,9	447	6,7	6,1	7,3	370	4,5	4,0	5,0
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	114	1,0	0,8	1,2	63	1,1	0,8	1,3	51	0,9	0,6	1,2
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	739	5,0	4,6	5,3	447	6,7	6,1	7,4	292	3,6	3,2	4,0
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	406	2,8	2,6	3,1	206	3,2	2,7	3,6	200	2,5	2,2	2,9
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	154	1,1	0,9	1,3	90	1,4	1,1	1,7	64	0,8	0,6	1,0
Autres leucémies	306	2,1	1,9	2,4	175	2,7	2,3	3,1	131	1,6	1,4	1,9
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	2 496	16,6	16,0	17,3	1 275	19,5	18,4	20,6	1 221	14,5	13,6	15,3
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	136	0,9	0,8	1,1	107	1,6	1,3	1,9	29	0,4	0,2	0,5
Sarcome de Kaposi (M-9140)	12	0,1	0,0	0,1	12	0,2	0,1	0,3	0	0,0	0,0	0,0

1. Les sièges in situ pour la vessie diagnostiqués en Ontario ne sont pas déclarés au Registre canadien du cancer. Les cancers cutanés sans mélanome ne sont pas répertoriés en Ontario. Les sarcomes de Kaposi sont considérablement sous-estimés.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2009) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 2-8

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Manitoba

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2006												
Total, tous les sièges primaires de cancer	5 457	436,1	424,9	447,3	2 764	493,5	476,0	510,9	2 693	395,5	380,7	410,2
Lèvre (C00.0-C00.9)	43	2,8	1,9	3,6	30	4,6	3,0	6,3	13	1,2	0,5	1,9
Langue (C01.9-C02.9)	32	2,3	1,5	3,2	17	2,6	1,3	3,8	15	2,1	1,0	3,1
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	12	0,8	0,3	1,3	6	0,9	0,2	1,6	6	0,8	0,1	1,6
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	21	1,5	0,8	2,1	12	1,8	0,8	2,8	9	1,2	0,4	2,1
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	8	0,6	0,2	1,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	12	0,9	0,4	1,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	20	1,3	0,7	1,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Oesophage (C15.0-C15.9)	39	2,9	2,0	3,8	31	4,9	3,1	6,6	8	1,1	0,3	1,9
Estomac (C16.0-C16.9)	99	6,4	5,1	7,7	65	9,7	7,3	12,1	34	3,8	2,4	5,1
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	26	1,7	1,0	2,4	20	3,0	1,7	4,4	6	0,6	0,1	1,1
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9-C26.0)	749	50,6	46,9	54,3	399	61,4	55,4	67,5	350	41,6	37,0	46,2
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	493	33,1	30,1	36,1	245	38,1	33,2	42,9	248	29,1	25,3	32,9
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	256	17,5	15,3	19,7	154	23,4	19,7	27,1	102	12,5	10,0	15,1
Anus (C21.0-C21.8)	17	1,2	0,6	1,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Foie (C22.0)	54	3,6	2,6	4,6	33	4,9	3,2	6,6	21	2,5	1,4	3,6
Vésicule biliaire (C23.9)	18	1,3	0,7	1,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Pancréas (C25.0-C25.9)	144	9,7	8,0	11,3	73	11,3	8,7	14,0	71	8,2	6,1	10,2
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	59	4,2	3,1	5,3	29	4,5	2,8	6,1	30	4,0	2,5	5,5
Larynx (C32.0-C32.9)	32	2,3	1,5	3,2	26	4,1	2,5	5,7	6	0,8	0,1	1,5
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	765	54,0	50,1	57,9	397	62,8	56,5	69,0	368	47,7	42,6	52,7
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	7	0,4	0,1	0,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	8	0,6	0,2	1,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	34	2,8	1,8	3,8	18	3,0	1,6	4,4	16	2,8	1,4	4,2
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	127	9,1	7,5	10,7	69	10,6	8,0	13,1	58	8,1	5,9	10,3
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	726	97,6	90,2	105,0
Col utérin (C53.0-C53.9)	42	3,2	2,2	4,2	42	6,3	4,3	8,3
Corps utérin (C54.0-C54.9)	158	11,4	9,6	13,3	158	21,9	18,4	25,4
Utérus, sans autre indication (C55.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Ovaire (C56.9)	92	6,5	5,1	7,9	92	12,4	9,7	15,0
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	22	1,6	0,9	2,3	22	3,1	1,7	4,5
Prostate (C61.9)	658	48,1	44,4	51,8	658	104,5	96,5	112,6
Testicule (C62.0-C62.9)	30	2,7	1,7	3,7	30	5,5	3,5	7,5
Verge (C60.0-C60.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	257	17,5	15,3	19,7	196	30,3	26,0	34,6	61	7,2	5,3	9,1
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	183	13,1	11,1	15,0	124	19,5	16,0	23,0	59	7,6	5,5	9,6
Uretere (C66.9)	10	0,7	0,3	1,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	9	0,6	0,2	1,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	8	0,6	0,2	1,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Cerveau (C71.0-C71.9)	66	5,2	3,9	6,4	36	5,7	3,8	7,6	30	4,7	3,0	6,5

Tableau 2-8 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Manitoba

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	84	7,0	5,5	8,6	21	3,5	2,0	5,1	63	10,4	7,7	13,1
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	8	0,6	0,2	1,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	29	2,4	1,5	3,3	12	2,1	0,9	3,3	17	2,7	1,4	4,0
Lymphomes non hodgkiniens	243	17,3	15,1	19,5	122	18,7	15,3	22,0	121	16,1	13,1	19,1
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	58	3,7	2,7	4,7	28	4,2	2,6	5,7	30	3,3	2,1	4,6
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	20	1,8	1,0	2,6	13	2,2	1,0	3,4	7	1,4	0,4	2,5
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	64	4,3	3,2	5,4	38	5,7	3,9	7,5	26	3,3	2,0	4,6
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	38	3,0	2,0	3,9	18	3,0	1,6	4,4	20	2,9	1,6	4,3
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	21	1,5	0,9	2,2	12	1,9	0,8	3,0	9	1,2	0,4	2,1
Autres leucémies	12	0,8	0,3	1,2	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	246	16,4	14,3	18,5	119	18,2	14,9	21,5	127	15,5	12,6	18,4
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	13	1,0	0,4	1,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2005												
Total, tous les sièges primaires de cancer	5 421	435,2	424,0	446,4	2 703	489,5	472,0	507,0	2 718	397,8	383,0	412,6
Lèvre (C00.0-C00.9)	43	3,1	2,1	4,0	33	5,3	3,5	7,2	10	1,1	0,4	1,9
Langue (C01.9-C02.9)	37	2,8	1,9	3,7	20	3,1	1,7	4,5	17	2,5	1,2	3,7
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	7	0,5	0,1	0,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	14	0,9	0,4	1,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	8	0,6	0,2	1,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	13	0,9	0,4	1,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Oesophage (C15.0-C15.9)	57	4,1	3,0	5,2	41	6,6	4,6	8,6	16	2,0	1,0	3,1
Estomac (C16.0-C16.9)	120	8,4	6,9	10,0	73	11,4	8,8	14,1	47	6,1	4,3	7,9
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	32	2,2	1,4	3,0	18	2,9	1,5	4,3	14	1,7	0,7	2,6
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)	709	48,0	44,3	51,6	381	58,7	52,8	64,7	328	39,2	34,7	43,7
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	473	31,1	28,2	34,0	233	35,7	31,0	40,3	240	27,7	24,0	31,5
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	236	16,9	14,7	19,1	148	23,1	19,3	26,8	88	11,5	9,0	14,0
Anus (C21.0-C21.8)	17	1,3	0,7	1,9	7	1,2	0,3	2,0	10	1,4	0,5	2,4
Foie (C22.0)	51	3,6	2,6	4,6	35	5,4	3,6	7,2	16	2,1	1,0	3,2
Vésicule biliaire (C23.9)	21	1,5	0,8	2,1	8	1,3	0,4	2,2	13	1,7	0,8	2,7
Pancréas (C25.0-C25.9)	121	8,3	6,8	9,8	62	9,7	7,3	12,2	59	7,1	5,2	9,0
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	48	3,5	2,5	4,5	27	4,5	2,8	6,2	21	2,6	1,4	3,7
Larynx (C32.0-C32.9)	23	1,7	1,0	2,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	833	59,6	55,5	63,7	442	70,4	63,7	77,0	391	51,5	46,2	56,8
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	7	0,5	0,1	1,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	12	1,0	0,4	1,5	x	x	x	x	x	x	x	x

Tableau 2-8 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Manitoba

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	30	2,2	1,4	3,0	16	2,5	1,3	3,8	14	2,0	0,9	3,1
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	137	10,3	8,5	12,1	72	11,2	8,5	13,8	65	10,0	7,5	12,5
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	725	96,2	89,0	103,5
Col utérin (C53.0-C53.9)	54	4,5	3,3	5,8	54	9,1	6,6	11,6
Corps utérin (C54.0-C54.9)	160	11,5	9,7	13,3	160	22,3	18,8	25,8
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ovaire (C56.9)	83	6,0	4,7	7,3	83	11,4	8,9	14,0
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	26	2,0	1,2	2,8	26	3,9	2,3	5,4
Prostate (C61.9)	571	42,2	38,7	45,8	571	92,6	84,9	100,3
Testicule (C62.0-C62.9)	28	2,7	1,7	3,8	28	5,4	3,3	7,4
Verge (C60.0-C60.9)	6	0,3	0,1	0,6	6	0,9	0,2	1,6
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	261	18,1	15,8	20,3	183	29,0	24,8	33,2	78	9,5	7,3	11,8
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	199	14,4	12,4	16,5	118	18,8	15,3	22,2	81	10,5	8,1	12,8
Uretrère (C66.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	12	0,8	0,3	1,3	6	0,9	0,2	1,7	6	0,7	0,1	1,2
Cerveau (C71.0-C71.9)	73	5,6	4,3	6,9	39	6,4	4,3	8,4	34	4,9	3,2	6,5
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	63	5,2	3,9	6,5	15	2,4	1,2	3,6	48	8,0	5,7	10,3
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	7	0,6	0,1	1,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	31	2,7	1,7	3,7	17	3,1	1,6	4,5	14	2,4	1,1	3,7
Lymphomes non hodgkiniens	245	17,7	15,4	20,0	137	22,0	18,3	25,8	108	13,9	11,1	16,7
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	68	4,7	3,5	5,8	38	5,9	4,0	7,8	30	3,6	2,3	5,0
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	14	1,3	0,6	1,9	8	1,5	0,4	2,6	6	1,0	0,2	1,8
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	96	6,6	5,2	7,9	49	7,8	5,6	10,0	47	5,6	3,9	7,3
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	22	1,6	0,9	2,3	13	2,2	1,0	3,4	9	1,2	0,3	2,0
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	12	0,9	0,4	1,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres leucémies	17	1,3	0,7	2,0	6	1,1	0,2	1,9	11	1,6	0,6	2,5
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	245	16,6	14,4	18,7	126	19,7	16,2	23,2	119	14,1	11,4	16,8
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	19	1,3	0,7	1,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2009) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 2-9
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Saskatchewan

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2006												
Total, tous les sièges primaires de cancer	4 757	432,8	420,8	444,8	2 471	487,9	469,5	506,3	2 286	390,5	374,5	406,5
Lèvre (C00.0-C00.9)	13	1,0	0,4	1,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	30	2,6	1,6	3,5	18	3,3	1,7	4,8	12	1,8	0,7	2,9
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	7	0,5	0,1	1,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	9	0,8	0,3	1,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	15	1,2	0,6	1,9	6	1,2	0,2	2,1	9	1,2	0,3	2,1
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	26	2,3	1,4	3,2	18	3,2	1,7	4,7	8	1,3	0,3	2,3
Oesophage (C15.0-C15.9)	46	3,4	2,4	4,4	29	4,6	2,9	6,3	17	2,4	1,2	3,6
Estomac (C16.0-C16.9)	85	6,7	5,2	8,2	50	8,8	6,3	11,2	35	4,9	3,2	6,6
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	18	1,4	0,8	2,1	11	1,9	0,8	3,1	7	1,0	0,2	1,7
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9-C26.0)	614	46,8	43,0	50,6	333	56,4	50,3	62,6	281	38,6	33,8	43,4
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	402	29,8	26,8	32,9	203	34,4	29,6	39,2	199	25,7	21,9	29,5
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	212	17,0	14,6	19,3	130	22,0	18,1	25,8	82	12,9	10,0	15,8
Anus (C21.0-C21.8)	12	0,9	0,4	1,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Foie (C22.0)	26	2,2	1,3	3,0	17	3,0	1,6	4,5	9	1,4	0,4	2,3
Vésicule biliaire (C23.9)	9	0,8	0,3	1,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Pancréas (C25.0-C25.9)	106	8,1	6,5	9,7	51	8,8	6,3	11,3	55	7,5	5,4	9,6
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	46	3,5	2,4	4,5	15	2,5	1,2	3,8	31	4,3	2,7	6,0
Larynx (C32.0-C32.9)	27	2,3	1,4	3,2	x	x	x	x	x	x	x	x
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	670	53,2	49,1	57,4	340	57,9	51,7	64,2	330	50,3	44,6	55,9
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	14	1,1	0,5	1,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	13	1,3	0,6	2,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	31	2,8	1,8	3,8	21	3,9	2,2	5,7	10	1,9	0,7	3,1
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	114	10,0	8,1	11,9	68	12,6	9,5	15,7	46	7,6	5,3	9,9
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	14	1,2	0,6	1,9	7	1,3	0,3	2,2	7	1,2	0,2	2,2
Sein (C50.0-C50.9)	618	51,0	46,8	55,1	6	1,1	0,2	1,9	612	97,3	89,2	105,3
Col utérin (C53.0-C53.9)	36	3,7	2,4	5,0	36	7,4	4,8	10,0
Corps utérin (C54.0-C54.9)	118	9,6	7,8	11,3	118	18,4	15,0	21,8
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ovaire (C56.9)	78	6,4	4,9	7,8	78	12,1	9,3	15,0
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	16	1,2	0,5	1,8	16	2,1	0,9	3,3
Prostate (C61.9)	720	59,5	55,0	63,9	720	127,1	117,7	136,5
Testicule (C62.0-C62.9)	35	4,0	2,6	5,3	35	7,8	5,2	10,5
Verge (C60.0-C60.9)	8	0,7	0,2	1,1	8	1,4	0,4	2,4
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	191	15,0	12,8	17,2	142	23,7	19,7	27,6	49	8,2	5,8	10,6
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	135	10,8	8,9	12,7	76	13,0	10,0	15,9	59	8,9	6,5	11,3
Uretere (C66.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Oeil (C69.0-C69.9)	7	0,5	0,1	1,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Cerveau (C71.0-C71.9)	75	6,5	5,0	8,0	41	7,1	4,9	9,3	34	6,0	3,9	8,2

Tableau 2-9 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Saskatchewan

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	60	5,6	4,2	7,1	11	2,1	0,8	3,4	49	9,2	6,5	12,0
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	6	0,5	0,1	0,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	32	3,4	2,2	4,6	20	4,4	2,4	6,4	12	2,4	1,0	3,7
Lymphomes non hodgkiniens	216	17,5	15,1	20,0	107	18,8	15,2	22,5	109	16,5	13,2	19,8
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	56	4,6	3,3	5,8	33	5,7	3,7	7,7	23	3,6	2,1	5,2
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	9	1,0	0,3	1,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	86	6,6	5,2	8,1	52	8,6	6,3	11,0	34	5,1	3,4	6,9
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	41	3,3	2,2	4,4	22	3,9	2,3	5,6	19	2,7	1,3	4,0
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	16	1,3	0,7	2,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres leucémies	18	1,4	0,7	2,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	212	15,9	13,7	18,1	109	18,5	15,0	22,0	103	13,4	10,6	16,3
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	8	0,7	0,2	1,2	8	1,4	0,4	2,5	0	0,0	0,0	0,0
Sarcome de Kaposi (M-9140)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
2005												
Total, tous les sièges primaires de cancer	4 805	442,4	430,2	454,5	2 651	533,9	514,6	553,2	2 154	368,5	353,0	383,9
Lèvre (C00.0-C00.9)	6	0,5	0,1	0,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	27	2,4	1,5	3,3	17	3,2	1,6	4,8	10	1,7	0,6	2,7
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	14	1,2	0,5	1,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	6	0,5	0,1	0,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	13	1,1	0,5	1,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Oropharynx (C10.0-C10.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	16	1,3	0,7	2,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Oesophage (C15.0-C15.9)	36	2,7	1,8	3,6	30	4,9	3,1	6,7	6	0,8	0,1	1,5
Estomac (C16.0-C16.9)	77	5,9	4,6	7,3	52	8,9	6,5	11,4	25	3,4	1,9	4,8
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	12	1,0	0,4	1,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)	654	51,5	47,4	55,6	375	65,5	58,8	72,2	279	39,6	34,6	44,6
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	422	32,8	29,6	36,1	219	37,9	32,8	43,0	203	28,7	24,5	33,0
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	232	18,7	16,2	21,1	156	27,6	23,2	32,0	76	10,9	8,3	13,5
Anus (C21.0-C21.8)	9	0,8	0,3	1,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Foie (C22.0)	19	1,6	0,9	2,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Vésicule biliaire (C23.9)	11	0,9	0,4	1,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Pancréas (C25.0-C25.9)	130	9,7	8,0	11,4	54	9,2	6,7	11,6	76	10,1	7,7	12,6
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	49	3,6	2,6	4,7	21	3,3	1,9	4,8	28	4,0	2,4	5,5
Larynx (C32.0-C32.9)	26	2,2	1,3	3,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	654	52,8	48,7	57,0	362	63,3	56,7	69,9	292	45,0	39,6	50,4
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	7	0,6	0,1	1,1	x	x	x	x	x	x	x	x

Tableau 2-9 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Saskatchewan

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	25	2,0	1,2	2,8	13	2,5	1,1	3,9	12	1,4	0,6	2,3
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	133	10,9	9,0	12,9	77	13,5	10,4	16,6	56	8,6	6,2	10,9
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	20	1,9	1,0	2,7	6	1,2	0,2	2,2	14	2,4	1,0	3,8
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	582	92,5	84,7	100,3
Col utérin (C53.0-C53.9)	34	3,4	2,2	4,6	34	6,9	4,4	9,3
Corps utérin (C54.0-C54.9)	112	9,1	7,4	10,9	112	17,7	14,3	21,1
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ovaire (C56.9)	67	5,3	4,0	6,7	67	10,2	7,6	12,7
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	21	1,5	0,8	2,2	21	2,8	1,5	4,1
Prostate (C61.9)	843	69,9	65,1	74,7	843	150,0	139,8	160,2
Testicule (C62.0-C62.9)	17	2,0	1,1	3,0	17	4,0	2,1	6,0
Verge (C60.0-C60.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	198	15,1	12,9	17,3	149	25,1	21,0	29,2	49	6,8	4,8	8,8
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	128	10,7	8,8	12,6	83	15,4	12,0	18,8	45	6,4	4,4	8,3
Uretrère (C66.9)	9	0,6	0,2	1,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	6	0,5	0,1	1,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Cerveau (C71.0-C71.9)	65	5,7	4,3	7,2	34	6,4	4,2	8,5	31	5,1	3,2	6,9
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	66	6,2	4,6	7,7	10	1,9	0,7	3,0	56	10,5	7,6	13,3
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	13	1,2	0,5	1,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	28	3,0	1,8	4,2	14	2,9	1,4	4,5	14	3,0	1,3	4,7
Lymphomes non hodgkiniens	191	15,4	13,1	17,6	98	16,9	13,5	20,3	93	14,2	11,1	17,3
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	54	4,4	3,2	5,6	32	5,6	3,7	7,6	22	3,3	1,9	4,8
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	23	2,3	1,4	3,3	13	2,7	1,2	4,2	10	1,9	0,7	3,2
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	77	5,9	4,6	7,3	45	7,8	5,5	10,1	32	4,4	2,8	6,0
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	31	2,6	1,7	3,6	16	2,9	1,5	4,4	15	2,3	1,1	3,6
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	9	0,8	0,3	1,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres leucémies	18	1,4	0,7	2,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	231	17,0	14,7	19,3	131	22,3	18,4	26,2	100	12,6	10,0	15,3
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	11	0,9	0,4	1,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2009) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 2-10

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Alberta

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2006												
Total, tous les sièges primaires de cancer	13 643	444,7	437,5	451,9	7 242	514,4	503,0	525,8	6 401	389,2	380,0	398,5
Lèvre (C00.0-C00.9)	16	0,5	0,2	0,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	87	2,5	1,9	3,0	56	3,3	2,4	4,1	31	1,8	1,1	2,4
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	21	0,6	0,3	0,9	12	0,7	0,3	1,1	9	0,5	0,2	0,8
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	20	0,6	0,3	0,8	14	0,9	0,4	1,4	6	0,3	0,1	0,6
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	47	1,3	0,9	1,7	29	1,7	1,1	2,3	18	0,9	0,5	1,4
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	15	0,5	0,2	0,8	9	0,6	0,2	1,0	6	0,4	0,1	0,7
Oropharynx (C10.0-C10.9)	11	0,4	0,1	0,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	27	0,8	0,5	1,1	18	1,2	0,6	1,7	9	0,5	0,2	0,9
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	41	1,1	0,7	1,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Oesophage (C15.0-C15.9)	136	4,0	3,3	4,6	105	6,4	5,2	7,7	31	1,6	1,0	2,2
Estomac (C16.0-C16.9)	250	7,4	6,5	8,3	164	10,4	8,8	12,1	86	4,7	3,7	5,7
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	69	2,0	1,5	2,5	36	2,2	1,5	3,0	33	1,8	1,2	2,4
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9-C26.0)	1 594	46,6	44,3	48,9	897	57,1	53,3	60,9	697	37,3	34,5	40,2
Célon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	1 035	30,5	28,6	32,4	555	35,7	32,7	38,7	480	25,9	23,6	28,3
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	559	16,1	14,7	17,5	342	21,5	19,1	23,8	217	11,4	9,8	12,9
Anus (C21.0-C21.8)	50	1,4	1,0	1,7	11	0,7	0,3	1,1	39	2,0	1,4	2,7
Foie (C22.0)	141	3,9	3,2	4,6	101	5,8	4,7	7,0	40	2,1	1,4	2,7
Vésicule biliaire (C23.9)	27	0,8	0,5	1,1	13	0,9	0,4	1,4	14	0,7	0,3	1,1
Pancréas (C25.0-C25.9)	329	9,5	8,5	10,6	153	9,6	8,1	11,2	176	9,3	7,9	10,7
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	143	4,2	3,5	4,9	63	4,0	3,0	5,1	80	4,3	3,3	5,3
Larynx (C32.0-C32.9)	65	1,9	1,5	2,4	52	3,3	2,4	4,2	13	0,7	0,3	1,1
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	1 730	52,0	49,6	54,5	928	60,8	56,8	64,7	802	45,7	42,5	49,0
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	27	0,8	0,5	1,1	14	0,8	0,4	1,3	13	0,7	0,3	1,1
Os et articulations (C40.0-C41.9)	33	0,9	0,6	1,3	12	0,7	0,3	1,1	21	1,2	0,7	1,7
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	82	2,4	1,8	2,9	42	2,5	1,7	3,3	40	2,2	1,5	2,9
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	462	13,3	12,1	14,5	244	14,8	12,9	16,7	218	12,2	10,6	13,9
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	59	1,7	1,3	2,1	30	2,0	1,3	2,7	29	1,6	1,0	2,3
Sein (C50.0-C50.9)	1 784	49,9	47,6	52,3	12	0,7	0,3	1,0	1 772	96,5	91,9	101,1
Col utérin (C53.0-C53.9)	157	4,7	3,9	5,4	157	9,5	7,9	11,0
Corps utérin (C54.0-C54.9)	369	10,4	9,3	11,5	369	20,3	18,2	22,4
Utérus, sans autre indication (C55.9)	7	0,2	0,0	0,4	7	0,4	0,1	0,7
Ovaire (C56.9)	157	4,4	3,7	5,1	157	8,4	7,0	9,7
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	62	1,7	1,3	2,2	62	3,3	2,5	4,2
Prostate (C61.9)	2 113	63,6	60,8	66,3	2 113	134,7	128,9	140,5
Testicule (C62.0-C62.9)	99	3,0	2,4	3,6	99	5,8	4,6	7,0
Verge (C60.0-C60.9)	13	0,4	0,2	0,6	13	0,8	0,4	1,3
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	644	19,0	17,5	20,5	503	32,6	29,7	35,5	141	7,5	6,3	8,8
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	417	11,8	10,6	12,9	263	15,4	13,5	17,4	154	8,4	7,1	9,8
Urètre (C66.9)	11	0,3	0,1	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	8	0,2	0,1	0,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	19	0,6	0,3	0,8	11	0,7	0,3	1,1	8	0,5	0,2	0,9
Cerveau (C71.0-C71.9)	182	5,2	4,5	6,0	107	6,4	5,2	7,7	75	4,3	3,3	5,2

Tableau 2-10 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Alberta

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	340	9,7	8,6	10,7	89	5,3	4,2	6,4	251	14,2	12,4	16,0
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	24	0,7	0,4	1,0	9	0,5	0,2	0,9	15	0,8	0,4	1,3
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	87	2,6	2,0	3,1	52	3,1	2,2	3,9	35	2,1	1,4	2,8
Lymphomes non hodgkiniens	547	15,8	14,5	17,2	299	18,4	16,2	20,5	248	13,7	11,9	15,4
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	144	4,2	3,5	4,9	79	5,1	4,0	6,3	65	3,5	2,6	4,4
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	54	1,7	1,2	2,2	28	1,8	1,1	2,4	26	1,6	1,0	2,3
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	190	5,6	4,8	6,4	107	6,6	5,3	7,8	83	4,8	3,7	5,8
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	102	3,1	2,5	3,7	56	3,6	2,6	4,5	46	2,6	1,9	3,4
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	55	1,6	1,2	2,1	28	1,7	1,1	2,3	27	1,6	1,0	2,2
Autres leucémies	39	1,1	0,7	1,4	19	1,1	0,6	1,7	20	1,1	0,6	1,6
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	497	14,4	13,1	15,7	251	16,3	14,2	18,3	246	12,7	11,1	14,4
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	32	1,0	0,7	1,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
2005												
Total, tous les sièges primaires de cancer	13 075	442,2	435,0	449,5	6 884	508,9	497,4	520,4	6 191	389,3	379,9	398,7
Lèvre (C00.0-C00.9)	29	0,9	0,6	1,2	22	1,5	0,8	2,1	7	0,4	0,1	0,6
Langue (C01.9-C02.9)	57	1,6	1,1	2,0	38	2,1	1,4	2,8	19	1,0	0,5	1,5
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	22	0,7	0,4	0,9	13	0,8	0,4	1,2	9	0,5	0,2	0,8
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	24	0,7	0,4	1,0	13	0,8	0,4	1,3	11	0,6	0,2	1,0
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	40	1,2	0,8	1,6	14	1,0	0,4	1,5	26	1,5	0,9	2,0
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	14	0,4	0,2	0,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	9	0,3	0,1	0,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	15	0,5	0,2	0,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	46	1,4	1,0	1,8	37	2,3	1,5	3,0	9	0,5	0,2	0,9
Oesophage (C15.0-C15.9)	113	3,5	2,9	4,2	93	6,1	4,8	7,3	20	1,2	0,7	1,7
Estomac (C16.0-C16.9)	228	6,9	6,0	7,8	150	10,0	8,4	11,6	78	4,3	3,3	5,3
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	58	1,7	1,3	2,2	42	2,7	1,8	3,5	16	0,9	0,5	1,4
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)	1 550	47,0	44,6	49,4	861	56,8	52,9	60,6	689	38,2	35,3	41,1
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	977	29,6	27,8	31,5	502	33,6	30,6	36,6	475	26,0	23,6	28,4
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	573	17,4	15,9	18,8	359	23,2	20,8	25,6	214	12,2	10,5	13,9
Anus (C21.0-C21.8)	21	0,6	0,3	0,9	7	0,5	0,1	0,8	14	0,7	0,3	1,1
Foie (C22.0)	143	4,2	3,5	4,9	107	6,6	5,3	7,8	36	2,0	1,4	2,7
Vésicule biliaire (C23.9)	43	1,3	0,9	1,7	16	1,2	0,6	1,7	27	1,5	0,9	2,1
Pancréas (C25.0-C25.9)	367	11,1	9,9	12,2	173	11,7	9,9	13,5	194	10,8	9,2	12,4
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	155	4,5	3,8	5,3	73	4,8	3,7	6,0	82	4,5	3,5	5,5
Larynx (C32.0-C32.9)	65	1,9	1,5	2,4	55	3,4	2,5	4,3	10	0,5	0,2	0,9
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	1 622	50,6	48,1	53,1	845	57,9	54,0	61,8	777	45,3	42,0	48,5
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	20	0,6	0,3	0,9	12	0,8	0,3	1,2	8	0,5	0,1	0,8
Os et articulations (C40.0-C41.9)	20	0,6	0,3	0,9	8	0,5	0,1	0,8	12	0,7	0,3	1,2

Tableau 2-10 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Alberta

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	91	2,7	2,1	3,2	51	3,2	2,3	4,1	40	2,1	1,5	2,8
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	399	11,5	10,4	12,7	197	12,0	10,3	13,7	202	11,3	9,7	12,9
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	57	1,7	1,2	2,1	31	2,0	1,3	2,7	26	1,5	0,9	2,0
Sein (C50.0-C50.9)	1 701	49,0	46,6	51,3	13	0,9	0,4	1,4	1 688	94,0	89,4	98,6
Col utérin (C53.0-C53.9)	140	4,3	3,5	5,0	140	8,6	7,1	10,0
Corps utérin (C54.0-C54.9)	386	11,5	10,3	12,6	386	22,4	20,1	24,6
Utérus, sans autre indication (C55.9)	6	0,2	0,0	0,3	6	0,3	0,1	0,5
Ovaire (C56.9)	187	5,4	4,6	6,2	187	10,4	8,9	11,9
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	52	1,5	1,1	1,9	52	2,8	2,0	3,6
Prostate (C61.9)	1 931	60,3	57,6	63,0	1 931	128,0	122,3	133,8
Testicule (C62.0-C62.9)	118	3,7	3,0	4,4	118	7,2	5,8	8,5
Verge (C60.0-C60.9)	16	0,5	0,3	0,8	16	1,1	0,6	1,7
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	6	0,2	0,0	0,4	6	0,4	0,1	0,8
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	584	17,9	16,5	19,4	419	28,4	25,6	31,1	165	9,2	7,8	10,7
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	356	10,7	9,5	11,8	237	15,1	13,1	17,1	119	6,8	5,5	8,0
Uretrère (C66.9)	x	x	x	x	10	0,7	0,3	1,1	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	8	0,2	0,1	0,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	19	0,6	0,3	0,8	11	0,7	0,3	1,1	8	0,5	0,1	0,8
Cerveau (C71.0-C71.9)	201	6,0	5,1	6,8	118	6,9	5,6	8,2	83	5,2	4,0	6,3
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	11	0,3	0,1	0,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	351	10,5	9,4	11,6	76	4,6	3,5	5,6	275	16,6	14,6	18,6
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	26	0,8	0,5	1,1	14	0,8	0,4	1,3	12	0,7	0,3	1,1
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	85	2,7	2,1	3,2	56	3,4	2,5	4,4	29	1,9	1,2	2,6
Lymphomes non hodgkiniens	558	16,7	15,3	18,1	321	20,3	18,1	22,6	237	13,5	11,8	15,3
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	162	4,9	4,2	5,7	97	6,4	5,1	7,7	65	3,7	2,8	4,6
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	40	1,3	0,9	1,7	26	1,7	1,0	2,3	14	0,9	0,4	1,3
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	195	5,9	5,1	6,8	118	7,7	6,3	9,2	77	4,3	3,3	5,3
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	89	2,8	2,2	3,4	51	3,4	2,5	4,4	38	2,2	1,5	2,9
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	53	1,6	1,2	2,0	31	1,9	1,2	2,6	22	1,3	0,8	1,9
Autres leucémies	31	0,9	0,6	1,3	23	1,5	0,9	2,1	8	0,5	0,1	0,8
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	491	14,9	13,5	16,2	254	17,3	15,1	19,4	237	12,9	11,3	14,6
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	45	1,4	1,0	1,8	34	2,3	1,5	3,1	11	0,7	0,3	1,1
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2009) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 2-11
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Colombie-Britannique

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2006												
Total, tous les sièges primaires de cancer	19 484	403,3	397,8	408,7	10 354	461,9	453,5	470,4	9 130	355,6	348,5	362,7
Lèvre (C00.0-C00.9)	x	x	x	x	9	0,3	0,1	0,6	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	115	2,1	1,7	2,5	86	3,3	2,6	4,0	29	1,0	0,6	1,4
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	37	0,7	0,5	0,9	17	0,7	0,4	1,0	20	0,7	0,4	1,1
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	23	0,5	0,3	0,6	13	0,5	0,2	0,8	10	0,4	0,1	0,6
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	54	1,0	0,7	1,2	21	0,8	0,5	1,2	33	1,1	0,7	1,5
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	34	0,6	0,4	0,9	22	0,8	0,5	1,2	12	0,5	0,2	0,8
Oropharynx (C10.0-C10.9)	10	0,2	0,1	0,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	30	0,6	0,4	0,8	24	0,9	0,6	1,3	6	0,2	0,0	0,4
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	63	1,1	0,8	1,4	44	1,6	1,1	2,1	19	0,6	0,3	0,9
Oesophage (C15.0-C15.9)	230	4,0	3,5	4,6	163	6,3	5,3	7,2	67	2,1	1,6	2,7
Estomac (C16.0-C16.9)	351	6,3	5,6	6,9	240	9,3	8,1	10,5	111	3,6	2,9	4,3
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	70	1,2	0,9	1,5	34	1,3	0,9	1,7	36	1,2	0,8	1,5
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9-C26.0)	2 415	43,5	41,7	45,2	1 324	51,9	49,1	54,7	1 091	36,1	33,9	38,3
Célon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	1 595	28,5	27,1	29,9	797	31,4	29,2	33,5	798	26,1	24,3	28,0
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	820	15,0	13,9	16,0	527	20,5	18,7	22,3	293	10,0	8,8	11,1
Anus (C21.0-C21.8)	62	1,1	0,8	1,4	24	0,9	0,5	1,3	38	1,2	0,8	1,6
Foie (C22.0)	207	3,7	3,2	4,2	156	5,8	4,9	6,7	51	1,8	1,3	2,3
Vésicule biliaire (C23.9)	50	0,9	0,6	1,1	19	0,8	0,4	1,1	31	1,0	0,6	1,3
Pancréas (C25.0-C25.9)	504	9,0	8,2	9,8	254	9,8	8,6	11,0	250	8,2	7,1	9,2
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	172	3,2	2,7	3,6	73	2,9	2,2	3,6	99	3,4	2,7	4,1
Larynx (C32.0-C32.9)	101	1,9	1,5	2,3	89	3,5	2,8	4,3	12	0,4	0,2	0,7
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	2 561	46,7	44,8	48,5	1 315	51,7	48,9	54,5	1 246	43,3	40,8	45,7
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	37	0,7	0,5	0,9	20	0,8	0,4	1,1	17	0,6	0,3	0,9
Os et articulations (C40.0-C41.9)	30	0,7	0,4	0,9	18	0,8	0,4	1,2	12	0,5	0,2	0,8
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	116	2,3	1,9	2,8	68	2,8	2,1	3,5	48	1,9	1,4	2,5
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	678	12,9	11,9	13,9	371	14,6	13,1	16,1	307	11,6	10,2	12,9
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	58	1,1	0,8	1,4	27	1,1	0,7	1,5	31	1,1	0,7	1,5
Sein (C50.0-C50.9)	2 576	47,2	45,4	49,1	17	0,6	0,3	1,0	2 559	90,8	87,2	94,4
Col utérin (C53.0-C53.9)	144	3,0	2,5	3,5	144	5,9	4,9	6,9
Corps utérin (C54.0-C54.9)	539	9,7	8,8	10,5	539	18,8	17,1	20,4
Utérus, sans autre indication (C55.9)	7	0,1	0,0	0,2	7	0,2	0,0	0,3
Ovaire (C56.9)	305	5,6	4,9	6,2	305	10,7	9,4	11,9
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	66	1,2	0,9	1,5	66	2,2	1,6	2,7
Prostate (C61.9)	3 028	56,8	54,7	58,8	3 028	120,2	115,9	124,5
Testicule (C62.0-C62.9)	106	2,7	2,2	3,3	106	5,5	4,4	6,5
Verge (C60.0-C60.9)	10	0,2	0,1	0,3	10	0,4	0,1	0,6
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	953	17,2	16,1	18,3	713	28,2	26,1	30,3	240	8,0	6,9	9,0
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	412	7,6	6,9	8,4	262	10,1	8,9	11,3	150	5,5	4,6	6,4
Urètre (C66.9)	11	0,2	0,1	0,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	6	0,1	0,0	0,2	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	46	0,9	0,6	1,1	29	1,2	0,7	1,6	17	0,6	0,3	0,8
Cerveau (C71.0-C71.9)	254	5,1	4,4	5,7	141	5,7	4,7	6,6	113	4,5	3,7	5,4

Tableau 2-11 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Colombie-Britannique

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	6	0,1	0,0	0,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	254	5,3	4,6	6,0	69	2,8	2,1	3,5	185	7,8	6,6	9,0
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	24	0,6	0,3	0,8	12	0,6	0,2	0,9	12	0,6	0,2	0,9
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	87	2,0	1,6	2,5	42	1,8	1,3	2,4	45	2,2	1,6	2,9
Lymphomes non hodgkiniens	905	16,9	15,8	18,1	505	20,1	18,4	21,9	400	14,0	12,6	15,4
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	205	3,6	3,1	4,1	117	4,5	3,7	5,3	88	2,9	2,3	3,5
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	63	1,7	1,3	2,2	35	1,9	1,3	2,6	28	1,5	0,9	2,1
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	280	5,1	4,5	5,7	166	6,5	5,5	7,5	114	3,9	3,2	4,6
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	147	2,7	2,3	3,2	78	3,2	2,5	3,9	69	2,3	1,7	2,9
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	69	1,3	1,0	1,6	38	1,6	1,1	2,1	31	1,0	0,7	1,4
Autres leucémies	68	1,2	0,9	1,5	38	1,5	1,0	2,0	30	0,9	0,6	1,2
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	776	13,5	12,6	14,5	396	15,5	13,9	17,0	380	11,8	10,6	13,1
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	89	1,6	1,3	1,9	76	3,0	2,3	3,7	13	0,5	0,2	0,7
Sarcome de Kaposi (M-9140)	20	0,5	0,2	0,7	20	0,9	0,5	1,3	0	0,0	0,0	0,0
2005												
Total, tous les sièges primaires de cancer	19 054	406,2	400,7	411,8	10 001	461,1	452,5	469,7	9 053	361,8	354,5	369,0
Lèvre (C00.0-C00.9)	15	0,3	0,1	0,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	113	2,2	1,8	2,6	81	3,2	2,5	3,9	32	1,2	0,8	1,7
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	46	0,9	0,6	1,2	28	1,2	0,7	1,6	18	0,7	0,3	1,0
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	31	0,6	0,4	0,8	15	0,6	0,3	0,9	16	0,5	0,3	0,8
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	59	1,1	0,8	1,4	28	1,1	0,7	1,6	31	1,1	0,7	1,5
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	43	0,8	0,6	1,1	30	1,2	0,7	1,6	13	0,5	0,2	0,8
Oropharynx (C10.0-C10.9)	17	0,3	0,2	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	35	0,6	0,4	0,8	27	1,0	0,6	1,4	8	0,3	0,1	0,5
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	74	1,4	1,1	1,7	52	2,0	1,4	2,5	22	0,8	0,5	1,1
Oesophage (C15.0-C15.9)	214	4,0	3,4	4,5	138	5,5	4,6	6,4	76	2,4	1,9	3,0
Estomac (C16.0-C16.9)	365	6,7	6,0	7,4	247	9,9	8,6	11,1	118	4,1	3,3	4,8
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	66	1,2	0,9	1,5	36	1,4	0,9	1,9	30	1,1	0,7	1,5
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)	2 417	44,8	43,0	46,6	1 324	53,6	50,6	56,5	1 093	37,1	34,8	39,4
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	1 612	29,7	28,3	31,2	840	34,0	31,7	36,3	772	26,1	24,2	28,0
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	805	15,1	14,0	16,1	484	19,5	17,8	21,3	321	11,0	9,8	12,3
Anus (C21.0-C21.8)	79	1,4	1,1	1,7	30	1,1	0,7	1,6	49	1,6	1,1	2,1
Foie (C22.0)	205	3,9	3,3	4,4	156	6,2	5,2	7,2	49	1,7	1,2	2,2
Vésicule biliaire (C23.9)	62	1,1	0,8	1,4	17	0,7	0,4	1,1	45	1,5	1,0	1,9
Pancréas (C25.0-C25.9)	476	8,5	7,7	9,3	239	9,4	8,2	10,6	237	7,7	6,7	8,7
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	175	3,2	2,7	3,6	78	3,2	2,5	3,9	97	3,2	2,5	3,9
Larynx (C32.0-C32.9)	98	1,8	1,5	2,2	88	3,5	2,7	4,2	10	0,4	0,1	0,6
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	2 603	48,8	46,9	50,7	1 365	55,1	52,1	58,0	1 238	43,7	41,2	46,2
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	38	0,8	0,5	1,0	23	1,0	0,6	1,4	15	0,6	0,3	0,9
Os et articulations (C40.0-C41.9)	35	0,8	0,5	1,0	22	1,0	0,6	1,4	13	0,6	0,3	0,9

Tableau 2-11 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Colombie-Britannique

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	125	2,5	2,1	3,0	64	2,8	2,1	3,5	61	2,3	1,7	2,9
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	669	13,2	12,2	14,2	350	14,3	12,8	15,8	319	12,2	10,9	13,6
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	40	0,8	0,5	1,0	25	1,1	0,6	1,5	15	0,5	0,2	0,7
Sein (C50.0-C50.9)	2 610	48,9	46,9	50,8	11	0,4	0,2	0,7	2 599	93,9	90,2	97,6
Col utérin (C53.0-C53.9)	158	3,4	2,8	3,9	158	6,7	5,6	7,7
Corps utérin (C54.0-C54.9)	521	9,9	9,0	10,8	521	19,2	17,5	20,9
Utérus, sans autre indication (C55.9)	7	0,1	0,0	0,2	7	0,2	0,0	0,3
Ovaire (C56.9)	316	5,9	5,3	6,6	316	11,4	10,1	12,7
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	71	1,3	1,0	1,5	71	2,4	1,8	2,9
Prostate (C61.9)	2 677	51,4	49,4	53,3	2 677	109,1	105,0	113,3
Testicule (C62.0-C62.9)	125	3,3	2,7	3,9	125	6,5	5,4	7,7
Verge (C60.0-C60.9)	16	0,3	0,2	0,5	16	0,7	0,3	1,0
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	6	0,1	0,0	0,2	6	0,3	0,0	0,5
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	878	16,2	15,1	17,3	678	27,5	25,4	29,5	200	6,8	5,8	7,8
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	381	7,2	6,5	8,0	235	9,6	8,3	10,8	146	5,1	4,2	5,9
Uretrère (C66.9)	26	0,5	0,3	0,7	15	0,6	0,3	0,9	11	0,3	0,1	0,5
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	7	0,1	0,0	0,2	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	39	0,8	0,6	1,1	24	1,0	0,6	1,4	15	0,7	0,3	1,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	267	5,4	4,7	6,1	157	6,6	5,5	7,6	110	4,3	3,5	5,1
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	8	0,2	0,0	0,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	231	5,0	4,4	5,7	63	2,7	2,0	3,4	168	7,3	6,2	8,5
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	23	0,5	0,3	0,8	13	0,6	0,3	1,0	10	0,4	0,2	0,7
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	103	2,4	1,9	2,9	55	2,5	1,8	3,1	48	2,3	1,7	3,0
Lymphomes non hodgkiniens	865	16,6	15,5	17,7	491	20,2	18,3	22,0	374	13,5	12,1	14,9
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	216	4,0	3,5	4,5	130	5,3	4,4	6,2	86	3,0	2,4	3,7
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	40	1,1	0,7	1,4	22	1,1	0,6	1,6	18	1,0	0,5	1,5
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	230	4,2	3,7	4,8	144	5,7	4,7	6,6	86	3,0	2,3	3,6
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	118	2,4	1,9	2,8	71	3,0	2,3	3,7	47	1,8	1,3	2,4
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	52	1,0	0,7	1,3	25	1,1	0,6	1,5	27	1,0	0,6	1,3
Autres leucémies	60	1,1	0,8	1,4	37	1,5	1,0	2,0	23	0,8	0,5	1,2
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	816	14,8	13,8	15,8	433	17,3	15,7	19,0	383	12,9	11,6	14,3
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	68	1,2	0,9	1,5	56	2,3	1,7	2,8	12	0,4	0,2	0,7
Sarcome de Kaposi (M-9140)	19	0,4	0,2	0,6	x	x	x	x	x	x	x	x

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2009) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 2-12

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Yukon

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2006												
Total, tous les sièges primaires de cancer	88	360,6	284,9	436,3	36	357,6	243,9	471,4	52	358,1	257,1	459,1
Lèvre (C00.0-C00.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Langue (C01.9-C02.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oropharynx (C10.0-C10.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oesophage (C15.0-C15.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Estomac (C16.0-C16.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9-C26.0)	15	54,8	25,2	84,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	9	38,0	12,0	64,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	6	16,8	2,6	31,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Anus (C21.0-C21.8)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Foie (C22.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Vésicule biliaire (C23.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Pancréas (C25.0-C25.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Larynx (C32.0-C32.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	10	40,8	14,5	67,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Os et articulations (C40.0-C41.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sein (C50.0-C50.9)	20	57,3	28,5	86,1	0	0,0	0,0	0,0	20	108,1	56,6	159,5
Col utérin (C53.0-C53.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Corps utérin (C54.0-C54.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Utérus, sans autre indication (C55.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Ovaire (C56.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Prostate (C61.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Testicule (C62.0-C62.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Verge (C60.0-C60.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Urètre (C66.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oeil (C69.0-C69.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Tableau 2-12 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Yukon

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Lymphomes non hodgkiniens	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres leucémies	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Sarcome de Kaposi (M-9140)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
2005												
Total, tous les sièges primaires de cancer	100	426,3	339,7	512,9	42	391,4	262,9	520,0	58	465,7	343,7	587,7
Lèvre (C00.0-C00.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Langue (C01.9-C02.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oropharynx (C10.0-C10.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oesophage (C15.0-C15.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Estomac (C16.0-C16.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	11	42,8	14,2	71,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Anus (C21.0-C21.8)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Foie (C22.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Vésicule biliaire (C23.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Pancréas (C25.0-C25.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Larynx (C32.0-C32.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	9	30,5	8,6	52,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Os et articulations (C40.0-C41.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0

Tableau 2-12 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Yukon

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	19	121,0	60,5	181,5
Col utérin (C53.0-C53.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Corps utérin (C54.0-C54.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Utérus, sans autre indication (C55.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Ovaire (C56.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Prostate (C61.9)	13	65,7	29,3	102,0	13	135,5	55,3	215,7
Testicule (C62.0-C62.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Verge (C60.0-C60.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Uretère (C66.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oeil (C69.0-C69.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Lymphomes non hodgkiniens	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres leucémies	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Sarcome de Kaposi (M-9140)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2009) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 2-13

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Territoires du Nord-Ouest

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2006												
Total, tous les sièges primaires de cancer	99	396,6	317,2	475,9	57	463,1	342,8	583,3	42	323,9	221,4	426,3
Lèvre (C00.0-C00.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Langue (C01.9-C02.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Oropharynx (C10.0-C10.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Oesophage (C15.0-C15.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Estomac (C16.0-C16.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9-C26.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	11	45,6	16,5	74,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Anus (C21.0-C21.8)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Foie (C22.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Vésicule biliaire (C23.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Pancréas (C25.0-C25.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Larynx (C32.0-C32.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	15	61,8	27,9	95,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Os et articulations (C40.0-C41.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sein (C50.0-C50.9)	13	32,6	14,0	51,2	0	0,0	0,0	0,0	13	72,2	30,1	114,4
Col utérin (C53.0-C53.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Corps utérin (C54.0-C54.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Utérus, sans autre indication (C55.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Ovaire (C56.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Prostate (C61.9)	15	45,8	20,9	70,8	15	82,7	37,4	128,0
Testicule (C62.0-C62.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Verge (C60.0-C60.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Urètre (C66.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oeil (C69.0-C69.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Tableau 2-13 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Territoires du Nord-Ouest

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0
Lymphomes non hodgkiniens	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres leucémies	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Sarcome de Kaposi (M-9140)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
2005												
Total, tous les sièges primaires de cancer	103	407,2	323,9	490,4	60	466,1	338,6	593,7	43	338,4	235,4	441,4
Lèvre (C00.0-C00.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Langue (C01.9-C02.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Oesophage (C15.0-C15.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Estomac (C16.0-C16.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Anus (C21.0-C21.8)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Foie (C22.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Vésicule biliaire (C23.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Pancréas (C25.0-C25.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Larynx (C32.0-C32.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	12	59,7	24,0	95,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Os et articulations (C40.0-C41.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0

Tableau 2-13 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Territoires du Nord-Ouest

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Sein (C50.0-C50.9)	12	39,9	14,4	65,3	0	0,0	0,0	0,0	12	81,8	29,8	133,9
Col utérin (C53.0-C53.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Corps utérin (C54.0-C54.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ovaire (C56.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Prostate (C61.9)	17	74,2	36,3	112,1	17	138,4	67,3	209,4
Testicule (C62.0-C62.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Verge (C60.0-C60.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Uretrère (C66.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oeil (C69.0-C69.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Lymphomes non hodgkiniens	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres leucémies	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2009) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 2-14

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Nunavut

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2006												
Total, tous les sièges primaires de cancer	59	569,1	406,0	732,1	28	456,5	279,1	633,8	31	809,3	456,0	1 162,6
Lèvre (C00.0-C00.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Langue (C01.9-C02.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oesophage (C15.0-C15.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Estomac (C16.0-C16.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9-C26.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	10	79,2	20,1	138,2	x	x	x	x	x	x	x	x
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Anus (C21.0-C21.8)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Foie (C22.0)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Vésicule biliaire (C23.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Pancréas (C25.0-C25.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Larynx (C32.0-C32.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	21	223,7	111,5	335,9	11	185,1	58,4	311,9	10	316,6	80,2	553,0
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Os et articulations (C40.0-C41.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sein (C50.0-C50.9)	6	41,0	-4,2	86,3	0	0,0	0,0	0,0	6	112,1	-23,2	247,4
Col utérin (C53.0-C53.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Corps utérin (C54.0-C54.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Utérus, sans autre indication (C55.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Ovaire (C56.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Prostate (C61.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Testicule (C62.0-C62.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Verge (C60.0-C60.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Urètre (C66.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oeil (C69.0-C69.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Tableau 2-14 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Nunavut

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Autres localisations du système nerveux												
(C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)												
0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)												
0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)												
0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lymphomes non hodgkiniens												
x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)												
x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	0	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)												
0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)												
0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)												
0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)												
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Autres leucémies												
x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues												
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mésothéliome (M-9050-M-9055)												
0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sarcome de Kaposi (M-9140)												
0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
2005												
Total, tous les sièges primaires de cancer												
73	883,7	657,8	1 109,5	39	942,3	644,2	1 240,3	34	747,7	438,6	1 056,7	
Lèvre (C00.0-C00.9)												
0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Langue (C01.9-C02.9)												
0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)												
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)												
0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)												
0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Nasopharynx (C11.0-C11.9)												
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Oropharynx (C10.0-C10.9)												
0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)												
0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)												
0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Oesophage (C15.0-C15.9)												
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	
Estomac (C16.0-C16.9)												
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Intestin grêle (C17.0-C17.9)												
0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)												
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)												
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)												
9	72,1	11,4	132,7	x	x	x	x	x	x	x	x	
Anus (C21.0-C21.8)												
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	
Foie (C22.0)												
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	
Vésicule biliaire (C23.9)												
0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Pancréas (C25.0-C25.9)												
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)												
x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	
Larynx (C32.0-C32.9)												
0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)												
21	260,8	136,4	385,3	14	300,6	134,8	466,3	7	206,3	14,3	398,2	
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)												
0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	
Os et articulations (C40.0-C41.9)												
0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	

Tableau 2-14 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009), selon le sexe, selon les taux d'incidence normalisés selon l'âge (structure démographique du Recensement de 1991), selon la géographie — Nunavut

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Sein (C50.0-C50.9)	10	58,7	18,4	99,1	0	0,0	0,0	0,0	10	129,7	37,8	221,6
Col utérin (C53.0-C53.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Corps utérin (C54.0-C54.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Utérus, sans autre indication (C55.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Ovaire (C56.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Prostate (C61.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Testicule (C62.0-C62.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Verge (C60.0-C60.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Uretère (C66.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oeil (C69.0-C69.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Lymphomes non hodgkiniens	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres leucémies	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2009) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Notes explicatives pour les tableaux

Tableau 1 Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009)

Organisation mondiale de la santé, Classification internationale des maladies, Troisième édition (CIM-O-3) et les règles du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) pour déterminer les sièges primaires multiples.

L'incidence du cancer se rapporte aux nouveaux sièges primaires des tumeurs malignes. L'incidence du cancer peut varier d'une diffusion à l'autre en raison du caractère dynamique de la base de données du Registre canadien du cancer (RCC) qui peut être mise à jour par l'ajout d'enregistrements ou par la modification d'enregistrements existants.

Le tableau a été préparé en se servant des groupes du « Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) » pour les sièges primaires selon la Classification internationale des maladies, Troisième édition (CIM-O-3). Tous les sièges invasifs et in situ pour la vessie sont compris.

L'intervalle de confiance (IC) de 95 % témoigne du degré de variabilité d'un taux. La variabilité des taux présentés est d'autant plus forte que l'intervalle de confiance est grand; aussi faut-il interpréter et comparer ces taux avec prudence.

Le programme de suppression Merrigan-Hortop est utilisé pour supprimer les cellules présentant de faibles dénombrements des données du cancer. Il supprime les cellules du tableau contenant un petit dénombrement (de 1 à 5) et supprime ensuite d'autres cellules itérativement pour empêcher le calcul des cellules supprimées à partir des données diffusées. Le programme choisit une cellule ayant le dénombrement minimal parmi les cellules dans la classe d'équivalence de position la plus prometteuse, mais il peut supprimer des cellules présentant n'importe quel dénombrement, y compris un dénombrement de zéro, mais il ne supprime pas de cellules non disponibles ou non applicables. Quand une cellule est supprimée, toutes les mesures de taux et nombre (nombre, taux, limite inférieure et supérieure de l'intervalle de confiance du taux) pour cette cellule sont supprimées ensemble.

Tableau 2 Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2009)

Organisation mondiale de la santé, Classification internationale des maladies, Troisième édition (CIM-O-3) et les règles du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) pour déterminer les sièges primaires multiples.

L'incidence du cancer se rapporte aux nouveaux sièges primaires des tumeurs malignes. L'incidence du cancer peut varier d'une diffusion à l'autre en raison du caractère dynamique de la base de données du Registre canadien du cancer (RCC) qui peut être mise à jour par l'ajout d'enregistrements ou par la modification d'enregistrements existants.

Le tableau a été préparé en se servant des groupes du « Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) » pour les sièges primaires selon la Classification internationale des maladies, Troisième édition (CIM-O-3). Tous les sièges invasifs et in situ pour la vessie sont compris.

Les taux d'incidence du cancer sont normalisés selon l'âge par la méthode directe en prenant pour référence la structure par âge de la population qui prévalait lors du Recensement de la population du Canada de 1991.

Les intervalles de confiance des taux d'incidence du cancer normalisés selon l'âge ont été produits par la méthode de référence suivante : ESTÈVE J, E BENHAMOU et L RAYMOND. *Statistical methods in cancer research. Volume IV : Descriptive epidemiology*, publication scientifique no 128 du Centre international de recherche sur le cancer, Lyon, CIRC, 1994.

L'intervalle de confiance (IC) de 95 % témoigne du degré de variabilité d'un taux. La variabilité des taux présentés est d'autant plus forte que l'intervalle de confiance est grand; aussi faut-il interpréter et comparer ces taux avec prudence.

Le programme de suppression Merrigan-Hortop est utilisé pour supprimer les cellules présentant de faibles dénombrements des données du cancer. Il supprime les cellules du tableau contenant un petit dénombrement (de 1 à 5) et supprime ensuite d'autres cellules itérativement pour empêcher le calcul des cellules supprimées à partir des données diffusées. Le programme choisit une cellule ayant le dénombrement minimal parmi les cellules dans la classe d'équivalence de position la plus prometteuse, mais il peut supprimer des cellules présentant n'importe quel dénombrement, y compris un dénombrement de zéro, mais il ne supprime pas de cellules non disponibles ou non applicables. Quand une cellule est supprimée, toutes les mesures de taux et nombre (nombre, taux, limite inférieure et supérieure de l'intervalle de confiance du taux) pour cette cellule sont supprimées ensemble.

L'utilisation d'estimations démographiques correspondant à une population type permet de calculer des taux d'incidence dont la comparaison est plus significative, car les taux ainsi obtenus sont corrigés pour la variation de la structure par âge de la population au fil du temps ainsi que d'une région à l'autre.

Appendice I

Sièges de cancer

Liste des sièges de cancer diagnostiqués au Canada, noms et codes de la Classification internationale des maladies, Troisième édition (CIM-O-3)¹

Sièges primaires	Codes de la CIM-O-3
Lèvre	C00.0 à C00.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Langue	C01.9 à C02.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Glandes salivaires principales	C07.9 à C08.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Plancher de la bouche	C04.0 à C04.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Gencive et autres localisations de la bouche	C03.0 à C03.9, C05.0 à C05.9, C06.0 à C06.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Nasopharynx	C11.0 à C11.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Oropharynx	C10.0 à C10.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Hypopharynx	C12.9, C13.0 à C13.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx	C09.0 à C09.9, C14.0, C14.2 à C14.8 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Oesophage	C15.0 à C15.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Estomac	C16.0 à C16.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Intestin grêle	C17.0 à C17.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Colorectal	C18.0 to 18.9, C19.9, C20.9, C26.0 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Côlon à l'exclusion du rectum	C18.0 à C18.9, C26.0 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Rectum et recto-sigmoïde	C19.9, C20.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Anus	C21.0 à C21.2, C21.8 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Foie	C22.0 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Vésicule biliaire	C23.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)

1. **Source** : Organisation mondiale de la santé, Classification internationale des maladies pour l'oncologie, Troisième édition (CIM-O-3) et Surveillance, Epidemiology, and End Results Program (SEER).

Pancréas	C25.0 à C25.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Autres localisations de l'appareil digestif	C22.1, C24.0 à C24.9, C26.8 à C26.9, C48.0, C48.1 à C48.2, C48.8 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Larynx	C32.0 à -C32.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Poumon et bronche	C34.0 à C34.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Autres localisations de l'appareil respiratoire	C30.0 à C30.1, C31.0 à C31.9, C33.9, C38.1 à C38.3, C38.4, C38.8, C39.0, C39.8, C39.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Os et articulations	C40.0 à C41.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Tissus mous (y compris le coeur)	C38.0, C47.0 à C47.9, C49.0 à C49.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Mélanomes de la peau	C44.0 à C44.9, M-8720 à M-8790
Autres localisations de la peau	C44.0 à C44.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-8050 à M-8084, M-8090 à M-8110, M-8720 à M-8790, M-9050 à M-9055, M-9140, M-9590 à M-9989.)
Sein	C50.0 à C50.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Col utérin	C53.0 à C53.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Corps utérin	C54.0 à C54.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Utérus, sans autre indication	C55.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Ovaire	C56.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Autres organes génitaux féminins	C51.0 à C51.9, C52.9, C57.0 à -C58.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Prostate	C61.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Testicule	C62.0 à C62.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Verge	C60.0 à C60.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Autres organes génitaux masculins	C63.0 à C63.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Vessie (y compris in situ)	C67.0 à C67.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Rein et bassinnet du rein	C64.9, C65.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Urètre	C66.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Autres localisations de l'appareil urinaire	C68.0 à C68.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Oeil	C69.0 à C69.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Cerveau	C71.0 à C71.9 (Excluding morphology types M-9530 à M-9539, M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.))
Autres localisations du système nerveux	C71.0 à C71.9, M-9530 à M-9539; C70.0 à C70.9, C72.0 à C72.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)

Thyroïde	C73.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Autre endocrine	C37.9, C74.0 à C74.9, C75.0 à C75.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Maladie de Hodgkin	M-9650 à M-9667
Lymphomes non hodgkiniens	M-9590 à M-9596, M-9670 à M-9719, M-9727 à M-9729; M-9823, tous les sièges sauf C42.0, C42.1, C42.4; M-9827, tous les sièges sauf C42.0, C42.1, C42.4
Myélome multiple	M-9731, M-9732, M-9734
Leucémie lymphocytaire aiguë	M-9826, M-9835 à M-9837
Leucémie lymphocytaire chronique	C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823
Leucémie myéloïde aiguë	M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871 à M-9874, M-9895 à M-9897, M-9910, M-9920
Leucémie myéloïde chronique	M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946
Autres leucémies	M-9733, M-9742, M-9800, M-9801, M-9805, M-9820, M-9831, M-9832 à M-9834, M-9860, M-9870, M-9891, M-9930, M-9931, M-9940, M-9948, M-9963, M-9964; C42.0, M-9827; C42.1, M-9827; C42.4, M-9827
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	C42.0 à C42.4, M-8000 à M-9049, M-9056 à M-9139, M-9141 à M-9589; C76.0 à C76.8, M-8000 à M-9049, M-9056 à M-9139, M-9141 à M-9589; C77.0 à C77.9, M-8000 à M-9049, M-9056 à M-9139, M-9141 à M-9589; C80.9, M-8000 à M-9049, M-9056 à M-9139, M-9141 à M-9589; M-9740, M-9741, M-9750 à M-9758, M-9760 à M-9769, M-9950 à M-9962, M-9970 à M-9989
Mésothéliome	M-9050 à M-9055
Sarcome de Kaposi	M-9140