

N° 82-231-X au catalogue

Incidence du cancer au Canada

2007 et 2008



Statistique
Canada

Statistics
Canada

Canada

Comment obtenir d'autres renseignements

Toute demande de renseignements au sujet du présent produit ou au sujet de statistiques ou de services connexes doit être adressée à : Division de la statistique de la santé, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 (téléphone : 1 800 263-1136; 613 951-1746 (hd-ds@statcan.gc.ca).

Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l'ensemble des données et des services de Statistique Canada, visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca. Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel à infostats@statcan.gc.ca ou par téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros suivants :

Centre de contact national de Statistique Canada

Numéros sans frais (Canada et États-Unis) :

Service de renseignements	1-800-263-1136
Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants	1-800-363-7629
Télécopieur	1-877-287-4369

Appels locaux ou internationaux :

Service de renseignements	1-613-951-8116
Télécopieur	1-613-951-0581

Programme des services de dépôt

Service de renseignements	1-800-635-7943
Télécopieur	1-800-565-7757

Comment accéder à ce produit

Le produit n° 82-231-X au catalogue est disponible gratuitement sous format électronique. Pour obtenir un exemplaire, il suffit de visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca et de parcourir par « Ressource clé » > « Publications ».

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s'est doté de *normes de service à la clientèle* que les employés observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi publiées sur le site www.statcan.gc.ca sous « À propos de nous » > « Offrir des services aux Canadiens ».

Incidence du cancer au Canada

2007 et 2008

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2010

Tous droits réservés. Le contenu de la présente publication électronique peut être reproduit en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, sans autre permission de Statistique Canada, sous réserve que la reproduction soit effectuée uniquement à des fins d'étude privée, de recherche, de critique, de compte rendu ou en vue d'en préparer un résumé destiné aux journaux et/ou à des fins non commerciales. Statistique Canada doit être cité comme suit : Source (ou « Adapté de », s'il y a lieu) : Statistique Canada, année de publication, nom du produit, numéro au catalogue, volume et numéro, période de référence et page(s). Autrement, il est interdit de reproduire le contenu de la présente publication, ou de l'emmagasiner dans un système d'extraction, ou de le transmettre sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, reproduction électronique, mécanique, photographique, pour quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable des Services d'octroi de licences, Division des services à la clientèle, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Septembre 2010

N° 82-231-X au catalogue

ISSN 1715-8176

Périodicité : annuelle

Ottawa

This publication is also available in English.

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

Information pour l'utilisateur

Signes conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada :

- . indisponible pour toute période de référence
- .. indisponible pour une période de référence précise
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- 0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
- 0^s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie
- p provisoire
- r révisé
- x confidentiel en vertu des dispositions de la *Loi sur la statistique*
- E à utiliser avec prudence
- F trop peu fiable pour être publié

Remerciements

Les données du Registre canadien du cancer utilisées dans la préparation des tableaux sur l'incidence du cancer ont été fournies à Statistique Canada par les registres provinciaux et territoriaux du cancer. Nous les remercions vivement de leur coopération.

Table des matières

Faits saillants	5
Aperçu du Registre canadien du cancer	6
Buts	6
Couverture	7
Produits connexes	8
Tableaux statistiques	
1 Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010)	10
1-1 Canada	10
1-2 Terre-Neuve-et-Labrador	11
1-3 Île-du-Prince-Édouard	12
1-4 Nouvelle-Écosse	13
1-5 Nouveau-Brunswick	14
1-6 Québec	15
1-7 Ontario	16
1-8 Manitoba	17
1-9 Saskatchewan	18
1-10 Alberta	19
1-11 Colombie-Britannique	20
1-12 Yukon	21
1-13 Territoires du Nord-Ouest	22
1-14 Nunavut	23
2 Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010)	24
2-1 Canada	24
2-2 Terre-Neuve-et-Labrador	26
2-3 Île-du-Prince-Édouard	29
2-4 Nouvelle-Écosse	32
2-5 Nouveau-Brunswick	35
2-6 Québec	38
2-7 Ontario	40
2-8 Manitoba	43

Table des matières – suite

2-9	Saskatchewan	46
2-10	Alberta	49
2-11	Colombie-Britannique	52
2-12	Yukon	55
2-13	Territoires du Nord-Ouest	58
2-14	Nunavut	61

Qualité des données, concepts et méthodologie

Notes explicatives pour les tableaux	64
--------------------------------------	----

Appendice

I Sièges de cancer	66
--------------------	----

Faits saillants

Les tableaux dans cette publication présentent des données sur l'incidence du cancer pour les cas diagnostiqués en 2007 et en 2008 au Canada, dans les provinces et les territoires. Les tableaux contiennent des données tirées du fichier de totalisations du RCC de juillet 2010. Les données sur l'incidence du cancer de 1992 à 2008 sont disponibles sur CANSIM. Les tendances relatives à l'incidence du cancer et les estimations pour l'an 2010 basées sur ces données ont été diffusées en mai 2010 par la Société canadienne du cancer dans la monographie Statistiques canadiennes sur le cancer.

Aperçu du Registre canadien du cancer

Le Registre canadien du cancer, qui est une base de données axée sur le patient, émane du Système national de déclaration des cas de cancer établi en 1969. Le Registre canadien du cancer est une enquête administrative. Les registres provinciaux et territoriaux du cancer transmettent au Registre canadien du cancer toutes les données qu'ils recueillent pour les cas de cancer diagnostiqués depuis 1992. Le Registre canadien du cancer a été élaboré afin de produire l'information requise sur l'incidence et le taux de survie au Canada, aux fins de la lutte contre le cancer. Le Registre canadien du cancer correspond à une banque de données personnelles qui figure dans la publication annuelle Info Source à Sources de renseignements fédéraux.

Le Registre canadien du cancer est le fruit d'une collaboration entre les treize registres provinciaux et territoriaux du cancer du Canada et de la Division de la statistique de la santé de Statistique Canada où les données sont entreposées. Les données transmises décrivent la personne atteinte du cancer ainsi que les caractéristiques de la tumeur. Le Conseil canadien des registres du cancer collabore avec les registres du cancer afin d'établir des normes nationales. L'autorité et la responsabilité finales en ce qui a trait à la complétude et à la qualité des données incombent aux provinces et territoires.

Le Registre canadien du cancer est une base de données dynamique sur tous les résidents du Canada en vie ou décédés chez lesquels on a diagnostiqué un cancer depuis 1992. Sa fonction est de produire des données normalisées et comparables sur l'incidence du cancer et des statistiques sur la survie pour chaque siège primaire de tumeur. Le Registre canadien du cancer est un système axé sur la personne, qui est conçu pour enregistrer le type et le nombre (incidence) de tumeurs primaires diagnostiquées chez une personne jusqu'à son décès. Ce système fait en sorte que des données longitudinales sont disponibles pour chaque personne atteinte d'un cancer. Il permet de repérer les nouvelles tumeurs primaires qui se manifestent chez des patients déjà atteints d'un cancer. Les données sur les patients sont couplées régulièrement aux données sur la mortalité de sorte qu'on connaisse, en dernière analyse, la date et la cause du décès de tous les patients enregistrés dans la base de données.

En plus de l'information sur l'incidence du cancer, le Registre canadien du cancer contient des données sur les caractéristiques des patients atteints d'une tumeur unique ou de tumeurs multiples, ainsi que sur la nature et la fréquence de ces tumeurs. Puisque les enregistrements patients demeurent actifs dans le Registre canadien du cancer jusqu'à la confirmation du décès, il est possible de calculer des taux de survie aux diverses formes de cancer.

Le Registre canadien du cancer utilise aussi des logiciels spécialisés pour le couplage interne des enregistrements, afin de déceler les enregistrements en double et pour la confirmation des décès de confirmer les enregistrements de décès. Ces procédures sont exécutées régulièrement. Les questions concernant les renseignements contradictoires et d'autres problèmes de données découverts lors de ces traitements sont résolus en consultation avec les provinces et les territoires déclarants.

Buts

L'objectif du RCC est avant tout de créer une grande base de données nationale permettant d'observer les profils et les tendances du cancer et d'étudier les variations du risque de cancer et la survie chez diverses populations au Canada.

Les statistiques sur la santé servent à fournir des renseignements précis, actuels et pertinents concernant la santé des Canadiens et le système de soins de santé. Statistique Canada fournit des analyses statistiques et d'autres renseignements concernant la santé de la population, les déterminants de la santé, ainsi que la portée et l'utilisation des ressources en soins de santé au Canada. Ces données servent à aider et à appuyer les planificateurs et les décideurs de tous les niveaux de gouvernement dans le domaine de la santé, à soutenir les

recherches démographiques et épidémiologiques, et à tenir le public canadien au courant de l'état de santé de la population et du système de soins de santé.

Couverture

Chaque registre provincial ou territorial du cancer enregistre tous les cas de cancer survenus dans la population de sa province ou de son territoire en combinant l'information provenant de diverses sources, comme les dossiers des centres de traitement anticancéreux et les rapports de radiothérapie, les dossiers médicaux d'hospitalisation, les dossiers médicaux des services de consultations externes et des hôpitaux privés, les rapports d'anatomopathologie et d'autres rapports de laboratoire ou d'autopsie, les rapports de radiologie et de programmes de dépistage, les rapports des médecins exerçant dans le privé et les certificats de décès par cancer émis par les bureaux de la statistique de l'état civil.

Chaque année, environ 145 000 nouveaux enregistrements de tumeur sont chargés dans la base de données du Registre canadien du cancer. Les modifications subséquentes qu'il convient d'apporter aux données des registres en raison d'erreurs ou d'omissions sont également communiquées à Statistique Canada aussitôt que l'information est disponible.

Le Conseil canadien des registres du cancer recommande que les tumeurs qui suivent soient déclarées au Registre canadien du cancer à :

- toutes les tumeurs malignes primaires (codes de topographie C00.00-C80.9 et code de comportement 3);
- tous les carcinomes in situ/intraépithéliaux/non infiltrants/non invasifs (dont le code de comportement est 2); sauf les tumeurs du col utérin (codes de topographie C53.0-C53.9); et sauf les tumeurs de la prostate (code de topographie C61.9);
- toutes les tumeurs à la limite de la malignité (le code de comportement est 1);
- les tumeurs primaires bénignes des méninges, du cerveau, de la moelle épinière, des nerfs crâniens et d'autres parties du système nerveux central (codes de topographie C70.0-C72.9 et code de comportement 0); hypophyse, canal craniopharyngé et glande pinéale (codes de topographie C75.1, C75.2, C75.3 et code de comportement 0).
- Exception : Toutes les tumeurs de la peau (codes de comportement 1, 2, 3) (codes de topographie C44.0-C44.9) répertoriées comme des carcinomes, SAI (code d'histologie 8000-8005), les carcinomes épithéliaux (code d'histologie 8010-8046), les carcinomes épidermoïdes (code d'histologie 8050-8084) et les carcinomes basocellulaires (code d'histologie 8090-8110) ne sont pas des tumeurs à déclarer.

Les enregistrements patients comprennent les données nominales, démographiques et sur la mortalité concernant la personne. Les enregistrements tumeur comprennent des renseignements sur les caractéristiques de la tumeur et son diagnostic.

Produits connexes

Choisis parmi les publications de Statistique Canada

82-221-X	Indicateurs de la santé
82-226-X	Statistiques sur la survie au cancer
82-401-X	Indicateurs de la santé comparables, Canada, provinces et territoires

Choisis parmi les tableaux de CANSIM de Statistique Canada

103-0550	Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010), selon le groupe d'âge et le sexe, Canada, provinces et territoires, annuel
103-0553	Nouveaux cas et taux normalisé selon l'âge pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010), selon le sexe, Canada, provinces et territoires, annuel

Choisis parmi les enquêtes de Statistique Canada

3207	Registre canadien du cancer (www.statcan.ca/francais/sdds/3207_f.htm)
------	--

Choisis parmi les tableaux sommaires de Statistique Canada

- *Cancer, nouveaux cas selon les sièges primaires choisis du cancer, selon le sexe*
- *Décès et taux de mortalité, par province et territoire*

Tableaux statistiques

Tableau 1-1
Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Canada

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
	nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux		
2007												
Tous les âges	163 529	496,6	494,2	499,0	85 430	523,3	519,8	526,8	78 099	470,3	467,0	473,6
0 à 4 ans	442	25,1	22,7	27,4	248	27,4	24,0	30,8	194	22,7	19,5	25,8
5 à 9 ans	211	11,7	10,1	13,3	126	13,6	11,2	16,0	85	9,7	7,6	11,8
10 à 14 ans	245	11,9	10,4	13,4	134	12,7	10,6	14,9	111	11,1	9,0	13,1
15 à 19 ans	473	21,1	19,2	23,0	238	20,7	18,1	23,3	235	21,6	18,8	24,3
20 à 24 ans	695	30,6	28,3	32,9	347	29,8	26,7	32,9	348	31,4	28,1	34,7
25 à 29 ans	1 105	49,5	46,6	52,4	482	42,9	39,1	46,7	623	56,2	51,8	60,6
30 à 34 ans	1 802	82,4	78,6	86,2	613	55,8	51,4	60,2	1 189	109,2	103,0	115,4
35 à 39 ans	2 782	120,3	115,8	124,8	918	78,7	73,6	83,7	1 864	162,8	155,4	170,2
40 à 44 ans	4 920	185,7	180,5	190,9	1 590	119,0	113,1	124,8	3 330	253,7	245,1	262,3
45 à 49 ans	8 563	316,3	309,6	323,0	3 215	236,9	228,7	245,1	5 348	396,1	385,5	406,8
50 à 54 ans	12 525	509,7	500,8	518,7	5 639	462,4	450,4	474,5	6 886	556,3	543,2	569,5
55 à 59 ans	17 268	818,4	806,2	830,7	9 090	872,0	854,1	889,9	8 178	766,2	749,6	782,8
60 à 64 ans	20 503	1 195,4	1 179,1	1 211,8	11 692	1 386,7	1 361,5	1 411,8	8 811	1 010,5	989,4	1 031,6
65 à 69 ans	21 529	1 676,9	1 654,5	1 699,3	12 821	2 068,7	2 032,9	2 104,5	8 708	1 311,2	1 283,7	1 338,8
70 à 74 ans	21 023	2 005,6	1 978,5	2 032,7	12 549	2 556,1	2 511,4	2 600,9	8 474	1 520,6	1 488,2	1 553,0
75 à 79 ans	20 583	2 307,7	2 276,1	2 339,2	11 824	2 975,6	2 921,9	3 029,2	8 759	1 771,0	1 733,9	1 808,1
80 à 84 ans	15 622	2 388,7	2 351,2	2 426,1	8 107	3 129,2	3 061,1	3 197,4	7 515	1 902,8	1 859,8	1 945,9
85 ans et plus	13 235	2 383,2	2 342,5	2 423,8	5 796	3 314,8	3 229,4	3 400,1	7 439	1 955,0	1 910,6	1 999,5
Groupe d'âge, non déclaré	3	1	2

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2010) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 1-2
Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Terre-Neuve-et-Labrador

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
	nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux		
2008												
Tous les âges	2 728	538,7	518,4	558,9	1 513	608,8	578,1	639,4	1 215	471,1	444,6	497,6
0 à 4 ans	9	39,3	18,0	74,5	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	8	25,6	11,0	50,4	x	x	x	x	x	x	x	x
25 à 29 ans	11	38,5	19,2	68,9	x	x	x	x	x	x	x	x
30 à 34 ans	23	75,9	48,1	114,0	10	68,3	32,8	125,5	13	83,1	44,3	142,2
35 à 39 ans	47	134,3	98,7	178,6	8	47,2	20,4	93,1	39	215,9	153,5	295,1
40 à 44 ans	73	179,6	138,4	220,7	23	116,9	74,1	175,4	50	238,3	172,2	304,4
45 à 49 ans	144	338,5	283,2	393,8	62	294,9	221,5	368,4	82	381,0	298,6	463,5
50 à 54 ans	215	506,9	439,2	574,7	102	493,0	397,3	588,7	113	520,2	424,3	616,1
55 à 59 ans	284	710,1	627,5	792,7	150	758,0	636,7	879,3	134	663,2	550,9	775,5
60 à 64 ans	412	1 212,4	1 095,3	1 329,5	259	1 534,5	1 347,7	1 721,4	153	894,5	752,8	1 036,3
65 à 69 ans	451	1 899,5	1 724,2	2 074,8	281	2 405,2	2 124,0	2 686,4	170	1 409,6	1 197,7	1 621,5
70 à 74 ans	376	2 094,2	1 882,6	2 305,9	238	2 734,4	2 387,0	3 081,8	138	1 491,9	1 243,0	1 740,8
75 à 79 ans	323	2 343,6	2 088,0	2 599,2	190	3 033,7	2 602,3	3 465,1	133	1 768,9	1 468,2	2 069,5
80 à 84 ans	212	2 259,6	1 955,5	2 563,8	111	2 866,7	2 333,4	3 400,0	101	1 833,0	1 475,5	2 190,5
85 ans et plus	129	1 587,3	1 313,4	1 861,2	58	2 330,3	1 730,5	2 930,0	71	1 259,3	966,4	1 552,2
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0
2007												
Tous les âges	2 662	525,5	505,6	545,5	1 473	592,0	561,8	622,2	1 189	461,4	435,2	487,6
0 à 4 ans	10	43,9	21,1	80,7	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	8	23,9	10,3	47,0	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25 à 29 ans	8	28,0	12,1	55,2	x	x	x	x	x	x	x	x
30 à 34 ans	21	68,3	42,3	104,3	x	x	x	x	x	x	x	x
35 à 39 ans	37	102,2	72,0	140,9	7	39,8	16,0	82,0	30	161,3	108,8	230,2
40 à 44 ans	74	177,7	137,2	218,2	25	123,1	79,7	181,8	49	229,6	169,9	303,6
45 à 49 ans	122	286,2	235,4	337,0	46	219,8	161,0	293,2	76	350,2	271,5	429,0
50 à 54 ans	204	479,7	413,9	545,6	94	449,5	358,7	540,4	110	509,0	413,8	604,1
55 à 59 ans	350	888,6	795,5	981,7	202	1 030,7	888,6	1 172,9	148	747,9	627,4	868,4
60 à 64 ans	422	1 312,9	1 187,6	1 438,1	241	1 513,6	1 322,5	1 704,7	181	1 115,8	953,3	1 278,4
65 à 69 ans	379	1 672,3	1 504,0	1 840,7	234	2 086,1	1 818,8	2 353,4	145	1 266,8	1 060,6	1 473,0
70 à 74 ans	353	2 001,0	1 792,3	2 209,8	223	2 604,2	2 262,4	2 946,0	130	1 432,0	1 185,9	1 678,2
75 à 79 ans	313	2 325,4	2 067,8	2 583,0	190	3 137,4	2 691,3	3 583,5	123	1 661,3	1 367,7	1 954,9
80 à 84 ans	211	2 254,8	1 950,5	2 559,0	127	3 285,9	2 714,4	3 857,4	84	1 529,2	1 202,2	1 856,2
85 ans et plus	134	1 683,2	1 398,2	1 968,2	60	2 472,2	1 846,6	3 097,7	74	1 337,2	1 032,5	1 641,9
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2010) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 1-3
Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Île-du-Prince-Édouard

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
	nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux		
2008												
Tous les âges	806	578,0	538,1	617,9	431	633,2	573,4	692,9	375	525,4	472,2	578,5
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25 à 29 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30 à 34 ans	8	100,0	43,1	197,0	x	x	x	x	x	x	x	x
35 à 39 ans	11	125,4	62,6	224,4	x	x	x	x	x	x	x	x
40 à 44 ans	21	203,3	125,9	310,8	x	x	x	x	x	x	x	x
45 à 49 ans	33	291,0	200,3	408,6	8	144,6	62,4	284,8	25	430,4	278,5	635,2
50 à 54 ans	54	505,1	370,4	639,9	28	539,9	358,9	780,4	26	472,4	308,5	692,2
55 à 59 ans	77	779,4	605,3	953,4	41	842,4	604,5	1 142,8	36	718,1	502,9	994,2
60 à 64 ans	117	1 335,2	1 093,2	1 577,1	72	1 656,3	1 273,7	2 038,9	45	1 019,0	743,2	1 363,5
65 à 69 ans	120	1 932,4	1 586,6	2 278,1	73	2 403,7	1 852,3	2 955,1	47	1 481,2	1 088,2	1 969,7
70 à 74 ans	116	2 283,5	1 867,9	2 699,0	74	3 057,9	2 361,1	3 754,6	42	1 578,9	1 138,0	2 134,2
75 à 79 ans	98	2 466,0	1 977,8	2 954,3	53	2 947,7	2 154,1	3 741,3	45	2 068,0	1 508,3	2 767,0
80 à 84 ans	63	2 213,6	1 667,0	2 760,3	32	2 821,9	1 930,3	3 983,2	31	1 810,7	1 230,1	2 570,1
85 ans et plus	79	2 724,1	2 123,4	3 324,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0
2007												
Tous les âges	845	611,8	570,5	653,0	475	703,5	640,2	766,7	370	524,0	470,7	577,4
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25 à 29 ans	8	101,2	43,6	199,4	x	x	x	x	x	x	x	x
30 à 34 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
35 à 39 ans	9	101,8	46,6	193,2	x	x	x	x	x	x	x	x
40 à 44 ans	30	281,5	189,9	401,8	13	244,8	130,3	418,6	17	317,9	185,1	509,0
45 à 49 ans	25	226,7	146,7	334,6	10	186,3	89,4	342,5	15	265,0	148,4	437,1
50 à 54 ans	64	612,3	462,3	762,3	39	775,3	551,3	1 059,8	25	461,1	298,4	680,6
55 à 59 ans	79	801,5	624,8	978,3	50	1 025,9	741,5	1 310,2	29	582,1	389,8	836,0
60 à 64 ans	108	1 329,7	1 078,9	1 580,5	66	1 629,2	1 236,2	2 022,3	42	1 031,7	743,6	1 394,5
65 à 69 ans	126	2 099,0	1 732,5	2 465,4	74	2 490,7	1 923,2	3 058,2	52	1 715,0	1 248,9	2 181,2
70 à 74 ans	127	2 516,8	2 079,1	2 954,6	68	2 850,0	2 172,6	3 527,4	59	2 218,0	1 652,1	2 784,0
75 à 79 ans	117	3 070,9	2 514,4	3 627,3	77	4 450,9	3 456,7	5 445,0	40	1 923,1	1 374,0	2 618,8
80 à 84 ans	69	2 384,2	1 821,7	2 946,8	39	3 475,9	2 471,5	4 751,3	30	1 693,0	1 142,2	2 417,0
85 ans et plus	66	2 368,1	1 796,8	2 939,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2010) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 1-4
Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Nouvelle-Écosse

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
	nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux		
2008												
Tous les âges	5 460	583,0	567,5	598,4	2 845	625,6	602,6	648,6	2 615	542,8	522,0	563,6
0 à 4 ans	10	23,0	11,0	42,3	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	10	15,9	7,7	29,3	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	16	26,0	14,9	42,3	x	x	x	x	x	x	x	x
25 à 29 ans	31	56,1	38,1	79,6	12	45,7	23,6	79,9	19	65,4	39,4	102,2
30 à 34 ans	38	68,7	48,6	94,3	11	41,3	20,6	73,9	27	94,2	62,1	137,1
35 à 39 ans	68	109,5	83,4	135,5	21	68,6	42,4	104,8	47	149,2	109,6	198,5
40 à 44 ans	147	207,1	173,6	240,6	51	146,0	105,9	186,0	96	266,4	213,1	319,7
45 à 49 ans	243	305,5	267,1	343,9	78	199,6	155,3	243,9	165	407,8	345,6	470,1
50 à 54 ans	403	533,2	481,1	585,2	195	527,4	453,4	601,5	208	538,7	465,4	611,9
55 à 59 ans	573	853,9	783,9	923,8	312	942,6	838,0	1 047,2	261	767,5	674,4	860,6
60 à 64 ans	689	1 160,5	1 073,9	1 247,2	413	1 415,9	1 279,3	1 552,4	276	913,9	806,1	1 021,7
65 à 69 ans	777	1 779,5	1 654,4	1 904,6	451	2 140,2	1 942,7	2 337,7	326	1 443,1	1 286,4	1 599,7
70 à 74 ans	788	2 337,6	2 174,4	2 500,8	472	2 961,3	2 694,1	3 228,4	316	1 778,2	1 582,1	1 974,2
75 à 79 ans	659	2 424,0	2 238,9	2 609,0	354	2 943,9	2 637,2	3 250,5	305	2 011,6	1 785,8	2 237,4
80 à 84 ans	511	2 584,7	2 360,6	2 808,8	251	3 237,0	2 836,6	3 637,5	260	2 163,8	1 900,8	2 426,8
85 ans et plus	485	2 438,3	2 221,3	2 655,3	199	3 301,8	2 843,1	3 760,6	286	2 062,9	1 823,8	2 302,0
Groupe d'âge, non déclaré	1	1	0
2007												
Tous les âges	5 669	605,7	590,0	621,5	3 035	667,8	644,0	691,5	2 634	547,2	526,3	568,1
0 à 4 ans	7	16,3	6,5	33,5	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	7	14,8	6,0	30,5	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	11	20,0	10,0	35,8	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	9	14,2	6,5	27,0	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	16	26,1	14,9	42,4	x	x	x	x	x	x	x	x
25 à 29 ans	33	59,9	41,2	84,1	18	69,1	41,0	109,2	15	51,6	28,9	85,1
30 à 34 ans	58	102,7	76,3	129,1	27	98,4	64,8	143,2	31	106,7	72,5	151,5
35 à 39 ans	90	143,6	113,9	173,2	36	116,7	81,7	161,6	54	169,5	124,3	214,7
40 à 44 ans	159	212,5	179,4	245,5	61	164,9	123,5	206,2	98	259,0	207,7	310,3
45 à 49 ans	239	302,4	264,1	340,7	99	255,2	204,9	305,5	140	347,9	290,3	405,5
50 à 54 ans	390	527,6	475,2	579,9	192	530,8	455,7	605,8	198	524,5	451,4	597,5
55 à 59 ans	613	912,8	840,5	985,0	351	1 058,2	947,5	1 168,9	262	770,8	677,5	864,2
60 à 64 ans	729	1 297,6	1 203,4	1 391,8	432	1 562,2	1 414,9	1 709,5	297	1 041,2	922,7	1 159,6
65 à 69 ans	780	1 869,7	1 738,5	2 000,9	454	2 247,2	2 040,5	2 453,9	326	1 515,2	1 350,7	1 679,7
70 à 74 ans	778	2 346,7	2 181,8	2 511,6	446	2 857,0	2 591,8	3 122,1	332	1 892,6	1 689,0	2 096,2
75 à 79 ans	771	2 872,2	2 669,4	3 074,9	423	3 592,1	3 249,7	3 934,4	348	2 309,5	2 066,9	2 552,2
80 à 84 ans	503	2 565,0	2 340,9	2 789,2	266	3 506,5	3 085,1	3 927,8	237	1 971,1	1 720,1	2 222,0
85 ans et plus	476	2 457,2	2 236,4	2 677,9	204	3 511,2	3 029,4	3 993,0	272	2 005,6	1 767,3	2 244,0
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2010) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 1-5
Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Nouveau-Brunswick

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
	nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux		
2008												
Tous les âges	4 423	592,0	574,5	609,4	2 500	681,7	655,0	708,4	1 923	505,5	482,9	528,1
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	6	14,1	5,2	30,6	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	12	24,7	12,7	43,1	6	24,0	8,8	52,2	6	25,4	9,3	55,2
20 à 24 ans	15	31,9	17,8	52,5	9	37,2	17,0	70,7	6	26,2	9,6	57,0
25 à 29 ans	24	53,0	34,0	78,9	15	66,0	37,0	108,8	9	39,9	18,3	75,7
30 à 34 ans	31	67,3	45,7	95,5	15	66,6	37,3	109,9	16	67,9	38,8	110,2
35 à 39 ans	62	124,7	93,7	155,8	22	89,3	56,0	135,3	40	159,4	113,9	217,1
40 à 44 ans	106	187,3	151,6	222,9	39	139,4	99,1	190,5	67	234,0	178,0	290,1
45 à 49 ans	194	313,9	269,8	358,1	69	228,0	174,2	281,7	125	396,5	327,0	466,0
50 à 54 ans	328	539,0	480,7	597,4	165	552,3	468,0	636,5	163	526,3	445,5	607,1
55 à 59 ans	470	852,1	775,0	929,1	261	963,8	846,9	1 080,8	209	744,2	643,3	845,2
60 à 64 ans	650	1 386,3	1 279,8	1 492,9	405	1 741,3	1 571,7	1 910,9	245	1 036,9	907,1	1 166,7
65 à 69 ans	661	1 925,4	1 778,6	2 072,2	438	2 586,2	2 344,0	2 828,4	223	1 282,0	1 113,7	1 450,2
70 à 74 ans	611	2 351,6	2 165,2	2 538,1	391	3 194,2	2 877,6	3 510,8	220	1 601,0	1 389,5	1 812,6
75 à 79 ans	487	2 292,4	2 088,8	2 496,0	274	2 929,9	2 582,9	3 276,8	213	1 791,1	1 550,6	2 031,7
80 à 84 ans	410	2 522,0	2 277,9	2 766,1	228	3 557,5	3 095,7	4 019,3	182	1 848,1	1 579,6	2 116,6
85 ans et plus	346	2 220,4	1 986,4	2 454,3	159	3 328,4	2 811,1	3 845,8	187	1 730,5	1 482,5	1 978,6
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0
2007												
Tous les âges	4 383	587,9	570,5	605,3	2 424	662,4	636,0	688,8	1 959	516,1	493,2	538,9
0 à 4 ans	12	34,2	17,7	59,7	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	11	22,5	11,2	40,3	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	20	42,3	25,9	65,4	13	53,9	28,7	92,2	7	30,3	12,2	62,4
25 à 29 ans	21	46,4	28,7	70,9	9	39,7	18,2	75,3	12	53,2	27,5	92,9
30 à 34 ans	38	81,2	57,5	111,4	13	56,8	30,3	97,2	25	104,5	67,6	154,2
35 à 39 ans	72	143,0	110,0	176,1	27	108,0	71,1	157,1	45	177,7	129,6	237,7
40 à 44 ans	104	176,1	142,3	210,0	34	115,9	80,3	162,0	70	235,5	180,3	290,7
45 à 49 ans	203	329,4	284,1	374,8	78	259,2	201,6	316,7	125	396,5	327,0	466,0
50 à 54 ans	336	560,0	500,1	619,9	164	557,1	471,8	642,3	172	562,8	478,7	646,9
55 à 59 ans	486	888,0	809,1	967,0	279	1 031,1	910,1	1 152,1	207	748,1	646,2	850,0
60 à 64 ans	557	1 266,9	1 161,7	1 372,1	333	1 523,6	1 360,0	1 687,3	224	1 013,1	880,4	1 145,8
65 à 69 ans	621	1 890,4	1 741,7	2 039,1	404	2 505,7	2 261,4	2 750,1	217	1 297,3	1 124,7	1 469,9
70 à 74 ans	602	2 359,2	2 170,7	2 547,7	384	3 222,6	2 900,2	3 544,9	218	1 602,8	1 390,1	1 815,6
75 à 79 ans	494	2 334,4	2 128,5	2 540,2	287	3 116,5	2 756,0	3 477,1	207	1 731,8	1 495,9	1 967,7
80 à 84 ans	416	2 593,5	2 344,3	2 842,7	210	3 358,9	2 904,6	3 813,2	206	2 104,6	1 817,2	2 392,0
85 ans et plus	380	2 531,8	2 277,3	2 786,4	166	3 631,6	3 079,1	4 184,0	214	2 050,2	1 775,5	2 324,9
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2010) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 1-6
Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Québec¹

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
	nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux		
2007												
Tous les âges	40 662	529,0	523,8	534,1	20 786	546,2	538,8	553,6	19 876	512,1	505,0	519,2
0 à 4 ans	117	30,3	24,8	35,7	67	33,8	25,7	41,9	50	26,5	19,2	33,9
5 à 9 ans	35	9,0	6,3	12,5	20	10,0	6,1	15,5	15	7,9	4,4	13,1
10 à 14 ans	58	12,5	9,3	15,8	36	15,2	10,6	21,0	22	9,8	6,1	14,8
15 à 19 ans	121	24,6	20,2	29,0	64	25,4	19,2	31,7	57	23,7	17,6	29,9
20 à 24 ans	132	26,9	22,3	31,5	65	25,9	19,6	32,2	67	28,0	21,3	34,7
25 à 29 ans	227	42,7	37,1	48,2	104	38,3	30,9	45,7	123	47,2	38,9	55,5
30 à 34 ans	377	75,2	67,6	82,8	139	54,1	45,1	63,1	238	97,5	85,1	109,9
35 à 39 ans	538	105,9	96,9	114,8	180	69,2	59,1	79,3	358	144,3	129,4	159,3
40 à 44 ans	1 100	179,4	168,8	190,0	365	116,7	104,8	128,7	735	244,6	226,9	262,3
45 à 49 ans	2 039	314,8	301,1	328,5	746	229,7	213,2	246,2	1 293	400,4	378,6	422,2
50 à 54 ans	3 093	514,6	496,5	532,8	1 313	441,3	417,4	465,1	1 780	586,6	559,4	613,9
55 à 59 ans	4 271	817,1	792,6	841,6	2 122	826,5	791,4	861,7	2 149	808,1	773,9	842,2
60 à 64 ans	5 356	1 203,4	1 171,2	1 235,6	2 967	1 369,6	1 320,3	1 418,9	2 389	1 045,8	1 003,9	1 087,8
65 à 69 ans	5 443	1 654,6	1 610,6	1 698,5	3 189	2 011,2	1 941,4	2 081,0	2 254	1 322,7	1 268,1	1 377,3
70 à 74 ans	5 114	1 957,2	1 903,6	2 010,9	2 988	2 476,4	2 387,6	2 565,2	2 126	1 511,8	1 447,5	1 576,1
75 à 79 ans	5 307	2 385,1	2 320,9	2 449,3	2 946	3 074,8	2 963,8	3 185,8	2 361	1 863,5	1 788,3	1 938,7
80 à 84 ans	4 023	2 562,3	2 483,1	2 641,5	2 026	3 379,4	3 232,3	3 526,6	1 997	2 057,5	1 967,3	2 147,8
85 ans et plus	3 311	2 620,2	2 531,0	2 709,5	1 449	3 943,6	3 740,6	4 146,7	1 862	2 077,6	1 983,3	2 172,0
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0

1. Pour aider à l'interprétation des résultats, il est important de souligner que les cancers déclarés au Fichier des tumeurs du Québec (FITQ) sont ceux ayant fait l'objet d'une hospitalisation ou d'une chirurgie d'un jour. Certains cancers ne sont donc pas déclarés au FITQ s'ils sont diagnostiqués et traités uniquement sur une base externe ou ambulatoire, ou encore ils sont déclarés à un stade plus avancé de la maladie qui requiert une hospitalisation. Une étude d'exhaustivité produite en 2003 évalue entre autres que plus du tiers des cancers de la prostate et des mélanomes ne sont pas déclarés au FITQ en raison de notre source de déclaration. Globalement, 90 % des cas de cancer confirmés par histopathologie seraient déclarés au FITQ.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2010) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 1-7
Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Ontario

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
	nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux		
2008												
Tous les âges	62 439	482,7	478,9	486,5	31 846	499,2	493,7	504,6	30 593	466,6	461,4	471,8
0 à 4 ans	180	25,6	21,9	29,3	90	24,9	19,8	30,1	90	26,3	20,9	31,7
5 à 9 ans	86	12,0	9,4	14,5	43	11,7	8,4	15,7	43	12,3	8,9	16,6
10 à 14 ans	116	14,5	11,8	17,1	63	15,4	11,6	19,2	53	13,5	9,9	17,1
15 à 19 ans	219	24,7	21,4	27,9	112	24,7	20,1	29,3	107	24,7	20,0	29,3
20 à 24 ans	355	39,6	35,5	43,8	171	37,4	31,8	43,0	184	41,9	35,9	48,0
25 à 29 ans	500	57,6	52,5	62,6	188	43,6	37,4	49,9	312	71,3	63,4	79,2
30 à 34 ans	779	90,2	83,9	96,5	275	64,9	57,2	72,5	504	114,6	104,6	124,6
35 à 39 ans	1 306	140,3	132,7	148,0	432	92,9	84,2	101,7	874	187,7	175,2	200,1
40 à 44 ans	2 177	210,8	201,9	219,6	698	134,7	124,7	144,7	1 479	287,4	272,7	302,0
45 à 49 ans	3 480	324,1	313,3	334,8	1 232	228,0	215,3	240,7	2 248	421,3	403,9	438,7
50 à 54 ans	5 063	535,7	520,9	550,4	2 286	487,7	467,7	507,7	2 777	582,9	561,2	604,5
55 à 59 ans	6 477	809,4	789,7	829,1	3 347	853,1	824,2	882,0	3 130	767,4	740,5	794,2
60 à 64 ans	7 881	1 170,1	1 144,3	1 195,9	4 393	1 335,2	1 295,8	1 374,7	3 488	1 012,4	978,8	1 046,0
65 à 69 ans	8 102	1 605,9	1 570,9	1 640,8	4 685	1 939,6	1 884,0	1 995,1	3 417	1 299,3	1 255,8	1 342,9
70 à 74 ans	7 892	1 936,8	1 894,1	1 979,6	4 622	2 444,2	2 373,7	2 514,6	3 270	1 497,5	1 446,1	1 548,8
75 à 79 ans	7 402	2 127,3	2 078,8	2 175,8	4 236	2 727,0	2 644,8	2 809,1	3 166	1 643,7	1 586,4	1 700,9
80 à 84 ans	5 918	2 269,8	2 212,0	2 327,6	3 009	2 878,7	2 775,9	2 981,6	2 909	1 862,3	1 794,7	1 930,0
85 ans et plus	4 502	2 043,8	1 984,1	2 103,5	1 962	2 762,5	2 640,2	2 884,7	2 540	1 701,8	1 635,7	1 768,0
Groupe d'âge, non déclaré	4	2	2
2007												
Tous les âges	63 062	492,9	489,0	496,7	32 651	517,1	511,5	522,7	30 411	469,2	464,0	474,5
0 à 4 ans	159	22,8	19,3	26,3	92	25,7	20,4	30,9	67	19,8	15,0	24,5
5 à 9 ans	97	13,4	10,8	16,1	57	15,4	11,4	19,4	40	11,4	8,1	15,5
10 à 14 ans	91	11,1	8,9	13,4	48	11,5	8,5	15,3	43	10,8	7,8	14,5
15 à 19 ans	216	24,5	21,3	27,8	104	23,1	18,6	27,5	112	26,0	21,2	30,9
20 à 24 ans	313	35,3	31,4	39,2	153	33,8	28,4	39,1	160	36,8	31,1	42,5
25 à 29 ans	468	55,3	50,3	60,4	198	47,3	40,7	53,8	270	63,3	55,7	70,8
30 à 34 ans	812	94,1	87,6	100,5	259	60,8	53,4	68,2	553	126,5	116,0	137,0
35 à 39 ans	1 279	136,7	129,2	144,2	414	88,3	79,8	96,8	865	185,3	172,9	197,6
40 à 44 ans	2 083	195,6	187,2	204,0	647	120,7	111,4	130,0	1 436	271,4	257,4	285,5
45 à 49 ans	3 553	339,7	328,5	350,9	1 298	246,8	233,4	260,3	2 255	433,6	415,7	451,5
50 à 54 ans	4 886	532,7	517,7	547,6	2 219	489,4	469,1	509,8	2 667	574,9	553,1	596,7
55 à 59 ans	6 717	854,3	833,9	874,7	3 535	915,6	885,5	945,8	3 182	795,2	767,5	822,8
60 à 64 ans	7 715	1 211,1	1 184,0	1 238,1	4 446	1 426,8	1 384,8	1 468,7	3 269	1 004,5	970,1	1 039,0
65 à 69 ans	8 276	1 709,8	1 673,0	1 746,7	4 915	2 127,6	2 068,1	2 187,1	3 361	1 328,4	1 283,5	1 373,3
70 à 74 ans	8 058	2 000,7	1 957,0	2 044,4	4 776	2 558,0	2 485,4	2 630,5	3 282	1 519,1	1 467,2	1 571,1
75 à 79 ans	7 723	2 242,1	2 192,1	2 292,1	4 443	2 903,1	2 817,8	2 988,5	3 280	1 713,6	1 655,0	1 772,3
80 à 84 ans	5 860	2 288,6	2 230,0	2 347,2	3 025	2 992,7	2 886,1	3 099,4	2 835	1 829,3	1 762,0	1 896,6
85 ans et plus	4 753	2 294,3	2 229,1	2 359,5	2 021	3 061,8	2 928,3	3 195,3	2 732	1 935,4	1 862,8	2 008,0
Groupe d'âge, non déclaré	3	1	2

1. Les sièges in situ pour la vessie diagnostiqués en Ontario ne sont pas déclarés au Registre canadien du cancer. Les cancers cutanés sans mélanome ne sont pas répertoriés en Ontario. Les sarcomes de Kaposi sont considérablement sous-estimés.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondants.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2010) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 1-8
Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Manitoba

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
	nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux		
2008												
Tous les âges	5 650	468,5	456,2	480,7	2 818	469,6	452,3	486,9	2 832	467,3	450,1	484,5
0 à 4 ans	13	17,7	9,4	30,3	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	6	8,1	3,0	17,6	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	9	11,0	5,0	20,9	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	13	14,6	7,8	25,0	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	22	25,8	16,2	39,1	10	22,8	11,0	42,0	12	29,0	15,0	50,6
25 à 29 ans	41	51,0	36,6	69,1	21	51,0	31,6	77,9	20	50,9	31,1	78,6
30 à 34 ans	65	84,9	64,3	105,5	17	43,8	25,5	70,1	48	127,2	93,8	168,7
35 à 39 ans	82	105,3	82,5	128,0	29	73,5	49,2	105,5	53	137,9	100,8	175,1
40 à 44 ans	131	155,4	128,8	182,0	38	89,1	63,1	122,4	93	223,2	177,8	268,5
45 à 49 ans	288	306,3	270,9	341,7	106	221,0	178,9	263,1	182	395,2	337,8	452,6
50 à 54 ans	409	468,0	422,6	513,4	181	408,7	349,2	468,2	228	528,9	460,3	597,6
55 à 59 ans	521	699,3	639,3	759,3	252	682,1	597,8	766,3	269	716,3	630,7	801,9
60 à 64 ans	710	1 151,4	1 066,7	1 236,1	380	1 246,6	1 121,2	1 371,9	330	1 058,4	944,2	1 172,6
65 à 69 ans	727	1 607,0	1 490,2	1 723,8	417	1 916,6	1 732,7	2 100,6	310	1 320,2	1 173,2	1 467,1
70 à 74 ans	708	1 955,2	1 811,2	2 099,2	412	2 449,9	2 213,3	2 686,5	296	1 526,2	1 352,4	1 700,1
75 à 79 ans	729	2 249,7	2 086,3	2 413,0	394	2 754,1	2 482,1	3 026,0	335	1 850,9	1 652,7	2 049,1
80 à 84 ans	614	2 366,6	2 179,4	2 553,8	311	3 023,8	2 687,7	3 359,9	303	1 935,0	1 717,1	2 152,9
85 ans et plus	562	2 154,2	1 976,1	2 332,3	226	2 738,1	2 381,1	3 095,0	336	1 883,9	1 682,5	2 085,4
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0
2007												
Tous les âges	5 678	475,6	463,2	487,9	2 934	494,1	476,2	512,0	2 744	457,2	440,1	474,3
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	6	7,2	2,7	15,8	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	14	15,9	8,7	26,6	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	27	32,0	21,1	46,5	18	41,4	24,5	65,4	9	22,0	10,1	41,8
25 à 29 ans	47	60,0	44,1	79,8	18	45,1	26,7	71,2	29	75,6	50,6	108,6
30 à 34 ans	52	68,8	50,1	87,5	18	46,8	27,8	74,0	34	91,6	63,4	128,0
35 à 39 ans	93	120,2	95,8	144,6	25	63,8	41,3	94,1	68	178,1	135,8	220,4
40 à 44 ans	142	161,9	135,3	188,6	47	106,4	78,1	141,4	95	218,4	174,4	262,3
45 à 49 ans	285	305,6	270,1	341,1	127	265,9	219,7	312,2	158	347,2	293,1	401,3
50 à 54 ans	448	524,0	475,5	572,5	207	481,0	415,4	546,5	241	567,6	495,9	639,2
55 à 59 ans	605	827,3	761,3	893,2	307	845,0	750,5	939,6	298	809,7	717,8	901,7
60 à 64 ans	679	1 160,3	1 073,0	1 247,6	374	1 289,2	1 158,6	1 419,9	305	1 033,6	917,6	1 149,6
65 à 69 ans	713	1 638,6	1 518,3	1 758,9	423	2 025,0	1 832,0	2 218,0	290	1 281,9	1 134,3	1 429,4
70 à 74 ans	704	1 947,9	1 804,0	2 091,8	429	2 557,4	2 315,4	2 799,4	275	1 420,0	1 252,2	1 587,8
75 à 79 ans	689	2 114,9	1 957,0	2 272,8	393	2 745,0	2 473,6	3 016,4	296	1 620,9	1 436,3	1 805,6
80 à 84 ans	602	2 299,6	2 115,9	2 483,2	281	2 752,7	2 430,9	3 074,6	321	2 009,9	1 790,0	2 229,8
85 ans et plus	557	2 216,9	2 032,8	2 401,0	246	3 120,2	2 730,3	3 510,2	311	1 803,8	1 603,4	2 004,3
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2010) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 1-9
Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Saskatchewan

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
	nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux		
2008												
Tous les âges	5 043	497,5	483,8	511,3	2 701	537,3	517,1	557,6	2 342	458,4	439,8	476,9
0 à 4 ans	22	34,8	21,8	52,8	15	46,2	25,9	76,2	7	22,8	9,2	47,0
5 à 9 ans	7	11,4	4,6	23,4	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	6	8,9	3,3	19,3	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	13	16,9	9,0	28,9	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	15	20,2	11,3	33,4	9	23,6	10,8	44,9	6	16,7	6,1	36,3
25 à 29 ans	35	51,1	35,6	71,1	16	46,5	26,6	75,5	19	55,8	33,6	87,1
30 à 34 ans	46	75,1	55,0	100,1	23	74,9	47,5	112,5	23	75,2	47,7	112,8
35 à 39 ans	68	114,7	87,4	142,0	26	87,3	57,0	128,0	42	142,3	102,6	192,4
40 à 44 ans	96	143,5	114,8	172,2	37	110,4	77,8	152,2	59	176,6	131,6	221,7
45 à 49 ans	228	293,7	255,5	331,8	107	275,9	223,6	328,2	121	311,4	255,9	366,9
50 à 54 ans	413	552,5	499,2	605,8	181	484,7	414,1	555,4	232	620,2	540,4	700,0
55 à 59 ans	478	775,3	705,8	844,8	236	757,9	661,2	854,6	242	793,0	693,1	892,9
60 à 64 ans	604	1 221,1	1 123,7	1 318,5	347	1 406,8	1 258,8	1 554,8	257	1 036,4	909,7	1 163,1
65 à 69 ans	632	1 634,3	1 506,9	1 761,7	383	2 034,6	1 830,9	2 238,4	249	1 254,6	1 098,8	1 410,4
70 à 74 ans	666	2 002,1	1 850,0	2 154,2	381	2 438,4	2 193,6	2 683,2	285	1 615,6	1 428,1	1 803,2
75 à 79 ans	655	2 175,1	2 008,6	2 341,7	390	2 855,1	2 571,7	3 138,4	265	1 610,6	1 416,7	1 804,6
80 à 84 ans	554	2 290,3	2 099,6	2 481,0	289	2 870,5	2 539,5	3 201,4	265	1 876,6	1 650,7	2 102,6
85 ans et plus	505	2 043,1	1 864,9	2 221,3	249	3 112,1	2 725,6	3 498,7	256	1 531,5	1 343,9	1 719,1
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0
2007												
Tous les âges	5 102	510,1	496,1	524,1	2 701	545,2	524,6	565,8	2 401	475,7	456,7	494,7
0 à 4 ans	12	19,8	10,2	34,6	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	6	9,8	3,6	21,3	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	8	11,7	5,0	23,0	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	9	11,7	5,3	22,2	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	19	26,0	15,7	40,6	9	24,2	11,1	45,9	10	27,9	13,4	51,3
25 à 29 ans	32	48,6	33,2	68,6	16	48,3	27,6	78,4	16	48,9	28,0	79,4
30 à 34 ans	37	62,3	43,9	85,9	14	47,1	25,7	79,0	23	77,6	49,2	116,4
35 à 39 ans	49	83,8	62,0	110,8	17	58,0	33,8	92,8	32	109,8	75,1	154,9
40 à 44 ans	120	171,1	140,5	201,7	34	97,0	67,2	135,6	86	245,1	193,3	296,9
45 à 49 ans	234	305,8	266,6	345,0	84	220,0	172,9	267,0	150	391,4	328,7	454,0
50 à 54 ans	352	482,8	432,4	533,3	170	465,1	395,2	535,0	182	500,6	427,9	573,4
55 à 59 ans	473	794,4	722,8	866,0	247	823,7	720,9	926,4	226	764,8	665,1	864,5
60 à 64 ans	632	1 345,9	1 241,0	1 450,8	360	1 537,9	1 379,1	1 696,8	272	1 155,0	1 017,8	1 292,3
65 à 69 ans	657	1 739,7	1 606,7	1 872,7	394	2 155,5	1 942,6	2 368,3	263	1 349,7	1 186,6	1 512,8
70 à 74 ans	742	2 230,6	2 070,1	2 391,1	474	3 023,0	2 750,8	3 295,1	268	1 524,1	1 341,6	1 706,6
75 à 79 ans	676	2 222,4	2 054,8	2 389,9	384	2 790,9	2 511,8	3 070,0	292	1 752,8	1 551,8	1 953,9
80 à 84 ans	517	2 147,6	1 962,5	2 332,8	259	2 607,2	2 289,7	2 924,7	258	1 824,7	1 602,1	2 047,4
85 ans et plus	527	2 162,7	1 978,0	2 347,3	221	2 815,3	2 444,1	3 186,5	306	1 852,5	1 645,0	2 060,1
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2010) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 1-10
Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Alberta

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
	nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux		
2008												
Tous les âges	14 179	394,3	387,8	400,8	7 565	412,3	403,0	421,6	6 614	375,6	366,5	384,6
0 à 4 ans	51	22,3	16,2	28,5	28	23,8	15,8	34,4	23	20,8	13,2	31,2
5 à 9 ans	34	16,2	11,2	22,6	17	15,7	9,1	25,1	17	16,7	9,8	26,8
10 à 14 ans	31	13,9	9,4	19,7	21	18,4	11,4	28,1	10	9,2	4,4	16,9
15 à 19 ans	54	21,7	15,9	27,4	34	26,5	18,4	37,0	20	16,5	10,1	25,5
20 à 24 ans	99	34,6	27,8	41,4	52	34,5	25,1	43,9	47	34,7	25,5	46,2
25 à 29 ans	156	53,0	44,7	61,3	77	49,5	38,5	60,6	79	56,9	44,3	69,4
30 à 34 ans	203	74,3	64,1	84,5	80	55,6	43,4	67,8	123	95,1	78,3	111,9
35 à 39 ans	265	99,0	87,1	111,0	102	72,8	58,7	87,0	163	127,8	108,2	147,4
40 à 44 ans	457	168,0	152,6	183,4	147	104,6	87,7	121,5	310	235,8	209,5	262,0
45 à 49 ans	849	291,3	271,7	310,9	330	221,8	197,8	245,7	519	363,9	332,6	395,2
50 à 54 ans	1 256	476,6	450,2	502,9	626	462,8	426,5	499,0	630	491,2	452,8	529,5
55 à 59 ans	1 539	752,3	714,7	789,9	838	805,8	751,3	860,4	701	696,9	645,3	748,5
60 à 64 ans	1 792	1 133,5	1 081,0	1 185,9	1 028	1 296,4	1 217,1	1 375,6	764	969,5	900,8	1 038,3
65 à 69 ans	1 835	1 635,4	1 560,6	1 710,2	1 108	2 009,3	1 891,0	2 127,6	727	1 274,0	1 181,4	1 366,6
70 à 74 ans	1 732	1 978,3	1 885,2	2 071,5	1 013	2 433,9	2 284,0	2 583,7	719	1 565,5	1 451,1	1 679,9
75 à 79 ans	1 616	2 174,7	2 068,6	2 280,7	944	2 767,2	2 590,7	2 943,7	672	1 671,8	1 545,4	1 798,2
80 à 84 ans	1 161	2 204,4	2 077,6	2 331,2	641	2 934,8	2 707,6	3 162,0	520	1 686,8	1 541,8	1 831,8
85 ans et plus	1 049	2 203,6	2 070,2	2 336,9	479	3 082,4	2 806,3	3 358,4	570	1 777,6	1 631,7	1 923,6
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0
2007												
Tous les âges	14 054	400,0	393,4	406,7	7 375	412,2	402,8	421,6	6 679	387,5	378,2	396,7
0 à 4 ans	58	26,4	19,6	33,2	30	26,5	17,9	37,8	28	26,4	17,5	38,1
5 à 9 ans	23	11,1	7,0	16,6	15	14,0	7,8	23,1	8	7,9	3,4	15,6
10 à 14 ans	27	12,0	7,9	17,4	13	11,3	6,0	19,3	14	12,7	7,0	21,4
15 à 19 ans	30	12,0	8,1	17,2	11	8,5	4,3	15,3	19	15,8	9,5	24,6
20 à 24 ans	71	25,1	19,3	31,0	37	24,8	17,5	34,3	34	25,4	17,6	35,5
25 à 29 ans	136	48,7	40,5	56,8	55	37,4	27,5	47,3	81	61,2	47,9	74,5
30 à 34 ans	210	79,8	69,0	90,6	69	50,1	38,3	62,0	141	112,5	93,9	131,0
35 à 39 ans	289	111,3	98,5	124,1	94	69,4	55,4	83,5	195	156,8	134,8	178,8
40 à 44 ans	524	189,6	173,3	205,8	177	124,7	106,3	143,0	347	258,1	231,0	285,3
45 à 49 ans	882	307,8	287,5	328,1	347	237,4	212,4	262,4	535	381,0	348,7	413,3
50 à 54 ans	1 281	503,8	476,2	531,4	603	462,9	425,9	499,8	678	546,8	505,7	588,0
55 à 59 ans	1 560	791,2	751,9	830,4	857	856,4	799,1	913,7	703	723,9	670,4	777,5
60 à 64 ans	1 606	1 086,1	1 033,0	1 139,2	897	1 210,6	1 131,4	1 289,8	709	961,0	890,3	1 031,8
65 à 69 ans	1 753	1 637,6	1 560,9	1 714,2	1 053	2 008,1	1 886,8	2 129,4	700	1 281,8	1 186,8	1 376,7
70 à 74 ans	1 733	1 988,9	1 895,3	2 082,6	1 023	2 466,0	2 314,8	2 617,1	710	1 555,4	1 441,0	1 669,8
75 à 79 ans	1 668	2 276,7	2 167,5	2 386,0	981	2 918,6	2 736,0	3 101,2	687	1 732,6	1 603,1	1 862,2
80 à 84 ans	1 151	2 240,0	2 110,6	2 369,5	633	3 016,3	2 781,3	3 251,3	518	1 704,1	1 557,4	1 850,9
85 ans et plus	1 052	2 315,0	2 175,1	2 454,9	480	3 243,5	2 953,3	3 533,6	572	1 866,7	1 713,7	2 019,6
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2010) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 1-11
Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Colombie-Britannique

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
	nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux		
2008												
Tous les âges	20 571	469,2	462,8	475,7	11 009	506,5	497,0	516,0	9 562	432,6	423,9	441,3
0 à 4 ans	46	21,4	15,6	28,5	25	22,5	14,5	33,2	21	20,2	12,5	30,9
5 à 9 ans	27	12,3	8,1	17,9	10	8,8	4,2	16,2	17	16,0	9,3	25,6
10 à 14 ans	37	14,7	10,4	20,3	18	13,9	8,2	22,0	19	15,6	9,4	24,4
15 à 19 ans	55	19,1	14,1	24,2	29	19,5	13,0	27,9	26	18,7	12,2	27,5
20 à 24 ans	88	29,0	23,0	35,1	49	31,3	23,2	41,4	39	26,6	18,9	36,4
25 à 29 ans	141	47,4	39,6	55,2	62	41,8	31,4	52,3	79	52,9	41,3	64,6
30 à 34 ans	179	64,0	54,6	73,3	87	62,8	49,6	76,0	92	65,1	51,8	78,4
35 à 39 ans	276	90,0	79,4	100,6	97	63,7	51,0	76,3	179	116,0	99,0	132,9
40 à 44 ans	599	179,3	164,9	193,7	191	114,9	98,6	131,2	408	243,0	219,4	266,6
45 à 49 ans	1 010	279,4	262,1	296,6	384	214,7	193,2	236,2	626	342,7	315,8	369,5
50 à 54 ans	1 553	455,7	433,1	478,4	688	410,8	380,1	441,5	865	499,2	465,9	532,4
55 à 59 ans	2 067	687,3	657,7	716,9	1 094	738,5	694,7	782,3	973	637,6	597,5	677,7
60 à 64 ans	2 601	1 040,2	1 000,2	1 080,1	1 459	1 178,5	1 118,0	1 238,9	1 142	904,5	852,1	957,0
65 à 69 ans	2 747	1 476,8	1 421,5	1 532,0	1 655	1 809,7	1 722,5	1 896,9	1 092	1 154,8	1 086,3	1 223,3
70 à 74 ans	2 567	1 743,1	1 675,7	1 810,5	1 534	2 146,3	2 038,9	2 253,7	1 033	1 362,9	1 279,8	1 446,0
75 à 79 ans	2 678	2 152,5	2 071,0	2 234,1	1 588	2 704,3	2 571,3	2 837,3	1 090	1 659,3	1 560,8	1 757,8
80 à 84 ans	2 009	2 174,4	2 079,3	2 269,5	1 129	2 887,5	2 719,0	3 055,9	880	1 651,2	1 542,1	1 760,3
85 ans et plus	1 891	2 206,7	2 107,3	2 306,2	910	3 079,6	2 879,5	3 279,7	981	1 747,3	1 638,0	1 856,7
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0
2007												
Tous les âges	21 125	490,2	483,6	496,8	11 425	535,0	525,2	544,8	9 700	446,2	437,3	455,1
0 à 4 ans	54	25,6	18,8	32,5	28	25,7	17,1	37,1	26	25,6	16,7	37,5
5 à 9 ans	31	14,1	9,6	20,0	20	17,6	10,8	27,3	11	10,3	5,2	18,5
10 à 14 ans	33	12,9	8,9	18,1	17	12,9	7,5	20,7	16	12,9	7,4	21,0
15 à 19 ans	52	18,2	13,2	23,1	26	17,5	11,4	25,6	26	18,9	12,3	27,7
20 à 24 ans	82	27,7	21,7	33,7	40	26,4	18,9	35,9	42	29,1	21,0	39,3
25 à 29 ans	123	43,2	35,6	50,8	57	40,2	29,8	50,7	66	46,1	35,0	57,2
30 à 34 ans	187	67,9	58,2	77,7	67	49,2	37,4	60,9	120	86,4	70,9	101,8
35 à 39 ans	317	103,5	92,1	114,9	109	71,6	58,1	85,0	208	135,0	116,7	153,4
40 à 44 ans	574	167,9	154,1	181,6	182	106,8	91,3	122,3	392	228,6	205,9	251,2
45 à 49 ans	962	271,7	254,5	288,9	372	213,2	191,5	234,8	590	328,6	302,1	355,1
50 à 54 ans	1 435	432,2	409,8	454,5	623	381,6	351,7	411,6	812	481,0	448,0	514,1
55 à 59 ans	2 076	705,5	675,1	735,8	1 121	770,7	725,6	815,9	955	641,7	601,0	682,4
60 à 64 ans	2 649	1 124,7	1 081,9	1 167,5	1 548	1 324,8	1 258,8	1 390,8	1 101	927,7	872,9	982,5
65 à 69 ans	2 738	1 544,8	1 486,9	1 602,6	1 653	1 901,5	1 809,8	1 993,1	1 085	1 201,4	1 129,9	1 272,9
70 à 74 ans	2 782	1 919,8	1 848,4	1 991,1	1 721	2 443,4	2 327,9	2 558,8	1 061	1 424,6	1 338,9	1 510,3
75 à 79 ans	2 807	2 291,5	2 206,7	2 376,3	1 690	2 935,6	2 795,6	3 075,5	1 117	1 720,4	1 619,5	1 821,3
80 à 84 ans	2 253	2 478,4	2 376,0	2 580,7	1 229	3 245,9	3 064,4	3 427,4	1 024	1 930,5	1 812,2	2 048,7
85 ans et plus	1 970	2 420,8	2 313,9	2 527,7	922	3 317,6	3 103,5	3 531,8	1 048	1 955,7	1 837,3	2 074,1
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2010) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 1-12
Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Yukon

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
	nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux		
2008												
Tous les âges	87	262,3	207,2	317,4	40	236,2	168,7	321,6	47	289,5	212,7	385,0
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25 à 29 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30 à 34 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
35 à 39 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40 à 44 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45 à 49 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
50 à 54 ans	10	331,5	159,1	609,5	x	x	x	x	x	x	x	x
55 à 59 ans	8	321,0	138,4	632,4	x	x	x	x	x	x	x	x
60 à 64 ans	13	711,9	379,0	1 217,4	7	697,2	279,9	1 436,3	6	729,9	267,6	1 588,8
65 à 69 ans	14	1 417,0	774,3	2 377,5	8	1 459,9	629,6	2 875,9	6	1 363,6	500,0	2 968,2
70 à 74 ans	9	1 355,4	620,5	2 572,3	x	x	x	x	x	x	x	x
75 à 79 ans	8	1 731,6	746,8	3 411,3	x	x	x	x	x	x	x	x
80 à 84 ans	6	2 803,7	1 028,0	6 102,8	x	x	x	x	x	x	x	x
85 ans et plus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0
2007												
Tous les âges	108	331,4	268,9	393,9	57	342,9	253,9	432,0	51	319,4	231,8	407,1
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25 à 29 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30 à 34 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
35 à 39 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40 à 44 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45 à 49 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
50 à 54 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
55 à 59 ans	19	794,0	478,1	1 239,9	9	711,5	325,7	1 350,2	10	886,5	425,5	1 630,3
60 à 64 ans	22	1 336,6	837,8	2 023,7	10	1 100,1	528,1	2 023,1	12	1 628,2	841,2	2 844,0
65 à 69 ans	16	1 720,4	983,9	2 793,5	x	x	x	x	x	x	x	x
70 à 74 ans	10	1 631,3	783,0	3 000,0	x	x	x	x	x	x	x	x
75 à 79 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80 à 84 ans	10	4 672,9	2 243,0	8 593,5	x	x	x	x	x	x	x	x
85 ans et plus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2010) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 1-13
Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Territoires du Nord-Ouest

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
	nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux		
2008												
Tous les âges	99	226,4	181,8	271,0	50	220,7	159,5	281,9	49	232,6	172,1	307,5
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25 à 29 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30 à 34 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
35 à 39 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40 à 44 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45 à 49 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
50 à 54 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
55 à 59 ans	17	720,9	419,8	1 154,4	8	613,5	264,6	1 208,6	9	853,9	390,9	1 620,5
60 à 64 ans	15	1 000,0	560,0	1 649,3	x	x	x	x	x	x	x	x
65 à 69 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
70 à 74 ans	14	2 697,5	1 474,0	4 526,0	6	2 205,9	808,8	4 801,5	8	3 238,9	1 396,8	6 380,6
75 à 79 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80 à 84 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85 ans et plus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0
2007												
Tous les âges	130	298,5	247,2	349,9	68	300,8	229,3	372,3	62	296,1	222,4	369,8
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
15 à 19 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
20 à 24 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25 à 29 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
30 à 34 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
35 à 39 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40 à 44 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45 à 49 ans	10	279,3	134,0	513,5	x	x	x	x	x	x	x	x
50 à 54 ans	21	710,2	439,6	1 085,6	6	393,4	144,3	856,4	15	1 047,5	586,6	1 727,7
55 à 59 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
60 à 64 ans	18	1 315,8	780,0	2 079,7	x	x	x	x	x	x	x	x
65 à 69 ans	18	2 359,1	1 398,4	3 728,7	x	x	x	x	x	x	x	x
70 à 74 ans	12	2 281,4	1 178,7	3 984,8	x	x	x	x	x	x	x	x
75 à 79 ans	11	2 925,5	1 460,1	5 234,0	x	x	x	x	x	x	x	x
80 à 84 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85 ans et plus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2010) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

Tableau 1-14
Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Nunavut

	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
	nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux		
2008												
Tous les âges	44	139,1	101,1	186,8	21	128,1	79,3	195,8	23	151,0	95,7	226,6
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25 à 29 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30 à 34 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
35 à 39 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40 à 44 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45 à 49 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
50 à 54 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
55 à 59 ans	10	945,2	453,7	1 738,2	x	x	x	x	x	x	x	x
60 à 64 ans	6	863,3	316,5	1 879,1	x	x	x	x	x	x	x	x
65 à 69 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
70 à 74 ans	6	2 553,2	936,2	5 557,4	x	x	x	x	x	x	x	x
75 à 79 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80 à 84 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85 ans et plus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0
2007												
Tous les âges	49	156,7	115,9	207,1	26	161,1	105,2	236,1	23	151,9	96,3	228,0
0 à 4 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 à 9 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10 à 14 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15 à 19 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20 à 24 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25 à 29 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30 à 34 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
35 à 39 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40 à 44 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
45 à 49 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
50 à 54 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
55 à 59 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
60 à 64 ans	10	1 464,1	702,8	2 692,5	x	x	x	x	x	x	x	x
65 à 69 ans	9	2 374,7	1 087,1	4 506,6	x	x	x	x	x	x	x	x
70 à 74 ans	8	3 603,6	1 554,1	7 099,1	x	x	x	x	x	x	x	x
75 à 79 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
80 à 84 ans	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85 ans et plus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Groupe d'âge, non déclaré	0	0	0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0550 présente des données sur l'incidence du cancer pour les sièges primaires selon le groupe d'âge quinquennal et fournit également les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95 % correspondantes.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2010) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0550).

**Tableau 2-1
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Canada**

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2007												
Total, tous les sièges primaires de cancer	163 529	405,2	403,2	407,2	85 430	463,2	460,0	466,3	78 099	362,2	359,6	364,8
Lèvre (C00.0-C00.9)	336	0,8	0,7	0,9	252	1,4	1,2	1,5	84	0,4	0,3	0,4
Langue (C01.9-C02.9)	932	2,3	2,1	2,4	643	3,3	3,0	3,5	289	1,3	1,2	1,5
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	421	1,1	1,0	1,2	232	1,3	1,1	1,5	189	0,9	0,8	1,1
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	191	0,5	0,4	0,5	115	0,6	0,5	0,7	76	0,4	0,3	0,4
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	516	1,3	1,2	1,4	284	1,5	1,3	1,7	232	1,1	0,9	1,2
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	256	0,7	0,6	0,7	181	1,0	0,8	1,1	75	0,4	0,3	0,5
Oropharynx (C10.0-C10.9)	162	0,4	0,3	0,4	114	0,6	0,5	0,7	48	0,2	0,2	0,3
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	234	0,6	0,5	0,7	201	1,1	0,9	1,2	33	0,2	0,1	0,2
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	607	1,4	1,3	1,5	463	2,3	2,1	2,5	144	0,6	0,5	0,8
Oesophage (C15.0-C15.9)	1 572	3,8	3,6	4,0	1 191	6,3	6,0	6,7	381	1,6	1,5	1,8
Estomac (C16.0-C16.9)	3 030	7,3	7,1	7,6	1 929	10,4	9,9	10,9	1 101	4,8	4,5	5,1
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	611	1,5	1,4	1,6	341	1,8	1,6	2,0	270	1,2	1,1	1,4
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9-C26.0)	20 465	49,6	49,0	50,3	11 198	60,4	59,3	61,5	9 267	40,6	39,7	41,4
Célon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	13 744	33,3	32,7	33,8	7 074	38,5	37,6	39,4	6 670	28,9	28,2	29,6
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	6 721	16,4	16,0	16,8	4 124	21,9	21,2	22,6	2 597	11,7	11,2	12,1
Anus (C21.0-C21.8)	556	1,3	1,2	1,4	231	1,2	1,0	1,4	325	1,5	1,3	1,6
Foie (C22.0)	1 557	3,8	3,6	4,0	1 185	6,2	5,8	6,5	372	1,7	1,5	1,9
Vésicule biliaire (C23.9)	458	1,1	1,0	1,2	151	0,8	0,7	1,0	307	1,3	1,2	1,5
Pancréas (C25.0-C25.9)	3 915	9,4	9,1	9,7	1 952	10,5	10,0	10,9	1 963	8,4	8,0	8,8
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	1 569	3,8	3,6	4,0	762	4,1	3,8	4,4	807	3,5	3,3	3,8
Larynx (C32.0-C32.9)	1 105	2,7	2,6	2,9	899	4,8	4,5	5,1	206	1,0	0,8	1,1
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	22 865	56,0	55,3	56,8	12 461	67,8	66,6	69,0	10 404	47,2	46,3	48,1
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	350	0,9	0,8	1,0	209	1,2	1,0	1,3	141	0,7	0,5	0,8
Os et articulations (C40.0-C41.9)	350	1,0	0,9	1,1	198	1,2	1,0	1,3	152	0,8	0,7	1,0
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	1 116	3,0	2,8	3,1	617	3,5	3,2	3,8	499	2,6	2,3	2,8
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	4 826	12,2	11,9	12,6	2 554	13,7	13,2	14,3	2 272	11,2	10,8	11,7
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	317	0,8	0,7	0,9	167	1,0	0,8	1,1	150	0,7	0,6	0,8
Sein (C50.0-C50.9)	21 184	51,8	51,1	52,5	163	0,9	0,7	1,0	21 021	98,4	97,0	99,7
Col utérin (C53.0-C53.9)	1 397	3,9	3,7	4,2	1 397	7,8	7,4	8,2
Corps utérin (C54.0-C54.9)	4 359	10,5	10,2	10,9	4 359	20,1	19,5	20,8
Utérus, sans autre indication (C55.9)	134	0,3	0,3	0,4	134	0,6	0,5	0,7
Ovaire (C56.9)	2 437	6,0	5,7	6,2	2 437	11,3	10,9	11,8
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	790	1,9	1,8	2,0	790	3,6	3,3	3,8
Prostate (C61.9)	23 181	57,8	57,1	58,6	23 181	124,7	123,1	126,3
Testicule (C62.0-C62.9)	832	2,8	2,6	3,0	832	5,5	5,1	5,9
Verge (C60.0-C60.9)	139	0,3	0,3	0,4	139	0,7	0,6	0,9
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	48	0,1	0,1	0,2	48	0,3	0,2	0,3
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	6 732	16,3	15,9	16,7	4 933	26,9	26,2	27,7	1 799	7,8	7,5	8,2
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	4 783	11,8	11,5	12,1	2 852	15,1	14,5	15,6	1 931	9,0	8,5	9,4
Uretere (C66.9)	196	0,5	0,4	0,5	119	0,7	0,5	0,8	77	0,3	0,2	0,4
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	249	0,6	0,5	0,7	195	1,1	0,9	1,2	54	0,2	0,2	0,3
Oeil (C69.0-C69.9)	289	0,7	0,7	0,8	162	0,9	0,7	1,0	127	0,6	0,5	0,7
Cerveau (C71.0-C71.9)	2 424	6,4	6,2	6,7	1 389	7,7	7,3	8,2	1 035	5,2	4,9	5,6
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	145	0,4	0,3	0,5	70	0,4	0,3	0,5	75	0,4	0,3	0,5
Thyroïde (C73.9)	4 200	11,7	11,3	12,0	950	5,2	4,9	5,6	3 250	18,0	17,4	18,7

Tableau 2-1 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Canada

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	278	0,8	0,7	0,8	124	0,7	0,6	0,8	154	0,8	0,7	0,9
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	915	2,8	2,6	3,0	500	3,1	2,8	3,4	415	2,5	2,3	2,8
Lymphomes non hodgkiniens	6 767	16,9	16,4	17,3	3 763	20,4	19,7	21,1	3 004	13,8	13,3	14,3
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	1 982	4,8	4,5	5,0	1 069	5,7	5,4	6,1	913	4,0	3,7	4,3
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	400	1,3	1,2	1,5	233	1,6	1,4	1,8	167	1,1	0,9	1,2
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	2 077	5,0	4,8	5,2	1 263	6,8	6,4	7,1	814	3,6	3,3	3,8
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	1 114	2,9	2,7	3,0	577	3,2	3,0	3,5	537	2,6	2,4	2,8
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	520	1,3	1,2	1,4	292	1,6	1,4	1,8	228	1,1	0,9	1,2
Autres leucémies	678	1,7	1,6	1,8	391	2,2	1,9	2,4	287	1,3	1,1	1,4
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	6 397	15,1	14,8	15,5	3 195	17,5	16,9	18,1	3 202	13,2	12,8	13,7
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	512	1,3	1,2	1,4	417	2,3	2,1	2,5	95	0,4	0,4	0,5
Sarcome de Kaposi (M-9140)	53	0,1	0,1	0,2	43	0,3	0,2	0,3	10	0,0	0,0	0,1

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2010) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 2-2
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Terre-Neuve-et-Labrador

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2008												
Total, tous les sièges primaires de cancer	2 728	403,8	388,3	419,4	1 513	473,5	449,1	497,9	1 215	344,3	324,3	364,4
Lèvre (C00.0-C00.9)	6	0,9	0,4	2,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	19	2,8	1,8	4,4	13	3,7	2,2	6,6	6	2,0	0,8	4,5
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	13	1,9	1,1	3,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Oesophage (C15.0-C15.9)	19	2,8	1,8	4,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Estomac (C16.0-C16.9)	79	11,8	9,2	14,5	55	17,9	13,1	22,7	24	7,1	4,8	10,6
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9-C26.0)	462	67,0	60,7	73,2	261	80,8	70,8	90,9	201	54,6	46,9	62,3
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	298	42,9	38,0	47,9	153	47,3	39,7	54,9	145	39,0	32,5	45,4
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	164	24,0	20,3	27,8	108	33,6	27,1	40,1	56	15,6	11,4	19,8
Anus (C21.0-C21.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Foie (C22.0)	10	1,5	0,8	2,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Vésicule biliaire (C23.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Pancréas (C25.0-C25.9)	46	6,6	5,1	8,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	22	3,6	2,4	5,5	8	2,6	1,3	5,4	14	4,4	2,5	7,5
Larynx (C32.0-C32.9)	31	4,6	3,3	6,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	336	49,6	44,2	55,0	215	68,4	59,1	77,7	121	34,3	28,1	40,5
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Os et articulations (C40.0-C41.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	13	2,5	1,4	4,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	86	12,8	10,0	15,6	51	16,1	11,5	20,6	35	9,9	7,2	13,8
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	11	1,8	1,0	3,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	343	93,7	83,5	103,8
Col utérin (C53.0-C53.9)	22	4,0	2,6	6,0	22	7,7	5,0	11,6
Corps utérin (C54.0-C54.9)	76	10,6	8,2	13,0	76	20,6	15,9	25,3
Utérus, sans autre indication (C55.9)	7	1,0	0,5	2,3	7	2,0	0,9	4,6
Ovaire (C56.9)	26	3,8	2,7	5,6	26	7,4	5,1	10,8
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Prostate (C61.9)	449	64,0	58,0	70,0	449	134,2	121,6	146,8
Testicule (C62.0-C62.9)	6	1,1	0,5	2,5	6	2,3	1,0	5,1
Verge (C60.0-C60.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	94	13,5	10,8	16,3	67	21,9	16,6	27,2	27	7,1	5,0	10,5
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	104	14,7	11,8	17,5	60	17,6	13,1	22,2	44	12,1	9,2	16,1
Uretere (C66.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cerveau (C71.0-C71.9)	43	6,3	4,8	8,4	x	x	x	x	x	x	x	x

Tableau 2-2 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Terre-Neuve-et-Labrador

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	58	10,3	7,4	13,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	8	1,6	0,8	3,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Lymphomes non hodgkiniens	100	15,5	12,4	18,6	49	16,3	12,5	21,2	51	14,5	10,4	18,7
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	24	3,4	2,3	5,0	10	3,1	1,6	5,8	14	3,6	2,2	6,3
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	11	2,7	1,5	4,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	19	2,8	1,9	4,5	9	2,8	1,5	5,6	10	2,8	1,5	5,4
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	16	3,0	1,8	4,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	11	1,7	0,9	3,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres leucémies	8	1,2	0,6	2,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	84	13,1	10,2	15,9	47	15,7	12,0	20,5	37	10,2	7,6	14,0
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
2007												
Total, tous les sièges primaires de cancer	2 662	397,3	381,8	412,7	1 473	466,3	442,0	490,6	1 189	340,9	320,8	360,9
Lèvre (C00.0-C00.9)	9	1,3	0,7	2,5	9	2,7	1,4	5,4	0	0,0	0,0	0,0
Langue (C01.9-C02.9)	14	2,1	1,2	3,6	8	2,5	1,2	5,1	6	1,7	0,7	4,0
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	6	0,8	0,3	2,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oesophage (C15.0-C15.9)	29	4,2	3,0	6,0	22	7,4	4,9	11,0	7	1,8	0,8	4,1
Estomac (C16.0-C16.9)	90	13,7	10,8	16,6	54	17,3	12,6	22,0	36	11,1	8,1	15,3
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	14	1,9	1,2	3,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9-C26.0)	485	72,4	65,8	78,9	279	89,6	78,9	100,3	206	57,5	49,5	65,5
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	312	47,0	41,7	52,3	169	55,9	47,4	64,5	143	39,7	33,1	46,3
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	173	25,4	21,6	29,2	110	33,6	27,2	40,0	63	17,8	13,3	22,3
Anus (C21.0-C21.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Foie (C22.0)	19	3,0	1,9	4,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Vésicule biliaire (C23.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Pancréas (C25.0-C25.9)	38	5,3	3,9	7,2	18	5,5	3,5	8,7	20	5,2	3,4	8,2
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	14	2,0	1,2	3,4	7	2,1	1,0	4,5	7	1,8	0,8	4,1
Larynx (C32.0-C32.9)	21	3,0	2,0	4,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	328	48,8	43,5	54,2	197	62,2	53,4	71,0	131	37,3	30,8	43,8
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	8	1,5	0,7	2,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	9	1,5	0,8	2,8	x	x	x	x	x	x	x	x

Tableau 2-2 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Terre-Neuve-et-Labrador

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	77	11,8	9,1	14,6	44	14,4	10,9	19,0	33	9,8	7,0	13,8
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	9	1,5	0,7	2,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	303	84,0	74,4	93,7
Col utérin (C53.0-C53.9)	25	4,6	3,1	6,7	25	8,8	5,9	12,9
Corps utérin (C54.0-C54.9)	77	10,6	8,2	13,0	77	20,6	15,9	25,3
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ovaire (C56.9)	23	3,2	2,2	4,9	23	6,3	4,3	9,5
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	9	1,3	0,7	2,6	9	2,4	1,2	4,9
Prostate (C61.9)	431	63,0	57,0	69,0	431	132,9	120,1	145,6
Testicule (C62.0-C62.9)	9	2,0	1,0	3,8	9	4,2	2,1	7,6
Verge (C60.0-C60.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	107	15,8	12,8	18,8	74	24,9	19,1	30,6	33	8,9	6,5	12,5
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	89	13,4	10,5	16,2	53	16,1	11,5	20,6	36	10,5	7,7	14,5
Ureètre (C66.9)	6	0,9	0,4	2,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cerveau (C71.0-C71.9)	35	5,8	4,2	8,0	25	8,1	5,6	11,9	10	3,5	1,8	6,6
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	59	9,7	7,1	12,4	11	3,3	1,8	6,0	48	15,8	12,0	20,7
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Lymphomes non hodgkiniens	113	17,1	13,8	20,3	58	18,5	13,6	23,4	55	16,2	11,8	20,7
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	23	3,5	2,4	5,2	12	3,6	2,1	6,5	11	3,3	1,8	6,1
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	9	1,6	0,8	3,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	7	1,1	0,5	2,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres leucémies	9	1,4	0,7	2,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	80	11,7	9,1	14,4	36	12,0	8,9	16,4	44	12,0	9,1	16,1
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2010) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 2-3
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Île-du-Prince-Édouard

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2008												
Total, tous les sièges primaires de cancer	806	429,4	399,0	459,8	431	497,5	449,9	545,1	375	375,9	336,1	415,7
Lèvre (C00.0-C00.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	6	3,1	1,3	7,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Oesophage (C15.0-C15.9)	11	6,3	3,4	11,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Estomac (C16.0-C16.9)	12	6,0	3,5	11,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9-C26.0)	104	54,5	43,9	65,2	52	59,6	43,3	75,9	52	49,6	35,6	63,7
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	84	44,0	34,4	53,6	38	44,1	33,0	59,7	46	43,4	33,0	57,8
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	20	10,5	6,9	16,3	14	15,5	9,3	26,5	6	6,3	2,7	14,7
Anus (C21.0-C21.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Foie (C22.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vésicule biliaire (C23.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Pancréas (C25.0-C25.9)	21	10,9	7,1	16,9	10	12,5	6,6	23,7	11	9,6	5,2	18,7
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	9	5,0	2,6	9,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Larynx (C32.0-C32.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	120	63,1	51,7	74,6	76	88,5	68,5	108,6	44	41,1	31,2	54,9
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Os et articulations (C40.0-C41.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	28	15,2	10,7	21,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Sein (C50.0-C50.9)	102	55,6	44,5	66,6	0	0,0	0,0	0,0	102	106,3	85,0	127,6
Col utérin (C53.0-C53.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Corps utérin (C54.0-C54.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Utérus, sans autre indication (C55.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Ovaire (C56.9)	9	4,8	2,5	9,6	9	9,1	4,6	18,3
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Prostate (C61.9)	117	59,1	48,2	70,0	117	130,4	106,6	154,2
Testicule (C62.0-C62.9)	x	x	x	x
Verge (C60.0-C60.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	34	17,0	12,4	23,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	35	18,6	13,7	25,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Urètre (C66.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Tableau 2-3 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Île-du-Prince-Édouard

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Lymphomes non hodgkiniens	26	13,6	9,3	20,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	6	3,2	1,4	7,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres leucémies	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	32	15,4	11,2	21,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Sarcome de Kaposi (M-9140)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
2007												
Total, tous les sièges primaires de cancer	845	469,3	436,9	501,8	475	567,1	515,3	618,9	370	387,5	346,2	428,7
Lèvre (C00.0-C00.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Langue (C01.9-C02.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Oropharynx (C10.0-C10.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oesophage (C15.0-C15.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Estomac (C16.0-C16.9)	11	6,5	3,6	11,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)	97	51,4	41,1	61,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	61	32,0	23,8	40,1	34	40,5	29,7	55,7	27	25,4	17,7	37,3
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	36	19,4	14,4	26,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Anus (C21.0-C21.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Foie (C22.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vésicule biliaire (C23.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Pancréas (C25.0-C25.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Larynx (C32.0-C32.9)	10	5,1	2,8	9,9	10	11,3	6,1	21,5	0	0,0	0,0	0,0
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	118	63,7	52,1	75,4	62	75,4	56,5	94,2	56	54,6	39,8	69,3
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0

Tableau 2-3 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Île-du-Prince-Édouard

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	40	22,5	16,9	30,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Sein (C50.0-C50.9)	82	45,3	35,3	55,4	0	0,0	0,0	0,0	82	86,0	66,7	105,3
Col utérin (C53.0-C53.9)	10	6,8	3,6	12,4	10	13,2	7,0	24,4
Corps utérin (C54.0-C54.9)	27	15,3	10,7	22,1	27	30,0	21,0	43,3
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ovaire (C56.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Prostate (C61.9)	163	88,5	74,8	102,2	163	188,7	159,5	217,8
Testicule (C62.0-C62.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Verge (C60.0-C60.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	30	15,5	11,1	22,1	18	21,2	13,6	33,4	12	9,4	5,3	18,2
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	29	15,4	10,9	22,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Uretere (C66.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Cerveau (C71.0-C71.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	12	10,0	5,5	16,9	6	10,2	4,2	21,6	6	9,8	4,0	20,9
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Lymphomes non hodgkiniens	28	16,1	11,3	23,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Myéiome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie myéiocytaire aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie myéiocytaire chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres leucémies	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	42	21,9	16,6	29,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sarcome de Kaposi (M-9140)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2010) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 2-4
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Nouvelle-Écosse

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2008												
Total, tous les sièges primaires de cancer	5 460	424,5	412,9	436,0	2 845	482,7	464,7	500,7	2 615	379,4	364,2	394,6
Lèvre (C00.0-C00.9)	7	0,5	0,2	1,2	x	x	x	x	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	39	2,9	2,2	3,9	29	4,4	3,2	6,4	10	1,4	0,8	2,8
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	11	1,0	0,5	1,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	16	1,1	0,7	1,9	8	1,3	0,7	2,8	8	1,0	0,5	2,2
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	7	0,5	0,3	1,2	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	20	1,5	1,0	2,3	13	2,0	1,2	3,5	7	1,0	0,5	2,2
Oesophage (C15.0-C15.9)	59	4,5	3,3	5,6	42	6,9	5,2	9,2	17	2,4	1,5	3,9
Estomac (C16.0-C16.9)	100	7,7	6,1	9,3	63	10,7	8,0	13,4	37	5,3	3,9	7,3
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	20	1,7	1,1	2,6	9	1,7	0,9	3,3	11	1,7	0,9	3,1
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9-C26.0)	799	60,3	56,0	64,6	437	73,7	66,7	80,7	362	49,3	44,0	54,5
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	573	42,7	39,2	46,3	280	47,5	41,8	53,1	293	39,0	34,3	43,6
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	226	17,6	15,2	19,9	157	26,2	22,1	30,4	69	10,3	7,7	12,8
Anus (C21.0-C21.8)	12	0,9	0,5	1,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Foie (C22.0)	36	2,6	1,9	3,6	28	4,5	3,2	6,5	8	1,0	0,5	2,2
Vésicule biliaire (C23.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Pancréas (C25.0-C25.9)	120	8,9	7,3	10,5	59	10,0	7,5	12,6	61	7,9	5,8	10,0
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	40	2,9	2,2	3,9	24	3,8	2,6	5,7	16	2,3	1,4	3,8
Larynx (C32.0-C32.9)	40	3,1	2,3	4,1	34	5,6	4,1	7,8	6	0,8	0,3	2,0
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	825	63,0	58,6	67,3	426	72,1	65,2	79,0	399	56,2	50,5	61,8
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	8	0,7	0,3	1,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	10	1,1	0,6	2,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	29	2,5	1,8	3,6	10	2,0	1,1	3,8	19	3,0	1,9	4,7
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	226	18,4	15,9	20,8	116	19,7	16,0	23,4	110	17,3	13,9	20,7
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	19	1,4	0,9	2,2	9	1,7	0,8	3,2	10	1,2	0,7	2,5
Sein (C50.0-C50.9)	714	55,7	51,5	59,9	7	1,1	0,5	2,4	707	104,4	96,5	112,4
Col utérin (C53.0-C53.9)	43	4,3	3,3	5,7	43	8,4	6,3	11,1
Corps utérin (C54.0-C54.9)	107	8,0	6,4	9,5	107	15,1	12,2	18,1
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ovaire (C56.9)	54	3,9	2,8	4,9	54	7,0	5,1	9,0
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	30	2,4	1,7	3,4	30	4,3	3,0	6,2
Prostate (C61.9)	731	56,0	51,9	60,1	731	120,8	112,0	129,6
Testicule (C62.0-C62.9)	24	3,0	2,0	4,3	24	6,1	4,2	8,9
Verge (C60.0-C60.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	245	18,2	15,9	20,6	183	31,2	26,7	35,8	62	8,2	6,1	10,4
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	199	15,3	13,1	17,4	118	19,6	16,0	23,1	81	11,4	8,9	14,0
Urètre (C66.9)	11	0,8	0,5	1,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	6	0,6	0,3	1,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Cerveau (C71.0-C71.9)	91	7,6	6,0	9,3	45	8,2	6,2	10,8	46	7,4	5,6	9,8

Tableau 2-4 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Nouvelle-Écosse

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	115	10,4	8,4	12,3	31	5,5	3,9	7,7	84	15,0	11,6	18,3
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	7	0,7	0,3	1,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	21	2,2	1,4	3,3	10	2,2	1,2	4,0	11	2,2	1,2	3,8
Lymphomes non hodgkiniens	214	16,6	14,3	18,9	101	16,9	13,5	20,2	113	16,3	13,2	19,5
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	68	5,3	4,0	6,5	44	7,5	5,7	9,8	24	3,5	2,4	5,2
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	35	2,7	2,0	3,7	25	4,0	2,8	5,9	10	1,4	0,7	2,7
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	31	2,6	1,8	3,6	19	3,4	2,2	5,3	12	1,9	1,0	3,5
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	17	1,3	0,8	2,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres leucémies	17	1,4	0,9	2,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	177	13,3	11,3	15,3	89	15,6	12,3	18,8	88	11,4	8,9	14,0
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	17	1,4	0,9	2,2	x	x	x	x	x	x	x	x
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2007												
Total, tous les sièges primaires de cancer	5 669	453,0	440,9	465,1	3 035	531,9	512,7	551,2	2 634	391,3	375,7	406,9
Lèvre (C00.0-C00.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	40	3,3	2,5	4,5	28	5,2	3,6	7,5	12	1,6	0,9	2,9
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	9	0,7	0,4	1,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	20	1,7	1,1	2,6	11	2,0	1,1	3,6	9	1,5	0,7	2,9
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	7	0,6	0,3	1,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	27	2,1	1,4	3,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Oesophage (C15.0-C15.9)	52	4,1	3,0	5,2	39	6,5	4,9	8,8	13	1,9	1,1	3,3
Estomac (C16.0-C16.9)	94	7,0	5,5	8,4	66	11,2	8,5	13,9	28	3,9	2,7	5,6
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	21	1,7	1,2	2,6	12	2,1	1,2	3,7	9	1,3	0,7	2,7
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)	776	60,5	56,1	64,8	424	74,4	67,2	81,6	352	49,6	44,3	55,0
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	527	41,1	37,5	44,7	273	48,5	42,6	54,3	254	35,6	31,0	40,1
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	249	19,4	16,9	21,9	151	26,0	21,7	30,2	98	14,0	11,2	16,9
Anus (C21.0-C21.8)	10	0,8	0,4	1,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Foie (C22.0)	39	3,0	2,3	4,1	26	4,2	2,9	6,1	13	2,0	1,2	3,5
Vésicule biliaire (C23.9)	21	1,5	1,0	2,4	6	1,1	0,5	2,4	15	2,0	1,2	3,4
Pancréas (C25.0-C25.9)	129	9,5	7,8	11,2	67	11,5	8,7	14,2	62	8,0	5,9	10,0
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	39	3,1	2,3	4,2	20	3,7	2,4	5,6	19	2,8	1,8	4,4
Larynx (C32.0-C32.9)	44	3,5	2,7	4,6	34	5,8	4,3	8,0	10	1,4	0,8	2,8
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	881	69,2	64,6	73,8	469	83,1	75,5	90,6	412	59,1	53,3	65,0
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	12	0,9	0,5	1,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	7	0,8	0,4	1,6	x	x	x	x	x	x	x	x

Tableau 2-4 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Nouvelle-Écosse

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	32	2,9	2,0	4,0	15	2,9	1,8	4,8	17	2,9	1,8	4,7
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	229	19,4	16,8	22,0	114	20,0	16,2	23,8	115	19,2	15,5	22,9
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	17	1,3	0,8	2,0	9	1,6	0,8	3,1	8	1,1	0,5	2,4
Sein (C50.0-C50.9)	641	50,8	46,8	54,9	8	1,3	0,7	2,8	633	94,4	86,8	102,0
Col utérin (C53.0-C53.9)	46	5,0	3,8	6,6	46	9,7	7,3	12,7
Corps utérin (C54.0-C54.9)	145	11,2	9,3	13,0	145	21,3	17,8	24,8
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ovaire (C56.9)	61	4,8	3,6	6,0	61	9,0	6,6	11,3
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	36	2,8	2,1	3,9	36	5,3	3,9	7,3
Prostate (C61.9)	884	69,2	64,6	73,8	884	148,9	139,0	158,8
Testicule (C62.0-C62.9)	24	3,0	2,0	4,3	24	6,2	4,2	8,9
Verge (C60.0-C60.9)	8	0,6	0,3	1,3	8	1,3	0,7	2,7
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	235	18,2	15,8	20,6	167	29,5	25,0	34,0	68	9,1	6,8	11,3
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	197	15,8	13,5	18,0	112	19,1	15,5	22,7	85	13,2	10,3	16,1
Uretrère (C66.9)	8	0,6	0,3	1,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	12	0,9	0,5	1,7	6	1,0	0,4	2,3	6	0,8	0,4	2,1
Cerveau (C71.0-C71.9)	64	5,7	4,3	7,2	32	6,2	4,5	8,7	32	5,1	3,7	7,2
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	115	10,8	8,7	12,9	27	5,5	3,8	7,8	88	15,7	12,2	19,2
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	6	0,6	0,2	1,2	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	34	3,8	2,7	5,2	20	5,0	3,2	7,4	14	2,6	1,5	4,4
Lymphomes non hodgkiniens	239	19,3	16,7	21,8	124	21,8	17,9	25,7	115	17,3	14,0	20,6
Myéiome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	50	4,1	2,9	5,3	24	4,3	3,0	6,4	26	3,8	2,6	5,6
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	12	1,4	0,8	2,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	57	4,4	3,3	5,6	31	5,2	3,8	7,3	26	3,6	2,5	5,3
Leucémie myéiocytaire aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	31	2,3	1,7	3,3	19	3,4	2,2	5,2	12	1,5	0,8	2,8
Leucémie myéiocytaire chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	15	1,3	0,8	2,1	7	1,5	0,7	3,0	8	1,1	0,5	2,4
Autres leucémies	18	1,5	1,0	2,5	10	2,1	1,1	3,8	8	1,0	0,5	2,3
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	186	14,2	12,1	16,3	100	17,6	14,1	21,0	86	11,3	8,8	13,8
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	16	1,2	0,8	2,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2010) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 2-5
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Nouveau-Brunswick

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2008												
Total, tous les sièges primaires de cancer	4 423	434,9	421,7	448,1	2 500	533,8	512,5	555,1	1 923	353,8	337,3	370,3
Lèvre (C00.0-C00.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	12	1,2	0,7	2,2	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	6	0,6	0,3	1,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	11	1,0	0,5	1,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	7	0,7	0,3	1,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	23	2,1	1,5	3,2	x	x	x	x	x	x	x	x
Oesophage (C15.0-C15.9)	45	4,3	3,3	5,7	36	7,8	5,8	10,6	9	1,4	0,7	3,0
Estomac (C16.0-C16.9)	65	6,0	4,5	7,5	45	9,5	7,3	12,5	20	3,4	2,2	5,3
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	14	1,5	0,9	2,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9-C26.0)	530	49,8	45,5	54,2	301	64,0	56,7	71,3	229	38,7	33,5	43,9
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	333	31,5	28,0	34,9	173	37,5	31,9	43,1	160	26,9	22,6	31,2
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	197	18,3	15,7	21,0	128	26,5	21,8	31,1	69	11,8	8,9	14,7
Anus (C21.0-C21.8)	14	1,3	0,8	2,2	x	x	x	x	x	x	x	x
Foie (C22.0)	19	1,8	1,2	2,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Vésicule biliaire (C23.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Pancréas (C25.0-C25.9)	100	9,4	7,5	11,2	50	10,4	7,5	13,4	50	8,6	6,2	11,1
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	31	2,9	2,1	4,1	16	3,4	2,1	5,4	15	2,8	1,7	4,6
Larynx (C32.0-C32.9)	29	2,7	1,9	3,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	711	69,0	63,8	74,1	399	85,5	77,1	94,0	312	56,0	49,6	62,3
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	10	1,0	0,5	1,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	15	2,0	1,2	3,2	9	2,3	1,2	4,4	6	1,7	0,7	3,6
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	158	15,9	13,4	18,5	77	16,4	12,6	20,1	81	16,0	12,3	19,6
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	11	1,2	0,6	2,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	503	93,3	84,9	101,7
Col utérin (C53.0-C53.9)	34	3,7	2,7	5,2	34	7,2	5,2	10,1
Corps utérin (C54.0-C54.9)	97	9,4	7,5	11,3	97	18,0	14,3	21,7
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ovaire (C56.9)	53	5,2	3,8	6,7	53	9,9	7,1	12,7
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	11	1,0	0,5	1,8	11	1,8	1,0	3,4
Prostate (C61.9)	816	79,6	74,0	85,1	816	168,8	157,1	180,5
Testicule (C62.0-C62.9)	23	3,7	2,5	5,4	23	7,5	5,0	10,8
Verge (C60.0-C60.9)	11	1,2	0,6	2,1	11	2,5	1,4	4,5
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	196	18,9	16,1	21,6	147	31,3	26,2	36,4	49	8,7	6,6	11,4
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	152	15,5	12,9	18,0	94	20,3	16,1	24,5	58	11,2	8,2	14,2
Urètre (C66.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cerveau (C71.0-C71.9)	55	5,8	4,2	7,4	28	6,1	4,3	8,6	27	5,5	3,7	8,0

Tableau 2-5 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Nouveau-Brunswick

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	118	12,8	10,4	15,2	33	7,3	5,2	10,1	85	18,2	14,1	22,3
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	13	2,0	1,1	3,2	x	x	x	x	x	x	x	x
Lymphomes non hodgkiniens	173	17,5	14,8	20,1	89	19,5	15,4	23,7	84	15,6	12,1	19,1
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	55	5,1	3,7	6,5	34	7,2	5,3	9,9	21	3,3	2,2	5,2
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	10	1,7	0,9	2,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	46	4,3	3,3	5,6	30	6,2	4,5	8,8	16	2,4	1,5	4,2
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	24	2,5	1,7	3,7	10	2,1	1,1	3,9	14	3,1	1,8	5,3
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	10	0,9	0,5	1,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres leucémies	18	1,9	1,2	3,0	9	2,3	1,1	4,3	9	1,6	0,8	3,3
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	124	11,8	9,6	13,9	65	14,6	11,0	18,1	59	9,3	6,8	11,8
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	12	1,2	0,7	2,1	12	2,6	1,5	4,6	0	0,0	0,0	0,0
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
2007												
Total, tous les sièges primaires de cancer	4 383	440,5	427,1	453,9	2 424	534,0	512,4	555,6	1 959	364,8	347,9	381,7
Lèvre (C00.0-C00.9)	7	0,6	0,3	1,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	13	1,2	0,7	2,2	x	x	x	x	x	x	x	x
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	15	1,7	1,0	2,7	8	2,0	1,0	3,9	7	1,3	0,6	2,9
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	13	1,2	0,7	2,1	7	1,6	0,7	3,3	6	0,9	0,4	2,4
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	6	0,6	0,3	1,4	6	1,3	0,5	2,9	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	25	2,5	1,7	3,6	19	3,9	2,5	6,1	6	1,3	0,6	3,0
Oesophage (C15.0-C15.9)	47	4,6	3,5	6,0	36	8,0	5,9	10,9	11	1,7	0,9	3,3
Estomac (C16.0-C16.9)	98	9,5	7,6	11,4	58	12,6	9,3	15,9	40	6,8	5,1	9,3
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	14	1,4	0,8	2,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)	524	50,4	46,0	54,8	294	64,0	56,6	71,5	230	39,0	33,8	44,3
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	325	31,1	27,7	34,6	166	36,4	30,8	42,0	159	26,8	22,5	31,2
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	199	19,3	16,5	22,0	128	27,6	22,8	32,5	71	12,2	9,3	15,2
Anus (C21.0-C21.8)	12	1,0	0,6	1,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Foie (C22.0)	26	2,7	1,8	3,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Vésicule biliaire (C23.9)	9	0,9	0,5	1,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Pancréas (C25.0-C25.9)	110	10,6	8,6	12,6	55	11,8	8,7	15,0	55	9,3	6,8	11,9
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	30	2,8	2,0	4,0	12	2,7	1,5	4,6	18	3,0	1,9	4,9
Larynx (C32.0-C32.9)	30	3,1	2,2	4,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	685	67,3	62,2	72,4	410	90,3	81,5	99,2	275	49,6	43,6	55,7
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	6	0,6	0,2	1,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	7	1,1	0,5	2,1	x	x	x	x	x	x	x	x

Tableau 2-5 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Nouveau-Brunswick

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	38	4,4	3,3	6,0	26	6,5	4,5	9,3	12	2,4	1,3	4,4
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	129	14,1	11,6	16,7	66	15,1	11,4	18,9	63	13,6	10,0	17,1
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	20	2,1	1,4	3,3	13	3,0	1,8	5,1	7	1,4	0,6	3,1
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	511	96,5	87,9	105,2
Col utérin (C53.0-C53.9)	31	3,9	2,8	5,5	31	7,7	5,4	10,7
Corps utérin (C54.0-C54.9)	102	10,2	8,2	12,2	102	19,5	15,6	23,4
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ovaire (C56.9)	70	6,7	5,1	8,3	70	12,5	9,5	15,5
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	17	1,7	1,1	2,8	17	3,3	2,1	5,4
Prostate (C61.9)	760	76,6	71,1	82,1	760	163,5	151,7	175,2
Testicule (C62.0-C62.9)	23	3,6	2,4	5,3	23	7,3	4,9	10,5
Verge (C60.0-C60.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	188	18,4	15,7	21,0	131	28,6	23,7	33,6	57	10,5	7,7	13,3
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	183	18,3	15,6	21,0	109	23,3	18,8	27,7	74	13,8	10,5	17,0
Uretere (C66.9)	10	0,9	0,5	1,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cerveau (C71.0-C71.9)	61	6,3	4,7	8,0	31	7,2	5,1	10,0	30	5,6	3,9	8,0
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	111	12,5	10,1	15,0	28	6,1	4,2	8,7	83	18,7	14,4	23,0
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	24	3,3	2,2	4,7	16	4,6	2,8	7,2	8	1,9	0,9	3,9
Lymphomes non hodgkiniens	146	14,5	12,1	16,9	83	18,4	14,4	22,5	63	11,6	8,6	14,6
Myéiome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	45	4,2	3,2	5,6	20	4,5	3,0	6,8	25	4,2	2,9	6,3
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	11	1,7	0,9	2,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	38	3,7	2,8	5,1	26	5,6	3,9	8,1	12	2,2	1,3	4,0
Leucémie myéiocytaire aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	26	3,1	2,1	4,4	12	2,9	1,6	5,0	14	3,3	1,9	5,5
Leucémie myéiocytaire chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	15	1,5	0,9	2,4	7	1,5	0,7	3,1	8	1,5	0,7	3,1
Autres leucémies	10	0,9	0,5	1,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	95	8,6	6,8	10,4	43	9,9	7,5	13,0	52	7,9	5,6	10,1
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	11	1,1	0,6	2,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2010) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 2-6
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Québec¹

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2007												
Total, tous les sièges primaires de cancer	40 662	407,0	403,0	411,1	20 786	465,3	458,9	471,7	19 876	368,6	363,3	374,0
Lèvre (C00.0-C00.9)	62	0,6	0,4	0,8	46	1,1	0,8	1,4	16	0,3	0,2	0,5
Langue (C01.9-C02.9)	219	2,2	1,9	2,5	148	3,1	2,6	3,6	71	1,3	1,0	1,6
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	90	1,0	0,8	1,2	53	1,3	0,9	1,6	37	0,7	0,5	1,0
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	50	0,5	0,4	0,6	30	0,6	0,4	0,9	20	0,4	0,3	0,6
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	99	1,0	0,8	1,2	60	1,3	1,0	1,7	39	0,7	0,5	1,0
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	56	0,6	0,4	0,8	39	0,9	0,6	1,1	17	0,3	0,2	0,5
Oropharynx (C10.0-C10.9)	44	0,4	0,3	0,5	30	0,6	0,4	0,9	14	0,2	0,1	0,4
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	78	0,8	0,6	0,9	66	1,5	1,1	1,8	12	0,2	0,1	0,4
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	155	1,5	1,3	1,8	119	2,4	2,0	2,8	36	0,7	0,5	0,9
Oesophage (C15.0-C15.9)	347	3,4	3,1	3,8	267	5,9	5,2	6,6	80	1,4	1,1	1,7
Estomac (C16.0-C16.9)	739	7,3	6,7	7,8	460	10,3	9,4	11,3	279	4,8	4,2	5,3
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	116	1,2	1,0	1,4	66	1,4	1,1	1,8	50	0,9	0,7	1,2
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9-C26.0)	5 280	51,9	50,5	53,3	2 878	64,2	61,8	66,6	2 402	41,9	40,2	43,6
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	3 448	33,8	32,6	34,9	1 766	39,9	38,0	41,8	1 682	29,0	27,6	30,4
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	1 832	18,1	17,3	19,0	1 112	24,3	22,9	25,7	720	12,9	11,9	13,9
Anus (C21.0-C21.8)	100	1,0	0,8	1,2	45	1,0	0,8	1,3	55	1,0	0,7	1,3
Foie (C22.0)	405	4,1	3,7	4,5	310	6,8	6,1	7,6	95	1,8	1,4	2,2
Vésicule biliaire (C23.9)	97	0,9	0,7	1,1	35	0,8	0,6	1,1	62	1,1	0,8	1,3
Pancréas (C25.0-C25.9)	1 034	10,1	9,5	10,7	510	11,4	10,4	12,4	524	9,1	8,3	9,9
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	438	4,3	3,8	4,7	200	4,6	3,9	5,2	238	4,1	3,5	4,6
Larynx (C32.0-C32.9)	349	3,5	3,1	3,9	274	6,0	5,3	6,7	75	1,4	1,1	1,7
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	6 925	68,1	66,5	69,7	3 937	87,7	84,9	90,5	2 988	54,0	52,0	56,0
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	112	1,2	1,0	1,4	78	1,8	1,4	2,2	34	0,7	0,5	0,9
Os et articulations (C40.0-C41.9)	95	1,1	0,9	1,3	58	1,4	1,1	1,8	37	0,8	0,6	1,1
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	234	2,5	2,2	2,8	137	3,2	2,7	3,8	97	2,0	1,6	2,4
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	614	6,5	5,9	7,0	348	7,7	6,9	8,5	266	5,6	4,9	6,3
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	134	1,4	1,2	1,7	64	1,5	1,1	1,9	70	1,3	1,0	1,7
Sein (C50.0-C50.9)	5 343	53,0	51,6	54,5	36	0,8	0,6	1,0	5 307	100,3	97,5	103,0
Col utérin (C53.0-C53.9)	296	3,4	3,0	3,8	296	6,7	5,9	7,5
Corps utérin (C54.0-C54.9)	1 010	9,8	9,2	10,4	1 010	18,4	17,3	19,6
Utérus, sans autre indication (C55.9)	46	0,5	0,4	0,6	46	0,9	0,6	1,1
Ovaire (C56.9)	629	6,2	5,7	6,6	629	11,5	10,6	12,4
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	162	1,6	1,4	1,9	162	2,9	2,5	3,4
Prostate (C61.9)	4 245	41,9	40,6	43,2	4 245	92,7	89,9	95,5
Testicule (C62.0-C62.9)	178	2,6	2,2	3,0	178	5,2	4,4	6,0
Verge (C60.0-C60.9)	29	0,3	0,2	0,4	29	0,6	0,5	0,9
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	16	0,2	0,1	0,3	16	0,4	0,2	0,6
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	2 261	22,2	21,2	23,1	1 636	36,8	35,0	38,6	625	11,0	10,1	11,8
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	1 203	12,0	11,3	12,7	722	15,8	14,6	16,9	481	9,0	8,2	9,8
Uretere (C66.9)	64	0,6	0,5	0,8	39	0,9	0,7	1,2	25	0,4	0,3	0,7
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	25	0,2	0,2	0,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	54	0,6	0,4	0,8	32	0,7	0,5	1,0	22	0,5	0,3	0,8
Cerveau (C71.0-C71.9)	638	6,9	6,4	7,5	366	8,4	7,6	9,3	272	5,6	4,9	6,3

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-6 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Québec¹

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	42	0,5	0,3	0,6	19	0,5	0,3	0,7	23	0,5	0,3	0,7
Thyroïde (C73.9)	936	10,9	10,1	11,6	195	4,4	3,8	5,0	741	17,3	16,0	18,6
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	70	0,8	0,6	0,9	31	0,7	0,5	1,0	39	0,8	0,6	1,1
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	218	2,8	2,5	3,2	127	3,4	2,8	4,0	91	2,4	1,9	2,9
Lymphomes non hodgkiniens	1 537	15,5	14,7	16,3	839	18,7	17,4	20,0	698	12,8	11,8	13,8
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	484	4,7	4,3	5,1	270	6,0	5,3	6,7	214	3,7	3,2	4,2
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	100	1,4	1,1	1,6	58	1,7	1,2	2,1	42	1,1	0,8	1,4
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	430	4,2	3,8	4,6	255	5,7	5,0	6,4	175	3,0	2,5	3,4
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	258	2,8	2,4	3,1	141	3,3	2,7	3,9	117	2,4	2,0	2,9
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	96	0,9	0,8	1,1	58	1,3	1,0	1,7	38	0,7	0,5	0,9
Autres leucémies	135	1,4	1,2	1,7	80	1,9	1,5	2,4	55	1,0	0,7	1,3
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	2 120	20,6	19,7	21,4	999	23,2	21,8	24,7	1 121	18,6	17,5	19,8
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	149	1,5	1,3	1,7	121	2,8	2,3	3,3	28	0,5	0,3	0,7
Sarcome de Kaposi (M-9140)	16	0,2	0,1	0,3	x	x	x	x	x	x	x	x

1. Pour aider à l'interprétation des résultats, il est important de souligner que les cancers déclarés au Fichier des tumeurs du Québec (FITQ) sont ceux ayant fait l'objet d'une hospitalisation ou d'une chirurgie d'un jour. Certains cancers ne sont donc pas déclarés au FITQ s'ils sont diagnostiqués et traités uniquement sur une base externe ou ambulatoire, ou encore ils sont déclarés à un stade plus avancé de la maladie qui requiert une hospitalisation. Une étude d'exhaustivité produite en 2003 évalue entre autres que plus du tiers des cancers de la prostate et des mélanomes ne sont pas déclarés au FITQ en raison de notre source de déclaration. Globalement, 90 % des cas de cancer confirmés par histopathologie seraient déclarés au FITQ.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2010) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 2-7
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Ontario¹

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2008												
Total, tous les sièges primaires de cancer	62 439	397,7	394,6	400,9	31 846	442,0	437,0	446,9	30 593	366,1	361,9	370,3
Lèvre (C00.0-C00.9)	126	0,8	0,6	0,9	89	1,2	0,9	1,5	37	0,4	0,3	0,5
Langue (C01.9-C02.9)	364	2,3	2,0	2,5	241	3,2	2,8	3,6	123	1,4	1,2	1,7
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	199	1,3	1,1	1,4	104	1,4	1,1	1,7	95	1,2	0,9	1,4
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	86	0,5	0,4	0,7	58	0,8	0,6	1,0	28	0,3	0,2	0,5
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	179	1,1	1,0	1,3	101	1,3	1,1	1,6	78	0,9	0,7	1,1
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	115	0,7	0,6	0,9	77	1,0	0,8	1,3	38	0,5	0,3	0,6
Oropharynx (C10.0-C10.9)	61	0,4	0,3	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	90	0,6	0,5	0,7	66	0,9	0,7	1,1	24	0,3	0,2	0,4
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	206	1,3	1,1	1,4	157	2,0	1,7	2,3	49	0,6	0,4	0,7
Oesophage (C15.0-C15.9)	641	4,0	3,7	4,3	498	6,8	6,2	7,4	143	1,5	1,3	1,8
Estomac (C16.0-C16.9)	1 138	7,0	6,6	7,4	696	9,6	8,8	10,3	442	5,0	4,5	5,5
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	270	1,7	1,5	1,9	140	1,9	1,6	2,2	130	1,6	1,3	1,9
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9-C26.0)	7 791	48,4	47,3	49,5	4 265	59,0	57,2	60,7	3 526	39,3	38,0	40,7
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	5 363	33,3	32,4	34,2	2 757	38,3	36,9	39,8	2 606	28,9	27,8	30,1
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	2 428	15,1	14,5	15,7	1 508	20,6	19,6	21,7	920	10,4	9,7	11,1
Anus (C21.0-C21.8)	245	1,5	1,3	1,7	116	1,5	1,3	1,8	129	1,5	1,3	1,8
Foie (C22.0)	576	3,6	3,3	3,9	435	5,8	5,3	6,4	141	1,7	1,4	2,0
Vésicule biliaire (C23.9)	172	1,1	0,9	1,2	54	0,7	0,5	0,9	118	1,3	1,1	1,6
Pancréas (C25.0-C25.9)	1 341	8,3	7,9	8,8	664	9,1	8,4	9,8	677	7,6	7,0	8,2
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	646	4,0	3,7	4,3	359	5,0	4,4	5,5	287	3,2	2,9	3,6
Larynx (C32.0-C32.9)	379	2,4	2,1	2,6	316	4,3	3,8	4,7	63	0,7	0,5	0,9
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	7 582	47,8	46,7	48,9	3 950	55,0	53,3	56,8	3 632	42,4	41,0	43,8
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	135	0,9	0,7	1,0	81	1,1	0,9	1,4	54	0,6	0,5	0,8
Os et articulations (C40.0-C41.9)	106	0,8	0,6	0,9	57	0,9	0,6	1,1	49	0,7	0,5	0,9
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	522	3,5	3,2	3,8	304	4,3	3,8	4,8	218	2,9	2,5	3,3
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	2 309	15,1	14,5	15,7	1 254	17,6	16,6	18,6	1 055	13,2	12,3	14,0
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sein (C50.0-C50.9)	8 543	53,6	52,4	54,8	61	0,8	0,6	1,0	8 482	101,7	99,5	103,9
Col utérin (C53.0-C53.9)	545	3,9	3,5	4,2	545	7,6	6,9	8,2
Corps utérin (C54.0-C54.9)	1 816	11,3	10,8	11,8	1 816	21,6	20,6	22,6
Utérus, sans autre indication (C55.9)	30	0,2	0,1	0,2	30	0,3	0,2	0,5
Ovaire (C56.9)	1 002	6,4	6,0	6,8	1 002	12,1	11,3	12,9
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	405	2,5	2,3	2,8	405	4,8	4,3	5,3
Prostate (C61.9)	8 856	56,5	55,3	57,7	8 856	121,8	119,2	124,3
Testicule (C62.0-C62.9)	378	3,2	2,9	3,5	378	6,4	5,8	7,1
Verge (C60.0-C60.9)	43	0,3	0,2	0,4	43	0,6	0,5	0,8
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	33	0,2	0,1	0,3	33	0,4	0,3	0,6
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	1 838	11,3	10,8	11,8	1 406	19,7	18,6	20,7	432	4,7	4,3	5,2
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	1 742	11,0	10,5	11,5	1 063	14,3	13,4	15,2	679	8,1	7,5	8,8
Uretere (C66.9)	64	0,4	0,3	0,5	34	0,5	0,4	0,7	30	0,3	0,2	0,5
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	224	1,4	1,2	1,6	169	2,4	2,0	2,7	55	0,6	0,5	0,8
Oeil (C69.0-C69.9)	120	0,8	0,7	1,0	61	0,9	0,6	1,1	59	0,8	0,6	1,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	939	6,5	6,1	6,9	541	7,8	7,2	8,5	398	5,3	4,7	5,8

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-7 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Ontario¹

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	59	0,4	0,3	0,6	28	0,4	0,3	0,6	31	0,4	0,3	0,6
Thyroïde (C73.9)	2 362	16,5	15,8	17,2	489	6,8	6,2	7,5	1 873	25,9	24,7	27,1
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	119	0,8	0,7	1,0	60	0,9	0,6	1,1	59	0,8	0,6	1,0
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	388	3,1	2,7	3,4	206	3,2	2,7	3,6	182	2,9	2,5	3,4
Lymphomes non hodgkiniens	2 727	17,4	16,8	18,1	1 505	20,9	19,8	22,0	1 222	14,6	13,8	15,5
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	792	4,9	4,5	5,2	447	6,1	5,6	6,7	345	3,8	3,4	4,2
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	157	1,3	1,1	1,5	89	1,5	1,2	1,8	68	1,2	0,9	1,5
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	841	5,2	4,9	5,6	505	7,0	6,4	7,6	336	3,7	3,3	4,1
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	404	2,7	2,4	3,0	210	3,0	2,6	3,4	194	2,5	2,1	2,8
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	196	1,3	1,1	1,4	109	1,6	1,3	1,9	87	1,0	0,8	1,2
Autres leucémies	322	2,1	1,8	2,3	186	2,6	2,2	3,0	136	1,6	1,3	1,9
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	2 018	12,2	11,7	12,8	1 077	15,0	14,1	15,9	941	10,1	9,4	10,8
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	185	1,2	1,0	1,3	153	2,2	1,8	2,5	32	0,4	0,3	0,5
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2007												
Total, tous les sièges primaires de cancer	63 062	411,5	408,3	414,8	32 651	467,1	462,0	472,2	30 411	370,6	366,3	374,8
Lèvre (C00.0-C00.9)	170	1,1	0,9	1,2	120	1,7	1,4	2,0	50	0,6	0,4	0,7
Langue (C01.9-C02.9)	348	2,2	2,0	2,4	241	3,2	2,8	3,6	107	1,3	1,0	1,5
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	233	1,5	1,3	1,7	127	1,9	1,5	2,2	106	1,4	1,1	1,6
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	74	0,5	0,4	0,6	48	0,6	0,5	0,8	26	0,3	0,2	0,5
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	206	1,3	1,1	1,5	118	1,6	1,3	1,9	88	1,1	0,8	1,3
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	100	0,7	0,5	0,8	65	0,9	0,7	1,2	35	0,5	0,3	0,6
Oropharynx (C10.0-C10.9)	74	0,5	0,4	0,6	52	0,7	0,5	0,9	22	0,3	0,2	0,4
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	71	0,5	0,4	0,6	61	0,9	0,7	1,1	10	0,1	0,1	0,2
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	237	1,5	1,3	1,6	175	2,3	1,9	2,6	62	0,7	0,5	0,9
Oesophage (C15.0-C15.9)	607	3,9	3,6	4,2	465	6,5	5,9	7,1	142	1,6	1,3	1,9
Estomac (C16.0-C16.9)	1 106	7,1	6,7	7,5	692	9,9	9,2	10,7	414	4,8	4,3	5,2
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	254	1,6	1,4	1,8	140	2,0	1,6	2,3	114	1,4	1,1	1,6
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)	7 621	48,6	47,5	49,7	4 112	58,5	56,7	60,3	3 509	40,3	38,9	41,7
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	5 391	34,3	33,4	35,3	2 753	39,5	38,0	41,0	2 638	30,1	28,9	31,2
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	2 230	14,3	13,7	14,9	1 359	19,0	18,0	20,0	871	10,3	9,6	11,0
Anus (C21.0-C21.8)	263	1,7	1,5	1,9	99	1,3	1,1	1,6	164	2,0	1,7	2,3
Foie (C22.0)	608	3,9	3,6	4,2	469	6,4	5,8	7,0	139	1,6	1,4	1,9
Vésicule biliaire (C23.9)	180	1,1	1,0	1,3	56	0,8	0,6	1,0	124	1,4	1,2	1,7
Pancréas (C25.0-C25.9)	1 449	9,1	8,7	9,6	724	10,2	9,5	11,0	725	8,1	7,5	8,7
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	594	3,8	3,5	4,1	310	4,4	3,9	4,9	284	3,3	2,9	3,6
Larynx (C32.0-C32.9)	388	2,5	2,3	2,8	327	4,6	4,1	5,1	61	0,8	0,6	1,0
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	7 758	50,2	49,0	51,3	4 127	59,4	57,6	61,2	3 631	43,3	41,9	44,7
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	138	0,9	0,8	1,1	78	1,2	0,9	1,4	60	0,7	0,5	0,9
Os et articulations (C40.0-C41.9)	141	1,1	0,9	1,2	76	1,2	0,9	1,4	65	0,9	0,7	1,2

Voir les notes à la fin du tableau.

Tableau 2-7 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Ontario¹

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	507	3,5	3,2	3,8	276	4,0	3,6	4,5	231	3,1	2,7	3,5
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	2 269	15,0	14,4	15,6	1 173	16,6	15,7	17,6	1 096	13,9	13,1	14,8
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sein (C50.0-C50.9)	8 252	53,0	51,9	54,2	67	0,9	0,7	1,2	8 185	100,3	98,0	102,5
Col utérin (C53.0-C53.9)	570	4,1	3,8	4,5	570	8,1	7,4	8,8
Corps utérin (C54.0-C54.9)	1 725	11,0	10,5	11,6	1 725	21,0	20,0	22,0
Utérus, sans autre indication (C55.9)	60	0,4	0,3	0,5	60	0,7	0,5	0,9
Ovaire (C56.9)	1 017	6,6	6,2	7,1	1 017	12,6	11,8	13,4
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	352	2,2	2,0	2,5	352	4,2	3,7	4,6
Prostate (C61.9)	9 690	64,0	62,7	65,3	9 690	138,4	135,6	141,2
Testicule (C62.0-C62.9)	326	2,7	2,4	3,0	326	5,5	4,9	6,1
Verge (C60.0-C60.9)	59	0,4	0,3	0,5	59	0,8	0,6	1,0
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	16	0,1	0,1	0,2	16	0,2	0,1	0,4
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	1 862	11,8	11,2	12,3	1 387	20,0	18,9	21,1	475	5,3	4,8	5,8
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	1 812	11,7	11,2	12,3	1 071	14,8	13,9	15,7	741	8,9	8,3	9,6
Urètre (C66.9)	65	0,4	0,3	0,5	36	0,5	0,4	0,7	29	0,3	0,2	0,4
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	200	1,3	1,1	1,4	157	2,3	1,9	2,6	43	0,5	0,3	0,6
Oeil (C69.0-C69.9)	138	0,9	0,8	1,1	79	1,1	0,9	1,4	59	0,8	0,6	1,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	967	6,7	6,3	7,2	541	7,9	7,2	8,6	426	5,6	5,1	6,2
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	75	0,6	0,4	0,7	39	0,6	0,4	0,8	36	0,5	0,4	0,7
Thyroïde (C73.9)	2 129	15,4	14,7	16,1	470	6,8	6,2	7,4	1 659	23,8	22,6	25,0
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	120	0,8	0,7	1,0	49	0,7	0,6	0,9	71	0,9	0,7	1,2
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	373	2,9	2,6	3,2	207	3,3	2,9	3,8	166	2,6	2,2	3,0
Lymphomes non hodgkiniens	2 722	17,8	17,1	18,5	1 519	21,7	20,6	22,8	1 203	14,5	13,7	15,3
Myéiome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	802	5,0	4,7	5,4	408	5,7	5,2	6,3	394	4,5	4,0	4,9
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	130	1,1	0,9	1,3	75	1,3	1,0	1,6	55	0,9	0,7	1,2
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	833	5,3	4,9	5,6	495	7,0	6,3	7,6	338	3,9	3,5	4,3
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	493	3,3	3,0	3,6	250	3,7	3,2	4,1	243	3,0	2,6	3,4
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	230	1,5	1,3	1,7	129	1,9	1,6	2,2	101	1,3	1,0	1,5
Autres leucémies	349	2,3	2,0	2,5	193	2,8	2,4	3,2	156	1,8	1,5	2,2
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	2 105	13,1	12,5	13,6	1 106	15,9	14,9	16,8	999	10,8	10,1	11,5
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	179	1,2	1,0	1,3	143	2,1	1,7	2,4	36	0,4	0,3	0,6
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

1. Les sièges in situ pour la vessie diagnostiqués en Ontario ne sont pas déclarés au Registre canadien du cancer. Les cancers cutanés sans mélanome ne sont pas répertoriés en Ontario. Les sarcomes de Kaposi sont considérablement sous-estimés.

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2010) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 2-8
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Manitoba

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2008												
Total, tous les sièges primaires de cancer	5 650	382,6	372,3	392,8	2 818	419,5	403,7	435,2	2 832	357,7	343,9	371,5
Lèvre (C00.0-C00.9)	45	3,1	2,3	4,0	35	5,3	3,9	7,2	10	1,0	0,5	2,0
Langue (C01.9-C02.9)	21	1,5	1,0	2,3	15	2,1	1,3	3,4	6	1,0	0,4	2,1
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	10	0,8	0,4	1,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	12	0,9	0,5	1,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	21	1,4	1,0	2,2	12	1,7	1,0	2,9	9	1,2	0,6	2,3
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	8	0,6	0,3	1,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	12	0,8	0,4	1,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	14	1,0	0,6	1,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Oesophage (C15.0-C15.9)	49	3,2	2,5	4,2	35	5,0	3,7	6,7	14	1,8	1,0	3,0
Estomac (C16.0-C16.9)	113	7,2	5,8	8,6	85	12,3	9,7	15,0	28	2,8	1,9	4,1
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	33	2,2	1,6	3,1	14	2,0	1,2	3,3	19	2,4	1,6	3,7
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9-C26.0)	802	52,3	48,6	56,1	450	66,2	60,0	72,4	352	41,0	36,5	45,5
Célon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	511	32,9	30,0	35,9	271	39,7	34,9	44,5	240	27,7	24,1	31,4
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	291	19,4	17,1	21,7	179	26,5	22,6	30,5	112	13,3	10,7	15,8
Anus (C21.0-C21.8)	12	0,8	0,4	1,4	6	0,9	0,4	1,9	6	0,7	0,3	1,6
Foie (C22.0)	49	3,4	2,6	4,3	33	4,9	3,6	6,7	16	1,9	1,2	3,2
Vésicule biliaire (C23.9)	15	1,1	0,6	1,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Pancréas (C25.0-C25.9)	145	9,0	7,5	10,5	59	8,5	6,3	10,7	86	9,2	7,2	11,3
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	48	3,1	2,4	4,0	31	4,5	3,3	6,3	17	1,9	1,2	3,1
Larynx (C32.0-C32.9)	30	2,1	1,5	3,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	811	54,4	50,5	58,2	413	61,7	55,7	67,7	398	48,9	44,0	53,9
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	11	0,7	0,4	1,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	9	0,7	0,3	1,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	21	1,7	1,1	2,6	12	2,1	1,2	3,5	9	1,4	0,7	2,6
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	159	10,7	9,0	12,5	78	11,1	8,6	13,6	81	10,7	8,2	13,2
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	17	1,2	0,8	2,0	10	1,7	0,9	2,9	7	0,9	0,4	1,9
Sein (C50.0-C50.9)	769	51,5	47,7	55,2	6	0,9	0,4	2,0	763	97,6	90,4	104,8
Col utérin (C53.0-C53.9)	48	4,1	3,2	5,4	48	8,2	6,3	10,7
Corps utérin (C54.0-C54.9)	184	12,2	10,4	14,0	184	23,4	19,9	26,9
Utérus, sans autre indication (C55.9)	7	0,5	0,2	1,1	7	1,0	0,5	2,1
Ovaire (C56.9)	85	5,9	4,6	7,2	85	11,3	8,8	13,8
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	31	1,9	1,4	2,7	31	3,5	2,5	5,0
Prostate (C61.9)	563	38,7	35,5	42,0	563	83,9	76,9	90,9
Testicule (C62.0-C62.9)	35	3,5	2,6	4,7	35	6,8	5,0	9,2
Verge (C60.0-C60.9)	12	0,9	0,5	1,5	12	1,8	1,1	3,1
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	257	16,6	14,6	18,7	199	29,4	25,3	33,6	58	6,6	4,8	8,4
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	187	12,7	10,9	14,6	115	16,8	13,6	19,9	72	9,0	6,9	11,2
Uretere (C66.9)	8	0,5	0,2	0,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	7	0,5	0,2	1,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Cerveau (C71.0-C71.9)	70	5,3	4,0	6,6	38	5,9	4,4	7,9	32	4,7	3,3	6,5

Tableau 2-8 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Manitoba

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	131	10,7	8,8	12,6	31	5,0	3,6	6,9	100	16,5	13,1	19,9
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	26	2,2	1,5	3,2	16	2,7	1,6	4,2	10	1,8	0,9	3,2
Lymphomes non hodgkiniens	247	16,8	14,6	18,9	137	20,0	16,6	23,4	110	14,0	11,2	16,8
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	49	3,2	2,5	4,2	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	12	1,0	0,6	1,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	96	6,4	5,1	7,7	59	8,7	6,4	10,9	37	4,4	3,2	6,0
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	43	3,0	2,3	4,0	22	3,2	2,2	4,7	21	2,9	1,9	4,4
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	17	1,2	0,8	1,9	8	1,2	0,6	2,4	9	1,2	0,6	2,4
Autres leucémies	25	1,7	1,2	2,4	15	2,2	1,4	3,6	10	1,3	0,7	2,4
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	241	15,4	13,4	17,4	124	18,2	14,9	21,4	117	13,3	10,8	15,9
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	17	1,2	0,7	1,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2007												
Total, tous les sièges primaires de cancer	5 678	390,0	379,5	400,4	2 934	443,2	426,9	459,4	2 744	351,0	337,3	364,8
Lèvre (C00.0-C00.9)	22	1,4	0,9	2,1	16	2,2	1,4	3,5	6	0,8	0,3	1,8
Langue (C01.9-C02.9)	34	2,3	1,7	3,1	26	3,4	2,4	4,9	8	1,2	0,6	2,3
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	6	0,4	0,2	0,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	28	2,0	1,4	2,8	16	2,3	1,5	3,7	12	1,7	1,0	3,0
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	9	0,6	0,3	1,2	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	10	0,7	0,4	1,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	17	1,1	0,7	1,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Oesophage (C15.0-C15.9)	56	3,6	2,6	4,5	47	6,8	5,3	8,9	9	1,0	0,5	2,0
Estomac (C16.0-C16.9)	132	8,4	7,0	9,9	95	13,8	10,9	16,6	37	3,9	2,8	5,4
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	26	1,9	1,3	2,7	11	1,7	0,9	3,0	15	2,0	1,2	3,3
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)	790	52,6	48,8	56,3	430	63,7	57,6	69,8	360	42,9	38,2	47,6
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	516	34,3	31,3	37,4	260	39,3	34,5	44,1	256	30,0	26,1	33,9
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	274	18,2	16,0	20,5	170	24,4	20,7	28,2	104	12,9	10,3	15,6
Anus (C21.0-C21.8)	18	1,3	0,8	2,0	8	1,2	0,6	2,3	10	1,3	0,7	2,5
Foie (C22.0)	46	3,2	2,4	4,1	37	5,7	4,2	7,6	9	1,0	0,5	2,0
Vésicule biliaire (C23.9)	26	1,6	1,1	2,4	8	1,2	0,6	2,4	18	2,0	1,3	3,3
Pancréas (C25.0-C25.9)	119	7,9	6,4	9,4	60	9,2	6,8	11,5	59	6,7	4,9	8,5
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	55	3,4	2,5	4,3	33	4,8	3,5	6,5	22	2,5	1,7	3,9
Larynx (C32.0-C32.9)	26	1,8	1,2	2,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	793	54,0	50,2	57,9	437	66,3	60,0	72,6	356	44,8	40,0	49,7
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	13	1,1	0,6	1,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	19	1,5	1,0	2,3	10	1,5	0,8	2,8	9	1,5	0,7	2,8

Tableau 2-8 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Manitoba

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	31	2,3	1,6	3,2	17	2,9	1,8	4,4	14	1,9	1,1	3,3
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	130	8,9	7,4	10,5	71	10,1	7,7	12,5	59	8,1	5,9	10,3
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	14	0,9	0,6	1,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	747	98,3	90,9	105,7
Col utérin (C53.0-C53.9)	48	3,8	2,9	4,9	48	7,5	5,7	9,7
Corps utérin (C54.0-C54.9)	205	14,3	12,3	16,3	205	27,5	23,7	31,4
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ovaire (C56.9)	93	6,2	4,9	7,6	93	11,9	9,3	14,4
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	34	2,3	1,7	3,2	34	4,5	3,2	6,2
Prostate (C61.9)	678	47,9	44,3	51,6	678	103,5	95,6	111,4
Testicule (C62.0-C62.9)	37	3,5	2,6	4,6	37	6,8	5,0	9,1
Verge (C60.0-C60.9)	9	0,6	0,3	1,2	9	1,4	0,7	2,6
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	239	15,8	13,7	17,8	182	27,1	23,1	31,0	57	7,0	5,1	8,8
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	180	12,5	10,6	14,4	104	15,6	12,5	18,6	76	9,7	7,5	12,0
Uretère (C66.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cerveau (C71.0-C71.9)	87	6,3	4,9	7,6	56	8,5	6,3	10,8	31	4,2	3,0	5,9
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	111	8,5	6,9	10,2	30	4,5	3,2	6,3	81	12,7	9,8	15,5
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	9	0,8	0,4	1,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	39	3,5	2,6	4,6	19	3,4	2,2	5,1	20	3,7	2,4	5,5
Lymphomes non hodgkiniens	250	17,3	15,1	19,5	142	22,1	18,4	25,8	108	13,0	10,4	15,6
Myéiome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	68	4,6	3,4	5,7	38	5,7	4,2	7,6	30	3,5	2,5	5,0
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	10	0,8	0,4	1,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	78	5,2	4,0	6,3	45	6,8	5,2	8,9	33	3,9	2,8	5,5
Leucémie myéiocytaire aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	29	2,0	1,4	2,8	12	1,8	1,0	3,1	17	2,2	1,3	3,5
Leucémie myéiocytaire chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	12	0,9	0,5	1,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres leucémies	19	1,2	0,8	1,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	229	14,7	12,7	16,7	112	16,9	13,7	20,1	117	12,6	10,1	15,0
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	12	0,8	0,5	1,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Sarcome de Kaposi (M-9140)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2010) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 2-9
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Saskatchewan

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2008												
Total, tous les sièges primaires de cancer	5 043	390,7	379,6	401,9	2 701	451,4	434,0	468,7	2 342	342,9	328,3	357,6
Lèvre (C00.0-C00.9)	16	1,2	0,7	1,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	23	1,9	1,3	2,8	17	3,0	1,9	4,7	6	0,8	0,3	2,0
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	7	0,5	0,3	1,2	x	x	x	x	x	x	x	x
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	14	1,1	0,6	1,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	16	1,2	0,7	1,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Oesophage (C15.0-C15.9)	55	4,2	3,0	5,3	41	6,7	5,1	9,0	14	1,9	1,1	3,2
Estomac (C16.0-C16.9)	101	7,2	5,7	8,6	70	10,8	8,3	13,4	31	4,4	3,1	6,2
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	21	1,7	1,1	2,5	12	2,0	1,2	3,5	9	1,4	0,7	2,7
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9-C26.0)	667	49,4	45,6	53,3	382	62,7	56,3	69,1	285	38,0	33,3	42,7
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	430	31,4	28,3	34,5	236	38,2	33,2	43,1	194	25,7	21,8	29,6
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	237	18,0	15,6	20,4	146	24,5	20,5	28,5	91	12,3	9,6	15,0
Anus (C21.0-C21.8)	12	0,9	0,5	1,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Foie (C22.0)	33	2,5	1,8	3,5	22	3,7	2,5	5,5	11	1,5	0,8	2,8
Vésicule biliaire (C23.9)	24	1,7	1,2	2,5	8	1,3	0,6	2,6	16	2,1	1,3	3,5
Pancréas (C25.0-C25.9)	144	10,3	8,6	12,0	71	11,5	8,8	14,3	73	9,0	6,8	11,2
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	50	3,6	2,6	4,7	24	3,8	2,6	5,6	26	3,5	2,4	5,2
Larynx (C32.0-C32.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	676	50,8	46,9	54,8	343	55,6	49,6	61,5	333	47,7	42,4	53,0
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	14	1,2	0,7	2,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	10	1,0	0,5	1,8	x	x	x	x	x	x	x	x
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	42	3,3	2,4	4,4	24	3,8	2,6	5,6	18	3,0	1,8	4,7
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	128	10,4	8,5	12,2	73	12,2	9,3	15,1	55	8,9	6,4	11,4
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	13	0,8	0,5	1,5	6	1,0	0,4	2,2	7	0,7	0,3	1,8
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	616	92,7	85,0	100,3
Col utérin (C53.0-C53.9)	53	5,4	3,9	6,9	53	10,6	7,6	13,6
Corps utérin (C54.0-C54.9)	153	12,1	10,1	14,1	153	23,5	19,7	27,4
Utérus, sans autre indication (C55.9)	6	0,4	0,2	1,0	6	0,7	0,3	1,8
Ovaire (C56.9)	89	6,8	5,3	8,3	89	13,0	10,2	15,9
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	26	1,7	1,2	2,5	26	3,1	2,1	4,7
Prostate (C61.9)	744	58,9	54,6	63,3	744	125,4	116,3	134,6
Testicule (C62.0-C62.9)	27	3,1	2,2	4,4	27	6,2	4,3	8,7
Verge (C60.0-C60.9)	9	0,7	0,4	1,4	9	1,6	0,8	3,1
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	252	19,1	16,7	21,5	194	32,1	27,5	36,7	58	8,1	5,9	10,3
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	151	11,9	9,9	13,8	89	14,9	11,7	18,0	62	9,3	6,9	11,7
Uretere (C66.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cerveau (C71.0-C71.9)	74	6,2	4,8	7,7	40	7,3	5,4	9,7	34	5,3	3,8	7,4

Tableau 2-9 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Saskatchewan

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	59	5,9	4,3	7,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	38	3,7	2,8	5,0	26	5,1	3,6	7,3	12	2,3	1,3	4,0
Lymphomes non hodgkiniens	211	16,7	14,3	19,0	121	20,5	16,8	24,3	90	13,1	10,3	16,0
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	57	4,2	3,1	5,3	30	4,9	3,5	6,9	27	3,6	2,5	5,2
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	18	1,8	1,2	2,8	10	2,1	1,1	3,7	8	1,4	0,7	2,8
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	90	6,7	5,3	8,1	59	9,4	7,0	11,9	31	4,3	3,1	6,1
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	36	2,9	2,1	3,9	18	3,1	2,0	4,8	18	2,7	1,7	4,3
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	15	1,3	0,8	2,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres leucémies	20	1,4	0,9	2,2	12	1,9	1,1	3,4	8	0,9	0,4	2,0
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	163	11,6	9,8	13,5	80	13,2	10,3	16,2	83	10,2	7,9	12,6
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	12	0,9	0,5	1,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
2007												
Total, tous les sièges primaires de cancer	5 102	402,7	391,2	414,1	2 701	461,8	444,0	479,5	2 401	354,7	339,7	369,7
Lèvre (C00.0-C00.9)	17	1,2	0,7	1,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	23	2,0	1,4	3,0	13	2,5	1,5	4,2	10	1,5	0,8	2,9
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	14	1,2	0,7	2,0	x	x	x	x	x	x	x	x
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	9	0,6	0,3	1,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	12	1,0	0,6	1,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Oesophage (C15.0-C15.9)	44	3,4	2,6	4,5	32	5,4	3,9	7,4	12	1,6	0,9	3,0
Estomac (C16.0-C16.9)	83	6,4	4,9	7,8	48	8,0	6,2	10,4	35	5,2	3,7	7,2
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	35	2,8	2,1	3,9	23	4,0	2,7	5,9	12	1,7	1,0	3,1
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)	677	50,9	46,9	54,8	374	62,6	56,2	69,1	303	40,3	35,5	45,2
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	436	32,2	29,1	35,4	220	37,0	32,1	42,0	216	27,7	23,8	31,7
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	241	18,6	16,2	21,1	154	25,6	21,5	29,7	87	12,6	9,8	15,4
Anus (C21.0-C21.8)	10	0,8	0,4	1,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Foie (C22.0)	37	2,7	2,0	3,8	25	4,2	2,9	6,1	12	1,4	0,7	2,6
Vésicule biliaire (C23.9)	16	1,1	0,7	1,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Pancréas (C25.0-C25.9)	154	11,4	9,6	13,3	71	12,1	9,3	15,0	83	10,4	8,0	12,8
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	54	4,2	3,0	5,3	22	3,6	2,5	5,4	32	4,7	3,3	6,7
Larynx (C32.0-C32.9)	34	2,9	2,1	3,9	28	4,9	3,5	7,0	6	1,1	0,5	2,4
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	687	53,2	49,1	57,3	362	60,7	54,4	67,1	325	47,7	42,3	53,0
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	10	0,9	0,5	1,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	10	0,9	0,5	1,6	x	x	x	x	x	x	x	x

Tableau 2-9 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Saskatchewan

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	33	2,5	1,8	3,5	19	3,3	2,1	5,1	14	1,9	1,1	3,3
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	104	8,7	6,9	10,4	57	9,9	7,2	12,5	47	7,7	5,8	10,2
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	12	0,9	0,5	1,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	643	97,4	89,5	105,2
Col utérin (C53.0-C53.9)	45	4,8	3,6	6,3	45	9,6	7,3	12,6
Corps utérin (C54.0-C54.9)	140	11,5	9,5	13,4	140	22,3	18,5	26,1
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ovaire (C56.9)	80	6,3	4,9	7,8	80	12,1	9,3	15,0
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	26	1,8	1,3	2,7	26	3,3	2,3	5,0
Prostate (C61.9)	875	71,3	66,5	76,2	875	151,3	141,2	161,5
Testicule (C62.0-C62.9)	26	3,2	2,2	4,5	26	6,4	4,4	9,0
Verge (C60.0-C60.9)	6	0,4	0,2	1,0	6	0,9	0,4	2,1
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	229	17,3	15,0	19,6	151	25,0	21,0	29,1	78	11,0	8,4	13,6
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	142	11,2	9,3	13,1	78	13,3	10,3	16,3	64	9,2	6,9	11,6
Uretère (C66.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	6	0,5	0,2	1,1	x	x	x	x	x	x	x	x
Cerveau (C71.0-C71.9)	64	5,3	4,0	6,7	36	6,3	4,7	8,6	28	4,4	3,1	6,3
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	54	5,2	3,8	6,7	19	3,8	2,5	5,8	35	6,5	4,7	8,9
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	8	0,7	0,3	1,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	23	2,6	1,8	3,8	11	2,4	1,3	4,1	12	2,9	1,7	4,8
Lymphomes non hodgkiniens	221	17,2	14,8	19,6	125	21,3	17,5	25,1	96	13,7	10,8	16,6
Myéiome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	64	5,0	3,7	6,2	32	5,3	3,8	7,4	32	4,7	3,4	6,6
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	16	1,5	1,0	2,4	8	1,5	0,7	2,9	8	1,6	0,8	3,1
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	83	6,3	4,9	7,7	51	8,6	6,2	10,9	32	4,4	3,2	6,3
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	29	2,3	1,6	3,3	15	2,7	1,6	4,3	14	1,9	1,1	3,4
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	18	1,4	0,9	2,3	11	1,9	1,1	3,5	7	1,0	0,5	2,2
Autres leucémies	21	1,6	1,1	2,5	11	1,8	1,0	3,2	10	1,5	0,7	2,9
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	163	11,4	9,6	13,2	73	11,7	9,0	14,4	90	11,3	8,8	13,8
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	14	1,1	0,7	1,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2010) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 2-10
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Alberta

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2008												
Total, tous les sièges primaires de cancer	14 179	383,9	377,5	390,4	7 565	440,0	429,9	450,1	6 614	340,0	331,5	348,4
Lèvre (C00.0-C00.9)	18	0,5	0,3	0,8	12	0,8	0,4	1,2	6	0,3	0,1	0,6
Langue (C01.9-C02.9)	64	1,6	1,2	2,0	41	2,1	1,6	2,8	23	1,1	0,8	1,7
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	28	0,7	0,5	1,0	11	0,6	0,3	1,0	17	0,9	0,6	1,4
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	25	0,7	0,5	0,9	18	1,0	0,6	1,5	7	0,4	0,2	0,7
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	32	0,9	0,6	1,2	24	1,4	1,0	2,0	8	0,3	0,2	0,7
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	23	0,6	0,4	0,8	17	0,9	0,6	1,4	6	0,3	0,1	0,6
Oropharynx (C10.0-C10.9)	13	0,3	0,2	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	14	0,3	0,2	0,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	51	1,3	0,9	1,6	44	2,2	1,7	2,9	7	0,4	0,2	0,7
Oesophage (C15.0-C15.9)	164	4,5	3,8	5,2	123	7,1	5,8	8,4	41	2,2	1,6	2,9
Estomac (C16.0-C16.9)	252	6,8	5,9	7,6	171	10,0	8,4	11,5	81	4,1	3,2	5,0
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	61	1,7	1,2	2,1	36	2,0	1,5	2,6	25	1,3	0,9	1,9
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9-C26.0)	1 653	44,8	42,6	47,0	959	56,1	52,5	59,8	694	34,6	32,0	37,3
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	1 016	27,8	26,0	29,5	555	33,0	30,2	35,8	461	23,0	20,8	25,1
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	637	17,0	15,7	18,4	404	23,1	20,8	25,4	233	11,6	10,1	13,2
Anus (C21.0-C21.8)	43	1,1	0,8	1,4	14	0,8	0,5	1,2	29	1,4	1,0	2,0
Foie (C22.0)	127	3,2	2,7	3,8	89	4,7	3,7	5,7	38	1,9	1,4	2,5
Vésicule biliaire (C23.9)	43	1,1	0,9	1,5	10	0,6	0,3	1,1	33	1,6	1,2	2,2
Pancréas (C25.0-C25.9)	334	9,1	8,1	10,0	172	10,1	8,5	11,6	162	8,2	6,9	9,5
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	157	4,3	3,6	5,0	69	4,1	3,1	5,1	88	4,7	3,7	5,7
Larynx (C32.0-C32.9)	62	1,7	1,3	2,1	49	2,9	2,3	3,7	13	0,6	0,4	1,1
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	1 743	48,8	46,5	51,1	891	54,3	50,7	57,9	852	44,9	41,9	48,0
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	41	1,1	0,8	1,5	29	1,6	1,1	2,2	12	0,7	0,4	1,1
Os et articulations (C40.0-C41.9)	31	0,9	0,6	1,2	20	1,1	0,7	1,7	11	0,6	0,3	1,0
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	94	2,6	2,0	3,1	53	3,1	2,3	4,0	41	2,2	1,7	2,9
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	447	11,7	10,6	12,8	242	13,1	11,4	14,8	205	10,7	9,2	12,2
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	50	1,3	0,9	1,7	27	1,6	1,1	2,2	23	1,1	0,8	1,7
Sein (C50.0-C50.9)	1 833	47,7	45,5	50,0	9	0,6	0,3	1,1	1 824	92,5	88,2	96,9
Col utérin (C53.0-C53.9)	141	3,7	3,1	4,3	141	7,6	6,3	8,9
Corps utérin (C54.0-C54.9)	393	10,1	9,1	11,1	393	19,8	17,8	21,8
Utérus, sans autre indication (C55.9)	7	0,2	0,1	0,4	7	0,3	0,2	0,7
Ovaire (C56.9)	194	5,0	4,3	5,7	194	9,8	8,4	11,2
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	50	1,3	0,9	1,7	50	2,5	1,8	3,2
Prostate (C61.9)	2 168	60,2	57,6	62,7	2 168	126,5	121,1	132,0
Testicule (C62.0-C62.9)	117	3,3	2,7	3,9	117	6,4	5,2	7,5
Verge (C60.0-C60.9)	9	0,2	0,1	0,4	9	0,5	0,2	0,8
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	628	17,1	15,8	18,5	487	29,2	26,6	31,9	141	7,0	5,9	8,2
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	387	10,2	9,1	11,2	230	12,6	11,0	14,3	157	8,1	6,8	9,4
Urètre (C66.9)	15	0,4	0,3	0,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	7	0,2	0,1	0,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	31	0,9	0,6	1,2	15	0,9	0,5	1,4	16	0,9	0,6	1,4
Cerveau (C71.0-C71.9)	227	6,2	5,4	7,0	145	8,1	6,7	9,4	82	4,5	3,5	5,5

Tableau 2-10 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Alberta

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	9	0,2	0,1	0,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	385	10,2	9,2	11,3	95	5,0	3,9	6,0	290	15,8	13,9	17,6
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	29	0,8	0,6	1,1	17	0,9	0,6	1,4	12	0,7	0,4	1,1
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	88	2,5	1,9	3,0	50	2,7	1,9	3,5	38	2,2	1,6	2,9
Lymphomes non hodgkiniens	633	17,1	15,8	18,5	358	20,4	18,2	22,6	275	14,2	12,5	16,0
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	180	5,0	4,2	5,7	96	5,7	4,6	6,9	84	4,3	3,4	5,3
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	53	1,6	1,1	2,0	29	1,7	1,2	2,4	24	1,4	1,0	2,0
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	230	6,3	5,5	7,1	143	8,3	6,9	9,7	87	4,5	3,5	5,4
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	112	3,2	2,6	3,8	62	3,7	2,8	4,7	50	2,7	1,9	3,4
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	64	1,8	1,3	2,2	39	2,3	1,7	3,0	25	1,4	0,9	1,9
Autres leucémies	x	x	x	x	19	1,0	0,6	1,5	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	535	14,6	13,4	15,9	266	16,3	14,3	18,2	269	13,4	11,8	15,1
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	45	1,3	1,0	1,7	38	2,3	1,7	3,1	7	0,4	0,2	0,8
Sarcome de Kaposi (M-9140)	10	0,3	0,1	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x
2007												
Total, tous les sièges primaires de cancer	14 054	391,4	384,8	398,0	7 375	443,8	433,5	454,2	6 679	352,3	343,7	361,0
Lèvre (C00.0-C00.9)	24	0,7	0,5	1,0	18	1,1	0,7	1,6	6	0,3	0,1	0,6
Langue (C01.9-C02.9)	92	2,4	1,9	3,0	61	3,3	2,5	4,2	31	1,6	1,2	2,2
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	19	0,5	0,3	0,8	9	0,5	0,3	0,9	10	0,5	0,3	0,9
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	21	0,5	0,4	0,8	9	0,5	0,3	0,9	12	0,6	0,4	1,1
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	52	1,5	1,1	1,9	24	1,5	1,0	2,1	28	1,4	1,0	2,0
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	25	0,6	0,4	0,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	14	0,3	0,2	0,6	8	0,4	0,2	0,7	6	0,3	0,1	0,7
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	16	0,5	0,3	0,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	45	1,1	0,8	1,4	35	1,7	1,2	2,3	10	0,5	0,3	0,9
Oesophage (C15.0-C15.9)	172	4,7	4,0	5,5	129	7,6	6,3	8,9	43	2,2	1,6	2,9
Estomac (C16.0-C16.9)	262	7,2	6,3	8,1	179	10,7	9,1	12,4	83	4,1	3,2	5,0
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	44	1,2	0,9	1,5	27	1,6	1,1	2,2	17	0,8	0,5	1,3
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)	1 620	45,6	43,3	47,9	902	54,5	50,9	58,1	718	37,6	34,8	40,5
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	1 017	28,7	26,9	30,5	528	32,4	29,6	35,2	489	25,4	23,1	27,7
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	603	16,9	15,5	18,3	374	22,1	19,8	24,4	229	12,2	10,6	13,9
Anus (C21.0-C21.8)	47	1,3	1,0	1,7	19	1,1	0,7	1,6	28	1,5	1,1	2,1
Foie (C22.0)	138	3,7	3,0	4,3	107	5,9	4,7	7,0	31	1,6	1,2	2,2
Vésicule biliaire (C23.9)	36	1,0	0,7	1,3	11	0,7	0,4	1,2	25	1,3	0,9	1,8
Pancréas (C25.0-C25.9)	346	9,7	8,6	10,7	180	11,0	9,4	12,7	166	8,5	7,1	9,8
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	145	3,9	3,3	4,6	68	3,9	3,0	4,9	77	4,1	3,2	5,0
Larynx (C32.0-C32.9)	77	2,2	1,7	2,6	62	3,6	2,7	4,5	15	0,9	0,6	1,4
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	1 743	49,8	47,5	52,2	917	57,6	53,8	61,3	826	44,3	41,2	47,4
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	26	0,7	0,5	1,0	16	0,9	0,6	1,4	10	0,5	0,3	0,9
Os et articulations (C40.0-C41.9)	24	0,7	0,5	1,0	17	0,9	0,6	1,4	7	0,4	0,2	0,8

Tableau 2-10 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Alberta

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	93	2,7	2,1	3,2	50	3,0	2,1	3,8	43	2,4	1,8	3,1
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	446	11,8	10,7	13,0	231	13,1	11,3	14,8	215	11,0	9,5	12,5
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	44	1,2	0,9	1,6	25	1,6	1,1	2,3	19	1,0	0,6	1,5
Sein (C50.0-C50.9)	1 880	50,2	47,9	52,5	15	0,9	0,6	1,4	1 865	97,2	92,7	101,8
Col utérin (C53.0-C53.9)	158	4,4	3,7	5,1	158	9,0	7,5	10,4
Corps utérin (C54.0-C54.9)	385	10,3	9,3	11,4	385	20,3	18,2	22,3
Utérus, sans autre indication (C55.9)	11	0,3	0,2	0,5	11	0,5	0,3	0,9
Ovaire (C56.9)	175	4,6	3,9	5,3	175	9,0	7,6	10,3
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	73	1,9	1,5	2,4	73	3,7	2,8	4,6
Prostate (C61.9)	2 025	58,1	55,5	60,7	2 025	122,9	117,4	128,3
Testicule (C62.0-C62.9)	99	2,9	2,3	3,5	99	5,6	4,5	6,7
Verge (C60.0-C60.9)	12	0,3	0,2	0,5	12	0,7	0,4	1,1
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	6	0,2	0,1	0,3	6	0,3	0,1	0,7
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	584	16,6	15,2	18,0	449	28,1	25,5	30,8	135	7,2	5,9	8,4
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	468	12,9	11,7	14,1	281	16,3	14,4	18,3	187	9,9	8,4	11,4
Uretere (C66.9)	17	0,5	0,3	0,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	8	0,2	0,1	0,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	28	0,7	0,5	1,0	17	0,9	0,6	1,4	11	0,6	0,3	1,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	200	5,6	4,8	6,3	123	7,1	5,8	8,3	77	4,1	3,2	5,0
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	384	10,5	9,5	11,6	96	5,2	4,2	6,3	288	16,2	14,2	18,1
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	24	0,7	0,5	1,0	15	0,8	0,5	1,3	9	0,5	0,3	0,9
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	95	2,7	2,2	3,3	47	2,6	2,0	3,4	48	2,8	2,2	3,6
Lymphomes non hodgkiniens	627	17,7	16,2	19,1	341	20,4	18,2	22,6	286	15,3	13,5	17,1
Myéiome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	169	4,8	4,1	5,5	99	6,0	4,8	7,2	70	3,8	2,9	4,7
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	53	1,5	1,1	1,9	32	1,9	1,3	2,5	21	1,2	0,8	1,8
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	240	6,8	5,9	7,7	154	9,4	7,9	10,9	86	4,6	3,6	5,6
Leucémie myéiocytaire aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	95	2,6	2,1	3,2	45	2,6	2,0	3,4	50	2,7	1,9	3,4
Leucémie myéiocytaire chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	58	1,6	1,2	2,0	30	1,7	1,2	2,4	28	1,6	1,1	2,2
Autres leucémies	33	0,9	0,7	1,2	18	1,0	0,7	1,6	15	0,8	0,5	1,3
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	517	14,5	13,2	15,7	266	16,6	14,6	18,7	251	12,7	11,1	14,3
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	53	1,6	1,1	2,0	43	2,7	2,0	3,5	10	0,6	0,3	1,1
Sarcome de Kaposi (M-9140)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2010) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 2-11
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Colombie-Britannique

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2008												
Total, tous les sièges primaires de cancer	20 571	359,2	354,2	364,3	11 009	409,3	401,5	417,0	9 562	318,4	311,7	325,0
Lèvre (C00.0-C00.9)	25	0,4	0,3	0,6	19	0,7	0,4	1,0	6	0,2	0,1	0,4
Langue (C01.9-C02.9)	158	2,7	2,3	3,2	113	4,0	3,3	4,8	45	1,5	1,1	2,0
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	45	0,7	0,5	0,9	22	0,8	0,5	1,1	23	0,7	0,5	1,1
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	32	0,6	0,4	0,8	24	0,8	0,6	1,2	8	0,3	0,1	0,6
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	71	1,2	0,9	1,5	32	1,2	0,8	1,6	39	1,3	1,0	1,8
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	44	0,9	0,7	1,1	29	1,1	0,8	1,6	15	0,6	0,4	1,0
Oropharynx (C10.0-C10.9)	19	0,3	0,2	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	23	0,4	0,3	0,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	97	1,6	1,3	1,9	79	2,7	2,1	3,3	18	0,6	0,4	0,9
Oesophage (C15.0-C15.9)	238	4,0	3,5	4,5	181	6,5	5,6	7,5	57	1,8	1,3	2,2
Estomac (C16.0-C16.9)	379	6,4	5,7	7,0	258	9,5	8,3	10,6	121	3,6	2,9	4,3
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	75	1,3	1,0	1,6	43	1,6	1,2	2,1	32	1,0	0,7	1,4
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9-C26.0)	2 564	43,6	41,9	45,3	1 411	52,1	49,3	54,8	1 153	36,2	34,0	38,3
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	1 681	28,6	27,2	30,0	865	32,1	30,0	34,3	816	25,7	23,8	27,5
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	883	15,0	14,0	16,0	546	19,9	18,2	21,6	337	10,5	9,3	11,7
Anus (C21.0-C21.8)	76	1,3	1,0	1,6	29	1,1	0,8	1,5	47	1,5	1,1	1,9
Foie (C22.0)	236	4,0	3,5	4,6	175	6,2	5,3	7,1	61	2,1	1,5	2,6
Vésicule biliaire (C23.9)	65	1,1	0,8	1,4	24	0,9	0,6	1,4	41	1,3	1,0	1,7
Pancréas (C25.0-C25.9)	462	7,8	7,1	8,5	237	8,7	7,6	9,8	225	7,0	6,0	7,9
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	179	3,1	2,6	3,5	82	3,0	2,4	3,7	97	3,2	2,5	3,8
Larynx (C32.0-C32.9)	132	2,3	1,9	2,7	109	4,0	3,2	4,7	23	0,8	0,5	1,1
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	2 673	45,8	44,1	47,6	1 408	51,8	49,1	54,6	1 265	41,0	38,7	43,3
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	35	0,6	0,5	0,9	25	1,0	0,7	1,5	10	0,3	0,2	0,6
Os et articulations (C40.0-C41.9)	45	0,9	0,7	1,2	26	1,1	0,8	1,6	19	0,8	0,5	1,2
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	136	2,4	2,0	2,9	67	2,6	1,9	3,2	69	2,4	1,8	3,0
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	827	15,1	14,1	16,2	427	16,0	14,4	17,6	400	14,5	13,0	16,0
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	52	0,9	0,7	1,2	34	1,3	0,9	1,7	18	0,7	0,4	1,1
Sein (C50.0-C50.9)	2 758	48,3	46,4	50,1	23	0,8	0,6	1,2	2 735	92,5	88,9	96,1
Col utérin (C53.0-C53.9)	151	3,0	2,5	3,5	151	5,9	4,9	6,9
Corps utérin (C54.0-C54.9)	574	9,8	9,0	10,6	574	19,0	17,4	20,6
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ovaire (C56.9)	281	4,8	4,3	5,4	281	9,2	8,1	10,3
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	96	1,7	1,3	2,0	96	3,2	2,5	3,8
Prostate (C61.9)	3 124	54,4	52,5	56,3	3 124	115,0	111,0	119,1
Testicule (C62.0-C62.9)	126	3,2	2,7	3,8	126	6,5	5,3	7,7
Verge (C60.0-C60.9)	23	0,4	0,3	0,6	23	0,9	0,6	1,3
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	6	0,1	0,0	0,2	6	0,2	0,1	0,5
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	1 020	17,1	16,1	18,2	778	28,5	26,5	30,5	242	7,6	6,6	8,6
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	420	7,3	6,6	8,0	271	10,1	8,8	11,3	149	4,8	4,0	5,6
Uretere (C66.9)	23	0,4	0,3	0,6	10	0,4	0,2	0,7	13	0,4	0,2	0,7
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	46	0,9	0,7	1,1	22	0,9	0,6	1,3	24	0,8	0,6	1,3
Cerveau (C71.0-C71.9)	277	5,3	4,7	6,0	169	6,5	5,5	7,5	108	4,2	3,3	5,0

Tableau 2-11 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Colombie-Britannique

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	14	0,3	0,2	0,5	6	0,3	0,1	0,6	8	0,3	0,2	0,7
Thyroïde (C73.9)	303	6,1	5,4	6,8	88	3,5	2,7	4,2	215	8,6	7,4	9,8
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	19	0,4	0,3	0,6	8	0,4	0,2	0,7	11	0,5	0,3	0,9
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	114	2,7	2,2	3,2	66	3,1	2,4	3,9	48	2,3	1,7	2,9
Lymphomes non hodgkiniens	861	15,0	14,0	16,0	464	17,3	15,7	18,9	397	12,9	11,6	14,3
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	242	4,1	3,6	4,7	131	4,8	4,0	5,6	111	3,5	2,9	4,2
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	51	1,4	1,0	1,8	28	1,4	1,0	2,0	23	1,3	0,9	1,9
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	262	4,4	3,8	4,9	166	6,0	5,1	6,9	96	3,0	2,4	3,6
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	117	2,1	1,7	2,5	62	2,3	1,7	2,9	55	2,0	1,4	2,5
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	78	1,4	1,1	1,7	44	1,7	1,3	2,3	34	1,1	0,8	1,6
Autres leucémies	64	1,1	0,9	1,4	42	1,6	1,2	2,1	22	0,7	0,5	1,1
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	745	12,3	11,4	13,2	399	14,7	13,3	16,2	346	10,3	9,2	11,4
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	61	1,0	0,8	1,3	48	1,8	1,4	2,3	13	0,5	0,3	0,8
Sarcome de Kaposi (M-9140)	16	0,3	0,2	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x
2007												
Total, tous les sièges primaires de cancer	21 125	379,7	374,4	384,9	11 425	439,1	430,9	447,2	9 700	330,6	323,7	337,4
Lèvre (C00.0-C00.9)	17	0,3	0,2	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	142	2,5	2,1	2,9	104	3,8	3,1	4,6	38	1,3	0,9	1,7
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	35	0,7	0,5	0,9	18	0,7	0,4	1,1	17	0,7	0,4	1,0
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	30	0,5	0,4	0,7	19	0,7	0,5	1,1	11	0,4	0,2	0,7
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	69	1,2	0,9	1,5	30	1,1	0,8	1,6	39	1,3	1,0	1,8
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	47	0,8	0,6	1,1	35	1,3	0,9	1,7	12	0,4	0,2	0,7
Oropharynx (C10.0-C10.9)	15	0,3	0,2	0,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	34	0,6	0,4	0,8	28	1,0	0,7	1,4	6	0,2	0,1	0,5
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	77	1,3	1,0	1,6	60	2,1	1,6	2,7	17	0,5	0,3	0,9
Oesophage (C15.0-C15.9)	209	3,7	3,2	4,2	147	5,5	4,6	6,4	62	2,0	1,5	2,5
Estomac (C16.0-C16.9)	402	7,1	6,4	7,8	264	9,9	8,7	11,1	138	4,6	3,8	5,4
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	82	1,4	1,1	1,7	44	1,7	1,3	2,2	38	1,2	0,9	1,7
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)	2 538	44,3	42,5	46,0	1 409	53,6	50,8	56,4	1 129	36,0	33,9	38,2
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	1 677	29,1	27,7	30,5	884	33,8	31,5	36,0	793	25,1	23,3	26,9
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	861	15,1	14,1	16,2	525	19,8	18,1	21,6	336	10,9	9,7	12,1
Anus (C21.0-C21.8)	88	1,5	1,2	1,8	44	1,6	1,2	2,1	44	1,4	1,1	1,8
Foie (C22.0)	234	4,2	3,7	4,8	171	6,4	5,4	7,4	63	2,2	1,7	2,8
Vésicule biliaire (C23.9)	65	1,1	0,8	1,4	28	1,1	0,8	1,5	37	1,2	0,9	1,6
Pancréas (C25.0-C25.9)	518	8,8	8,0	9,6	258	9,6	8,4	10,8	260	8,0	7,0	9,0
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	192	3,4	2,9	3,9	87	3,4	2,7	4,1	105	3,4	2,7	4,1
Larynx (C32.0-C32.9)	123	2,1	1,8	2,5	99	3,7	2,9	4,4	24	0,8	0,5	1,2
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	2 898	51,0	49,1	52,9	1 514	57,5	54,6	60,4	1 384	45,8	43,3	48,3
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	26	0,5	0,3	0,7	6	0,3	0,1	0,5	20	0,6	0,4	1,0
Os et articulations (C40.0-C41.9)	39	0,8	0,6	1,1	20	0,9	0,6	1,4	19	0,7	0,5	1,2

Tableau 2-11 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Colombie-Britannique

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	132	2,6	2,2	3,1	70	2,8	2,2	3,5	62	2,5	1,8	3,1
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	782	14,7	13,6	15,7	427	16,6	15,0	18,2	355	13,2	11,8	14,6
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	62	1,1	0,8	1,4	34	1,3	1,0	1,8	28	0,9	0,6	1,3
Sein (C50.0-C50.9)	2 737	49,1	47,3	51,0	23	0,8	0,6	1,2	2 714	94,1	90,4	97,7
Col utérin (C53.0-C53.9)	163	3,5	3,0	4,1	163	6,9	5,8	8,0
Corps utérin (C54.0-C54.9)	536	9,4	8,6	10,2	536	18,2	16,6	19,8
Utérus, sans autre indication (C55.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Ovaire (C56.9)	280	5,1	4,5	5,7	280	9,8	8,6	10,9
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	79	1,4	1,1	1,7	79	2,6	2,0	3,2
Prostate (C61.9)	3 396	61,5	59,4	63,6	3 396	130,0	125,6	134,4
Testicule (C62.0-C62.9)	102	2,6	2,0	3,1	102	5,1	4,1	6,2
Verge (C60.0-C60.9)	9	0,2	0,1	0,3	9	0,3	0,2	0,6
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	989	17,3	16,2	18,4	733	28,1	26,0	30,1	256	8,3	7,3	9,4
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	474	8,4	7,6	9,2	303	11,5	10,2	12,8	171	5,7	4,8	6,6
Uretrère (C66.9)	20	0,3	0,2	0,5	13	0,5	0,3	0,8	7	0,2	0,1	0,5
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	40	0,8	0,6	1,0	19	0,7	0,5	1,1	21	0,8	0,5	1,3
Cerveau (C71.0-C71.9)	297	5,9	5,2	6,6	173	7,2	6,1	8,3	124	4,7	3,8	5,5
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	11	0,3	0,2	0,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Thyroïde (C73.9)	282	5,8	5,1	6,5	68	2,8	2,1	3,5	214	8,7	7,5	10,0
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	30	0,6	0,5	0,9	15	0,6	0,4	1,0	15	0,6	0,4	1,0
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	99	2,5	2,0	3,0	50	2,6	1,9	3,4	49	2,4	1,8	3,1
Lymphomes non hodgkiniens	874	15,8	14,7	16,8	511	19,7	18,0	21,5	363	12,3	11,0	13,6
Myéiome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	266	4,6	4,0	5,1	161	6,1	5,1	7,0	105	3,3	2,6	3,9
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	60	1,7	1,2	2,1	34	1,9	1,4	2,5	26	1,5	1,0	2,1
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	289	5,0	4,4	5,6	187	7,0	6,0	8,0	102	3,3	2,7	4,0
Leucémie myéiocytaire aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	137	2,6	2,1	3,0	74	3,0	2,3	3,7	63	2,2	1,6	2,8
Leucémie myéiocytaire chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	65	1,2	0,9	1,5	35	1,4	1,0	1,9	30	1,0	0,7	1,4
Autres leucémies	80	1,3	1,0	1,6	50	1,9	1,4	2,5	30	0,9	0,6	1,3
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	850	14,4	13,4	15,4	434	16,4	14,9	18,0	416	12,7	11,5	14,0
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	75	1,3	1,0	1,6	66	2,6	1,9	3,2	9	0,3	0,2	0,6
Sarcome de Kaposi (M-9140)	17	0,4	0,2	0,6	x	x	x	x	x	x	x	x

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2010) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 2-12
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Yukon

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2008												
Total, tous les sièges primaires de cancer	87	286,7	221,0	352,4	40	263,3	192,7	362,8	47	306,0	231,1	403,8
Lèvre (C00.0-C00.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Langue (C01.9-C02.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oesophage (C15.0-C15.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Estomac (C16.0-C16.9)	8	26,4	12,4	54,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Anus (C21.0-C21.8)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Foie (C22.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Vésicule biliaire (C23.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Pancréas (C25.0-C25.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Larynx (C32.0-C32.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	14	48,1	27,9	81,5	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Os et articulations (C40.0-C41.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Col utérin (C53.0-C53.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Corps utérin (C54.0-C54.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Utérus, sans autre indication (C55.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Ovaire (C56.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Prostate (C61.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Testicule (C62.0-C62.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Verge (C60.0-C60.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Urètre (C66.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Tableau 2-12 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Yukon

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Lymphomes non hodgkiniens	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres leucémies	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mésothéliome (M-9050-M-9055)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Sarcome de Kaposi (M-9140)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
2007												
Total, tous les sièges primaires de cancer	108	362,6	287,2	438,0	57	387,6	274,8	500,3	51	330,0	231,8	428,1
Lèvre (C00.0-C00.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Langue (C01.9-C02.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oesophage (C15.0-C15.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Estomac (C16.0-C16.9)	6	24,7	10,3	53,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	10	31,2	16,4	59,4	x	x	x	x	x	x	x	x
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Anus (C21.0-C21.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Foie (C22.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Vésicule biliaire (C23.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Pancréas (C25.0-C25.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Larynx (C32.0-C32.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	12	46,4	25,3	81,3	6	54,9	21,8	122,1	6	40,3	16,7	90,6
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0

Tableau 2-12 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Yukon

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Col utérin (C53.0-C53.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Corps utérin (C54.0-C54.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Utérus, sans autre indication (C55.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Ovaire (C56.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Prostate (C61.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Testicule (C62.0-C62.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Verge (C60.0-C60.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Uretere (C66.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Lymphomes non hodgkiniens	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Myéiome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie myéiocytaire aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie myéiocytaire chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres leucémies	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	7	22,4	9,4	49,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sarcome de Kaposi (M-9140)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2010) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 2-13
Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Territoires du Nord-Ouest

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2008												
Total, tous les sièges primaires de cancer	99	343,0	267,9	418,2	50	326,0	222,8	429,3	49	363,1	275,0	475,3
Lèvre (C00.0-C00.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Langue (C01.9-C02.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oesophage (C15.0-C15.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Estomac (C16.0-C16.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9-C26.0)	22	83,2	54,0	124,9	x	x	x	x	x	x	x	x
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	15	52,3	30,2	87,0	8	38,1	17,2	89,4	7	66,8	30,2	131,6
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	7	30,9	13,8	61,7	x	x	x	x	x	x	x	x
Anus (C21.0-C21.8)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Foie (C22.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Vésicule biliaire (C23.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Pancréas (C25.0-C25.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Larynx (C32.0-C32.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	16	71,1	42,8	112,6	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Os et articulations (C40.0-C41.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Sein (C50.0-C50.9)	13	31,5	17,6	57,4	0	0,0	0,0	0,0	13	67,0	38,3	120,3
Col utérin (C53.0-C53.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Corps utérin (C54.0-C54.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Utérus, sans autre indication (C55.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Ovaire (C56.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Prostate (C61.9)	14	53,0	30,5	88,2	14	100,0	56,4	172,8
Testicule (C62.0-C62.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Verge (C60.0-C60.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Uretere (C66.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Tableau 2-13 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Territoires du Nord-Ouest

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Lymphomes non hodgkiniens	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres leucémies	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Sarcome de Kaposi (M-9140)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
2007												
Total, tous les sièges primaires de cancer	130	459,2	371,0	547,3	68	496,6	363,8	629,3	62	425,1	305,9	544,4
Lèvre (C00.0-C00.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Langue (C01.9-C02.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oesophage (C15.0-C15.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Estomac (C16.0-C16.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)	29	110,4	76,0	157,6	15	106,3	61,3	181,4	14	113,9	64,8	189,8
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	15	63,7	37,7	103,0	9	61,1	29,4	124,0	6	62,7	26,4	127,9
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	14	46,8	26,2	80,5	6	45,2	17,0	106,8	8	51,2	22,4	107,1
Anus (C21.0-C21.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Foie (C22.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Vésicule biliaire (C23.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Pancréas (C25.0-C25.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Larynx (C32.0-C32.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	19	73,7	45,9	114,6	11	90,8	47,7	165,3	8	56,6	24,8	116,0
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0

Tableau 2-13 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Territoires du Nord-Ouest

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	17	93,0	55,6	154,8
Col utérin (C53.0-C53.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Corps utérin (C54.0-C54.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Utérus, sans autre indication (C55.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Ovaire (C56.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Prostate (C61.9)	19	80,3	51,1	122,5	19	154,6	97,1	241,9
Testicule (C62.0-C62.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Verge (C60.0-C60.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Uretere (C66.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Lymphomes non hodgkiniens	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Myéiome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie myéiocytaire aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie myéiocytaire chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres leucémies	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sarcome de Kaposi (M-9140)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2010) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Tableau 2-14

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Nunavut

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
2008												
Total, tous les sièges primaires de cancer	44	284,9	206,0	406,1	21	290,3	175,7	507,1	23	283,4	179,6	476,0
Lèvre (C00.0-C00.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Langue (C01.9-C02.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Oesophage (C15.0-C15.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Estomac (C16.0-C16.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Colon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Anus (C21.0-C21.8)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Foie (C22.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Vésicule biliaire (C23.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Pancréas (C25.0-C25.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Larynx (C32.0-C32.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	15	120,2	68,5	219,0	8	123,5	55,1	305,4	7	114,5	46,5	284,4
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Os et articulations (C40.0-C41.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Col utérin (C53.0-C53.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Corps utérin (C54.0-C54.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Utérus, sans autre indication (C55.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Ovaire (C56.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Prostate (C61.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Testicule (C62.0-C62.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Verge (C60.0-C60.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Urètre (C66.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Tableau 2-14 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Nunavut

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Lymphomes non hodgkiniens	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Myélome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie myéloïde aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie myéloïde chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres leucémies	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Sarcome de Kaposi (M-9140)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
2007												
Total, tous les sièges primaires de cancer	49	397,7	296,5	546,1	26	409,7	270,0	652,9	23	370,5	238,3	602,2
Lèvre (C00.0-C00.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Langue (C01.9-C02.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Glandes salivaires principales (C07.9-C08.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plancher de la bouche (C04.0-C04.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Gencive et autres localisations de la bouche (C03.0-C03.9, C05.0-C05.9, C06.0-C06.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Nasopharynx (C11.0-C11.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Oropharynx (C10.0-C10.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Hypopharynx (C12.9, C13.0-C13.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx (C09.0-C09.9, C14.0-C14.8)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Oesophage (C15.0-C15.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Estomac (C16.0-C16.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Intestin grêle (C17.0-C17.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Colorectal (C18.0-C18.9, C19.9, C20.9 C26.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Côlon à l'exclusion du rectum (C18.0-C18.9, C26.0)	9	82,9	36,5	187,3	x	x	x	x	x	x	x	x
Rectum et recto-sigmoïde (C19.9, C20.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Anus (C21.0-C21.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Foie (C22.0)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Vésicule biliaire (C23.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Pancréas (C25.0-C25.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations de l'appareil digestif (C22.1, C24.0-C24.9, C26.8-C26.9, C48.0-C48.8)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Larynx (C32.0-C32.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Poumon et bronche (C34.0-C34.9)	18	162,5	101,4	275,4	12	195,5	106,8	396,9	6	123,9	51,4	311,2
Autres localisations de l'appareil respiratoire (C30.0-C30.1, C31.0-C31.9, C33.9, C38.1-C38.8, C39.0-C39.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Os et articulations (C40.0-C41.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0

Tableau 2-14 – suite

Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010) — Nunavut

	Structure démographique du Recensement de 1991											
	Les deux sexes				Hommes				Femmes			
	Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %		Incidence du cancer	Taux normalisé selon l'âge pour 100 000	Intervalle de confiance de 95 %	
			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure			Limite inférieure	Limite supérieure
nombre	taux			nombre	taux			nombre	taux			
Tissus mous (y compris le cœur) (C38.0, C47.0-C47.9, C49.0-C49.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Mélanomes de la peau (C44.0-C44.9, M-8720-M-8790)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de la peau (C44.0-C44.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Sein (C50.0-C50.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Col utérin (C53.0-C53.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Corps utérin (C54.0-C54.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Utérus, sans autre indication (C55.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Ovaire (C56.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres organes génitaux féminins (C51.0-C51.9, C52.9, C57.0-C58.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Prostate (C61.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Testicule (C62.0-C62.9)	x	x	x	x	x	x	x	x
Verge (C60.0-C60.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres organes génitaux masculins (C63.0-C63.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Vessie (y compris in situ) (C67.0-C67.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rein et bassinnet du rein (C64.9, C65.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Uretere (C66.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations de l'appareil urinaire (C68.0-C68.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Oeil (C69.0-C69.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Cerveau (C71.0-C71.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Autres localisations du système nerveux (C71.0-C71.9, M-9530-M-9539; C70.0-C70.9, C72.0-C72.9)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Thyroïde (C73.9)	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Autre endocrine (C37.9, C74.0-C74.9, C75.0-C75.9)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Maladie de Hodgkin (M-9650-M-9667)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Lymphomes non hodgkiniens	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Myéiome multiple (M-9731, M-9732, M-9734)	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie lymphocytaire aiguë (M-9826, M-9835-M-9837)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie lymphocytaire chronique (C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leucémie myéiocytaire aiguë (M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871-M-9874, M-9895-M-9897, M-9910, M-9920)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Leucémie myéiocytaire chronique (M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Autres leucémies	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mésotéliome (M-9050-M-9055)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Sarcome de Kaposi (M-9140)	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0

Note(s) : Voir la section « Qualité des données, concepts et méthodologie — Notes explicatives pour les tableaux ». Veuillez noter que le tableau CANSIM 103-0553 ne fournit plus les taux bruts pour 100 000 personnes ainsi que leurs intervalles de confiance de 95% correspondantes. Ces données sont maintenant disponibles au tableau CANSIM 103-0550.

Source(s) : Statistique Canada, Base de données du Registre canadien du cancer (RCC) (fichier de juillet 2010) et Division de la démographie (estimations de la population) (Tableau CANSIM 103-0553).

Notes explicatives pour les tableaux

Tableau 1 Nouveaux cas pour tous les sièges primaires de cancer combinés (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010)

Organisation mondiale de la santé, Classification internationale des maladies, Troisième édition (CIM-O-3) et les règles du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) pour déterminer les sièges primaires multiples.

L'incidence du cancer se rapporte aux nouveaux sièges primaires des tumeurs malignes. L'incidence du cancer peut varier d'une diffusion à l'autre en raison du caractère dynamique de la base de données du Registre canadien du cancer (RCC) qui peut être mise à jour par l'ajout d'enregistrements ou par la modification d'enregistrements existants.

Le tableau a été préparé en se servant des groupes du « Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) » pour les sièges primaires selon la Classification internationale des maladies, Troisième édition (CIM-O-3). Tous les sièges invasifs et in situ pour la vessie sont compris.

L'intervalle de confiance (IC) de 95 % témoigne du degré de variabilité d'un taux. La variabilité des taux présentés est d'autant plus forte que l'intervalle de confiance est grand; aussi faut-il interpréter et comparer ces taux avec prudence.

Le programme de suppression tau-Ardent, développé à Statistique Canada, est utilisé pour supprimer les cellules présentant de faibles dénombrements des données du cancer. Il supprime les cellules du tableau contenant un petit dénombrement (de 1 à 5) et supprime ensuite d'autres cellules itérativement pour empêcher le calcul des cellules supprimées à partir des données diffusées. Le programme choisit une cellule ayant le dénombrement minimal parmi les cellules dans la classe d'équivalence de position la plus prometteuse, mais il peut supprimer des cellules présentant n'importe quel dénombrement, y compris un dénombrement de zéro, mais il ne supprime pas de cellules non disponibles ou non applicables. Quand une cellule est supprimée, toutes les mesures de taux et nombre (nombre, taux, limite inférieure et supérieure de l'intervalle de confiance du taux) pour cette cellule sont supprimées ensemble.

Tableau 2 Nouveaux cas pour les sièges primaires de cancer de la CIM-O-3 (d'après le fichier des totalisations du RCC de juillet 2010)

Organisation mondiale de la santé, Classification internationale des maladies, Troisième édition (CIM-O-3) et les règles du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) pour déterminer les sièges primaires multiples.

L'incidence du cancer se rapporte aux nouveaux sièges primaires des tumeurs malignes. L'incidence du cancer peut varier d'une diffusion à l'autre en raison du caractère dynamique de la base de données du Registre canadien du cancer (RCC) qui peut être mise à jour par l'ajout d'enregistrements ou par la modification d'enregistrements existants.

Le tableau a été préparé en se servant des groupes du « Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) » pour les sièges primaires selon la Classification internationale des maladies, Troisième édition (CIM-O-3). Tous les sièges invasifs et in situ pour la vessie sont compris.

Les taux d'incidence du cancer sont normalisés selon l'âge par la méthode directe en prenant pour référence la structure par âge de la population qui prévalait lors du Recensement de la population du Canada de 1991.

Les intervalles de confiance des taux d'incidence du cancer normalisés selon l'âge ont été produits par la méthode de référence suivante : « Fay M.P. and E.J. Feuer. 1997. « Confidence intervals for directly standardized rates : a method based on the gamma distribution. » Statistics in Medicine. Volume 16, pages 791 to 801 ».

L'intervalle de confiance (IC) de 95 % témoigne du degré de variabilité d'un taux. La variabilité des taux présentés est d'autant plus forte que l'intervalle de confiance est grand; aussi faut-il interpréter et comparer ces taux avec prudence.

Le programme de suppression tau-Ardent, développé à Statistique Canada, est utilisé pour supprimer les cellules présentant de faibles dénombrements des données du cancer. Il supprime les cellules du tableau contenant un petit dénombrement (de 1 à 5) et supprime ensuite d'autres cellules itérativement pour empêcher le calcul des cellules supprimées à partir des données diffusées. Le programme choisit une cellule ayant la dénombrement minimal parmi les cellules dans la classe d'équivalence de position le plus prometteur, mais il peut supprimer des cellules présentant n'importe quel dénombrement, y inclus un dénombrement de zéro, mais il ne supprime pas de cellules non disponibles ou non applicables. Quand une cellule est supprimée, toutes les mesures de taux et nombre (nombre, taux, limite inférieure et supérieure de l'intervalle de confiance du taux) pour cette cellule sont supprimées ensemble.

L'utilisation d'estimations démographiques correspondant à une population type permet de calculer des taux d'incidence dont la comparaison est plus significative, car les taux ainsi obtenus sont corrigés pour la variation de la structure par âge de la population au fil du temps ainsi que d'une région à l'autre.

Appendice I

Sièges de cancer

Liste des sièges de cancer diagnostiqués au Canada, noms et codes de la Classification internationale des maladies, Troisième édition (CIM-O-3)¹

Sièges primaires	Codes de la CIM-O-3
Lèvre	C00.0 à C00.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Langue	C01.9 à C02.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Glandes salivaires principales	C07.9 à C08.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Plancher de la bouche	C04.0 à C04.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Gencive et autres localisations de la bouche	C03.0 à C03.9, C05.0 à C05.9, C06.0 à C06.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Nasopharynx	C11.0 à C11.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Oropharynx	C10.0 à C10.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Hypopharynx	C12.9, C13.0 à C13.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Autres localisations de la cavité buccale et du pharynx	C09.0 à C09.9, C14.0, C14.2 à C14.8 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Oesophage	C15.0 à C15.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Estomac	C16.0 à C16.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Intestin grêle	C17.0 à C17.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Colorectal	C18.0 to 18.9, C19.9, C20.9, C26.0 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Côlon à l'exclusion du rectum	C18.0 à C18.9, C26.0 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Rectum et recto-sigmoïde	C19.9, C20.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Anus	C21.0 à C21.2, C21.8 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Foie	C22.0 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Vésicule biliaire	C23.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)

1. **Source** : Organisation mondiale de la santé, Classification internationale des maladies pour l'oncologie, Troisième édition (CIM-O-3) et Surveillance, Epidemiology, and End Results Program (SEER).

Pancréas	C25.0 à C25.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Autres localisations de l'appareil digestif	C22.1, C24.0 à C24.9, C26.8 à C26.9, C48.0, C48.1 à C48.2, C48.8 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Larynx	C32.0 à -C32.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Poumon et bronche	C34.0 à C34.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Autres localisations de l'appareil respiratoire	C30.0 à C30.1, C31.0 à C31.9, C33.9, C38.1 à C38.3, C38.4, C38.8, C39.0, C39.8, C39.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Os et articulations	C40.0 à C41.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Tissus mous (y compris le coeur)	C38.0, C47.0 à C47.9, C49.0 à C49.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Mélanomes de la peau	C44.0 à C44.9, M-8720 à M-8790
Autres localisations de la peau	C44.0 à C44.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-8050 à M-8084, M-8090 à M-8110, M-8720 à M-8790, M-9050 à M-9055, M-9140, M-9590 à M-9989.)
Sein	C50.0 à C50.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Col utérin	C53.0 à C53.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Corps utérin	C54.0 à C54.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Utérus, sans autre indication	C55.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Ovaire	C56.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Autres organes génitaux féminins	C51.0 à C51.9, C52.9, C57.0 à -C58.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Prostate	C61.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Testicule	C62.0 à C62.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Verge	C60.0 à C60.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Autres organes génitaux masculins	C63.0 à C63.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Vessie (y compris in situ)	C67.0 à C67.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Rein et bassinnet du rein	C64.9, C65.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Urètre	C66.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Autres localisations de l'appareil urinaire	C68.0 à C68.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Oeil	C69.0 à C69.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Cerveau	C71.0 à C71.9 (Excluding morphology types M-9530 à M-9539, M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.))
Autres localisations du système nerveux	C71.0 à C71.9, M-9530 à M-9539; C70.0 à C70.9, C72.0 à C72.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)

Thyroïde	C73.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Autre endocrine	C37.9, C74.0 à C74.9, C75.0 à C75.9 (À l'exclusion des types morphologiques M-9050 à M-9055; M-9140; M-9590 à M-9989.)
Maladie de Hodgkin	M-9650 à M-9667
Lymphomes non hodgkiniens	M-9590 à M-9596, M-9670 à M-9719, M-9727 à M-9729; M-9823, tous les sièges sauf C42.0, C42.1, C42.4; M-9827, tous les sièges sauf C42.0, C42.1, C42.4
Myélome multiple	M-9731, M-9732, M-9734
Leucémie lymphocytaire aiguë	M-9826, M-9835 à M-9837
Leucémie lymphocytaire chronique	C42.0, M-9823; C42.1, M-9823; C42.4, M-9823
Leucémie myéloïde aiguë	M-9840, M-9861, M-9866, M-9867, M-9871 à M-9874, M-9895 à M-9897, M-9910, M-9920
Leucémie myéloïde chronique	M-9863, M-9875, M-9876, M-9945, M-9946
Autres leucémies	M-9733, M-9742, M-9800, M-9801, M-9805, M-9820, M-9831, M-9832 à M-9834, M-9860, M-9870, M-9891, M-9930, M-9931, M-9940, M-9948, M-9963, M-9964; C42.0, M-9827; C42.1, M-9827; C42.4, M-9827
Autres localisations, localisations mal définies et inconnues	C42.0 à C42.4, M-8000 à M-9049, M-9056 à M-9139, M-9141 à M-9589; C76.0 à C76.8, M-8000 à M-9049, M-9056 à M-9139, M-9141 à M-9589; C77.0 à C77.9, M-8000 à M-9049, M-9056 à M-9139, M-9141 à M-9589; C80.9, M-8000 à M-9049, M-9056 à M-9139, M-9141 à M-9589; M-9740, M-9741, M-9750 à M-9758, M-9760 à M-9769, M-9950 à M-9962, M-9970 à M-9989
Mésothéliome	M-9050 à M-9055
Sarcome de Kaposi	M-9140