


Enquête canadienne sur les mesures de la santé : tableaux de données du cycle 1



2007 à 2009



Statistique
Canada

Statistics
Canada

Canada

Comment obtenir d'autres renseignements

Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l'ensemble des données et des services de Statistique Canada, visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca. Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel à infostats@statcan.gc.ca ou par téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros suivants :

Centre de contact national de Statistique Canada

Numéros sans frais (Canada et États-Unis) :

| | |
|---|----------------|
| Service de renseignements | 1-800-263-1136 |
| Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants | 1-800-363-7629 |
| Télécopieur | 1-877-287-4369 |

Appels locaux ou internationaux :

| | |
|---------------------------|----------------|
| Service de renseignements | 1-613-951-8116 |
| Télécopieur | 1-613-951-0581 |

Programme des services de dépôt

| | |
|---------------------------|----------------|
| Service de renseignements | 1-800-635-7943 |
| Télécopieur | 1-800-565-7757 |

Comment accéder à ce produit

Le produit n° 82-623-X au catalogue est disponible gratuitement sous format électronique. Pour obtenir un exemplaire, il suffit de visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca et de choisir la rubrique « Publications ».

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s'est doté de *normes de service à la clientèle* que les employés observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi publiées sur le site www.statcan.gc.ca sous « À propos de nous » > « Offrir des services aux Canadiens ».

Statistique Canada

Division des mesures physiques de la santé

Enquête canadienne sur les mesures de la santé : tableaux de données du cycle 1

2007 à 2009

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2010

Tous droits réservés. Le contenu de la présente publication électronique peut être reproduit en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, sans autre permission de Statistique Canada, sous réserve que la reproduction soit effectuée uniquement à des fins d'étude privée, de recherche, de critique, de compte rendu ou en vue d'en préparer un résumé destiné aux journaux et/ou à des fins non commerciales. Statistique Canada doit être citée comme suit : Source (ou « Adapté de », s'il y a lieu) : Statistique Canada, année de publication, nom du produit, numéro au catalogue, volume et numéro, période de référence et page(s). Autrement, il est interdit de reproduire le contenu de la présente publication, ou de l'emmagasiner dans un système d'extraction, ou de le transmettre sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, reproduction électronique, mécanique, photographique, pour quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable des Services d'octroi de licences, Division des services à la clientèle, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Janvier 2010

N° 82-623-X au catalogue

ISSN 1920-6569

Périodicité : irrégulière

Ottawa

This publication is also available in English.

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

Information pour l'utilisateur

Signes conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada :

- . indisponible pour toute période de référence
- .. indisponible pour une période de référence précise
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- 0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
- 0^s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie
- p provisoire
- r révisé
- x confidentiel en vertu des dispositions de la *Loi sur la statistique*
- E à utiliser avec prudence
- F trop peu fiable pour être publié

Table des matières

| | |
|---|----------|
| Introduction | 5 |
| Tableaux statistiques | |
| 1 Distribution de la population à domicile selon la pression diastolique au repos moyenne, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009 | 7 |
| 2 Distribution de la population à domicile selon la pression systolique au repos moyenne, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009 | 8 |
| 3 Distribution de la population à domicile selon la fréquence cardiaque au repos moyenne, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009 | 9 |
| 4 Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives à la tension artérielle, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009 | 10 |
| 5 Population à domicile qui a autodéclaré avoir reçu un diagnostic d'hypertension ou prendre des médicaments pour l'hypertension, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009 | 11 |
| 6 Force de préhension totale de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009 | 12 |
| 7 Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives à la force de préhension, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009 | 13 |
| 8 Nombre de redressements assis partiels effectués par la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009 | 14 |
| 9 Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives aux redressements assis partiels, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009 | 15 |
| 10 Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives à la santé du dos, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009 | 16 |
| 11 Mesure de la flexion du tronc effectuée par la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009 | 17 |
| 12 Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives à la flexion du tronc, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009 | 18 |
| 13 Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives aux aptitudes musculosquelettiques, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009 | 19 |
| 14 Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives à l'aptitude aérobie, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009 | 20 |
| 15 Circonférence de la taille mesurée de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009 | 21 |
| 16 Circonférence des hanches mesurée de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009 | 22 |
| 17 Ratio de la taille aux hanches mesuré de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009 | 23 |
| 18 Distribution de la population à domicile dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30kg/m ² , selon la mesure moyenne du pli cutané du biceps, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009 | 24 |
| 19 Distribution de la population à domicile dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30kg/m ² , selon la mesure moyenne du pli cutané du triceps, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009 | 25 |

Table des matières – suite

| | | |
|----|---|----|
| 20 | Distribution de la population à domicile dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30kg/m ² , selon la mesure moyenne du pli cutané sous-scapulaire, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009 | 26 |
| 21 | Distribution de la population à domicile dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30kg/m ² , selon la mesure moyenne du pli cutané de la crête iliaque, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009 | 27 |
| 22 | Distribution de la population à domicile dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30kg/m ² , selon la mesure moyenne du pli cutané du mollet, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009 | 28 |
| 23 | Distribution de la population à domicile dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30kg/m ² , selon la somme des mesures des cinq plis cutanés, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009 | 29 |
| 24 | Poids autodéclaré de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009 | 30 |
| 25 | Taille autodéclarée de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009 | 31 |
| 26 | Distribution de la population à domicile âgée de 6 à 17 ans, d'après les normes relatives à l'indice de masse corporelle basées sur les entrées autodéclarées — méthode CDC, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009 | 32 |
| 27 | Distribution de la population à domicile âgée de 6 à 17 ans, d'après les normes relatives à l'indice de masse corporelle basées sur les entrées autodéclarées — méthode Cole, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009 | 33 |
| 28 | Distribution de la population à domicile âgée de 18 à 79 ans, d'après les normes relatives à l'indice de masse corporelle basées sur les entrées autodéclarées, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009 | 34 |
| 29 | Taille en position assise mesurée de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009 | 35 |
| 30 | Taille en position debout mesurée de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009 | 36 |
| 31 | Poids mesuré de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009 | 37 |
| 32 | Indice de masse corporelle mesuré de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009 | 38 |
| 33 | Distribution de la population à domicile âgée de 6 à 17 ans, d'après les normes relatives à l'indice de masse corporelle basées sur les entrées mesurées — méthode CDC, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009 | 39 |
| 34 | Distribution de la population à domicile âgée de 6 à 17 ans, d'après les normes relatives à l'indice de masse corporelle basées sur les entrées mesurées — méthode Cole, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009 | 40 |
| 35 | Distribution de la population à domicile âgée de 18 à 79 ans, d'après les normes relatives à l'indice de masse corporelle basées sur les entrées mesurées, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009 | 41 |
| 36 | Puissance aérobique maximale prévue moyenne de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009 | 42 |
| 37 | Ratio du meilleur volume expiratoire maximal en une seconde à la meilleure capacité vitale forcée de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009 | 43 |
| 38 | Meilleur volume expiratoire maximal en une seconde de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009 | 44 |
| 39 | Meilleure capacité vitale forcée de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009 | 45 |
| 40 | Distribution de la population à domicile d'après l'état dentaire, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009 | 46 |

Introduction

L'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) est l'enquête nationale la plus exhaustive sur les mesures physiques de la santé jamais menée au pays. La collecte des données se déroule en deux étapes, à savoir une interview en personne au domicile du répondant, suivie d'une visite à la clinique mobile de l'ECMS, où l'on prend des mesures physiques et prélève des échantillons de sang et d'urine.

L'ECMS dresse un portrait de la santé des Canadiens, grâce à la collecte de données de base touchant diverses préoccupations, y compris la santé cardiovasculaire, l'état nutritionnel, les maladies chroniques et l'activité physique, ainsi que l'exposition à des maladies infectieuses et à des contaminants environnementaux. L'enquête recueille des renseignements sur la santé qui ne pourraient être obtenus autrement ou qui pourraient être déclarés incorrectement par autodéclaration ou d'après les dossiers médicaux.

L'ECMS est menée par Statistique Canada, en partenariat avec Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada.

Au cours du cycle 1 de l'ECMS, des mesures physiques ont été recueillies dans 15 sites au Canada, auprès d'environ 5 600 personnes représentant la population canadienne de 6 à 79 ans. Les sites de collecte étaient situés dans cinq provinces : le Nouveau-Brunswick, le Québec, l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique. La collecte a commencé en mars 2007 et s'est poursuivie jusqu'en février 2009. Les données sont représentatives à l'échelon national.

La présente publication fait partie de la première diffusion des données de l'ECMS en janvier 2010. Elle contient des tableaux de données sur la tension artérielle, la condition physique, les mesures anthropométriques, la spirométrie et la santé buccodentaire. Les données sont présentées selon le sexe et les groupes d'âge suivants (selon la mesure) : 6 à 11 ans, 12 à 19 ans, 20 à 39 ans, 40 à 59 ans et 60 à 79 ans.

D'autres tableaux s'ajouteront à la présente publication à chaque nouvelle diffusion de données tout au long de 2010. Les données relatives à la santé cardiovasculaire, aux marqueurs des maladies chroniques et infectieuses ainsi qu'à la nutrition seront diffusées au printemps, les données sur les mesures environnementales, à l'été, et les données sur l'activité physique, à l'automne. Chaque diffusion de données sera accompagnée de tableaux, d'un guide de l'utilisateur, de documentation sur les variables dérivées et de plusieurs articles publiés dans les *Rapports sur la santé*, une publication trimestrielle de Statistique Canada revue par les pairs.

Pour obtenir plus de renseignements sur l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé :

| | |
|---|--|
| Numéro sans frais : | 1-888-253-1087 |
| Courriel : | chms-ecms@statcan.gc.ca |
| Appareil de télécommunication pour malentendants : | 1-866-753-7083 |
| Site Web de Statistique Canada : | www.statcan.gc.ca/ecms |

Tableaux statistiques

Tableau 1
Distribution de la population à domicile selon la pression diastolique au repos moyenne, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2007 à 2009

| | Pression diastolique au repos moyenne | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| | Moyenne | | 5 ^e percentile | | 10 ^e percentile | | 25 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance |
| | | de à | | de à | | de à | | de à | | de à | | de à |
| millimètres de mercure | | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 61 | 60 | 61 | 49 | 48 | 50 | 51 | 49 | 53 | 56 | 55 | 57 |
| 12 à 19 ans | 63 | 62 | 64 | 52 | 51 | 53 | 54 | 53 | 55 | 58 | 57 | 59 |
| 20 à 39 ans | 69 | 68 | 71 | 56 | 55 | 57 | 58 | 57 | 59 | 63 | 62 | 64 |
| 40 à 59 ans | 75 | 74 | 76 | 61 | 60 | 62 | 64 | 63 | 65 | 68 | 67 | 69 |
| 60 à 79 ans | 73 | 72 | 73 | 57 | 55 | 59 | 61 | 60 | 62 | 67 | 66 | 68 |
| 6 à 79 ans | 70 | 70 | 71 | 55 | 54 | 56 | 58 | 57 | 59 | 63 | 62 | 64 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 61 | 59 | 62 | 49 | 47 | 51 | 51 | 49 | 53 | 56 | 55 | 57 |
| 12 à 19 ans | 63 | 62 | 64 | 51 | 50 | 52 | 53 | 52 | 54 | 58 | 56 | 60 |
| 20 à 39 ans | 72 | 70 | 73 | 56 | 54 | 58 | 59 | 56 | 62 | 66 | 64 | 68 |
| 40 à 59 ans | 78 | 76 | 79 | 65 | 62 | 68 | 67 | 65 | 69 | 72 | 70 | 74 |
| 60 à 79 ans | 74 | 73 | 75 | 58 | 57 | 59 | 62 | 61 | 63 | 68 | 67 | 69 |
| 6 à 79 ans | 72 | 71 | 73 | 55 | 54 | 56 | 58 | 56 | 60 | 65 | 64 | 66 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 60 | 60 | 61 | 50 | 48 | 52 | 52 | 50 | 54 | 55 | 54 | 56 |
| 12 à 19 ans | 63 | 62 | 64 | 53 | 51 | 55 | 55 | 54 | 56 | 57 | 56 | 58 |
| 20 à 39 ans | 67 | 66 | 69 | 55 | 53 | 57 | 58 | 57 | 59 | 62 | 61 | 63 |
| 40 à 59 ans | 72 | 71 | 73 | 60 | 59 | 61 | 62 | 61 | 63 | 66 | 65 | 67 |
| 60 à 79 ans | 72 | 71 | 73 | 57 | 54 | 60 | 60 | 58 | 62 | 65 | 63 | 67 |
| 6 à 79 ans | 69 | 68 | 69 | 55 | 54 | 56 | 57 | 56 | 58 | 62 | 61 | 63 |

| | Pression diastolique au repos moyenne | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| | 50 ^e percentile | | 75 ^e percentile | | 90 ^e percentile | | 95 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance |
| | | de à | | de à | | de à | | de à | | de à | | de à |
| millimètres de mercure | | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 61 | 60 | 62 | 65 | 64 | 66 | 70 | 69 | 71 | 72 | 70 | 74 |
| 12 à 19 ans | 63 | 61 | 65 | 68 | 66 | 70 | 72 | 71 | 73 | 75 | 74 | 76 |
| 20 à 39 ans | 69 | 68 | 70 | 75 | 73 | 77 | 81 | 79 | 83 | 84 | 82 | 86 |
| 40 à 59 ans | 74 | 73 | 75 | 81 | 79 | 83 | 86 | 85 | 87 | 89 | 87 | 91 |
| 60 à 79 ans | 73 | 72 | 74 | 78 | 77 | 79 | 83 | 82 | 84 | 88 | 86 | 90 |
| 6 à 79 ans | 70 | 69 | 71 | 77 | 76 | 78 | 83 | 82 | 84 | 86 | 85 | 87 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 60 | 59 | 61 | 64 | 63 | 65 | 69 | 67 | 71 | 72 | 69 | 75 |
| 12 à 19 ans | 63 | 61 | 65 | 68 | 66 | 70 | 72 | 70 | 74 | 77 | 74 | 80 |
| 20 à 39 ans | 72 | 70 | 74 | 78 | 76 | 80 | 82 | 80 | 84 | 86 | 83 | 89 |
| 40 à 59 ans | 78 | 76 | 80 | 83 | 82 | 84 | 87 | 86 | 88 | 90 | 88 | 92 |
| 60 à 79 ans | 75 | 74 | 76 | 80 | 79 | 81 | 84 | 83 | 85 | 88 | 86 | 90 |
| 6 à 79 ans | 73 | 72 | 74 | 79 | 78 | 80 | 84 | 83 | 85 | 87 | 86 | 88 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 61 | 60 | 62 | 65 | 64 | 66 | 70 | 69 | 71 | 73 | 71 | 75 |
| 12 à 19 ans | 63 | 61 | 65 | 68 | 66 | 70 | 72 | 71 | 73 | 74 | 73 | 75 |
| 20 à 39 ans | 66 | 64 | 68 | 72 | 70 | 74 | 78 | 75 | 81 | 83 | 80 | 86 |
| 40 à 59 ans | 71 | 70 | 72 | 77 | 76 | 78 | 82 | 80 | 84 | 87 | 84 | 90 |
| 60 à 79 ans | 72 | 71 | 73 | 77 | 76 | 78 | 83 | 81 | 85 | 88 | 86 | 90 |
| 6 à 79 ans | 68 | 67 | 69 | 74 | 73 | 75 | 80 | 79 | 81 | 85 | 83 | 87 |

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*)

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 2
Distribution de la population à domicile selon la pression systolique au repos moyenne, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2007 à 2009

| | Pression systolique au repos moyenne | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------|-----------|------------|-------------------------|------------|
| | Moyenne | | 5 ^e percentile | | 10 ^e percentile | | 25 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à | | de | à |
| millimètres de mercure | | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 93 | 92 | 94 | 82 | 80 | 84 | 84 | 83 | 85 | 88 | 87 | 89 |
| 12 à 19 ans | 99 | 98 | 101 | 86 | 84 | 88 | 89 | 88 | 90 | 93 | 91 | 95 |
| 20 à 39 ans | 106 | 104 | 107 | 90 | 89 | 91 | 93 | 92 | 94 | 98 | 96 | 100 |
| 40 à 59 ans | 114 | 112 | 116 | 95 | 94 | 96 | 99 | 97 | 101 | 105 | 104 | 106 |
| 60 à 79 ans | 125 | 124 | 126 | 102 | 100 | 104 | 105 | 104 | 106 | 113 | 112 | 114 |
| 6 à 79 ans | 110 | 109 | 111 | 89 | 88 | 90 | 92 | 91 | 93 | 99 | 98 | 100 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 93 | 92 | 94 | 81 | 78 | 84 | 84 | 82 | 86 | 88 | 87 | 89 |
| 12 à 19 ans | 101 | 99 | 103 | 87 | 86 | 88 | 89 | 88 | 90 | 94 | 92 | 96 |
| 20 à 39 ans | 110 | 108 | 112 | 93 | 91 | 95 | 98 | 96 | 100 | 103 | 101 | 105 |
| 40 à 59 ans | 116 | 115 | 118 | 99 | 98 | 100 | 102 | 101 | 103 | 108 | 106 | 110 |
| 60 à 79 ans | 122 | 121 | 124 | 100 | 98 | 102 | 104 | 102 | 106 | 113 | 111 | 115 |
| 6 à 79 ans | 112 | 111 | 113 | 90 | 89 | 91 | 94 | 93 | 95 | 102 | 101 | 103 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 93 | 93 | 94 | 82 | 80 | 84 | 84 | 82 | 86 | 88 | 87 | 89 |
| 12 à 19 ans | 98 | 96 | 99 | 86 | 84 | 88 | 89 | 87 | 91 | 92 | 90 | 94 |
| 20 à 39 ans | 101 | 100 | 103 | 87 | 85 | 89 | 91 | 90 | 92 | 94 | 92 | 96 |
| 40 à 59 ans | 112 | 110 | 114 | 93 | 92 | 94 | 96 | 94 | 98 | 102 | 101 | 103 |
| 60 à 79 ans | 127 | 125 | 129 | 103 | 101 | 105 | 105 | 103 | 107 | 115 | 113 | 117 |
| 6 à 79 ans | 108 | 107 | 110 | 88 | 87 | 89 | 91 | 90 | 92 | 97 | 96 | 98 |

| | Pression systolique au repos moyenne | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|
| | 50 ^e percentile | | 75 ^e percentile | | 90 ^e percentile | | 95 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à | | de | à |
| millimètres de mercure | | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 93 | 92 | 94 | 98 | 96 | 100 | 103 | 102 | 104 | 106 | 104 | 108 |
| 12 à 19 ans | 98 | 96 | 100 | 105 | 103 | 107 | 111 | 108 | 114 | 115 | 113 | 117 |
| 20 à 39 ans | 105 | 103 | 107 | 113 | 111 | 115 | 119 | 117 | 121 | 125 | 122 | 128 |
| 40 à 59 ans | 113 | 111 | 115 | 121 | 118 | 124 | 131 | 127 | 135 | 138 | 135 | 141 |
| 60 à 79 ans | 123 | 121 | 125 | 134 | 132 | 136 | 146 | 143 | 149 | 156 | 151 | 161 |
| 6 à 79 ans | 108 | 106 | 110 | 118 | 117 | 119 | 129 | 127 | 131 | 138 | 136 | 140 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 92 | 91 | 93 | 97 | 95 | 99 | 102 | 100 | 104 | 105 | 102 | 108 |
| 12 à 19 ans | 101 | 99 | 103 | 106 | 104 | 108 | 113 | 110 | 116 | 116 | 113 | 119 |
| 20 à 39 ans | 110 | 108 | 112 | 117 | 115 | 119 | 122 | 119 | 125 | 127 | 124 | 130 |
| 40 à 59 ans | 116 | 114 | 118 | 123 | 121 | 125 | 131 | 126 | 136 | 138 | 132 | 144 |
| 60 à 79 ans | 121 | 119 | 123 | 132 | 129 | 135 | 142 | 140 | 144 | 146 | 143 | 149 |
| 6 à 79 ans | 111 | 110 | 112 | 119 | 117 | 121 | 129 | 128 | 130 | 137 | 135 | 139 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 93 | 92 | 94 | 99 | 98 | 100 | 104 | 103 | 105 | 107 | 105 | 109 |
| 12 à 19 ans | 97 | 96 | 98 | 102 | 101 | 103 | 109 | 107 | 111 | 112 | 109 | 115 |
| 20 à 39 ans | 100 | 98 | 102 | 107 | 104 | 110 | 115 | 113 | 117 | 119 | 115 | 123 |
| 40 à 59 ans | 110 | 108 | 112 | 119 | 116 | 122 | 130 | 125 | 135 | 138 | 134 | 142 |
| 60 à 79 ans | 125 | 123 | 127 | 136 | 133 | 139 | 152 | 146 | 158 | 163 | 154 | 172 |
| 6 à 79 ans | 105 | 104 | 106 | 117 | 115 | 119 | 129 | 126 | 132 | 139 | 136 | 142 |

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 3
Distribution de la population à domicile selon la fréquence cardiaque au repos moyenne, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2007 à 2009

| | Fréquence cardiaque au repos moyenne | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------|-----------|------------|-------------------------|-----------|
| | Moyenne | | 5 ^e percentile | | 10 ^e percentile | | 25 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à | | de | à |
| battements par minute | | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 80 | 79 | 81 | 63 | 61 | 65 | 67 | 66 | 68 | 72 | 71 | 73 |
| 12 à 19 ans | 75 | 74 | 76 | 56 | 54 | 58 | 60 | 59 | 61 | 67 | 65 | 69 |
| 20 à 39 ans | 69 | 68 | 71 | 53 | 51 | 55 | 56 | 54 | 58 | 62 | 60 | 64 |
| 40 à 59 ans | 67 | 66 | 68 | 51 | 49 | 53 | 55 | 54 | 56 | 61 | 60 | 62 |
| 60 à 79 ans | 66 | 65 | 67 | 50 | 48 | 52 | 53 | 52 | 54 | 59 | 58 | 60 |
| 6 à 79 ans | 69 | 69 | 70 | 52 | 51 | 53 | 56 | 55 | 57 | 62 | 61 | 63 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 77 | 76 | 78 | 62 | 60 | 64 | 64 | 62 | 66 | 69 | 68 | 70 |
| 12 à 19 ans | 74 | 72 | 76 | 55 | 52 | 58 | 59 | 57 | 61 | 65 | 62 | 68 |
| 20 à 39 ans | 68 | 66 | 70 | 50 | 47 | 53 | 54 | 52 | 56 | 61 | 60 | 62 |
| 40 à 59 ans | 66 | 65 | 67 | 49 | 47 | 51 | 52 | 49 | 55 | 59 | 57 | 61 |
| 60 à 79 ans | 65 | 64 | 66 | 48 | 46 | 50 | 52 | 51 | 53 | 58 | 57 | 59 |
| 6 à 79 ans | 68 | 67 | 69 | 50 | 48 | 52 | 54 | 53 | 55 | 60 | 59 | 61 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 82 | 81 | 83 | 66 | 64 | 68 | 69 | 67 | 71 | 75 | 73 | 77 |
| 12 à 19 ans | 75 | 74 | 76 | 58 | 55 | 61 | 61 | 59 | 63 | 68 | 66 | 70 |
| 20 à 39 ans | 71 | 69 | 73 | 55 | 53 | 57 | 58 | 56 | 60 | 63 | 61 | 65 |
| 40 à 59 ans | 68 | 67 | 69 | 54 | 53 | 55 | 57 | 55 | 59 | 62 | 61 | 63 |
| 60 à 79 ans | 66 | 65 | 68 | 52 | 50 | 54 | 54 | 53 | 55 | 59 | 58 | 60 |
| 6 à 79 ans | 71 | 70 | 71 | 54 | 53 | 55 | 58 | 57 | 59 | 63 | 62 | 64 |

| | Fréquence cardiaque au repos moyenne | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------|-----------|------------|-------------------------|-----------|
| | 50 ^e percentile | | 75 ^e percentile | | 90 ^e percentile | | 95 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à | | de | à |
| battements par minute | | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 79 | 78 | 80 | 87 | 86 | 88 | 93 | 91 | 95 | 98 | 96 | 100 |
| 12 à 19 ans | 74 | 73 | 75 | 82 | 80 | 84 | 91 | 90 | 92 | 95 | 94 | 96 |
| 20 à 39 ans | 69 | 67 | 71 | 76 | 75 | 77 | 83 | 81 | 85 | 88 | 85 | 91 |
| 40 à 59 ans | 66 | 65 | 67 | 73 | 71 | 75 | 81 | 79 | 83 | 85 | 83 | 87 |
| 60 à 79 ans | 65 | 64 | 66 | 72 | 71 | 73 | 78 | 76 | 80 | 84 | 81 | 87 |
| 6 à 79 ans | 68 | 67 | 69 | 76 | 75 | 77 | 84 | 83 | 85 | 89 | 88 | 90 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 76 | 75 | 77 | 85 | 83 | 87 | 91 | 89 | 93 | 96 | 93 | 99 |
| 12 à 19 ans | 73 | 71 | 75 | 81 | 78 | 84 | 92 | 88 | 96 | 97 | 95 | 99 |
| 20 à 39 ans | 68 | 66 | 70 | 75 | 73 | 77 | 81 | 79 | 83 | 85 | 81 | 89 |
| 40 à 59 ans | 65 | 64 | 66 | 72 | 70 | 74 | 80 | 77 | 83 | 84 | 81 | 87 |
| 60 à 79 ans | 65 | 64 | 66 | 71 | 69 | 73 | 78 | 75 | 81 | 86 | 80 | 92 |
| 6 à 79 ans | 67 | 66 | 68 | 75 | 74 | 76 | 83 | 81 | 85 | 88 | 87 | 89 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 82 | 80 | 84 | 88 | 86 | 90 | 96 | 93 | 99 | 100 | 96 | 104 |
| 12 à 19 ans | 74 | 73 | 75 | 83 | 81 | 85 | 91 | 89 | 93 | 94 | 92 | 96 |
| 20 à 39 ans | 71 | 69 | 73 | 77 | 76 | 78 | 84 | 82 | 86 | 89 | 86 | 92 |
| 40 à 59 ans | 67 | 66 | 68 | 74 | 72 | 76 | 82 | 80 | 84 | 86 | 84 | 88 |
| 60 à 79 ans | 66 | 64 | 68 | 73 | 71 | 75 | 79 | 77 | 81 | 83 | 80 | 86 |
| 6 à 79 ans | 70 | 69 | 71 | 77 | 76 | 78 | 85 | 84 | 86 | 89 | 87 | 91 |

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 4
Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives à la tension artérielle, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2007 à 2009

| | Normes relatives à la tension artérielle | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|-------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------|------------|
| | Dans les limites souhaitables | | | Dans les limites souhaitables, mais dans les valeurs supérieures de la normale | | | Au-dessus des limites souhaitables | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | de | à | | de | à | | de | à | |
| pourcentage | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | |
| 18 à 39 ans | 95,4 | 93,8 | 96,9 | 3,9 ^E | 2,6 | 5,1 | F | ... | ... |
| 40 à 59 ans | 82,4 | 78,8 | 85,9 | 11,3 | 8,7 | 13,9 | 5,3 | 4,0 | 6,6 |
| 60 à 79 ans | 66,7 | 64,2 | 69,1 | 15,7 | 12,8 | 18,6 | 13,8 | 11,6 | 15,9 |
| 18 à 79 ans | 84,4 | 82,8 | 86,0 | 9,2 | 8,0 | 10,4 | 5,1 | 4,5 | 5,8 |
| Hommes | | | | | | | | | |
| 18 à 39 ans | 93,9 | 91,3 | 96,5 | 4,9 ^E | 2,9 | 7,0 | F | ... | ... |
| 40 à 59 ans | 78,0 | 72,6 | 83,3 | 14,7 | 10,5 | 18,9 | 6,5 | 4,7 | 8,4 |
| 60 à 79 ans | 69,7 | 65,3 | 74,0 | 15,2 | 10,5 | 19,9 | 13,8 | 10,7 | 16,9 |
| 18 à 79 ans | 82,8 | 80,7 | 84,9 | 10,8 | 9,1 | 12,6 | 5,7 | 4,7 | 6,7 |
| Femmes | | | | | | | | | |
| 18 à 39 ans | 96,8 | 94,6 | 99,1 | F | ... | ... | F | ... | ... |
| 40 à 59 ans | 86,7 | 82,5 | 90,8 | 7,9 ^E | 5,2 | 10,7 | 4,0 ^E | 2,2 | 5,9 |
| 60 à 79 ans | 63,9 | 60,7 | 67,1 | 16,1 | 13,9 | 18,3 | 13,8 | 10,3 | 17,3 |
| 18 à 79 ans | 86,0 | 83,9 | 88,1 | 7,6 | 6,2 | 9,0 | 4,6 | 3,5 | 5,6 |

| | Normes relatives à la tension artérielle | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|
| | Modérément élevée | | Élevée | | Très élevée | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | de | à | | de | à | |
| pourcentage | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | |
| 18 à 39 ans | F | ... | ... | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 à 59 ans | 0,7 ^E | 0,3 | 1,1 | F | ... | 0,0 |
| 60 à 79 ans | 2,4 ^E | 1,4 | 3,4 | F | ... | 0,0 |
| 18 à 79 ans | 0,8^E | 0,5 | 1,1 | F | ... | 0,0 |
| Hommes | | | | | | |
| 18 à 39 ans | F | ... | ... | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 à 59 ans | F | ... | ... | F | ... | 0,0 |
| 60 à 79 ans | 1,0 ^E | 0,4 | 1,6 | F | ... | 0,0 |
| 18 à 79 ans | 0,5^E | 0,2 | 0,9 | F | ... | 0,0 |
| Femmes | | | | | | |
| 18 à 39 ans | F | ... | ... | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 à 59 ans | F | ... | ... | F | ... | 0,0 |
| 60 à 79 ans | 3,6 ^E | 1,9 | 5,3 | F | ... | 0,0 |
| 18 à 79 ans | 1,0^E | 0,5 | 1,6 | F | ... | 0,0 |

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

^F trop peu fiable pour être publié (données avec un coefficient de variation (CV) de plus de 33,3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage)

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de D. Abbott, N. Campbell, P. Carruthers-Czyzewski, A. Chockalingam, M. David, G. Dunkley, E.

Ellis, J.G. Fodor, D. McKay, V.R. Ramsden, 1994, « Guidelines for measurement of blood pressure, follow-up, and lifestyle counselling », Canadian Journal of Public Health, Vol. 85 (suppl 2), p. S29 à S35.

Population à domicile âgée de 18 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 5
Population à domicile qui a autodéclaré avoir reçu un diagnostic d'hypertension ou prendre des médicaments pour l'hypertension, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

| | Diagnostiqué d'hypertension ou prend des médicaments pour l'hypertension | | | Non diagnostiqué d'hypertension et ne prend pas des médicaments pour l'hypertension | | |
|-----------------------|--|-------------------------|-------------|---|-------------------------|-------------|
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à |
| pourcentage | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | |
| 12 à 19 ans | F | ... | ... | 99,7 | 99,4 | 99,9 |
| 20 à 39 ans | 2,5 ^E | 1,4 | 3,5 | 97,5 | 96,5 | 98,6 |
| 40 à 59 ans | 17,3 | 14,1 | 20,6 | 82,7 | 79,4 | 85,9 |
| 60 à 79 ans | 48,0 | 43,7 | 52,3 | 52,0 | 47,7 | 56,3 |
| 12 à 79 ans | 15,8 | 14,7 | 17,0 | 84,2 | 83,0 | 85,3 |
| Hommes | | | | | | |
| 12 à 19 ans | F | ... | ... | 99,7 | 99,5 | 100,0 |
| 20 à 39 ans | 2,6 ^E | 1,2 | 4,0 | 97,4 | 96,0 | 98,8 |
| 40 à 59 ans | 18,9 | 13,3 | 24,5 | 81,1 | 75,5 | 86,7 |
| 60 à 79 ans | 47,9 | 42,5 | 53,3 | 52,1 | 46,7 | 57,5 |
| 12 à 79 ans | 16,1 | 14,5 | 17,7 | 83,9 | 82,3 | 85,5 |
| Femmes | | | | | | |
| 12 à 19 ans | F | ... | ... | 99,7 | 99,2 | 100,1 |
| 20 à 39 ans | F | ... | ... | 97,6 | 95,9 | 99,4 |
| 40 à 59 ans | 15,8 | 13,5 | 18,2 | 84,2 | 81,8 | 86,5 |
| 60 à 79 ans | 48,1 | 42,5 | 53,7 | 51,9 | 46,3 | 57,5 |
| 12 à 79 ans | 15,6 | 14,3 | 16,9 | 84,4 | 83,1 | 85,7 |

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6% à 33,3%)

^F trop peu fiable pour être publié (données avec un coefficient de variation (CV) de plus de 33,3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage)

Note(s) : Population à domicile âgée de 12 à 79 ans.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 6
Force de préhension totale de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

| | Force de préhension totale | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------|-----------|------------|-------------------------|-----------|
| | Moyenne | | 5 ^e percentile | | 10 ^e percentile | | 25 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à | | de | à |
| kilogrammes | | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 26 | 25 | 28 | 12 | 11 | 13 | 14 | 12 | 16 | 19 | 17 | 21 |
| 12 à 19 ans | 62 | 60 | 64 | 35 | 33 | 37 | 39 | 37 | 41 | 46 | 44 | 48 |
| 20 à 39 ans | 76 | 75 | 78 | 43 | 42 | 44 | 47 | 46 | 48 | 56 | 54 | 58 |
| 40 à 59 ans | 73 | 72 | 75 | 42 | 39 | 45 | 47 | 46 | 48 | 54 | 53 | 55 |
| 60 à 79 ans | 61 | 60 | 62 | 34 | 32 | 36 | 36 | 35 | 37 | 44 | 43 | 45 |
| 6 à 79 ans | 67 | 66 | 69 | 28 | 26 | 30 | 37 | 36 | 38 | 49 | 48 | 50 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 27 | 26 | 29 | 12 | 10 | 14 | 16 | 13 | 19 | 21 | 18 | 24 |
| 12 à 19 ans | 72 | 69 | 74 | 35 | 32 | 38 | 39 | 35 | 43 | 51 | 48 | 54 |
| 20 à 39 ans | 97 | 94 | 99 | 72 | 66 | 78 | 77 | 74 | 80 | 87 | 82 | 92 |
| 40 à 59 ans | 93 | 91 | 95 | 68 | 64 | 72 | 73 | 69 | 77 | 83 | 81 | 85 |
| 60 à 79 ans | 78 | 75 | 80 | 51 | 45 | 57 | 57 | 52 | 62 | 68 | 65 | 71 |
| 6 à 79 ans | 84 | 82 | 86 | 29 | 27 | 31 | 46 | 43 | 49 | 74 | 72 | 76 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 25 | 24 | 27 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | 14 | 19 | 18 | 20 |
| 12 à 19 ans | 51 | 49 | 53 | 35 | 31 | 39 | 39 | 37 | 41 | 43 | 41 | 45 |
| 20 à 39 ans | 56 | 54 | 58 | 39 | 36 | 42 | 43 | 42 | 44 | 49 | 48 | 50 |
| 40 à 59 ans | 54 | 53 | 55 | 38 | 35 | 41 | 42 | 39 | 45 | 48 | 46 | 50 |
| 60 à 79 ans | 46 | 45 | 47 | 31 | 30 | 32 | 34 | 33 | 35 | 39 | 38 | 40 |
| 6 à 79 ans | 51 | 50 | 52 | 26 | 24 | 28 | 34 | 32 | 36 | 44 | 43 | 45 |

| | Force de préhension totale | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|
| | 50 ^e percentile | | 75 ^e percentile | | 90 ^e percentile | | 95 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à | | de | à |
| kilogrammes | | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 26 | 25 | 27 | 32 | 30 | 34 | 39 | 37 | 41 | 43 | 41 | 45 |
| 12 à 19 ans | 56 | 53 | 59 | 75 | 72 | 78 | 93 | 90 | 96 | 102 | 98 | 106 |
| 20 à 39 ans | 73 | 69 | 77 | 98 | 95 | 101 | 109 | 105 | 113 | 117 | 113 | 121 |
| 40 à 59 ans | 68 | 65 | 71 | 92 | 90 | 94 | 106 | 104 | 108 | 113 | 110 | 116 |
| 60 à 79 ans | 57 | 54 | 60 | 78 | 75 | 81 | 90 | 87 | 93 | 97 | 93 | 101 |
| 6 à 79 ans | 63 | 61 | 65 | 88 | 86 | 90 | 104 | 102 | 106 | 111 | 108 | 114 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 27 | 25 | 29 | 33 | 31 | 35 | 40 | 38 | 42 | 43 | 41 | 45 |
| 12 à 19 ans | 73 | 70 | 76 | 89 | 84 | 94 | 102 | 98 | 106 | 108 | 102 | 114 |
| 20 à 39 ans | 98 | 95 | 101 | 106 | 103 | 109 | 117 | 113 | 121 | 123 | 117 | 129 |
| 40 à 59 ans | 92 | 90 | 94 | 103 | 101 | 105 | 113 | 110 | 116 | 116 | 114 | 118 |
| 60 à 79 ans | 79 | 76 | 82 | 89 | 86 | 92 | 98 | 94 | 102 | 103 | 100 | 106 |
| 6 à 79 ans | 88 | 86 | 90 | 101 | 99 | 103 | 111 | 108 | 114 | 117 | 115 | 119 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 24 | 22 | 26 | 31 | 29 | 33 | 38 | 35 | 41 | 43 | 40 | 46 |
| 12 à 19 ans | 51 | 49 | 53 | 58 | 55 | 61 | 66 | 64 | 68 | 70 | 68 | 72 |
| 20 à 39 ans | 56 | 54 | 58 | 63 | 60 | 66 | 70 | 67 | 73 | 74 | 71 | 77 |
| 40 à 59 ans | 54 | 53 | 55 | 60 | 59 | 61 | 67 | 65 | 69 | 71 | 68 | 74 |
| 60 à 79 ans | 45 | 44 | 46 | 52 | 50 | 54 | 59 | 57 | 61 | 63 | 61 | 65 |
| 6 à 79 ans | 52 | 51 | 53 | 59 | 58 | 60 | 66 | 64 | 68 | 71 | 69 | 73 |

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 7
Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives à la force de préhension, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

| | Normes relatives à la force de préhension | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|-------------|--|
| | À améliorer | | | Acceptable | | | | Bien | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | |
| | | de | à | | de | à | | de | à | |
| pourcentage | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | |
| 15 à 19 ans | 32,9 | 24,1 | 41,8 | 19,5 | 14,8 | 24,2 | 23,0 | 19,1 | 27,0 | |
| 20 à 39 ans | 26,1 | 22,1 | 30,0 | 23,0 | 18,8 | 27,1 | 20,7 | 16,1 | 25,2 | |
| 40 à 59 ans | 18,2 | 15,1 | 21,3 | 17,4 | 13,6 | 21,1 | 24,1 | 19,6 | 28,5 | |
| 60 à 69 ans | 25,4 | 21,6 | 29,2 | 21,9 | 17,6 | 26,1 | 15,2 | 12,0 | 18,3 | |
| 15 à 69 ans | 23,4 | 20,4 | 26,3 | 20,2 | 17,1 | 23,4 | 21,5 | 19,2 | 23,8 | |
| Hommes | | | | | | | | | | |
| 15 à 19 ans | 37,7 | 25,8 | 49,6 | 21,4 | 15,0 | 27,8 | 18,8 ^E | 12,6 | 24,9 | |
| 20 à 39 ans | 20,7 | 14,8 | 26,7 | 21,5 | 16,3 | 26,8 | 23,6 ^E | 14,8 | 32,4 | |
| 40 à 59 ans | 16,4 | 12,2 | 20,6 | 18,4 | 14,4 | 22,5 | 19,0 ^E | 10,9 | 27,0 | |
| 60 à 69 ans | 28,4 | 23,8 | 32,9 | 29,6 | 25,6 | 33,6 | 17,7 | 12,4 | 22,9 | |
| 15 à 69 ans | 21,3 | 17,7 | 25,0 | 21,3 | 17,8 | 24,8 | 20,5 | 17,1 | 24,0 | |
| Femmes | | | | | | | | | | |
| 15 à 19 ans | 28,8 | 20,4 | 37,2 | 17,8 | 13,2 | 22,5 | 26,8 | 21,8 | 31,9 | |
| 20 à 39 ans | 31,3 | 26,1 | 36,5 | 24,4 | 19,9 | 28,9 | 17,7 | 13,6 | 21,9 | |
| 40 à 59 ans | 20,0 | 15,2 | 24,8 | 16,3 | 12,0 | 20,7 | 29,1 | 23,8 | 34,4 | |
| 60 à 69 ans | 22,6 | 15,7 | 29,6 | 14,6 ^E | 7,8 | 21,5 | 12,8 | 8,7 | 16,9 | |
| 15 à 69 ans | 25,4 | 21,2 | 29,5 | 19,2 | 16,0 | 22,5 | 22,5 | 20,5 | 24,5 | |

| | Normes relatives à la force de préhension | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| | Très bien | | | Excellent | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à |
| pourcentage | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | |
| 15 à 19 ans | 14,5 | 11,2 | 17,7 | 10,0 | 7,5 | 12,6 |
| 20 à 39 ans | 18,9 | 15,6 | 22,2 | 11,4 | 7,9 | 14,9 |
| 40 à 59 ans | 23,3 | 19,3 | 27,3 | 17,0 | 12,3 | 21,7 |
| 60 à 69 ans | 17,6 | 13,5 | 21,6 | 20,0 | 17,2 | 22,8 |
| 15 à 69 ans | 20,2 | 18,8 | 21,5 | 14,7 | 11,5 | 17,9 |
| Hommes | | | | | | |
| 15 à 19 ans | 12,6 | 9,2 | 15,9 | 9,6 ^E | 5,2 | 14,0 |
| 20 à 39 ans | 21,2 | 15,6 | 26,7 | 13,0 ^E | 7,5 | 18,5 |
| 40 à 59 ans | 24,8 | 20,3 | 29,3 | 21,3 | 15,6 | 27,0 |
| 60 à 69 ans | 12,2 ^E | 6,6 | 17,9 | 12,1 | 8,6 | 15,7 |
| 15 à 69 ans | 20,8 | 18,9 | 22,7 | 16,0 | 12,1 | 20,0 |
| Femmes | | | | | | |
| 15 à 19 ans | 16,1 | 11,2 | 21,0 | 10,4 ^E | 6,5 | 14,4 |
| 20 à 39 ans | 16,7 | 12,4 | 21,0 | 9,8 ^E | 5,0 | 14,6 |
| 40 à 59 ans | 21,9 | 16,6 | 27,2 | 12,7 ^E | 7,0 | 18,5 |
| 60 à 69 ans | 22,5 | 16,8 | 28,3 | 27,4 | 21,0 | 33,8 |
| 15 à 69 ans | 19,5 | 16,8 | 22,3 | 13,4 | 10,3 | 16,5 |

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de Société canadienne de physiologie de l'exercice, 2004, Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (Guide du conseiller CPHV), 3e édition, Ottawa.

Population à domicile âgée de 15 à 69 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 8
Nombre de redressements assis partiels effectués par la population à domicile, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2007 à 2009

| | Nombre de redressements assis partiels | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|----------|----------------------------|-------------------------|----------|------------|-------------------------|------------|
| | Moyenne | | 5 ^e percentile | | 10 ^e percentile | | 25 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à | | de | à |
| nombre | | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 9 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 à 19 ans | 19 | 18 | 20 | 0 | -2 | 2 | F | ... | ... | 15 | 12 | 18 |
| 20 à 39 ans | 16 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | ... | ... |
| 40 à 59 ans | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 à 69 ans | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 à 69 ans | 13 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 8 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 à 19 ans | 21 | 20 | 22 | F | ... | ... | 10 ^E | 5 | 15 | 20 | 17 | 23 |
| 20 à 39 ans | 20 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 19 | 17 | 21 |
| 40 à 59 ans | 15 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 60 à 69 ans | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 à 69 ans | 16 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | ... | ... |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 10 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 à 19 ans | 17 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | F | ... | ... | 11 | 9 | 13 |
| 20 à 39 ans | 13 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 à 59 ans | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 à 69 ans | 3 ^E | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 à 69 ans | 10 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Nombre de redressements assis partiels | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------|-----------|------------|-------------------------|-----------|
| | 50 ^e percentile | | 75 ^e percentile | | 90 ^e percentile | | 95 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à | | de | à |
| nombre | | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 6 ^E | 4 | 8 | 18 | 15 | 21 | 25 | 24 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 12 à 19 ans | 24 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 20 à 39 ans | 23 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 40 à 59 ans | F | ... | ... | 24 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 60 à 69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 6 | 23 | 19 | 27 | 25 | 25 | 25 |
| 6 à 69 ans | 15 | 13 | 17 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 5 ^E | 2 | 8 | 15 | 11 | 19 | 25 | 23 | 27 | 25 | 25 | 25 |
| 12 à 19 ans | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 20 à 39 ans | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 40 à 59 ans | 20 | 17 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 60 à 69 ans | 0 | 0 | 0 | F | ... | ... | 25 | 24 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 6 à 69 ans | 22 | 20 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 7 ^E | 4 | 10 | 20 | 17 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 12 à 19 ans | 22 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 20 à 39 ans | 15 | 11 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 40 à 59 ans | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 60 à 69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | ... | ... | 23 | 19 | 27 |
| 6 à 69 ans | 6^E | 3 | 9 | 23 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)
^F trop peu fiable pour être publié (données avec un coefficient de variation (CV) de plus de 33,3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage)
Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 69 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1).
Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 9
Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives aux redressements assis partiels, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

| | Normes relatives aux redressements assis partiels | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|------------|------------------|-------------------------|-------------|--|
| | À améliorer | | | Acceptable | | | Bien | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | |
| | | de | à | | de | à | | de | à | |
| pourcentage | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | |
| 15 à 19 ans | 20,9 | 16,7 | 25,0 | 8,6 ^E | 4,9 | 12,3 | 7,6 ^E | 4,9 | 10,3 | |
| 20 à 39 ans | 26,8 | 22,8 | 30,7 | 5,5 ^E | 3,5 | 7,5 | 8,1 | 6,3 | 9,8 | |
| 40 à 59 ans | 47,8 | 43,3 | 52,4 | 6,5 ^E | 4,2 | 8,8 | 7,2 | 5,0 | 9,4 | |
| 60 à 69 ans | 79,4 | 73,5 | 85,2 | 1,6 ^E | 0,8 | 2,4 | 2,9 ^E | 1,4 | 4,4 | |
| 15 à 69 ans | 41,0 | 37,7 | 44,2 | 5,7 | 4,7 | 6,8 | 7,1 | 5,8 | 8,3 | |
| Hommes | | | | | | | | | | |
| 15 à 19 ans | 12,2 ^E | 7,9 | 16,6 | 8,0 ^E | 4,6 | 11,4 | F | ... | ... | |
| 20 à 39 ans | 14,7 | 10,2 | 19,2 | 3,9 ^E | 2,0 | 5,8 | 6,5 ^E | 4,1 | 8,9 | |
| 40 à 59 ans | 34,2 | 28,5 | 39,8 | F | ... | ... | 5,0 ^E | 2,8 | 7,2 | |
| 60 à 69 ans | 73,9 | 67,8 | 79,9 | F | ... | ... | 2,8 ^E | 1,1 | 4,5 | |
| 15 à 69 ans | 29,5 | 25,6 | 33,4 | 4,3^E | 2,6 | 6,1 | 5,4 | 3,9 | 6,9 | |
| Femmes | | | | | | | | | | |
| 15 à 19 ans | 28,7 | 21,4 | 36,0 | 9,2 ^E | 4,5 | 13,9 | 9,1 | 6,6 | 11,6 | |
| 20 à 39 ans | 39,0 | 33,5 | 44,5 | 7,2 ^E | 3,6 | 10,7 | 9,6 | 6,6 | 12,7 | |
| 40 à 59 ans | 61,8 | 54,6 | 69,1 | 8,1 | 5,6 | 10,6 | 9,5 | 6,5 | 12,5 | |
| 60 à 69 ans | 85,1 | 77,8 | 92,4 | 2,0 ^E | 0,8 | 3,3 | F | ... | ... | |
| 15 à 69 ans | 52,5 | 48,5 | 56,6 | 7,1 | 5,8 | 8,4 | 8,7 | 7,0 | 10,4 | |

| | Normes relatives aux redressements assis partiels | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| | Très bien | | | Excellent | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à |
| pourcentage | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | |
| 15 à 19 ans | 12,6 | 9,9 | 15,3 | 50,3 | 43,5 | 57,1 |
| 20 à 39 ans | 16,5 | 14,6 | 18,3 | 43,2 | 39,0 | 47,4 |
| 40 à 59 ans | 13,5 | 10,1 | 16,9 | 24,9 | 22,7 | 27,1 |
| 60 à 69 ans | 8,3 ^E | 5,2 | 11,4 | 7,8 ^E | 5,1 | 10,5 |
| 15 à 69 ans | 14,0 | 12,0 | 16,0 | 32,3 | 29,6 | 34,9 |
| Hommes | | | | | | |
| 15 à 19 ans | 9,8 ^E | 6,4 | 13,3 | 63,9 | 57,9 | 69,9 |
| 20 à 39 ans | 19,5 | 14,5 | 24,5 | 55,5 | 49,2 | 61,7 |
| 40 à 59 ans | 19,8 | 14,5 | 25,1 | 36,0 | 33,2 | 38,8 |
| 60 à 69 ans | 10,4 | 7,4 | 13,4 | 11,7 ^E | 7,7 | 15,7 |
| 15 à 69 ans | 17,7 | 14,2 | 21,2 | 43,0 | 39,9 | 46,2 |
| Femmes | | | | | | |
| 15 à 19 ans | 15,0 | 11,0 | 19,0 | 38,0 | 26,0 | 50,0 |
| 20 à 39 ans | 13,5 | 10,7 | 16,2 | 30,8 | 26,1 | 35,4 |
| 40 à 59 ans | 7,1 ^E | 3,9 | 10,3 | 13,5 | 10,3 | 16,7 |
| 60 à 69 ans | F | ... | ... | 3,7 ^E | 1,7 | 5,8 |
| 15 à 69 ans | 10,2 | 8,5 | 12,0 | 21,4 | 18,6 | 24,1 |

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

^F trop peu fiable pour être publié (données avec un coefficient de variation (CV) de plus de 33,3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage)

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de Société canadienne de physiologie de l'exercice, 2004, Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (Guide du conseiller CPHV), 3e édition, Ottawa.

Population à domicile âgée de 15 à 69 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 10
Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives à la santé du dos, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2007 à 2009

| | Normes relatives à la santé du dos | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| | À améliorer | | | Acceptable | | | Bien | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à |
| pourcentage | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | |
| 15 à 19 ans | 6,2 ^E | 3,7 | 8,7 | 11,4 | 7,9 | 15,0 | 21,1 | 17,4 | 24,7 |
| 20 à 39 ans | 11,9 | 8,8 | 15,0 | 13,9 | 11,0 | 16,8 | 18,8 | 14,6 | 23,0 |
| 40 à 59 ans | 18,3 | 13,9 | 22,8 | 19,8 | 16,8 | 22,9 | 22,2 | 18,7 | 25,8 |
| 60 à 69 ans | 29,4 | 26,3 | 32,5 | 32,1 | 26,9 | 37,2 | 19,0 | 15,5 | 22,5 |
| 15 à 69 ans | 16,3 | 13,8 | 18,9 | 18,5 | 16,7 | 20,4 | 20,4 | 18,3 | 22,6 |
| Hommes | | | | | | | | | |
| 15 à 19 ans | F | ... | ... | 9,7 ^E | 6,2 | 13,2 | 28,7 | 22,5 | 34,9 |
| 20 à 39 ans | 6,6 ^E | 3,0 | 10,1 | 14,9 | 11,9 | 18,0 | 20,8 | 14,8 | 26,8 |
| 40 à 59 ans | 13,8 | 10,5 | 17,1 | 20,0 | 15,0 | 25,0 | 23,5 | 18,2 | 28,7 |
| 60 à 69 ans | 28,0 | 23,2 | 32,8 | 32,4 | 25,7 | 39,1 | 20,7 | 15,4 | 25,9 |
| 15 à 69 ans | 12,0 | 9,9 | 14,1 | 18,8 | 16,7 | 21,0 | 22,5 | 19,4 | 25,6 |
| Femmes | | | | | | | | | |
| 15 à 19 ans | 8,8 ^E | 5,2 | 12,4 | 12,9 ^E | 5,4 | 20,5 | 14,3 ^E | 8,5 | 20,2 |
| 20 à 39 ans | 17,4 | 13,5 | 21,4 | 12,8 | 8,9 | 16,8 | 16,7 | 11,8 | 21,5 |
| 40 à 59 ans | 22,8 ^E | 15,0 | 30,5 | 19,7 | 14,2 | 25,1 | 21,0 | 17,2 | 24,8 |
| 60 à 69 ans | 30,7 | 24,6 | 36,8 | 31,7 | 25,7 | 37,8 | 17,5 | 13,0 | 21,9 |
| 15 à 69 ans | 20,6 | 16,2 | 25,0 | 18,2 | 14,6 | 21,8 | 18,3 | 15,5 | 21,2 |

| | Normes relatives à la santé du dos | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| | Très bien | | | Excellent | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à |
| pourcentage | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | |
| 15 à 19 ans | 47,4 | 43,0 | 51,9 | 13,9 | 9,5 | 18,3 |
| 20 à 39 ans | 38,8 | 35,7 | 41,9 | 16,6 | 13,9 | 19,3 |
| 40 à 59 ans | 27,0 | 22,3 | 31,6 | 12,7 | 10,7 | 14,6 |
| 60 à 69 ans | 14,4 | 10,6 | 18,2 | 5,1 ^E | 3,3 | 6,8 |
| 15 à 69 ans | 31,5 | 29,0 | 34,0 | 13,2 | 12,0 | 14,5 |
| Hommes | | | | | | |
| 15 à 19 ans | 51,1 | 44,9 | 57,3 | 7,3 ^E | 3,3 | 11,3 |
| 20 à 39 ans | 41,0 | 36,2 | 45,8 | 16,7 | 13,6 | 19,8 |
| 40 à 59 ans | 25,5 | 19,8 | 31,3 | 17,2 | 14,0 | 20,4 |
| 60 à 69 ans | 13,8 | 9,8 | 17,8 | 5,1 ^E | 3,3 | 6,8 |
| 15 à 69 ans | 32,0 | 29,4 | 34,6 | 14,6 | 13,3 | 16,0 |
| Femmes | | | | | | |
| 15 à 19 ans | 44,2 | 37,3 | 51,2 | 19,7 ^E | 13,2 | 26,2 |
| 20 à 39 ans | 36,5 | 32,2 | 40,9 | 16,5 | 13,3 | 19,7 |
| 40 à 59 ans | 28,4 | 22,3 | 34,5 | 8,2 ^E | 5,4 | 10,9 |
| 60 à 69 ans | 15,0 ^E | 9,9 | 20,1 | 5,1 ^E | 2,2 | 8,0 |
| 15 à 69 ans | 31,0 | 26,4 | 35,5 | 11,8 | 10,1 | 13,6 |

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

^F trop peu fiable pour être publié (données avec un coefficient de variation (CV) de plus de 33,3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage)

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de Société canadienne de physiologie de l'exercice, 2004, Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (Guide du conseiller CPHV), 3e édition, Ottawa.

Population à domicile âgée de 15 à 69 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 11
Mesure de la flexion du tronc effectuée par la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

| | Mesure de la flexion du tronc | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| | Moyenne | | 5 ^e percentile | | 10 ^e percentile | | 25 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance |
| | | de à | | de à | | de à | | de à | | de à | | de à |
| centimètres | | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 26,5 | 25,9 | 27,1 | 12,8 | 11,7 | 13,9 | 15,7 | 14,8 | 16,6 | 21,0 | 19,9 | 22,1 |
| 12 à 19 ans | 25,7 | 25,0 | 26,4 | 8,7 | 7,5 | 9,9 | 12,8 | 12,0 | 13,6 | 18,0 | 16,6 | 19,4 |
| 20 à 39 ans | 28,0 | 27,3 | 28,6 | 11,0 | 9,7 | 12,3 | 14,0 | 12,3 | 15,7 | 21,1 | 20,3 | 21,9 |
| 40 à 59 ans | 27,0 | 26,0 | 27,9 | 8,4 | 6,6 | 10,2 | 12,2 | 9,7 | 14,7 | 20,2 | 19,0 | 21,4 |
| 60 à 69 ans | 22,2 | 21,1 | 23,2 | 4,5 ^E | 1,6 | 7,4 | 8,5 | 6,4 | 10,6 | 14,4 | 13,2 | 15,6 |
| 6 à 69 ans | 26,6 | 26,2 | 26,9 | 9,0 | 7,7 | 10,3 | 12,4 | 11,4 | 13,4 | 20,0 | 19,5 | 20,5 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 24,2 | 23,1 | 25,2 | 11,1 | 9,3 | 12,9 | 14,3 | 12,0 | 16,6 | 18,7 | 17,8 | 19,6 |
| 12 à 19 ans | 22,2 | 21,3 | 23,2 | 8,3 | 7,1 | 9,5 | 10,8 | 9,2 | 12,4 | 15,7 | 14,4 | 17,0 |
| 20 à 39 ans | 25,4 | 24,2 | 26,6 | 9,0 | 6,2 | 11,8 | 12,1 | 10,5 | 13,7 | 18,4 | 16,3 | 20,5 |
| 40 à 59 ans | 25,1 | 24,1 | 26,1 | 7,1 | 5,4 | 8,8 | 10,6 | 8,6 | 12,6 | 18,7 | 17,2 | 20,2 |
| 60 à 69 ans | 17,4 | 16,2 | 18,5 | 0,0 | -1,5 | 1,5 | 4,6 ^E | 2,0 | 7,2 | 10,0 | 8,5 | 11,5 |
| 6 à 69 ans | 23,9 | 23,4 | 24,4 | 7,1 | 5,9 | 8,3 | 10,2 | 9,0 | 11,4 | 17,0 | 15,9 | 18,1 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 29,0 | 28,3 | 29,6 | 14,2 | 13,4 | 15,0 | 18,4 | 15,7 | 21,1 | 24,9 | 23,6 | 26,2 |
| 12 à 19 ans | 29,5 | 27,9 | 31,1 | 12,0 | 8,2 | 15,8 | 15,3 | 12,9 | 17,7 | 23,3 | 20,7 | 25,9 |
| 20 à 39 ans | 30,6 | 30,2 | 31,1 | 14,4 | 13,3 | 15,5 | 17,7 | 15,3 | 20,1 | 25,5 | 24,3 | 26,7 |
| 40 à 59 ans | 28,7 | 27,2 | 30,3 | 10,4 | 7,3 | 13,5 | 14,7 ^E | 9,8 | 19,6 | 23,4 | 21,5 | 25,3 |
| 60 à 69 ans | 26,9 | 25,6 | 28,2 | 12,3 | 11,0 | 13,6 | 14,4 | 13,2 | 15,6 | 21,4 | 19,9 | 22,9 |
| 6 à 69 ans | 29,3 | 28,6 | 29,9 | 12,2 | 10,4 | 14,0 | 15,9 | 14,4 | 17,4 | 24,0 | 23,1 | 24,9 |

| | Mesure de la flexion du tronc | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| | 50 ^e percentile | | 75 ^e percentile | | 90 ^e percentile | | 95 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance |
| | | de à | | de à | | de à | | de à | | de à | | de à |
| centimètres | | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 27,2 | 26,6 | 27,8 | 32,0 | 31,4 | 32,6 | 36,4 | 35,5 | 37,3 | 38,4 | 37,3 | 39,5 |
| 12 à 19 ans | 25,5 | 24,7 | 26,3 | 32,7 | 31,0 | 34,4 | 39,0 | 37,5 | 40,5 | 43,0 | 41,5 | 44,5 |
| 20 à 39 ans | 28,2 | 27,7 | 28,7 | 35,4 | 34,7 | 36,1 | 40,9 | 39,2 | 42,6 | 43,7 | 42,4 | 45,0 |
| 40 à 59 ans | 27,7 | 26,8 | 28,6 | 34,1 | 33,4 | 34,8 | 39,0 | 37,9 | 40,1 | 42,3 | 40,4 | 44,2 |
| 60 à 69 ans | 22,6 | 21,1 | 24,1 | 29,7 | 28,4 | 31,0 | 35,5 | 33,6 | 37,4 | 38,7 | 37,1 | 40,3 |
| 6 à 69 ans | 27,2 | 26,8 | 27,6 | 33,6 | 33,2 | 34,0 | 39,2 | 38,7 | 39,7 | 42,6 | 42,0 | 43,2 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 25,2 | 23,7 | 26,7 | 29,7 | 28,7 | 30,7 | 33,3 | 32,4 | 34,2 | 35,2 | 33,6 | 36,8 |
| 12 à 19 ans | 23,1 | 21,7 | 24,5 | 28,6 | 27,3 | 29,9 | 33,8 | 32,4 | 35,2 | 36,6 | 35,0 | 38,2 |
| 20 à 39 ans | 25,4 | 23,8 | 27,0 | 32,4 | 31,3 | 33,5 | 39,2 | 37,0 | 41,4 | 43,1 | 41,1 | 45,1 |
| 40 à 59 ans | 25,2 | 24,0 | 26,4 | 32,9 | 31,3 | 34,5 | 37,6 | 35,4 | 39,8 | 41,9 | 37,7 | 46,1 |
| 60 à 69 ans | 17,6 | 15,8 | 19,4 | 24,2 | 22,7 | 25,7 | 29,1 | 27,1 | 31,1 | 33,7 | 31,0 | 36,4 |
| 6 à 69 ans | 24,2 | 23,6 | 24,8 | 30,9 | 30,5 | 31,3 | 36,3 | 35,4 | 37,2 | 40,6 | 39,2 | 42,0 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 29,4 | 28,1 | 30,7 | 34,2 | 33,3 | 35,1 | 38,2 | 37,1 | 39,3 | 40,7 | 39,2 | 42,2 |
| 12 à 19 ans | 28,9 | 26,6 | 31,2 | 37,4 | 35,4 | 39,4 | 43,0 | 41,3 | 44,7 | 47,0 | 44,5 | 49,5 |
| 20 à 39 ans | 30,6 | 29,8 | 31,4 | 36,9 | 36,4 | 37,4 | 42,3 | 41,3 | 43,3 | 45,2 | 43,9 | 46,5 |
| 40 à 59 ans | 29,8 | 28,4 | 31,2 | 35,2 | 34,0 | 36,4 | 39,6 | 38,5 | 40,7 | 42,6 | 40,9 | 44,3 |
| 60 à 69 ans | 27,7 | 25,8 | 29,6 | 33,5 | 31,4 | 35,6 | 38,5 | 36,6 | 40,4 | 40,9 | 38,8 | 43,0 |
| 6 à 69 ans | 29,7 | 28,9 | 30,5 | 36,0 | 35,3 | 36,7 | 40,7 | 39,8 | 41,6 | 43,3 | 42,6 | 44,0 |

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 69 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 12
Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives à la flexion du tronc, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2007 à 2009

| | Normes relatives à la flexion du tronc | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | À améliorer | | | Acceptable | | | Bien | | | pourcentage |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | |
| | | de | à | | de | à | | de | à | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | |
| 15 à 19 ans | 47,5 | 40,4 | 54,5 | 15,7 | 13,4 | 18,0 | 14,9 | 11,9 | 17,8 | |
| 20 à 39 ans | 37,3 | 34,1 | 40,4 | 20,7 | 17,3 | 24,1 | 16,0 | 13,1 | 18,9 | |
| 40 à 59 ans | 24,2 | 19,8 | 28,5 | 20,4 | 17,0 | 23,8 | 19,5 | 15,6 | 23,4 | |
| 60 à 69 ans | 35,1 | 30,4 | 39,7 | 16,6 | 14,1 | 19,2 | 18,4 | 15,3 | 21,6 | |
| 15 à 69 ans | 32,6 | 30,2 | 35,0 | 19,6 | 17,7 | 21,5 | 17,6 | 16,1 | 19,1 | |
| Hommes | | | | | | | | | | |
| 15 à 19 ans | 48,5 | 41,9 | 55,1 | 19,6 | 13,3 | 25,8 | 18,5 | 12,5 | 24,5 | |
| 20 à 39 ans | 42,6 | 37,1 | 48,0 | 18,1 | 14,2 | 22,0 | 16,5 | 11,8 | 21,2 | |
| 40 à 59 ans | 20,0 | 15,9 | 24,1 | 21,9 | 17,8 | 26,0 | 18,8 | 15,3 | 22,3 | |
| 60 à 69 ans | 40,7 | 35,7 | 45,6 | 16,7 | 13,3 | 20,0 | 18,8 | 14,4 | 23,1 | |
| 15 à 69 ans | 33,7 | 30,8 | 36,7 | 19,6 | 17,4 | 21,7 | 17,9 | 15,5 | 20,3 | |
| Femmes | | | | | | | | | | |
| 15 à 19 ans | 46,5 | 34,8 | 58,3 | 12,2 | 9,1 | 15,3 | 11,6 ^E | 7,7 | 15,5 | |
| 20 à 39 ans | 31,8 | 27,8 | 35,7 | 23,4 | 17,8 | 29,1 | 15,5 | 12,0 | 19,0 | |
| 40 à 59 ans | 28,2 | 21,7 | 34,8 | 18,9 | 14,2 | 23,6 | 20,2 | 14,2 | 26,2 | |
| 60 à 69 ans | 29,5 | 21,6 | 37,5 | 16,6 | 12,6 | 20,6 | 18,1 | 13,6 | 22,5 | |
| 15 à 69 ans | 31,4 | 27,4 | 35,4 | 19,7 | 16,9 | 22,5 | 17,4 | 14,9 | 19,9 | |

| | Normes relatives à la flexion du tronc | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| | Très bien | | | Excellent | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à |
| | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | |
| 15 à 19 ans | 12,6 | 8,5 | 16,7 | 9,4 | 6,6 | 12,1 |
| 20 à 39 ans | 13,2 | 11,1 | 15,4 | 12,8 | 10,3 | 15,3 |
| 40 à 59 ans | 19,1 | 16,9 | 21,2 | 16,8 | 14,2 | 19,5 |
| 60 à 69 ans | 16,4 | 13,1 | 19,7 | 13,4 | 10,3 | 16,5 |
| 15 à 69 ans | 16,0 | 14,4 | 17,5 | 14,2 | 12,8 | 15,7 |
| Hommes | | | | | | |
| 15 à 19 ans | 8,5 ^E | 4,0 | 13,1 | 4,9 ^E | 2,9 | 6,9 |
| 20 à 39 ans | 11,5 | 7,8 | 15,3 | 11,3 | 8,4 | 14,3 |
| 40 à 59 ans | 20,9 | 16,9 | 24,9 | 18,5 | 14,9 | 22,1 |
| 60 à 69 ans | 17,7 | 12,1 | 23,3 | 6,2 ^E | 3,5 | 8,9 |
| 15 à 69 ans | 15,8 | 13,2 | 18,5 | 13,0 | 11,1 | 14,9 |
| Femmes | | | | | | |
| 15 à 19 ans | 16,3 ^E | 9,5 | 23,0 | 13,4 ^E | 8,1 | 18,6 |
| 20 à 39 ans | 14,9 | 11,3 | 18,5 | 14,4 | 11,3 | 17,5 |
| 40 à 59 ans | 17,3 | 13,7 | 21,0 | 15,3 | 11,8 | 18,7 |
| 60 à 69 ans | 15,2 | 11,7 | 18,8 | 20,5 ^E | 13,8 | 27,3 |
| 15 à 69 ans | 16,1 | 13,5 | 18,7 | 15,4 | 12,9 | 17,9 |

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de Société canadienne de physiologie de l'exercice, 2004, Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (Guide du conseiller CPHV), 3e édition, Ottawa.

Population à domicile âgée de 15 à 69 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 13

Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives aux aptitudes musculosquelettiques, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

| | Normes relatives aux aptitudes musculosquelettiques | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|
| | À améliorer | | | Acceptable | | | Bien | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à |
| pourcentage | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | |
| 15 à 19 ans | 14,4 ^E | 9,3 | 19,5 | 31,8 | 28,1 | 35,6 | 29,4 | 22,9 | 35,8 |
| 20 à 39 ans | 10,6 | 8,3 | 13,0 | 30,0 | 26,3 | 33,8 | 30,1 | 26,6 | 33,5 |
| 40 à 59 ans | 11,0 | 8,8 | 13,2 | 25,1 | 20,7 | 29,4 | 33,0 | 29,0 | 37,1 |
| 60 à 69 ans | 17,3 | 13,5 | 21,0 | 31,6 | 27,7 | 35,6 | 31,7 | 27,3 | 36,1 |
| 15 à 69 ans | 12,0 | 10,0 | 14,0 | 28,4 | 25,8 | 31,0 | 31,4 | 29,2 | 33,7 |
| Hommes | | | | | | | | | |
| 15 à 19 ans | 9,8 ^E | 4,5 | 15,1 | 35,9 | 28,9 | 43,0 | 29,7 | 20,8 | 38,7 |
| 20 à 39 ans | 4,2 ^E | 2,5 | 5,8 | 26,2 | 21,3 | 31,1 | 32,1 | 26,1 | 38,1 |
| 40 à 59 ans | 5,3 ^E | 3,0 | 7,6 | 23,9 | 18,8 | 28,9 | 29,6 | 23,6 | 35,6 |
| 60 à 69 ans | 16,3 | 11,9 | 20,7 | 44,3 | 36,7 | 51,8 | 25,0 | 18,7 | 31,2 |
| 15 à 69 ans | 6,6 | 5,1 | 8,2 | 28,4 | 25,0 | 31,7 | 30,0 | 27,4 | 32,5 |
| Femmes | | | | | | | | | |
| 15 à 19 ans | 18,5 ^E | 12,5 | 24,5 | 28,2 | 20,1 | 36,2 | 29,0 | 20,1 | 38,0 |
| 20 à 39 ans | 17,2 | 12,7 | 21,6 | 33,9 | 29,0 | 38,9 | 28,0 | 23,1 | 32,9 |
| 40 à 59 ans | 16,7 | 11,7 | 21,6 | 26,2 | 21,5 | 30,9 | 36,4 | 31,7 | 41,2 |
| 60 à 69 ans | 18,1 | 13,2 | 23,1 | 19,8 | 14,5 | 25,0 | 38,0 | 33,1 | 42,9 |
| 15 à 69 ans | 17,2 | 13,3 | 21,1 | 28,4 | 25,7 | 31,1 | 32,9 | 29,9 | 35,8 |

| | Normes relatives aux aptitudes musculosquelettiques | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|-------------|------------------|-------------------------|------------|
| | Très bien | | | Excellent | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à |
| pourcentage | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | |
| 15 à 19 ans | 19,1 | 15,0 | 23,2 | 5,3 ^E | 2,7 | 7,9 |
| 20 à 39 ans | 23,3 | 20,8 | 25,7 | 6,0 | 4,2 | 7,8 |
| 40 à 59 ans | 22,7 | 20,0 | 25,4 | 8,2 | 6,5 | 9,9 |
| 60 à 69 ans | 15,8 | 12,6 | 18,9 | 3,7 | 2,9 | 4,4 |
| 15 à 69 ans | 21,7 | 20,2 | 23,2 | 6,5 | 5,8 | 7,3 |
| Hommes | | | | | | |
| 15 à 19 ans | 20,0 | 15,0 | 25,1 | 4,5 ^E | 1,8 | 7,2 |
| 20 à 39 ans | 30,5 | 25,2 | 35,8 | 7,0 ^E | 3,9 | 10,2 |
| 40 à 59 ans | 28,6 | 24,1 | 33,2 | 12,6 | 9,1 | 16,2 |
| 60 à 69 ans | 11,1 ^E | 6,2 | 16,0 | 3,3 ^E | 1,4 | 5,2 |
| 15 à 69 ans | 26,4 | 23,5 | 29,3 | 8,6 | 7,3 | 9,9 |
| Femmes | | | | | | |
| 15 à 19 ans | 18,3 | 12,8 | 23,8 | 6,0 ^E | 2,6 | 9,4 |
| 20 à 39 ans | 15,9 | 13,1 | 18,7 | 4,9 ^E | 2,5 | 7,3 |
| 40 à 59 ans | 16,8 | 12,7 | 21,0 | 3,9 ^E | 1,8 | 6,0 |
| 60 à 69 ans | 20,2 ^E | 13,6 | 26,7 | 4,0 ^E | 2,0 | 6,0 |
| 15 à 69 ans | 17,1 | 14,9 | 19,3 | 4,5 | 3,5 | 5,4 |

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)**Note(s)** : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de Société canadienne de physiologie de l'exercice, 2004, Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (Guide du conseiller CPHV), 3e édition, Ottawa.

Population à domicile âgée de 15 à 69 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 14
Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives à l'aptitude aérobie, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2007 à 2009

| | Normes relatives à l'aptitude aérobie | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------------------|-------------|
| | À améliorer | | | Acceptable | | | Bien | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à |
| pourcentage | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | |
| 15 à 19 ans | 9,3 ^E | 5,8 | 12,7 | 15,9 | 11,9 | 19,9 | 43,1 | 36,2 | 50,1 |
| 20 à 39 ans | 13,7 | 9,9 | 17,5 | 28,2 | 23,6 | 32,8 | 33,0 | 29,1 | 37,0 |
| 40 à 59 ans | 14,6 | 12,5 | 16,7 | 29,2 | 25,6 | 32,9 | 29,8 | 25,3 | 34,3 |
| 60 à 69 ans | 40,0 | 32,6 | 47,3 | 35,8 | 28,9 | 42,7 | 19,3 | 15,8 | 22,9 |
| 15 à 69 ans | 15,6 | 13,2 | 18,0 | 28,0 | 25,0 | 31,0 | 31,7 | 28,6 | 34,7 |
| Hommes | | | | | | | | | |
| 15 à 19 ans | F | ... | ... | 22,3 | 16,8 | 27,9 | 30,6 | 23,6 | 37,6 |
| 20 à 39 ans | 12,0 ^E | 7,6 | 16,4 | 34,2 | 26,0 | 42,4 | 26,3 | 19,7 | 33,0 |
| 40 à 59 ans | 11,2 ^E | 6,9 | 15,4 | 20,9 | 17,5 | 24,2 | 39,5 | 31,8 | 47,2 |
| 60 à 69 ans | 22,8 ^E | 13,4 | 32,1 | 36,5 | 27,1 | 45,9 | 30,8 | 23,8 | 37,7 |
| 15 à 69 ans | 12,2 | 9,9 | 14,6 | 28,1 | 23,9 | 32,3 | 32,2 | 27,3 | 37,1 |
| Femmes | | | | | | | | | |
| 15 à 19 ans | 9,2 ^E | 5,0 | 13,4 | F | ... | ... | 54,1 | 46,6 | 61,6 |
| 20 à 39 ans | 15,5 ^E | 10,2 | 20,8 | 21,7 | 18,3 | 25,1 | 40,3 | 36,5 | 44,0 |
| 40 à 59 ans | 18,1 | 13,8 | 22,4 | 37,6 | 32,1 | 43,2 | 20,0 | 16,2 | 23,8 |
| 60 à 69 ans | 56,5 | 48,4 | 64,6 | 35,2 | 25,4 | 44,9 | 8,3 ^E | 4,5 | 12,1 |
| 15 à 69 ans | 19,1 | 15,9 | 22,2 | 27,9 | 24,9 | 30,9 | 31,1 | 28,3 | 33,9 |

| | Normes relatives à l'aptitude aérobie | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| | Très bien | | | Excellent | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à |
| pourcentage | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | |
| 15 à 19 ans | 22,7 | 18,6 | 26,9 | 9,0 ^E | 5,6 | 12,3 |
| 20 à 39 ans | 17,6 | 13,6 | 21,6 | 7,5 ^E | 4,2 | 10,9 |
| 40 à 59 ans | 19,7 | 16,4 | 23,0 | 6,6 | 4,8 | 8,5 |
| 60 à 69 ans | 4,1 ^E | 1,8 | 6,4 | F | ... | ... |
| 15 à 69 ans | 17,9 | 15,2 | 20,6 | 6,8 | 5,1 | 8,5 |
| Hommes | | | | | | |
| 15 à 19 ans | 24,9 | 20,6 | 29,1 | 12,9 ^E | 7,9 | 17,9 |
| 20 à 39 ans | 17,4 ^E | 10,4 | 24,3 | 10,1 ^E | 5,0 | 15,1 |
| 40 à 59 ans | 20,8 | 15,4 | 26,2 | 7,6 ^E | 4,4 | 10,8 |
| 60 à 69 ans | 8,4 ^E | 3,6 | 13,2 | F | ... | ... |
| 15 à 69 ans | 18,7 | 14,5 | 22,9 | 8,7^E | 5,8 | 11,6 |
| Femmes | | | | | | |
| 15 à 19 ans | 20,9 | 15,0 | 26,8 | 5,5 ^E | 2,0 | 9,0 |
| 20 à 39 ans | 17,8 | 13,1 | 22,5 | 4,8 ^E | 2,7 | 6,9 |
| 40 à 59 ans | 18,6 | 15,9 | 21,3 | 5,7 ^E | 3,3 | 8,0 |
| 60 à 69 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 à 69 ans | 17,1 | 14,1 | 20,1 | 4,8^E | 3,2 | 6,5 |

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

F trop peu fiable pour être publié (données avec un coefficient de variation (CV) de plus de 33,3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage et habitudes de vie (Guide du conseiller CPHV), 3e édition, Ottawa.

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de Société canadienne de physiologie de l'exercice, 2004, Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (Guide du conseiller CPHV), 3e édition, Ottawa.

Population à domicile âgée de 15 à 69 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 15
Circonférence de la taille mesurée de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

| | Circonférence de la taille mesurée | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|
| | Moyenne | | 5 ^e percentile | | 10 ^e percentile | | 25 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à | | de | à |
| centimètres | | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 60,8 | 60,1 | 61,5 | 49,3 | 48,0 | 50,6 | 51,2 | 50,1 | 52,3 | 54,0 | 53,2 | 54,8 |
| 12 à 19 ans | 76,2 | 74,4 | 77,9 | 61,3 | 60,5 | 62,1 | 63,1 | 62,2 | 64,0 | 67,4 | 66,5 | 68,3 |
| 20 à 39 ans | 86,9 | 85,5 | 88,4 | 67,0 | 65,2 | 68,8 | 70,2 | 68,7 | 71,7 | 76,1 | 74,6 | 77,6 |
| 40 à 59 ans | 93,4 | 91,9 | 94,9 | 70,4 | 68,5 | 72,3 | 75,0 | 73,6 | 76,4 | 82,9 | 81,6 | 84,2 |
| 60 à 79 ans | 97,6 | 96,2 | 98,9 | 74,9 | 73,6 | 76,2 | 79,7 | 77,8 | 81,6 | 87,5 | 85,5 | 89,5 |
| 6 à 79 ans | 87,7 | 86,5 | 88,9 | 60,7 | 59,9 | 61,5 | 66,7 | 65,9 | 67,5 | 75,2 | 74,2 | 76,2 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 61,3 | 60,1 | 62,5 | 50,2 | 48,5 | 51,9 | 51,5 | 50,0 | 53,0 | 54,6 | 53,6 | 55,6 |
| 12 à 19 ans | 77,5 | 75,2 | 79,8 | 61,5 | 59,1 | 63,9 | 64,1 | 62,7 | 65,5 | 67,8 | 66,2 | 69,4 |
| 20 à 39 ans | 90,7 | 89,7 | 91,7 | 72,0 | 70,1 | 73,9 | 75,1 | 73,5 | 76,7 | 80,6 | 78,7 | 82,5 |
| 40 à 59 ans | 98,7 | 96,8 | 100,7 | 80,9 | 78,9 | 82,9 | 84,0 | 82,2 | 85,8 | 90,9 | 88,4 | 93,4 |
| 60 à 79 ans | 102,5 | 101,0 | 104,0 | 83,0 | 80,7 | 85,3 | 87,5 | 85,7 | 89,3 | 94,1 | 91,6 | 96,6 |
| 6 à 79 ans | 91,5 | 90,4 | 92,6 | 61,2 | 60,1 | 62,3 | 68,8 | 67,7 | 69,9 | 80,3 | 79,0 | 81,6 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 60,3 | 59,2 | 61,4 | 48,7 | 47,3 | 50,1 | 50,7 | 49,5 | 51,9 | 53,2 | 52,4 | 54,0 |
| 12 à 19 ans | 74,8 | 73,0 | 76,5 | 61,0 | 60,3 | 61,7 | 62,5 | 61,4 | 63,6 | 67,4 | 66,2 | 68,6 |
| 20 à 39 ans | 82,9 | 80,7 | 85,1 | 64,9 | 63,3 | 66,5 | 67,2 | 65,3 | 69,1 | 72,3 | 70,3 | 74,3 |
| 40 à 59 ans | 88,1 | 86,1 | 90,1 | 68,1 | 66,8 | 69,4 | 70,5 | 68,4 | 72,6 | 76,7 | 75,2 | 78,2 |
| 60 à 79 ans | 93,0 | 91,1 | 95,0 | 72,7 | 71,3 | 74,1 | 76,0 | 74,1 | 77,9 | 82,8 | 80,9 | 84,7 |
| 6 à 79 ans | 83,9 | 82,2 | 85,6 | 60,0 | 59,3 | 60,7 | 65,3 | 64,4 | 66,2 | 72,5 | 71,0 | 74,0 |

| | Circonférence de la taille mesurée | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | 50 ^e percentile | | 75 ^e percentile | | 90 ^e percentile | | 95 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à | | de | à |
| centimètres | | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 58,7 | 57,9 | 59,5 | 65,7 | 64,5 | 66,9 | 74,2 | 71,5 | 76,9 | 81,5 | 78,0 | 85,0 |
| 12 à 19 ans | 73,0 | 71,4 | 74,6 | 81,6 | 78,2 | 85,0 | 93,3 | 88,2 | 98,4 | 102,2 | 97,4 | 107,0 |
| 20 à 39 ans | 84,5 | 82,5 | 86,5 | 96,0 | 92,6 | 99,4 | 105,5 | 103,3 | 107,7 | 113,6 | 111,0 | 116,2 |
| 40 à 59 ans | 92,9 | 91,2 | 94,6 | 102,5 | 100,7 | 104,3 | 112,6 | 109,2 | 116,0 | 119,0 | 115,5 | 122,5 |
| 60 à 79 ans | 96,4 | 94,8 | 98,0 | 107,2 | 105,5 | 108,9 | 115,6 | 114,2 | 117,0 | 121,5 | 118,7 | 124,3 |
| 6 à 79 ans | 87,0 | 85,7 | 88,3 | 99,4 | 97,6 | 101,2 | 110,0 | 108,4 | 111,6 | 116,2 | 114,2 | 118,2 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 59,4 | 57,9 | 60,9 | 66,0 | 64,6 | 67,4 | 74,4 | 71,6 | 77,2 | 81,2 | 77,9 | 84,5 |
| 12 à 19 ans | 74,3 | 72,6 | 76,0 | 85,1 | 81,2 | 89,0 | 96,6 | 89,6 | 103,6 | 103,1 | 97,2 | 109,0 |
| 20 à 39 ans | 89,0 | 87,0 | 91,0 | 99,5 | 97,8 | 101,2 | 108,0 | 104,9 | 111,1 | 115,7 | 111,3 | 120,1 |
| 40 à 59 ans | 97,5 | 95,7 | 99,3 | 104,3 | 102,3 | 106,3 | 114,0 | 110,7 | 117,3 | 122,5 | 118,3 | 126,7 |
| 60 à 79 ans | 101,0 | 98,6 | 103,4 | 110,6 | 109,3 | 111,9 | 118,1 | 116,9 | 119,3 | 124,0 | 120,2 | 127,8 |
| 6 à 79 ans | 92,4 | 90,9 | 93,9 | 102,3 | 100,7 | 103,9 | 112,4 | 110,4 | 114,4 | 118,9 | 117,6 | 120,2 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 57,4 | 56,5 | 58,3 | 65,0 | 63,2 | 66,8 | 73,8 | 68,6 | 79,0 | 81,8 | 74,6 | 89,0 |
| 12 à 19 ans | 72,2 | 70,8 | 73,6 | 79,1 | 74,3 | 83,9 | 91,6 | 87,4 | 95,8 | 101,2 | 93,3 | 109,1 |
| 20 à 39 ans | 79,1 | 75,9 | 82,3 | 90,7 | 86,8 | 94,6 | 103,7 | 101,5 | 105,9 | 110,2 | 105,5 | 114,9 |
| 40 à 59 ans | 85,6 | 83,4 | 87,8 | 97,5 | 94,0 | 101,0 | 110,5 | 104,2 | 116,8 | 116,2 | 111,3 | 121,1 |
| 60 à 79 ans | 92,0 | 89,7 | 94,3 | 101,0 | 97,5 | 104,5 | 111,4 | 109,0 | 113,8 | 117,4 | 111,1 | 123,7 |
| 6 à 79 ans | 81,9 | 80,0 | 83,8 | 94,2 | 91,4 | 97,0 | 105,8 | 102,2 | 109,4 | 113,0 | 110,2 | 115,8 |

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 16
Circonférence des hanches mesurée de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

| | Circonférence des hanches mesurée | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| | Moyenne | | 5 ^e percentile | | 10 ^e percentile | | 25 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance |
| | | de à | | de à | | de à | | de à | | de à | | de à |
| centimètres | | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 73,2 | 72,3 | 74,2 | 59,5 | 58,0 | 61,0 | 61,7 | 60,5 | 62,9 | 66,0 | 64,8 | 67,2 |
| 12 à 19 ans | 94,7 | 93,4 | 96,0 | 78,0 | 77,1 | 78,9 | 82,1 | 80,4 | 83,8 | 87,6 | 86,9 | 88,3 |
| 20 à 39 ans | 102,7 | 101,5 | 103,8 | 88,5 | 87,4 | 89,6 | 90,8 | 89,3 | 92,3 | 95,5 | 94,3 | 96,7 |
| 40 à 59 ans | 104,3 | 103,3 | 105,3 | 90,4 | 89,7 | 91,1 | 93,0 | 92,1 | 93,9 | 97,0 | 95,8 | 98,2 |
| 60 à 79 ans | 105,1 | 104,3 | 105,9 | 91,0 | 89,9 | 92,1 | 93,5 | 92,8 | 94,2 | 98,0 | 97,1 | 98,9 |
| 6 à 79 ans | 100,5 | 99,7 | 101,4 | 75,5 | 74,5 | 76,5 | 86,2 | 85,6 | 86,8 | 93,8 | 93,2 | 94,4 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 73,2 | 71,5 | 74,9 | 59,6 | 57,8 | 61,4 | 61,5 | 60,2 | 62,8 | 66,2 | 64,4 | 68,0 |
| 12 à 19 ans | 93,7 | 91,9 | 95,5 | 77,3 | 76,1 | 78,5 | 79,4 | 76,6 | 82,2 | 86,3 | 85,3 | 87,3 |
| 20 à 39 ans | 102,2 | 101,5 | 103,0 | 89,7 | 88,6 | 90,8 | 91,6 | 89,7 | 93,5 | 96,0 | 95,0 | 97,0 |
| 40 à 59 ans | 103,5 | 102,5 | 104,6 | 92,4 | 91,5 | 93,3 | 94,0 | 92,9 | 95,1 | 98,0 | 96,6 | 99,4 |
| 60 à 79 ans | 103,7 | 102,6 | 104,7 | 89,9 | 88,3 | 91,5 | 93,3 | 91,8 | 94,8 | 97,8 | 96,8 | 98,8 |
| 6 à 79 ans | 99,7 | 98,9 | 100,5 | 75,3 | 73,3 | 77,3 | 85,3 | 84,5 | 86,1 | 94,0 | 93,2 | 94,8 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 73,3 | 72,3 | 74,2 | 59,5 | 58,0 | 61,0 | 62,0 | 60,5 | 63,5 | 65,6 | 64,6 | 66,6 |
| 12 à 19 ans | 95,9 | 94,8 | 96,9 | 80,6 | 77,9 | 83,3 | 84,1 | 82,6 | 85,6 | 89,3 | 88,5 | 90,1 |
| 20 à 39 ans | 103,1 | 101,3 | 105,0 | 87,6 | 86,3 | 88,9 | 89,7 | 87,9 | 91,5 | 94,5 | 92,9 | 96,1 |
| 40 à 59 ans | 105,1 | 103,5 | 106,6 | 89,4 | 88,8 | 90,0 | 91,4 | 90,0 | 92,8 | 96,2 | 94,9 | 97,5 |
| 60 à 79 ans | 106,4 | 105,1 | 107,6 | 91,5 | 90,9 | 92,1 | 93,8 | 93,0 | 94,6 | 98,5 | 96,9 | 100,1 |
| 6 à 79 ans | 101,4 | 100,2 | 102,5 | 76,0 | 75,1 | 76,9 | 86,9 | 86,4 | 87,4 | 93,6 | 92,9 | 94,3 |

| | Circonférence des hanches mesurée | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| | 50 ^e percentile | | 75 ^e percentile | | 90 ^e percentile | | 95 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance |
| | | de à | | de à | | de à | | de à | | de à | | de à |
| centimètres | | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 72,1 | 70,8 | 73,4 | 79,5 | 78,2 | 80,8 | 86,6 | 85,2 | 88,0 | 90,7 | 88,7 | 92,7 |
| 12 à 19 ans | 93,1 | 91,9 | 94,3 | 100,9 | 98,5 | 103,3 | 108,5 | 104,7 | 112,3 | 115,9 | 113,2 | 118,6 |
| 20 à 39 ans | 100,6 | 99,3 | 101,9 | 108,1 | 106,5 | 109,7 | 117,5 | 114,4 | 120,6 | 122,8 | 118,7 | 126,9 |
| 40 à 59 ans | 102,8 | 102,0 | 103,6 | 109,3 | 108,0 | 110,6 | 117,7 | 115,0 | 120,4 | 126,0 | 123,1 | 128,9 |
| 60 à 79 ans | 103,5 | 102,2 | 104,8 | 110,0 | 108,6 | 111,4 | 118,7 | 116,3 | 121,1 | 125,1 | 120,9 | 129,3 |
| 6 à 79 ans | 100,4 | 99,5 | 101,3 | 107,7 | 106,7 | 108,7 | 115,9 | 114,3 | 117,5 | 122,6 | 120,2 | 125,0 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 72,4 | 70,4 | 74,4 | 79,5 | 77,4 | 81,6 | 85,5 | 83,4 | 87,6 | 89,5 | 88,1 | 90,9 |
| 12 à 19 ans | 92,0 | 90,9 | 93,1 | 100,1 | 96,6 | 103,6 | 108,5 | 103,0 | 114,0 | 115,5 | 110,8 | 120,2 |
| 20 à 39 ans | 101,0 | 99,6 | 102,4 | 107,5 | 106,0 | 109,0 | 113,8 | 111,3 | 116,3 | 118,9 | 115,9 | 121,9 |
| 40 à 59 ans | 102,7 | 101,8 | 103,6 | 107,8 | 106,2 | 109,4 | 113,6 | 111,3 | 115,9 | 117,7 | 115,0 | 120,4 |
| 60 à 79 ans | 102,5 | 101,3 | 103,7 | 108,3 | 107,3 | 109,3 | 114,5 | 113,1 | 115,9 | 120,4 | 116,1 | 124,7 |
| 6 à 79 ans | 100,5 | 99,4 | 101,6 | 106,8 | 106,0 | 107,6 | 113,0 | 111,3 | 114,7 | 117,5 | 116,1 | 118,9 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 71,9 | 70,5 | 73,3 | 79,0 | 77,0 | 81,0 | 87,0 | 84,8 | 89,2 | 92,3 | 89,0 | 95,6 |
| 12 à 19 ans | 94,7 | 93,0 | 96,4 | 101,8 | 99,7 | 103,9 | 109,4 | 106,1 | 112,7 | 116,5 | 113,9 | 119,1 |
| 20 à 39 ans | 100,1 | 98,4 | 101,8 | 108,5 | 105,4 | 111,6 | 121,2 | 116,8 | 125,6 | 127,8 | 122,9 | 132,7 |
| 40 à 59 ans | 103,0 | 101,7 | 104,3 | 111,0 | 108,9 | 113,1 | 122,2 | 116,6 | 127,8 | 129,0 | 126,2 | 131,8 |
| 60 à 79 ans | 104,2 | 102,3 | 106,1 | 112,8 | 111,2 | 114,4 | 120,5 | 116,8 | 124,2 | 129,0 | 124,7 | 133,3 |
| 6 à 79 ans | 100,3 | 99,3 | 101,3 | 108,7 | 106,8 | 110,6 | 119,7 | 117,3 | 122,1 | 127,1 | 125,0 | 129,2 |

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 17
Ratio de la taille aux hanches mesuré de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

| | Ratio de la taille aux hanches mesuré | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|
| | Moyenne | | 5 ^e percentile | | 10 ^e percentile | | 25 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à | | de | à |
| | ratio | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,79 | 0,78 | 0,80 |
| 12 à 19 ans | 0,80 | 0,79 | 0,81 | 0,71 | 0,70 | 0,72 | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0,76 | 0,75 | 0,77 |
| 20 à 39 ans | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0,74 | 0,72 | 0,76 | 0,78 | 0,77 | 0,79 |
| 40 à 59 ans | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0,83 | 0,82 | 0,84 |
| 60 à 79 ans | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0,78 | 0,77 | 0,79 | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0,86 | 0,85 | 0,87 |
| 6 à 79 ans | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0,80 | 0,79 | 0,81 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 0,84 | 0,83 | 0,84 | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0,80 | 0,79 | 0,81 |
| 12 à 19 ans | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,78 | 0,77 | 0,79 |
| 20 à 39 ans | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,78 | 0,76 | 0,80 | 0,79 | 0,77 | 0,81 | 0,83 | 0,82 | 0,84 |
| 40 à 59 ans | 0,95 | 0,94 | 0,96 | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0,90 | 0,89 | 0,91 |
| 60 à 79 ans | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 0,88 | 0,86 | 0,90 | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0,94 | 0,92 | 0,96 |
| 6 à 79 ans | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,78 | 0,77 | 0,79 | 0,80 | 0,79 | 0,81 | 0,84 | 0,83 | 0,85 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 0,82 | 0,81 | 0,83 | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0,79 | 0,78 | 0,80 |
| 12 à 19 ans | 0,78 | 0,76 | 0,79 | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0,71 | 0,70 | 0,72 | 0,74 | 0,73 | 0,75 |
| 20 à 39 ans | 0,80 | 0,79 | 0,81 | 0,71 | 0,70 | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0,75 | 0,73 | 0,77 |
| 40 à 59 ans | 0,84 | 0,83 | 0,85 | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0,75 | 0,74 | 0,76 | 0,78 | 0,77 | 0,79 |
| 60 à 79 ans | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 0,78 | 0,77 | 0,79 | 0,82 | 0,81 | 0,83 |
| 6 à 79 ans | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0,77 | 0,76 | 0,78 |

| | Ratio de la taille aux hanches mesuré | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|
| | 50 ^e percentile | | 75 ^e percentile | | 90 ^e percentile | | 95 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à | | de | à |
| | ratio | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0,93 | 0,91 | 0,95 |
| 12 à 19 ans | 0,79 | 0,78 | 0,80 | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0,88 | 0,86 | 0,90 | 0,92 | 0,90 | 0,94 |
| 20 à 39 ans | 0,84 | 0,83 | 0,85 | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0,95 | 0,94 | 0,96 | 0,99 | 0,98 | 1,00 |
| 40 à 59 ans | 0,89 | 0,88 | 0,90 | 0,96 | 0,95 | 0,97 | 1,01 | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,03 | 1,05 |
| 60 à 79 ans | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 1,04 | 1,02 | 1,06 | 1,08 | 1,06 | 1,10 |
| 6 à 79 ans | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 1,03 | 1,02 | 1,04 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0,91 | 0,89 | 0,93 | 0,93 | 0,91 | 0,95 |
| 12 à 19 ans | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0,85 | 0,83 | 0,87 | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0,92 | 0,89 | 0,95 |
| 20 à 39 ans | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0,98 | 0,97 | 0,99 | 1,01 | 1,00 | 1,02 |
| 40 à 59 ans | 0,95 | 0,94 | 0,96 | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 1,04 | 1,02 | 1,06 | 1,06 | 1,04 | 1,08 |
| 60 à 79 ans | 0,98 | 0,97 | 0,99 | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1,08 | 1,06 | 1,10 | 1,10 | 1,09 | 1,11 |
| 6 à 79 ans | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 1,02 | 1,01 | 1,03 | 1,06 | 1,05 | 1,07 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0,85 | 0,83 | 0,87 | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0,92 | 0,90 | 0,94 |
| 12 à 19 ans | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0,81 | 0,79 | 0,83 | 0,86 | 0,84 | 0,88 | 0,90 | 0,86 | 0,94 |
| 20 à 39 ans | 0,79 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0,89 | 0,88 | 0,90 | 0,94 | 0,92 | 0,96 |
| 40 à 59 ans | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0,93 | 0,91 | 0,95 | 0,97 | 0,95 | 0,99 |
| 60 à 79 ans | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0,92 | 0,90 | 0,94 | 0,96 | 0,95 | 0,97 | 0,99 | 0,97 | 1,01 |
| 6 à 79 ans | 0,82 | 0,81 | 0,83 | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 0,95 | 0,97 |

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 18
Distribution de la population à domicile dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30 kg/m², selon la mesure moyenne du pli cutané du biceps, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

| | Mesure moyenne du pli cutané du biceps | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|
| | Moyenne | | 5 ^e percentile | | 10 ^e percentile | | 25 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à | | de | à |
| millimètres | | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 6,4 | 6,2 | 6,7 | 3,0 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 4,0 | 4,4 |
| 12 à 19 ans | 6,7 | 6,4 | 7,0 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 4,1 | 3,9 | 4,3 |
| 20 à 39 ans | 6,4 | 6,1 | 6,7 | 3,0 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 3,8 | 3,6 | 4,0 |
| 40 à 59 ans | 7,6 | 7,2 | 8,0 | 3,0 | 2,7 | 3,3 | 3,5 | 3,2 | 3,8 | 4,6 | 4,3 | 4,9 |
| 60 à 79 ans | 8,0 | 7,6 | 8,4 | 3,2 | 3,0 | 3,4 | 3,7 | 3,5 | 3,9 | 5,0 | 4,6 | 5,4 |
| 6 à 79 ans | 7,1 | 6,9 | 7,3 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 4,3 | 4,2 | 4,4 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 6,2 | 5,8 | 6,5 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 3,4 | 3,7 | 3,4 | 4,0 |
| 12 à 19 ans | 5,6 | 5,4 | 5,8 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 3,6 |
| 20 à 39 ans | 4,9 | 4,6 | 5,1 | 2,7 | 2,5 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,2 | 3,6 |
| 40 à 59 ans | 5,4 | 5,1 | 5,8 | 2,7 | 2,5 | 2,9 | 3,1 | 2,8 | 3,4 | 3,9 | 3,6 | 4,2 |
| 60 à 79 ans | 5,5 | 5,2 | 5,8 | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 3,4 | 4,0 | 3,8 | 4,2 |
| 6 à 79 ans | 5,4 | 5,2 | 5,5 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 3,7 | 3,6 | 3,8 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 6,7 | 6,5 | 6,9 | 3,4 | 3,1 | 3,7 | 3,8 | 3,5 | 4,1 | 4,6 | 4,4 | 4,8 |
| 12 à 19 ans | 7,8 | 7,4 | 8,3 | 4,1 | 3,9 | 4,3 | 4,4 | 4,0 | 4,8 | 5,5 | 5,1 | 5,9 |
| 20 à 39 ans | 8,1 | 7,5 | 8,7 | 3,5 | 3,2 | 3,8 | 4,0 | 3,4 | 4,6 | 5,1 | 4,5 | 5,7 |
| 40 à 59 ans | 9,7 | 9,2 | 10,2 | 3,8 | 3,2 | 4,4 | 4,7 | 4,0 | 5,4 | 6,3 | 5,5 | 7,1 |
| 60 à 79 ans | 10,3 | 9,7 | 10,8 | 4,7 | 4,0 | 5,4 | 5,9 | 5,2 | 6,6 | 7,3 | 6,9 | 7,7 |
| 6 à 79 ans | 8,8 | 8,5 | 9,1 | 3,6 | 3,4 | 3,8 | 4,4 | 4,2 | 4,6 | 5,6 | 5,3 | 5,9 |

| | Mesure moyenne du pli cutané du biceps | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|
| | 50 ^e percentile | | 75 ^e percentile | | 90 ^e percentile | | 95 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à | | de | à |
| millimètres | | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 5,5 | 5,2 | 5,8 | 8,0 | 7,5 | 8,5 | 10,9 | 10,2 | 11,6 | 12,7 | 12,1 | 13,3 |
| 12 à 19 ans | 5,9 | 5,5 | 6,3 | 8,1 | 7,7 | 8,5 | 11,1 | 10,1 | 12,1 | 13,8 | 12,4 | 15,2 |
| 20 à 39 ans | 5,4 | 5,1 | 5,7 | 8,0 | 7,4 | 8,6 | 11,1 | 10,3 | 11,9 | 13,7 | 12,6 | 14,8 |
| 40 à 59 ans | 6,6 | 6,0 | 7,2 | 9,8 | 8,9 | 10,7 | 13,6 | 13,1 | 14,1 | 15,2 | 14,5 | 15,9 |
| 60 à 79 ans | 7,0 | 6,7 | 7,3 | 10,0 | 9,4 | 10,6 | 13,6 | 12,1 | 15,1 | 16,5 | 14,8 | 18,2 |
| 6 à 79 ans | 6,1 | 5,8 | 6,4 | 8,7 | 8,3 | 9,1 | 12,4 | 12,0 | 12,8 | 14,9 | 14,3 | 15,5 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 7,6 | 6,9 | 8,3 | 10,7 | 10,1 | 11,3 | 13,7 | 12,1 | 15,3 |
| 12 à 19 ans | 4,5 | 4,1 | 4,9 | 6,6 | 5,9 | 7,3 | 10,0 | 9,1 | 10,9 | 11,4 | 10,4 | 12,4 |
| 20 à 39 ans | 4,3 | 4,0 | 4,6 | 5,8 | 5,4 | 6,2 | 7,3 | 6,3 | 8,3 | 9,1 | 7,6 | 10,6 |
| 40 à 59 ans | 4,9 | 4,6 | 5,2 | 6,6 | 6,0 | 7,2 | 8,2 | 7,3 | 9,1 | 9,8 | 8,7 | 10,9 |
| 60 à 79 ans | 5,2 | 4,8 | 5,6 | 6,8 | 6,3 | 7,3 | 8,1 | 7,4 | 8,8 | 9,1 | 8,5 | 9,7 |
| 6 à 79 ans | 4,7 | 4,5 | 4,9 | 6,5 | 6,2 | 6,8 | 8,4 | 7,9 | 8,9 | 10,0 | 9,7 | 10,3 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 5,9 | 5,5 | 6,3 | 8,3 | 7,8 | 8,8 | 11,3 | 10,4 | 12,2 | 12,3 | 11,7 | 12,9 |
| 12 à 19 ans | 7,2 | 6,8 | 7,6 | 8,9 | 8,3 | 9,5 | 12,4 | 10,2 | 14,6 | 15,2 | 13,9 | 16,5 |
| 20 à 39 ans | 7,6 | 6,6 | 8,6 | 10,3 | 9,4 | 11,2 | 13,7 | 12,6 | 14,8 | 16,6 | 15,3 | 17,9 |
| 40 à 59 ans | 8,8 | 8,0 | 9,6 | 13,0 | 12,2 | 13,8 | 15,2 | 14,5 | 15,9 | 16,6 | 15,9 | 17,3 |
| 60 à 79 ans | 9,8 | 9,2 | 10,4 | 12,1 | 10,8 | 13,4 | 16,1 | 14,4 | 17,8 | 17,6 | 16,0 | 19,2 |
| 6 à 79 ans | 8,0 | 7,7 | 8,3 | 11,2 | 10,7 | 11,7 | 14,6 | 13,9 | 15,3 | 16,4 | 15,7 | 17,1 |

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30 kg/m², sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 19

Distribution de la population à domicile dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30 kg/m², selon la mesure moyenne du pli cutané du triceps, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

| | Mesure moyenne du pli cutané du triceps | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|
| | Moyenne | | 5 ^e percentile | | 10 ^e percentile | | 25 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à | | de | à |
| millimètres | | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 12,4 | 12,0 | 12,7 | 6,6 | 6,4 | 6,8 | 7,3 | 7,0 | 7,6 | 8,6 | 8,2 | 9,0 |
| 12 à 19 ans | 13,9 | 13,4 | 14,4 | 5,7 | 5,3 | 6,1 | 6,6 | 6,2 | 7,0 | 8,7 | 8,2 | 9,2 |
| 20 à 39 ans | 14,3 | 13,8 | 14,9 | 5,4 | 5,0 | 5,8 | 6,5 | 5,9 | 7,1 | 9,2 | 8,4 | 10,0 |
| 40 à 59 ans | 16,0 | 15,3 | 16,6 | 5,9 | 5,4 | 6,4 | 7,5 | 6,7 | 8,3 | 10,2 | 9,3 | 11,1 |
| 60 à 79 ans | 16,0 | 15,4 | 16,6 | 6,7 | 6,5 | 6,9 | 7,4 | 7,1 | 7,7 | 10,1 | 9,4 | 10,8 |
| 6 à 79 ans | 14,9 | 14,5 | 15,2 | 5,9 | 5,7 | 6,1 | 7,0 | 6,7 | 7,3 | 9,4 | 9,0 | 9,8 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 11,9 | 11,3 | 12,4 | 6,4 | 6,2 | 6,6 | 6,8 | 6,4 | 7,2 | 8,1 | 7,8 | 8,4 |
| 12 à 19 ans | 11,1 | 10,6 | 11,6 | 5,1 | 4,5 | 5,7 | 5,7 | 5,3 | 6,1 | 7,0 | 6,5 | 7,5 |
| 20 à 39 ans | 10,3 | 9,8 | 10,8 | 4,8 | 4,6 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 7,2 | 6,5 | 7,9 |
| 40 à 59 ans | 10,9 | 10,1 | 11,7 | 5,4 | 5,0 | 5,8 | 5,9 | 5,4 | 6,4 | 8,0 | 7,1 | 8,9 |
| 60 à 79 ans | 10,5 | 10,1 | 11,0 | 5,4 | 4,8 | 6,0 | 6,7 | 6,5 | 6,9 | 7,6 | 7,1 | 8,1 |
| 6 à 79 ans | 10,8 | 10,4 | 11,1 | 5,2 | 5,0 | 5,4 | 5,9 | 5,6 | 6,2 | 7,6 | 7,2 | 8,0 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 12,9 | 12,5 | 13,3 | 7,1 | 6,7 | 7,5 | 8,0 | 7,7 | 8,3 | 9,6 | 9,1 | 10,1 |
| 12 à 19 ans | 16,7 | 16,0 | 17,5 | 8,7 | 8,0 | 9,4 | 9,7 | 8,8 | 10,6 | 12,6 | 11,8 | 13,4 |
| 20 à 39 ans | 18,7 | 17,8 | 19,7 | 9,4 | 8,1 | 10,7 | 11,5 | 10,4 | 12,6 | 13,8 | 12,6 | 15,0 |
| 40 à 59 ans | 20,7 | 20,1 | 21,4 | 10,8 | 10,0 | 11,6 | 12,7 | 11,3 | 14,1 | 16,1 | 15,4 | 16,8 |
| 60 à 79 ans | 20,9 | 20,2 | 21,7 | 11,2 | 9,4 | 13,0 | 13,6 | 12,8 | 14,4 | 17,0 | 15,9 | 18,1 |
| 6 à 79 ans | 18,9 | 18,5 | 19,4 | 9,1 | 8,7 | 9,5 | 10,8 | 10,5 | 11,1 | 14,0 | 13,5 | 14,5 |

| | Mesure moyenne du pli cutané du triceps | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|
| | 50 ^e percentile | | 75 ^e percentile | | 90 ^e percentile | | 95 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à | | de | à |
| millimètres | | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 11,1 | 10,6 | 11,6 | 14,8 | 13,9 | 15,7 | 20,0 | 19,1 | 20,9 | 22,8 | 21,7 | 23,9 |
| 12 à 19 ans | 12,7 | 12,0 | 13,4 | 17,6 | 17,1 | 18,1 | 22,6 | 21,1 | 24,1 | 25,1 | 23,8 | 26,4 |
| 20 à 39 ans | 13,1 | 12,7 | 13,5 | 18,7 | 17,2 | 20,2 | 23,9 | 22,9 | 24,9 | 27,0 | 25,8 | 28,2 |
| 40 à 59 ans | 14,5 | 13,9 | 15,1 | 21,4 | 20,2 | 22,6 | 26,8 | 26,0 | 27,6 | 28,9 | 28,0 | 29,8 |
| 60 à 79 ans | 15,1 | 14,6 | 15,6 | 20,8 | 19,1 | 22,5 | 26,1 | 25,4 | 26,8 | 28,5 | 27,1 | 29,9 |
| 6 à 79 ans | 13,4 | 13,0 | 13,8 | 19,2 | 18,7 | 19,7 | 25,0 | 24,5 | 25,5 | 27,9 | 27,4 | 28,4 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 10,2 | 9,5 | 10,9 | 14,6 | 13,4 | 15,8 | 19,4 | 17,8 | 21,0 | 22,4 | 20,9 | 23,9 |
| 12 à 19 ans | 9,4 | 8,7 | 10,1 | 13,4 | 12,4 | 14,4 | 19,0 | 17,6 | 20,4 | 22,6 | 20,1 | 25,1 |
| 20 à 39 ans | 9,9 | 8,9 | 10,9 | 12,7 | 12,1 | 13,3 | 15,9 | 14,7 | 17,1 | 17,2 | 16,0 | 18,4 |
| 40 à 59 ans | 10,4 | 9,5 | 11,3 | 13,1 | 12,0 | 14,2 | 15,0 | 13,3 | 16,7 | 19,1 | 14,3 | 23,9 |
| 60 à 79 ans | 9,9 | 9,2 | 10,6 | 12,8 | 11,8 | 13,8 | 15,4 | 14,8 | 16,0 | 17,0 | 15,7 | 18,3 |
| 6 à 79 ans | 10,0 | 9,5 | 10,5 | 13,0 | 12,5 | 13,5 | 16,3 | 15,6 | 17,0 | 19,1 | 18,1 | 20,1 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 11,7 | 11,4 | 12,0 | 15,1 | 13,8 | 16,4 | 20,2 | 18,8 | 21,6 | 22,9 | 21,2 | 24,6 |
| 12 à 19 ans | 16,6 | 16,0 | 17,2 | 19,4 | 18,3 | 20,5 | 24,3 | 23,0 | 25,6 | 26,8 | 24,1 | 29,5 |
| 20 à 39 ans | 18,1 | 16,4 | 19,8 | 23,1 | 21,7 | 24,5 | 27,1 | 25,8 | 28,4 | 30,8 | 28,7 | 32,9 |
| 40 à 59 ans | 20,5 | 19,5 | 21,5 | 25,6 | 24,3 | 26,9 | 28,9 | 28,0 | 29,8 | 31,4 | 30,2 | 32,6 |
| 60 à 79 ans | 20,3 | 18,8 | 21,8 | 25,0 | 24,2 | 25,8 | 28,2 | 26,9 | 29,5 | 30,7 | 28,7 | 32,7 |
| 6 à 79 ans | 18,6 | 17,9 | 19,3 | 23,4 | 22,9 | 23,9 | 27,6 | 26,9 | 28,3 | 30,3 | 29,4 | 31,2 |

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30 kg/m², sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 20
Distribution de la population à domicile dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30 kg/m², selon la mesure moyenne du pli cutané sous-scapulaire, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

| | Mesure moyenne du pli cutané sous-scapulaire | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------|-------------|
| | Moyenne | | 5 ^e percentile | | 10 ^e percentile | | 25 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à | | de | à |
| millimètres | | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 8,4 | 8,1 | 8,8 | 4,1 | 3,9 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4,6 | 4,9 | 4,7 | 5,1 |
| 12 à 19 ans | 11,6 | 11,0 | 12,1 | 5,5 | 5,3 | 5,7 | 6,1 | 5,9 | 6,3 | 7,2 | 7,0 | 7,4 |
| 20 à 39 ans | 16,0 | 15,2 | 16,8 | 7,2 | 6,9 | 7,5 | 8,0 | 7,6 | 8,4 | 9,8 | 9,3 | 10,3 |
| 40 à 59 ans | 18,7 | 17,5 | 19,9 | 7,6 | 6,7 | 8,5 | 8,9 | 7,9 | 9,9 | 12,5 | 11,7 | 13,3 |
| 60 à 79 ans | 19,1 | 18,5 | 19,7 | 8,4 | 7,7 | 9,1 | 9,9 | 9,2 | 10,6 | 13,3 | 12,5 | 14,1 |
| 6 à 79 ans | 16,0 | 15,6 | 16,4 | 5,7 | 5,5 | 5,9 | 6,9 | 6,7 | 7,1 | 9,4 | 9,0 | 9,8 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 7,9 | 7,5 | 8,4 | 4,0 | 3,7 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 4,5 | 4,7 | 4,5 | 4,9 |
| 12 à 19 ans | 10,0 | 9,6 | 10,4 | 5,0 | 4,6 | 5,4 | 5,7 | 5,4 | 6,0 | 6,6 | 6,2 | 7,0 |
| 20 à 39 ans | 15,0 | 14,3 | 15,8 | 7,2 | 6,8 | 7,6 | 7,8 | 7,3 | 8,3 | 9,8 | 9,1 | 10,5 |
| 40 à 59 ans | 17,9 | 16,3 | 19,5 | 8,1 | 6,9 | 9,3 | 9,0 | 7,6 | 10,4 | 12,6 | 11,5 | 13,7 |
| 60 à 79 ans | 17,9 | 16,9 | 18,8 | 8,4 | 7,8 | 9,0 | 9,7 | 8,7 | 10,7 | 12,2 | 11,0 | 13,4 |
| 6 à 79 ans | 15,0 | 14,4 | 15,5 | 5,3 | 5,0 | 5,6 | 6,5 | 6,3 | 6,7 | 9,0 | 8,5 | 9,5 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 9,0 | 8,3 | 9,7 | 4,2 | 4,0 | 4,4 | 4,5 | 4,3 | 4,7 | 5,2 | 5,0 | 5,4 |
| 12 à 19 ans | 13,2 | 12,2 | 14,1 | 6,1 | 5,9 | 6,3 | 6,8 | 6,3 | 7,3 | 8,3 | 7,9 | 8,7 |
| 20 à 39 ans | 17,0 | 15,8 | 18,2 | 7,2 | 7,0 | 7,4 | 8,2 | 7,6 | 8,8 | 10,1 | 9,4 | 10,8 |
| 40 à 59 ans | 19,5 | 18,2 | 20,8 | 7,4 | 6,3 | 8,5 | 8,7 | 7,9 | 9,5 | 12,4 | 11,5 | 13,3 |
| 60 à 79 ans | 20,2 | 19,4 | 21,0 | 8,0 | 6,6 | 9,4 | 10,2 | 9,1 | 11,3 | 14,4 | 13,3 | 15,5 |
| 6 à 79 ans | 17,1 | 16,6 | 17,6 | 6,0 | 5,9 | 6,1 | 7,2 | 7,1 | 7,3 | 9,9 | 9,5 | 10,3 |

| | Mesure moyenne du pli cutané sous-scapulaire | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|
| | 50 ^e percentile | | 75 ^e percentile | | 90 ^e percentile | | 95 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à | | de | à |
| millimètres | | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 6,1 | 5,8 | 6,4 | 9,5 | 9,0 | 10,0 | 16,3 | 14,3 | 18,3 | 20,7 | 18,7 | 22,7 |
| 12 à 19 ans | 9,6 | 9,0 | 10,2 | 14,4 | 13,4 | 15,4 | 19,9 | 18,3 | 21,5 | 24,8 | 21,9 | 27,7 |
| 20 à 39 ans | 13,3 | 12,3 | 14,3 | 20,3 | 18,7 | 21,9 | 27,2 | 25,8 | 28,6 | 32,9 | 28,6 | 37,2 |
| 40 à 59 ans | 17,2 | 15,5 | 18,9 | 23,4 | 21,5 | 25,3 | 30,3 | 29,4 | 31,2 | 34,1 | 32,3 | 35,9 |
| 60 à 79 ans | 18,4 | 17,6 | 19,2 | 23,4 | 22,0 | 24,8 | 29,2 | 27,3 | 31,1 | 35,1 | 32,2 | 38,0 |
| 6 à 79 ans | 14,2 | 13,6 | 14,8 | 20,6 | 19,8 | 21,4 | 28,0 | 27,0 | 29,0 | 31,8 | 29,7 | 33,9 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 5,7 | 5,3 | 6,1 | 8,9 | 7,5 | 10,3 | 15,6 | 13,4 | 17,8 | 21,0 | 18,1 | 23,9 |
| 12 à 19 ans | 8,0 | 7,5 | 8,5 | 11,5 | 10,5 | 12,5 | 17,2 | 15,3 | 19,1 | 20,7 | 17,4 | 24,0 |
| 20 à 39 ans | 13,0 | 11,9 | 14,1 | 18,3 | 16,7 | 19,9 | 25,2 | 22,9 | 27,5 | 27,9 | 23,9 | 31,9 |
| 40 à 59 ans | 16,0 | 14,6 | 17,4 | 22,0 | 19,3 | 24,7 | 29,9 | 27,0 | 32,8 | 30,8 | 27,1 | 34,5 |
| 60 à 79 ans | 16,8 | 15,2 | 18,4 | 22,0 | 20,9 | 23,1 | 27,7 | 24,7 | 30,7 | 30,7 | 25,3 | 36,1 |
| 6 à 79 ans | 13,5 | 12,8 | 14,2 | 19,2 | 18,4 | 20,0 | 25,8 | 24,4 | 27,2 | 30,0 | 28,7 | 31,3 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 6,6 | 6,1 | 7,1 | 10,2 | 9,0 | 11,4 | 17,4 | 14,7 | 20,1 | 20,2 | 17,7 | 22,7 |
| 12 à 19 ans | 11,4 | 10,0 | 12,8 | 16,3 | 14,6 | 18,0 | 21,8 | 18,7 | 24,9 | 26,7 | 23,4 | 30,0 |
| 20 à 39 ans | 14,5 | 12,6 | 16,4 | 21,2 | 18,7 | 23,7 | 29,0 | 25,4 | 32,6 | 36,7 | 31,0 | 42,4 |
| 40 à 59 ans | 18,4 | 16,9 | 19,9 | 25,1 | 22,5 | 27,7 | 31,2 | 30,0 | 32,4 | 35,4 | 31,9 | 38,9 |
| 60 à 79 ans | 19,1 | 18,3 | 19,9 | 25,4 | 24,2 | 26,6 | 31,0 | 28,2 | 33,8 | 36,2 | 34,0 | 38,4 |
| 6 à 79 ans | 15,2 | 14,3 | 16,1 | 22,0 | 20,8 | 23,2 | 29,3 | 28,1 | 30,5 | 34,6 | 32,2 | 37,0 |

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30 kg/m², sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 21
Distribution de la population à domicile dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30 kg/m², selon la mesure moyenne du pli cutané de la crête iliaque, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

| | Mesure moyenne du pli cutané de la crête iliaque | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------------------|-------------|
| | Moyenne | | 5 ^e percentile | | 10 ^e percentile | | 25 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à | | de | à |
| millimètres | | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 11,6 | 10,7 | 12,5 | 4,0 | 3,8 | 4,2 | 4,5 | 4,3 | 4,7 | 5,4 | 5,1 | 5,7 |
| 12 à 19 ans | 17,5 | 16,5 | 18,4 | 6,0 | 5,6 | 6,4 | 7,2 | 6,7 | 7,7 | 9,1 | 8,4 | 9,8 |
| 20 à 39 ans | 21,6 | 20,9 | 22,2 | 8,2 | 7,4 | 9,0 | 9,8 | 8,8 | 10,8 | 13,9 | 12,8 | 15,0 |
| 40 à 59 ans | 22,3 | 21,2 | 23,5 | 9,0 | 8,3 | 9,7 | 10,5 | 9,5 | 11,5 | 15,6 | 14,2 | 17,0 |
| 60 à 79 ans | 19,5 | 18,8 | 20,2 | 8,1 | 6,8 | 9,4 | 9,8 | 8,7 | 10,9 | 14,1 | 13,7 | 14,5 |
| 6 à 79 ans | 20,0 | 19,6 | 20,5 | 6,4 | 6,1 | 6,7 | 7,9 | 7,7 | 8,1 | 12,5 | 11,8 | 13,2 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 11,1 | 9,8 | 12,3 | 3,9 | 3,7 | 4,1 | 4,3 | 4,0 | 4,6 | 5,2 | 4,9 | 5,5 |
| 12 à 19 ans | 14,2 | 13,6 | 14,8 | 5,6 | 5,4 | 5,8 | 6,1 | 5,6 | 6,6 | 7,7 | 7,1 | 8,3 |
| 20 à 39 ans | 21,7 | 20,8 | 22,6 | 7,4 | 6,5 | 8,3 | 9,3 | 8,3 | 10,3 | 13,3 | 11,4 | 15,2 |
| 40 à 59 ans | 23,0 | 21,4 | 24,5 | 9,0 | 7,9 | 10,1 | 11,3 | 9,4 | 13,2 | 15,7 | 13,6 | 17,8 |
| 60 à 79 ans | 19,2 | 18,4 | 20,1 | 7,7 | 6,3 | 9,1 | 9,8 | 8,3 | 11,3 | 14,0 | 12,9 | 15,1 |
| 6 à 79 ans | 19,7 | 19,1 | 20,4 | 5,7 | 5,3 | 6,1 | 7,2 | 6,9 | 7,5 | 11,1 | 10,0 | 12,2 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 12,2 | 11,1 | 13,2 | 4,4 | 4,1 | 4,7 | 4,8 | 4,5 | 5,1 | 6,2 | 5,8 | 6,6 |
| 12 à 19 ans | 20,9 | 19,4 | 22,3 | 7,8 | 6,8 | 8,8 | 9,6 | 8,9 | 10,3 | 13,2 | 11,8 | 14,6 |
| 20 à 39 ans | 21,4 | 20,3 | 22,5 | 8,6 | 7,3 | 9,9 | 10,7 | 9,0 | 12,4 | 14,1 | 12,6 | 15,6 |
| 40 à 59 ans | 21,7 | 20,3 | 23,1 | 8,7 | 7,4 | 10,0 | 10,4 | 9,2 | 11,6 | 15,6 | 14,2 | 17,0 |
| 60 à 79 ans | 19,7 | 18,8 | 20,7 | 8,4 | 6,5 | 10,3 | 9,9 | 8,3 | 11,5 | 14,1 | 13,2 | 15,0 |
| 6 à 79 ans | 20,3 | 19,8 | 20,8 | 7,1 | 6,8 | 7,4 | 8,9 | 8,4 | 9,4 | 13,5 | 12,9 | 14,1 |

| | Mesure moyenne du pli cutané de la crête iliaque | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|
| | 50 ^e percentile | | 75 ^e percentile | | 90 ^e percentile | | 95 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à | | de | à |
| millimètres | | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 7,9 | 7,1 | 8,7 | 15,1 | 13,0 | 17,2 | 24,5 | 21,8 | 27,2 | 30,3 | 27,6 | 33,0 |
| 12 à 19 ans | 15,2 | 13,9 | 16,5 | 23,8 | 22,4 | 25,2 | 31,2 | 29,4 | 33,0 | 36,8 | 33,3 | 40,3 |
| 20 à 39 ans | 20,6 | 19,5 | 21,7 | 27,9 | 26,7 | 29,1 | 34,3 | 32,7 | 35,9 | 38,5 | 36,8 | 40,2 |
| 40 à 59 ans | 21,0 | 19,4 | 22,6 | 27,9 | 26,4 | 29,4 | 34,8 | 33,3 | 36,3 | 38,5 | 37,1 | 39,9 |
| 60 à 79 ans | 19,1 | 18,3 | 19,9 | 24,1 | 22,9 | 25,3 | 29,2 | 26,9 | 31,5 | 31,8 | 29,3 | 34,3 |
| 6 à 79 ans | 19,3 | 18,6 | 20,0 | 26,2 | 25,5 | 26,9 | 33,1 | 32,3 | 33,9 | 38,1 | 36,9 | 39,3 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 6,8 | 6,0 | 7,6 | 13,4 | 9,7 | 17,1 | 25,4 | 22,4 | 28,4 | 31,1 | 26,8 | 35,4 |
| 12 à 19 ans | 10,2 | 9,0 | 11,4 | 18,1 | 15,6 | 20,6 | 27,6 | 26,0 | 29,2 | 34,6 | 31,2 | 38,0 |
| 20 à 39 ans | 20,6 | 18,9 | 22,3 | 28,2 | 26,3 | 30,1 | 34,3 | 30,2 | 38,4 | 40,5 | 35,3 | 45,7 |
| 40 à 59 ans | 21,8 | 20,0 | 23,6 | 28,5 | 26,1 | 30,9 | 36,1 | 33,3 | 38,9 | 40,2 | 37,0 | 43,4 |
| 60 à 79 ans | 18,9 | 17,8 | 20,0 | 23,4 | 22,2 | 24,6 | 27,8 | 25,6 | 30,0 | 31,1 | 28,8 | 33,4 |
| 6 à 79 ans | 18,7 | 17,9 | 19,5 | 26,2 | 25,1 | 27,3 | 33,2 | 32,0 | 34,4 | 38,5 | 37,0 | 40,0 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 9,0 | 8,2 | 9,8 | 15,7 | 14,2 | 17,2 | 23,9 | 20,0 | 27,8 | 29,6 | 24,4 | 34,8 |
| 12 à 19 ans | 19,6 | 18,0 | 21,2 | 26,6 | 23,5 | 29,7 | 33,1 | 29,4 | 36,8 | 39,6 | 35,2 | 44,0 |
| 20 à 39 ans | 20,5 | 19,1 | 21,9 | 27,3 | 25,6 | 29,0 | 34,3 | 32,6 | 36,0 | 36,6 | 35,2 | 38,0 |
| 40 à 59 ans | 20,4 | 18,9 | 21,9 | 27,6 | 25,4 | 29,8 | 34,1 | 32,3 | 35,9 | 38,1 | 35,9 | 40,3 |
| 60 à 79 ans | 19,3 | 18,2 | 20,4 | 24,3 | 23,0 | 25,6 | 29,9 | 27,1 | 32,7 | 32,3 | 28,9 | 35,7 |
| 6 à 79 ans | 19,7 | 19,1 | 20,3 | 26,1 | 25,1 | 27,1 | 32,8 | 31,7 | 33,9 | 36,7 | 35,4 | 38,0 |

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30 kg/m², sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 22
Distribution de la population à domicile dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30 kg/m², selon la mesure moyenne du pli cutané du mollet, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

| | Mesure moyenne du pli cutané du mollet | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | Moyenne | | 5 ^e percentile | | 10 ^e percentile | | 25 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | | | | |
| | | de à | | de à | | de à | | de à | | | | |
| | millimètres | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 11,9 | 11,3 | 12,4 | 5,2 | 4,7 | 5,7 | 6,0 | 5,7 | 6,3 | 7,7 | 7,3 | 8,1 |
| 12 à 19 ans | 14,0 | 13,3 | 14,7 | 5,2 | 4,7 | 5,7 | 6,1 | 5,7 | 6,5 | 8,7 | 7,9 | 9,5 |
| 20 à 39 ans | 13,1 | 12,5 | 13,6 | 4,6 | 4,2 | 5,0 | 5,5 | 5,2 | 5,8 | 7,5 | 7,2 | 7,8 |
| 40 à 59 ans | 14,2 | 13,6 | 14,9 | 4,8 | 4,3 | 5,3 | 6,0 | 5,3 | 6,7 | 8,2 | 7,4 | 9,0 |
| 60 à 79 ans | 15,4 | 14,7 | 16,1 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,7 | 5,3 | 6,1 | 8,0 | 7,5 | 8,5 |
| 6 à 79 ans | 13,8 | 13,4 | 14,2 | 4,8 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 5,5 | 6,1 | 7,9 | 7,6 | 8,2 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 11,4 | 10,6 | 12,1 | 4,8 | 4,2 | 5,4 | 5,6 | 5,2 | 6,0 | 7,2 | 6,6 | 7,8 |
| 12 à 19 ans | 11,3 | 10,6 | 11,9 | 4,5 | 4,1 | 4,9 | 5,2 | 4,7 | 5,7 | 6,7 | 6,3 | 7,1 |
| 20 à 39 ans | 9,5 | 8,9 | 10,0 | 4,1 | 3,7 | 4,5 | 4,7 | 4,3 | 5,1 | 6,0 | 5,5 | 6,5 |
| 40 à 59 ans | 9,8 | 9,1 | 10,6 | 4,3 | 4,0 | 4,6 | 4,9 | 4,4 | 5,4 | 6,7 | 6,0 | 7,4 |
| 60 à 79 ans | 8,8 | 8,4 | 9,2 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,1 | 4,9 | 6,0 | 5,6 | 6,4 |
| 6 à 79 ans | 9,9 | 9,6 | 10,2 | 4,2 | 4,0 | 4,4 | 4,9 | 4,6 | 5,2 | 6,3 | 5,9 | 6,7 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 12,4 | 11,7 | 13,1 | 5,8 | 5,3 | 6,3 | 6,7 | 6,0 | 7,4 | 8,3 | 8,0 | 8,6 |
| 12 à 19 ans | 16,8 | 15,8 | 17,8 | 7,8 | 7,0 | 8,6 | 9,0 | 8,4 | 9,6 | 12,0 | 11,0 | 13,0 |
| 20 à 39 ans | 17,0 | 15,9 | 18,0 | 7,4 | 7,1 | 7,7 | 8,4 | 7,4 | 9,4 | 11,5 | 10,3 | 12,7 |
| 40 à 59 ans | 18,4 | 17,6 | 19,2 | 7,6 | 6,8 | 8,4 | 9,4 | 7,9 | 10,9 | 12,6 | 11,9 | 13,3 |
| 60 à 79 ans | 21,6 | 20,4 | 22,8 | 10,6 | 9,4 | 11,8 | 12,5 | 11,7 | 13,3 | 15,7 | 14,6 | 16,8 |
| 6 à 79 ans | 17,7 | 17,2 | 18,2 | 7,4 | 7,2 | 7,6 | 8,6 | 8,0 | 9,2 | 12,0 | 11,4 | 12,6 |

| | Mesure moyenne du pli cutané du mollet | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 50 ^e percentile | | 75 ^e percentile | | 90 ^e percentile | | 95 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | | | | |
| | | de à | | de à | | de à | | de à | | | | |
| | millimètres | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 10,2 | 9,3 | 11,1 | 15,0 | 14,1 | 15,9 | 19,8 | 19,0 | 20,6 | 22,9 | 21,5 | 24,3 |
| 12 à 19 ans | 12,7 | 11,9 | 13,5 | 18,2 | 16,8 | 19,6 | 23,3 | 22,3 | 24,3 | 27,4 | 25,8 | 29,0 |
| 20 à 39 ans | 11,6 | 10,7 | 12,5 | 17,1 | 15,9 | 18,3 | 22,3 | 20,5 | 24,1 | 27,0 | 24,5 | 29,5 |
| 40 à 59 ans | 12,8 | 11,8 | 13,8 | 18,8 | 17,6 | 20,0 | 25,6 | 24,0 | 27,2 | 28,7 | 27,3 | 30,1 |
| 60 à 79 ans | 13,7 | 12,7 | 14,7 | 22,0 | 19,9 | 24,1 | 27,1 | 25,4 | 28,8 | 31,9 | 29,5 | 34,3 |
| 6 à 79 ans | 12,2 | 11,7 | 12,7 | 18,2 | 17,6 | 18,8 | 24,4 | 23,4 | 25,4 | 28,5 | 27,4 | 29,6 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 9,3 | 8,2 | 10,4 | 14,4 | 13,1 | 15,7 | 19,9 | 18,9 | 20,9 | 22,8 | 21,5 | 24,1 |
| 12 à 19 ans | 9,6 | 9,0 | 10,2 | 13,8 | 12,7 | 14,9 | 20,2 | 17,9 | 22,5 | 24,3 | 19,9 | 28,7 |
| 20 à 39 ans | 8,3 | 7,6 | 9,0 | 12,1 | 10,8 | 13,4 | 16,0 | 14,5 | 17,5 | 18,3 | 16,6 | 20,0 |
| 40 à 59 ans | 8,7 | 7,9 | 9,5 | 12,6 | 10,9 | 14,3 | 15,7 | 13,5 | 17,9 | 18,5 | 14,6 | 22,4 |
| 60 à 79 ans | 8,0 | 7,6 | 8,4 | 10,8 | 10,2 | 11,4 | 14,4 | 13,3 | 15,5 | 16,6 | 14,6 | 18,6 |
| 6 à 79 ans | 8,7 | 8,3 | 9,1 | 12,4 | 11,7 | 13,1 | 16,6 | 15,7 | 17,5 | 19,7 | 18,3 | 21,1 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 10,9 | 10,2 | 11,6 | 15,4 | 14,4 | 16,4 | 19,4 | 17,9 | 20,9 | 23,1 | 19,8 | 26,4 |
| 12 à 19 ans | 16,2 | 15,2 | 17,2 | 20,4 | 19,0 | 21,8 | 25,3 | 22,7 | 27,9 | 29,5 | 26,8 | 32,2 |
| 20 à 39 ans | 16,2 | 14,5 | 17,9 | 20,7 | 19,1 | 22,3 | 27,4 | 24,9 | 29,9 | 31,0 | 29,1 | 32,9 |
| 40 à 59 ans | 17,5 | 16,3 | 18,7 | 23,3 | 22,0 | 24,6 | 28,7 | 27,4 | 30,0 | 31,3 | 29,7 | 32,9 |
| 60 à 79 ans | 21,3 | 19,2 | 23,4 | 26,1 | 24,6 | 27,6 | 31,4 | 28,9 | 33,9 | 34,9 | 31,1 | 38,7 |
| 6 à 79 ans | 16,6 | 15,8 | 17,4 | 22,4 | 21,7 | 23,1 | 28,1 | 27,0 | 29,2 | 31,3 | 30,4 | 32,2 |

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30 kg/m², sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 23

Distribution de la population à domicile dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30 kg/m², selon la somme des mesures des cinq plis cutanés, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

| | La somme des mesures des cinq plis cutanés | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| | Moyenne | | 5 ^e percentile | | 10 ^e percentile | | 25 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance |
| | | de à | | de à | | de à | | de à | | de à | | de à |
| | millimètres | | | | | | | | | | | |
| Both sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 50,5 | 48,1 52,9 | 24,4 | 23,1 25,7 | 27,1 | 26,0 28,2 | 31,3 | 29,9 32,7 | 39,1 | 36,5 41,7 | 47,4 | 44,8 50,0 |
| 12 à 19 ans | 63,3 | 60,5 66,1 | 28,1 | 26,5 29,7 | 31,4 | 30,1 32,7 | 39,1 | 36,5 41,7 | 47,4 | 44,8 50,0 | 55,9 | 53,3 58,5 |
| 20 à 39 ans | 71,2 | 68,9 73,5 | 31,3 | 29,2 33,4 | 36,3 | 34,1 38,5 | 49,8 | 47,4 52,2 | 59,3 | 56,9 61,7 | 68,8 | 66,4 71,2 |
| 40 à 59 ans | 78,6 | 75,0 82,2 | 37,2 | 32,3 42,1 | 43,0 | 38,7 47,3 | 56,3 | 51,9 60,7 | 65,8 | 61,4 70,2 | 75,3 | 70,9 79,7 |
| 60 à 79 ans | 78,0 | 75,4 80,5 | 36,2 | 31,8 40,6 | 43,6 | 40,7 46,5 | 57,5 | 55,6 59,4 | 67,0 | 64,1 69,9 | 76,5 | 73,6 79,4 |
| 6 à 79 ans | 71,6 | 70,0 73,1 | 30,0 | 29,4 30,6 | 34,7 | 33,5 35,9 | 48,5 | 46,4 50,6 | 58,0 | 55,9 60,1 | 67,5 | 65,4 69,6 |
| Males | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 48,4 | 45,3 51,5 | 23,4 | 21,8 25,0 | 25,7 | 24,5 26,9 | 29,3 | 27,7 30,9 | 36,4 | 34,8 38,0 | 43,3 | 41,7 44,9 |
| 12 à 19 ans | 51,6 | 49,8 53,4 | 25,5 | 24,6 26,4 | 28,2 | 26,6 29,8 | 33,4 | 32,2 34,6 | 40,3 | 38,7 41,9 | 47,2 | 45,6 48,8 |
| 20 à 39 ans | 61,3 | 58,9 63,7 | 28,6 | 26,5 30,7 | 31,8 | 29,6 34,0 | 42,1 | 38,5 45,7 | 51,6 | 47,0 56,2 | 61,1 | 56,5 65,7 |
| 40 à 59 ans | 66,6 | 62,1 71,1 | 32,3 | 29,3 35,3 | 38,8 | 34,1 43,5 | 51,3 | 46,5 56,1 | 60,8 | 56,0 66,6 | 70,3 | 65,5 75,1 |
| 60 à 79 ans | 62,0 | 59,9 64,0 | 31,5 | 28,2 34,8 | 36,5 | 32,1 40,9 | 47,3 | 43,3 51,3 | 56,8 | 52,8 60,8 | 65,3 | 61,3 69,3 |
| 6 à 79 ans | 60,5 | 58,6 62,3 | 27,4 | 26,6 28,2 | 31,2 | 30,5 31,9 | 41,4 | 38,9 43,9 | 50,9 | 48,4 53,4 | 60,4 | 57,9 62,9 |
| Females | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 52,8 | 49,7 55,9 | 26,9 | 24,7 29,1 | 29,3 | 28,4 30,2 | 34,5 | 33,0 36,0 | 41,4 | 39,9 42,9 | 48,3 | 46,8 49,8 |
| 12 à 19 ans | 75,3 | 71,1 79,6 | 36,6 | 32,8 40,4 | 40,9 | 36,8 45,0 | 54,0 | 49,9 58,1 | 62,9 | 58,8 67,0 | 71,8 | 67,7 75,9 |
| 20 à 39 ans | 82,0 | 77,6 86,4 | 39,6 | 36,8 42,4 | 46,1 | 42,6 49,6 | 58,7 | 54,6 62,8 | 67,6 | 63,5 71,7 | 76,5 | 72,4 80,6 |
| 40 à 59 ans | 89,9 | 86,0 93,9 | 44,7 | 40,1 49,3 | 53,8 | 49,4 58,2 | 64,8 | 59,9 69,7 | 73,7 | 68,8 78,6 | 82,6 | 77,7 87,5 |
| 60 à 79 ans | 92,8 | 89,8 95,8 | 53,8 | 49,1 58,5 | 60,6 | 55,8 65,4 | 75,4 | 72,7 78,1 | 84,3 | 80,6 88,0 | 93,2 | 89,5 95,9 |
| 6 à 79 ans | 82,7 | 80,8 84,6 | 37,2 | 36,5 37,9 | 43,3 | 41,4 45,2 | 59,1 | 56,5 61,7 | 68,0 | 65,4 70,6 | 76,9 | 74,3 79,5 |

| | La somme des mesures des cinq plis cutanés | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| | 50 ^e percentile | | 75 ^e percentile | | 90 ^e percentile | | 95 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance |
| | | de à | | de à | | de à | | de à | | de à | | de à |
| | millimètres | | | | | | | | | | | |
| Both sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 41,2 | 38,5 43,9 | 61,8 | 56,9 66,7 | 92,4 | 85,9 98,9 | 105,8 | 99,6 112,0 | 123,4 | 114,2 132,6 | 141,0 | 131,8 150,2 |
| 12 à 19 ans | 57,1 | 52,8 61,4 | 81,9 | 76,8 87,0 | 104,0 | 98,5 109,5 | 123,4 | 114,2 132,6 | 141,0 | 131,8 150,2 | 158,6 | 149,4 167,8 |
| 20 à 39 ans | 65,5 | 61,0 70,0 | 88,8 | 84,7 92,9 | 111,8 | 106,2 117,4 | 125,5 | 122,3 128,7 | 141,0 | 131,8 150,2 | 158,6 | 149,4 167,8 |
| 40 à 59 ans | 73,5 | 67,2 79,8 | 99,3 | 93,9 104,7 | 121,0 | 114,8 127,2 | 131,1 | 124,5 137,7 | 141,0 | 131,8 150,2 | 158,6 | 149,4 167,8 |
| 60 à 79 ans | 76,3 | 74,0 78,6 | 93,3 | 88,0 98,6 | 117,2 | 112,0 122,4 | 127,3 | 123,1 131,5 | 141,0 | 131,8 150,2 | 158,6 | 149,4 167,8 |
| 6 à 79 ans | 67,3 | 64,5 70,1 | 90,4 | 88,6 92,2 | 113,7 | 110,5 116,9 | 126,3 | 123,1 129,5 | 141,0 | 131,8 150,2 | 158,6 | 149,4 167,8 |
| Males | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 37,1 | 33,5 40,7 | 60,3 | 51,4 69,2 | 92,4 | 84,5 100,3 | 107,4 | 99,4 115,4 | 123,4 | 114,2 132,6 | 141,0 | 131,8 150,2 |
| 12 à 19 ans | 42,9 | 40,7 45,1 | 63,6 | 57,6 69,6 | 92,2 | 82,9 101,5 | 105,5 | 95,8 115,2 | 123,4 | 114,2 132,6 | 141,0 | 131,8 150,2 |
| 20 à 39 ans | 58,0 | 52,8 63,2 | 76,5 | 73,9 79,1 | 91,6 | 84,7 98,5 | 103,7 | 95,1 112,3 | 123,4 | 114,2 132,6 | 141,0 | 131,8 150,2 |
| 40 à 59 ans | 63,4 | 58,0 68,8 | 80,6 | 72,4 88,8 | 98,2 | 91,0 105,4 | 109,3 | 98,6 120,0 | 123,4 | 114,2 132,6 | 141,0 | 131,8 150,2 |
| 60 à 79 ans | 60,2 | 56,5 63,9 | 76,1 | 72,7 79,5 | 85,0 | 82,1 87,9 | 93,3 | 86,9 99,7 | 107,4 | 100,8 114,0 | 123,4 | 114,2 132,6 |
| 6 à 79 ans | 57,5 | 55,0 60,0 | 75,7 | 73,0 78,4 | 93,4 | 90,3 96,5 | 104,9 | 100,8 109,0 | 123,4 | 114,2 132,6 | 141,0 | 131,8 150,2 |
| Females | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 44,8 | 42,6 47,0 | 62,9 | 58,0 67,8 | 92,8 | 84,6 101,0 | 103,8 | 93,5 114,1 | 123,4 | 114,2 132,6 | 141,0 | 131,8 150,2 |
| 12 à 19 ans | 71,1 | 65,8 76,4 | 90,5 | 83,9 97,1 | 117,4 | 106,0 128,8 | 131,6 | 121,7 141,5 | 141,0 | 131,8 150,2 | 158,6 | 149,4 167,8 |
| 20 à 39 ans | 77,3 | 70,3 84,3 | 103,0 | 97,3 108,7 | 124,7 | 120,0 129,4 | 132,2 | 125,7 138,7 | 141,0 | 131,8 150,2 | 158,6 | 149,4 167,8 |
| 40 à 59 ans | 88,7 | 83,3 94,1 | 110,0 | 106,3 113,7 | 129,2 | 124,3 134,1 | 141,6 | 131,8 151,4 | 141,0 | 131,8 150,2 | 158,6 | 149,4 167,8 |
| 60 à 79 ans | 89,1 | 84,4 93,8 | 110,0 | 103,4 116,6 | 124,3 | 117,0 131,6 | 143,1 | 132,8 153,4 | 141,0 | 131,8 150,2 | 158,6 | 149,4 167,8 |
| 6 à 79 ans | 80,7 | 77,2 84,2 | 104,7 | 102,4 107,0 | 124,7 | 121,6 127,8 | 136,5 | 130,8 142,2 | 141,0 | 131,8 150,2 | 158,6 | 149,4 167,8 |

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30 kg/m², sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 24
Poids autodéclaré de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

| | Poids autodéclaré | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------|-----------|------------|-------------------------|-----------|
| | Moyenne | | 5 ^e percentile | | 10 ^e percentile | | 25 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à | | de | à |
| | kilogrammes | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 32 | 32 | 33 | 19 | 18 | 20 | 20 | 19 | 21 | 25 | 24 | 26 |
| 12 à 19 ans | 62 | 60 | 63 | 41 | 40 | 42 | 45 | 44 | 46 | 50 | 48 | 52 |
| 20 à 39 ans | 75 | 73 | 76 | 52 | 50 | 54 | 54 | 53 | 55 | 61 | 58 | 64 |
| 40 à 59 ans | 78 | 76 | 80 | 53 | 51 | 55 | 57 | 55 | 59 | 65 | 63 | 67 |
| 60 à 79 ans | 76 | 75 | 77 | 54 | 52 | 56 | 57 | 55 | 59 | 64 | 62 | 66 |
| 6 à 79 ans | 72 | 70 | 73 | 36 | 35 | 37 | 49 | 48 | 50 | 59 | 58 | 60 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 33 | 32 | 34 | 20 | 19 | 21 | 22 | 20 | 24 | 26 | 24 | 28 |
| 12 à 19 ans | 66 | 63 | 68 | 41 | 40 | 42 | 45 | 42 | 48 | 53 | 51 | 55 |
| 20 à 39 ans | 82 | 81 | 84 | 59 | 56 | 62 | 65 | 62 | 68 | 70 | 68 | 72 |
| 40 à 59 ans | 86 | 84 | 89 | 66 | 64 | 68 | 69 | 67 | 71 | 76 | 74 | 78 |
| 60 à 79 ans | 84 | 82 | 85 | 61 | 59 | 63 | 66 | 64 | 68 | 73 | 71 | 75 |
| 6 à 79 ans | 78 | 77 | 80 | 37 | 35 | 39 | 54 | 53 | 55 | 68 | 67 | 69 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 32 | 31 | 33 | 18 | 17 | 19 | 20 | 19 | 21 | 24 | 23 | 25 |
| 12 à 19 ans | 57 | 56 | 59 | 43 | 42 | 44 | 44 | 42 | 46 | 50 | 49 | 51 |
| 20 à 39 ans | 67 | 65 | 70 | 49 | 47 | 51 | 52 | 51 | 53 | 56 | 53 | 59 |
| 40 à 59 ans | 69 | 67 | 72 | 50 | 49 | 51 | 53 | 52 | 54 | 59 | 58 | 60 |
| 60 à 79 ans | 70 | 68 | 71 | 52 | 50 | 54 | 54 | 52 | 56 | 60 | 58 | 62 |
| 6 à 79 ans | 65 | 63 | 66 | 36 | 35 | 37 | 48 | 47 | 49 | 54 | 53 | 55 |

| | Poids autodéclaré | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|
| | 50 ^e percentile | | 75 ^e percentile | | 90 ^e percentile | | 95 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à | | de | à |
| | kilogrammes | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 32 | 31 | 33 | 39 | 38 | 40 | 45 | 43 | 47 | 50 | 48 | 52 |
| 12 à 19 ans | 59 | 58 | 60 | 69 | 65 | 73 | 83 | 80 | 86 | 91 | 88 | 94 |
| 20 à 39 ans | 73 | 71 | 75 | 85 | 82 | 88 | 98 | 95 | 101 | 104 | 99 | 109 |
| 40 à 59 ans | 77 | 76 | 78 | 88 | 85 | 91 | 100 | 95 | 105 | 108 | 103 | 113 |
| 60 à 79 ans | 75 | 73 | 77 | 86 | 84 | 88 | 98 | 94 | 102 | 104 | 101 | 107 |
| 6 à 79 ans | 72 | 70 | 74 | 84 | 82 | 86 | 96 | 92 | 100 | 104 | 100 | 108 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 32 | 31 | 33 | 39 | 38 | 40 | 46 | 43 | 49 | 50 | 47 | 53 |
| 12 à 19 ans | 64 | 61 | 67 | 77 | 72 | 82 | 88 | 83 | 93 | 95 | 89 | 101 |
| 20 à 39 ans | 79 | 76 | 82 | 91 | 88 | 94 | 102 | 99 | 105 | 109 | 104 | 114 |
| 40 à 59 ans | 84 | 81 | 87 | 93 | 90 | 96 | 107 | 101 | 113 | 116 | 110 | 122 |
| 60 à 79 ans | 82 | 80 | 84 | 91 | 89 | 93 | 104 | 102 | 106 | 109 | 106 | 112 |
| 6 à 79 ans | 79 | 77 | 81 | 91 | 89 | 93 | 102 | 99 | 105 | 109 | 106 | 112 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 30 | 28 | 32 | 37 | 35 | 39 | 45 | 43 | 47 | 50 | 46 | 54 |
| 12 à 19 ans | 56 | 53 | 59 | 64 | 61 | 67 | 73 | 67 | 79 | 82 | 79 | 85 |
| 20 à 39 ans | 64 | 61 | 67 | 75 | 72 | 78 | 88 | 81 | 95 | 100 | 93 | 107 |
| 40 à 59 ans | 66 | 64 | 68 | 77 | 73 | 81 | 91 | 85 | 97 | 100 | 92 | 108 |
| 60 à 79 ans | 68 | 66 | 70 | 76 | 73 | 79 | 86 | 81 | 91 | 95 | 89 | 101 |
| 6 à 79 ans | 64 | 63 | 65 | 75 | 72 | 78 | 86 | 82 | 90 | 95 | 89 | 101 |

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans.
Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 25
Taille autodéclarée de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

| | Taille autodéclarée | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|
| | Moyenne | | 5 ^e percentile | | 10 ^e percentile | | 25 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à | | de | à |
| centimètres | | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 134 | 132 | 135 | 104 | 97 | 111 | 117 | 112 | 122 | 122 | 120 | 124 |
| 12 à 19 ans | 167 | 167 | 168 | 150 | 148 | 152 | 155 | 153 | 157 | 160 | 159 | 161 |
| 20 à 39 ans | 171 | 170 | 172 | 155 | 154 | 156 | 157 | 156 | 158 | 163 | 162 | 164 |
| 40 à 59 ans | 170 | 169 | 170 | 155 | 155 | 155 | 157 | 157 | 157 | 163 | 161 | 165 |
| 60 à 79 ans | 168 | 167 | 168 | 152 | 149 | 155 | 155 | 153 | 157 | 160 | 160 | 160 |
| 6 à 79 ans | 167 | 167 | 168 | 145 | 142 | 148 | 155 | 152 | 158 | 160 | 160 | 160 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 133 | 131 | 135 | 104 | 95 | 113 | 117 | 110 | 124 | 122 | 120 | 124 |
| 12 à 19 ans | 171 | 170 | 172 | 152 | 150 | 154 | 155 | 153 | 157 | 165 | 163 | 167 |
| 20 à 39 ans | 177 | 176 | 178 | 168 | 165 | 171 | 168 | 166 | 170 | 173 | 170 | 176 |
| 40 à 59 ans | 176 | 175 | 177 | 163 | 160 | 166 | 168 | 166 | 170 | 170 | 167 | 173 |
| 60 à 79 ans | 174 | 174 | 175 | 163 | 161 | 165 | 165 | 162 | 168 | 170 | 169 | 171 |
| 6 à 79 ans | 173 | 172 | 173 | 145 | 142 | 148 | 160 | 158 | 162 | 170 | 168 | 172 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 134 | 132 | 136 | 104 | 94 | 114 | 117 | 112 | 122 | 122 | 119 | 125 |
| 12 à 19 ans | 164 | 163 | 165 | 150 | 148 | 152 | 155 | 152 | 158 | 157 | 154 | 160 |
| 20 à 39 ans | 164 | 163 | 165 | 152 | 150 | 154 | 155 | 154 | 156 | 157 | 154 | 160 |
| 40 à 59 ans | 163 | 163 | 164 | 152 | 151 | 153 | 155 | 154 | 156 | 157 | 154 | 160 |
| 60 à 79 ans | 161 | 161 | 162 | 152 | 150 | 154 | 155 | 152 | 158 | 157 | 157 | 157 |
| 6 à 79 ans | 161 | 161 | 162 | 145 | 143 | 147 | 152 | 152 | 152 | 157 | 157 | 157 |

| | Taille autodéclarée | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------|------------|
| | 50 ^e percentile | | 75 ^e percentile | | 90 ^e percentile | | 95 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à | | de | à |
| centimètres | | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 135 | 133 | 137 | 145 | 142 | 148 | 152 | 151 | 153 | 157 | 155 | 159 |
| 12 à 19 ans | 168 | 168 | 168 | 175 | 174 | 176 | 180 | 178 | 182 | 185 | 183 | 187 |
| 20 à 39 ans | 170 | 169 | 171 | 178 | 177 | 179 | 183 | 183 | 183 | 185 | 181 | 189 |
| 40 à 59 ans | 170 | 169 | 171 | 178 | 176 | 180 | 183 | 181 | 185 | 185 | 183 | 187 |
| 60 à 79 ans | 168 | 168 | 168 | 175 | 174 | 176 | 180 | 180 | 180 | 183 | 182 | 184 |
| 6 à 79 ans | 168 | 167 | 169 | 175 | 172 | 178 | 183 | 181 | 185 | 185 | 184 | 186 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 135 | 132 | 138 | 145 | 142 | 148 | 152 | 150 | 154 | 155 | 151 | 159 |
| 12 à 19 ans | 173 | 170 | 176 | 180 | 178 | 182 | 185 | 183 | 187 | 188 | 184 | 192 |
| 20 à 39 ans | 178 | 177 | 179 | 183 | 180 | 186 | 185 | 181 | 189 | 191 | 188 | 194 |
| 40 à 59 ans | 175 | 172 | 178 | 180 | 177 | 183 | 185 | 183 | 187 | 188 | 186 | 190 |
| 60 à 79 ans | 175 | 174 | 176 | 180 | 179 | 181 | 183 | 182 | 184 | 185 | 185 | 185 |
| 6 à 79 ans | 175 | 174 | 176 | 180 | 180 | 180 | 185 | 183 | 187 | 188 | 186 | 190 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 135 | 133 | 137 | 145 | 142 | 148 | 152 | 149 | 155 | 157 | 155 | 159 |
| 12 à 19 ans | 165 | 163 | 167 | 168 | 166 | 170 | 175 | 173 | 177 | 178 | 175 | 181 |
| 20 à 39 ans | 163 | 161 | 165 | 170 | 168 | 172 | 173 | 171 | 175 | 175 | 172 | 178 |
| 40 à 59 ans | 163 | 162 | 164 | 168 | 168 | 168 | 173 | 170 | 176 | 175 | 172 | 178 |
| 60 à 79 ans | 160 | 158 | 162 | 165 | 164 | 166 | 170 | 168 | 172 | 173 | 170 | 176 |
| 6 à 79 ans | 163 | 162 | 164 | 168 | 168 | 168 | 173 | 171 | 175 | 175 | 174 | 176 |

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans.
Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 26
Distribution de la population à domicile âgée de 6 à 17 ans, d'après les normes relatives à l'indice de masse corporelle basées sur les entrées autodéclarées — méthode CDC, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

| | Indice de masse corporelle basées sur les entrées autodéclarées — méthode CDC | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| | Poids insuffisant | | | Poids normal | | | Embonpoint | | | Obèse | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à | | de | à |
| | pourcentage | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 7,5 | 5,8 | 9,2 | 58,8 | 53,2 | 64,4 | 16,0 | 12,3 | 19,8 | 17,7 | 13,9 | 21,4 |
| 12 à 17 ans | 3,2 ^E | 1,6 | 4,7 | 74,4 | 67,4 | 81,3 | 12,3 | 8,4 | 16,1 | 10,2 ^E | 5,3 | 15,1 |
| 6 à 17 ans | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 67,6 | 62,1 | 73,2 | 13,9 | 10,6 | 17,2 | 13,4 | 10,4 | 16,5 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 8,1 | 5,7 | 10,5 | 50,6 | 43,1 | 58,2 | 19,3 | 14,7 | 23,9 | 22,0 | 15,2 | 28,9 |
| 12 à 17 ans | 3,6 ^E | 1,4 | 5,8 | 68,9 | 60,9 | 76,8 | 13,7 | 9,5 | 17,9 | 13,8 ^E | 7,1 | 20,6 |
| 6 à 17 ans | 5,5 | 4,0 | 6,9 | 61,2 | 55,2 | 67,3 | 16,0 | 12,3 | 19,8 | 17,3 | 12,8 | 21,7 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 6,9 ^E | 4,5 | 9,3 | 67,4 | 60,9 | 74,0 | 12,6 | 8,6 | 16,7 | 13,1 | 10,1 | 16,0 |
| 12 à 17 ans | 2,7 ^E | 1,5 | 3,8 | 80,9 | 73,7 | 88,0 | 10,6 ^E | 5,1 | 16,1 | F | ... | ... |
| 6 à 17 ans | 4,5 | 3,1 | 6,0 | 74,9 | 69,1 | 80,7 | 11,5 | 8,1 | 14,9 | 9,1 | 6,2 | 11,9 |

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

^F trop peu fiable pour être publié (données avec un coefficient de variation (CV) de plus de 33,3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage)

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de National Center for Health Statistics, 2000, Clinical Growth Charts, Department of Health and Human Services, Public Health Service, Center for Disease Control, Hyattsville, MD, <http://www.cdc.gov/nchs/about/major/nhanes/growthcharts/clinicalcharts.htm> (site consulté le 19 décembre 2006).
 Population à domicile âgée de 6 à 17 ans.
 Center for Disease Control (CDC).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 27

Distribution de la population à domicile âgée de 6 à 17 ans, d'après les normes relatives à l'indice de masse corporelle basées sur les entrées autodéclarées — méthode Cole, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

| | Indice de masse corporelle basées sur les entrées autodéclarées — méthode Cole | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| | Ni embonpoint ni obèse | | | Embonpoint | | | Obèse | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à |
| | pourcentage | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 69,1 | 63,9 | 74,3 | 19,3 | 14,7 | 23,9 | 11,6 | 8,2 | 15,1 |
| 12 à 17 ans | 76,2 | 68,1 | 84,3 | 15,5 | 10,7 | 20,3 | 8,3 ^E | 3,4 | 13,1 |
| 6 à 17 ans | 73,2 | 67,6 | 78,7 | 17,1 | 12,9 | 21,3 | 9,7 | 7,1 | 12,4 |
| Hommes | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 64,1 | 56,5 | 71,7 | 22,7 | 17,9 | 27,5 | 13,2 ^E | 7,8 | 18,6 |
| 12 à 17 ans | 71,6 | 63,1 | 80,2 | 16,8 | 13,5 | 20,1 | 11,6 ^E | 4,8 | 18,3 |
| 6 à 17 ans | 68,5 | 62,5 | 74,5 | 19,3 | 15,8 | 22,8 | 12,2 | 8,3 | 16,2 |
| Femmes | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 74,4 | 69,0 | 79,7 | 15,6 ^E | 10,2 | 21,1 | 10,0 | 7,3 | 12,7 |
| 12 à 17 ans | 81,7 | 72,5 | 90,8 | 14,0 ^E | 6,9 | 21,0 | F | ... | ... |
| 6 à 17 ans | 78,4 | 72,2 | 84,6 | 14,7^E | 9,1 | 20,3 | 6,9 | 5,2 | 8,5 |

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

^F trop peu fiable pour être publié (données avec un coefficient de variation (CV) de plus de 33,3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage)

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de T.J. Cole, M.C. Bellizzi, K.M. Flegal & W.H. Dietz, 2000, "Establishing a Standard Definition for Child Overweight and Obesity Worldwide : International survey," The BMJ, Vol. 320, p. 1240-1243.
Population à domicile âgée de 6 à 17 ans.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 28
Distribution de la population à domicile âgée de 18 à 79 ans, d'après les normes relatives à l'indice de masse corporelle basées sur les entrées autodéclarées, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

| | Indice de masse corporelle basées sur les entrées autodéclarées | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|
| | Poids insuffisant | | | Poids normal | | | Embonpoint | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à |
| pourcentage | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | |
| 18 à 39 ans | 3,3 ^E | 1,6 | 4,9 | 53,2 | 48,9 | 57,5 | 28,5 | 24,9 | 32,0 |
| 40 à 59 ans | 1,0 ^E | 0,6 | 1,3 | 37,3 | 33,0 | 41,6 | 38,2 | 33,6 | 42,8 |
| 60 à 79 ans | F | ... | ... | 33,8 | 28,4 | 39,3 | 41,7 | 37,3 | 46,1 |
| 18 à 79 ans | 1,8^E | 1,2 | 2,5 | 42,9 | 39,2 | 46,5 | 35,1 | 32,4 | 37,7 |
| Hommes | | | | | | | | | |
| 18 à 39 ans | F | ... | ... | 49,0 | 44,7 | 53,3 | 35,1 | 31,8 | 38,3 |
| 40 à 59 ans | F | ... | ... | 25,0 | 19,6 | 30,3 | 49,9 | 42,8 | 56,9 |
| 60 à 79 ans | F | ... | ... | 31,3 | 25,1 | 37,4 | 43,4 | 37,6 | 49,2 |
| 18 à 79 ans | 0,7^E | 0,3 | 1,1 | 35,9 | 32,0 | 39,7 | 42,7 | 39,3 | 46,0 |
| Femmes | | | | | | | | | |
| 18 à 39 ans | 5,6 ^E | 2,4 | 8,7 | 57,7 | 52,2 | 63,1 | 21,5 | 15,6 | 27,4 |
| 40 à 59 ans | 1,4 | 1,0 | 1,7 | 49,7 | 44,8 | 54,6 | 26,3 | 22,2 | 30,5 |
| 60 à 79 ans | F | ... | ... | 36,2 | 29,8 | 42,6 | 40,2 | 34,8 | 45,6 |
| 18 à 79 ans | 2,9^E | 1,8 | 4,1 | 50,0 | 45,6 | 54,3 | 27,4 | 24,6 | 30,2 |

| | Indice de masse corporelle basées sur les entrées autodéclarées | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|------------|------------------------|-------------------------|------------|
| | Obésité, classe I | | | Obésité, classe II | | | Obésité, classe III | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à |
| pourcentage | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | |
| 18 à 39 ans | 9,5 | 7,2 | 11,8 | 4,1 ^E | 1,8 | 6,4 | 1,4 ^E | 0,6 | 2,3 |
| 40 à 59 ans | 17,0 | 12,7 | 21,3 | 4,3 | 3,2 | 5,4 | 2,3 ^E | 1,4 | 3,3 |
| 60 à 79 ans | 17,7 | 14,9 | 20,5 | 4,4 ^E | 2,9 | 5,8 | 1,6 ^E | 1,1 | 2,2 |
| 18 à 79 ans | 14,2 | 12,2 | 16,2 | 4,2 | 3,1 | 5,4 | 1,8^E | 1,2 | 2,5 |
| Hommes | | | | | | | | | |
| 18 à 39 ans | 9,9 ^E | 6,2 | 13,6 | F | ... | ... | 0,8 ^E | 0,4 | 1,3 |
| 40 à 59 ans | 18,8 | 13,1 | 24,5 | 3,9 ^E | 2,5 | 5,2 | 1,9 ^E | 0,7 | 3,2 |
| 60 à 79 ans | 19,4 | 15,9 | 22,9 | 4,4 ^E | 3,0 | 5,8 | F | ... | ... |
| 18 à 79 ans | 15,3 | 12,5 | 18,2 | 4,1^E | 2,6 | 5,6 | 1,3^E | 0,7 | 2,0 |
| Femmes | | | | | | | | | |
| 18 à 39 ans | 9,1 | 6,8 | 11,3 | F | ... | ... | F | ... | ... |
| 40 à 59 ans | 15,1 | 11,1 | 19,1 | 4,8 ^E | 3,0 | 6,5 | F | ... | ... |
| 60 à 79 ans | 16,1 | 12,6 | 19,5 | 4,3 ^E | 1,6 | 7,0 | 2,1 ^E | 1,3 | 2,9 |
| 18 à 79 ans | 13,0 | 11,2 | 14,8 | 4,4^E | 2,8 | 6,0 | 2,3^E | 1,0 | 3,7 |

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

F trop peu fiable pour être publié (données avec un coefficient de variation (CV) de plus de 33,3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage)

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de Santé Canada, 2003. « Description des "Lignes directrices canadiennes pour la classification du poids chez les adultes" », Lignes directrices canadiennes pour la classification du poids chez les adultes, produit no H49-179/2003F au catalogue de Santé Canada, p. 9 à 13, http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/weights-poids/guide-ld-adult/weight_book_tc-livres_des_poids_tm-fra.php (site consulté le 19 décembre 2006).

Population à domicile âgée de 18 à 79 ans.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 29
Taille en position assise mesurée de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

| | Taille en position assise mesurée | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | Moyenne | | 5 ^e percentile | | 10 ^e percentile | | 25 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à | | de | à |
| | centimètres | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 71,69 | 71,07 | 72,31 | 62,58 | 61,97 | 63,19 | 63,78 | 63,08 | 64,48 | 66,96 | 66,04 | 67,88 |
| 12 à 19 ans | 87,99 | 87,57 | 88,41 | 79,00 | 77,83 | 80,17 | 80,54 | 79,74 | 81,34 | 84,45 | 83,77 | 85,13 |
| 20 à 39 ans | 90,95 | 90,57 | 91,32 | 83,71 | 82,98 | 84,44 | 85,22 | 84,85 | 85,59 | 87,73 | 87,32 | 88,14 |
| 40 à 59 ans | 90,14 | 89,76 | 90,51 | 83,04 | 82,66 | 83,42 | 84,21 | 83,79 | 84,63 | 86,38 | 85,86 | 86,90 |
| 60 à 79 ans | 87,54 | 87,13 | 87,95 | 79,20 | 78,04 | 80,36 | 81,23 | 80,24 | 82,22 | 84,39 | 84,01 | 84,77 |
| 6 à 79 ans | 88,33 | 88,03 | 88,64 | 74,15 | 73,65 | 74,65 | 80,68 | 80,22 | 81,14 | 85,28 | 84,98 | 85,58 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 71,66 | 70,70 | 72,62 | 63,00 | 62,29 | 63,71 | 63,98 | 62,87 | 65,09 | 67,45 | 65,89 | 69,01 |
| 12 à 19 ans | 89,07 | 88,29 | 89,85 | 77,16 | 75,51 | 78,81 | 79,55 | 78,55 | 80,55 | 84,30 | 82,59 | 86,01 |
| 20 à 39 ans | 93,86 | 93,30 | 94,41 | 88,25 | 87,05 | 89,45 | 88,93 | 88,20 | 89,66 | 91,26 | 90,55 | 91,97 |
| 40 à 59 ans | 93,22 | 92,69 | 93,75 | 87,11 | 85,83 | 88,39 | 88,43 | 87,49 | 89,37 | 90,54 | 89,53 | 91,55 |
| 60 à 79 ans | 90,89 | 90,41 | 91,38 | 85,01 | 84,26 | 85,76 | 86,53 | 86,01 | 87,05 | 88,46 | 87,97 | 88,95 |
| 6 à 79 ans | 90,91 | 90,51 | 91,32 | 73,94 | 73,25 | 74,63 | 82,76 | 81,65 | 83,87 | 88,94 | 88,43 | 89,45 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 71,72 | 71,02 | 72,41 | 61,77 | 60,86 | 62,68 | 63,55 | 62,65 | 64,45 | 66,50 | 65,45 | 67,55 |
| 12 à 19 ans | 86,85 | 86,44 | 87,27 | 80,14 | 79,43 | 80,85 | 81,01 | 80,30 | 81,72 | 84,46 | 83,90 | 85,02 |
| 20 à 39 ans | 88,01 | 87,62 | 88,40 | 82,30 | 81,18 | 83,42 | 83,79 | 83,08 | 84,50 | 85,81 | 85,36 | 86,26 |
| 40 à 59 ans | 87,11 | 86,83 | 87,39 | 82,21 | 81,72 | 82,70 | 83,04 | 82,64 | 83,44 | 84,93 | 84,54 | 85,32 |
| 60 à 79 ans | 84,46 | 84,02 | 84,90 | 78,35 | 77,61 | 79,09 | 79,69 | 78,45 | 80,93 | 82,45 | 81,58 | 83,32 |
| 6 à 79 ans | 85,78 | 85,50 | 86,06 | 74,48 | 73,90 | 75,06 | 80,37 | 79,82 | 80,92 | 83,91 | 83,63 | 84,19 |

| | Taille en position assise mesurée | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | 50 ^e percentile | | 75 ^e percentile | | 90 ^e percentile | | 95 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à | | de | à |
| | centimètres | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 71,85 | 70,99 | 72,71 | 75,55 | 74,80 | 76,30 | 79,25 | 78,32 | 80,18 | 81,60 | 80,69 | 82,51 |
| 12 à 19 ans | 88,39 | 87,84 | 88,94 | 91,75 | 91,38 | 92,12 | 94,70 | 93,93 | 95,47 | 96,81 | 95,87 | 97,75 |
| 20 à 39 ans | 90,93 | 90,47 | 91,39 | 94,10 | 93,49 | 94,71 | 96,98 | 96,26 | 97,70 | 98,82 | 97,96 | 99,68 |
| 40 à 59 ans | 89,77 | 89,27 | 90,27 | 93,62 | 93,10 | 94,14 | 96,30 | 95,90 | 96,70 | 97,60 | 97,02 | 98,18 |
| 60 à 79 ans | 87,57 | 87,17 | 87,97 | 91,13 | 90,29 | 91,97 | 93,80 | 93,38 | 94,22 | 95,20 | 94,69 | 95,71 |
| 6 à 79 ans | 89,03 | 88,73 | 89,33 | 92,86 | 92,55 | 93,17 | 95,90 | 95,48 | 96,32 | 97,46 | 97,07 | 97,85 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 72,07 | 70,70 | 73,44 | 75,39 | 74,37 | 76,41 | 78,42 | 77,66 | 79,18 | 80,16 | 79,07 | 81,25 |
| 12 à 19 ans | 90,41 | 89,55 | 91,27 | 93,59 | 92,92 | 94,26 | 96,60 | 95,64 | 97,56 | 98,33 | 97,57 | 99,09 |
| 20 à 39 ans | 93,91 | 93,35 | 94,47 | 96,35 | 95,62 | 97,08 | 98,82 | 97,88 | 99,76 | 99,95 | 99,24 | 100,66 |
| 40 à 59 ans | 93,48 | 92,86 | 94,10 | 95,84 | 95,23 | 96,45 | 97,66 | 97,07 | 98,25 | 99,01 | 98,17 | 99,85 |
| 60 à 79 ans | 91,16 | 90,29 | 92,03 | 93,38 | 92,98 | 93,78 | 95,26 | 94,78 | 95,74 | 96,02 | 95,35 | 96,69 |
| 6 à 79 ans | 92,42 | 91,94 | 92,90 | 95,19 | 94,69 | 95,69 | 97,46 | 97,07 | 97,85 | 99,01 | 98,42 | 99,60 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 71,77 | 70,88 | 72,66 | 75,91 | 74,99 | 76,83 | 80,85 | 79,86 | 81,84 | 82,52 | 81,10 | 83,94 |
| 12 à 19 ans | 87,05 | 86,53 | 87,57 | 89,63 | 88,95 | 90,31 | 91,74 | 90,75 | 92,73 | 92,95 | 91,83 | 94,07 |
| 20 à 39 ans | 87,96 | 87,53 | 88,39 | 90,40 | 89,81 | 90,99 | 92,16 | 91,70 | 92,62 | 92,82 | 92,71 | 92,93 |
| 40 à 59 ans | 86,88 | 86,33 | 87,43 | 89,27 | 88,89 | 89,65 | 91,51 | 91,09 | 91,93 | 92,82 | 92,43 | 93,21 |
| 60 à 79 ans | 84,84 | 84,39 | 85,29 | 86,67 | 86,25 | 87,09 | 88,88 | 88,64 | 89,12 | 89,36 | 88,78 | 89,94 |
| 6 à 79 ans | 86,50 | 86,15 | 86,85 | 89,14 | 88,83 | 89,45 | 91,35 | 91,09 | 91,61 | 92,58 | 92,30 | 92,86 |

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 30
Taille en position debout mesurée de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

| | Taille en position debout mesurée | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | Moyenne | | 5 ^e percentile | | 10 ^e percentile | | 25 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à | | de | à |
| centimètres | | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 135,34 | 134,14 | 136,55 | 116,06 | 114,81 | 117,31 | 119,34 | 117,82 | 120,86 | 125,87 | 123,80 | 127,94 |
| 12 à 19 ans | 166,66 | 166,24 | 167,09 | 150,45 | 148,08 | 152,82 | 154,88 | 152,93 | 156,83 | 160,01 | 158,89 | 161,13 |
| 20 à 39 ans | 169,99 | 169,30 | 170,68 | 155,45 | 153,56 | 157,34 | 157,83 | 156,85 | 158,81 | 163,07 | 162,26 | 163,88 |
| 40 à 59 ans | 168,82 | 168,16 | 169,48 | 154,84 | 154,05 | 155,63 | 157,03 | 156,17 | 157,89 | 161,41 | 160,24 | 162,58 |
| 60 à 79 ans | 165,46 | 164,79 | 166,12 | 150,74 | 148,99 | 152,49 | 153,90 | 152,48 | 155,32 | 158,57 | 158,01 | 159,13 |
| 6 à 79 ans | 165,89 | 165,41 | 166,36 | 141,27 | 140,00 | 142,54 | 151,86 | 151,00 | 152,72 | 159,43 | 158,95 | 159,91 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 135,41 | 133,38 | 137,43 | 115,93 | 113,22 | 118,64 | 119,99 | 116,14 | 123,84 | 126,15 | 122,56 | 129,74 |
| 12 à 19 ans | 169,83 | 168,87 | 170,79 | 149,53 | 146,50 | 152,56 | 155,10 | 152,23 | 157,97 | 162,63 | 161,70 | 163,56 |
| 20 à 39 ans | 176,39 | 175,49 | 177,29 | 165,82 | 163,98 | 167,66 | 167,78 | 166,11 | 169,45 | 171,38 | 169,73 | 173,03 |
| 40 à 59 ans | 175,15 | 174,19 | 176,11 | 162,31 | 160,52 | 164,10 | 165,73 | 164,03 | 167,43 | 169,96 | 168,33 | 171,59 |
| 60 à 79 ans | 172,31 | 171,59 | 173,03 | 161,00 | 159,08 | 162,92 | 164,00 | 163,31 | 164,69 | 167,67 | 166,53 | 168,81 |
| 6 à 79 ans | 171,44 | 170,82 | 172,05 | 141,15 | 139,15 | 143,15 | 157,99 | 156,87 | 159,11 | 167,81 | 166,89 | 168,73 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 135,28 | 133,87 | 136,68 | 116,34 | 114,58 | 118,10 | 118,58 | 117,36 | 119,80 | 125,07 | 122,87 | 127,27 |
| 12 à 19 ans | 163,31 | 162,31 | 164,31 | 151,06 | 148,62 | 153,50 | 153,98 | 151,83 | 156,13 | 158,49 | 156,72 | 160,26 |
| 20 à 39 ans | 163,52 | 162,76 | 164,28 | 152,31 | 150,42 | 154,20 | 155,45 | 153,52 | 157,38 | 158,87 | 157,78 | 159,96 |
| 40 à 59 ans | 162,59 | 161,95 | 163,23 | 152,30 | 151,48 | 153,12 | 154,86 | 154,05 | 155,67 | 158,50 | 157,54 | 159,46 |
| 60 à 79 ans | 159,21 | 158,41 | 160,01 | 148,92 | 147,77 | 150,07 | 150,95 | 149,16 | 152,74 | 155,21 | 154,26 | 156,16 |
| 6 à 79 ans | 160,38 | 159,91 | 160,86 | 141,52 | 139,77 | 143,27 | 150,53 | 149,54 | 151,52 | 156,78 | 156,21 | 157,35 |

| | Taille en position debout mesurée | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | 50 ^e percentile | | 75 ^e percentile | | 90 ^e percentile | | 95 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à | | de | à |
| centimètres | | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 135,63 | 134,23 | 137,03 | 143,93 | 142,57 | 145,29 | 151,36 | 150,23 | 152,49 | 154,90 | 153,08 | 156,72 |
| 12 à 19 ans | 166,29 | 165,55 | 167,03 | 173,46 | 172,43 | 174,49 | 179,68 | 178,85 | 180,51 | 183,39 | 181,52 | 185,26 |
| 20 à 39 ans | 169,82 | 168,70 | 170,94 | 177,00 | 176,13 | 177,87 | 181,68 | 180,49 | 182,87 | 184,71 | 182,62 | 186,80 |
| 40 à 59 ans | 168,46 | 167,40 | 169,52 | 175,46 | 174,51 | 176,41 | 181,24 | 180,10 | 182,38 | 184,58 | 183,21 | 185,95 |
| 60 à 79 ans | 165,23 | 164,48 | 165,98 | 172,52 | 171,30 | 173,74 | 178,13 | 177,41 | 178,85 | 179,98 | 179,01 | 180,95 |
| 6 à 79 ans | 167,00 | 166,52 | 167,48 | 174,74 | 173,93 | 175,55 | 180,25 | 179,70 | 180,80 | 183,22 | 182,34 | 184,10 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 135,64 | 133,16 | 138,12 | 143,21 | 141,60 | 144,82 | 150,44 | 149,30 | 151,58 | 153,23 | 151,97 | 154,49 |
| 12 à 19 ans | 171,08 | 169,78 | 172,38 | 177,75 | 176,76 | 178,74 | 182,30 | 180,25 | 184,35 | 186,37 | 184,54 | 188,20 |
| 20 à 39 ans | 176,65 | 175,40 | 177,90 | 180,59 | 179,62 | 181,56 | 184,71 | 182,49 | 186,93 | 189,85 | 185,59 | 194,11 |
| 40 à 59 ans | 175,14 | 173,97 | 176,31 | 179,74 | 178,81 | 180,67 | 184,58 | 183,21 | 185,95 | 187,65 | 186,29 | 189,01 |
| 60 à 79 ans | 172,62 | 171,38 | 173,86 | 177,42 | 176,65 | 178,19 | 180,13 | 179,07 | 181,19 | 182,37 | 181,46 | 183,28 |
| 6 à 79 ans | 173,90 | 172,86 | 174,94 | 179,00 | 178,33 | 179,67 | 183,10 | 182,24 | 183,96 | 186,86 | 185,49 | 188,23 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 135,50 | 133,51 | 137,49 | 144,96 | 143,47 | 146,45 | 152,49 | 150,72 | 154,26 | 156,27 | 154,17 | 158,37 |
| 12 à 19 ans | 163,65 | 162,58 | 164,72 | 167,88 | 166,30 | 169,46 | 172,20 | 170,04 | 174,36 | 175,32 | 173,40 | 177,24 |
| 20 à 39 ans | 163,42 | 162,63 | 164,21 | 167,82 | 166,96 | 168,68 | 171,94 | 169,92 | 173,96 | 175,32 | 173,00 | 177,64 |
| 40 à 59 ans | 162,39 | 161,07 | 163,71 | 167,06 | 166,19 | 167,93 | 171,02 | 170,48 | 171,56 | 172,57 | 170,41 | 174,73 |
| 60 à 79 ans | 159,13 | 158,34 | 159,92 | 163,17 | 161,97 | 164,37 | 167,83 | 166,82 | 168,84 | 169,24 | 168,09 | 170,39 |
| 6 à 79 ans | 161,46 | 160,91 | 162,01 | 166,54 | 165,99 | 167,09 | 170,87 | 169,98 | 171,76 | 173,13 | 171,12 | 175,14 |

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 31
Poids mesuré de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

| | Poids mesuré | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|
| | Moyenne | | 5 ^e percentile | | 10 ^e percentile | | 25 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à | | de | à |
| | kilogrammes | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 33,3 | 32,5 | 34,0 | 20,8 | 19,9 | 21,7 | 22,0 | 21,1 | 22,9 | 25,2 | 24,2 | 26,2 |
| 12 à 19 ans | 63,1 | 61,2 | 65,1 | 41,0 | 39,5 | 42,5 | 44,2 | 42,5 | 45,9 | 51,4 | 50,2 | 52,6 |
| 20 à 39 ans | 76,0 | 74,2 | 77,7 | 51,8 | 50,9 | 52,7 | 55,2 | 54,0 | 56,4 | 62,4 | 60,4 | 64,4 |
| 40 à 59 ans | 79,2 | 77,4 | 80,9 | 53,5 | 51,9 | 55,1 | 57,5 | 56,2 | 58,8 | 66,4 | 65,0 | 67,8 |
| 60 à 79 ans | 77,5 | 76,4 | 78,6 | 54,0 | 52,6 | 55,4 | 57,9 | 56,3 | 59,5 | 66,0 | 64,5 | 67,5 |
| 6 à 79 ans | 72,7 | 71,3 | 74,0 | 35,3 | 34,5 | 36,1 | 48,9 | 48,5 | 49,3 | 59,5 | 58,4 | 60,6 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 33,4 | 32,0 | 34,8 | 20,9 | 19,9 | 21,9 | 22,2 | 21,0 | 23,4 | 25,8 | 24,5 | 27,1 |
| 12 à 19 ans | 66,1 | 63,1 | 69,0 | 39,6 | 37,6 | 41,6 | 43,3 | 40,4 | 46,2 | 53,4 | 51,0 | 55,8 |
| 20 à 39 ans | 82,7 | 81,2 | 84,2 | 59,2 | 56,8 | 61,6 | 64,5 | 61,4 | 67,6 | 70,8 | 69,5 | 72,1 |
| 40 à 59 ans | 87,1 | 84,5 | 89,6 | 66,2 | 64,6 | 67,8 | 69,3 | 67,4 | 71,2 | 75,6 | 73,3 | 77,9 |
| 60 à 79 ans | 84,2 | 82,7 | 85,7 | 62,0 | 60,0 | 64,0 | 66,2 | 64,6 | 67,8 | 72,8 | 70,4 | 75,2 |
| 6 à 79 ans | 78,7 | 77,2 | 80,2 | 35,2 | 33,2 | 37,2 | 51,0 | 49,6 | 52,4 | 68,0 | 66,7 | 69,3 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 33,2 | 31,9 | 34,4 | 20,0 | 18,9 | 21,1 | 21,8 | 20,9 | 22,7 | 24,2 | 23,1 | 25,3 |
| 12 à 19 ans | 60,0 | 58,6 | 61,5 | 41,4 | 40,0 | 42,8 | 45,0 | 43,3 | 46,7 | 51,0 | 49,5 | 52,5 |
| 20 à 39 ans | 69,1 | 66,6 | 71,6 | 49,5 | 48,1 | 50,9 | 51,9 | 50,7 | 53,1 | 56,9 | 55,3 | 58,5 |
| 40 à 59 ans | 71,4 | 69,3 | 73,6 | 50,4 | 48,6 | 52,2 | 53,9 | 52,6 | 55,2 | 59,7 | 58,2 | 61,2 |
| 60 à 79 ans | 71,4 | 69,8 | 73,1 | 52,2 | 50,7 | 53,7 | 54,8 | 53,1 | 56,5 | 60,9 | 59,2 | 62,6 |
| 6 à 79 ans | 66,7 | 65,0 | 68,3 | 35,4 | 34,2 | 36,6 | 47,9 | 47,4 | 48,4 | 55,4 | 54,2 | 56,6 |

| | Poids mesuré | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | 50 ^e percentile | | 75 ^e percentile | | 90 ^e percentile | | 95 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à | | de | à |
| | kilogrammes | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 31,4 | 30,7 | 32,1 | 38,8 | 37,9 | 39,7 | 47,2 | 45,5 | 48,9 | 54,6 | 51,5 | 57,7 |
| 12 à 19 ans | 60,2 | 58,7 | 61,7 | 71,0 | 67,3 | 74,7 | 86,2 | 82,2 | 90,2 | 94,6 | 90,1 | 99,1 |
| 20 à 39 ans | 72,7 | 70,5 | 74,9 | 86,0 | 82,6 | 89,4 | 100,3 | 94,1 | 106,5 | 110,0 | 106,3 | 113,7 |
| 40 à 59 ans | 77,6 | 75,4 | 79,8 | 90,0 | 88,4 | 91,6 | 101,3 | 97,3 | 105,3 | 109,7 | 105,1 | 114,3 |
| 60 à 79 ans | 75,8 | 74,4 | 77,2 | 87,2 | 86,0 | 88,4 | 98,8 | 95,7 | 101,9 | 106,3 | 102,6 | 110,0 |
| 6 à 79 ans | 72,0 | 70,5 | 73,5 | 85,8 | 83,9 | 87,7 | 98,2 | 95,0 | 101,4 | 107,4 | 103,5 | 111,3 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 31,6 | 29,8 | 33,4 | 38,8 | 37,2 | 40,4 | 47,0 | 44,5 | 49,5 | 52,2 | 50,0 | 54,4 |
| 12 à 19 ans | 63,6 | 61,2 | 66,0 | 76,1 | 70,8 | 81,4 | 89,9 | 85,0 | 94,8 | 95,8 | 87,0 | 104,6 |
| 20 à 39 ans | 80,0 | 77,2 | 82,8 | 92,0 | 89,6 | 94,4 | 105,2 | 98,5 | 111,9 | 113,7 | 109,3 | 118,1 |
| 40 à 59 ans | 85,7 | 81,9 | 89,5 | 95,0 | 91,7 | 98,3 | 106,5 | 101,0 | 112,0 | 116,6 | 110,7 | 122,5 |
| 60 à 79 ans | 82,9 | 80,7 | 85,1 | 92,8 | 90,9 | 94,7 | 104,2 | 102,0 | 106,4 | 112,6 | 108,5 | 116,7 |
| 6 à 79 ans | 79,3 | 77,1 | 81,5 | 91,3 | 89,6 | 93,0 | 103,0 | 99,2 | 106,8 | 112,6 | 109,7 | 115,5 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 31,1 | 30,0 | 32,2 | 38,7 | 37,2 | 40,2 | 48,0 | 43,2 | 52,8 | 56,6 | 51,5 | 61,7 |
| 12 à 19 ans | 57,5 | 55,6 | 59,4 | 64,7 | 62,2 | 67,2 | 80,3 | 75,2 | 85,4 | 88,6 | 82,7 | 94,5 |
| 20 à 39 ans | 65,9 | 63,5 | 68,3 | 78,6 | 74,5 | 82,7 | 92,6 | 85,5 | 99,7 | 103,4 | 93,4 | 113,4 |
| 40 à 59 ans | 69,0 | 66,8 | 71,2 | 80,8 | 77,0 | 84,6 | 93,8 | 89,0 | 98,6 | 102,6 | 95,4 | 109,8 |
| 60 à 79 ans | 69,6 | 67,6 | 71,6 | 79,3 | 76,7 | 81,9 | 91,0 | 86,8 | 95,2 | 97,4 | 92,2 | 102,6 |
| 6 à 79 ans | 64,8 | 63,1 | 66,5 | 76,9 | 74,0 | 79,8 | 90,4 | 87,1 | 93,7 | 99,2 | 94,0 | 104,4 |

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 32
Indice de masse corporelle mesuré de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

| | Indice de masse corporelle mesuré | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | Moyenne | | 5 ^e percentile | | 10 ^e percentile | | 25 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à | | de | à |
| | kilogrammes par mètre carré | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 17,76 | 17,57 | 17,95 | 14,06 | 13,69 | 14,43 | 14,59 | 14,29 | 14,89 | 15,48 | 15,37 | 15,59 |
| 12 à 19 ans | 22,50 | 21,80 | 23,19 | 16,74 | 16,19 | 17,29 | 17,42 | 16,99 | 17,85 | 19,14 | 18,69 | 19,59 |
| 20 à 39 ans | 26,20 | 25,64 | 26,77 | 19,02 | 18,39 | 19,65 | 20,35 | 19,92 | 20,78 | 22,16 | 21,73 | 22,59 |
| 40 à 59 ans | 27,69 | 27,18 | 28,19 | 20,50 | 20,06 | 20,94 | 21,56 | 21,21 | 21,91 | 24,18 | 23,59 | 24,77 |
| 60 à 79 ans | 28,23 | 27,85 | 28,62 | 21,27 | 20,54 | 22,00 | 22,64 | 22,25 | 23,03 | 24,59 | 24,01 | 25,17 |
| 6 à 79 ans | 25,99 | 25,57 | 26,41 | 17,12 | 16,91 | 17,33 | 18,92 | 18,80 | 19,04 | 21,90 | 21,63 | 22,17 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 17,86 | 17,57 | 18,16 | 14,36 | 14,01 | 14,71 | 14,87 | 14,48 | 15,26 | 15,63 | 15,37 | 15,89 |
| 12 à 19 ans | 22,62 | 21,73 | 23,51 | 16,67 | 16,08 | 17,26 | 17,40 | 16,98 | 17,82 | 19,00 | 18,63 | 19,37 |
| 20 à 39 ans | 26,54 | 26,27 | 26,80 | 20,09 | 19,58 | 20,60 | 21,53 | 20,86 | 22,20 | 23,09 | 22,65 | 23,53 |
| 40 à 59 ans | 28,34 | 27,71 | 28,97 | 22,01 | 21,34 | 22,68 | 23,47 | 22,44 | 24,50 | 25,47 | 24,74 | 26,20 |
| 60 à 79 ans | 28,28 | 27,85 | 28,70 | 21,95 | 21,46 | 22,44 | 23,20 | 22,70 | 23,70 | 24,96 | 24,34 | 25,58 |
| 6 à 79 ans | 26,30 | 25,96 | 26,64 | 17,18 | 16,88 | 17,48 | 19,21 | 18,87 | 19,55 | 22,78 | 22,36 | 23,20 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 17,65 | 17,29 | 18,01 | 13,87 | 13,42 | 14,32 | 14,33 | 13,93 | 14,73 | 15,38 | 15,20 | 15,56 |
| 12 à 19 ans | 22,37 | 21,79 | 22,95 | 16,74 | 15,83 | 17,65 | 17,59 | 16,86 | 18,32 | 19,35 | 18,78 | 19,92 |
| 20 à 39 ans | 25,85 | 24,89 | 26,81 | 18,38 | 17,79 | 18,97 | 19,65 | 18,94 | 20,36 | 21,22 | 20,73 | 21,71 |
| 40 à 59 ans | 27,04 | 26,34 | 27,75 | 19,67 | 19,03 | 20,31 | 20,76 | 20,45 | 21,07 | 22,41 | 21,81 | 23,01 |
| 60 à 79 ans | 28,20 | 27,57 | 28,83 | 20,57 | 19,69 | 21,45 | 22,28 | 21,70 | 22,86 | 24,22 | 23,54 | 24,90 |
| 6 à 79 ans | 25,69 | 25,09 | 26,28 | 16,98 | 16,67 | 17,29 | 18,77 | 18,64 | 18,90 | 21,21 | 20,93 | 21,49 |

| | Indice de masse corporelle mesuré | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | 50 ^e percentile | | 75 ^e percentile | | 90 ^e percentile | | 95 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à | | de | à |
| | kilogrammes par mètre carré | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 16,85 | 16,65 | 17,05 | 19,21 | 18,82 | 19,60 | 22,24 | 21,40 | 23,08 | 24,28 | 23,42 | 25,14 |
| 12 à 19 ans | 21,48 | 20,91 | 22,05 | 24,40 | 23,32 | 25,48 | 29,38 | 27,43 | 31,33 | 32,55 | 31,10 | 34,00 |
| 20 à 39 ans | 25,03 | 24,28 | 25,78 | 28,99 | 28,14 | 29,84 | 33,70 | 32,31 | 35,09 | 37,70 | 35,59 | 39,81 |
| 40 à 59 ans | 27,00 | 26,54 | 27,46 | 30,08 | 29,29 | 30,87 | 34,78 | 33,51 | 36,05 | 38,24 | 37,11 | 39,37 |
| 60 à 79 ans | 27,35 | 26,85 | 27,85 | 31,07 | 30,50 | 31,64 | 34,71 | 33,69 | 35,73 | 37,85 | 36,21 | 39,49 |
| 6 à 79 ans | 25,43 | 24,84 | 26,02 | 29,30 | 28,84 | 29,76 | 33,62 | 32,89 | 34,35 | 37,05 | 36,04 | 38,06 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 17,06 | 16,66 | 17,46 | 19,38 | 18,81 | 19,95 | 22,36 | 21,34 | 23,38 | 24,21 | 23,36 | 25,06 |
| 12 à 19 ans | 21,60 | 21,03 | 22,17 | 24,79 | 23,17 | 26,41 | 30,12 | 26,45 | 33,79 | 32,68 | 30,87 | 34,49 |
| 20 à 39 ans | 25,72 | 25,37 | 26,07 | 28,99 | 28,15 | 29,83 | 33,50 | 32,27 | 34,73 | 36,37 | 34,65 | 38,09 |
| 40 à 59 ans | 27,88 | 27,18 | 28,58 | 30,27 | 29,42 | 31,12 | 34,02 | 32,80 | 35,24 | 36,39 | 34,19 | 38,59 |
| 60 à 79 ans | 27,70 | 27,02 | 28,38 | 31,11 | 30,29 | 31,93 | 34,15 | 33,21 | 35,09 | 35,81 | 34,23 | 37,39 |
| 6 à 79 ans | 26,16 | 25,71 | 26,61 | 29,46 | 29,03 | 29,89 | 32,88 | 32,05 | 33,71 | 35,81 | 35,12 | 36,50 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 16,67 | 16,47 | 16,87 | 19,01 | 18,33 | 19,69 | 22,16 | 20,85 | 23,47 | 24,50 | 22,66 | 26,34 |
| 12 à 19 ans | 21,47 | 20,79 | 22,15 | 24,13 | 23,03 | 25,23 | 29,00 | 28,18 | 29,82 | 30,96 | 29,21 | 32,71 |
| 20 à 39 ans | 24,26 | 23,23 | 25,29 | 28,99 | 27,67 | 30,31 | 35,33 | 32,58 | 38,08 | 39,33 | 36,26 | 42,40 |
| 40 à 59 ans | 25,61 | 24,97 | 26,25 | 29,80 | 28,59 | 31,01 | 35,77 | 33,49 | 38,05 | 38,76 | 37,09 | 40,43 |
| 60 à 79 ans | 27,09 | 26,45 | 27,73 | 31,06 | 30,10 | 32,02 | 35,55 | 33,42 | 37,68 | 39,11 | 37,04 | 41,18 |
| 6 à 79 ans | 24,59 | 24,00 | 25,18 | 29,04 | 28,32 | 29,76 | 34,69 | 33,24 | 36,14 | 38,15 | 36,81 | 39,49 |

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 33

Distribution de la population à domicile âgée de 6 à 17 ans, d'après les normes relatives à l'indice de masse corporelle basées sur les entrées mesurées — méthode CDC, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

| | Indice de masse corporelle basées sur les entrées mesurées — méthode CDC | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| | Poids insuffisant | | Poids normal | | | | Embonpoint | | Obèse | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à | | de | à |
| | pourcentage | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 3,7 ^E | 1,5 | 6,0 | 70,7 | 67,7 | 73,7 | 13,9 | 10,4 | 17,4 | 11,6 | 9,0 | 14,3 |
| 12 à 17 ans | 3,5 ^E | 1,5 | 5,6 | 69,3 | 62,6 | 76,0 | 12,4 | 10,0 | 14,7 | 14,8 ^E | 9,0 | 20,6 |
| 6 à 17 ans | 3,6^E | 2,4 | 4,9 | 69,9 | 65,8 | 74,1 | 13,1 | 10,9 | 15,3 | 13,4 | 10,7 | 16,0 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 3,1 ^E | 1,2 | 5,0 | 68,4 | 64,6 | 72,2 | 14,1 | 10,7 | 17,5 | 14,4 | 10,9 | 17,8 |
| 12 à 17 ans | 3,8 ^E | 1,8 | 5,8 | 66,9 | 60,5 | 73,4 | 12,8 | 9,4 | 16,3 | 16,5 ^E | 9,4 | 23,5 |
| 6 à 17 ans | 3,5^E | 2,2 | 4,7 | 67,6 | 63,7 | 71,5 | 13,4 | 11,1 | 15,7 | 15,5 | 12,2 | 18,8 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | F | ... | ... | 73,1 | 68,8 | 77,3 | 13,8 ^E | 9,2 | 18,3 | 8,8 ^E | 5,4 | 12,1 |
| 12 à 17 ans | F | ... | ... | 72,1 | 62,8 | 81,3 | 11,9 | 9,3 | 14,4 | 12,9 ^E | 6,7 | 19,1 |
| 6 à 17 ans | 3,7^E | 2,2 | 5,3 | 72,5 | 67,0 | 78,1 | 12,8 | 10,2 | 15,3 | 11,0 | 8,1 | 13,8 |

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

^F trop peu fiable pour être publié (données avec un coefficient de variation (CV) de plus de 33,3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage)

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de National Center for Health Statistics, 2000, Clinical Growth Charts, Department of Health and Human Services, Public Health Service, Center for Disease Control, Hyattsville, MD, <http://www.cdc.gov/nchs/about/major/nhanes/growthcharts/clinicalcharts.htm> (site consulté le 19 décembre 2006).

Population à domicile âgée de 6 à 17 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1).
Center for Disease Control (CDC).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 34
Distribution de la population à domicile âgée de 6 à 17 ans, d'après les normes relatives à l'indice de masse corporelle basées sur les entrées mesurées — méthode Cole, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

| | Indice de masse corporelle basées sur les entrées mesurées — méthode Cole | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| | Ni embonpoint ni obèse | | | Embonpoint | | | Obèse | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à |
| | pourcentage | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 76,8 | 74,1 | 79,5 | 16,8 | 13,8 | 19,7 | 6,4 | 4,7 | 8,2 |
| 12 à 17 ans | 72,1 | 65,6 | 78,7 | 17,4 | 13,8 | 21,0 | 10,5 ^E | 5,2 | 15,8 |
| 6 à 17 ans | 74,3 | 69,9 | 78,7 | 17,1 | 14,2 | 20,0 | 8,6 | 5,9 | 11,3 |
| Hommes | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 75,8 | 72,7 | 78,8 | 17,2 | 13,7 | 20,6 | 7,1 | 5,0 | 9,1 |
| 12 à 17 ans | 70,7 | 64,3 | 77,1 | 16,9 | 13,5 | 20,3 | 12,4 ^E | 5,4 | 19,4 |
| 6 à 17 ans | 73,0 | 69,0 | 77,0 | 17,0 | 14,3 | 19,7 | 10,0^E | 6,3 | 13,7 |
| Femmes | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 77,9 | 73,8 | 82,0 | 16,3 | 11,6 | 21,1 | 5,8 ^E | 2,9 | 8,6 |
| 12 à 17 ans | 73,8 | 65,2 | 82,4 | 18,0 | 12,4 | 23,5 | 8,3 ^E | 3,8 | 12,7 |
| 6 à 17 ans | 75,7 | 70,3 | 81,2 | 17,2 | 13,3 | 21,1 | 7,1 | 4,8 | 9,3 |

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de T.J. Cole, M.C. Bellizzi, K.M. Flegal & W.H. Diets, 2000, "Establishing a Standard Definition for Child Overweight and Obesity Worldwide : International survey," The BMJ, Vol. 320, p. 1240-1243.

Population à domicile âgée de 6 à 17 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 35

Distribution de la population à domicile âgée de 18 à 79 ans, d'après les normes relatives à l'indice de masse corporelle basées sur les entrées mesurées, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

| | Indice de masse corporelle basées sur les entrées mesurées | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|
| | Poids insuffisant | | | Poids normal | | | Embonpoint | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à |
| pourcentage | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | |
| 18 à 39 ans | 3,0 ^E | 1,6 | 4,4 | 48,2 | 42,8 | 53,7 | 29,7 | 25,4 | 33,9 |
| 40 à 59 ans | F | ... | ... | 32,7 | 28,0 | 37,4 | 41,4 | 38,0 | 44,8 |
| 60 à 79 ans | F | ... | ... | 27,9 | 22,5 | 33,3 | 41,2 | 37,2 | 45,3 |
| 18 à 79 ans | 1,5^E | 0,9 | 2,1 | 37,9 | 33,3 | 42,4 | 36,7 | 33,7 | 39,7 |
| Hommes | | | | | | | | | |
| 18 à 39 ans | F | ... | ... | 44,2 | 39,1 | 49,4 | 36,2 | 29,4 | 43,0 |
| 40 à 59 ans | F | ... | ... | 20,6 | 15,2 | 26,0 | 51,9 | 47,1 | 56,7 |
| 60 à 79 ans | F | ... | ... | 24,7 | 19,4 | 30,1 | 44,3 | 39,7 | 48,8 |
| 18 à 79 ans | 0,8^E | 0,3 | 1,2 | 31,0 | 26,6 | 35,4 | 44,1 | 39,6 | 48,5 |
| Femmes | | | | | | | | | |
| 18 à 39 ans | 5,0 ^E | 2,4 | 7,6 | 52,4 | 44,5 | 60,4 | 22,9 | 17,3 | 28,5 |
| 40 à 59 ans | F | ... | ... | 44,6 | 39,7 | 49,5 | 31,0 | 27,1 | 35,0 |
| 60 à 79 ans | F | ... | ... | 30,8 | 24,6 | 37,1 | 38,4 | 33,8 | 43,1 |
| 18 à 79 ans | 2,2^E | 1,2 | 3,2 | 44,7 | 39,0 | 50,4 | 29,5 | 26,6 | 32,3 |

| | Indice de masse corporelle basées sur les entrées mesurées | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|------------|------------------------|-------------------------|------------|
| | Obésité, classe I | | | Obésité, classe II | | | Obésité, classe III | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à |
| pourcentage | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | |
| 18 à 39 ans | 11,3 | 9,8 | 12,7 | 5,0 | 3,4 | 6,5 | 2,8 ^E | 1,6 | 4,0 |
| 40 à 59 ans | 15,9 | 12,8 | 19,0 | 6,3 ^E | 4,2 | 8,5 | 3,2 | 2,2 | 4,2 |
| 60 à 79 ans | 21,0 | 16,1 | 25,8 | 6,5 | 4,5 | 8,5 | 3,0 ^E | 1,9 | 4,1 |
| 18 à 79 ans | 15,1 | 13,3 | 16,9 | 5,8 | 4,7 | 7,0 | 3,0 | 2,3 | 3,7 |
| Hommes | | | | | | | | | |
| 18 à 39 ans | 12,4 | 9,3 | 15,6 | 4,6 ^E | 2,9 | 6,3 | 1,4 ^E | 0,8 | 2,0 |
| 40 à 59 ans | 19,9 | 15,0 | 24,9 | 3,7 ^E | 2,0 | 5,4 | 3,3 ^E | 1,8 | 4,8 |
| 60 à 79 ans | 22,8 | 16,5 | 29,1 | 6,3 | 4,3 | 8,4 | F | ... | ... |
| 18 à 79 ans | 17,4 | 14,7 | 20,2 | 4,6 | 3,6 | 5,6 | 2,2 | 1,5 | 2,8 |
| Femmes | | | | | | | | | |
| 18 à 39 ans | 10,1 | 7,4 | 12,8 | 5,3 ^E | 2,6 | 8,0 | 4,3 ^E | 2,1 | 6,5 |
| 40 à 59 ans | 11,9 | 9,3 | 14,5 | 8,9 ^E | 5,8 | 12,0 | 3,1 ^E | 1,1 | 5,1 |
| 60 à 79 ans | 19,2 | 14,3 | 24,2 | 6,7 ^E | 3,6 | 9,8 | 4,4 ^E | 2,7 | 6,0 |
| 18 à 79 ans | 12,7 | 10,6 | 14,9 | 7,1 | 5,4 | 8,8 | 3,8^E | 2,4 | 5,3 |

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)^F trop peu fiable pour être publié (données avec un coefficient de variation (CV) de plus de 33,3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage)

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de Santé Canada, 2003. « Description des "Lignes directrices canadiennes pour la classification du poids chez les adultes" », Lignes directrices canadiennes pour la classification du poids chez les adultes, produit no H49-179/2003F au catalogue de Santé Canada, p. 9 à 13, http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/weights-poids/guide-ld-adult/weight_book_tc-livres_des_poids_tm-fra.php (site consulté le 19 décembre 2006).

Population à domicile âgée de 18 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 36
Puissance aérobique maximale prévue moyenne de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

| | Puissance aérobique maximale prévue moyenne | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| | Moyenne | | 5 ^e percentile | | 10 ^e percentile | | 25 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance |
| | | de à | | de à | | de à | | de à | | de à | | de à |
| millilitres par kilogramme par minute | | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 53,3 | 53,0 | 53,5 | 45,2 | 44,5 | 45,9 | 46,7 | 45,9 | 47,5 | 49,9 | 49,4 | 50,4 |
| 12 à 19 ans | 48,6 | 48,0 | 49,2 | 37,6 | 36,7 | 38,5 | 40,3 | 39,7 | 40,9 | 43,0 | 42,2 | 43,8 |
| 20 à 39 ans | 41,4 | 40,6 | 42,1 | 32,0 | 31,4 | 32,6 | 33,2 | 32,4 | 34,0 | 36,5 | 35,9 | 37,1 |
| 40 à 59 ans | 33,9 | 33,3 | 34,4 | 23,3 | 22,6 | 24,0 | 25,6 | 25,0 | 26,2 | 30,0 | 29,6 | 30,4 |
| 60 à 79 ans | 25,8 | 25,2 | 26,4 | 19,3 | 18,9 | 19,7 | 19,8 | 18,9 | 20,7 | 22,3 | 21,5 | 23,1 |
| 6 à 79 ans | 39,6 | 39,2 | 40,1 | 24,1 | 23,3 | 24,9 | 28,0 | 27,3 | 28,7 | 32,5 | 31,9 | 33,1 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 56,4 | 55,9 | 56,8 | 49,7 | 48,8 | 50,6 | 50,8 | 49,8 | 51,8 | 54,8 | 53,8 | 55,8 |
| 12 à 19 ans | 52,5 | 51,7 | 53,4 | 43,4 | 39,2 | 47,6 | 45,3 | 44,0 | 46,6 | 49,9 | 48,3 | 51,5 |
| 20 à 39 ans | 44,1 | 43,1 | 45,1 | 32,7 | 31,7 | 33,7 | 34,5 | 33,0 | 36,0 | 40,0 | 38,1 | 41,9 |
| 40 à 59 ans | 36,6 | 35,6 | 37,6 | 26,8 | 25,6 | 28,0 | 28,3 | 26,9 | 29,7 | 31,6 | 30,9 | 32,3 |
| 60 à 79 ans | 27,6 | 26,6 | 28,5 | 19,4 | 18,1 | 20,7 | 21,0 | 19,7 | 22,3 | 24,7 | 22,4 | 27,0 |
| 6 à 79 ans | 42,5 | 41,9 | 43,1 | 27,1 | 26,2 | 28,0 | 30,0 | 29,3 | 30,7 | 35,1 | 33,5 | 36,7 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 50,4 | 50,0 | 50,8 | 44,5 | 43,8 | 45,2 | 45,3 | 44,6 | 46,0 | 47,4 | 46,6 | 48,2 |
| 12 à 19 ans | 44,5 | 43,8 | 45,1 | 36,3 | 34,7 | 37,9 | 38,4 | 37,4 | 39,4 | 41,1 | 40,5 | 41,7 |
| 20 à 39 ans | 38,4 | 37,6 | 39,3 | 31,4 | 30,2 | 32,6 | 32,4 | 31,5 | 33,3 | 35,5 | 34,6 | 36,5 |
| 40 à 59 ans | 31,2 | 30,5 | 31,8 | 22,4 | 20,7 | 24,1 | 23,5 | 22,8 | 24,2 | 28,4 | 26,3 | 30,5 |
| 60 à 79 ans | 24,1 | 23,6 | 24,6 | 18,8 | 18,0 | 19,6 | 19,6 | 19,2 | 20,0 | 21,5 | 20,4 | 22,6 |
| 6 à 79 ans | 36,7 | 36,1 | 37,2 | 22,8 | 22,3 | 23,3 | 25,0 | 24,1 | 25,9 | 30,9 | 30,3 | 31,5 |

| | Puissance aérobique maximale prévue moyenne | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| | 50 ^e percentile | | 75 ^e percentile | | 90 ^e percentile | | 95 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance |
| | | de à | | de à | | de à | | de à | | de à | | de à |
| millilitres par kilogramme par minute | | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 54,0 | 52,2 | 55,8 | 57,2 | 56,8 | 57,6 | 59,3 | 59,1 | 59,5 | 59,8 | 59,5 | 60,1 |
| 12 à 19 ans | 48,8 | 48,1 | 49,5 | 54,0 | 53,7 | 54,3 | 57,1 | 56,6 | 57,6 | 58,1 | 57,5 | 58,7 |
| 20 à 39 ans | 40,6 | 39,9 | 41,3 | 45,6 | 44,4 | 46,8 | 50,6 | 49,9 | 51,3 | 52,3 | 51,3 | 53,3 |
| 40 à 59 ans | 33,0 | 32,1 | 33,9 | 38,8 | 38,1 | 39,5 | 41,9 | 40,6 | 43,2 | 45,2 | 44,0 | 46,4 |
| 60 à 79 ans | 25,3 | 23,7 | 26,9 | 28,9 | 28,5 | 29,3 | 31,4 | 30,5 | 32,3 | 32,7 | 28,4 | 37,0 |
| 6 à 79 ans | 39,3 | 38,8 | 39,8 | 46,2 | 45,4 | 47,0 | 52,6 | 51,8 | 53,4 | 56,3 | 55,8 | 56,8 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 57,2 | 56,4 | 58,0 | 59,1 | 58,7 | 59,5 | 59,8 | 59,4 | 60,2 | 60,2 | 60,0 | 60,4 |
| 12 à 19 ans | 53,6 | 52,8 | 54,4 | 56,4 | 55,7 | 57,1 | 58,1 | 57,5 | 58,7 | 60,0 | 58,9 | 61,1 |
| 20 à 39 ans | 44,0 | 42,7 | 45,3 | 49,4 | 48,6 | 50,2 | 52,0 | 51,2 | 52,8 | 54,2 | 51,2 | 57,2 |
| 40 à 59 ans | 38,2 | 36,5 | 39,9 | 40,0 | 39,6 | 40,4 | 44,5 | 43,3 | 45,7 | 46,3 | 44,4 | 48,2 |
| 60 à 79 ans | 27,6 | 26,6 | 28,6 | 30,2 | 29,5 | 30,9 | 32,5 | 27,7 | 37,3 | 37,3 | 35,6 | 39,0 |
| 6 à 79 ans | 42,1 | 41,0 | 43,2 | 50,1 | 49,5 | 50,7 | 55,9 | 55,0 | 56,8 | 58,2 | 57,8 | 58,6 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 50,4 | 50,1 | 50,7 | 52,3 | 50,9 | 53,7 | 56,2 | 55,8 | 56,6 | 56,8 | 56,4 | 57,2 |
| 12 à 19 ans | 43,2 | 42,3 | 44,1 | 48,0 | 47,3 | 48,7 | 53,0 | 51,4 | 54,6 | 54,0 | 53,5 | 54,5 |
| 20 à 39 ans | 38,1 | 37,1 | 39,1 | 40,8 | 39,9 | 41,7 | 45,2 | 43,7 | 46,7 | 47,1 | 44,4 | 49,8 |
| 40 à 59 ans | 31,0 | 30,3 | 31,7 | 34,6 | 34,2 | 35,0 | 37,2 | 35,8 | 38,6 | 40,4 | 38,4 | 42,4 |
| 60 à 79 ans | 23,1 | 22,6 | 23,6 | 27,6 | 26,4 | 28,8 | 29,2 | 28,8 | 29,6 | 30,8 | 28,6 | 33,0 |
| 6 à 79 ans | 36,4 | 35,8 | 37,0 | 41,8 | 41,1 | 42,5 | 48,4 | 47,5 | 49,3 | 51,1 | 50,5 | 51,7 |

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1).

L'équation pour la puissance aérobique maximale prévue n'a pas été validée pour les enfants de 6 à 14 ans.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 37

Ratio du meilleur volume expiratoire maximal en une seconde à la meilleure capacité vitale forcée de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

| | Ratio du meilleur volume expiratoire maximal en une seconde à la meilleure capacité vitale forcée | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | Moyenne | | 5 ^e percentile | | 10 ^e percentile | | 25 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à | | de | à |
| | ratio | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 0,846 | 0,839 | 0,852 | 0,738 | 0,719 | 0,757 | 0,769 | 0,759 | 0,779 | 0,813 | 0,807 | 0,819 |
| 12 à 19 ans | 0,840 | 0,835 | 0,845 | 0,717 | 0,708 | 0,726 | 0,754 | 0,746 | 0,762 | 0,798 | 0,791 | 0,805 |
| 20 à 39 ans | 0,804 | 0,797 | 0,811 | 0,690 | 0,666 | 0,714 | 0,723 | 0,711 | 0,735 | 0,767 | 0,759 | 0,775 |
| 40 à 59 ans | 0,762 | 0,755 | 0,768 | 0,642 | 0,621 | 0,663 | 0,680 | 0,668 | 0,692 | 0,726 | 0,720 | 0,732 |
| 60 à 79 ans | 0,729 | 0,725 | 0,733 | 0,583 | 0,561 | 0,605 | 0,631 | 0,618 | 0,644 | 0,696 | 0,692 | 0,700 |
| 6 à 79 ans | 0,784 | 0,779 | 0,789 | 0,648 | 0,637 | 0,659 | 0,693 | 0,685 | 0,701 | 0,741 | 0,735 | 0,747 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 0,835 | 0,825 | 0,845 | 0,723 | 0,696 | 0,750 | 0,760 | 0,735 | 0,785 | 0,806 | 0,797 | 0,815 |
| 12 à 19 ans | 0,826 | 0,816 | 0,836 | 0,712 | 0,692 | 0,732 | 0,749 | 0,737 | 0,761 | 0,785 | 0,776 | 0,794 |
| 20 à 39 ans | 0,794 | 0,781 | 0,806 | 0,666 | 0,627 | 0,705 | 0,711 | 0,687 | 0,735 | 0,756 | 0,742 | 0,770 |
| 40 à 59 ans | 0,764 | 0,755 | 0,773 | 0,643 | 0,615 | 0,671 | 0,679 | 0,653 | 0,705 | 0,724 | 0,712 | 0,736 |
| 60 à 79 ans | 0,716 | 0,708 | 0,725 | 0,553 | 0,506 | 0,600 | 0,605 | 0,591 | 0,619 | 0,686 | 0,674 | 0,698 |
| 6 à 79 ans | 0,778 | 0,771 | 0,785 | 0,643 | 0,630 | 0,656 | 0,685 | 0,667 | 0,703 | 0,735 | 0,728 | 0,742 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 0,856 | 0,849 | 0,862 | 0,756 | 0,740 | 0,772 | 0,778 | 0,769 | 0,787 | 0,821 | 0,817 | 0,825 |
| 12 à 19 ans | 0,854 | 0,849 | 0,860 | 0,717 | 0,708 | 0,726 | 0,765 | 0,752 | 0,778 | 0,815 | 0,809 | 0,821 |
| 20 à 39 ans | 0,815 | 0,806 | 0,824 | 0,707 | 0,682 | 0,732 | 0,737 | 0,720 | 0,754 | 0,779 | 0,767 | 0,791 |
| 40 à 59 ans | 0,760 | 0,753 | 0,766 | 0,622 | 0,581 | 0,663 | 0,680 | 0,665 | 0,695 | 0,727 | 0,722 | 0,732 |
| 60 à 79 ans | 0,741 | 0,734 | 0,748 | 0,609 | 0,569 | 0,649 | 0,658 | 0,639 | 0,677 | 0,704 | 0,695 | 0,713 |
| 6 à 79 ans | 0,790 | 0,785 | 0,796 | 0,661 | 0,643 | 0,679 | 0,698 | 0,687 | 0,709 | 0,745 | 0,736 | 0,754 |

| | Ratio du meilleur volume expiratoire maximal en une seconde à la meilleure capacité vitale forcée | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | 50 ^e percentile | | 75 ^e percentile | | 90 ^e percentile | | 95 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à | | de | à |
| | ratio | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 0,848 | 0,840 | 0,856 | 0,885 | 0,876 | 0,894 | 0,917 | 0,912 | 0,922 | 0,939 | 0,929 | 0,949 |
| 12 à 19 ans | 0,845 | 0,836 | 0,854 | 0,888 | 0,882 | 0,894 | 0,923 | 0,917 | 0,929 | 0,940 | 0,935 | 0,945 |
| 20 à 39 ans | 0,805 | 0,798 | 0,812 | 0,845 | 0,841 | 0,849 | 0,882 | 0,869 | 0,895 | 0,910 | 0,896 | 0,924 |
| 40 à 59 ans | 0,774 | 0,767 | 0,781 | 0,808 | 0,802 | 0,814 | 0,835 | 0,827 | 0,843 | 0,852 | 0,844 | 0,860 |
| 60 à 79 ans | 0,741 | 0,734 | 0,748 | 0,782 | 0,778 | 0,786 | 0,810 | 0,804 | 0,816 | 0,828 | 0,817 | 0,839 |
| 6 à 79 ans | 0,791 | 0,787 | 0,795 | 0,833 | 0,827 | 0,839 | 0,874 | 0,867 | 0,881 | 0,904 | 0,897 | 0,911 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 0,837 | 0,828 | 0,846 | 0,876 | 0,868 | 0,884 | 0,910 | 0,903 | 0,917 | 0,920 | 0,915 | 0,925 |
| 12 à 19 ans | 0,830 | 0,818 | 0,842 | 0,875 | 0,864 | 0,886 | 0,907 | 0,897 | 0,917 | 0,932 | 0,920 | 0,944 |
| 20 à 39 ans | 0,801 | 0,787 | 0,815 | 0,837 | 0,827 | 0,847 | 0,862 | 0,849 | 0,875 | 0,891 | 0,876 | 0,906 |
| 40 à 59 ans | 0,777 | 0,767 | 0,787 | 0,811 | 0,803 | 0,819 | 0,845 | 0,834 | 0,856 | 0,857 | 0,849 | 0,865 |
| 60 à 79 ans | 0,729 | 0,718 | 0,740 | 0,778 | 0,769 | 0,787 | 0,804 | 0,796 | 0,812 | 0,823 | 0,809 | 0,837 |
| 6 à 79 ans | 0,788 | 0,781 | 0,795 | 0,830 | 0,821 | 0,839 | 0,862 | 0,855 | 0,869 | 0,891 | 0,881 | 0,901 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 0,860 | 0,850 | 0,870 | 0,895 | 0,888 | 0,902 | 0,930 | 0,914 | 0,946 | 0,947 | 0,939 | 0,955 |
| 12 à 19 ans | 0,865 | 0,859 | 0,871 | 0,900 | 0,893 | 0,907 | 0,930 | 0,921 | 0,939 | 0,945 | 0,932 | 0,958 |
| 20 à 39 ans | 0,812 | 0,800 | 0,824 | 0,855 | 0,848 | 0,862 | 0,904 | 0,882 | 0,926 | 0,918 | 0,901 | 0,935 |
| 40 à 59 ans | 0,772 | 0,765 | 0,779 | 0,801 | 0,794 | 0,808 | 0,825 | 0,817 | 0,833 | 0,841 | 0,836 | 0,846 |
| 60 à 79 ans | 0,750 | 0,738 | 0,762 | 0,787 | 0,779 | 0,795 | 0,816 | 0,810 | 0,822 | 0,832 | 0,818 | 0,846 |
| 6 à 79 ans | 0,793 | 0,790 | 0,796 | 0,840 | 0,834 | 0,846 | 0,887 | 0,878 | 0,896 | 0,916 | 0,907 | 0,925 |

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 38
Meilleur volume expiratoire maximal en une seconde de la population à domicile, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2007 à 2009

| | Meilleur volume expiratoire maximal en une seconde | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| | Moyenne | | 5 ^e percentile | | 10 ^e percentile | | 25 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance |
| | de à | | de à | | de à | | de à | | de à | | de à | |
| | litres | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 1,86 | 1,82 | 1,90 | 1,19 | 1,14 | 1,24 | 1,28 | 1,21 | 1,35 | 1,51 | 1,44 | 1,58 |
| 12 à 19 ans | 3,45 | 3,40 | 3,50 | 2,26 | 2,12 | 2,40 | 2,50 | 2,43 | 2,57 | 2,87 | 2,81 | 2,93 |
| 20 à 39 ans | 3,66 | 3,59 | 3,74 | 2,54 | 2,44 | 2,64 | 2,73 | 2,65 | 2,81 | 3,05 | 2,98 | 3,12 |
| 40 à 59 ans | 3,11 | 3,05 | 3,18 | 2,00 | 1,85 | 2,15 | 2,19 | 2,10 | 2,28 | 2,56 | 2,48 | 2,64 |
| 60 à 79 ans | 2,43 | 2,37 | 2,49 | 1,39 | 1,30 | 1,48 | 1,60 | 1,50 | 1,70 | 1,92 | 1,87 | 1,97 |
| 6 à 79 ans | 3,13 | 3,08 | 3,17 | 1,66 | 1,61 | 1,71 | 1,95 | 1,89 | 2,01 | 2,47 | 2,42 | 2,52 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 1,88 | 1,81 | 1,94 | 1,22 | 1,15 | 1,29 | 1,29 | 1,19 | 1,39 | 1,57 | 1,47 | 1,67 |
| 12 à 19 ans | 3,73 | 3,63 | 3,84 | 2,24 | 2,09 | 2,39 | 2,44 | 2,34 | 2,54 | 3,02 | 2,81 | 3,23 |
| 20 à 39 ans | 4,17 | 4,06 | 4,29 | 3,03 | 2,83 | 3,23 | 3,30 | 3,09 | 3,51 | 3,79 | 3,68 | 3,90 |
| 40 à 59 ans | 3,62 | 3,52 | 3,72 | 2,53 | 2,23 | 2,83 | 2,85 | 2,67 | 3,03 | 3,20 | 3,09 | 3,31 |
| 60 à 79 ans | 2,84 | 2,74 | 2,95 | 1,63 | 1,43 | 1,83 | 1,97 | 1,78 | 2,16 | 2,41 | 2,29 | 2,53 |
| 6 à 79 ans | 3,57 | 3,50 | 3,65 | 1,87 | 1,75 | 1,99 | 2,28 | 2,16 | 2,40 | 3,02 | 2,94 | 3,10 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 1,84 | 1,79 | 1,89 | 1,17 | 1,11 | 1,23 | 1,27 | 1,20 | 1,34 | 1,47 | 1,43 | 1,51 |
| 12 à 19 ans | 3,15 | 3,10 | 3,20 | 2,30 | 2,08 | 2,52 | 2,54 | 2,45 | 2,63 | 2,83 | 2,77 | 2,89 |
| 20 à 39 ans | 3,12 | 3,07 | 3,18 | 2,40 | 2,32 | 2,48 | 2,54 | 2,44 | 2,64 | 2,80 | 2,72 | 2,88 |
| 40 à 59 ans | 2,61 | 2,55 | 2,67 | 1,76 | 1,67 | 1,85 | 2,06 | 1,98 | 2,14 | 2,32 | 2,27 | 2,37 |
| 60 à 79 ans | 2,05 | 2,02 | 2,09 | 1,26 | 1,11 | 1,41 | 1,48 | 1,41 | 1,55 | 1,79 | 1,74 | 1,84 |
| 6 à 79 ans | 2,68 | 2,64 | 2,71 | 1,53 | 1,48 | 1,58 | 1,79 | 1,74 | 1,84 | 2,25 | 2,20 | 2,30 |

| | Meilleur volume expiratoire maximal en une seconde | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| | 50 ^e percentile | | 75 ^e percentile | | 90 ^e percentile | | 95 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance |
| | de à | | de à | | de à | | de à | | de à | | de à | |
| | litres | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 1,81 | 1,75 | 1,87 | 2,17 | 2,12 | 2,22 | 2,46 | 2,37 | 2,55 | 2,68 | 2,59 | 2,77 |
| 12 à 19 ans | 3,36 | 3,30 | 3,42 | 3,90 | 3,81 | 3,99 | 4,60 | 4,43 | 4,77 | 4,87 | 4,74 | 5,00 |
| 20 à 39 ans | 3,59 | 3,49 | 3,69 | 4,30 | 4,19 | 4,41 | 4,70 | 4,51 | 4,89 | 5,01 | 4,84 | 5,18 |
| 40 à 59 ans | 3,05 | 2,98 | 3,12 | 3,65 | 3,57 | 3,73 | 4,18 | 3,97 | 4,39 | 4,46 | 4,33 | 4,59 |
| 60 à 79 ans | 2,36 | 2,30 | 2,42 | 2,91 | 2,81 | 3,01 | 3,45 | 3,32 | 3,58 | 3,70 | 3,54 | 3,86 |
| 6 à 79 ans | 3,09 | 3,05 | 3,13 | 3,75 | 3,70 | 3,80 | 4,39 | 4,31 | 4,47 | 4,68 | 4,53 | 4,83 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 1,85 | 1,74 | 1,96 | 2,19 | 2,13 | 2,25 | 2,44 | 2,33 | 2,55 | 2,61 | 2,52 | 2,70 |
| 12 à 19 ans | 3,77 | 3,66 | 3,88 | 4,43 | 4,34 | 4,52 | 4,86 | 4,73 | 4,99 | 5,15 | 4,96 | 5,34 |
| 20 à 39 ans | 4,27 | 4,14 | 4,40 | 4,52 | 4,35 | 4,69 | 4,98 | 4,81 | 5,15 | 5,11 | 4,93 | 5,29 |
| 40 à 59 ans | 3,62 | 3,54 | 3,70 | 4,03 | 3,85 | 4,21 | 4,46 | 4,33 | 4,59 | 4,56 | 4,39 | 4,73 |
| 60 à 79 ans | 2,91 | 2,81 | 3,01 | 3,31 | 3,18 | 3,44 | 3,72 | 3,57 | 3,87 | 3,85 | 3,73 | 3,97 |
| 6 à 79 ans | 3,69 | 3,61 | 3,77 | 4,29 | 4,17 | 4,41 | 4,68 | 4,53 | 4,83 | 4,95 | 4,83 | 5,07 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 1,77 | 1,71 | 1,83 | 2,14 | 2,05 | 2,23 | 2,48 | 2,35 | 2,61 | 2,69 | 2,56 | 2,82 |
| 12 à 19 ans | 3,20 | 3,12 | 3,28 | 3,48 | 3,42 | 3,54 | 3,74 | 3,64 | 3,84 | 3,87 | 3,74 | 4,00 |
| 20 à 39 ans | 3,10 | 3,04 | 3,16 | 3,42 | 3,35 | 3,49 | 3,72 | 3,58 | 3,86 | 3,88 | 3,76 | 4,00 |
| 40 à 59 ans | 2,62 | 2,55 | 2,69 | 2,94 | 2,85 | 3,03 | 3,25 | 3,16 | 3,34 | 3,42 | 3,34 | 3,50 |
| 60 à 79 ans | 2,07 | 2,03 | 2,11 | 2,36 | 2,31 | 2,41 | 2,65 | 2,56 | 2,74 | 2,74 | 2,67 | 2,81 |
| 6 à 79 ans | 2,70 | 2,65 | 2,75 | 3,14 | 3,08 | 3,20 | 3,49 | 3,43 | 3,55 | 3,71 | 3,61 | 3,81 |

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 39
Meilleure capacité vitale forcée de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

| | Meilleure capacité vitale forcée | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| | Moyenne | | 5 ^e percentile | | 10 ^e percentile | | 25 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance |
| | | de à | | de à | | de à | | de à | | de à | | de à |
| | litres | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 2,20 | 2,15 | 2,25 | 1,34 | 1,27 | 1,41 | 1,51 | 1,42 | 1,60 | 1,79 | 1,71 | 1,87 |
| 12 à 19 ans | 4,13 | 4,05 | 4,21 | 2,69 | 2,54 | 2,84 | 2,94 | 2,84 | 3,04 | 3,45 | 3,35 | 3,55 |
| 20 à 39 ans | 4,59 | 4,49 | 4,69 | 3,03 | 2,85 | 3,21 | 3,35 | 3,19 | 3,51 | 3,77 | 3,67 | 3,87 |
| 40 à 59 ans | 4,09 | 4,01 | 4,18 | 2,65 | 2,54 | 2,76 | 2,87 | 2,79 | 2,95 | 3,41 | 3,30 | 3,52 |
| 60 à 79 ans | 3,34 | 3,25 | 3,42 | 2,02 | 1,86 | 2,18 | 2,34 | 2,28 | 2,40 | 2,68 | 2,61 | 2,75 |
| 6 à 79 ans | 4,00 | 3,93 | 4,06 | 2,20 | 2,13 | 2,27 | 2,55 | 2,50 | 2,60 | 3,19 | 3,11 | 3,27 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 2,26 | 2,18 | 2,34 | 1,35 | 1,23 | 1,47 | 1,52 | 1,40 | 1,64 | 1,85 | 1,75 | 1,95 |
| 12 à 19 ans | 4,53 | 4,38 | 4,67 | 2,70 | 2,50 | 2,90 | 3,04 | 2,85 | 3,23 | 3,72 | 3,55 | 3,89 |
| 20 à 39 ans | 5,28 | 5,14 | 5,42 | 3,80 | 3,49 | 4,11 | 4,14 | 3,93 | 4,35 | 4,78 | 4,57 | 4,99 |
| 40 à 59 ans | 4,75 | 4,63 | 4,87 | 3,46 | 3,04 | 3,88 | 3,71 | 3,52 | 3,90 | 4,16 | 3,97 | 4,35 |
| 60 à 79 ans | 3,96 | 3,84 | 4,09 | 2,62 | 2,46 | 2,78 | 2,91 | 2,69 | 3,13 | 3,38 | 3,20 | 3,56 |
| 6 à 79 ans | 4,61 | 4,51 | 4,71 | 2,49 | 2,41 | 2,57 | 3,03 | 2,85 | 3,21 | 3,94 | 3,82 | 4,06 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 2,15 | 2,09 | 2,21 | 1,34 | 1,28 | 1,40 | 1,47 | 1,37 | 1,57 | 1,71 | 1,61 | 1,81 |
| 12 à 19 ans | 3,70 | 3,65 | 3,75 | 2,67 | 2,45 | 2,89 | 2,91 | 2,85 | 2,97 | 3,30 | 3,24 | 3,36 |
| 20 à 39 ans | 3,85 | 3,77 | 3,93 | 2,84 | 2,68 | 3,00 | 3,02 | 2,83 | 3,21 | 3,46 | 3,34 | 3,58 |
| 40 à 59 ans | 3,44 | 3,37 | 3,51 | 2,45 | 2,35 | 2,55 | 2,67 | 2,57 | 2,77 | 3,02 | 2,93 | 3,11 |
| 60 à 79 ans | 2,76 | 2,70 | 2,82 | 1,74 | 1,53 | 1,95 | 2,04 | 1,85 | 2,23 | 2,42 | 2,35 | 2,49 |
| 6 à 79 ans | 3,39 | 3,35 | 3,43 | 2,02 | 1,93 | 2,11 | 2,38 | 2,33 | 2,43 | 2,89 | 2,85 | 2,93 |

| | Meilleure capacité vitale forcée | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| | 50 ^e percentile | | 75 ^e percentile | | 90 ^e percentile | | 95 ^e percentile | | | | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance | Estimation | Intervalle de confiance |
| | | de à | | de à | | de à | | de à | | de à | | de à |
| | litres | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 2,15 | 2,09 | 2,21 | 2,58 | 2,51 | 2,65 | 2,97 | 2,89 | 3,05 | 3,16 | 3,07 | 3,25 |
| 12 à 19 ans | 3,94 | 3,87 | 4,01 | 4,79 | 4,66 | 4,92 | 5,53 | 5,37 | 5,69 | 5,90 | 5,73 | 6,07 |
| 20 à 39 ans | 4,45 | 4,30 | 4,60 | 5,35 | 5,22 | 5,48 | 5,98 | 5,87 | 6,09 | 6,28 | 6,10 | 6,46 |
| 40 à 59 ans | 3,97 | 3,85 | 4,09 | 4,74 | 4,57 | 4,91 | 5,48 | 5,29 | 5,67 | 5,91 | 5,68 | 6,14 |
| 60 à 79 ans | 3,22 | 3,13 | 3,31 | 3,94 | 3,82 | 4,06 | 4,60 | 4,38 | 4,82 | 5,00 | 4,86 | 5,14 |
| 6 à 79 ans | 3,92 | 3,85 | 3,99 | 4,81 | 4,70 | 4,92 | 5,58 | 5,45 | 5,71 | 5,98 | 5,90 | 6,06 |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 2,26 | 2,15 | 2,37 | 2,62 | 2,53 | 2,71 | 2,97 | 2,90 | 3,04 | 3,15 | 3,04 | 3,26 |
| 12 à 19 ans | 4,56 | 4,42 | 4,70 | 5,34 | 5,18 | 5,50 | 5,89 | 5,72 | 6,06 | 6,15 | 5,88 | 6,42 |
| 20 à 39 ans | 5,31 | 5,15 | 5,47 | 5,86 | 5,73 | 5,99 | 6,26 | 6,09 | 6,43 | 6,58 | 6,37 | 6,79 |
| 40 à 59 ans | 4,67 | 4,49 | 4,85 | 5,28 | 5,12 | 5,44 | 5,91 | 5,68 | 6,14 | 6,28 | 6,02 | 6,54 |
| 60 à 79 ans | 3,95 | 3,82 | 4,08 | 4,53 | 4,40 | 4,66 | 5,00 | 4,87 | 5,13 | 5,24 | 5,04 | 5,44 |
| 6 à 79 ans | 4,69 | 4,52 | 4,86 | 5,40 | 5,28 | 5,52 | 5,98 | 5,90 | 6,06 | 6,30 | 6,13 | 6,47 |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 2,08 | 2,01 | 2,15 | 2,52 | 2,42 | 2,62 | 2,97 | 2,82 | 3,12 | 3,16 | 2,99 | 3,33 |
| 12 à 19 ans | 3,69 | 3,62 | 3,76 | 4,09 | 3,97 | 4,21 | 4,46 | 4,32 | 4,60 | 4,82 | 4,51 | 5,13 |
| 20 à 39 ans | 3,84 | 3,76 | 3,92 | 4,24 | 4,18 | 4,30 | 4,68 | 4,56 | 4,80 | 4,87 | 4,74 | 5,00 |
| 40 à 59 ans | 3,47 | 3,37 | 3,57 | 3,81 | 3,72 | 3,90 | 4,14 | 4,01 | 4,27 | 4,41 | 4,31 | 4,51 |
| 60 à 79 ans | 2,77 | 2,71 | 2,83 | 3,17 | 3,08 | 3,26 | 3,44 | 3,34 | 3,54 | 3,57 | 3,47 | 3,67 |
| 6 à 79 ans | 3,44 | 3,38 | 3,50 | 3,90 | 3,83 | 3,97 | 4,32 | 4,26 | 4,38 | 4,64 | 4,51 | 4,77 |

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 40
Distribution de la population à domicile d'après l'état dentaire, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

| | État dentaire | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|--|-------------------------|------------|--|-------------------------|------------|
| | Denté — les deux maxillaires | | | Denté — maxillaires supérieure seulement | | | Denté — maxillaires inférieure seulement | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à | | de | à |
| | pourcentage | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 à 19 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 à 39 ans | 99,3 | 98,9 | 99,8 | F | ... | ... | F | ... | ... |
| 40 à 59 ans | 88,4 | 84,0 | 92,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 ^E | 3,7 | 10,9 |
| 60 à 79 ans | 62,9 | 53,5 | 72,2 | F | ... | ... | 15,1 | 11,3 | 19,0 |
| 6 à 79 ans | 89,6 | 86,8 | 92,5 | F | ... | ... | 5,1^E | 3,4 | 6,8 |
| Hommes | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 à 19 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 à 39 ans | 99,7 | 99,2 | 100,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | F | ... | ... |
| 40 à 59 ans | 89,0 | 84,5 | 93,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 ^E | 2,4 | 11,0 |
| 60 à 79 ans | 60,9 | 51,2 | 70,6 | F | ... | ... | 16,5 ^E | 10,7 | 22,3 |
| 6 à 79 ans | 89,9 | 87,2 | 92,7 | F | ... | ... | 5,0^E | 3,1 | 6,8 |
| Femmes | | | | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 à 19 ans | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 à 39 ans | 99,0 | 98,3 | 99,8 | F | ... | ... | F | ... | ... |
| 40 à 59 ans | 87,7 | 83,0 | 92,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 ^E | 4,4 | 11,3 |
| 60 à 79 ans | 64,7 | 54,9 | 74,5 | F | ... | ... | 13,9 ^E | 8,8 | 19,0 |
| 6 à 79 ans | 89,4 | 86,3 | 92,5 | F | ... | ... | 5,2^E | 3,4 | 7,1 |

| | État dentaire | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------|-------------------------|------------|
| | Édenté avec un ou plusieurs implants | | | Édenté | | |
| | Estimation | Intervalle de confiance | | Estimation | Intervalle de confiance | |
| | | de | à | | de | à |
| | pourcentage | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 à 19 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 à 39 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | F | ... | ... |
| 40 à 59 ans | F | ... | ... | 4,4 ^E | 2,7 | 6,0 |
| 60 à 79 ans | F | ... | ... | 20,8 | 14,7 | 26,9 |
| 6 à 79 ans | 0,2^E | 0,1 | 0,2 | 5,0 | 3,7 | 6,4 |
| Hommes | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 à 19 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 à 39 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | F | ... | ... |
| 40 à 59 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 ^E | 2,2 | 6,4 |
| 60 à 79 ans | F | ... | ... | 22,1 | 15,0 | 29,2 |
| 6 à 79 ans | F | ... | ... | 5,0 | 3,5 | 6,5 |
| Femmes | | | | | | |
| 6 à 11 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 à 19 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 à 39 ans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | F | ... | ... |
| 40 à 59 ans | F | ... | ... | 4,4 ^E | 2,3 | 6,6 |
| 60 à 79 ans | F | ... | ... | 19,6 ^E | 13,2 | 26,0 |
| 6 à 79 ans | F | ... | ... | 5,1 | 3,7 | 6,4 |

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

^F trop peu fiable pour être publié (données avec un coefficient de variation (CV) de plus de 33,3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage)

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.