

Enquête canadienne sur les mesures de la santé : tableaux de données du cycle 1



2007 à 2009



Statistique
Canada

Statistics
Canada

Canada

Comment obtenir d'autres renseignements

Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l'ensemble des données et des services de Statistique Canada, visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca. Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel à infostats@statcan.gc.ca ou par téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros suivants :

Centre de contact national de Statistique Canada

Numéros sans frais (Canada et États-Unis) :

Service de renseignements	1-800-263-1136
Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants	1-800-363-7629
Télécopieur	1-877-287-4369

Appels locaux ou internationaux :

Service de renseignements	1-613-951-8116
Télécopieur	1-613-951-0581

Programme des services de dépôt

Service de renseignements	1-800-635-7943
Télécopieur	1-800-565-7757

Comment accéder à ce produit

Le produit n° 82-623-X au catalogue est disponible gratuitement sous format électronique. Pour obtenir un exemplaire, il suffit de visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca et de parcourir par « Ressource clé » > « Publications ».

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s'est doté de *normes de service à la clientèle* que les employés observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi publiées sur le site www.statcan.gc.ca sous « À propos de nous » > « Offrir des services aux Canadiens ».

Statistique Canada

Division des mesures physiques de la santé

Enquête canadienne sur les mesures de la santé : tableaux de données du cycle 1

2007 à 2009

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2010

Tous droits réservés. Le contenu de la présente publication électronique peut être reproduit en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, sans autre permission de Statistique Canada, sous réserve que la reproduction soit effectuée uniquement à des fins d'étude privée, de recherche, de critique, de compte rendu ou en vue d'en préparer un résumé destiné aux journaux et/ou à des fins non commerciales. Statistique Canada doit être citée comme suit : Source (ou « Adapté de », s'il y a lieu) : Statistique Canada, année de publication, nom du produit, numéro au catalogue, volume et numéro, période de référence et page(s). Autrement, il est interdit de reproduire le contenu de la présente publication, ou de l'emmagasiner dans un système d'extraction, ou de le transmettre sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, reproduction électronique, mécanique, photographique, pour quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable des Services d'octroi de licences, Division des services à la clientèle, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Août 2010

N° 82-623-X au catalogue, n° 2

ISSN 1920-6569

Périodicité : irrégulière

Ottawa

This publication is also available in English.

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

Information pour l'utilisateur

Signes conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada :

- . indisponible pour toute période de référence
- .. indisponible pour une période de référence précise
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- 0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
- 0^s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie
- p provisoire
- r révisé
- x confidentiel en vertu des dispositions de la *Loi sur la statistique*
- E à utiliser avec prudence
- F trop peu fiable pour être publié

Table des matières

Introduction

7

Tableaux statistiques

1	Distribution de la population à domicile selon la pression diastolique au repos moyenne, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	9
2	Distribution de la population à domicile selon la pression systolique au repos moyenne, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	10
3	Distribution de la population à domicile selon la fréquence cardiaque au repos moyenne, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	11
4	Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives à la tension artérielle, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	12
5	Population à domicile qui a autodéclaré avoir reçu un diagnostic d'hypertension ou prendre des médicaments pour l'hypertension, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	13
6	Force de préhension totale de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	14
7	Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives à la force de préhension, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	15
8	Nombre de redressements assis partiels effectués par la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	16
9	Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives aux redressements assis partiels, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	17
10	Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives à la santé du dos, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	18
11	Mesure de la flexion du tronc effectuée par la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	19
12	Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives à la flexion du tronc, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	20
13	Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives aux aptitudes musculosquelettiques, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	21
14	Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives à l'aptitude aérobie, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	22
15	Circonférence de la taille mesurée de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	23
16	Circonférence des hanches mesurée de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	24
17	Ratio de la taille aux hanches mesuré de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	25
18	Distribution de la population à domicile dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30kg/m ² , selon la mesure moyenne du pli cutané du biceps, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	26
19	Distribution de la population à domicile dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30kg/m ² , selon la mesure moyenne du pli cutané du triceps, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	27

Table des matières – suite

20	Distribution de la population à domicile dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30kg/m ² , selon la mesure moyenne du pli cutané sous-scapulaire, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	28
21	Distribution de la population à domicile dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30kg/m ² , selon la mesure moyenne du pli cutané de la crête iliaque, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	29
22	Distribution de la population à domicile dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30kg/m ² , selon la mesure moyenne du pli cutané du mollet, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	30
23	Distribution de la population à domicile dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30kg/m ² , selon la somme des mesures des cinq plis cutanés, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	31
24	Poids autodéclaré de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	32
25	Taille autodéclarée de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	33
26	Distribution de la population à domicile âgée de 6 à 17 ans, d'après les normes relatives à l'indice de masse corporelle basées sur les entrées autodéclarées — méthode CDC, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	34
27	Distribution de la population à domicile âgée de 6 à 17 ans, d'après les normes relatives à l'indice de masse corporelle basées sur les entrées autodéclarées — méthode Cole, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	34
28	Distribution de la population à domicile âgée de 18 à 79 ans, d'après les normes relatives à l'indice de masse corporelle basées sur les entrées autodéclarées, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	35
29	Taille en position assise mesurée de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	36
30	Taille en position debout mesurée de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	37
31	Poids mesuré de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	38
32	Indice de masse corporelle mesuré de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	39
33	Distribution de la population à domicile âgée de 6 à 17 ans, d'après les normes relatives à l'indice de masse corporelle basées sur les entrées mesurées — méthode CDC, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	40
34	Distribution de la population à domicile âgée de 6 à 17 ans, d'après les normes relatives à l'indice de masse corporelle basées sur les entrées mesurées — méthode Cole, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	40
35	Distribution de la population à domicile âgée de 18 à 79 ans, d'après les normes relatives à l'indice de masse corporelle basées sur les entrées mesurées, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	41
36	Puissance aérobique maximale prévue moyenne de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	42
37	Ratio du meilleur volume expiratoire maximal en une seconde à la meilleure capacité vitale forcée de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	43
38	Meilleur volume expiratoire maximal en une seconde de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	44
39	Meilleure capacité vitale forcée de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	45
40	Distribution de la population à domicile d'après l'état dentaire, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	46
41	Distribution de la population à domicile selon la concentration de vitamine B12 dans le sérum, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	47

Table des matières – suite

42	Distribution de la population à domicile selon la concentration de vitamine D dans le plasma, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	48
43	Distribution de la population à domicile selon la concentration d'homocystéine dans le plasma, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	49
44	Distribution de la population à domicile selon la concentration de folate dans les globules rouges du sang total, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	50
45	Distribution de la population à domicile (échantillon total) selon la concentration de cholestérol total dans le sérum, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	51
46	Distribution de la population à domicile (sous-échantillon à jeun) selon la concentration de cholestérol total dans le sérum, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	52
47	Distribution de la population à domicile (sous-échantillon à jeun) selon la concentration de triglycérides dans le sérum, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	53
48	Distribution de la population à domicile (sous-échantillon à jeun) selon la concentration de lipoprotéines de basse densité dans le sérum, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	54
49	Distribution de la population à domicile (échantillon total) selon la concentration de lipoprotéines de haute densité dans le sérum, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	55
50	Distribution de la population à domicile (sous-échantillon à jeun) selon la concentration de lipoprotéines de haute densité dans le sérum, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	56
51	Distribution de la population à domicile (échantillon total) selon le ratio du cholestérol total aux lipoprotéines de haute densité dans le sérum, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	57
52	Distribution de la population à domicile (sous-échantillon à jeun) selon le ratio du cholestérol total aux lipoprotéines de haute densité dans le sérum, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	58
53	Distribution de la population à domicile (sous-échantillon à jeun) selon la concentration d'apolipoprotéine A1 dans le sérum, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	59
54	Distribution de la population à domicile (sous-échantillon à jeun) selon la concentration d'apolipoprotéine B dans le sérum, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	60
55	Distribution de la population à domicile (sous-échantillon à jeun) selon la concentration de glucose dans le plasma, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	61
56	Prévalence de l'anticorps de l'hépatite A dans la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	62
57	Prévalence de l'anticorps de surface de l'hépatite B dans la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	62
58	Distribution de la population à domicile selon la concentration de bisphénol A dans l'urine, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	63
59	Distribution de la population à domicile selon la concentration de bisphénol A dans l'urine normalisée par la créatinine dans l'urine, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	64
60	Distribution de la population à domicile selon la concentration de plomb dans le sang total en micromoles per litre, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	65
61	Distribution de la population à domicile selon la concentration de plomb dans le sang total en microgrammes par décilitre, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	66
62	Distribution de la population à domicile selon la concentration de mercure dans le sang total en nanomoles par litre, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	67
63	Distribution de la population à domicile selon la concentration de mercure dans le sang total en microgrammes par litre, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	68

Table des matières – suite

64	Distribution de la population à domicile selon la concentration de cadmium dans le sang total en nanomoles par litre, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	69
65	Distribution de la population à domicile selon la concentration de cadmium dans le sang total en microgrammes par litre, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009	70
Qualité des données, concepts et méthodologie		
	Methodologie	71

Introduction

L'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) est l'enquête nationale la plus exhaustive sur les mesures physiques de la santé jamais menée au pays. La collecte des données se déroule en deux étapes, à savoir une interview en personne au domicile du répondant, suivie d'une visite à la clinique mobile de l'ECMS, où l'on prend des mesures physiques et prélève des échantillons de sang et d'urine.

L'ECMS dresse un portrait de la santé des Canadiens, grâce à la collecte de données de base touchant diverses préoccupations, y compris la santé cardiovasculaire, l'état nutritionnel, les maladies chroniques et l'activité physique, ainsi que l'exposition à des maladies infectieuses et à des contaminants environnementaux. L'enquête recueille des renseignements sur la santé qui ne pourraient être obtenus autrement ou qui pourraient être déclarés incorrectement par autodéclaration ou d'après les dossiers médicaux.

L'ECMS est menée par Statistique Canada, en partenariat avec Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada.

Au cours du cycle 1 de l'ECMS, des mesures physiques ont été recueillies dans 15 sites au Canada, auprès d'environ 5 600 personnes représentant la population canadienne de 6 à 79 ans. Les sites de collecte étaient situés dans cinq provinces : le Nouveau-Brunswick, le Québec, l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique. La collecte a commencé en mars 2007 et s'est poursuivie jusqu'en février 2009. Les données sont représentatives à l'échelon national.

La présente publication fait partie de la diffusion des données de l'ECMS, qui a commencée en janvier 2010. Les données sont présentées selon le sexe et les groupes d'âge suivants (selon la mesure) : 6 à 11 ans, 12 à 19 ans, 20 à 39 ans, 40 à 59 ans et 60 à 79 ans.

Chaque diffusion de données sera accompagnée de tableaux, d'un guide de l'utilisateur, de documentation sur les variables dérivées et de plusieurs articles publiés dans les *Rapports sur la santé*, une publication trimestrielle de Statistique Canada revue par les pairs.

Pour obtenir plus de renseignements sur l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé :

Numéro sans frais :	1-888-253-1087
Courriel :	chms-ecms@statcan.gc.ca
Appareil de télécommunication pour malentendants :	1-866-753-7083
Site Web de Statistique Canada :	www.statcan.gc.ca/ecms

Tableaux statistiques

Tableau 1
Distribution de la population à domicile selon la pression diastolique au repos moyenne, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2007 à 2009

	Pression diastolique au repos moyenne											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
millimètres de mercure												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	61	60	61	49	48	50	51	49	53	56	55	57
12 à 19 ans	63	62	64	52	51	53	54	53	55	58	57	59
20 à 39 ans	69	68	71	56	55	57	58	57	59	63	62	64
40 à 59 ans	75	74	76	61	60	62	64	63	65	68	67	69
60 à 79 ans	73	72	73	57	55	59	61	60	62	67	66	68
6 à 79 ans	70	70	71	55	54	56	58	57	59	63	62	64
Hommes												
6 à 11 ans	61	59	62	49	47	51	51	49	53	56	55	57
12 à 19 ans	63	62	64	51	50	52	53	52	54	58	56	60
20 à 39 ans	72	70	73	56	54	58	59	56	62	66	64	68
40 à 59 ans	78	76	79	65	62	68	67	65	69	72	70	74
60 à 79 ans	74	73	75	58	57	59	62	61	63	68	67	69
6 à 79 ans	72	71	73	55	54	56	58	56	60	65	64	66
Femmes												
6 à 11 ans	60	60	61	50	48	52	52	50	54	55	54	56
12 à 19 ans	63	62	64	53	51	55	55	54	56	57	56	58
20 à 39 ans	67	66	69	55	53	57	58	57	59	62	61	63
40 à 59 ans	72	71	73	60	59	61	62	61	63	66	65	67
60 à 79 ans	72	71	73	57	54	60	60	58	62	65	63	67
6 à 79 ans	69	68	69	55	54	56	57	56	58	62	61	63

	Pression diastolique au repos moyenne											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
millimètres de mercure												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	61	60	62	65	64	66	70	69	71	72	70	74
12 à 19 ans	63	61	65	68	66	70	72	71	73	75	74	76
20 à 39 ans	69	68	70	75	73	77	81	79	83	84	82	86
40 à 59 ans	74	73	75	81	79	83	86	85	87	89	87	91
60 à 79 ans	73	72	74	78	77	79	83	82	84	88	86	90
6 à 79 ans	70	69	71	77	76	78	83	82	84	86	85	87
Hommes												
6 à 11 ans	60	59	61	64	63	65	69	67	71	72	69	75
12 à 19 ans	63	61	65	68	66	70	72	70	74	77	74	80
20 à 39 ans	72	70	74	78	76	80	82	80	84	86	83	89
40 à 59 ans	78	76	80	83	82	84	87	86	88	90	88	92
60 à 79 ans	75	74	76	80	79	81	84	83	85	88	86	90
6 à 79 ans	73	72	74	79	78	80	84	83	85	87	86	88
Femmes												
6 à 11 ans	61	60	62	65	64	66	70	69	71	73	71	75
12 à 19 ans	63	61	65	68	66	70	72	71	73	74	73	75
20 à 39 ans	66	64	68	72	70	74	78	75	81	83	80	86
40 à 59 ans	71	70	72	77	76	78	82	80	84	87	84	90
60 à 79 ans	72	71	73	77	76	78	83	81	85	88	86	90
6 à 79 ans	68	67	69	74	73	75	80	79	81	85	83	87

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*)

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 2
Distribution de la population à domicile selon la pression systolique au repos moyenne, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2007 à 2009

	Pression systolique au repos moyenne											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
millimètres de mercure												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	93	92	94	82	80	84	84	83	85	88	87	89
12 à 19 ans	99	98	101	86	84	88	89	88	90	93	91	95
20 à 39 ans	106	104	107	90	89	91	93	92	94	98	96	100
40 à 59 ans	114	112	116	95	94	96	99	97	101	105	104	106
60 à 79 ans	125	124	126	102	100	104	105	104	106	113	112	114
6 à 79 ans	110	109	111	89	88	90	92	91	93	99	98	100
Hommes												
6 à 11 ans	93	92	94	81	78	84	84	82	86	88	87	89
12 à 19 ans	101	99	103	87	86	88	89	88	90	94	92	96
20 à 39 ans	110	108	112	93	91	95	98	96	100	103	101	105
40 à 59 ans	116	115	118	99	98	100	102	101	103	108	106	110
60 à 79 ans	122	121	124	100	98	102	104	102	106	113	111	115
6 à 79 ans	112	111	113	90	89	91	94	93	95	102	101	103
Femmes												
6 à 11 ans	93	93	94	82	80	84	84	82	86	88	87	89
12 à 19 ans	98	96	99	86	84	88	89	87	91	92	90	94
20 à 39 ans	101	100	103	87	85	89	91	90	92	94	92	96
40 à 59 ans	112	110	114	93	92	94	96	94	98	102	101	103
60 à 79 ans	127	125	129	103	101	105	105	103	107	115	113	117
6 à 79 ans	108	107	110	88	87	89	91	90	92	97	96	98

	Pression systolique au repos moyenne											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
millimètres de mercure												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	93	92	94	98	96	100	103	102	104	106	104	108
12 à 19 ans	98	96	100	105	103	107	111	108	114	115	113	117
20 à 39 ans	105	103	107	113	111	115	119	117	121	125	122	128
40 à 59 ans	113	111	115	121	118	124	131	127	135	138	135	141
60 à 79 ans	123	121	125	134	132	136	146	143	149	156	151	161
6 à 79 ans	108	106	110	118	117	119	129	127	131	138	136	140
Hommes												
6 à 11 ans	92	91	93	97	95	99	102	100	104	105	102	108
12 à 19 ans	101	99	103	106	104	108	113	110	116	116	113	119
20 à 39 ans	110	108	112	117	115	119	122	119	125	127	124	130
40 à 59 ans	116	114	118	123	121	125	131	126	136	138	132	144
60 à 79 ans	121	119	123	132	129	135	142	140	144	146	143	149
6 à 79 ans	111	110	112	119	117	121	129	128	130	137	135	139
Femmes												
6 à 11 ans	93	92	94	99	98	100	104	103	105	107	105	109
12 à 19 ans	97	96	98	102	101	103	109	107	111	112	109	115
20 à 39 ans	100	98	102	107	104	110	115	113	117	119	115	123
40 à 59 ans	110	108	112	119	116	122	130	125	135	138	134	142
60 à 79 ans	125	123	127	136	133	139	152	146	158	163	154	172
6 à 79 ans	105	104	106	117	115	119	129	126	132	139	136	142

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 3
Distribution de la population à domicile selon la fréquence cardiaque au repos moyenne, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2007 à 2009

	Fréquence cardiaque au repos moyenne											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
battements par minute												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	80	79	81	63	61	65	67	66	68	72	71	73
12 à 19 ans	75	74	76	56	54	58	60	59	61	67	65	69
20 à 39 ans	69	68	71	53	51	55	56	54	58	62	60	64
40 à 59 ans	67	66	68	51	49	53	55	54	56	61	60	62
60 à 79 ans	66	65	67	50	48	52	53	52	54	59	58	60
6 à 79 ans	69	69	70	52	51	53	56	55	57	62	61	63
Hommes												
6 à 11 ans	77	76	78	62	60	64	64	62	66	69	68	70
12 à 19 ans	74	72	76	55	52	58	59	57	61	65	62	68
20 à 39 ans	68	66	70	50	47	53	54	52	56	61	60	62
40 à 59 ans	66	65	67	49	47	51	52	49	55	59	57	61
60 à 79 ans	65	64	66	48	46	50	52	51	53	58	57	59
6 à 79 ans	68	67	69	50	48	52	54	53	55	60	59	61
Femmes												
6 à 11 ans	82	81	83	66	64	68	69	67	71	75	73	77
12 à 19 ans	75	74	76	58	55	61	61	59	63	68	66	70
20 à 39 ans	71	69	73	55	53	57	58	56	60	63	61	65
40 à 59 ans	68	67	69	54	53	55	57	55	59	62	61	63
60 à 79 ans	66	65	68	52	50	54	54	53	55	59	58	60
6 à 79 ans	71	70	71	54	53	55	58	57	59	63	62	64

	Fréquence cardiaque au repos moyenne											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
battements par minute												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	79	78	80	87	86	88	93	91	95	98	96	100
12 à 19 ans	74	73	75	82	80	84	91	90	92	95	94	96
20 à 39 ans	69	67	71	76	75	77	83	81	85	88	85	91
40 à 59 ans	66	65	67	73	71	75	81	79	83	85	83	87
60 à 79 ans	65	64	66	72	71	73	78	76	80	84	81	87
6 à 79 ans	68	67	69	76	75	77	84	83	85	89	88	90
Hommes												
6 à 11 ans	76	75	77	85	83	87	91	89	93	96	93	99
12 à 19 ans	73	71	75	81	78	84	92	88	96	97	95	99
20 à 39 ans	68	66	70	75	73	77	81	79	83	85	81	89
40 à 59 ans	65	64	66	72	70	74	80	77	83	84	81	87
60 à 79 ans	65	64	66	71	69	73	78	75	81	86	80	92
6 à 79 ans	67	66	68	75	74	76	83	81	85	88	87	89
Femmes												
6 à 11 ans	82	80	84	88	86	90	96	93	99	100	96	104
12 à 19 ans	74	73	75	83	81	85	91	89	93	94	92	96
20 à 39 ans	71	69	73	77	76	78	84	82	86	89	86	92
40 à 59 ans	67	66	68	74	72	76	82	80	84	86	84	88
60 à 79 ans	66	64	68	73	71	75	79	77	81	83	80	86
6 à 79 ans	70	69	71	77	76	78	85	84	86	89	87	91

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 4
Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives à la tension artérielle, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2007 à 2009

	Normes relatives à la tension artérielle								
	Dans les limites souhaitables			Dans les limites souhaitables, mais dans les valeurs supérieures de la normale			Au-dessus des limites souhaitables		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à
pourcentage									
Les deux sexes									
18 à 39 ans	95,4	93,8	96,9	3,9 ^E	2,6	5,1	F
40 à 59 ans	82,4	78,8	85,9	11,3	8,7	13,9	5,3	4,0	6,6
60 à 79 ans	66,7	64,2	69,1	15,7	12,8	18,6	13,8	11,6	15,9
18 à 79 ans	84,4	82,8	86,0	9,2	8,0	10,4	5,1	4,5	5,8
Hommes									
18 à 39 ans	93,9	91,3	96,5	4,9 ^E	2,9	7,0	F
40 à 59 ans	78,0	72,6	83,3	14,7	10,5	18,9	6,5	4,7	8,4
60 à 79 ans	69,7	65,3	74,0	15,2	10,5	19,9	13,8	10,7	16,9
18 à 79 ans	82,8	80,7	84,9	10,8	9,1	12,6	5,7	4,7	6,7
Femmes									
18 à 39 ans	96,8	94,6	99,1	F	F
40 à 59 ans	86,7	82,5	90,8	7,9 ^E	5,2	10,7	4,0 ^E	2,2	5,9
60 à 79 ans	63,9	60,7	67,1	16,1	13,9	18,3	13,8	10,3	17,3
18 à 79 ans	86,0	83,9	88,1	7,6	6,2	9,0	4,6	3,5	5,6

	Normes relatives à la tension artérielle								
	Modérément élevée			Élevée			Très élevée		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à
pourcentage									
Les deux sexes									
18 à 39 ans	F	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40 à 59 ans	0,7 ^E	0,3	1,1	F	0,0	0,0	0,0
60 à 79 ans	2,4 ^E	1,4	3,4	F	0,0	0,0	0,0
18 à 79 ans	0,8^E	0,5	1,1	F	0,0	0,0	0,0
Hommes									
18 à 39 ans	F	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40 à 59 ans	F	F	0,0	0,0	0,0
60 à 79 ans	1,0 ^E	0,4	1,6	F	0,0	0,0	0,0
18 à 79 ans	0,5^E	0,2	0,9	F	0,0	0,0	0,0
Femmes									
18 à 39 ans	F	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40 à 59 ans	F	F	0,0	0,0	0,0
60 à 79 ans	3,6 ^E	1,9	5,3	F	0,0	0,0	0,0
18 à 79 ans	1,0^E	0,5	1,6	F	0,0	0,0	0,0

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

^F trop peu fiable pour être publié (données avec un coefficient de variation (CV) de plus de 33,3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage)

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de D. Abbott, N. Campbell, P. Carruthers-Czyzewski, A. Chockalingam, M. David, G. Dunkley, E. Ellis, J.G. Fodor, D. McKay, V.R. Ramsden, 1994, « Guidelines for measurement of blood pressure, follow-up, and lifestyle counselling », *Canadian Journal of Public Health*, Vol. 85 (suppl 2), p. S29 à S35.

Population à domicile âgée de 18 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 5
Population à domicile qui a autodéclaré avoir reçu un diagnostic d'hypertension ou prendre des médicaments pour l'hypertension, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Diagnostiqué d'hypertension ou prend des médicaments pour l'hypertension			Non diagnostiqué d'hypertension et ne prend pas des médicaments pour l'hypertension		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à
pourcentage						
Les deux sexes						
12 à 19 ans	F	99,7	99,4	99,9
20 à 39 ans	2,5 ^E	1,4	3,5	97,5	96,5	98,6
40 à 59 ans	17,3	14,1	20,6	82,7	79,4	85,9
60 à 79 ans	48,0	43,7	52,3	52,0	47,7	56,3
12 à 79 ans	15,8	14,7	17,0	84,2	83,0	85,3
Hommes						
12 à 19 ans	F	99,7	99,5	100,0
20 à 39 ans	2,6 ^E	1,2	4,0	97,4	96,0	98,8
40 à 59 ans	18,9	13,3	24,5	81,1	75,5	86,7
60 à 79 ans	47,9	42,5	53,3	52,1	46,7	57,5
12 à 79 ans	16,1	14,5	17,7	83,9	82,3	85,5
Femmes						
12 à 19 ans	F	99,7	99,2	100,1
20 à 39 ans	F	97,6	95,9	99,4
40 à 59 ans	15,8	13,5	18,2	84,2	81,8	86,5
60 à 79 ans	48,1	42,5	53,7	51,9	46,3	57,5
12 à 79 ans	15,6	14,3	16,9	84,4	83,1	85,7

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6% à 33,3%)

^F trop peu fiable pour être publié (données avec un coefficient de variation (CV) de plus de 33,3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage)

Note(s) : Population à domicile âgée de 12 à 79 ans.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 6
Force de préhension totale de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Force de préhension totale											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	kilogrammes											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	26	25	28	12	11	13	14	12	16	19	17	21
12 à 19 ans	62	60	64	35	33	37	39	37	41	46	44	48
20 à 39 ans	76	75	78	43	42	44	47	46	48	56	54	58
40 à 59 ans	73	72	75	42	39	45	47	46	48	54	53	55
60 à 79 ans	61	60	62	34	32	36	36	35	37	44	43	45
6 à 79 ans	67	66	69	28	26	30	37	36	38	49	48	50
Hommes												
6 à 11 ans	27	26	29	12	10	14	16	13	19	21	18	24
12 à 19 ans	72	69	74	35	32	38	39	35	43	51	48	54
20 à 39 ans	97	94	99	72	66	78	77	74	80	87	82	92
40 à 59 ans	93	91	95	68	64	72	73	69	77	83	81	85
60 à 79 ans	78	75	80	51	45	57	57	52	62	68	65	71
6 à 79 ans	84	82	86	29	27	31	46	43	49	74	72	76
Femmes												
6 à 11 ans	25	24	27	12	11	13	13	12	14	19	18	20
12 à 19 ans	51	49	53	35	31	39	39	37	41	43	41	45
20 à 39 ans	56	54	58	39	36	42	43	42	44	49	48	50
40 à 59 ans	54	53	55	38	35	41	42	39	45	48	46	50
60 à 79 ans	46	45	47	31	30	32	34	33	35	39	38	40
6 à 79 ans	51	50	52	26	24	28	34	32	36	44	43	45

	Force de préhension totale											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	kilogrammes											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	26	25	27	32	30	34	39	37	41	43	41	45
12 à 19 ans	56	53	59	75	72	78	93	90	96	102	98	106
20 à 39 ans	73	69	77	98	95	101	109	105	113	117	113	121
40 à 59 ans	68	65	71	92	90	94	106	104	108	113	110	116
60 à 79 ans	57	54	60	78	75	81	90	87	93	97	93	101
6 à 79 ans	63	61	65	88	86	90	104	102	106	111	108	114
Hommes												
6 à 11 ans	27	25	29	33	31	35	40	38	42	43	41	45
12 à 19 ans	73	70	76	89	84	94	102	98	106	108	102	114
20 à 39 ans	98	95	101	106	103	109	117	113	121	123	117	129
40 à 59 ans	92	90	94	103	101	105	113	110	116	116	114	118
60 à 79 ans	79	76	82	89	86	92	98	94	102	103	100	106
6 à 79 ans	88	86	90	101	99	103	111	108	114	117	115	119
Femmes												
6 à 11 ans	24	22	26	31	29	33	38	35	41	43	40	46
12 à 19 ans	51	49	53	58	55	61	66	64	68	70	68	72
20 à 39 ans	56	54	58	63	60	66	70	67	73	74	71	77
40 à 59 ans	54	53	55	60	59	61	67	65	69	71	68	74
60 à 79 ans	45	44	46	52	50	54	59	57	61	63	61	65
6 à 79 ans	52	51	53	59	58	60	66	64	68	71	69	73

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 7

Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives à la force de préhension, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Normes relatives à la force de préhension								
	À améliorer			Acceptable			Bien		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à
pourcentage									
Les deux sexes									
15 à 19 ans	32,9	24,1	41,8	19,5	14,8	24,2	23,0	19,1	27,0
20 à 39 ans	26,1	22,1	30,0	23,0	18,8	27,1	20,7	16,1	25,2
40 à 59 ans	18,2	15,1	21,3	17,4	13,6	21,1	24,1	19,6	28,5
60 à 69 ans	25,4	21,6	29,2	21,9	17,6	26,1	15,2	12,0	18,3
15 à 69 ans	23,4	20,4	26,3	20,2	17,1	23,4	21,5	19,2	23,8
Hommes									
15 à 19 ans	37,7	25,8	49,6	21,4	15,0	27,8	18,8 ^E	12,6	24,9
20 à 39 ans	20,7	14,8	26,7	21,5	16,3	26,8	23,6 ^E	14,8	32,4
40 à 59 ans	16,4	12,2	20,6	18,4	14,4	22,5	19,0 ^E	10,9	27,0
60 à 69 ans	28,4	23,8	32,9	29,6	25,6	33,6	17,7	12,4	22,9
15 à 69 ans	21,3	17,7	25,0	21,3	17,8	24,8	20,5	17,1	24,0
Femmes									
15 à 19 ans	28,8	20,4	37,2	17,8	13,2	22,5	26,8	21,8	31,9
20 à 39 ans	31,3	26,1	36,5	24,4	19,9	28,9	17,7	13,6	21,9
40 à 59 ans	20,0	15,2	24,8	16,3	12,0	20,7	29,1	23,8	34,4
60 à 69 ans	22,6	15,7	29,6	14,6 ^E	7,8	21,5	12,8	8,7	16,9
15 à 69 ans	25,4	21,2	29,5	19,2	16,0	22,5	22,5	20,5	24,5
	Normes relatives à la force de préhension								
	Très bien			Excellent					
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance				
		de	à		de	à			
	pourcentage								
Les deux sexes									
15 à 19 ans	14,5	11,2	17,7	10,0	7,5	12,6			
20 à 39 ans	18,9	15,6	22,2	11,4	7,9	14,9			
40 à 59 ans	23,3	19,3	27,3	17,0	12,3	21,7			
60 à 69 ans	17,6	13,5	21,6	20,0	17,2	22,8			
15 à 69 ans	20,2	18,8	21,5	14,7	11,5	17,9			
Hommes									
15 à 19 ans	12,6	9,2	15,9	9,6 ^E	5,2	14,0			
20 à 39 ans	21,2	15,6	26,7	13,0 ^E	7,5	18,5			
40 à 59 ans	24,8	20,3	29,3	21,3	15,6	27,0			
60 à 69 ans	12,2 ^E	6,6	17,9	12,1	8,6	15,7			
15 à 69 ans	20,8	18,9	22,7	16,0	12,1	20,0			
Femmes									
15 à 19 ans	16,1	11,2	21,0	10,4 ^E	6,5	14,4			
20 à 39 ans	16,7	12,4	21,0	9,8 ^E	5,0	14,6			
40 à 59 ans	21,9	16,6	27,2	12,7 ^E	7,0	18,5			
60 à 69 ans	22,5	16,8	28,3	27,4	21,0	33,8			
15 à 69 ans	19,5	16,8	22,3	13,4	10,3	16,5			

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)**Note(s)** : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de Société canadienne de physiologie de l'exercice, 2004, *Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (Guide du conseiller CPHV)*, 3e édition, Ottawa.Population à domicile âgée de 15 à 69 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).**Source(s)** : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 8
Nombre de redressements assis partiels effectués par la population à domicile, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2007 à 2009

	Nombre de redressements assis partiels											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	nombre											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	9	8	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 à 19 ans	19	18	20	0	-2	2	F	15	12	18
20 à 39 ans	16	16	17	0	0	0	0	0	0	F
40 à 59 ans	11	10	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 à 69 ans	4	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 à 69 ans	13	12	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hommes												
6 à 11 ans	8	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 à 19 ans	21	20	22	F	10 ^E	5	15	20	17	23
20 à 39 ans	20	19	21	0	0	0	0	-5	5	19	17	21
40 à 59 ans	15	13	16	0	0	0	0	0	0	0	-2	2
60 à 69 ans	6	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 à 69 ans	16	15	17	0	0	0	0	0	0	F
Femmes												
6 à 11 ans	10	8	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 à 19 ans	17	16	19	0	0	0	F	11	9	13
20 à 39 ans	13	12	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 à 59 ans	7	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 à 69 ans	3 ^E	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 à 69 ans	10	9	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Nombre de redressements assis partiels											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	nombre											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	6 ^E	4	8	18	15	21	25	24	26	25	25	25
12 à 19 ans	24	23	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
20 à 39 ans	23	21	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
40 à 59 ans	F	24	23	25	25	25	25	25	25	25
60 à 69 ans	0	0	0	0	-6	6	23	19	27	25	25	25
6 à 69 ans	15	13	17	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Hommes												
6 à 11 ans	5 ^E	2	8	15	11	19	25	23	27	25	25	25
12 à 19 ans	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
20 à 39 ans	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
40 à 59 ans	20	17	23	25	25	25	25	25	25	25	25	25
60 à 69 ans	0	0	0	F	25	24	26	25	25	25
6 à 69 ans	22	20	24	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Femmes												
6 à 11 ans	7 ^E	4	10	20	17	23	25	25	25	25	25	25
12 à 19 ans	22	19	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
20 à 39 ans	15	11	19	25	25	25	25	25	25	25	25	25
40 à 59 ans	0	0	0	16	11	21	25	25	25	25	25	25
60 à 69 ans	0	0	0	0	0	0	F	23	19	27
6 à 69 ans	6^E	3	9	23	22	24	25	25	25	25	25	25

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

^F trop peu fiable pour être publié (données avec un coefficient de variation (CV) de plus de 33,3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage)

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 69 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 9
Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives aux redressements assis partiels, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Normes relatives aux redressements assis partiels								
	À améliorer			Acceptable			Bien		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à
pourcentage									
Les deux sexes									
15 à 19 ans	20,9	16,7	25,0	8,6 ^E	4,9	12,3	7,6 ^E	4,9	10,3
20 à 39 ans	26,8	22,8	30,7	5,5 ^E	3,5	7,5	8,1	6,3	9,8
40 à 59 ans	47,8	43,3	52,4	6,5 ^E	4,2	8,8	7,2	5,0	9,4
60 à 69 ans	79,4	73,5	85,2	1,6 ^E	0,8	2,4	2,9 ^E	1,4	4,4
15 à 69 ans	41,0	37,7	44,2	5,7	4,7	6,8	7,1	5,8	8,3
Hommes									
15 à 19 ans	12,2 ^E	7,9	16,6	8,0 ^E	4,6	11,4	F
20 à 39 ans	14,7	10,2	19,2	3,9 ^E	2,0	5,8	6,5 ^E	4,1	8,9
40 à 59 ans	34,2	28,5	39,8	F	5,0 ^E	2,8	7,2
60 à 69 ans	73,9	67,8	79,9	F	2,8 ^E	1,1	4,5
15 à 69 ans	29,5	25,6	33,4	4,3^E	2,6	6,1	5,4	3,9	6,9
Femmes									
15 à 19 ans	28,7	21,4	36,0	9,2 ^E	4,5	13,9	9,1	6,6	11,6
20 à 39 ans	39,0	33,5	44,5	7,2 ^E	3,6	10,7	9,6	6,6	12,7
40 à 59 ans	61,8	54,6	69,1	8,1	5,6	10,6	9,5	6,5	12,5
60 à 69 ans	85,1	77,8	92,4	2,0 ^E	0,8	3,3	F
15 à 69 ans	52,5	48,5	56,6	7,1	5,8	8,4	8,7	7,0	10,4

	Normes relatives aux redressements assis partiels					
	Très bien			Excellent		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à
pourcentage						
Les deux sexes						
15 à 19 ans	12,6	9,9	15,3	50,3	43,5	57,1
20 à 39 ans	16,5	14,6	18,3	43,2	39,0	47,4
40 à 59 ans	13,5	10,1	16,9	24,9	22,7	27,1
60 à 69 ans	8,3 ^E	5,2	11,4	7,8 ^E	5,1	10,5
15 à 69 ans	14,0	12,0	16,0	32,3	29,6	34,9
Hommes						
15 à 19 ans	9,8 ^E	6,4	13,3	63,9	57,9	69,9
20 à 39 ans	19,5	14,5	24,5	55,5	49,2	61,7
40 à 59 ans	19,8	14,5	25,1	36,0	33,2	38,8
60 à 69 ans	10,4	7,4	13,4	11,7 ^E	7,7	15,7
15 à 69 ans	17,7	14,2	21,2	43,0	39,9	46,2
Femmes						
15 à 19 ans	15,0	11,0	19,0	38,0	26,0	50,0
20 à 39 ans	13,5	10,7	16,2	30,8	26,1	35,4
40 à 59 ans	7,1 ^E	3,9	10,3	13,5	10,3	16,7
60 à 69 ans	F	3,7 ^E	1,7	5,8
15 à 69 ans	10,2	8,5	12,0	21,4	18,6	24,1

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

^F trop peu fiable pour être publié (données avec un coefficient de variation (CV) de plus de 33,3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage)

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de Société canadienne de physiologie de l'exercice, 2004, *Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (Guide du conseiller CPHV)*, 3e édition, Ottawa.

Population à domicile âgée de 15 à 69 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 10
Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives à la santé du dos, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2007 à 2009

	Normes relatives à la santé du dos									
	À améliorer			Acceptable			Bien			
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		
		de	à		de	à		de	à	
pourcentage										
Les deux sexes										
15 à 19 ans	6,2 ^E	3,7	8,7	11,4	7,9	15,0	21,1	17,4	24,7	
20 à 39 ans	11,9	8,8	15,0	13,9	11,0	16,8	18,8	14,6	23,0	
40 à 59 ans	18,3	13,9	22,8	19,8	16,8	22,9	22,2	18,7	25,8	
60 à 69 ans	29,4	26,3	32,5	32,1	26,9	37,2	19,0	15,5	22,5	
15 à 69 ans	16,3	13,8	18,9	18,5	16,7	20,4	20,4	18,3	22,6	
Hommes										
15 à 19 ans	F	9,7 ^E	6,2	13,2	28,7	22,5	34,9	
20 à 39 ans	6,6 ^E	3,0	10,1	14,9	11,9	18,0	20,8	14,8	26,8	
40 à 59 ans	13,8	10,5	17,1	20,0	15,0	25,0	23,5	18,2	28,7	
60 à 69 ans	28,0	23,2	32,8	32,4	25,7	39,1	20,7	15,4	25,9	
15 à 69 ans	12,0	9,9	14,1	18,8	16,7	21,0	22,5	19,4	25,6	
Femmes										
15 à 19 ans	8,8 ^E	5,2	12,4	12,9 ^E	5,4	20,5	14,3 ^E	8,5	20,2	
20 à 39 ans	17,4	13,5	21,4	12,8	8,9	16,8	16,7	11,8	21,5	
40 à 59 ans	22,8 ^E	15,0	30,5	19,7	14,2	25,1	21,0	17,2	24,8	
60 à 69 ans	30,7	24,6	36,8	31,7	25,7	37,8	17,5	13,0	21,9	
15 à 69 ans	20,6	16,2	25,0	18,2	14,6	21,8	18,3	15,5	21,2	

	Normes relatives à la santé du dos					
	Très bien			Excellent		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à
pourcentage						
Les deux sexes						
15 à 19 ans	47,4	43,0	51,9	13,9	9,5	18,3
20 à 39 ans	38,8	35,7	41,9	16,6	13,9	19,3
40 à 59 ans	27,0	22,3	31,6	12,7	10,7	14,6
60 à 69 ans	14,4	10,6	18,2	5,1 ^E	3,3	6,8
15 à 69 ans	31,5	29,0	34,0	13,2	12,0	14,5
Hommes						
15 à 19 ans	51,1	44,9	57,3	7,3 ^E	3,3	11,3
20 à 39 ans	41,0	36,2	45,8	16,7	13,6	19,8
40 à 59 ans	25,5	19,8	31,3	17,2	14,0	20,4
60 à 69 ans	13,8	9,8	17,8	5,1 ^E	3,3	6,8
15 à 69 ans	32,0	29,4	34,6	14,6	13,3	16,0
Femmes						
15 à 19 ans	44,2	37,3	51,2	19,7 ^E	13,2	26,2
20 à 39 ans	36,5	32,2	40,9	16,5	13,3	19,7
40 à 59 ans	28,4	22,3	34,5	8,2 ^E	5,4	10,9
60 à 69 ans	15,0 ^E	9,9	20,1	5,1 ^E	2,2	8,0
15 à 69 ans	31,0	26,4	35,5	11,8	10,1	13,6

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

^F trop peu fiable pour être publié (données avec un coefficient de variation (CV) de plus de 33,3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage)

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de Société canadienne de physiologie de l'exercice, 2004, *Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (Guide du conseiller CPHV)*, 3e édition, Ottawa.

Population à domicile âgée de 15 à 69 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 11
Mesure de la flexion du tronc effectuée par la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Mesure de la flexion du tronc											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	centimètres											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	26,5	25,9	27,1	12,8	11,7	13,9	15,7	14,8	16,6	21,0	19,9	22,1
12 à 19 ans	25,7	25,0	26,4	8,7	7,5	9,9	12,8	12,0	13,6	18,0	16,6	19,4
20 à 39 ans	28,0	27,3	28,6	11,0	9,7	12,3	14,0	12,3	15,7	21,1	20,3	21,9
40 à 59 ans	27,0	26,0	27,9	8,4	6,6	10,2	12,2	9,7	14,7	20,2	19,0	21,4
60 à 69 ans	22,2	21,1	23,2	4,5 ^E	1,6	7,4	8,5	6,4	10,6	14,4	13,2	15,6
6 à 69 ans	26,6	26,2	26,9	9,0	7,7	10,3	12,4	11,4	13,4	20,0	19,5	20,5
Hommes												
6 à 11 ans	24,2	23,1	25,2	11,1	9,3	12,9	14,3	12,0	16,6	18,7	17,8	19,6
12 à 19 ans	22,2	21,3	23,2	8,3	7,1	9,5	10,8	9,2	12,4	15,7	14,4	17,0
20 à 39 ans	25,4	24,2	26,6	9,0	6,2	11,8	12,1	10,5	13,7	18,4	16,3	20,5
40 à 59 ans	25,1	24,1	26,1	7,1	5,4	8,8	10,6	8,6	12,6	18,7	17,2	20,2
60 à 69 ans	17,4	16,2	18,5	0,0	-1,5	1,5	4,6 ^E	2,0	7,2	10,0	8,5	11,5
6 à 69 ans	23,9	23,4	24,4	7,1	5,9	8,3	10,2	9,0	11,4	17,0	15,9	18,1
Femmes												
6 à 11 ans	29,0	28,3	29,6	14,2	13,4	15,0	18,4	15,7	21,1	24,9	23,6	26,2
12 à 19 ans	29,5	27,9	31,1	12,0	8,2	15,8	15,3	12,9	17,7	23,3	20,7	25,9
20 à 39 ans	30,6	30,2	31,1	14,4	13,3	15,5	17,7	15,3	20,1	25,5	24,3	26,7
40 à 59 ans	28,7	27,2	30,3	10,4	7,3	13,5	14,7 ^E	9,8	19,6	23,4	21,5	25,3
60 à 69 ans	26,9	25,6	28,2	12,3	11,0	13,6	14,4	13,2	15,6	21,4	19,9	22,9
6 à 69 ans	29,3	28,6	29,9	12,2	10,4	14,0	15,9	14,4	17,4	24,0	23,1	24,9

	Mesure de la flexion du tronc											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	centimètres											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	27,2	26,6	27,8	32,0	31,4	32,6	36,4	35,5	37,3	38,4	37,3	39,5
12 à 19 ans	25,5	24,7	26,3	32,7	31,0	34,4	39,0	37,5	40,5	43,0	41,5	44,5
20 à 39 ans	28,2	27,7	28,7	35,4	34,7	36,1	40,9	39,2	42,6	43,7	42,4	45,0
40 à 59 ans	27,7	26,8	28,6	34,1	33,4	34,8	39,0	37,9	40,1	42,3	40,4	44,2
60 à 69 ans	22,6	21,1	24,1	29,7	28,4	31,0	35,5	33,6	37,4	38,7	37,1	40,3
6 à 69 ans	27,2	26,8	27,6	33,6	33,2	34,0	39,2	38,7	39,7	42,6	42,0	43,2
Hommes												
6 à 11 ans	25,2	23,7	26,7	29,7	28,7	30,7	33,3	32,4	34,2	35,2	33,6	36,8
12 à 19 ans	23,1	21,7	24,5	28,6	27,3	29,9	33,8	32,4	35,2	36,6	35,0	38,2
20 à 39 ans	25,4	23,8	27,0	32,4	31,3	33,5	39,2	37,0	41,4	43,1	41,1	45,1
40 à 59 ans	25,2	24,0	26,4	32,9	31,3	34,5	37,6	35,4	39,8	41,9	37,7	46,1
60 à 69 ans	17,6	15,8	19,4	24,2	22,7	25,7	29,1	27,1	31,1	33,7	31,0	36,4
6 à 69 ans	24,2	23,6	24,8	30,9	30,5	31,3	36,3	35,4	37,2	40,6	39,2	42,0
Femmes												
6 à 11 ans	29,4	28,1	30,7	34,2	33,3	35,1	38,2	37,1	39,3	40,7	39,2	42,2
12 à 19 ans	28,9	26,6	31,2	37,4	35,4	39,4	43,0	41,3	44,7	47,0	44,5	49,5
20 à 39 ans	30,6	29,8	31,4	36,9	36,4	37,4	42,3	41,3	43,3	45,2	43,9	46,5
40 à 59 ans	29,8	28,4	31,2	35,2	34,0	36,4	39,6	38,5	40,7	42,6	40,9	44,3
60 à 69 ans	27,7	25,8	29,6	33,5	31,4	35,6	38,5	36,6	40,4	40,9	38,8	43,0
6 à 69 ans	29,7	28,9	30,5	36,0	35,3	36,7	40,7	39,8	41,6	43,3	42,6	44,0

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 69 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 12
Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives à la flexion du tronc, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2007 à 2009

	Normes relatives à la flexion du tronc									
	À améliorer			Acceptable			Bien			
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		
		de	à		de	à		de	à	
pourcentage										
Les deux sexes										
15 à 19 ans	47,5	40,4	54,5	15,7	13,4	18,0	14,9	11,9	17,8	
20 à 39 ans	37,3	34,1	40,4	20,7	17,3	24,1	16,0	13,1	18,9	
40 à 59 ans	24,2	19,8	28,5	20,4	17,0	23,8	19,5	15,6	23,4	
60 à 69 ans	35,1	30,4	39,7	16,6	14,1	19,2	18,4	15,3	21,6	
15 à 69 ans	32,6	30,2	35,0	19,6	17,7	21,5	17,6	16,1	19,1	
Hommes										
15 à 19 ans	48,5	41,9	55,1	19,6	13,3	25,8	18,5	12,5	24,5	
20 à 39 ans	42,6	37,1	48,0	18,1	14,2	22,0	16,5	11,8	21,2	
40 à 59 ans	20,0	15,9	24,1	21,9	17,8	26,0	18,8	15,3	22,3	
60 à 69 ans	40,7	35,7	45,6	16,7	13,3	20,0	18,8	14,4	23,1	
15 à 69 ans	33,7	30,8	36,7	19,6	17,4	21,7	17,9	15,5	20,3	
Femmes										
15 à 19 ans	46,5	34,8	58,3	12,2	9,1	15,3	11,6 ^E	7,7	15,5	
20 à 39 ans	31,8	27,8	35,7	23,4	17,8	29,1	15,5	12,0	19,0	
40 à 59 ans	28,2	21,7	34,8	18,9	14,2	23,6	20,2	14,2	26,2	
60 à 69 ans	29,5	21,6	37,5	16,6	12,6	20,6	18,1	13,6	22,5	
15 à 69 ans	31,4	27,4	35,4	19,7	16,9	22,5	17,4	14,9	19,9	

	Normes relatives à la flexion du tronc					
	Très bien			Excellent		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à
pourcentage						
Les deux sexes						
15 à 19 ans	12,6	8,5	16,7	9,4	6,6	12,1
20 à 39 ans	13,2	11,1	15,4	12,8	10,3	15,3
40 à 59 ans	19,1	16,9	21,2	16,8	14,2	19,5
60 à 69 ans	16,4	13,1	19,7	13,4	10,3	16,5
15 à 69 ans	16,0	14,4	17,5	14,2	12,8	15,7
Hommes						
15 à 19 ans	8,5 ^E	4,0	13,1	4,9 ^E	2,9	6,9
20 à 39 ans	11,5	7,8	15,3	11,3	8,4	14,3
40 à 59 ans	20,9	16,9	24,9	18,5	14,9	22,1
60 à 69 ans	17,7	12,1	23,3	6,2 ^E	3,5	8,9
15 à 69 ans	15,8	13,2	18,5	13,0	11,1	14,9
Femmes						
15 à 19 ans	16,3 ^E	9,5	23,0	13,4 ^E	8,1	18,6
20 à 39 ans	14,9	11,3	18,5	14,4	11,3	17,5
40 à 59 ans	17,3	13,7	21,0	15,3	11,8	18,7
60 à 69 ans	15,2	11,7	18,8	20,5 ^E	13,8	27,3
15 à 69 ans	16,1	13,5	18,7	15,4	12,9	17,9

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de Société canadienne de physiologie de l'exercice, 2004, *Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (Guide du conseiller CPHV)*, 3e édition, Ottawa.
 Population à domicile âgée de 15 à 69 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 13
Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives aux aptitudes musculosquelettiques, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Normes relatives aux aptitudes musculosquelettiques								
	À améliorer			Acceptable			Bien		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à
	pourcentage								
Les deux sexes									
15 à 19 ans	14,4 ^E	9,3	19,5	31,8	28,1	35,6	29,4	22,9	35,8
20 à 39 ans	10,6	8,3	13,0	30,0	26,3	33,8	30,1	26,6	33,5
40 à 59 ans	11,0	8,8	13,2	25,1	20,7	29,4	33,0	29,0	37,1
60 à 69 ans	17,3	13,5	21,0	31,6	27,7	35,6	31,7	27,3	36,1
15 à 69 ans	12,0	10,0	14,0	28,4	25,8	31,0	31,4	29,2	33,7
Hommes									
15 à 19 ans	9,8 ^E	4,5	15,1	35,9	28,9	43,0	29,7	20,8	38,7
20 à 39 ans	4,2 ^E	2,5	5,8	26,2	21,3	31,1	32,1	26,1	38,1
40 à 59 ans	5,3 ^E	3,0	7,6	23,9	18,8	28,9	29,6	23,6	35,6
60 à 69 ans	16,3	11,9	20,7	44,3	36,7	51,8	25,0	18,7	31,2
15 à 69 ans	6,6	5,1	8,2	28,4	25,0	31,7	30,0	27,4	32,5
Femmes									
15 à 19 ans	18,5 ^E	12,5	24,5	28,2	20,1	36,2	29,0	20,1	38,0
20 à 39 ans	17,2	12,7	21,6	33,9	29,0	38,9	28,0	23,1	32,9
40 à 59 ans	16,7	11,7	21,6	26,2	21,5	30,9	36,4	31,7	41,2
60 à 69 ans	18,1	13,2	23,1	19,8	14,5	25,0	38,0	33,1	42,9
15 à 69 ans	17,2	13,3	21,1	28,4	25,7	31,1	32,9	29,9	35,8

	Normes relatives aux aptitudes musculosquelettiques					
	Très bien			Excellent		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à
	pourcentage					
Les deux sexes						
15 à 19 ans	19,1	15,0	23,2	5,3 ^E	2,7	7,9
20 à 39 ans	23,3	20,8	25,7	6,0	4,2	7,8
40 à 59 ans	22,7	20,0	25,4	8,2	6,5	9,9
60 à 69 ans	15,8	12,6	18,9	3,7	2,9	4,4
15 à 69 ans	21,7	20,2	23,2	6,5	5,8	7,3
Hommes						
15 à 19 ans	20,0	15,0	25,1	4,5 ^E	1,8	7,2
20 à 39 ans	30,5	25,2	35,8	7,0 ^E	3,9	10,2
40 à 59 ans	28,6	24,1	33,2	12,6	9,1	16,2
60 à 69 ans	11,1 ^E	6,2	16,0	3,3 ^E	1,4	5,2
15 à 69 ans	26,4	23,5	29,3	8,6	7,3	9,9
Femmes						
15 à 19 ans	18,3	12,8	23,8	6,0 ^E	2,6	9,4
20 à 39 ans	15,9	13,1	18,7	4,9 ^E	2,5	7,3
40 à 59 ans	16,8	12,7	21,0	3,9 ^E	1,8	6,0
60 à 69 ans	20,2 ^E	13,6	26,7	4,0 ^E	2,0	6,0
15 à 69 ans	17,1	14,9	19,3	4,5	3,5	5,4

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de Société canadienne de physiologie de l'exercice, 2004, *Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (Guide du conseiller CPHV)*, 3e édition, Ottawa.

Population à domicile âgée de 15 à 69 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 14
Distribution de la population à domicile d'après les normes relatives à l'aptitude aérobie, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2007 à 2009

	Normes relatives à l'aptitude aérobie									
	À améliorer			Acceptable			Bien			
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		
		de	à		de	à		de	à	
pourcentage										
Les deux sexes										
15 à 19 ans	9,3 ^E	5,8	12,7	15,9	11,9	19,9	43,1	36,2	50,1	
20 à 39 ans	13,7	9,9	17,5	28,2	23,6	32,8	33,0	29,1	37,0	
40 à 59 ans	14,6	12,5	16,7	29,2	25,6	32,9	29,8	25,3	34,3	
60 à 69 ans	40,0	32,6	47,3	35,8	28,9	42,7	19,3	15,8	22,9	
15 à 69 ans	15,6	13,2	18,0	28,0	25,0	31,0	31,7	28,6	34,7	
Hommes										
15 à 19 ans	F	22,3	16,8	27,9	30,6	23,6	37,6	
20 à 39 ans	12,0 ^E	7,6	16,4	34,2	26,0	42,4	26,3	19,7	33,0	
40 à 59 ans	11,2 ^E	6,9	15,4	20,9	17,5	24,2	39,5	31,8	47,2	
60 à 69 ans	22,8 ^E	13,4	32,1	36,5	27,1	45,9	30,8	23,8	37,7	
15 à 69 ans	12,2	9,9	14,6	28,1	23,9	32,3	32,2	27,3	37,1	
Femmes										
15 à 19 ans	9,2 ^E	5,0	13,4	F	54,1	46,6	61,6	
20 à 39 ans	15,5 ^E	10,2	20,8	21,7	18,3	25,1	40,3	36,5	44,0	
40 à 59 ans	18,1	13,8	22,4	37,6	32,1	43,2	20,0	16,2	23,8	
60 à 69 ans	56,5	48,4	64,6	35,2	25,4	44,9	8,3 ^E	4,5	12,1	
15 à 69 ans	19,1	15,9	22,2	27,9	24,9	30,9	31,1	28,3	33,9	

	Normes relatives à l'aptitude aérobie					
	Très bien			Excellent		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à
pourcentage						
Les deux sexes						
15 à 19 ans	22,7	18,6	26,9	9,0 ^E	5,6	12,3
20 à 39 ans	17,6	13,6	21,6	7,5 ^E	4,2	10,9
40 à 59 ans	19,7	16,4	23,0	6,6	4,8	8,5
60 à 69 ans	4,1 ^E	1,8	6,4	F
15 à 69 ans	17,9	15,2	20,6	6,8	5,1	8,5
Hommes						
15 à 19 ans	24,9	20,6	29,1	12,9 ^E	7,9	17,9
20 à 39 ans	17,4 ^E	10,4	24,3	10,1 ^E	5,0	15,1
40 à 59 ans	20,8	15,4	26,2	7,6 ^E	4,4	10,8
60 à 69 ans	8,4 ^E	3,6	13,2	F
15 à 69 ans	18,7	14,5	22,9	8,7^E	5,8	11,6
Femmes						
15 à 19 ans	20,9	15,0	26,8	5,5 ^E	2,0	9,0
20 à 39 ans	17,8	13,1	22,5	4,8 ^E	2,7	6,9
40 à 59 ans	18,6	15,9	21,3	5,7 ^E	3,3	8,0
60 à 69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 à 69 ans	17,1	14,1	20,1	4,8^E	3,2	6,5

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

^F trop peu fiable pour être publié (données avec un coefficient de variation (CV) de plus de 33,3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage)

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de Société canadienne de physiologie de l'exercice, 2004, *Guide du conseiller en condition physique et habitudes de vie (Guide du conseiller CPHV)*, 3e édition, Ottawa.

Population à domicile âgée de 15 à 69 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 15
Circonférence de la taille mesurée de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Circonférence de la taille mesurée											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
centimètres												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	60,8	60,1	61,5	49,3	48,0	50,6	51,2	50,1	52,3	54,0	53,2	54,8
12 à 19 ans	76,2	74,4	77,9	61,3	60,5	62,1	63,1	62,2	64,0	67,4	66,5	68,3
20 à 39 ans	86,9	85,5	88,4	67,0	65,2	68,8	70,2	68,7	71,7	76,1	74,6	77,6
40 à 59 ans	93,4	91,9	94,9	70,4	68,5	72,3	75,0	73,6	76,4	82,9	81,6	84,2
60 à 79 ans	97,6	96,2	98,9	74,9	73,6	76,2	79,7	77,8	81,6	87,5	85,5	89,5
6 à 79 ans	87,7	86,5	88,9	60,7	59,9	61,5	66,7	65,9	67,5	75,2	74,2	76,2
Hommes												
6 à 11 ans	61,3	60,1	62,5	50,2	48,5	51,9	51,5	50,0	53,0	54,6	53,6	55,6
12 à 19 ans	77,5	75,2	79,8	61,5	59,1	63,9	64,1	62,7	65,5	67,8	66,2	69,4
20 à 39 ans	90,7	89,7	91,7	72,0	70,1	73,9	75,1	73,5	76,7	80,6	78,7	82,5
40 à 59 ans	98,7	96,8	100,7	80,9	78,9	82,9	84,0	82,2	85,8	90,9	88,4	93,4
60 à 79 ans	102,5	101,0	104,0	83,0	80,7	85,3	87,5	85,7	89,3	94,1	91,6	96,6
6 à 79 ans	91,5	90,4	92,6	61,2	60,1	62,3	68,8	67,7	69,9	80,3	79,0	81,6
Femmes												
6 à 11 ans	60,3	59,2	61,4	48,7	47,3	50,1	50,7	49,5	51,9	53,2	52,4	54,0
12 à 19 ans	74,8	73,0	76,5	61,0	60,3	61,7	62,5	61,4	63,6	67,4	66,2	68,6
20 à 39 ans	82,9	80,7	85,1	64,9	63,3	66,5	67,2	65,3	69,1	72,3	70,3	74,3
40 à 59 ans	88,1	86,1	90,1	68,1	66,8	69,4	70,5	68,4	72,6	76,7	75,2	78,2
60 à 79 ans	93,0	91,1	95,0	72,7	71,3	74,1	76,0	74,1	77,9	82,8	80,9	84,7
6 à 79 ans	83,9	82,2	85,6	60,0	59,3	60,7	65,3	64,4	66,2	72,5	71,0	74,0

	Circonférence de la taille mesurée											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
centimètres												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	58,7	57,9	59,5	65,7	64,5	66,9	74,2	71,5	76,9	81,5	78,0	85,0
12 à 19 ans	73,0	71,4	74,6	81,6	78,2	85,0	93,3	88,2	98,4	102,2	97,4	107,0
20 à 39 ans	84,5	82,5	86,5	96,0	92,6	99,4	105,5	103,3	107,7	113,6	111,0	116,2
40 à 59 ans	92,9	91,2	94,6	102,5	100,7	104,3	112,6	109,2	116,0	119,0	115,5	122,5
60 à 79 ans	96,4	94,8	98,0	107,2	105,5	108,9	115,6	114,2	117,0	121,5	118,7	124,3
6 à 79 ans	87,0	85,7	88,3	99,4	97,6	101,2	110,0	108,4	111,6	116,2	114,2	118,2
Hommes												
6 à 11 ans	59,4	57,9	60,9	66,0	64,6	67,4	74,4	71,6	77,2	81,2	77,9	84,5
12 à 19 ans	74,3	72,6	76,0	85,1	81,2	89,0	96,6	89,6	103,6	103,1	97,2	109,0
20 à 39 ans	89,0	87,0	91,0	99,5	97,8	101,2	108,0	104,9	111,1	115,7	111,3	120,1
40 à 59 ans	97,5	95,7	99,3	104,3	102,3	106,3	114,0	110,7	117,3	122,5	118,3	126,7
60 à 79 ans	101,0	98,6	103,4	110,6	109,3	111,9	118,1	116,9	119,3	124,0	120,2	127,8
6 à 79 ans	92,4	90,9	93,9	102,3	100,7	103,9	112,4	110,4	114,4	118,9	117,6	120,2
Femmes												
6 à 11 ans	57,4	56,5	58,3	65,0	63,2	66,8	73,8	68,6	79,0	81,8	74,6	89,0
12 à 19 ans	72,2	70,8	73,6	79,1	74,3	83,9	91,6	87,4	95,8	101,2	93,3	109,1
20 à 39 ans	79,1	75,9	82,3	90,7	86,8	94,6	103,7	101,5	105,9	110,2	105,5	114,9
40 à 59 ans	85,6	83,4	87,8	97,5	94,0	101,0	110,5	104,2	116,8	116,2	111,3	121,1
60 à 79 ans	92,0	89,7	94,3	101,0	97,5	104,5	111,4	109,0	113,8	117,4	111,1	123,7
6 à 79 ans	81,9	80,0	83,8	94,2	91,4	97,0	105,8	102,2	109,4	113,0	110,2	115,8

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 16
Circonférence des hanches mesurée de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Circonférence des hanches mesurée											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
centimètres												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	73,2	72,3	74,2	59,5	58,0	61,0	61,7	60,5	62,9	66,0	64,8	67,2
12 à 19 ans	94,7	93,4	96,0	78,0	77,1	78,9	82,1	80,4	83,8	87,6	86,9	88,3
20 à 39 ans	102,7	101,5	103,8	88,5	87,4	89,6	90,8	89,3	92,3	95,5	94,3	96,7
40 à 59 ans	104,3	103,3	105,3	90,4	89,7	91,1	93,0	92,1	93,9	97,0	95,8	98,2
60 à 79 ans	105,1	104,3	105,9	91,0	89,9	92,1	93,5	92,8	94,2	98,0	97,1	98,9
6 à 79 ans	100,5	99,7	101,4	75,5	74,5	76,5	86,2	85,6	86,8	93,8	93,2	94,4
Hommes												
6 à 11 ans	73,2	71,5	74,9	59,6	57,8	61,4	61,5	60,2	62,8	66,2	64,4	68,0
12 à 19 ans	93,7	91,9	95,5	77,3	76,1	78,5	79,4	76,6	82,2	86,3	85,3	87,3
20 à 39 ans	102,2	101,5	103,0	89,7	88,6	90,8	91,6	89,7	93,5	96,0	95,0	97,0
40 à 59 ans	103,5	102,5	104,6	92,4	91,5	93,3	94,0	92,9	95,1	98,0	96,6	99,4
60 à 79 ans	103,7	102,6	104,7	89,9	88,3	91,5	93,3	91,8	94,8	97,8	96,8	98,8
6 à 79 ans	99,7	98,9	100,5	75,3	73,3	77,3	85,3	84,5	86,1	94,0	93,2	94,8
Femmes												
6 à 11 ans	73,3	72,3	74,2	59,5	58,0	61,0	62,0	60,5	63,5	65,6	64,6	66,6
12 à 19 ans	95,9	94,8	96,9	80,6	77,9	83,3	84,1	82,6	85,6	89,3	88,5	90,1
20 à 39 ans	103,1	101,3	105,0	87,6	86,3	88,9	89,7	87,9	91,5	94,5	92,9	96,1
40 à 59 ans	105,1	103,5	106,6	89,4	88,8	90,0	91,4	90,0	92,8	96,2	94,9	97,5
60 à 79 ans	106,4	105,1	107,6	91,5	90,9	92,1	93,8	93,0	94,6	98,5	96,9	100,1
6 à 79 ans	101,4	100,2	102,5	76,0	75,1	76,9	86,9	86,4	87,4	93,6	92,9	94,3

	Circonférence des hanches mesurée											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
centimètres												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	72,1	70,8	73,4	79,5	78,2	80,8	86,6	85,2	88,0	90,7	88,7	92,7
12 à 19 ans	93,1	91,9	94,3	100,9	98,5	103,3	108,5	104,7	112,3	115,9	113,2	118,6
20 à 39 ans	100,6	99,3	101,9	108,1	106,5	109,7	117,5	114,4	120,6	122,8	118,7	126,9
40 à 59 ans	102,8	102,0	103,6	109,3	108,0	110,6	117,7	115,0	120,4	126,0	123,1	128,9
60 à 79 ans	103,5	102,2	104,8	110,0	108,6	111,4	118,7	116,3	121,1	125,1	120,9	129,3
6 à 79 ans	100,4	99,5	101,3	107,7	106,7	108,7	115,9	114,3	117,5	122,6	120,2	125,0
Hommes												
6 à 11 ans	72,4	70,4	74,4	79,5	77,4	81,6	85,5	83,4	87,6	89,5	88,1	90,9
12 à 19 ans	92,0	90,9	93,1	100,1	96,6	103,6	108,5	103,0	114,0	115,5	110,8	120,2
20 à 39 ans	101,0	99,6	102,4	107,5	106,0	109,0	113,8	111,3	116,3	118,9	115,9	121,9
40 à 59 ans	102,7	101,8	103,6	107,8	106,2	109,4	113,6	111,3	115,9	117,7	115,0	120,4
60 à 79 ans	102,5	101,3	103,7	108,3	107,3	109,3	114,5	113,1	115,9	120,4	116,1	124,7
6 à 79 ans	100,5	99,4	101,6	106,8	106,0	107,6	113,0	111,3	114,7	117,5	116,1	118,9
Femmes												
6 à 11 ans	71,9	70,5	73,3	79,0	77,0	81,0	87,0	84,8	89,2	92,3	89,0	95,6
12 à 19 ans	94,7	93,0	96,4	101,8	99,7	103,9	109,4	106,1	112,7	116,5	113,9	119,1
20 à 39 ans	100,1	98,4	101,8	108,5	105,4	111,6	121,2	116,8	125,6	127,8	122,9	132,7
40 à 59 ans	103,0	101,7	104,3	111,0	108,9	113,1	122,2	116,6	127,8	129,0	126,2	131,8
60 à 79 ans	104,2	102,3	106,1	112,8	111,2	114,4	120,5	116,8	124,2	129,0	124,7	133,3
6 à 79 ans	100,3	99,3	101,3	108,7	106,8	110,6	119,7	117,3	122,1	127,1	125,0	129,2

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 17
Ratio de la taille aux hanches mesuré de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Ratio de la taille aux hanches mesuré											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
ratio												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	0,83	0,82	0,84	0,75	0,74	0,76	0,77	0,77	0,77	0,79	0,78	0,80
12 à 19 ans	0,80	0,79	0,81	0,71	0,70	0,72	0,73	0,72	0,74	0,76	0,75	0,77
20 à 39 ans	0,84	0,84	0,85	0,72	0,71	0,73	0,74	0,72	0,76	0,78	0,77	0,79
40 à 59 ans	0,89	0,89	0,90	0,75	0,74	0,76	0,77	0,76	0,78	0,83	0,82	0,84
60 à 79 ans	0,93	0,92	0,94	0,78	0,77	0,79	0,81	0,80	0,82	0,86	0,85	0,87
6 à 79 ans	0,87	0,86	0,87	0,73	0,72	0,74	0,75	0,74	0,76	0,80	0,79	0,81
Hommes												
6 à 11 ans	0,84	0,83	0,84	0,76	0,75	0,77	0,77	0,76	0,78	0,80	0,79	0,81
12 à 19 ans	0,82	0,82	0,83	0,75	0,74	0,76	0,76	0,76	0,76	0,78	0,77	0,79
20 à 39 ans	0,88	0,88	0,89	0,78	0,76	0,80	0,79	0,77	0,81	0,83	0,82	0,84
40 à 59 ans	0,95	0,94	0,96	0,85	0,84	0,86	0,87	0,86	0,88	0,90	0,89	0,91
60 à 79 ans	0,99	0,98	1,00	0,88	0,86	0,90	0,91	0,90	0,92	0,94	0,92	0,96
6 à 79 ans	0,91	0,91	0,92	0,78	0,77	0,79	0,80	0,79	0,81	0,84	0,83	0,85
Femmes												
6 à 11 ans	0,82	0,81	0,83	0,75	0,74	0,76	0,77	0,76	0,78	0,79	0,78	0,80
12 à 19 ans	0,78	0,76	0,79	0,69	0,68	0,70	0,71	0,70	0,72	0,74	0,73	0,75
20 à 39 ans	0,80	0,79	0,81	0,71	0,70	0,72	0,72	0,71	0,73	0,75	0,73	0,77
40 à 59 ans	0,84	0,83	0,85	0,72	0,71	0,73	0,75	0,74	0,76	0,78	0,77	0,79
60 à 79 ans	0,87	0,86	0,88	0,76	0,75	0,77	0,78	0,77	0,79	0,82	0,81	0,83
6 à 79 ans	0,82	0,82	0,83	0,72	0,71	0,73	0,73	0,72	0,74	0,77	0,76	0,78

	Ratio de la taille aux hanches mesuré											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
ratio												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	0,83	0,82	0,84	0,86	0,85	0,87	0,90	0,89	0,91	0,93	0,91	0,95
12 à 19 ans	0,79	0,78	0,80	0,83	0,82	0,84	0,88	0,86	0,90	0,92	0,90	0,94
20 à 39 ans	0,84	0,83	0,85	0,90	0,89	0,91	0,95	0,94	0,96	0,99	0,98	1,00
40 à 59 ans	0,89	0,88	0,90	0,96	0,95	0,97	1,01	1,00	1,02	1,04	1,03	1,05
60 à 79 ans	0,93	0,92	0,94	0,99	0,98	1,00	1,04	1,02	1,06	1,08	1,06	1,10
6 à 79 ans	0,86	0,85	0,87	0,93	0,92	0,94	1,00	0,99	1,01	1,03	1,02	1,04
Hommes												
6 à 11 ans	0,83	0,82	0,84	0,86	0,85	0,87	0,91	0,89	0,93	0,93	0,91	0,95
12 à 19 ans	0,81	0,80	0,82	0,85	0,83	0,87	0,90	0,89	0,91	0,92	0,89	0,95
20 à 39 ans	0,88	0,87	0,89	0,93	0,92	0,94	0,98	0,97	0,99	1,01	1,00	1,02
40 à 59 ans	0,95	0,94	0,96	1,00	0,98	1,02	1,04	1,02	1,06	1,06	1,04	1,08
60 à 79 ans	0,98	0,97	0,99	1,03	1,02	1,04	1,08	1,06	1,10	1,10	1,09	1,11
6 à 79 ans	0,91	0,90	0,92	0,97	0,96	0,98	1,02	1,01	1,03	1,06	1,05	1,07
Femmes												
6 à 11 ans	0,81	0,80	0,82	0,85	0,83	0,87	0,90	0,89	0,91	0,92	0,90	0,94
12 à 19 ans	0,77	0,76	0,78	0,81	0,79	0,83	0,86	0,84	0,88	0,90	0,86	0,94
20 à 39 ans	0,79	0,77	0,81	0,85	0,84	0,86	0,89	0,88	0,90	0,94	0,92	0,96
40 à 59 ans	0,83	0,82	0,84	0,88	0,87	0,89	0,93	0,91	0,95	0,97	0,95	0,99
60 à 79 ans	0,87	0,86	0,88	0,92	0,90	0,94	0,96	0,95	0,97	0,99	0,97	1,01
6 à 79 ans	0,82	0,81	0,83	0,87	0,86	0,88	0,93	0,92	0,94	0,96	0,95	0,97

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 18
Distribution de la population à domicile dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30 kg/m², selon la mesure moyenne du pli cutané du biceps, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Mesure moyenne du pli cutané du biceps											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	millimètres											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	6,4	6,2	6,7	3,0	2,8	3,2	3,4	3,2	3,6	4,2	4,0	4,4
12 à 19 ans	6,7	6,4	7,0	3,0	2,9	3,1	3,3	3,2	3,4	4,1	3,9	4,3
20 à 39 ans	6,4	6,1	6,7	3,0	2,8	3,2	3,2	3,1	3,3	3,8	3,6	4,0
40 à 59 ans	7,6	7,2	8,0	3,0	2,7	3,3	3,5	3,2	3,8	4,6	4,3	4,9
60 à 79 ans	8,0	7,6	8,4	3,2	3,0	3,4	3,7	3,5	3,9	5,0	4,6	5,4
6 à 79 ans	7,1	6,9	7,3	3,0	2,9	3,1	3,3	3,2	3,4	4,3	4,2	4,4
Hommes												
6 à 11 ans	6,2	5,8	6,5	2,9	2,8	3,0	3,2	3,0	3,4	3,7	3,4	4,0
12 à 19 ans	5,6	5,4	5,8	2,8	2,7	2,9	3,1	3,0	3,2	3,4	3,2	3,6
20 à 39 ans	4,9	4,6	5,1	2,7	2,5	2,9	3,0	2,9	3,1	3,4	3,2	3,6
40 à 59 ans	5,4	5,1	5,8	2,7	2,5	2,9	3,1	2,8	3,4	3,9	3,6	4,2
60 à 79 ans	5,5	5,2	5,8	2,8	2,6	3,0	3,2	3,0	3,4	4,0	3,8	4,2
6 à 79 ans	5,4	5,2	5,5	2,8	2,7	2,9	3,1	3,0	3,2	3,7	3,6	3,8
Femmes												
6 à 11 ans	6,7	6,5	6,9	3,4	3,1	3,7	3,8	3,5	4,1	4,6	4,4	4,8
12 à 19 ans	7,8	7,4	8,3	4,1	3,9	4,3	4,4	4,0	4,8	5,5	5,1	5,9
20 à 39 ans	8,1	7,5	8,7	3,5	3,2	3,8	4,0	3,4	4,6	5,1	4,5	5,7
40 à 59 ans	9,7	9,2	10,2	3,8	3,2	4,4	4,7	4,0	5,4	6,3	5,5	7,1
60 à 79 ans	10,3	9,7	10,8	4,7	4,0	5,4	5,9	5,2	6,6	7,3	6,9	7,7
6 à 79 ans	8,8	8,5	9,1	3,6	3,4	3,8	4,4	4,2	4,6	5,6	5,3	5,9

	Mesure moyenne du pli cutané du biceps											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	millimètres											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	5,5	5,2	5,8	8,0	7,5	8,5	10,9	10,2	11,6	12,7	12,1	13,3
12 à 19 ans	5,9	5,5	6,3	8,1	7,7	8,5	11,1	10,1	12,1	13,8	12,4	15,2
20 à 39 ans	5,4	5,1	5,7	8,0	7,4	8,6	11,1	10,3	11,9	13,7	12,6	14,8
40 à 59 ans	6,6	6,0	7,2	9,8	8,9	10,7	13,6	13,1	14,1	15,2	14,5	15,9
60 à 79 ans	7,0	6,7	7,3	10,0	9,4	10,6	13,6	12,1	15,1	16,5	14,8	18,2
6 à 79 ans	6,1	5,8	6,4	8,7	8,3	9,1	12,4	12,0	12,8	14,9	14,3	15,5
Hommes												
6 à 11 ans	5,0	4,5	5,5	7,6	6,9	8,3	10,7	10,1	11,3	13,7	12,1	15,3
12 à 19 ans	4,5	4,1	4,9	6,6	5,9	7,3	10,0	9,1	10,9	11,4	10,4	12,4
20 à 39 ans	4,3	4,0	4,6	5,8	5,4	6,2	7,3	6,3	8,3	9,1	7,6	10,6
40 à 59 ans	4,9	4,6	5,2	6,6	6,0	7,2	8,2	7,3	9,1	9,8	8,7	10,9
60 à 79 ans	5,2	4,8	5,6	6,8	6,3	7,3	8,1	7,4	8,8	9,1	8,5	9,7
6 à 79 ans	4,7	4,5	4,9	6,5	6,2	6,8	8,4	7,9	8,9	10,0	9,7	10,3
Femmes												
6 à 11 ans	5,9	5,5	6,3	8,3	7,8	8,8	11,3	10,4	12,2	12,3	11,7	12,9
12 à 19 ans	7,2	6,8	7,6	8,9	8,3	9,5	12,4	10,2	14,6	15,2	13,9	16,5
20 à 39 ans	7,6	6,6	8,6	10,3	9,4	11,2	13,7	12,6	14,8	16,6	15,3	17,9
40 à 59 ans	8,8	8,0	9,6	13,0	12,2	13,8	15,2	14,5	15,9	16,6	15,9	17,3
60 à 79 ans	9,8	9,2	10,4	12,1	10,8	13,4	16,1	14,4	17,8	17,6	16,0	19,2
6 à 79 ans	8,0	7,7	8,3	11,2	10,7	11,7	14,6	13,9	15,3	16,4	15,7	17,1

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30 kg/m², sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 19
Distribution de la population à domicile dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30 kg/m², selon la mesure moyenne du pli cutané du triceps, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Mesure moyenne du pli cutané du triceps											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	millimètres											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	12,4	12,0	12,7	6,6	6,4	6,8	7,3	7,0	7,6	8,6	8,2	9,0
12 à 19 ans	13,9	13,4	14,4	5,7	5,3	6,1	6,6	6,2	7,0	8,7	8,2	9,2
20 à 39 ans	14,3	13,8	14,9	5,4	5,0	5,8	6,5	5,9	7,1	9,2	8,4	10,0
40 à 59 ans	16,0	15,3	16,6	5,9	5,4	6,4	7,5	6,7	8,3	10,2	9,3	11,1
60 à 79 ans	16,0	15,4	16,6	6,7	6,5	6,9	7,4	7,1	7,7	10,1	9,4	10,8
6 à 79 ans	14,9	14,5	15,2	5,9	5,7	6,1	7,0	6,7	7,3	9,4	9,0	9,8
Hommes												
6 à 11 ans	11,9	11,3	12,4	6,4	6,2	6,6	6,8	6,4	7,2	8,1	7,8	8,4
12 à 19 ans	11,1	10,6	11,6	5,1	4,5	5,7	5,7	5,3	6,1	7,0	6,5	7,5
20 à 39 ans	10,3	9,8	10,8	4,8	4,6	5,0	5,5	5,0	6,0	7,2	6,5	7,9
40 à 59 ans	10,9	10,1	11,7	5,4	5,0	5,8	5,9	5,4	6,4	8,0	7,1	8,9
60 à 79 ans	10,5	10,1	11,0	5,4	4,8	6,0	6,7	6,5	6,9	7,6	7,1	8,1
6 à 79 ans	10,8	10,4	11,1	5,2	5,0	5,4	5,9	5,6	6,2	7,6	7,2	8,0
Femmes												
6 à 11 ans	12,9	12,5	13,3	7,1	6,7	7,5	8,0	7,7	8,3	9,6	9,1	10,1
12 à 19 ans	16,7	16,0	17,5	8,7	8,0	9,4	9,7	8,8	10,6	12,6	11,8	13,4
20 à 39 ans	18,7	17,8	19,7	9,4	8,1	10,7	11,5	10,4	12,6	13,8	12,6	15,0
40 à 59 ans	20,7	20,1	21,4	10,8	10,0	11,6	12,7	11,3	14,1	16,1	15,4	16,8
60 à 79 ans	20,9	20,2	21,7	11,2	9,4	13,0	13,6	12,8	14,4	17,0	15,9	18,1
6 à 79 ans	18,9	18,5	19,4	9,1	8,7	9,5	10,8	10,5	11,1	14,0	13,5	14,5

	Mesure moyenne du pli cutané du triceps											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	millimètres											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	11,1	10,6	11,6	14,8	13,9	15,7	20,0	19,1	20,9	22,8	21,7	23,9
12 à 19 ans	12,7	12,0	13,4	17,6	17,1	18,1	22,6	21,1	24,1	25,1	23,8	26,4
20 à 39 ans	13,1	12,7	13,5	18,7	17,2	20,2	23,9	22,9	24,9	27,0	25,8	28,2
40 à 59 ans	14,5	13,9	15,1	21,4	20,2	22,6	26,8	26,0	27,6	28,9	28,0	29,8
60 à 79 ans	15,1	14,6	15,6	20,8	19,1	22,5	26,1	25,4	26,8	28,5	27,1	29,9
6 à 79 ans	13,4	13,0	13,8	19,2	18,7	19,7	25,0	24,5	25,5	27,9	27,4	28,4
Hommes												
6 à 11 ans	10,2	9,5	10,9	14,6	13,4	15,8	19,4	17,8	21,0	22,4	20,9	23,9
12 à 19 ans	9,4	8,7	10,1	13,4	12,4	14,4	19,0	17,6	20,4	22,6	20,1	25,1
20 à 39 ans	9,9	8,9	10,9	12,7	12,1	13,3	15,9	14,7	17,1	17,2	16,0	18,4
40 à 59 ans	10,4	9,5	11,3	13,1	12,0	14,2	15,0	13,3	16,7	19,1	14,3	23,9
60 à 79 ans	9,9	9,2	10,6	12,8	11,8	13,8	15,4	14,8	16,0	17,0	15,7	18,3
6 à 79 ans	10,0	9,5	10,5	13,0	12,5	13,5	16,3	15,6	17,0	19,1	18,1	20,1
Femmes												
6 à 11 ans	11,7	11,4	12,0	15,1	13,8	16,4	20,2	18,8	21,6	22,9	21,2	24,6
12 à 19 ans	16,6	16,0	17,2	19,4	18,3	20,5	24,3	23,0	25,6	26,8	24,1	29,5
20 à 39 ans	18,1	16,4	19,8	23,1	21,7	24,5	27,1	25,8	28,4	30,8	28,7	32,9
40 à 59 ans	20,5	19,5	21,5	25,6	24,3	26,9	28,9	28,0	29,8	31,4	30,2	32,6
60 à 79 ans	20,3	18,8	21,8	25,0	24,2	25,8	28,2	26,9	29,5	30,7	28,7	32,7
6 à 79 ans	18,6	17,9	19,3	23,4	22,9	23,9	27,6	26,9	28,3	30,3	29,4	31,2

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30 kg/m², sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 20
Distribution de la population à domicile dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30 kg/m², selon la mesure moyenne du pli cutané sous-scapulaire, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Mesure moyenne du pli cutané sous-scapulaire												
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile			
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		
		de	à		de	à		de	à		de	à	
	millimètres												
Les deux sexes													
6 à 11 ans	8,4	8,1	8,8	4,1	3,9	4,3	4,4	4,2	4,6		4,9	4,7	5,1
12 à 19 ans	11,6	11,0	12,1	5,5	5,3	5,7	6,1	5,9	6,3		7,2	7,0	7,4
20 à 39 ans	16,0	15,2	16,8	7,2	6,9	7,5	8,0	7,6	8,4		9,8	9,3	10,3
40 à 59 ans	18,7	17,5	19,9	7,6	6,7	8,5	8,9	7,9	9,9		12,5	11,7	13,3
60 à 79 ans	19,1	18,5	19,7	8,4	7,7	9,1	9,9	9,2	10,6		13,3	12,5	14,1
6 à 79 ans	16,0	15,6	16,4	5,7	5,5	5,9	6,9	6,7	7,1		9,4	9,0	9,8
Hommes													
6 à 11 ans	7,9	7,5	8,4	4,0	3,7	4,3	4,3	4,1	4,5		4,7	4,5	4,9
12 à 19 ans	10,0	9,6	10,4	5,0	4,6	5,4	5,7	5,4	6,0		6,6	6,2	7,0
20 à 39 ans	15,0	14,3	15,8	7,2	6,8	7,6	7,8	7,3	8,3		9,8	9,1	10,5
40 à 59 ans	17,9	16,3	19,5	8,1	6,9	9,3	9,0	7,6	10,4		12,6	11,5	13,7
60 à 79 ans	17,9	16,9	18,8	8,4	7,8	9,0	9,7	8,7	10,7		12,2	11,0	13,4
6 à 79 ans	15,0	14,4	15,5	5,3	5,0	5,6	6,5	6,3	6,7		9,0	8,5	9,5
Femmes													
6 à 11 ans	9,0	8,3	9,7	4,2	4,0	4,4	4,5	4,3	4,7		5,2	5,0	5,4
12 à 19 ans	13,2	12,2	14,1	6,1	5,9	6,3	6,8	6,3	7,3		8,3	7,9	8,7
20 à 39 ans	17,0	15,8	18,2	7,2	7,0	7,4	8,2	7,6	8,8		10,1	9,4	10,8
40 à 59 ans	19,5	18,2	20,8	7,4	6,3	8,5	8,7	7,9	9,5		12,4	11,5	13,3
60 à 79 ans	20,2	19,4	21,0	8,0	6,6	9,4	10,2	9,1	11,3		14,4	13,3	15,5
6 à 79 ans	17,1	16,6	17,6	6,0	5,9	6,1	7,2	7,1	7,3		9,9	9,5	10,3

	Mesure moyenne du pli cutané sous-scapulaire												
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile			
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		
		de	à		de	à		de	à		de	à	
	millimètres												
Les deux sexes													
6 à 11 ans	6,1	5,8	6,4	9,5	9,0	10,0	16,3	14,3	18,3		20,7	18,7	22,7
12 à 19 ans	9,6	9,0	10,2	14,4	13,4	15,4	19,9	18,3	21,5		24,8	21,9	27,7
20 à 39 ans	13,3	12,3	14,3	20,3	18,7	21,9	27,2	25,8	28,6		32,9	28,6	37,2
40 à 59 ans	17,2	15,5	18,9	23,4	21,5	25,3	30,3	29,4	31,2		34,1	32,3	35,9
60 à 79 ans	18,4	17,6	19,2	23,4	22,0	24,8	29,2	27,3	31,1		35,1	32,2	38,0
6 à 79 ans	14,2	13,6	14,8	20,6	19,8	21,4	28,0	27,0	29,0		31,8	29,7	33,9
Hommes													
6 à 11 ans	5,7	5,3	6,1	8,9	7,5	10,3	15,6	13,4	17,8		21,0	18,1	23,9
12 à 19 ans	8,0	7,5	8,5	11,5	10,5	12,5	17,2	15,3	19,1		20,7	17,4	24,0
20 à 39 ans	13,0	11,9	14,1	18,3	16,7	19,9	25,2	22,9	27,5		27,9	23,9	31,9
40 à 59 ans	16,0	14,6	17,4	22,0	19,3	24,7	29,9	27,0	32,8		30,8	27,1	34,5
60 à 79 ans	16,8	15,2	18,4	22,0	20,9	23,1	27,7	24,7	30,7		30,7	25,3	36,1
6 à 79 ans	13,5	12,8	14,2	19,2	18,4	20,0	25,8	24,4	27,2		30,0	28,7	31,3
Femmes													
6 à 11 ans	6,6	6,1	7,1	10,2	9,0	11,4	17,4	14,7	20,1		20,2	17,7	22,7
12 à 19 ans	11,4	10,0	12,8	16,3	14,6	18,0	21,8	18,7	24,9		26,7	23,4	30,0
20 à 39 ans	14,5	12,6	16,4	21,2	18,7	23,7	29,0	25,4	32,6		36,7	31,0	42,4
40 à 59 ans	18,4	16,9	19,9	25,1	22,5	27,7	31,2	30,0	32,4		35,4	31,9	38,9
60 à 79 ans	19,1	18,3	19,9	25,4	24,2	26,6	31,0	28,2	33,8		36,2	34,0	38,4
6 à 79 ans	15,2	14,3	16,1	22,0	20,8	23,2	29,3	28,1	30,5		34,6	32,2	37,0

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30 kg/m², sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 21
Distribution de la population à domicile dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30 kg/m², selon la mesure moyenne du pli cutané de la crête iliaque, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Mesure moyenne du pli cutané de la crête iliaque											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
millimètres												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	11,6	10,7	12,5	4,0	3,8	4,2	4,5	4,3	4,7	5,4	5,1	5,7
12 à 19 ans	17,5	16,5	18,4	6,0	5,6	6,4	7,2	6,7	7,7	9,1	8,4	9,8
20 à 39 ans	21,6	20,9	22,2	8,2	7,4	9,0	9,8	8,8	10,8	13,9	12,8	15,0
40 à 59 ans	22,3	21,2	23,5	9,0	8,3	9,7	10,5	9,5	11,5	15,6	14,2	17,0
60 à 79 ans	19,5	18,8	20,2	8,1	6,8	9,4	9,8	8,7	10,9	14,1	13,7	14,5
6 à 79 ans	20,0	19,6	20,5	6,4	6,1	6,7	7,9	7,7	8,1	12,5	11,8	13,2
Hommes												
6 à 11 ans	11,1	9,8	12,3	3,9	3,7	4,1	4,3	4,0	4,6	5,2	4,9	5,5
12 à 19 ans	14,2	13,6	14,8	5,6	5,4	5,8	6,1	5,6	6,6	7,7	7,1	8,3
20 à 39 ans	21,7	20,8	22,6	7,4	6,5	8,3	9,3	8,3	10,3	13,3	11,4	15,2
40 à 59 ans	23,0	21,4	24,5	9,0	7,9	10,1	11,3	9,4	13,2	15,7	13,6	17,8
60 à 79 ans	19,2	18,4	20,1	7,7	6,3	9,1	9,8	8,3	11,3	14,0	12,9	15,1
6 à 79 ans	19,7	19,1	20,4	5,7	5,3	6,1	7,2	6,9	7,5	11,1	10,0	12,2
Femmes												
6 à 11 ans	12,2	11,1	13,2	4,4	4,1	4,7	4,8	4,5	5,1	6,2	5,8	6,6
12 à 19 ans	20,9	19,4	22,3	7,8	6,8	8,8	9,6	8,9	10,3	13,2	11,8	14,6
20 à 39 ans	21,4	20,3	22,5	8,6	7,3	9,9	10,7	9,0	12,4	14,1	12,6	15,6
40 à 59 ans	21,7	20,3	23,1	8,7	7,4	10,0	10,4	9,2	11,6	15,6	14,2	17,0
60 à 79 ans	19,7	18,8	20,7	8,4	6,5	10,3	9,9	8,3	11,5	14,1	13,2	15,0
6 à 79 ans	20,3	19,8	20,8	7,1	6,8	7,4	8,9	8,4	9,4	13,5	12,9	14,1

	Mesure moyenne du pli cutané de la crête iliaque											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
millimètres												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	7,9	7,1	8,7	15,1	13,0	17,2	24,5	21,8	27,2	30,3	27,6	33,0
12 à 19 ans	15,2	13,9	16,5	23,8	22,4	25,2	31,2	29,4	33,0	36,8	33,3	40,3
20 à 39 ans	20,6	19,5	21,7	27,9	26,7	29,1	34,3	32,7	35,9	38,5	36,8	40,2
40 à 59 ans	21,0	19,4	22,6	27,9	26,4	29,4	34,8	33,3	36,3	38,5	37,1	39,9
60 à 79 ans	19,1	18,3	19,9	24,1	22,9	25,3	29,2	26,9	31,5	31,8	29,3	34,3
6 à 79 ans	19,3	18,6	20,0	26,2	25,5	26,9	33,1	32,3	33,9	38,1	36,9	39,3
Hommes												
6 à 11 ans	6,8	6,0	7,6	13,4	9,7	17,1	25,4	22,4	28,4	31,1	26,8	35,4
12 à 19 ans	10,2	9,0	11,4	18,1	15,6	20,6	27,6	26,0	29,2	34,6	31,2	38,0
20 à 39 ans	20,6	18,9	22,3	28,2	26,3	30,1	34,3	30,2	38,4	40,5	35,3	45,7
40 à 59 ans	21,8	20,0	23,6	28,5	26,1	30,9	36,1	33,3	38,9	40,2	37,0	43,4
60 à 79 ans	18,9	17,8	20,0	23,4	22,2	24,6	27,8	25,6	30,0	31,1	28,8	33,4
6 à 79 ans	18,7	17,9	19,5	26,2	25,1	27,3	33,2	32,0	34,4	38,5	37,0	40,0
Femmes												
6 à 11 ans	9,0	8,2	9,8	15,7	14,2	17,2	23,9	20,0	27,8	29,6	24,4	34,8
12 à 19 ans	19,6	18,0	21,2	26,6	23,5	29,7	33,1	29,4	36,8	39,6	35,2	44,0
20 à 39 ans	20,5	19,1	21,9	27,3	25,6	29,0	34,3	32,6	36,0	36,6	35,2	38,0
40 à 59 ans	20,4	18,9	21,9	27,6	25,4	29,8	34,1	32,3	35,9	38,1	35,9	40,3
60 à 79 ans	19,3	18,2	20,4	24,3	23,0	25,6	29,9	27,1	32,7	32,3	28,9	35,7
6 à 79 ans	19,7	19,1	20,3	26,1	25,1	27,1	32,8	31,7	33,9	36,7	35,4	38,0

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30 kg/m², sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 22
Distribution de la population à domicile dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30 kg/m², selon la mesure moyenne du pli cutané du mollet, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Mesure moyenne du pli cutané du mollet											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
millimètres												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	11,9	11,3	12,4	5,2	4,7	5,7	6,0	5,7	6,3	7,7	7,3	8,1
12 à 19 ans	14,0	13,3	14,7	5,2	4,7	5,7	6,1	5,7	6,5	8,7	7,9	9,5
20 à 39 ans	13,1	12,5	13,6	4,6	4,2	5,0	5,5	5,2	5,8	7,5	7,2	7,8
40 à 59 ans	14,2	13,6	14,9	4,8	4,3	5,3	6,0	5,3	6,7	8,2	7,4	9,0
60 à 79 ans	15,4	14,7	16,1	4,5	4,0	5,0	5,7	5,3	6,1	8,0	7,5	8,5
6 à 79 ans	13,8	13,4	14,2	4,8	4,5	5,1	5,8	5,5	6,1	7,9	7,6	8,2
Hommes												
6 à 11 ans	11,4	10,6	12,1	4,8	4,2	5,4	5,6	5,2	6,0	7,2	6,6	7,8
12 à 19 ans	11,3	10,6	11,9	4,5	4,1	4,9	5,2	4,7	5,7	6,7	6,3	7,1
20 à 39 ans	9,5	8,9	10,0	4,1	3,7	4,5	4,7	4,3	5,1	6,0	5,5	6,5
40 à 59 ans	9,8	9,1	10,6	4,3	4,0	4,6	4,9	4,4	5,4	6,7	6,0	7,4
60 à 79 ans	8,8	8,4	9,2	3,5	3,0	4,0	4,5	4,1	4,9	6,0	5,6	6,4
6 à 79 ans	9,9	9,6	10,2	4,2	4,0	4,4	4,9	4,6	5,2	6,3	5,9	6,7
Femmes												
6 à 11 ans	12,4	11,7	13,1	5,8	5,3	6,3	6,7	6,0	7,4	8,3	8,0	8,6
12 à 19 ans	16,8	15,8	17,8	7,8	7,0	8,6	9,0	8,4	9,6	12,0	11,0	13,0
20 à 39 ans	17,0	15,9	18,0	7,4	7,1	7,7	8,4	7,4	9,4	11,5	10,3	12,7
40 à 59 ans	18,4	17,6	19,2	7,6	6,8	8,4	9,4	7,9	10,9	12,6	11,9	13,3
60 à 79 ans	21,6	20,4	22,8	10,6	9,4	11,8	12,5	11,7	13,3	15,7	14,6	16,8
6 à 79 ans	17,7	17,2	18,2	7,4	7,2	7,6	8,6	8,0	9,2	12,0	11,4	12,6

	Mesure moyenne du pli cutané du mollet											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
millimètres												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	10,2	9,3	11,1	15,0	14,1	15,9	19,8	19,0	20,6	22,9	21,5	24,3
12 à 19 ans	12,7	11,9	13,5	18,2	16,8	19,6	23,3	22,3	24,3	27,4	25,8	29,0
20 à 39 ans	11,6	10,7	12,5	17,1	15,9	18,3	22,3	20,5	24,1	27,0	24,5	29,5
40 à 59 ans	12,8	11,8	13,8	18,8	17,6	20,0	25,6	24,0	27,2	28,7	27,3	30,1
60 à 79 ans	13,7	12,7	14,7	22,0	19,9	24,1	27,1	25,4	28,8	31,9	29,5	34,3
6 à 79 ans	12,2	11,7	12,7	18,2	17,6	18,8	24,4	23,4	25,4	28,5	27,4	29,6
Hommes												
6 à 11 ans	9,3	8,2	10,4	14,4	13,1	15,7	19,9	18,9	20,9	22,8	21,5	24,1
12 à 19 ans	9,6	9,0	10,2	13,8	12,7	14,9	20,2	17,9	22,5	24,3	19,9	28,7
20 à 39 ans	8,3	7,6	9,0	12,1	10,8	13,4	16,0	14,5	17,5	18,3	16,6	20,0
40 à 59 ans	8,7	7,9	9,5	12,6	10,9	14,3	15,7	13,5	17,9	18,5	14,6	22,4
60 à 79 ans	8,0	7,6	8,4	10,8	10,2	11,4	14,4	13,3	15,5	16,6	14,6	18,6
6 à 79 ans	8,7	8,3	9,1	12,4	11,7	13,1	16,6	15,7	17,5	19,7	18,3	21,1
Femmes												
6 à 11 ans	10,9	10,2	11,6	15,4	14,4	16,4	19,4	17,9	20,9	23,1	19,8	26,4
12 à 19 ans	16,2	15,2	17,2	20,4	19,0	21,8	25,3	22,7	27,9	29,5	26,8	32,2
20 à 39 ans	16,2	14,5	17,9	20,7	19,1	22,3	27,4	24,9	29,9	31,0	29,1	32,9
40 à 59 ans	17,5	16,3	18,7	23,3	22,0	24,6	28,7	27,4	30,0	31,3	29,7	32,9
60 à 79 ans	21,3	19,2	23,4	26,1	24,6	27,6	31,4	28,9	33,9	34,9	31,1	38,7
6 à 79 ans	16,6	15,8	17,4	22,4	21,7	23,1	28,1	27,0	29,2	31,3	30,4	32,2

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30 kg/m², sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 23
Distribution de la population à domicile dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30 kg/m², selon la somme des mesures des cinq plis cutanés, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	La somme des mesures des cinq plis cutanés											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	millimètres											
Both sexes												
6 à 11 ans	50,5	48,1	52,9	24,4	23,1	25,7	27,1	26,0	28,2	31,3	29,9	32,7
12 à 19 ans	63,3	60,5	66,1	28,1	26,5	29,7	31,4	30,1	32,7	39,1	36,5	41,7
20 à 39 ans	71,2	68,9	73,5	31,3	29,2	33,4	36,3	34,1	38,5	49,8	47,4	52,2
40 à 59 ans	78,6	75,0	82,2	37,2	32,3	42,1	43,0	38,7	47,3	56,3	51,9	60,7
60 à 79 ans	78,0	75,4	80,5	36,2	31,8	40,6	43,6	40,7	46,5	57,5	55,6	59,4
6 à 79 ans	71,6	70,0	73,1	30,0	29,4	30,6	34,7	33,5	35,9	48,5	46,4	50,6
Males												
6 à 11 ans	48,4	45,3	51,5	23,4	21,8	25,0	25,7	24,5	26,9	29,3	27,7	30,9
12 à 19 ans	51,6	49,8	53,4	25,5	24,6	26,4	28,2	26,6	29,8	33,4	32,2	34,6
20 à 39 ans	61,3	58,9	63,7	28,6	26,5	30,7	31,8	29,6	34,0	42,1	38,5	45,7
40 à 59 ans	66,6	62,1	71,1	32,3	29,3	35,3	38,8	34,1	43,5	51,3	46,5	56,1
60 à 79 ans	62,0	59,9	64,0	31,5	28,2	34,8	36,5	32,1	40,9	47,3	43,3	51,3
6 à 79 ans	60,5	58,6	62,3	27,4	26,6	28,2	31,2	30,5	31,9	41,4	38,9	43,9
Females												
6 à 11 ans	52,8	49,7	55,9	26,9	24,7	29,1	29,3	28,4	30,2	34,5	33,0	36,0
12 à 19 ans	75,3	71,1	79,6	36,6	32,8	40,4	40,9	36,8	45,0	54,0	49,9	58,1
20 à 39 ans	82,0	77,6	86,4	39,6	36,8	42,4	46,1	42,6	49,6	58,7	54,6	62,8
40 à 59 ans	89,9	86,0	93,9	44,7	40,1	49,3	53,8	49,4	58,2	64,8	59,9	69,7
60 à 79 ans	92,8	89,8	95,8	53,8	49,1	58,5	60,6	55,8	65,4	75,4	72,7	78,1
6 à 79 ans	82,7	80,8	84,6	37,2	36,5	37,9	43,3	41,4	45,2	59,1	56,5	61,7

	La somme des mesures des cinq plis cutanés											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	millimètres											
Both sexes												
6 à 11 ans	41,2	38,5	43,9	61,8	56,9	66,7	92,4	85,9	98,9	105,8	99,6	112,0
12 à 19 ans	57,1	52,8	61,4	81,9	76,8	87,0	104,0	98,5	109,5	123,4	114,2	132,6
20 à 39 ans	65,5	61,0	70,0	88,8	84,7	92,9	111,8	106,2	117,4	125,5	122,3	128,7
40 à 59 ans	73,5	67,2	79,8	99,3	93,9	104,7	121,0	114,8	127,2	131,1	124,5	137,7
60 à 79 ans	76,3	74,0	78,6	93,3	88,0	98,6	117,2	112,0	122,4	127,3	116,4	138,2
6 à 79 ans	67,3	64,5	70,1	90,4	88,6	92,2	113,7	110,5	116,9	126,3	123,1	129,5
Males												
6 à 11 ans	37,1	33,5	40,7	60,3	51,4	69,2	92,4	84,5	100,3	107,4	99,4	115,4
12 à 19 ans	42,9	40,7	45,1	63,6	57,6	69,6	92,2	82,9	101,5	105,5	95,8	115,2
20 à 39 ans	58,0	52,8	63,2	76,5	73,9	79,1	91,6	84,7	98,5	103,7	95,1	112,3
40 à 59 ans	63,4	58,0	68,8	80,6	72,4	88,8	98,2	91,0	105,4	109,3	98,6	120,0
60 à 79 ans	60,2	56,5	63,9	76,1	72,7	79,5	85,0	82,1	87,9	93,3	86,9	99,7
6 à 79 ans	57,5	55,0	60,0	75,7	73,0	78,4	93,4	90,3	96,5	104,9	100,8	109,0
Females												
6 à 11 ans	44,8	42,6	47,0	62,9	58,0	67,8	92,8	84,6	101,0	103,8	93,5	114,1
12 à 19 ans	71,1	65,8	76,4	90,5	83,9	97,1	117,4	106,0	128,8	131,6	121,7	141,5
20 à 39 ans	77,3	70,3	84,3	103,0	97,3	108,7	124,7	120,0	129,4	132,2	125,7	138,7
40 à 59 ans	88,7	83,3	94,1	110,0	106,3	113,7	129,2	124,3	134,1	141,6	131,8	151,4
60 à 79 ans	89,1	84,4	93,8	110,0	103,4	116,6	124,3	117,0	131,6	143,1	132,8	153,4
6 à 79 ans	80,7	77,2	84,2	104,7	102,4	107,0	124,7	121,6	127,8	136,5	130,8	142,2

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 30 kg/m², sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 24
Poids autodéclaré de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Poids autodéclaré											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	kilogrammes											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	32	32	33	19	18	20	20	19	21	25	24	26
12 à 19 ans	62	60	63	41	40	42	45	44	46	50	48	52
20 à 39 ans	75	73	76	52	50	54	54	53	55	61	58	64
40 à 59 ans	78	76	80	53	51	55	57	55	59	65	63	67
60 à 79 ans	76	75	77	54	52	56	57	55	59	64	62	66
6 à 79 ans	72	70	73	36	35	37	49	48	50	59	58	60
Hommes												
6 à 11 ans	33	32	34	20	19	21	22	20	24	26	24	28
12 à 19 ans	66	63	68	41	40	42	45	42	48	53	51	55
20 à 39 ans	82	81	84	59	56	62	65	62	68	70	68	72
40 à 59 ans	86	84	89	66	64	68	69	67	71	76	74	78
60 à 79 ans	84	82	85	61	59	63	66	64	68	73	71	75
6 à 79 ans	78	77	80	37	35	39	54	53	55	68	67	69
Femmes												
6 à 11 ans	32	31	33	18	17	19	20	19	21	24	23	25
12 à 19 ans	57	56	59	43	42	44	44	42	46	50	49	51
20 à 39 ans	67	65	70	49	47	51	52	51	53	56	53	59
40 à 59 ans	69	67	72	50	49	51	53	52	54	59	58	60
60 à 79 ans	70	68	71	52	50	54	54	52	56	60	58	62
6 à 79 ans	65	63	66	36	35	37	48	47	49	54	53	55

	Poids autodéclaré											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	kilogrammes											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	32	31	33	39	38	40	45	43	47	50	48	52
12 à 19 ans	59	58	60	69	65	73	83	80	86	91	88	94
20 à 39 ans	73	71	75	85	82	88	98	95	101	104	99	109
40 à 59 ans	77	76	78	88	85	91	100	95	105	108	103	113
60 à 79 ans	75	73	77	86	84	88	98	94	102	104	101	107
6 à 79 ans	72	70	74	84	82	86	96	92	100	104	100	108
Hommes												
6 à 11 ans	32	31	33	39	38	40	46	43	49	50	47	53
12 à 19 ans	64	61	67	77	72	82	88	83	93	95	89	101
20 à 39 ans	79	76	82	91	88	94	102	99	105	109	104	114
40 à 59 ans	84	81	87	93	90	96	107	101	113	116	110	122
60 à 79 ans	82	80	84	91	89	93	104	102	106	109	106	112
6 à 79 ans	79	77	81	91	89	93	102	99	105	109	106	112
Femmes												
6 à 11 ans	30	28	32	37	35	39	45	43	47	50	46	54
12 à 19 ans	56	53	59	64	61	67	73	67	79	82	79	85
20 à 39 ans	64	61	67	75	72	78	88	81	95	100	93	107
40 à 59 ans	66	64	68	77	73	81	91	85	97	100	92	108
60 à 79 ans	68	66	70	76	73	79	86	81	91	95	89	101
6 à 79 ans	64	63	65	75	72	78	86	82	90	95	89	101

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans.
Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 25
Taille autodéclarée de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Taille autodéclarée												
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile			
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		
		de	à		de	à		de	à		de	à	
centimètres													
Les deux sexes													
6 à 11 ans	134	132	135	104	97	111	117	112	122		122	120	124
12 à 19 ans	167	167	168	150	148	152	155	153	157		160	159	161
20 à 39 ans	171	170	172	155	154	156	157	156	158		163	162	164
40 à 59 ans	170	169	170	155	155	155	157	157	157		163	161	165
60 à 79 ans	168	167	168	152	149	155	155	153	157		160	160	160
6 à 79 ans	167	167	168	145	142	148	155	152	158		160	160	160
Hommes													
6 à 11 ans	133	131	135	104	95	113	117	110	124		122	120	124
12 à 19 ans	171	170	172	152	150	154	155	153	157		165	163	167
20 à 39 ans	177	176	178	168	165	171	168	166	170		173	170	176
40 à 59 ans	176	175	177	163	160	166	168	166	170		170	167	173
60 à 79 ans	174	174	175	163	161	165	165	162	168		170	169	171
6 à 79 ans	173	172	173	145	142	148	160	158	162		170	168	172
Femmes													
6 à 11 ans	134	132	136	104	94	114	117	112	122		122	119	125
12 à 19 ans	164	163	165	150	148	152	155	152	158		157	154	160
20 à 39 ans	164	163	165	152	150	154	155	154	156		157	154	160
40 à 59 ans	163	163	164	152	151	153	155	154	156		157	154	160
60 à 79 ans	161	161	162	152	150	154	155	152	158		157	157	157
6 à 79 ans	161	161	162	145	143	147	152	152	152		157	157	157

	Taille autodéclarée												
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile			
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		
		de	à		de	à		de	à		de	à	
centimètres													
Les deux sexes													
6 à 11 ans	135	133	137	145	142	148	152	151	153		157	155	159
12 à 19 ans	168	168	168	175	174	176	180	178	182		185	183	187
20 à 39 ans	170	169	171	178	177	179	183	183	183		185	181	189
40 à 59 ans	170	169	171	178	176	180	183	181	185		185	183	187
60 à 79 ans	168	168	168	175	174	176	180	180	180		183	182	184
6 à 79 ans	168	167	169	175	172	178	183	181	185		185	184	186
Hommes													
6 à 11 ans	135	132	138	145	142	148	152	150	154		155	151	159
12 à 19 ans	173	170	176	180	178	182	185	183	187		188	184	192
20 à 39 ans	178	177	179	183	180	186	185	181	189		191	188	194
40 à 59 ans	175	172	178	180	177	183	185	183	187		188	186	190
60 à 79 ans	175	174	176	180	179	181	183	182	184		185	185	185
6 à 79 ans	175	174	176	180	180	180	185	183	187		188	186	190
Femmes													
6 à 11 ans	135	133	137	145	142	148	152	149	155		157	155	159
12 à 19 ans	165	163	167	168	166	170	175	173	177		178	175	181
20 à 39 ans	163	161	165	170	168	172	173	171	175		175	172	178
40 à 59 ans	163	162	164	168	168	168	173	170	176		175	172	178
60 à 79 ans	160	158	162	165	164	166	170	168	172		173	170	176
6 à 79 ans	163	162	164	168	168	168	173	171	175		175	174	176

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans.
Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 26
Distribution de la population à domicile âgée de 6 à 17 ans, d'après les normes relatives à l'indice de masse corporelle basées sur les entrées autodéclarées — méthode CDC, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Indice de masse corporelle basées sur les entrées autodéclarées — méthode CDC											
	Poids insuffisant			Poids normal			Embonpoint			Obèse		
	Estimation		Intervalle de confiance de à	Estimation		Intervalle de confiance de à	Estimation		Intervalle de confiance de à	Estimation		Intervalle de confiance de à
pourcentage												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	7,5	5,8	9,2	58,8	53,2	64,4	16,0	12,3	19,8	17,7	13,9	21,4
12 à 17 ans	3,2 ^E	1,6	4,7	74,4	67,4	81,3	12,3	8,4	16,1	10,2 ^E	5,3	15,1
6 à 17 ans	5,0	4,0	6,0	67,6	62,1	73,2	13,9	10,6	17,2	13,4	10,4	16,5
Hommes												
6 à 11 ans	8,1	5,7	10,5	50,6	43,1	58,2	19,3	14,7	23,9	22,0	15,2	28,9
12 à 17 ans	3,6 ^E	1,4	5,8	68,9	60,9	76,8	13,7	9,5	17,9	13,8 ^E	7,1	20,6
6 à 17 ans	5,5	4,0	6,9	61,2	55,2	67,3	16,0	12,3	19,8	17,3	12,8	21,7
Femmes												
6 à 11 ans	6,9 ^E	4,5	9,3	67,4	60,9	74,0	12,6	8,6	16,7	13,1	10,1	16,0
12 à 17 ans	2,7 ^E	1,5	3,8	80,9	73,7	88,0	10,6 ^E	5,1	16,1	F
6 à 17 ans	4,5	3,1	6,0	74,9	69,1	80,7	11,5	8,1	14,9	9,1	6,2	11,9

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

^F trop peu fiable pour être publié (données avec un coefficient de variation (CV) de plus de 33,3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage)

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de National Center for Health Statistics, 2000, *Clinical Growth Charts*, Department of Health and Human Services, Public Health Service, Center for Disease Control, Hyattsville, MD, <http://www.cdc.gov/nchs/about/major/nhanes/growthcharts/clinicalcharts.htm> (site consulté le 19 décembre 2006).
 Population à domicile âgée de 6 à 17 ans.
 Center for Disease Control (CDC).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 27
Distribution de la population à domicile âgée de 6 à 17 ans, d'après les normes relatives à l'indice de masse corporelle basées sur les entrées autodéclarées — méthode Cole, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Indice de masse corporelle basées sur les entrées autodéclarées — méthode Cole								
	Ni embonpoint ni obèse			Embonpoint			Obèse		
	Estimation		Intervalle de confiance de à	Estimation		Intervalle de confiance de à	Estimation		Intervalle de confiance de à
pourcentage									
Les deux sexes									
6 à 11 ans	69,1	63,9	74,3	19,3	14,7	23,9	11,6	8,2	15,1
12 à 17 ans	76,2	68,1	84,3	15,5	10,7	20,3	8,3 ^E	3,4	13,1
6 à 17 ans	73,2	67,6	78,7	17,1	12,9	21,3	9,7	7,1	12,4
Hommes									
6 à 11 ans	64,1	56,5	71,7	22,7	17,9	27,5	13,2 ^E	7,8	18,6
12 à 17 ans	71,6	63,1	80,2	16,8	13,5	20,1	11,6 ^E	4,8	18,3
6 à 17 ans	68,5	62,5	74,5	19,3	15,8	22,8	12,2	8,3	16,2
Femmes									
6 à 11 ans	74,4	69,0	79,7	15,6 ^E	10,2	21,1	10,0	7,3	12,7
12 à 17 ans	81,7	72,5	90,8	14,0 ^E	6,9	21,0	F
6 à 17 ans	78,4	72,2	84,6	14,7^E	9,1	20,3	6,9	5,2	8,5

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

^F trop peu fiable pour être publié (données avec un coefficient de variation (CV) de plus de 33,3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage)

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de T.J. Cole, M.C. Bellizzi, K.M. Flegal & W.H. Dietz, 2000, "Establishing a Standard Definition for Child Overweight and Obesity Worldwide : International survey," *The BMJ*, Vol. 320, p. 1240-1243.
 Population à domicile âgée de 6 à 17 ans.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 28
Distribution de la population à domicile âgée de 18 à 79 ans, d'après les normes relatives à l'indice de masse corporelle basées sur les entrées autodéclarées, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Indice de masse corporelle basées sur les entrées autodéclarées								
	Poids insuffisant			Poids normal			Embonpoint		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à
pourcentage									
Les deux sexes									
18 à 39 ans	3,3 ^E	1,6	4,9	53,2	48,9	57,5	28,5	24,9	32,0
40 à 59 ans	1,0 ^E	0,6	1,3	37,3	33,0	41,6	38,2	33,6	42,8
60 à 79 ans	F	33,8	28,4	39,3	41,7	37,3	46,1
18 à 79 ans	1,8^E	1,2	2,5	42,9	39,2	46,5	35,1	32,4	37,7
Hommes									
18 à 39 ans	F	49,0	44,7	53,3	35,1	31,8	38,3
40 à 59 ans	F	25,0	19,6	30,3	49,9	42,8	56,9
60 à 79 ans	F	31,3	25,1	37,4	43,4	37,6	49,2
18 à 79 ans	0,7^E	0,3	1,1	35,9	32,0	39,7	42,7	39,3	46,0
Femmes									
18 à 39 ans	5,6 ^E	2,4	8,7	57,7	52,2	63,1	21,5	15,6	27,4
40 à 59 ans	1,4	1,0	1,7	49,7	44,8	54,6	26,3	22,2	30,5
60 à 79 ans	F	36,2	29,8	42,6	40,2	34,8	45,6
18 à 79 ans	2,9^E	1,8	4,1	50,0	45,6	54,3	27,4	24,6	30,2

	Indice de masse corporelle basées sur les entrées autodéclarées								
	Obésité, classe I			Obésité, classe II			Obésité, classe III		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à
pourcentage									
Les deux sexes									
18 à 39 ans	9,5	7,2	11,8	4,1 ^E	1,8	6,4	1,4 ^E	0,6	2,3
40 à 59 ans	17,0	12,7	21,3	4,3	3,2	5,4	2,3 ^E	1,4	3,3
60 à 79 ans	17,7	14,9	20,5	4,4 ^E	2,9	5,8	1,6 ^E	1,1	2,2
18 à 79 ans	14,2	12,2	16,2	4,2	3,1	5,4	1,8^E	1,2	2,5
Hommes									
18 à 39 ans	9,9 ^E	6,2	13,6	F	0,8 ^E	0,4	1,3
40 à 59 ans	18,8	13,1	24,5	3,9 ^E	2,5	5,2	1,9 ^E	0,7	3,2
60 à 79 ans	19,4	15,9	22,9	4,4 ^E	3,0	5,8	F
18 à 79 ans	15,3	12,5	18,2	4,1^E	2,6	5,6	1,3^E	0,7	2,0
Femmes									
18 à 39 ans	9,1	6,8	11,3	F	F
40 à 59 ans	15,1	11,1	19,1	4,8 ^E	3,0	6,5	F
60 à 79 ans	16,1	12,6	19,5	4,3 ^E	1,6	7,0	2,1 ^E	1,3	2,9
18 à 79 ans	13,0	11,2	14,8	4,4^E	2,8	6,0	2,3^E	1,0	3,7

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

F trop peu fiable pour être publié (données avec un coefficient de variation (CV) de plus de 33,3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage)

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de Santé Canada. 2003. « Description des "Lignes directrices canadiennes pour la classification du poids chez les adultes" », *Lignes directrices canadiennes pour la classification du poids chez les adultes, produit no H49-179/2003F au catalogue de Santé Canada, p. 9 à 13, http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/weights-poids/guide-ld-adult/weight_book_tc-livres_des_poids_tm-fra.php (site consulté le 19 décembre 2006).*

Population à domicile âgée de 18 à 79 ans.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 29
Taille en position assise mesurée de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Taille en position assise mesurée											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
centimètres												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	71,69	71,07	72,31	62,58	61,97	63,19	63,78	63,08	64,48	66,96	66,04	67,88
12 à 19 ans	87,99	87,57	88,41	79,00	77,83	80,17	80,54	79,74	81,34	84,45	83,77	85,13
20 à 39 ans	90,95	90,57	91,32	83,71	82,98	84,44	85,22	84,85	85,59	87,73	87,32	88,14
40 à 59 ans	90,14	89,76	90,51	83,04	82,66	83,42	84,21	83,79	84,63	86,38	85,86	86,90
60 à 79 ans	87,54	87,13	87,95	79,20	78,04	80,36	81,23	80,24	82,22	84,39	84,01	84,77
6 à 79 ans	88,33	88,03	88,64	74,15	73,65	74,65	80,68	80,22	81,14	85,28	84,98	85,58
Hommes												
6 à 11 ans	71,66	70,70	72,62	63,00	62,29	63,71	63,98	62,87	65,09	67,45	65,89	69,01
12 à 19 ans	89,07	88,29	89,85	77,16	75,51	78,81	79,55	78,55	80,55	84,30	82,59	86,01
20 à 39 ans	93,86	93,30	94,41	88,25	87,05	89,45	88,93	88,20	89,66	91,26	90,55	91,97
40 à 59 ans	93,22	92,69	93,75	87,11	85,83	88,39	88,43	87,49	89,37	90,54	89,53	91,55
60 à 79 ans	90,89	90,41	91,38	85,01	84,26	85,76	86,53	86,01	87,05	88,46	87,97	88,95
6 à 79 ans	90,91	90,51	91,32	73,94	73,25	74,63	82,76	81,65	83,87	88,94	88,43	89,45
Femmes												
6 à 11 ans	71,72	71,02	72,41	61,77	60,86	62,68	63,55	62,65	64,45	66,50	65,45	67,55
12 à 19 ans	86,85	86,44	87,27	80,14	79,43	80,85	81,01	80,30	81,72	84,46	83,90	85,02
20 à 39 ans	88,01	87,62	88,40	82,30	81,18	83,42	83,79	83,08	84,50	85,81	85,36	86,26
40 à 59 ans	87,11	86,83	87,39	82,21	81,72	82,70	83,04	82,64	83,44	84,93	84,54	85,32
60 à 79 ans	84,46	84,02	84,90	78,35	77,61	79,09	79,69	78,45	80,93	82,45	81,58	83,32
6 à 79 ans	85,78	85,50	86,06	74,48	73,90	75,06	80,37	79,82	80,92	83,91	83,63	84,19

	Taille en position assise mesurée											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
centimètres												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	71,85	70,99	72,71	75,55	74,80	76,30	79,25	78,32	80,18	81,60	80,69	82,51
12 à 19 ans	88,39	87,84	88,94	91,75	91,38	92,12	94,70	93,93	95,47	96,81	95,87	97,75
20 à 39 ans	90,93	90,47	91,39	94,10	93,49	94,71	96,98	96,26	97,70	98,82	97,96	99,68
40 à 59 ans	89,77	89,27	90,27	93,62	93,10	94,14	96,30	95,90	96,70	97,60	97,02	98,18
60 à 79 ans	87,57	87,17	87,97	91,13	90,29	91,97	93,80	93,38	94,22	95,20	94,69	95,71
6 à 79 ans	89,03	88,73	89,33	92,86	92,55	93,17	95,90	95,48	96,32	97,46	97,07	97,85
Hommes												
6 à 11 ans	72,07	70,70	73,44	75,39	74,37	76,41	78,42	77,66	79,18	80,16	79,07	81,25
12 à 19 ans	90,41	89,55	91,27	93,59	92,92	94,26	96,60	95,64	97,56	98,33	97,57	99,09
20 à 39 ans	93,91	93,35	94,47	96,35	95,62	97,08	98,82	97,88	99,76	99,95	99,24	100,66
40 à 59 ans	93,48	92,86	94,10	95,84	95,23	96,45	97,66	97,07	98,25	99,01	98,17	99,85
60 à 79 ans	91,16	90,29	92,03	93,38	92,98	93,78	95,26	94,78	95,74	96,02	95,35	96,69
6 à 79 ans	92,42	91,94	92,90	95,19	94,69	95,69	97,46	97,07	97,85	99,01	98,42	99,60
Femmes												
6 à 11 ans	71,77	70,88	72,66	75,91	74,99	76,83	80,85	79,86	81,84	82,52	81,10	83,94
12 à 19 ans	87,05	86,53	87,57	89,63	88,95	90,31	91,74	90,75	92,73	92,95	91,83	94,07
20 à 39 ans	87,96	87,53	88,39	90,40	89,81	90,99	92,16	91,70	92,62	92,82	92,71	92,93
40 à 59 ans	86,88	86,33	87,43	89,27	88,89	89,65	91,51	91,09	91,93	92,82	92,43	93,21
60 à 79 ans	84,84	84,39	85,29	86,67	86,25	87,09	88,88	88,64	89,12	89,36	88,78	89,94
6 à 79 ans	86,50	86,15	86,85	89,14	88,83	89,45	91,35	91,09	91,61	92,58	92,30	92,86

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 30
Taille en position debout mesurée de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Taille en position debout mesurée											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
centimètres												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	135,34	134,14	136,55	116,06	114,81	117,31	119,34	117,82	120,86	125,87	123,80	127,94
12 à 19 ans	166,66	166,24	167,09	150,45	148,08	152,82	154,88	152,93	156,83	160,01	158,89	161,13
20 à 39 ans	169,99	169,30	170,68	155,45	153,56	157,34	157,83	156,85	158,81	163,07	162,26	163,88
40 à 59 ans	168,82	168,16	169,48	154,84	154,05	155,63	157,03	156,17	157,89	161,41	160,24	162,58
60 à 79 ans	165,46	164,79	166,12	150,74	148,99	152,49	153,90	152,48	155,32	158,57	158,01	159,13
6 à 79 ans	165,89	165,41	166,36	141,27	140,00	142,54	151,86	151,00	152,72	159,43	158,95	159,91
Hommes												
6 à 11 ans	135,41	133,38	137,43	115,93	113,22	118,64	119,99	116,14	123,84	126,15	122,56	129,74
12 à 19 ans	169,83	168,87	170,79	149,53	146,50	152,56	155,10	152,23	157,97	162,63	161,70	163,56
20 à 39 ans	176,39	175,49	177,29	165,82	163,98	167,66	167,78	166,11	169,45	171,38	169,73	173,03
40 à 59 ans	175,15	174,19	176,11	162,31	160,52	164,10	165,73	164,03	167,43	169,96	168,33	171,59
60 à 79 ans	172,31	171,59	173,03	161,00	159,08	162,92	164,00	163,31	164,69	167,67	166,53	168,81
6 à 79 ans	171,44	170,82	172,05	141,15	139,15	143,15	157,99	156,87	159,11	167,81	166,89	168,73
Femmes												
6 à 11 ans	135,28	133,87	136,68	116,34	114,58	118,10	118,58	117,36	119,80	125,07	122,87	127,27
12 à 19 ans	163,31	162,31	164,31	151,06	148,62	153,50	153,98	151,83	156,13	158,49	156,72	160,26
20 à 39 ans	163,52	162,76	164,28	152,31	150,42	154,20	155,45	153,52	157,38	158,87	157,78	159,96
40 à 59 ans	162,59	161,95	163,23	152,30	151,48	153,12	154,86	154,05	155,67	158,50	157,54	159,46
60 à 79 ans	159,21	158,41	160,01	148,92	147,77	150,07	150,95	149,16	152,74	155,21	154,26	156,16
6 à 79 ans	160,38	159,91	160,86	141,52	139,77	143,27	150,53	149,54	151,52	156,78	156,21	157,35

	Taille en position debout mesurée											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
centimètres												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	135,63	134,23	137,03	143,93	142,57	145,29	151,36	150,23	152,49	154,90	153,08	156,72
12 à 19 ans	166,29	165,55	167,03	173,46	172,43	174,49	179,68	178,85	180,51	183,39	181,52	185,26
20 à 39 ans	169,82	168,70	170,94	177,00	176,13	177,87	181,68	180,49	182,87	184,71	182,62	186,80
40 à 59 ans	168,46	167,40	169,52	175,46	174,51	176,41	181,24	180,10	182,38	184,58	183,21	185,95
60 à 79 ans	165,23	164,48	165,98	172,52	171,30	173,74	178,13	177,41	178,85	179,98	179,01	180,95
6 à 79 ans	167,00	166,52	167,48	174,74	173,93	175,55	180,25	179,70	180,80	183,22	182,34	184,10
Hommes												
6 à 11 ans	135,64	133,16	138,12	143,21	141,60	144,82	150,44	149,30	151,58	153,23	151,97	154,49
12 à 19 ans	171,08	169,78	172,38	177,75	176,76	178,74	182,30	180,25	184,35	186,37	184,54	188,20
20 à 39 ans	176,65	175,40	177,90	180,59	179,62	181,56	184,71	182,49	186,93	189,85	185,59	194,11
40 à 59 ans	175,14	173,97	176,31	179,74	178,81	180,67	184,58	183,21	185,95	187,65	186,29	189,01
60 à 79 ans	172,62	171,38	173,86	177,42	176,65	178,19	180,13	179,07	181,19	182,37	181,46	183,28
6 à 79 ans	173,90	172,86	174,94	179,00	178,33	179,67	183,10	182,24	183,96	186,86	185,49	188,23
Femmes												
6 à 11 ans	135,50	133,51	137,49	144,96	143,47	146,45	152,49	150,72	154,26	156,27	154,17	158,37
12 à 19 ans	163,65	162,58	164,72	167,88	166,30	169,46	172,20	170,04	174,36	175,32	173,40	177,24
20 à 39 ans	163,42	162,63	164,21	167,82	166,96	168,68	171,94	169,92	173,96	175,32	173,00	177,64
40 à 59 ans	162,39	161,07	163,71	167,06	166,19	167,93	171,02	170,48	171,56	172,57	170,41	174,73
60 à 79 ans	159,13	158,34	159,92	163,17	161,97	164,37	167,83	166,82	168,84	169,24	168,09	170,39
6 à 79 ans	161,46	160,91	162,01	166,54	165,99	167,09	170,87	169,98	171,76	173,13	171,12	175,14

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 31
Poids mesuré de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Poids mesuré											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
kilogrammes												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	33,3	32,5	34,0	20,8	19,9	21,7	22,0	21,1	22,9	25,2	24,2	26,2
12 à 19 ans	63,1	61,2	65,1	41,0	39,5	42,5	44,2	42,5	45,9	51,4	50,2	52,6
20 à 39 ans	76,0	74,2	77,7	51,8	50,9	52,7	55,2	54,0	56,4	62,4	60,4	64,4
40 à 59 ans	79,2	77,4	80,9	53,5	51,9	55,1	57,5	56,2	58,8	66,4	65,0	67,8
60 à 79 ans	77,5	76,4	78,6	54,0	52,6	55,4	57,9	56,3	59,5	66,0	64,5	67,5
6 à 79 ans	72,7	71,3	74,0	35,3	34,5	36,1	48,9	48,5	49,3	59,5	58,4	60,6
Hommes												
6 à 11 ans	33,4	32,0	34,8	20,9	19,9	21,9	22,2	21,0	23,4	25,8	24,5	27,1
12 à 19 ans	66,1	63,1	69,0	39,6	37,6	41,6	43,3	40,4	46,2	53,4	51,0	55,8
20 à 39 ans	82,7	81,2	84,2	59,2	56,8	61,6	64,5	61,4	67,6	70,8	69,5	72,1
40 à 59 ans	87,1	84,5	89,6	66,2	64,6	67,8	69,3	67,4	71,2	75,6	73,3	77,9
60 à 79 ans	84,2	82,7	85,7	62,0	60,0	64,0	66,2	64,6	67,8	72,8	70,4	75,2
6 à 79 ans	78,7	77,2	80,2	35,2	33,2	37,2	51,0	49,6	52,4	68,0	66,7	69,3
Femmes												
6 à 11 ans	33,2	31,9	34,4	20,0	18,9	21,1	21,8	20,9	22,7	24,2	23,1	25,3
12 à 19 ans	60,0	58,6	61,5	41,4	40,0	42,8	45,0	43,3	46,7	51,0	49,5	52,5
20 à 39 ans	69,1	66,6	71,6	49,5	48,1	50,9	51,9	50,7	53,1	56,9	55,3	58,5
40 à 59 ans	71,4	69,3	73,6	50,4	48,6	52,2	53,9	52,6	55,2	59,7	58,2	61,2
60 à 79 ans	71,4	69,8	73,1	52,2	50,7	53,7	54,8	53,1	56,5	60,9	59,2	62,6
6 à 79 ans	66,7	65,0	68,3	35,4	34,2	36,6	47,9	47,4	48,4	55,4	54,2	56,6

	Poids mesuré											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
kilogrammes												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	31,4	30,7	32,1	38,8	37,9	39,7	47,2	45,5	48,9	54,6	51,5	57,7
12 à 19 ans	60,2	58,7	61,7	71,0	67,3	74,7	86,2	82,2	90,2	94,6	90,1	99,1
20 à 39 ans	72,7	70,5	74,9	86,0	82,6	89,4	100,3	94,1	106,5	110,0	106,3	113,7
40 à 59 ans	77,6	75,4	79,8	90,0	88,4	91,6	101,3	97,3	105,3	109,7	105,1	114,3
60 à 79 ans	75,8	74,4	77,2	87,2	86,0	88,4	98,8	95,7	101,9	106,3	102,6	110,0
6 à 79 ans	72,0	70,5	73,5	85,8	83,9	87,7	98,2	95,0	101,4	107,4	103,5	111,3
Hommes												
6 à 11 ans	31,6	29,8	33,4	38,8	37,2	40,4	47,0	44,5	49,5	52,2	50,0	54,4
12 à 19 ans	63,6	61,2	66,0	76,1	70,8	81,4	89,9	85,0	94,8	95,8	87,0	104,6
20 à 39 ans	80,0	77,2	82,8	92,0	89,6	94,4	105,2	98,5	111,9	113,7	109,3	118,1
40 à 59 ans	85,7	81,9	89,5	95,0	91,7	98,3	106,5	101,0	112,0	116,6	110,7	122,5
60 à 79 ans	82,9	80,7	85,1	92,8	90,9	94,7	104,2	102,0	106,4	112,6	108,5	116,7
6 à 79 ans	79,3	77,1	81,5	91,3	89,6	93,0	103,0	99,2	106,8	112,6	109,7	115,5
Femmes												
6 à 11 ans	31,1	30,0	32,2	38,7	37,2	40,2	48,0	43,2	52,8	56,6	51,5	61,7
12 à 19 ans	57,5	55,6	59,4	64,7	62,2	67,2	80,3	75,2	85,4	88,6	82,7	94,5
20 à 39 ans	65,9	63,5	68,3	78,6	74,5	82,7	92,6	85,5	99,7	103,4	93,4	113,4
40 à 59 ans	69,0	66,8	71,2	80,8	77,0	84,6	93,8	89,0	98,6	102,6	95,4	109,8
60 à 79 ans	69,6	67,6	71,6	79,3	76,7	81,9	91,0	86,8	95,2	97,4	92,2	102,6
6 à 79 ans	64,8	63,1	66,5	76,9	74,0	79,8	90,4	87,1	93,7	99,2	94,0	104,4

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 32
Indice de masse corporelle mesuré de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Indice de masse corporelle mesuré											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
kilogrammes par mètre carré												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	17,76	17,57	17,95	14,06	13,69	14,43	14,59	14,29	14,89	15,48	15,37	15,59
12 à 19 ans	22,50	21,80	23,19	16,74	16,19	17,29	17,42	16,99	17,85	19,14	18,69	19,59
20 à 39 ans	26,20	25,64	26,77	19,02	18,39	19,65	20,35	19,92	20,78	22,16	21,73	22,59
40 à 59 ans	27,69	27,18	28,19	20,50	20,06	20,94	21,56	21,21	21,91	24,18	23,59	24,77
60 à 79 ans	28,23	27,85	28,62	21,27	20,54	22,00	22,64	22,25	23,03	24,59	24,01	25,17
6 à 79 ans	25,99	25,57	26,41	17,12	16,91	17,33	18,92	18,80	19,04	21,90	21,63	22,17
Hommes												
6 à 11 ans	17,86	17,57	18,16	14,36	14,01	14,71	14,87	14,48	15,26	15,63	15,37	15,89
12 à 19 ans	22,62	21,73	23,51	16,67	16,08	17,26	17,40	16,98	17,82	19,00	18,63	19,37
20 à 39 ans	26,54	26,27	26,80	20,09	19,58	20,60	21,53	20,86	22,20	23,09	22,65	23,53
40 à 59 ans	28,34	27,71	28,97	22,01	21,34	22,68	23,47	22,44	24,50	25,47	24,74	26,20
60 à 79 ans	28,28	27,85	28,70	21,95	21,46	22,44	23,20	22,70	23,70	24,96	24,34	25,58
6 à 79 ans	26,30	25,96	26,64	17,18	16,88	17,48	19,21	18,87	19,55	22,78	22,36	23,20
Femmes												
6 à 11 ans	17,65	17,29	18,01	13,87	13,42	14,32	14,33	13,93	14,73	15,38	15,20	15,56
12 à 19 ans	22,37	21,79	22,95	16,74	15,83	17,65	17,59	16,86	18,32	19,35	18,78	19,92
20 à 39 ans	25,85	24,89	26,81	18,38	17,79	18,97	19,65	18,94	20,36	21,22	20,73	21,71
40 à 59 ans	27,04	26,34	27,75	19,67	19,03	20,31	20,76	20,45	21,07	22,41	21,81	23,01
60 à 79 ans	28,20	27,57	28,83	20,57	19,69	21,45	22,28	21,70	22,86	24,22	23,54	24,90
6 à 79 ans	25,69	25,09	26,28	16,98	16,67	17,29	18,77	18,64	18,90	21,21	20,93	21,49

	Indice de masse corporelle mesuré											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
kilogrammes par mètre carré												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	16,85	16,65	17,05	19,21	18,82	19,60	22,24	21,40	23,08	24,28	23,42	25,14
12 à 19 ans	21,48	20,91	22,05	24,40	23,32	25,48	29,38	27,43	31,33	32,55	31,10	34,00
20 à 39 ans	25,03	24,28	25,78	28,99	28,14	29,84	33,70	32,31	35,09	37,70	35,59	39,81
40 à 59 ans	27,00	26,54	27,46	30,08	29,29	30,87	34,78	33,51	36,05	38,24	37,11	39,37
60 à 79 ans	27,35	26,85	27,85	31,07	30,50	31,64	34,71	33,69	35,73	37,85	36,21	39,49
6 à 79 ans	25,43	24,84	26,02	29,30	28,84	29,76	33,62	32,89	34,35	37,05	36,04	38,06
Hommes												
6 à 11 ans	17,06	16,66	17,46	19,38	18,81	19,95	22,36	21,34	23,38	24,21	23,36	25,06
12 à 19 ans	21,60	21,03	22,17	24,79	23,17	26,41	30,12	26,45	33,79	32,68	30,87	34,49
20 à 39 ans	25,72	25,37	26,07	28,99	28,15	29,83	33,50	32,27	34,73	36,37	34,65	38,09
40 à 59 ans	27,88	27,18	28,58	30,27	29,42	31,12	34,02	32,80	35,24	36,39	34,19	38,59
60 à 79 ans	27,70	27,02	28,38	31,11	30,29	31,93	34,15	33,21	35,09	35,81	34,23	37,39
6 à 79 ans	26,16	25,71	26,61	29,46	29,03	29,89	32,88	32,05	33,71	35,81	35,12	36,50
Femmes												
6 à 11 ans	16,67	16,47	16,87	19,01	18,33	19,69	22,16	20,85	23,47	24,50	22,66	26,34
12 à 19 ans	21,47	20,79	22,15	24,13	23,03	25,23	29,00	28,18	29,82	30,96	29,21	32,71
20 à 39 ans	24,26	23,23	25,29	28,99	27,67	30,31	35,33	32,58	38,08	39,33	36,26	42,40
40 à 59 ans	25,61	24,97	26,25	29,80	28,59	31,01	35,77	33,49	38,05	38,76	37,09	40,43
60 à 79 ans	27,09	26,45	27,73	31,06	30,10	32,02	35,55	33,42	37,68	39,11	37,04	41,18
6 à 79 ans	24,59	24,00	25,18	29,04	28,32	29,76	34,69	33,24	36,14	38,15	36,81	39,49

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 33
Distribution de la population à domicile âgée de 6 à 17 ans, d'après les normes relatives à l'indice de masse corporelle basées sur les entrées mesurées — méthode CDC, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Indice de masse corporelle basées sur les entrées mesurées — méthode CDC											
	Poids insuffisant			Poids normal			Embonpoint			Obèse		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
pourcentage												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	3,7 ^E	1,5	6,0	70,7	67,7	73,7	13,9	10,4	17,4	11,6	9,0	14,3
12 à 17 ans	3,5 ^E	1,5	5,6	69,3	62,6	76,0	12,4	10,0	14,7	14,8 ^E	9,0	20,6
6 à 17 ans	3,6^E	2,4	4,9	69,9	65,8	74,1	13,1	10,9	15,3	13,4	10,7	16,0
Hommes												
6 à 11 ans	3,1 ^E	1,2	5,0	68,4	64,6	72,2	14,1	10,7	17,5	14,4	10,9	17,8
12 à 17 ans	3,8 ^E	1,8	5,8	66,9	60,5	73,4	12,8	9,4	16,3	16,5 ^E	9,4	23,5
6 à 17 ans	3,5^E	2,2	4,7	67,6	63,7	71,5	13,4	11,1	15,7	15,5	12,2	18,8
Femmes												
6 à 11 ans	F	73,1	68,8	77,3	13,8 ^E	9,2	18,3	8,8 ^E	5,4	12,1
12 à 17 ans	F	72,1	62,8	81,3	11,9	9,3	14,4	12,9 ^E	6,7	19,1
6 à 17 ans	3,7^E	2,2	5,3	72,5	67,0	78,1	12,8	10,2	15,3	11,0	8,1	13,8

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

^F trop peu fiable pour être publié (données avec un coefficient de variation (CV) de plus de 33,3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage)

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de National Center for Health Statistics, 2000, *Clinical Growth Charts*, Department of Health and Human Services, Public Health Service, Center for Disease Control, Hyattsville, MD, <http://www.cdc.gov/nchs/about/major/nhanes/growthcharts/clinicalcharts.htm> (site consulté le 19 décembre 2006).

Population à domicile âgée de 6 à 17 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*, Center for Disease Control (CDC)).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 34
Distribution de la population à domicile âgée de 6 à 17 ans, d'après les normes relatives à l'indice de masse corporelle basées sur les entrées mesurées — méthode Cole, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Indice de masse corporelle basées sur les entrées mesurées — méthode Cole								
	Ni embonpoint ni obèse			Embonpoint			Obèse		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à			de
pourcentage									
Les deux sexes									
6 à 11 ans	76,8	74,1	79,5	16,8	13,8	19,7	6,4	4,7	8,2
12 à 17 ans	72,1	65,6	78,7	17,4	13,8	21,0	10,5 ^E	5,2	15,8
6 à 17 ans	74,3	69,9	78,7	17,1	14,2	20,0	8,6	5,9	11,3
Hommes									
6 à 11 ans	75,8	72,7	78,8	17,2	13,7	20,6	7,1	5,0	9,1
12 à 17 ans	70,7	64,3	77,1	16,9	13,5	20,3	12,4 ^E	5,4	19,4
6 à 17 ans	73,0	69,0	77,0	17,0	14,3	19,7	10,0^E	6,3	13,7
Femmes									
6 à 11 ans	77,9	73,8	82,0	16,3	11,6	21,1	5,8 ^E	2,9	8,6
12 à 17 ans	73,8	65,2	82,4	18,0	12,4	23,5	8,3 ^E	3,8	12,7
6 à 17 ans	75,7	70,3	81,2	17,2	13,3	21,1	7,1	4,8	9,3

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de T.J. Cole, M.C. Bellizzi, K.M. Flegal & W.H. Dietz, 2000, "Establishing a Standard Definition for Child Overweight and Obesity Worldwide : International survey," *The BMJ*, Vol. 320, p. 1240-1243.

Population à domicile âgée de 6 à 17 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 35

Distribution de la population à domicile âgée de 18 à 79 ans, d'après les normes relatives à l'indice de masse corporelle basées sur les entrées mesurées, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Indice de masse corporelle basées sur les entrées mesurées								
	Poids insuffisant			Poids normal			Embonpoint		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à
pourcentage									
Les deux sexes									
18 à 39 ans	3,0 ^E	1,6	4,4	48,2	42,8	53,7	29,7	25,4	33,9
40 à 59 ans	F	32,7	28,0	37,4	41,4	38,0	44,8
60 à 79 ans	F	27,9	22,5	33,3	41,2	37,2	45,3
18 à 79 ans	1,5^E	0,9	2,1	37,9	33,3	42,4	36,7	33,7	39,7
Hommes									
18 à 39 ans	F	44,2	39,1	49,4	36,2	29,4	43,0
40 à 59 ans	F	20,6	15,2	26,0	51,9	47,1	56,7
60 à 79 ans	F	24,7	19,4	30,1	44,3	39,7	48,8
18 à 79 ans	0,8^E	0,3	1,2	31,0	26,6	35,4	44,1	39,6	48,5
Femmes									
18 à 39 ans	5,0 ^E	2,4	7,6	52,4	44,5	60,4	22,9	17,3	28,5
40 à 59 ans	F	44,6	39,7	49,5	31,0	27,1	35,0
60 à 79 ans	F	30,8	24,6	37,1	38,4	33,8	43,1
18 à 79 ans	2,2^E	1,2	3,2	44,7	39,0	50,4	29,5	26,6	32,3

	Indice de masse corporelle basées sur les entrées mesurées								
	Obésité, classe I			Obésité, classe II			Obésité, classe III		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à
pourcentage									
Les deux sexes									
18 à 39 ans	11,3	9,8	12,7	5,0	3,4	6,5	2,8 ^E	1,6	4,0
40 à 59 ans	15,9	12,8	19,0	6,3 ^E	4,2	8,5	3,2	2,2	4,2
60 à 79 ans	21,0	16,1	25,8	6,5	4,5	8,5	3,0 ^E	1,9	4,1
18 à 79 ans	15,1	13,3	16,9	5,8	4,7	7,0	3,0	2,3	3,7
Hommes									
18 à 39 ans	12,4	9,3	15,6	4,6 ^E	2,9	6,3	1,4 ^E	0,8	2,0
40 à 59 ans	19,9	15,0	24,9	3,7 ^E	2,0	5,4	3,3 ^E	1,8	4,8
60 à 79 ans	22,8	16,5	29,1	6,3	4,3	8,4	F
18 à 79 ans	17,4	14,7	20,2	4,6	3,6	5,6	2,2	1,5	2,8
Femmes									
18 à 39 ans	10,1	7,4	12,8	5,3 ^E	2,6	8,0	4,3 ^E	2,1	6,5
40 à 59 ans	11,9	9,3	14,5	8,9 ^E	5,8	12,0	3,1 ^E	1,1	5,1
60 à 79 ans	19,2	14,3	24,2	6,7 ^E	3,6	9,8	4,4 ^E	2,7	6,0
18 à 79 ans	12,7	10,6	14,9	7,1	5,4	8,8	3,8^E	2,4	5,3

E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

F trop peu fiable pour être publié (données avec un coefficient de variation (CV) de plus de 33,3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage)

Note(s) : Les normes utilisées dans ce tableau sont tirées de Santé Canada. 2003. « Description des "Lignes directrices canadiennes pour la classification du poids chez les adultes" », Lignes directrices canadiennes pour la classification du poids chez les adultes, produit no H49-179/2003F au catalogue de Santé Canada, p. 9 à 13, http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/weights-poids/guide-ld-adult/weight_book_tc-livres_des_poids_tm-fra.php (site consulté le 19 décembre 2006).

Population à domicile âgée de 18 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 36
Puissance aérobique maximale prévue moyenne de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Puissance aérobique maximale prévue moyenne											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
millilitres par kilogramme par minute												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	53,3	53,0	53,5	45,2	44,5	45,9	46,7	45,9	47,5	49,9	49,4	50,4
12 à 19 ans	48,6	48,0	49,2	37,6	36,7	38,5	40,3	39,7	40,9	43,0	42,2	43,8
20 à 39 ans	41,4	40,6	42,1	32,0	31,4	32,6	33,2	32,4	34,0	36,5	35,9	37,1
40 à 59 ans	33,9	33,3	34,4	23,3	22,6	24,0	25,6	25,0	26,2	30,0	29,6	30,4
60 à 79 ans	25,8	25,2	26,4	19,3	18,9	19,7	19,8	18,9	20,7	22,3	21,5	23,1
6 à 79 ans	39,6	39,2	40,1	24,1	23,3	24,9	28,0	27,3	28,7	32,5	31,9	33,1
Hommes												
6 à 11 ans	56,4	55,9	56,8	49,7	48,8	50,6	50,8	49,8	51,8	54,8	53,8	55,8
12 à 19 ans	52,5	51,7	53,4	43,4	39,2	47,6	45,3	44,0	46,6	49,9	48,3	51,5
20 à 39 ans	44,1	43,1	45,1	32,7	31,7	33,7	34,5	33,0	36,0	40,0	38,1	41,9
40 à 59 ans	36,6	35,6	37,6	26,8	25,6	28,0	28,3	26,9	29,7	31,6	30,9	32,3
60 à 79 ans	27,6	26,6	28,5	19,4	18,1	20,7	21,0	19,7	22,3	24,7	22,4	27,0
6 à 79 ans	42,5	41,9	43,1	27,1	26,2	28,0	30,0	29,3	30,7	35,1	33,5	36,7
Femmes												
6 à 11 ans	50,4	50,0	50,8	44,5	43,8	45,2	45,3	44,6	46,0	47,4	46,6	48,2
12 à 19 ans	44,5	43,8	45,1	36,3	34,7	37,9	38,4	37,4	39,4	41,1	40,5	41,7
20 à 39 ans	38,4	37,6	39,3	31,4	30,2	32,6	32,4	31,5	33,3	35,5	34,6	36,5
40 à 59 ans	31,2	30,5	31,8	22,4	20,7	24,1	23,5	22,8	24,2	28,4	26,3	30,5
60 à 79 ans	24,1	23,6	24,6	18,8	18,0	19,6	19,6	19,2	20,0	21,5	20,4	22,6
6 à 79 ans	36,7	36,1	37,2	22,8	22,3	23,3	25,0	24,1	25,9	30,9	30,3	31,5

	Puissance aérobique maximale prévue moyenne											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
millilitres par kilogramme par minute												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	54,0	52,2	55,8	57,2	56,8	57,6	59,3	59,1	59,5	59,8	59,5	60,1
12 à 19 ans	48,8	48,1	49,5	54,0	53,7	54,3	57,1	56,6	57,6	58,1	57,5	58,7
20 à 39 ans	40,6	39,9	41,3	45,6	44,4	46,8	50,6	49,9	51,3	52,3	51,3	53,3
40 à 59 ans	33,0	32,1	33,9	38,8	38,1	39,5	41,9	40,6	43,2	45,2	44,0	46,4
60 à 79 ans	25,3	23,7	26,9	28,9	28,5	29,3	31,4	30,5	32,3	32,7	28,4	37,0
6 à 79 ans	39,3	38,8	39,8	46,2	45,4	47,0	52,6	51,8	53,4	56,3	55,8	56,8
Hommes												
6 à 11 ans	57,2	56,4	58,0	59,1	58,7	59,5	59,8	59,4	60,2	60,2	60,0	60,4
12 à 19 ans	53,6	52,8	54,4	56,4	55,7	57,1	58,1	57,5	58,7	60,0	58,9	61,1
20 à 39 ans	44,0	42,7	45,3	49,4	48,6	50,2	52,0	51,2	52,8	54,2	51,2	57,2
40 à 59 ans	38,2	36,5	39,9	40,0	39,6	40,4	44,5	43,3	45,7	46,3	44,4	48,2
60 à 79 ans	27,6	26,6	28,6	30,2	29,5	30,9	32,5	27,7	37,3	37,3	35,6	39,0
6 à 79 ans	42,1	41,0	43,2	50,1	49,5	50,7	55,9	55,0	56,8	58,2	57,8	58,6
Femmes												
6 à 11 ans	50,4	50,1	50,7	52,3	50,9	53,7	56,2	55,8	56,6	56,8	56,4	57,2
12 à 19 ans	43,2	42,3	44,1	48,0	47,3	48,7	53,0	51,4	54,6	54,0	53,5	54,5
20 à 39 ans	38,1	37,1	39,1	40,8	39,9	41,7	45,2	43,7	46,7	47,1	44,4	49,8
40 à 59 ans	31,0	30,3	31,7	34,6	34,2	35,0	37,2	35,8	38,6	40,4	38,4	42,4
60 à 79 ans	23,1	22,6	23,6	27,6	26,4	28,8	29,2	28,8	29,6	30,8	28,6	33,0
6 à 79 ans	36,4	35,8	37,0	41,8	41,1	42,5	48,4	47,5	49,3	51,1	50,5	51,7

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

L'équation pour la puissance aérobique maximale prévue n'a pas été validée pour les enfants de 6 à 14 ans.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 37

Ratio du meilleur volume expiratoire maximal en une seconde à la meilleure capacité vitale forcée de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Ratio du meilleur volume expiratoire maximal en une seconde à la meilleure capacité vitale forcée											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	ratio											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	0,846	0,839	0,852	0,738	0,719	0,757	0,769	0,759	0,779	0,813	0,807	0,819
12 à 19 ans	0,840	0,835	0,845	0,717	0,708	0,726	0,754	0,746	0,762	0,798	0,791	0,805
20 à 39 ans	0,804	0,797	0,811	0,690	0,666	0,714	0,723	0,711	0,735	0,767	0,759	0,775
40 à 59 ans	0,762	0,755	0,768	0,642	0,621	0,663	0,680	0,668	0,692	0,726	0,720	0,732
60 à 79 ans	0,729	0,725	0,733	0,583	0,561	0,605	0,631	0,618	0,644	0,696	0,692	0,700
6 à 79 ans	0,784	0,779	0,789	0,648	0,637	0,659	0,693	0,685	0,701	0,741	0,735	0,747
Hommes												
6 à 11 ans	0,835	0,825	0,845	0,723	0,696	0,750	0,760	0,735	0,785	0,806	0,797	0,815
12 à 19 ans	0,826	0,816	0,836	0,712	0,692	0,732	0,749	0,737	0,761	0,785	0,776	0,794
20 à 39 ans	0,794	0,781	0,806	0,666	0,627	0,705	0,711	0,687	0,735	0,756	0,742	0,770
40 à 59 ans	0,764	0,755	0,773	0,643	0,615	0,671	0,679	0,653	0,705	0,724	0,712	0,736
60 à 79 ans	0,716	0,708	0,725	0,553	0,506	0,600	0,605	0,591	0,619	0,686	0,674	0,698
6 à 79 ans	0,778	0,771	0,785	0,643	0,630	0,656	0,685	0,667	0,703	0,735	0,728	0,742
Femmes												
6 à 11 ans	0,856	0,849	0,862	0,756	0,740	0,772	0,778	0,769	0,787	0,821	0,817	0,825
12 à 19 ans	0,854	0,849	0,860	0,717	0,708	0,726	0,765	0,752	0,778	0,815	0,809	0,821
20 à 39 ans	0,815	0,806	0,824	0,707	0,682	0,732	0,737	0,720	0,754	0,779	0,767	0,791
40 à 59 ans	0,760	0,753	0,766	0,622	0,581	0,663	0,680	0,665	0,695	0,727	0,722	0,732
60 à 79 ans	0,741	0,734	0,748	0,609	0,569	0,649	0,658	0,639	0,677	0,704	0,695	0,713
6 à 79 ans	0,790	0,785	0,796	0,661	0,643	0,679	0,698	0,687	0,709	0,745	0,736	0,754

	Ratio du meilleur volume expiratoire maximal en une seconde à la meilleure capacité vitale forcée											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	ratio											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	0,848	0,840	0,856	0,885	0,876	0,894	0,917	0,912	0,922	0,939	0,929	0,949
12 à 19 ans	0,845	0,836	0,854	0,888	0,882	0,894	0,923	0,917	0,929	0,940	0,935	0,945
20 à 39 ans	0,805	0,798	0,812	0,845	0,841	0,849	0,882	0,869	0,895	0,910	0,896	0,924
40 à 59 ans	0,774	0,767	0,781	0,808	0,802	0,814	0,835	0,827	0,843	0,852	0,844	0,860
60 à 79 ans	0,741	0,734	0,748	0,782	0,778	0,786	0,810	0,804	0,816	0,828	0,817	0,839
6 à 79 ans	0,791	0,787	0,795	0,833	0,827	0,839	0,874	0,867	0,881	0,904	0,897	0,911
Hommes												
6 à 11 ans	0,837	0,828	0,846	0,876	0,868	0,884	0,910	0,903	0,917	0,920	0,915	0,925
12 à 19 ans	0,830	0,818	0,842	0,875	0,864	0,886	0,907	0,897	0,917	0,932	0,920	0,944
20 à 39 ans	0,801	0,787	0,815	0,837	0,827	0,847	0,862	0,849	0,875	0,891	0,876	0,906
40 à 59 ans	0,777	0,767	0,787	0,811	0,803	0,819	0,845	0,834	0,856	0,857	0,849	0,865
60 à 79 ans	0,729	0,718	0,740	0,778	0,769	0,787	0,804	0,796	0,812	0,823	0,809	0,837
6 à 79 ans	0,788	0,781	0,795	0,830	0,821	0,839	0,862	0,855	0,869	0,891	0,881	0,901
Femmes												
6 à 11 ans	0,860	0,850	0,870	0,895	0,888	0,902	0,930	0,914	0,946	0,947	0,939	0,955
12 à 19 ans	0,865	0,859	0,871	0,900	0,893	0,907	0,930	0,921	0,939	0,945	0,932	0,958
20 à 39 ans	0,812	0,800	0,824	0,855	0,848	0,862	0,904	0,882	0,926	0,918	0,901	0,935
40 à 59 ans	0,772	0,765	0,779	0,801	0,794	0,808	0,825	0,817	0,833	0,841	0,836	0,846
60 à 79 ans	0,750	0,738	0,762	0,787	0,779	0,795	0,816	0,810	0,822	0,832	0,818	0,846
6 à 79 ans	0,793	0,790	0,796	0,840	0,834	0,846	0,887	0,878	0,896	0,916	0,907	0,925

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 38
Meilleur volume expiratoire maximal en une seconde de la population à domicile, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2007 à 2009

	Meilleur volume expiratoire maximal en une seconde											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	litres											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	1,86	1,82	1,90	1,19	1,14	1,24	1,28	1,21	1,35	1,51	1,44	1,58
12 à 19 ans	3,45	3,40	3,50	2,26	2,12	2,40	2,50	2,43	2,57	2,87	2,81	2,93
20 à 39 ans	3,66	3,59	3,74	2,54	2,44	2,64	2,73	2,65	2,81	3,05	2,98	3,12
40 à 59 ans	3,11	3,05	3,18	2,00	1,85	2,15	2,19	2,10	2,28	2,56	2,48	2,64
60 à 79 ans	2,43	2,37	2,49	1,39	1,30	1,48	1,60	1,50	1,70	1,92	1,87	1,97
6 à 79 ans	3,13	3,08	3,17	1,66	1,61	1,71	1,95	1,89	2,01	2,47	2,42	2,52
Hommes												
6 à 11 ans	1,88	1,81	1,94	1,22	1,15	1,29	1,29	1,19	1,39	1,57	1,47	1,67
12 à 19 ans	3,73	3,63	3,84	2,24	2,09	2,39	2,44	2,34	2,54	3,02	2,81	3,23
20 à 39 ans	4,17	4,06	4,29	3,03	2,83	3,23	3,30	3,09	3,51	3,79	3,68	3,90
40 à 59 ans	3,62	3,52	3,72	2,53	2,23	2,83	2,85	2,67	3,03	3,20	3,09	3,31
60 à 79 ans	2,84	2,74	2,95	1,63	1,43	1,83	1,97	1,78	2,16	2,41	2,29	2,53
6 à 79 ans	3,57	3,50	3,65	1,87	1,75	1,99	2,28	2,16	2,40	3,02	2,94	3,10
Femmes												
6 à 11 ans	1,84	1,79	1,89	1,17	1,11	1,23	1,27	1,20	1,34	1,47	1,43	1,51
12 à 19 ans	3,15	3,10	3,20	2,30	2,08	2,52	2,54	2,45	2,63	2,83	2,77	2,89
20 à 39 ans	3,12	3,07	3,18	2,40	2,32	2,48	2,54	2,44	2,64	2,80	2,72	2,88
40 à 59 ans	2,61	2,55	2,67	1,76	1,67	1,85	2,06	1,98	2,14	2,32	2,27	2,37
60 à 79 ans	2,05	2,02	2,09	1,26	1,11	1,41	1,48	1,41	1,55	1,79	1,74	1,84
6 à 79 ans	2,68	2,64	2,71	1,53	1,48	1,58	1,79	1,74	1,84	2,25	2,20	2,30

	Meilleur volume expiratoire maximal en une seconde											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	litres											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	1,81	1,75	1,87	2,17	2,12	2,22	2,46	2,37	2,55	2,68	2,59	2,77
12 à 19 ans	3,36	3,30	3,42	3,90	3,81	3,99	4,60	4,43	4,77	4,87	4,74	5,00
20 à 39 ans	3,59	3,49	3,69	4,30	4,19	4,41	4,70	4,51	4,89	5,01	4,84	5,18
40 à 59 ans	3,05	2,98	3,12	3,65	3,57	3,73	4,18	3,97	4,39	4,46	4,33	4,59
60 à 79 ans	2,36	2,30	2,42	2,91	2,81	3,01	3,45	3,32	3,58	3,70	3,54	3,86
6 à 79 ans	3,09	3,05	3,13	3,75	3,70	3,80	4,39	4,31	4,47	4,68	4,53	4,83
Hommes												
6 à 11 ans	1,85	1,74	1,96	2,19	2,13	2,25	2,44	2,33	2,55	2,61	2,52	2,70
12 à 19 ans	3,77	3,66	3,88	4,43	4,34	4,52	4,86	4,73	4,99	5,15	4,96	5,34
20 à 39 ans	4,27	4,14	4,40	4,52	4,35	4,69	4,98	4,81	5,15	5,11	4,93	5,29
40 à 59 ans	3,62	3,54	3,70	4,03	3,85	4,21	4,46	4,33	4,59	4,56	4,39	4,73
60 à 79 ans	2,91	2,81	3,01	3,31	3,18	3,44	3,72	3,57	3,87	3,85	3,73	3,97
6 à 79 ans	3,69	3,61	3,77	4,29	4,17	4,41	4,68	4,53	4,83	4,95	4,83	5,07
Femmes												
6 à 11 ans	1,77	1,71	1,83	2,14	2,05	2,23	2,48	2,35	2,61	2,69	2,56	2,82
12 à 19 ans	3,20	3,12	3,28	3,48	3,42	3,54	3,74	3,64	3,84	3,87	3,74	4,00
20 à 39 ans	3,10	3,04	3,16	3,42	3,35	3,49	3,72	3,58	3,86	3,88	3,76	4,00
40 à 59 ans	2,62	2,55	2,69	2,94	2,85	3,03	3,25	3,16	3,34	3,42	3,34	3,50
60 à 79 ans	2,07	2,03	2,11	2,36	2,31	2,41	2,65	2,56	2,74	2,74	2,67	2,81
6 à 79 ans	2,70	2,65	2,75	3,14	3,08	3,20	3,49	3,43	3,55	3,71	3,61	3,81

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 39
Meilleure capacité vitale forcée de la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Meilleure capacité vitale forcée											
	Moyenne			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	litres											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	2,20	2,15	2,25	1,34	1,27	1,41	1,51	1,42	1,60	1,79	1,71	1,87
12 à 19 ans	4,13	4,05	4,21	2,69	2,54	2,84	2,94	2,84	3,04	3,45	3,35	3,55
20 à 39 ans	4,59	4,49	4,69	3,03	2,85	3,21	3,35	3,19	3,51	3,77	3,67	3,87
40 à 59 ans	4,09	4,01	4,18	2,65	2,54	2,76	2,87	2,79	2,95	3,41	3,30	3,52
60 à 79 ans	3,34	3,25	3,42	2,02	1,86	2,18	2,34	2,28	2,40	2,68	2,61	2,75
6 à 79 ans	4,00	3,93	4,06	2,20	2,13	2,27	2,55	2,50	2,60	3,19	3,11	3,27
Hommes												
6 à 11 ans	2,26	2,18	2,34	1,35	1,23	1,47	1,52	1,40	1,64	1,85	1,75	1,95
12 à 19 ans	4,53	4,38	4,67	2,70	2,50	2,90	3,04	2,85	3,23	3,72	3,55	3,89
20 à 39 ans	5,28	5,14	5,42	3,80	3,49	4,11	4,14	3,93	4,35	4,78	4,57	4,99
40 à 59 ans	4,75	4,63	4,87	3,46	3,04	3,88	3,71	3,52	3,90	4,16	3,97	4,35
60 à 79 ans	3,96	3,84	4,09	2,62	2,46	2,78	2,91	2,69	3,13	3,38	3,20	3,56
6 à 79 ans	4,61	4,51	4,71	2,49	2,41	2,57	3,03	2,85	3,21	3,94	3,82	4,06
Femmes												
6 à 11 ans	2,15	2,09	2,21	1,34	1,28	1,40	1,47	1,37	1,57	1,71	1,61	1,81
12 à 19 ans	3,70	3,65	3,75	2,67	2,45	2,89	2,91	2,85	2,97	3,30	3,24	3,36
20 à 39 ans	3,85	3,77	3,93	2,84	2,68	3,00	3,02	2,83	3,21	3,46	3,34	3,58
40 à 59 ans	3,44	3,37	3,51	2,45	2,35	2,55	2,67	2,57	2,77	3,02	2,93	3,11
60 à 79 ans	2,76	2,70	2,82	1,74	1,53	1,95	2,04	1,85	2,23	2,42	2,35	2,49
6 à 79 ans	3,39	3,35	3,43	2,02	1,93	2,11	2,38	2,33	2,43	2,89	2,85	2,93

	Meilleure capacité vitale forcée											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	litres											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	2,15	2,09	2,21	2,58	2,51	2,65	2,97	2,89	3,05	3,16	3,07	3,25
12 à 19 ans	3,94	3,87	4,01	4,79	4,66	4,92	5,53	5,37	5,69	5,90	5,73	6,07
20 à 39 ans	4,45	4,30	4,60	5,35	5,22	5,48	5,98	5,87	6,09	6,28	6,10	6,46
40 à 59 ans	3,97	3,85	4,09	4,74	4,57	4,91	5,48	5,29	5,67	5,91	5,68	6,14
60 à 79 ans	3,22	3,13	3,31	3,94	3,82	4,06	4,60	4,38	4,82	5,00	4,86	5,14
6 à 79 ans	3,92	3,85	3,99	4,81	4,70	4,92	5,58	5,45	5,71	5,98	5,90	6,06
Hommes												
6 à 11 ans	2,26	2,15	2,37	2,62	2,53	2,71	2,97	2,90	3,04	3,15	3,04	3,26
12 à 19 ans	4,56	4,42	4,70	5,34	5,18	5,50	5,89	5,72	6,06	6,15	5,88	6,42
20 à 39 ans	5,31	5,15	5,47	5,86	5,73	5,99	6,26	6,09	6,43	6,58	6,37	6,79
40 à 59 ans	4,67	4,49	4,85	5,28	5,12	5,44	5,91	5,68	6,14	6,28	6,02	6,54
60 à 79 ans	3,95	3,82	4,08	4,53	4,40	4,66	5,00	4,87	5,13	5,24	5,04	5,44
6 à 79 ans	4,69	4,52	4,86	5,40	5,28	5,52	5,98	5,90	6,06	6,30	6,13	6,47
Femmes												
6 à 11 ans	2,08	2,01	2,15	2,52	2,42	2,62	2,97	2,82	3,12	3,16	2,99	3,33
12 à 19 ans	3,69	3,62	3,76	4,09	3,97	4,21	4,46	4,32	4,60	4,82	4,51	5,13
20 à 39 ans	3,84	3,76	3,92	4,24	4,18	4,30	4,68	4,56	4,80	4,87	4,74	5,00
40 à 59 ans	3,47	3,37	3,57	3,81	3,72	3,90	4,14	4,01	4,27	4,41	4,31	4,51
60 à 79 ans	2,77	2,71	2,83	3,17	3,08	3,26	3,44	3,34	3,54	3,57	3,47	3,67
6 à 79 ans	3,44	3,38	3,50	3,90	3,83	3,97	4,32	4,26	4,38	4,64	4,51	4,77

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 40
Distribution de la population à domicile d'après l'état dentaire, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	État dentaire								
	Denté — les deux maxillaires			Denté — maxillaires supérieure seulement			Denté — maxillaires inférieure seulement		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à
pourcentage									
Les deux sexes									
6 à 11 ans	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 à 19 ans	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 à 39 ans	99,3	98,9	99,8	F	F
40 à 59 ans	88,4	84,0	92,7	0,0	0,0	0,0	7,3 ^E	3,7	10,9
60 à 79 ans	62,9	53,5	72,2	F	15,1	11,3	19,0
6 à 79 ans	89,6	86,8	92,5	F	5,1^E	3,4	6,8
Hommes									
6 à 11 ans	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 à 19 ans	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 à 39 ans	99,7	99,2	100,1	0,0	0,0	0,0	F
40 à 59 ans	89,0	84,5	93,5	0,0	0,0	0,0	6,7 ^E	2,4	11,0
60 à 79 ans	60,9	51,2	70,6	F	16,5 ^E	10,7	22,3
6 à 79 ans	89,9	87,2	92,7	F	5,0^E	3,1	6,8
Femmes									
6 à 11 ans	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 à 19 ans	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 à 39 ans	99,0	98,3	99,8	F	F
40 à 59 ans	87,7	83,0	92,4	0,0	0,0	0,0	7,8 ^E	4,4	11,3
60 à 79 ans	64,7	54,9	74,5	F	13,9 ^E	8,8	19,0
6 à 79 ans	89,4	86,3	92,5	F	5,2^E	3,4	7,1

	État dentaire					
	Édenté avec un ou plusieurs implants			Édenté		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à
pourcentage						
Les deux sexes						
6 à 11 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 à 19 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 à 39 ans	0,0	0,0	0,0	F
40 à 59 ans	F	4,4 ^E	2,7	6,0
60 à 79 ans	F	20,8	14,7	26,9
6 à 79 ans	0,2^E	0,1	0,2	5,0	3,7	6,4
Hommes						
6 à 11 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 à 19 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 à 39 ans	0,0	0,0	0,0	F
40 à 59 ans	0,0	0,0	0,0	4,3 ^E	2,2	6,4
60 à 79 ans	F	22,1	15,0	29,2
6 à 79 ans	F	5,0	3,5	6,5
Femmes						
6 à 11 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 à 19 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 à 39 ans	0,0	0,0	0,0	F
40 à 59 ans	F	4,4 ^E	2,3	6,6
60 à 79 ans	F	19,6 ^E	13,2	26,0
6 à 79 ans	F	5,1	3,7	6,4

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

^F trop peu fiable pour être publié (données avec un coefficient de variation (CV) de plus de 33,3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage)

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 41

Distribution de la population à domicile selon la concentration de vitamine B12 dans le sérum, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Concentration de vitamine B12 dans le sérum											
	Moyenne		5 ^e percentile		10 ^e percentile		25 ^e percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance
		de à		de à		de à		de à		de à		de à
	picomoles par litre											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	462	450	474	228	214	242	267	255	279	348	332	364
12 à 19 ans	347	334	359	153	142	164	178	159	197	233	225	241
20 à 39 ans	321	312	330	148	134	162	176	164	188	218	209	227
40 à 59 ans	332	318	346	145	136	154	169	156	182	218	205	231
60 à 79 ans	351	340	362	153	143	163	177	169	185	230	221	239
6 à 19 ans	387	378	396	163	150	176	202	194	210	262	252	272
20 à 79 ans	332	323	340	147	140	154	174	167	181	221	214	228
6 à 79 ans	341	334	349	150	144	156	177	171	183	227	220	234
Hommes												
6 à 11 ans	453	434	471	223	193	253	269	250	288	337	312	362
12 à 19 ans	358	340	376	177	155	199	204	191	217	252	235	269
20 à 39 ans	328	315	341	178	166	190	194	186	202	241	229	253
40 à 59 ans	315	304	325	144	129	159	162	148	176	213	195	231
60 à 79 ans	327	315	339	150	135	165	171	163	179	220	207	233
6 à 19 ans	391	376	406	190	172	208	212	200	224	276	267	285
20 à 79 ans	322	314	330	154	145	163	178	173	183	224	212	236
6 à 79 ans	334	329	340	156	149	163	181	177	185	232	226	238
Femmes												
6 à 11 ans	473	454	491	238	222	254	266	234	298	359	319	399
12 à 19 ans	334	317	352	139	117	161	157	138	176	225	208	242
20 à 39 ans	315	300	330	140	125	155	156	139	173	201	187	215
40 à 59 ans	350	327	372	148	135	161	175	158	192	221	204	238
60 à 79 ans	374	359	389	153	133	173	181	166	196	244	231	257
6 à 19 ans	382	372	393	151	134	168	177	149	205	246	228	264
20 à 79 ans	342	328	355	144	135	153	170	157	183	218	211	225
6 à 79 ans	349	336	361	144	136	152	170	157	183	221	213	229

	Concentration de vitamine B12 dans le sérum											
	50 ^e percentile		75 ^e percentile		90 ^e percentile		95 ^e percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance
		de à		de à		de à		de à		de à		de à
	picomoles par litre											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	448	431	465	589	571	607	671	655	687	702	696	708
12 à 19 ans	312	298	326	449	419	479	567	524	610	618	584	652
20 à 39 ans	291	284	298	411	391	431	529	503	555	582	557	607
40 à 59 ans	301	279	323	432	409	455	553	528	578	620	592	648
60 à 79 ans	320	304	336	451	424	478	592	567	617	654	631	677
6 à 19 ans	364	352	376	508	489	527	618	599	637	665	647	683
20 à 79 ans	299	288	310	426	408	444	553	540	566	618	604	632
6 à 79 ans	308	299	317	440	429	451	570	560	580	629	617	641
Hommes												
6 à 11 ans	443	418	468	569	531	607	659	638	680	700	692	708
12 à 19 ans	323	308	338	467	428	506	567	526	608	614	576	652
20 à 39 ans	301	290	312	398	367	429	514	475	553	573	545	601
40 à 59 ans	288	268	308	390	375	405	513	473	553	597	554	640
60 à 79 ans	298	280	316	398	381	415	563	525	601	621	581	661
6 à 19 ans	362	339	385	508	485	531	612	591	633	658	642	674
20 à 79 ans	296	287	305	394	380	408	520	493	547	590	570	610
6 à 79 ans	305	298	312	415	399	431	544	529	559	613	595	631
Femmes												
6 à 11 ans	454	426	482	594	573	615	682	669	695	705	696	714
12 à 19 ans	302	277	327	441	402	480	567	506	628	626	579	673
20 à 39 ans	277	262	292	413	381	445	532	495	569	596	563	629
40 à 59 ans	320	287	353	479	433	525	575	554	596	629	584	674
60 à 79 ans	344	326	362	485	449	521	632	614	650	671	650	692
6 à 19 ans	364	350	378	506	483	529	626	606	646	675	659	691
20 à 79 ans	305	283	327	450	423	477	575	560	590	632	613	651
6 à 79 ans	313	295	331	461	437	485	584	569	599	646	628	664

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent.

Pour plus de renseignements concernant les critères d'exclusion et la limite de détection de vitamine B12 dans le sérum, veuillez consulter le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 42

Distribution de la population à domicile selon la concentration de vitamine D dans le plasma, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Concentration de vitamine D dans le plasma											
	Moyenne		5 ^e percentile		10 ^e percentile		25 ^e percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance
		de	à	de	à	de	à	de	à	de	à	de
	nanomoles par litre											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	75,0	70,4	79,6	39,3	33,7	45,0	45,7	39,3	52,1	60,0	54,0	66,1
12 à 19 ans	68,1	63,8	72,4	27,5	23,5	31,4	34,9	28,5	41,2	48,9	43,5	54,4
20 à 39 ans	65,0	61,0	69,0	27,4	23,6	31,3	34,9	31,6	38,2	46,3	42,8	49,9
40 à 59 ans	66,5	63,9	69,1	28,1	25,6	30,7	36,7	32,5	40,9	49,3	46,3	52,3
60 à 79 ans	72,0	69,5	74,5	33,9	31,3	36,4	42,2	40,4	43,9	54,6	51,5	57,7
6 à 19 ans	70,6	67,1	74,2	30,5	25,7	35,2	38,4	33,5	43,4	53,1	48,9	57,4
20 à 79 ans	67,1	64,8	69,4	29,3	26,6	32,0	36,6	34,0	39,3	49,0	46,3	51,6
6 à 79 ans	67,7	65,3	70,1	29,4	26,7	32,1	36,9	34,1	39,7	49,5	46,8	52,2
Hommes												
6 à 11 ans	76,8	73,0	80,6	44,1	39,4	48,9	49,5	44,1	54,9	63,6	59,7	67,5
12 à 19 ans	65,6	60,9	70,4	26,7	22,4	31,0	31,9	26,4	37,5	44,5	39,0	50,1
20 à 39 ans	60,7	55,3	66,0	25,9	21,9	29,9	32,7	27,8	37,7	44,4	40,3	48,5
40 à 59 ans	66,0	62,4	69,5	27,4	25,0	29,7	31,7	25,8	37,6	48,2	44,2	52,2
60 à 79 ans	70,5	67,5	73,5	32,9	30,3	35,6	40,7	35,9	45,6	53,4	50,0	56,7
6 à 19 ans	69,7	65,8	73,6	30,5	25,5	35,4	37,3	31,6	42,9	51,2	45,7	56,8
20 à 79 ans	64,8	61,6	68,0	27,2	24,3	30,2	33,8	30,1	37,6	47,1	43,9	50,3
6 à 79 ans	65,7	62,6	68,8	27,5	24,7	30,3	34,4	30,5	38,3	47,4	44,2	50,7
Femmes												
6 à 11 ans	73,1	67,1	79,1	36,0	28,9	43,0	42,4	33,9	50,9	56,3	49,1	63,5
12 à 19 ans	70,8	65,9	75,8	27,7	20,6	34,8	38,4	29,5	47,4	53,7	48,6	58,8
20 à 39 ans	69,5	65,9	73,2	31,9	27,6	36,3	38,0	34,4	41,6	49,3	45,7	52,9
40 à 59 ans	67,1	65,0	69,2	30,7	26,4	35,0	38,7	34,9	42,4	50,0	46,3	53,6
60 à 79 ans	73,3	70,3	76,3	35,0	30,4	39,6	43,0	40,4	45,6	55,8	52,0	59,6
6 à 19 ans	71,7	67,8	75,6	30,5	23,9	37,1	39,4	33,3	45,6	54,7	50,7	58,7
20 à 79 ans	69,3	67,5	71,2	32,1	29,3	34,9	39,5	36,5	42,4	50,9	48,3	53,5
6 à 79 ans	69,7	67,8	71,7	32,0	29,0	34,9	39,5	36,5	42,4	51,3	48,5	54,0

	Concentration de vitamine D dans le plasma											
	50 ^e percentile		75 ^e percentile		90 ^e percentile		95 ^e percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance
		de	à	de	à	de	à	de	à	de	à	de
	nanomoles par litre											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	74,1	70,4	77,9	87,5	83,4	91,6	103,5	96,8	110,3	114,9	107,4	122,4
12 à 19 ans	64,2	59,8	68,7	85,0	79,4	90,7	104,0	97,9	110,1	115,9	110,0	121,9
20 à 39 ans	61,2	56,6	65,8	78,8	73,6	84,1	95,6	89,6	101,5	110,5	96,6	124,5
40 à 59 ans	65,8	62,4	69,2	81,0	78,3	83,6	97,5	93,8	101,1	110,5	102,5	118,6
60 à 79 ans	71,2	66,7	75,7	88,9	84,9	92,9	103,1	101,0	105,2	112,2	109,5	114,8
6 à 19 ans	69,0	65,4	72,6	86,5	82,8	90,2	103,8	98,7	109,0	115,8	111,2	120,4
20 à 79 ans	65,1	62,3	68,0	82,0	79,9	84,0	98,6	95,4	101,8	111,4	106,7	116,0
6 à 79 ans	65,7	63,0	68,5	82,9	80,8	85,0	99,5	96,5	102,5	112,2	107,9	116,4
Hommes												
6 à 11 ans	76,0	73,1	79,0	88,0	83,2	92,8	102,2	96,0	108,5	113,2	105,1	121,3
12 à 19 ans	63,0	58,3	67,7	83,5	76,8	90,1	101,5	94,4	108,6	111,3	105,1	117,5
20 à 39 ans	56,8	51,9	61,7	72,9	65,9	79,8	90,0	81,3	98,7	98,8	73,2	124,3
40 à 59 ans	65,3	60,6	70,0	81,4	76,4	86,3	97,6	92,1	103,1	112,5	100,6	124,4
60 à 79 ans	69,2	64,5	73,9	86,9	81,6	92,3	101,3	97,1	105,4	109,9	102,1	117,7
6 à 19 ans	69,1	64,9	73,2	86,1	81,3	90,9	101,8	95,6	107,9	112,0	106,7	117,3
20 à 79 ans	62,6	58,8	66,5	80,1	76,0	84,3	95,4	90,9	99,9	108,4	100,3	116,5
6 à 79 ans	63,9	60,3	67,5	81,0	77,2	84,8	97,4	93,2	101,6	108,7	102,5	114,9
Femmes												
6 à 11 ans	72,1	66,7	77,6	86,1	81,0	91,2	106,9	97,3	116,5	115,8	104,3	127,3
12 à 19 ans	66,4	60,5	72,4	87,0	80,4	93,5	105,3	94,6	116,0	119,2	106,5	131,9
20 à 39 ans	66,1	61,4	70,9	84,1	81,5	86,6	104,0	96,8	111,3	121,1	108,2	133,9
40 à 59 ans	66,3	63,3	69,3	80,6	77,5	83,7	96,1	92,3	99,8	110,2	102,9	117,4
60 à 79 ans	73,0	68,4	77,6	90,8	87,4	94,2	105,1	100,6	109,6	112,3	108,4	116,2
6 à 19 ans	68,9	64,7	73,1	86,9	82,9	90,9	106,6	99,3	113,9	116,7	107,7	125,8
20 à 79 ans	67,4	65,3	69,5	83,8	82,8	84,8	101,8	98,6	104,9	113,3	107,9	118,7
6 à 79 ans	67,9	65,7	70,1	84,1	82,6	85,5	102,3	99,5	105,1	114,9	110,1	119,7

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent.

Pour plus de renseignements concernant les critères d'exclusion et la limite de détection de vitamine D dans le plasma, veuillez consulter le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 43
Distribution de la population à domicile selon la concentration d'homocystéine dans le plasma, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Concentration d'homocystéine dans le plasma											
	Moyenne		5 ^e percentile		10 ^e percentile		25 ^e percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance
		de à		de à		de à		de à		de à		de à
	micromoles par litre											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	4,0	3,6	4,4	2,0	1,7	2,3	2,3	2,0	2,6	3,0	2,7	3,3
12 à 19 ans	5,8	5,5	6,0	3,2	2,8	3,6	3,7	3,5	3,9	4,5	4,3	4,7
20 à 39 ans	7,1	6,7	7,4	3,7	3,3	4,1	4,2	3,8	4,6	5,4	5,0	5,8
40 à 59 ans	8,1	7,7	8,4	4,6	4,3	4,9	5,2	4,9	5,5	6,2	5,9	6,5
60 à 79 ans	9,8	9,4	10,2	5,6	5,0	6,2	6,4	6,0	6,8	7,6	7,1	8,1
6 à 19 ans	5,1	4,9	5,4	2,3	2,0	2,6	2,8	2,5	3,1	3,8	3,6	4,0
20 à 79 ans	8,1	7,7	8,4	4,2	3,8	4,6	4,9	4,5	5,3	6,1	5,7	6,5
6 à 79 ans	7,5	7,2	7,9	3,5	3,2	3,8	4,2	3,9	4,5	5,5	5,2	5,8
Hommes												
6 à 11 ans	4,1	3,7	4,4	2,1	1,9	2,3	2,4	2,0	2,8	3,0	2,7	3,3
12 à 19 ans	6,1	5,8	6,4	3,5	3,3	3,7	3,8	3,6	4,0	4,5	4,2	4,8
20 à 39 ans	8,1	7,7	8,5	5,2	4,5	5,9	5,6	5,3	5,9	6,5	6,1	6,9
40 à 59 ans	8,9	8,5	9,2	5,5	5,2	5,8	6,1	5,8	6,4	7,0	6,6	7,4
60 à 79 ans	10,4	9,8	11,0	5,8	4,9	6,7	6,6	6,0	7,2	8,0	7,4	8,6
6 à 19 ans	5,3	5,1	5,6	2,5	2,1	2,9	3,0	2,7	3,3	3,9	3,7	4,1
20 à 79 ans	8,9	8,5	9,2	5,4	5,0	5,8	5,8	5,4	6,2	6,9	6,6	7,2
6 à 79 ans	8,2	7,9	8,6	3,9	3,6	4,2	4,8	4,4	5,2	6,2	5,9	6,5
Femmes												
6 à 11 ans	3,9	3,5	4,3	1,9	1,5	2,3	2,2	1,8	2,6	2,9	2,5	3,3
12 à 19 ans	5,5	5,1	5,9	2,9	2,4	3,4	3,5	3,1	3,9	4,4	4,0	4,8
20 à 39 ans	6,0	5,6	6,4	3,2	2,8	3,6	3,7	3,4	4,0	4,6	4,2	5,0
40 à 59 ans	7,3	6,9	7,7	4,1	3,7	4,5	4,7	4,4	5,0	5,6	5,3	5,9
60 à 79 ans	9,3	8,9	9,7	5,5	5,0	6,0	6,2	5,8	6,6	7,3	6,9	7,7
6 à 19 ans	4,9	4,5	5,3	2,2	1,8	2,6	2,7	2,3	3,1	3,7	3,3	4,1
20 à 79 ans	7,2	6,9	7,6	3,7	3,4	4,0	4,3	4,0	4,6	5,4	5,0	5,8
6 à 79 ans	6,8	6,5	7,2	3,2	2,8	3,6	3,8	3,5	4,1	4,9	4,5	5,3

	Concentration d'homocystéine dans le plasma											
	50 ^e percentile		75 ^e percentile		90 ^e percentile		95 ^e percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance
		de à		de à		de à		de à		de à		de à
	micromoles par litre											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	3,9	3,5	4,3	4,8	4,4	5,2	5,9	5,2	6,6	6,7	6,1	7,3
12 à 19 ans	5,5	5,3	5,7	6,7	6,3	7,1	8,1	7,7	8,5	8,9	8,4	9,4
20 à 39 ans	6,8	6,5	7,1	8,3	8,0	8,6	10,1	9,4	10,8	11,8	11,1	12,5
40 à 59 ans	7,6	7,2	8,0	9,3	8,9	9,7	11,4	10,7	12,1	13,3	12,2	14,4
60 à 79 ans	9,2	8,8	9,6	11,2	10,8	11,6	13,7	13,1	14,3	16,5	15,4	17,6
6 à 19 ans	4,8	4,5	5,1	6,2	5,8	6,6	7,6	7,1	8,1	8,4	8,1	8,7
20 à 79 ans	7,6	7,2	8,0	9,4	9,0	9,8	11,7	11,3	12,1	13,5	12,9	14,1
6 à 79 ans	7,1	6,7	7,5	8,9	8,5	9,3	11,2	10,8	11,6	13,1	12,5	13,7
Hommes												
6 à 11 ans	3,9	3,6	4,2	4,9	4,4	5,4	6,1	5,2	7,0	6,9	6,3	7,5
12 à 19 ans	5,6	5,4	5,8	7,0	6,6	7,4	8,5	8,2	8,8	9,3	8,7	9,9
20 à 39 ans	7,7	7,4	8,0	9,2	8,5	9,9	11,3	10,3	12,3	12,7	11,5	13,9
40 à 59 ans	8,4	7,9	8,9	10,1	9,6	10,6	12,2	11,5	12,9	14,0	12,9	15,1
60 à 79 ans	9,8	9,4	10,2	11,8	10,9	12,7	14,7	13,4	16,0	17,7	16,6	18,8
6 à 19 ans	5,0	4,6	5,4	6,5	6,1	6,9	8,0	7,4	8,6	8,6	8,3	8,9
20 à 79 ans	8,3	7,9	8,7	10,2	9,7	10,7	12,5	11,9	13,1	14,3	13,6	15,0
6 à 79 ans	7,9	7,5	8,3	9,7	9,3	10,1	12,0	11,6	12,4	14,0	13,4	14,6
Femmes												
6 à 11 ans	3,8	3,3	4,3	4,8	4,4	5,2	5,8	5,2	6,4	6,5	5,9	7,1
12 à 19 ans	5,3	4,9	5,7	6,6	6,1	7,1	7,7	7,0	8,4	8,2	7,1	9,3
20 à 39 ans	5,8	5,2	6,4	7,1	6,7	7,5	8,4	7,8	9,0	9,4	8,5	10,3
40 à 59 ans	7,0	6,4	7,6	8,3	7,9	8,7	10,0	9,2	10,8	11,6	10,3	12,9
60 à 79 ans	8,6	8,2	9,0	10,7	10,4	11,0	12,9	12,5	13,3	14,9	13,6	16,2
6 à 19 ans	4,7	4,5	4,9	6,0	5,5	6,5	7,3	6,7	7,9	8,0	7,3	8,7
20 à 79 ans	6,8	6,4	7,2	8,4	8,0	8,8	10,6	10,1	11,1	12,3	11,6	13,0
6 à 79 ans	6,5	6,2	6,8	8,1	7,7	8,5	10,1	9,6	10,6	11,8	11,2	12,4

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent.
 Pour plus de renseignements concernant les critères d'exclusion et la limite de détection d'homocystéine dans le plasma, veuillez consulter le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 44
Distribution de la population à domicile selon la concentration de folate dans les globules rouges du sang total, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Concentration de folate dans les globules rouges du sang total											
	Moyenne		5 ^e percentile		10 ^e percentile		25 ^e percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance
	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à
nanomoles par litre												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	1 250	1 195	1 306	668	562	774	775	695	855	1 007	946	1 068
12 à 19 ans	1 137	1 058	1 217	594	555	632	661	592	730	848	756	940
20 à 39 ans	1 260	1 191	1 329	638	525	752	749	668	830	944	886	1 001
40 à 59 ans	1 383	1 281	1 484	622	572	672	751	674	828	987	888	1 086
60 à 79 ans	1 516	1 397	1 635	634	513	756	800	709	891	1 058	951	1 165
6 à 19 ans	1 179	1 113	1 245	597	554	641	699	632	766	901	820	982
20 à 79 ans	1 363	1 279	1 447	623	545	701	758	691	825	971	905	1 038
6 à 79 ans	1 331	1 250	1 411	622	553	691	741	675	807	960	890	1 030
Hommes												
6 à 11 ans	1 274	1 211	1 336	675	583	767	786	695	877	1 073	993	1 153
12 à 19 ans	1 125	1 047	1 202	560	495	626	647	571	723	841	733	948
20 à 39 ans	1 241	1 176	1 306	658	561	756	740	664	817	939	883	995
40 à 59 ans	1 332	1 226	1 437	618	549	686	715	617	814	951	837	1 065
60 à 79 ans	1 453	1 307	1 600	633	500	765	764	642	886	1 005	878	1 132
6 à 19 ans	1 180	1 112	1 248	592	542	642	691	615	767	913	824	1 001
20 à 79 ans	1 320	1 238	1 402	622	551	693	732	671	794	957	882	1 033
6 à 79 ans	1 295	1 217	1 372	619	557	681	726	667	786	950	876	1 024
Femmes												
6 à 11 ans	1 225	1 164	1 286	643	502	783	765	680	850	967	903	1 032
12 à 19 ans	1 151	1 060	1 242	602	548	656	681	610	753	849	762	935
20 à 39 ans	1 279	1 180	1 379	600	461	740	749	635	863	944	868	1 019
40 à 59 ans	1 433	1 322	1 544	626	545	707	781	696	865	1 005	878	1 131
60 à 79 ans	1 573	1 468	1 678	661	524	798	814	729	898	1 119	1 030	1 208
6 à 19 ans	1 179	1 109	1 249	603	539	667	701	636	766	889	811	967
20 à 79 ans	1 406	1 310	1 502	634	533	735	772	692	853	987	909	1 065
6 à 79 ans	1 367	1 277	1 456	623	537	709	757	679	834	966	888	1 045

	Concentration de folate dans les globules rouges du sang total											
	50 ^e percentile		75 ^e percentile		90 ^e percentile		95 ^e percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance
	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à
nanomoles par litre												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	1 212	1 141	1 283	1 492	1 441	1 542	1 726	1 674	1 779	1 872	1 786	1 959
12 à 19 ans	1 120	1 047	1 193	1 378	1 281	1 474	1 686	1 544	1 828	1 846	1 711	1 982
20 à 39 ans	1 191	1 123	1 259	1 482	1 392	1 572	1 873	1 753	1 992	2 108	1 938	2 279
40 à 59 ans	1 292	1 181	1 402	1 697	1 562	1 831	2 120	1 987	2 253	2 429	2 224	2 634
60 à 79 ans	1 410	1 285	1 536	1 899	1 769	2 028	2 395	2 154	2 636	2 737	2 513	2 960
6 à 19 ans	1 150	1 097	1 204	1 423	1 354	1 493	1 710	1 620	1 799	1 847	1 742	1 952
20 à 79 ans	1 266	1 191	1 342	1 672	1 568	1 777	2 098	1 973	2 222	2 404	2 226	2 582
6 à 79 ans	1 248	1 173	1 323	1 619	1 514	1 724	2 044	1 920	2 169	2 316	2 165	2 467
Hommes												
6 à 11 ans	1 249	1 168	1 330	1 520	1 440	1 600	1 729	1 642	1 816	1 852	1 776	1 929
12 à 19 ans	1 125	1 047	1 203	1 353	1 266	1 440	1 593	1 453	1 732	1 898	1 700	2 096
20 à 39 ans	1 211	1 124	1 297	1 454	1 376	1 533	1 816	1 702	1 930	1 928	1 777	2 079
40 à 59 ans	1 256	1 122	1 391	1 690	1 532	1 848	2 072	1 921	2 223	2 291	2 153	2 429
60 à 79 ans	1 355	1 214	1 497	1 800	1 619	1 981	2 289	1 998	2 579	2 584	2 257	2 910
6 à 19 ans	1 158	1 105	1 212	1 415	1 346	1 485	1 680	1 589	1 770	1 885	1 749	2 021
20 à 79 ans	1 255	1 171	1 339	1 622	1 507	1 738	1 994	1 862	2 125	2 249	2 073	2 425
6 à 79 ans	1 233	1 148	1 317	1 566	1 460	1 673	1 925	1 811	2 040	2 216	2 057	2 376
Femmes												
6 à 11 ans	1 164	1 084	1 243	1 454	1 405	1 503	1 715	1 659	1 772	1 884	1 758	2 010
12 à 19 ans	1 113	1 029	1 198	1 413	1 281	1 545	1 729	1 574	1 884	1 822	1 708	1 936
20 à 39 ans	1 175	1 097	1 253	1 549	1 399	1 700	2 013	1 778	2 247	2 256	2 089	2 424
40 à 59 ans	1 337	1 222	1 451	1 726	1 573	1 879	2 220	2 005	2 436	2 656	2 371	2 940
60 à 79 ans	1 488	1 356	1 619	1 938	1 835	2 041	2 461	2 188	2 735	2 834	2 645	3 023
6 à 19 ans	1 127	1 061	1 194	1 442	1 360	1 525	1 724	1 621	1 827	1 832	1 746	1 918
20 à 79 ans	1 300	1 211	1 389	1 706	1 581	1 831	2 172	2 029	2 315	2 552	2 310	2 794
6 à 79 ans	1 261	1 175	1 347	1 664	1 557	1 771	2 112	1 984	2 240	2 461	2 228	2 694

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 45

Distribution de la population à domicile (échantillon total) selon la concentration de cholestérol total dans le sérum, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Concentration de cholestérol total dans le sérum - échantillon total											
	Moyenne		5 ^e percentile		10 ^e percentile		25 ^e percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance
		de à		de à		de à		de à		de à		de à
	millimoles par litre											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	4,2	4,2	4,3	3,3	3,2	3,4	3,5	3,4	3,6	3,8	3,7	3,9
12 à 19 ans	4,1	4,0	4,2	3,0	2,8	3,2	3,2	3,1	3,3	3,6	3,5	3,7
20 à 39 ans	4,8	4,7	4,8	3,4	3,2	3,6	3,7	3,6	3,8	4,1	4,0	4,2
40 à 59 ans	5,2	5,1	5,3	3,7	3,4	4,0	4,0	3,8	4,2	4,6	4,5	4,7
60 à 79 ans	5,2	5,1	5,3	3,5	3,3	3,7	3,8	3,7	3,9	4,4	4,2	4,6
6 à 19 ans	4,1	4,1	4,2	3,0	2,9	3,1	3,3	3,2	3,4	3,7	3,6	3,8
20 à 79 ans	5,0	5,0	5,1	3,5	3,3	3,7	3,8	3,7	3,9	4,3	4,2	4,4
6 à 79 ans	4,9	4,8	5,0	3,3	3,2	3,4	3,6	3,5	3,7	4,1	4,0	4,2
Hommes												
6 à 11 ans	4,3	4,2	4,3	3,4	3,3	3,5	3,5	3,4	3,6	3,8	3,7	3,9
12 à 19 ans	4,0	3,9	4,1	3,0	2,8	3,2	3,2	3,1	3,3	3,5	3,4	3,6
20 à 39 ans	4,8	4,7	5,0	3,5	3,3	3,7	3,7	3,6	3,8	4,2	4,1	4,3
40 à 59 ans	5,2	5,1	5,3	3,6	3,2	4,0	4,0	3,7	4,3	4,5	4,3	4,7
60 à 79 ans	5,1	4,9	5,2	3,2	3,0	3,4	3,6	3,4	3,8	4,2	4,0	4,4
6 à 19 ans	4,1	4,0	4,2	3,1	3,0	3,2	3,3	3,2	3,4	3,6	3,5	3,7
20 à 79 ans	5,0	4,9	5,2	3,4	3,2	3,6	3,8	3,6	4,0	4,3	4,1	4,5
6 à 79 ans	4,9	4,8	5,0	3,3	3,2	3,4	3,6	3,5	3,7	4,1	4,0	4,2
Femmes												
6 à 11 ans	4,2	4,1	4,3	3,2	3,0	3,4	3,3	3,2	3,4	3,8	3,7	3,9
12 à 19 ans	4,2	4,0	4,3	2,9	2,6	3,2	3,2	3,0	3,4	3,7	3,5	3,9
20 à 39 ans	4,7	4,6	4,8	3,4	3,1	3,7	3,6	3,4	3,8	4,1	4,0	4,2
40 à 59 ans	5,2	5,1	5,4	3,7	3,5	3,9	4,0	3,8	4,2	4,6	4,5	4,7
60 à 79 ans	5,4	5,3	5,5	3,6	3,3	3,9	3,9	3,7	4,1	4,7	4,5	4,9
6 à 19 ans	4,2	4,1	4,3	3,0	2,8	3,2	3,3	3,2	3,4	3,7	3,6	3,8
20 à 79 ans	5,1	5,0	5,1	3,5	3,3	3,7	3,8	3,7	3,9	4,4	4,3	4,5
6 à 79 ans	4,9	4,8	5,0	3,4	3,2	3,6	3,7	3,6	3,8	4,2	4,1	4,3

	Concentration de cholestérol total dans le sérum - échantillon total											
	50 ^e percentile		75 ^e percentile		90 ^e percentile		95 ^e percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance
		de à		de à		de à		de à		de à		de à
	millimoles par litre											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	4,2	4,1	4,3	4,6	4,5	4,7	5,0	4,9	5,1	5,3	5,2	5,4
12 à 19 ans	4,0	3,9	4,1	4,5	4,3	4,7	5,2	5,0	5,4	5,5	5,3	5,7
20 à 39 ans	4,7	4,6	4,8	5,3	5,2	5,4	6,0	5,8	6,2	6,4	6,2	6,6
40 à 59 ans	5,2	5,1	5,3	5,9	5,7	6,1	6,5	6,4	6,6	6,9	6,7	7,1
60 à 79 ans	5,3	5,2	5,4	6,1	6,0	6,2	6,7	6,6	6,8	7,1	6,9	7,3
6 à 19 ans	4,1	4,0	4,2	4,6	4,5	4,7	5,1	4,9	5,3	5,4	5,3	5,5
20 à 79 ans	5,0	4,9	5,1	5,7	5,6	5,8	6,4	6,3	6,5	6,8	6,7	6,9
6 à 79 ans	4,8	4,7	4,9	5,5	5,4	5,6	6,3	6,2	6,4	6,7	6,6	6,8
Hommes												
6 à 11 ans	4,2	4,1	4,3	4,6	4,5	4,7	5,0	4,9	5,1	5,3	5,2	5,4
12 à 19 ans	3,9	3,8	4,0	4,4	4,2	4,6	5,0	4,7	5,3	5,4	5,0	5,8
20 à 39 ans	4,8	4,6	5,0	5,5	5,4	5,6	6,1	5,9	6,3	6,3	6,1	6,5
40 à 59 ans	5,2	5,1	5,3	5,8	5,6	6,0	6,5	6,4	6,6	6,9	6,5	7,3
60 à 79 ans	5,1	4,9	5,3	5,8	5,6	6,0	6,6	6,3	6,9	7,0	6,8	7,2
6 à 19 ans	4,0	3,9	4,1	4,5	4,4	4,6	5,0	4,8	5,2	5,4	5,2	5,6
20 à 79 ans	5,0	4,9	5,1	5,7	5,5	5,9	6,3	6,2	6,4	6,7	6,5	6,9
6 à 79 ans	4,8	4,7	4,9	5,5	5,4	5,6	6,3	6,2	6,4	6,6	6,4	6,8
Femmes												
6 à 11 ans	4,3	4,2	4,4	4,7	4,6	4,8	5,1	4,9	5,3	5,4	5,3	5,5
12 à 19 ans	4,1	3,9	4,3	4,6	4,4	4,8	5,2	5,0	5,4	5,6	5,4	5,8
20 à 39 ans	4,6	4,5	4,7	5,1	5,0	5,2	5,9	5,6	6,2	6,4	6,3	6,5
40 à 59 ans	5,2	5,0	5,4	5,9	5,7	6,1	6,5	6,3	6,7	7,0	6,5	7,5
60 à 79 ans	5,4	5,3	5,5	6,1	6,0	6,2	6,7	6,5	6,9	7,1	6,9	7,3
6 à 19 ans	4,2	4,1	4,3	4,6	4,5	4,7	5,2	5,1	5,3	5,4	5,2	5,6
20 à 79 ans	5,0	4,9	5,1	5,7	5,5	5,9	6,4	6,3	6,5	6,9	6,7	7,1
6 à 79 ans	4,8	4,7	4,9	5,5	5,4	5,6	6,3	6,2	6,4	6,7	6,5	6,9

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans basée sur l' échantillon total, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 46
Distribution de la population à domicile (sous-échantillon à jeun) selon la concentration de cholestérol total dans le sérum, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Concentration de cholestérol total dans le sérum - sous-échantillon à jeun											
	Moyenne		5 ^e percentile		10 ^e percentile		25 ^e percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance
		de à		de à		de à		de à		de à		de à
	millimoles par litre											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	4,2	4,0	4,3	3,1	2,8	3,4	3,3	3,1	3,5	3,7	3,5	3,9
12 à 19 ans	3,9	3,8	4,1	2,8	2,5	3,1	3,0	2,9	3,1	3,4	3,3	3,5
20 à 39 ans	4,6	4,5	4,7	3,1	2,8	3,4	3,6	3,3	3,9	3,9	3,7	4,1
40 à 59 ans	5,1	4,9	5,2	3,5	3,2	3,8	3,8	3,5	4,1	4,3	4,2	4,4
60 à 79 ans	5,2	5,0	5,3	3,2	3,0	3,4	3,7	3,5	3,9	4,3	4,1	4,5
6 à 19 ans	4,0	3,9	4,1	2,9	2,7	3,1	3,1	2,9	3,3	3,5	3,4	3,6
20 à 79 ans	4,9	4,8	5,0	3,3	3,0	3,6	3,7	3,5	3,9	4,1	4,0	4,2
6 à 79 ans	4,7	4,6	4,9	3,1	2,9	3,3	3,5	3,3	3,7	4,0	3,8	4,2
Hommes												
6 à 11 ans	4,2	4,1	4,3	3,3	3,1	3,5	3,4	3,2	3,6	3,8	3,6	4,0
12 à 19 ans	3,9	3,7	4,0	2,8	2,4	3,2	3,1	2,9	3,3	3,4	3,3	3,5
20 à 39 ans	4,7	4,5	4,8	3,3	3,0	3,6	3,6	3,4	3,8	3,9	3,7	4,1
40 à 59 ans	5,0	4,8	5,1	3,4	3,0	3,8	3,7	3,4	4,0	4,3	4,1	4,5
60 à 79 ans	5,0	4,7	5,2	3,1	2,8	3,4	3,5	3,1	3,9	4,1	3,8	4,4
6 à 19 ans	4,0	3,9	4,1	3,0	2,8	3,2	3,2	3,1	3,3	3,5	3,4	3,6
20 à 79 ans	4,9	4,7	5,0	3,3	3,1	3,5	3,7	3,5	3,9	4,1	3,9	4,3
6 à 79 ans	4,7	4,6	4,8	3,2	3,0	3,4	3,5	3,3	3,7	3,9	3,7	4,1
Femmes												
6 à 11 ans	4,1	3,9	4,3	3,0	2,5	3,5	3,2	2,8	3,6	3,6	3,3	3,9
12 à 19 ans	4,0	3,8	4,2	2,8	2,4	3,2	3,0	2,7	3,3	3,5	3,3	3,7
20 à 39 ans	4,5	4,3	4,7	3,1	2,6	3,6	3,4	3,0	3,8	3,9	3,7	4,1
40 à 59 ans	5,2	4,9	5,4	3,6	3,1	4,1	3,9	3,6	4,2	4,4	4,2	4,6
60 à 79 ans	5,4	5,2	5,5	3,7	3,3	4,1	3,9	3,6	4,2	4,6	4,3	4,9
6 à 19 ans	4,0	3,8	4,2	2,8	2,5	3,1	3,0	2,8	3,2	3,5	3,3	3,7
20 à 79 ans	5,0	4,8	5,1	3,4	3,1	3,7	3,7	3,5	3,9	4,2	4,1	4,3
6 à 79 ans	4,8	4,7	4,9	3,1	2,8	3,4	3,5	3,3	3,7	4,0	3,9	4,1

	Concentration de cholestérol total dans le sérum - sous-échantillon à jeun											
	50 ^e percentile		75 ^e percentile		90 ^e percentile		95 ^e percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance
		de à		de à		de à		de à		de à		de à
	millimoles par litre											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	4,2	4,0	4,4	4,5	4,4	4,6	5,0	4,8	5,2	5,4	5,2	5,6
12 à 19 ans	3,8	3,6	4,0	4,4	4,2	4,6	4,9	4,6	5,2	5,2	4,9	5,5
20 à 39 ans	4,5	4,3	4,7	5,2	5,0	5,4	5,8	5,6	6,0	6,1	5,9	6,3
40 à 59 ans	5,1	4,9	5,3	5,7	5,4	6,0	6,5	6,2	6,8	6,7	6,3	7,1
60 à 79 ans	5,3	5,1	5,5	6,0	5,8	6,2	6,6	6,5	6,7	7,0	6,8	7,2
6 à 19 ans	4,0	3,8	4,2	4,5	4,4	4,6	5,0	4,8	5,2	5,3	5,1	5,5
20 à 79 ans	4,9	4,8	5,0	5,5	5,3	5,7	6,3	6,1	6,5	6,6	6,4	6,8
6 à 79 ans	4,6	4,5	4,7	5,4	5,3	5,5	6,1	6,0	6,2	6,6	6,5	6,7
Hommes												
6 à 11 ans	4,2	4,1	4,3	4,5	4,4	4,6	5,1	4,9	5,3	5,4	5,2	5,6
12 à 19 ans	3,8	3,7	3,9	4,3	4,0	4,6	4,9	4,6	5,2	5,2	4,9	5,5
20 à 39 ans	4,6	4,3	4,9	5,4	5,2	5,6	5,8	5,6	6,0	6,0	5,7	6,3
40 à 59 ans	5,0	4,8	5,2	5,6	5,4	5,8	6,3	6,1	6,5	6,6	6,2	7,0
60 à 79 ans	5,1	4,8	5,4	5,8	5,5	6,1	6,3	6,1	6,5	6,7	6,4	7,0
6 à 19 ans	3,9	3,7	4,1	4,4	4,2	4,6	5,0	4,8	5,2	5,2	5,0	5,4
20 à 79 ans	4,9	4,7	5,1	5,5	5,4	5,6	6,1	5,9	6,3	6,5	6,3	6,7
6 à 79 ans	4,6	4,4	4,8	5,4	5,3	5,5	6,1	5,9	6,3	6,4	6,2	6,6
Femmes												
6 à 11 ans	4,1	3,8	4,4	4,6	4,5	4,7	4,9	4,7	5,1	5,3	5,0	5,6
12 à 19 ans	4,0	3,8	4,2	4,4	4,2	4,6	5,0	4,6	5,4	5,5	5,0	6,0
20 à 39 ans	4,5	4,3	4,7	5,0	4,8	5,2	5,8	5,4	6,2	6,1	5,7	6,5
40 à 59 ans	5,1	4,8	5,4	5,9	5,6	6,2	6,5	6,2	6,8	6,9	6,5	7,3
60 à 79 ans	5,4	5,3	5,5	6,1	5,9	6,3	6,7	6,5	6,9	7,1	6,9	7,3
6 à 19 ans	4,0	3,8	4,2	4,5	4,4	4,6	4,9	4,7	5,1	5,3	4,9	5,7
20 à 79 ans	4,9	4,7	5,1	5,6	5,3	5,9	6,4	6,1	6,7	6,8	6,5	7,1
6 à 79 ans	4,7	4,6	4,8	5,5	5,3	5,7	6,2	6,0	6,4	6,6	6,4	6,8

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans basée sur le sous-échantillon des répondants ayant jeûné, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 47
Distribution de la population à domicile (sous-échantillon à jeun) selon la concentration de triglycérides dans le sérum, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Concentration de triglycérides dans le sérum - sous-échantillon à jeun											
	Moyenne		5 ^e percentile		10 ^e percentile		25 ^e percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance
	de à		de à		de à		de à		de à		de à	
	millimoles par litre											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	0,76	0,70	0,82	0,30	0,25	0,35	0,36	0,32	0,40	0,49	0,45	0,53
12 à 19 ans	0,94	0,88	1,00	0,38	0,33	0,43	0,45	0,41	0,49	0,59	0,54	0,64
20 à 39 ans	1,16	1,07	1,25	0,43	0,30	0,56	0,52	0,45	0,59	0,70	0,67	0,73
40 à 59 ans	1,40	1,27	1,52	0,46	0,41	0,51	0,54	0,49	0,59	0,83	0,76	0,90
60 à 79 ans	1,60	1,50	1,70	0,61	0,54	0,68	0,74	0,69	0,79	0,99	0,93	1,05
6 à 19 ans	0,87	0,82	0,92	0,33	0,29	0,37	0,40	0,35	0,45	0,53	0,49	0,57
20 à 79 ans	1,35	1,26	1,44	0,47	0,43	0,51	0,56	0,51	0,61	0,77	0,74	0,80
6 à 79 ans	1,26	1,18	1,34	0,43	0,38	0,48	0,51	0,48	0,54	0,73	0,70	0,76
Hommes												
6 à 11 ans	0,72	0,66	0,78	0,27	0,22	0,32	0,32	0,26	0,38	0,44	0,36	0,52
12 à 19 ans	0,92	0,81	1,03	0,28	0,21	0,35	0,39	0,33	0,45	0,56	0,47	0,65
20 à 39 ans	1,26	1,11	1,40	0,48	0,35	0,61	0,60	0,48	0,72	0,73	0,65	0,81
40 à 59 ans	1,46	1,30	1,61	0,46	0,41	0,51	0,53	0,44	0,62	0,92	0,79	1,05
60 à 79 ans	1,66	1,50	1,82	0,63	0,56	0,70	0,74	0,70	0,78	1,03	0,85	1,21
6 à 19 ans	0,84	0,77	0,91	0,28	0,23	0,33	0,36	0,31	0,41	0,50	0,43	0,57
20 à 79 ans	1,42	1,31	1,53	0,48	0,42	0,54	0,61	0,53	0,69	0,83	0,75	0,91
6 à 79 ans	1,31	1,21	1,40	0,42	0,37	0,47	0,51	0,47	0,55	0,73	0,70	0,76
Femmes												
6 à 11 ans	0,81	0,73	0,89	0,37	0,33	0,41	0,41	0,35	0,47	0,51	0,46	0,56
12 à 19 ans	0,96	0,88	1,04	0,44	0,41	0,47	0,48	0,44	0,52	0,62	0,54	0,70
20 à 39 ans	1,07	0,96	1,17	0,33 ^E	0,18	0,48	0,50	0,42	0,58	0,67	0,63	0,71
40 à 59 ans	1,34	1,17	1,51	0,46	0,36	0,56	0,54	0,46	0,62	0,76	0,66	0,86
60 à 79 ans	1,54	1,38	1,70	0,60	0,49	0,71	0,74	0,61	0,87	0,97	0,89	1,05
6 à 19 ans	0,90	0,85	0,95	0,41	0,36	0,46	0,46	0,43	0,49	0,58	0,53	0,63
20 à 79 ans	1,28	1,18	1,38	0,45	0,38	0,52	0,54	0,49	0,59	0,74	0,70	0,78
6 à 79 ans	1,21	1,13	1,30	0,44	0,39	0,49	0,51	0,48	0,54	0,71	0,67	0,75

	Concentration de triglycérides dans le sérum - sous-échantillon à jeun											
	50 ^e percentile		75 ^e percentile		90 ^e percentile		95 ^e percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance
	de à		de à		de à		de à		de à		de à	
	millimoles par litre											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	0,67	0,60	0,74	0,97	0,89	1,05	1,28	1,21	1,35	1,50	1,35	1,65
12 à 19 ans	0,83	0,75	0,91	1,12	1,06	1,18	1,60	1,36	1,84	2,05	1,85	2,25
20 à 39 ans	0,96	0,89	1,03	1,53	1,38	1,68	1,94	1,68	2,20	2,37	1,99	2,75
40 à 59 ans	1,21	1,08	1,34	1,79	1,57	2,01	2,45	2,24	2,66	2,97	2,60	3,34
60 à 79 ans	1,39	1,30	1,48	1,92	1,73	2,11	2,76	2,29	3,23	3,29	2,91	3,67
6 à 19 ans	0,77	0,72	0,82	1,07	1,02	1,12	1,43	1,33	1,53	1,84	1,62	2,06
20 à 79 ans	1,14	1,05	1,23	1,69	1,57	1,81	2,38	2,17	2,59	2,89	2,56	3,22
6 à 79 ans	1,05	1,00	1,10	1,62	1,52	1,72	2,28	2,05	2,51	2,68	2,35	3,01
Hommes												
6 à 11 ans	0,65	0,57	0,73	0,91	0,80	1,02	1,16	1,07	1,25	1,39	1,23	1,55
12 à 19 ans	0,78	0,67	0,89	1,12	1,01	1,23	1,60	1,11	2,09	2,07	1,65	2,49
20 à 39 ans	1,01	0,83	1,19	1,63	1,45	1,81	2,10	1,77	2,43	2,67	2,13	3,21
40 à 59 ans	1,26	1,02	1,50	1,86	1,58	2,14	2,39	2,23	2,55	2,78	2,37	3,19
60 à 79 ans	1,47	1,27	1,67	2,06	1,85	2,27	2,96	2,58	3,34	3,29	3,03	3,55
6 à 19 ans	0,74	0,67	0,81	1,06	1,00	1,12	1,43	1,20	1,66	1,88	1,42	2,34
20 à 79 ans	1,24	1,10	1,38	1,79	1,64	1,94	2,39	2,21	2,57	2,95	2,68	3,22
6 à 79 ans	1,09	1,01	1,17	1,69	1,56	1,82	2,33	2,13	2,53	2,82	2,51	3,13
Femmes												
6 à 11 ans	0,71	0,65	0,77	0,99	0,86	1,12	1,33	1,16	1,50	1,55	1,13	1,97
12 à 19 ans	0,85	0,75	0,95	1,11	0,97	1,25	1,60	1,34	1,86	1,92	1,71	2,13
20 à 39 ans	0,92	0,81	1,03	1,38	1,19	1,57	1,76	1,41	2,11	2,26	1,87	2,65
40 à 59 ans	1,13	0,97	1,29	1,76	1,45	2,07	2,55	2,05	3,05	3,03	2,59	3,47
60 à 79 ans	1,31	1,24	1,38	1,82	1,57	2,07	2,52	2,01	3,03	3,40	2,54	4,26
6 à 19 ans	0,80	0,73	0,87	1,09	0,99	1,19	1,49	1,36	1,62	1,78	1,54	2,02
20 à 79 ans	1,09	0,99	1,19	1,62	1,49	1,75	2,32	1,97	2,67	2,70	2,23	3,17
6 à 79 ans	1,01	0,93	1,09	1,50	1,39	1,61	2,20	1,85	2,55	2,64	2,22	3,06

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans basée sur le sous-échantillon des répondants ayant jeûné, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent. Pour plus de renseignements concernant les critères d'exclusion et la limite de détection de triglycérides dans le sérum, veuillez consulter le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 48
Distribution de la population à domicile (sous-échantillon à jeun) selon la concentration de lipoprotéines de basse densité dans le sérum, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Concentration de lipoprotéines de basse densité dans le sérum - sous-échantillon à jeun											
	Moyenne		5 ^e percentile		10 ^e percentile		25 ^e percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance
		de à		de à		de à		de à		de à		de à
	millimoles par litre											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	2,31	2,19	2,43	1,29	1,11	1,47	1,54	1,39	1,69	1,82	1,67	1,97
12 à 19 ans	2,30	2,14	2,45	1,15	0,96	1,34	1,40	1,31	1,49	1,80	1,67	1,93
20 à 39 ans	2,82	2,74	2,90	1,40	1,19	1,61	1,69	1,51	1,87	2,15	2,07	2,23
40 à 59 ans	3,19	3,07	3,32	1,56	1,33	1,79	1,96	1,74	2,18	2,46	2,34	2,58
60 à 79 ans	3,14	3,04	3,23	1,58	1,40	1,76	1,80	1,57	2,03	2,34	2,20	2,48
6 à 19 ans	2,30	2,20	2,41	1,26	1,13	1,39	1,44	1,35	1,53	1,82	1,72	1,92
20 à 79 ans	3,04	2,97	3,11	1,51	1,33	1,69	1,80	1,63	1,97	2,31	2,22	2,40
6 à 79 ans	2,90	2,83	2,97	1,41	1,28	1,54	1,66	1,54	1,78	2,16	2,10	2,22
Hommes												
6 à 11 ans	2,34	2,21	2,46	1,44	1,31	1,57	1,54	1,43	1,65	1,84	1,66	2,02
12 à 19 ans	2,28	2,12	2,43	1,31	1,01	1,61	1,41	1,27	1,55	1,80	1,65	1,95
20 à 39 ans	3,05	2,95	3,15	1,69	1,55	1,83	1,93	1,79	2,07	2,39	2,25	2,53
40 à 59 ans	3,23	3,07	3,40	1,64	1,28	2,00	1,89	1,49	2,29	2,49	2,33	2,65
60 à 79 ans	3,14	2,93	3,34	1,37	1,06	1,68	1,75	1,47	2,03	2,26	2,03	2,49
6 à 19 ans	2,30	2,19	2,41	1,33	1,20	1,46	1,48	1,36	1,60	1,83	1,73	1,93
20 à 79 ans	3,14	3,04	3,25	1,65	1,48	1,82	1,89	1,74	2,04	2,43	2,31	2,55
6 à 79 ans	2,98	2,89	3,07	1,50	1,33	1,67	1,74	1,62	1,86	2,25	2,12	2,38
Femmes												
6 à 11 ans	2,28	2,12	2,45	1,19	0,92	1,46	1,42	1,09	1,75	1,78	1,61	1,95
12 à 19 ans	2,32	2,11	2,53	1,11	0,92	1,30	1,40	1,20	1,60	1,81	1,59	2,03
20 à 39 ans	2,58	2,43	2,74	1,31	1,01	1,61	1,43	1,19	1,67	2,04	1,91	2,17
40 à 59 ans	3,15	2,99	3,31	1,56	1,16	1,99	1,99	1,75	2,23	2,43	2,22	2,64
60 à 79 ans	3,14	3,07	3,21	1,62	1,45	1,79	1,97	1,65	2,29	2,41	2,28	2,54
6 à 19 ans	2,31	2,15	2,46	1,12	0,99	1,25	1,40	1,25	1,55	1,79	1,63	1,95
20 à 79 ans	2,94	2,85	3,02	1,40	1,24	1,56	1,68	1,47	1,89	2,19	2,12	2,26
6 à 79 ans	2,82	2,75	2,90	1,35	1,23	1,47	1,60	1,45	1,75	2,11	2,05	2,17

	Concentration de lipoprotéines de basse densité dans le sérum - sous-échantillon à jeun											
	50 ^e percentile		75 ^e percentile		90 ^e percentile		95 ^e percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance
		de à		de à		de à		de à		de à		de à
	millimoles par litre											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	2,25	2,12	2,38	2,74	2,58	2,90	3,25	3,13	3,37	3,49	3,33	3,65
12 à 19 ans	2,19	2,03	2,35	2,79	2,61	2,97	3,14	2,92	3,36	3,53	3,28	3,78
20 à 39 ans	2,71	2,58	2,84	3,48	3,33	3,63	4,13	3,77	4,49	4,48	4,24	4,72
40 à 59 ans	3,18	3,08	3,28	3,84	3,62	4,06	4,44	4,16	4,72	4,95	4,58	5,32
60 à 79 ans	3,11	2,96	3,26	3,84	3,68	4,00	4,49	4,30	4,68	4,97	4,60	5,34
6 à 19 ans	2,22	2,10	2,34	2,76	2,63	2,89	3,17	3,05	3,29	3,53	3,35	3,71
20 à 79 ans	2,95	2,84	3,06	3,68	3,59	3,77	4,35	4,24	4,46	4,80	4,56	5,04
6 à 79 ans	2,78	2,70	2,86	3,56	3,47	3,65	4,22	4,11	4,33	4,67	4,49	4,85
Hommes												
6 à 11 ans	2,26	2,10	2,42	2,74	2,57	2,91	3,17	2,98	3,36	3,43	3,12	3,74
12 à 19 ans	2,17	1,96	2,38	2,81	2,62	3,00	3,13	2,85	3,41	3,53	3,31	3,75
20 à 39 ans	2,88	2,66	3,10	3,68	3,44	3,92	4,35	4,00	4,70	4,59	4,30	4,88
40 à 59 ans	3,25	3,02	3,48	3,94	3,65	4,23	4,47	4,23	4,71	4,85	4,45	5,25
60 à 79 ans	3,11	2,77	3,45	3,96	3,68	4,24	4,53	4,22	4,84	4,97	4,48	5,46
6 à 19 ans	2,24	2,11	2,37	2,76	2,62	2,90	3,15	3,00	3,30	3,53	3,33	3,73
20 à 79 ans	3,13	2,91	3,35	3,75	3,57	3,93	4,43	4,30	4,56	4,80	4,63	4,97
6 à 79 ans	2,85	2,74	2,96	3,65	3,52	3,78	4,35	4,22	4,48	4,70	4,54	4,86
Femmes												
6 à 11 ans	2,22	2,02	2,42	2,74	2,49	2,99	3,28	3,09	3,47	3,50	3,23	3,77
12 à 19 ans	2,22	1,99	2,45	2,79	2,56	3,02	3,16	2,87	3,45	3,67	3,22	4,12
20 à 39 ans	2,43	2,26	2,60	3,06	2,81	3,31	3,80	3,50	4,10	4,30	3,84	4,76
40 à 59 ans	3,15	2,98	3,32	3,80	3,56	4,04	4,34	3,88	4,80	5,06	4,56	5,56
60 à 79 ans	3,11	2,99	3,23	3,80	3,65	3,95	4,44	4,13	4,75	4,97	4,53	5,41
6 à 19 ans	2,22	2,04	2,40	2,76	2,60	2,92	3,27	3,09	3,45	3,62	3,32	3,92
20 à 79 ans	2,82	2,68	2,96	3,59	3,48	3,70	4,19	3,93	4,45	4,80	4,36	5,24
6 à 79 ans	2,71	2,59	2,83	3,45	3,35	3,55	4,08	3,89	4,27	4,66	4,32	5,00

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans basée sur le sous-échantillon des répondants ayant jeûné, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent. Pour plus de renseignements concernant les critères d'exclusion et la limite de détection de lipoprotéines de basse densité dans le sérum, veuillez consulter le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 49
Distribution de la population à domicile (échantillon total) selon la concentration de lipoprotéines de haute densité dans le sérum, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Concentration de lipoprotéines de haute densité dans le sérum - échantillon total											
	Moyenne		5 ^e percentile		10 ^e percentile		25 ^e percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance
		de à		de à		de à		de à		de à		de à
	millimoles par litre											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	1,39	1,34	1,43	0,93	0,87	0,99	1,01	0,95	1,07	1,16	1,10	1,22
12 à 19 ans	1,28	1,24	1,32	0,86	0,79	0,93	0,92	0,88	0,96	1,09	1,04	1,14
20 à 39 ans	1,32	1,27	1,37	0,83	0,78	0,88	0,89	0,85	0,93	1,08	1,03	1,13
40 à 59 ans	1,32	1,26	1,37	0,76	0,67	0,85	0,89	0,81	0,97	1,05	1,00	1,10
60 à 79 ans	1,37	1,32	1,43	0,86	0,80	0,92	0,93	0,90	0,96	1,08	1,03	1,13
6 à 19 ans	1,32	1,28	1,36	0,88	0,83	0,93	0,95	0,91	0,99	1,11	1,07	1,15
20 à 79 ans	1,33	1,28	1,38	0,81	0,74	0,88	0,90	0,85	0,95	1,07	1,03	1,11
6 à 79 ans	1,33	1,28	1,37	0,82	0,76	0,88	0,91	0,87	0,95	1,08	1,04	1,12
Hommes												
6 à 11 ans	1,41	1,36	1,45	0,94	0,86	1,02	1,06	1,01	1,11	1,19	1,15	1,23
12 à 19 ans	1,23	1,19	1,28	0,80	0,71	0,89	0,90	0,83	0,97	1,06	1,00	1,12
20 à 39 ans	1,19	1,14	1,24	0,75	0,69	0,81	0,85	0,82	0,88	1,01	0,95	1,07
40 à 59 ans	1,17	1,12	1,23	0,71	0,63	0,79	0,82	0,73	0,91	0,97	0,90	1,04
60 à 79 ans	1,24	1,18	1,31	0,80	0,75	0,85	0,88	0,82	0,94	1,01	0,96	1,06
6 à 19 ans	1,30	1,26	1,34	0,86	0,78	0,94	0,93	0,88	0,98	1,10	1,07	1,13
20 à 79 ans	1,19	1,15	1,24	0,75	0,68	0,82	0,84	0,79	0,89	0,99	0,93	1,05
6 à 79 ans	1,21	1,17	1,25	0,76	0,69	0,83	0,86	0,81	0,91	1,01	0,96	1,06
Femmes												
6 à 11 ans	1,36	1,30	1,43	0,91	0,83	0,99	0,99	0,92	1,06	1,13	1,05	1,21
12 à 19 ans	1,33	1,28	1,38	0,90	0,87	0,93	0,96	0,92	1,00	1,11	1,03	1,19
20 à 39 ans	1,45	1,39	1,51	0,89	0,82	0,96	1,01	0,91	1,11	1,20	1,13	1,27
40 à 59 ans	1,45	1,38	1,53	0,93	0,84	1,02	1,01	0,94	1,08	1,18	1,10	1,26
60 à 79 ans	1,49	1,42	1,56	0,96	0,92	1,00	1,02	0,98	1,06	1,20	1,14	1,26
6 à 19 ans	1,34	1,29	1,39	0,90	0,87	0,93	0,97	0,93	1,01	1,12	1,04	1,20
20 à 79 ans	1,46	1,40	1,52	0,91	0,85	0,97	1,01	0,95	1,07	1,19	1,13	1,25
6 à 79 ans	1,44	1,38	1,50	0,91	0,86	0,96	1,00	0,95	1,05	1,18	1,12	1,24

	Concentration de lipoprotéines de haute densité dans le sérum - échantillon total											
	50 ^e percentile		75 ^e percentile		90 ^e percentile		95 ^e percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance
		de à		de à		de à		de à		de à		de à
	millimoles par litre											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	1,35	1,30	1,40	1,56	1,50	1,62	1,79	1,72	1,86	1,96	1,86	2,06
12 à 19 ans	1,26	1,22	1,30	1,45	1,42	1,48	1,66	1,61	1,71	1,79	1,71	1,87
20 à 39 ans	1,27	1,23	1,31	1,51	1,43	1,59	1,81	1,72	1,90	2,00	1,89	2,11
40 à 59 ans	1,25	1,19	1,31	1,52	1,46	1,58	1,84	1,73	1,95	2,03	1,92	2,14
60 à 79 ans	1,30	1,24	1,36	1,62	1,54	1,70	1,93	1,76	2,10	2,18	1,99	2,37
6 à 19 ans	1,29	1,25	1,33	1,50	1,46	1,54	1,70	1,64	1,76	1,85	1,77	1,93
20 à 79 ans	1,27	1,22	1,32	1,53	1,47	1,59	1,83	1,74	1,92	2,05	1,95	2,15
6 à 79 ans	1,28	1,23	1,33	1,52	1,47	1,57	1,81	1,73	1,89	2,02	1,93	2,11
Hommes												
6 à 11 ans	1,38	1,31	1,45	1,58	1,51	1,65	1,80	1,75	1,85	1,97	1,85	2,09
12 à 19 ans	1,21	1,18	1,24	1,40	1,34	1,46	1,57	1,50	1,64	1,76	1,64	1,88
20 à 39 ans	1,17	1,13	1,21	1,35	1,29	1,41	1,56	1,44	1,68	1,69	1,53	1,85
40 à 59 ans	1,13	1,09	1,17	1,33	1,27	1,39	1,63	1,52	1,74	1,76	1,63	1,89
60 à 79 ans	1,16	1,09	1,23	1,41	1,31	1,51	1,70	1,59	1,81	1,94	1,74	2,14
6 à 19 ans	1,26	1,22	1,30	1,48	1,42	1,54	1,69	1,62	1,76	1,82	1,74	1,90
20 à 79 ans	1,15	1,11	1,19	1,35	1,30	1,40	1,62	1,53	1,71	1,78	1,64	1,92
6 à 79 ans	1,18	1,14	1,22	1,38	1,34	1,42	1,64	1,57	1,71	1,79	1,68	1,90
Femmes												
6 à 11 ans	1,35	1,30	1,40	1,54	1,46	1,62	1,79	1,67	1,91	1,95	1,79	2,11
12 à 19 ans	1,33	1,27	1,39	1,50	1,43	1,57	1,69	1,63	1,75	1,82	1,71	1,93
20 à 39 ans	1,40	1,33	1,47	1,69	1,60	1,78	1,94	1,87	2,01	2,18	2,06	2,30
40 à 59 ans	1,41	1,33	1,49	1,69	1,58	1,80	1,97	1,84	2,10	2,12	1,96	2,28
60 à 79 ans	1,45	1,38	1,52	1,70	1,62	1,78	2,06	1,86	2,26	2,30	2,14	2,46
6 à 19 ans	1,33	1,28	1,38	1,52	1,46	1,58	1,71	1,63	1,79	1,88	1,77	1,99
20 à 79 ans	1,41	1,35	1,47	1,70	1,63	1,77	1,98	1,88	2,08	2,20	2,08	2,32
6 à 79 ans	1,40	1,34	1,46	1,66	1,59	1,73	1,95	1,86	2,04	2,15	2,03	2,27

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans basée sur l' échantillon total, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).
Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 50

Distribution de la population à domicile (sous-échantillon à jeun) selon la concentration de lipoprotéines de haute densité dans le sérum, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Concentration de lipoprotéines de haute densité dans le sérum - sous-échantillon à jeun													
	Moyenne		5 ^e percentile		10 ^e percentile		25 ^e percentile							
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance		
		de	à	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à	
	millimoles par litre													
Les deux sexes														
6 à 11 ans	1,43	1,37	1,48	0,94	0,88	1,00	1,03	0,95	1,11	1,21	1,14	1,28		
12 à 19 ans	1,25	1,22	1,29	0,83	0,76	0,90	0,93	0,87	0,99	1,06	1,01	1,11		
20 à 39 ans	1,33	1,28	1,38	0,84	0,76	0,92	0,89	0,82	0,96	1,12	1,07	1,17		
40 à 59 ans	1,33	1,29	1,38	0,76	0,65	0,87	0,90	0,80	1,00	1,09	1,06	1,12		
60 à 79 ans	1,37	1,31	1,42	0,87	0,81	0,93	0,94	0,90	0,98	1,07	1,02	1,12		
6 à 19 ans	1,32	1,29	1,35	0,88	0,82	0,94	0,97	0,94	1,00	1,11	1,08	1,14		
20 à 79 ans	1,34	1,30	1,39	0,82	0,73	0,91	0,90	0,84	0,96	1,09	1,06	1,12		
6 à 79 ans	1,34	1,30	1,38	0,83	0,75	0,91	0,92	0,87	0,97	1,09	1,06	1,12		
Hommes														
6 à 11 ans	1,48	1,43	1,53	1,00	0,90	1,10	1,11	1,05	1,17	1,23	1,18	1,28		
12 à 19 ans	1,23	1,18	1,27	0,83	0,74	0,92	0,91	0,83	0,99	1,08	1,02	1,14		
20 à 39 ans	1,19	1,14	1,24	0,75	0,60	0,90	0,86	0,79	0,93	1,02	0,94	1,10		
40 à 59 ans	1,20	1,14	1,26	0,70	0,60	0,80	0,83	0,73	0,93	0,99	0,93	1,05		
60 à 79 ans	1,21	1,15	1,27	0,80	0,72	0,88	0,89	0,85	0,93	1,01	0,96	1,06		
6 à 19 ans	1,33	1,30	1,36	0,88	0,80	0,96	0,97	0,91	1,03	1,12	1,09	1,15		
20 à 79 ans	1,20	1,16	1,23	0,75	0,64	0,86	0,86	0,79	0,93	1,01	0,96	1,06		
6 à 79 ans	1,22	1,19	1,25	0,78	0,69	0,87	0,87	0,81	0,93	1,03	1,00	1,06		
Femmes														
6 à 11 ans	1,37	1,29	1,46	0,92	0,84	1,00	0,98	0,90	1,06	1,13	1,01	1,25		
12 à 19 ans	1,28	1,24	1,32	0,83	0,72	0,94	0,96	0,90	1,02	1,04	0,96	1,12		
20 à 39 ans	1,47	1,41	1,54	0,89	0,78	1,00	1,07	0,94	1,20	1,21	1,14	1,28		
40 à 59 ans	1,47	1,37	1,56	0,84	0,63	1,05	1,02	0,91	1,13	1,21	1,11	1,31		
60 à 79 ans	1,51	1,43	1,58	0,97	0,90	1,04	1,04	0,98	1,10	1,20	1,12	1,28		
6 à 19 ans	1,32	1,27	1,36	0,88	0,80	0,96	0,96	0,92	1,00	1,08	1,00	1,16		
20 à 79 ans	1,48	1,41	1,55	0,90	0,81	0,99	1,04	0,96	1,12	1,21	1,14	1,28		
6 à 79 ans	1,45	1,39	1,51	0,90	0,83	0,97	1,00	0,95	1,05	1,18	1,12	1,24		

	Concentration de lipoprotéines de haute densité dans le sérum - sous-échantillon à jeun													
	50 ^e percentile		75 ^e percentile		90 ^e percentile		95 ^e percentile							
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance		
		de	à	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à	
	millimoles par litre													
Les deux sexes														
6 à 11 ans	1,40	1,34	1,46	1,61	1,55	1,67	1,82	1,67	1,97	2,06	1,87	2,25		
12 à 19 ans	1,22	1,18	1,26	1,42	1,39	1,45	1,61	1,54	1,68	1,76	1,67	1,85		
20 à 39 ans	1,27	1,21	1,33	1,49	1,40	1,58	1,82	1,74	1,90	1,99	1,76	2,22		
40 à 59 ans	1,28	1,23	1,33	1,54	1,46	1,62	1,86	1,74	1,98	2,06	1,93	2,19		
60 à 79 ans	1,28	1,21	1,35	1,60	1,51	1,69	1,97	1,80	2,14	2,24	2,04	2,44		
6 à 19 ans	1,29	1,25	1,33	1,51	1,47	1,55	1,71	1,62	1,80	1,88	1,71	2,05		
20 à 79 ans	1,28	1,24	1,32	1,54	1,47	1,61	1,85	1,75	1,95	2,07	1,92	2,22		
6 à 79 ans	1,28	1,25	1,31	1,53	1,47	1,59	1,83	1,74	1,92	2,04	1,91	2,17		
Hommes														
6 à 11 ans	1,48	1,40	1,56	1,63	1,58	1,68	1,89	1,72	2,06	2,26	1,98	2,54		
12 à 19 ans	1,20	1,15	1,25	1,39	1,32	1,46	1,54	1,38	1,70	1,76	1,58	1,94		
20 à 39 ans	1,20	1,15	1,25	1,37	1,30	1,44	1,53	1,42	1,64	1,65	1,50	1,80		
40 à 59 ans	1,14	1,09	1,19	1,34	1,27	1,41	1,66	1,47	1,85	1,86	1,63	2,09		
60 à 79 ans	1,13	1,09	1,17	1,35	1,26	1,44	1,69	1,55	1,83	1,87	1,65	2,09		
6 à 19 ans	1,27	1,22	1,32	1,51	1,46	1,56	1,73	1,64	1,82	1,88	1,74	2,02		
20 à 79 ans	1,16	1,13	1,19	1,35	1,31	1,39	1,59	1,48	1,70	1,78	1,64	1,92		
6 à 79 ans	1,18	1,15	1,21	1,39	1,36	1,42	1,63	1,54	1,72	1,80	1,69	1,91		
Femmes														
6 à 11 ans	1,36	1,30	1,42	1,57	1,47	1,67	1,82	1,55	2,09	2,04	1,73	2,35		
12 à 19 ans	1,25	1,21	1,29	1,46	1,40	1,52	1,61	1,53	1,69	1,75	1,54	1,96		
20 à 39 ans	1,42	1,35	1,49	1,74	1,62	1,86	1,94	1,77	2,11	2,20	2,03	2,37		
40 à 59 ans	1,41	1,31	1,51	1,70	1,58	1,82	1,95	1,79	2,11	2,23	1,96	2,50		
60 à 79 ans	1,45	1,38	1,52	1,73	1,62	1,84	2,13	1,91	2,35	2,32	2,13	2,51		
6 à 19 ans	1,30	1,26	1,34	1,49	1,43	1,55	1,69	1,57	1,81	1,89	1,64	2,14		
20 à 79 ans	1,42	1,35	1,49	1,72	1,63	1,81	1,99	1,86	2,12	2,23	2,11	2,35		
6 à 79 ans	1,39	1,33	1,45	1,67	1,59	1,75	1,95	1,83	2,07	2,20	2,06	2,34		

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans basée sur le sous-échantillon des répondants ayant jeûné, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 51

Distribution de la population à domicile (échantillon total) selon le ratio du cholestérol total aux lipoprotéines de haute densité dans le sérum, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Ratio du cholestérol total aux lipoprotéines de haute densité dans le sérum - échantillon total												
	Moyenne		5 ^e percentile		10 ^e percentile		25 ^e percentile						
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à
	ratio												
Les deux sexes													
6 à 11 ans	3,20	3,09	3,30	2,17	2,04	2,30	2,37	2,28	2,46	2,65	2,56	2,74	
12 à 19 ans	3,34	3,28	3,40	2,20	2,14	2,25	2,38	2,32	2,44	2,71	2,62	2,80	
20 à 39 ans	3,84	3,69	3,99	2,25	2,16	2,34	2,48	2,40	2,57	2,91	2,78	3,04	
40 à 59 ans	4,25	4,09	4,42	2,46	2,30	2,62	2,74	2,63	2,85	3,22	3,08	3,36	
60 à 79 ans	4,04	3,93	4,15	2,43	2,36	2,50	2,69	2,58	2,81	3,17	3,04	3,31	
6 à 19 ans	3,29	3,22	3,36	2,19	2,13	2,25	2,38	2,33	2,43	2,68	2,62	2,74	
20 à 79 ans	4,05	3,93	4,18	2,36	2,28	2,44	2,61	2,54	2,69	3,09	2,97	3,20	
6 à 79 ans	3,92	3,80	4,03	2,30	2,24	2,36	2,54	2,48	2,60	2,99	2,90	3,09	
Hommes													
6 à 11 ans	3,16	3,06	3,25	2,17	2,02	2,32	2,32	2,24	2,40	2,59	2,45	2,73	
12 à 19 ans	3,41	3,28	3,54	2,16	2,01	2,31	2,40	2,26	2,53	2,80	2,66	2,94	
20 à 39 ans	4,29	4,08	4,50	2,53	2,28	2,78	2,86	2,66	3,06	3,33	3,08	3,59	
40 à 59 ans	4,69	4,47	4,91	2,77	2,52	3,02	3,04	2,93	3,14	3,69	3,49	3,89	
60 à 79 ans	4,29	4,16	4,42	2,54	2,35	2,72	2,76	2,54	2,98	3,40	3,26	3,54	
6 à 19 ans	3,32	3,22	3,42	2,16	2,07	2,26	2,37	2,29	2,45	2,71	2,59	2,83	
20 à 79 ans	4,45	4,29	4,62	2,62	2,44	2,79	2,95	2,81	3,09	3,53	3,35	3,70	
6 à 79 ans	4,25	4,11	4,39	2,43	2,30	2,56	2,74	2,61	2,88	3,23	3,09	3,36	
Femmes													
6 à 11 ans	3,24	3,11	3,37	2,16	1,95	2,38	2,43	2,24	2,62	2,68	2,58	2,78	
12 à 19 ans	3,26	3,18	3,35	2,22	2,17	2,28	2,37	2,29	2,45	2,65	2,51	2,79	
20 à 39 ans	3,39	3,23	3,55	2,12	2,04	2,20	2,33	2,23	2,42	2,68	2,58	2,78	
40 à 59 ans	3,82	3,64	4,01	2,30	2,12	2,48	2,56	2,44	2,68	2,97	2,80	3,15	
60 à 79 ans	3,81	3,68	3,94	2,42	2,33	2,52	2,61	2,46	2,76	3,02	2,90	3,13	
6 à 19 ans	3,25	3,17	3,34	2,20	2,11	2,28	2,39	2,32	2,45	2,66	2,57	2,74	
20 à 79 ans	3,66	3,52	3,80	2,25	2,18	2,33	2,45	2,38	2,51	2,84	2,74	2,94	
6 à 79 ans	3,59	3,47	3,72	2,24	2,17	2,31	2,44	2,38	2,49	2,81	2,75	2,88	

	Ratio du cholestérol total aux lipoprotéines de haute densité dans le sérum - échantillon total												
	50 ^e percentile		75 ^e percentile		90 ^e percentile		95 ^e percentile						
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à
	ratio												
Les deux sexes													
6 à 11 ans	3,06	2,96	3,16	3,61	3,46	3,77	4,21	3,94	4,47	4,65	4,42	4,89	
12 à 19 ans	3,18	3,11	3,24	3,80	3,65	3,94	4,55	4,28	4,81	5,05	4,72	5,38	
20 à 39 ans	3,70	3,51	3,88	4,53	4,34	4,73	5,38	5,05	5,72	6,13	5,73	6,52	
40 à 59 ans	4,09	3,87	4,31	5,00	4,81	5,19	5,94	5,55	6,33	6,67	6,26	7,07	
60 à 79 ans	3,87	3,71	4,03	4,74	4,55	4,92	5,63	5,46	5,79	6,11	5,97	6,25	
6 à 19 ans	3,12	3,06	3,18	3,70	3,56	3,84	4,33	4,10	4,56	4,83	4,62	5,03	
20 à 79 ans	3,86	3,72	4,01	4,77	4,59	4,95	5,70	5,48	5,93	6,39	6,06	6,71	
6 à 79 ans	3,71	3,57	3,85	4,62	4,47	4,78	5,56	5,36	5,75	6,24	5,94	6,53	
Hommes													
6 à 11 ans	3,05	2,94	3,17	3,55	3,45	3,65	4,12	3,86	4,38	4,55	4,36	4,75	
12 à 19 ans	3,19	3,14	3,25	3,80	3,62	3,99	4,68	4,35	5,02	5,29	4,61	5,97	
20 à 39 ans	4,20	4,00	4,39	4,92	4,73	5,12	5,95	5,57	6,33	6,67	5,83	7,50	
40 à 59 ans	4,53	4,28	4,78	5,37	5,06	5,68	6,48	6,05	6,91	7,27	6,34	8,21	
60 à 79 ans	4,20	4,04	4,37	5,14	4,96	5,31	5,96	5,79	6,13	6,27	6,06	6,49	
6 à 19 ans	3,17	3,10	3,25	3,70	3,54	3,86	4,55	4,27	4,82	5,06	4,65	5,48	
20 à 79 ans	4,29	4,13	4,45	5,17	5,01	5,32	6,12	5,84	6,40	6,74	6,31	7,17	
6 à 79 ans	4,11	3,93	4,29	5,00	4,87	5,13	6,02	5,77	6,27	6,63	6,32	6,94	
Femmes													
6 à 11 ans	3,06	2,94	3,19	3,67	3,43	3,92	4,21	3,87	4,54	4,71	4,32	5,10	
12 à 19 ans	3,10	3,01	3,20	3,73	3,56	3,90	4,17	3,91	4,44	4,73	4,40	5,05	
20 à 39 ans	3,18	2,97	3,39	3,91	3,70	4,13	4,73	4,32	5,14	5,26	4,93	5,60	
40 à 59 ans	3,64	3,37	3,91	4,46	4,13	4,80	5,30	4,98	5,62	5,89	5,46	6,33	
60 à 79 ans	3,62	3,44	3,80	4,41	4,16	4,65	5,25	4,90	5,61	5,98	5,47	6,49	
6 à 19 ans	3,09	3,02	3,17	3,72	3,55	3,88	4,20	4,00	4,39	4,73	4,53	4,92	
20 à 79 ans	3,48	3,30	3,65	4,25	4,04	4,46	5,12	4,86	5,38	5,64	5,27	6,01	
6 à 79 ans	3,38	3,23	3,53	4,15	3,97	4,32	5,00	4,74	5,26	5,52	5,21	5,84	

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans basée sur l' échantillon total, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 52

Distribution de la population à domicile (sous-échantillon à jeun) selon le ratio du cholestérol total aux lipoprotéines de haute densité dans le sérum, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Ratio du cholestérol total aux lipoprotéines de haute densité dans le sérum - sous-échantillon à jeun											
	Moyenne		5 ^e percentile		10 ^e percentile		25 ^e percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
ratio												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	3,02	2,91	3,13	2,06	1,91	2,21	2,22	2,08	2,37	2,53	2,43	2,64
12 à 19 ans	3,25	3,11	3,38	2,19	2,09	2,30	2,37	2,27	2,47	2,66	2,55	2,76
20 à 39 ans	3,65	3,56	3,75	2,27	2,18	2,37	2,46	2,36	2,55	2,80	2,69	2,91
40 à 59 ans	4,07	3,95	4,19	2,26	1,96	2,55	2,62	2,50	2,74	3,11	2,98	3,23
60 à 79 ans	4,03	3,92	4,14	2,40	2,33	2,47	2,66	2,46	2,85	3,11	2,97	3,25
6 à 19 ans	3,16	3,07	3,24	2,12	2,02	2,22	2,30	2,22	2,39	2,60	2,53	2,67
20 à 79 ans	3,90	3,82	3,99	2,29	2,19	2,39	2,53	2,45	2,62	2,98	2,88	3,08
6 à 79 ans	3,76	3,69	3,84	2,26	2,17	2,35	2,47	2,40	2,54	2,87	2,78	2,95
Hommes												
6 à 11 ans	2,95	2,84	3,06	2,07	1,85	2,30	2,23	2,07	2,39	2,48	2,37	2,60
12 à 19 ans	3,27	3,08	3,46	2,16	1,96	2,36	2,37	2,18	2,56	2,66	2,42	2,89
20 à 39 ans	4,09	3,94	4,24	2,53	2,32	2,75	2,90	2,63	3,17	3,10	2,97	3,24
40 à 59 ans	4,41	4,24	4,59	2,50	2,05	2,95	2,95	2,63	3,28	3,48	3,27	3,70
60 à 79 ans	4,29	4,14	4,45	2,65	2,40	2,91	2,82	2,60	3,04	3,40	3,32	3,48
6 à 19 ans	3,14	3,03	3,25	2,12	2,00	2,24	2,32	2,21	2,43	2,58	2,45	2,71
20 à 79 ans	4,26	4,16	4,37	2,53	2,36	2,70	2,91	2,73	3,10	3,35	3,21	3,50
6 à 79 ans	4,05	3,95	4,15	2,38	2,26	2,50	2,61	2,51	2,72	3,09	3,04	3,14
Femmes												
6 à 11 ans	3,09	2,94	3,24	2,03	1,85	2,22	2,20	1,97	2,42	2,55	2,42	2,68
12 à 19 ans	3,22	3,08	3,36	2,24	2,08	2,40	2,37	2,27	2,47	2,63	2,50	2,77
20 à 39 ans	3,21	3,06	3,36	2,13	1,92	2,34	2,31	2,22	2,39	2,58	2,51	2,66
40 à 59 ans	3,74	3,51	3,96	2,11	1,79	2,43	2,50	2,24	2,76	2,86	2,69	3,02
60 à 79 ans	3,79	3,61	3,96	2,29	2,09	2,49	2,44	2,32	2,57	2,88	2,74	3,02
6 à 19 ans	3,17	3,07	3,27	2,13	1,98	2,27	2,30	2,20	2,41	2,60	2,53	2,67
20 à 79 ans	3,55	3,41	3,69	2,15	2,00	2,20	2,40	2,32	2,48	2,75	2,69	2,81
6 à 79 ans	3,48	3,37	3,60	2,14	2,01	2,28	2,38	2,29	2,46	2,73	2,66	2,80

	Ratio du cholestérol total aux lipoprotéines de haute densité dans le sérum - sous-échantillon à jeun											
	50 ^e percentile		75 ^e percentile		90 ^e percentile		95 ^e percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
ratio												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	2,91	2,81	3,01	3,41	3,21	3,60	3,96	3,75	4,17	4,41	4,09	4,74
12 à 19 ans	3,11	2,94	3,28	3,68	3,48	3,88	4,27	3,84	4,70	4,82	4,44	5,20
20 à 39 ans	3,42	3,22	3,62	4,37	4,24	4,49	5,21	4,96	5,46	5,75	5,51	5,99
40 à 59 ans	3,84	3,61	4,06	4,81	4,57	5,05	5,67	5,48	5,86	6,31	5,62	7,00
60 à 79 ans	3,76	3,57	3,96	4,77	4,60	4,93	5,74	5,41	6,08	6,43	6,08	6,78
6 à 19 ans	3,04	2,93	3,15	3,55	3,42	3,67	4,11	3,90	4,32	4,70	4,48	4,92
20 à 79 ans	3,67	3,56	3,77	4,62	4,46	4,77	5,51	5,36	5,67	6,10	5,87	6,33
6 à 79 ans	3,51	3,44	3,59	4,44	4,28	4,59	5,34	5,19	5,50	5,92	5,69	6,15
Hommes												
6 à 11 ans	2,88	2,73	3,02	3,31	3,09	3,53	3,72	3,50	3,94	4,07	3,76	4,37
12 à 19 ans	3,19	2,93	3,45	3,69	3,45	3,93	4,35	3,78	4,93	4,83	4,20	5,46
20 à 39 ans	4,11	3,89	4,34	4,76	4,54	4,98	5,61	5,28	5,93	5,86	5,57	6,15
40 à 59 ans	4,29	4,03	4,54	5,00	4,72	5,28	5,90	5,36	6,43	7,05	5,38	8,72
60 à 79 ans	4,23	3,98	4,48	5,15	4,78	5,52	5,92	5,46	6,38	6,27	5,86	6,69
6 à 19 ans	3,06	2,89	3,22	3,54	3,37	3,72	4,07	3,69	4,44	4,68	4,24	5,13
20 à 79 ans	4,15	4,00	4,29	4,96	4,77	5,16	5,75	5,60	5,91	6,27	5,98	6,57
6 à 79 ans	3,85	3,68	4,02	4,77	4,56	4,97	5,61	5,46	5,76	6,12	5,85	6,38
Femmes												
6 à 11 ans	2,93	2,80	3,07	3,51	3,26	3,76	4,17	3,90	4,44	4,70	4,21	5,19
12 à 19 ans	3,07	2,91	3,23	3,68	3,43	3,94	4,17	3,73	4,62	4,82	4,39	5,25
20 à 39 ans	2,95	2,71	3,19	3,65	3,39	3,91	4,48	4,05	4,91	5,05	4,86	5,24
40 à 59 ans	3,51	3,19	3,83	4,32	3,93	4,70	5,16	4,65	5,67	5,81	5,15	6,47
60 à 79 ans	3,52	3,34	3,69	4,42	4,09	4,74	5,48	4,68	6,29	6,63	5,76	7,50
6 à 19 ans	3,03	2,93	3,12	3,56	3,39	3,74	4,17	3,89	4,44	4,82	4,49	5,15
20 à 79 ans	3,28	3,13	3,43	4,16	3,95	4,37	5,05	4,73	5,37	5,70	5,14	6,27
6 à 79 ans	3,22	3,12	3,32	4,05	3,87	4,23	4,90	4,63	5,17	5,54	5,08	6,00

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans basée sur le sous-échantillon des répondants ayant jeûné, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 53
Distribution de la population à domicile (sous-échantillon à jeun) selon la concentration d'apolipoprotéine A1 dans le sérum, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Concentration d'apolipoprotéine A1 dans le sérum - sous-échantillon à jeun											
	Moyenne		5 ^e percentile		10 ^e percentile		25 ^e percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance
		de à		de à		de à		de à		de à		de à
	grammes par litre											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	1,40	1,36	1,44	1,06	0,96	1,16	1,14	1,07	1,21	1,27	1,23	1,31
12 à 19 ans	1,28	1,25	1,31	1,01	0,96	1,06	1,05	1,01	1,09	1,14	1,11	1,17
20 à 39 ans	1,39	1,35	1,44	1,03	0,92	1,14	1,12	1,06	1,18	1,24	1,20	1,28
40 à 59 ans	1,45	1,41	1,49	1,02	0,93	1,11	1,12	1,04	1,20	1,29	1,26	1,32
60 à 79 ans	1,51	1,46	1,55	1,10	1,04	1,16	1,19	1,14	1,24	1,29	1,25	1,33
6 à 19 ans	1,33	1,30	1,36	1,02	0,97	1,07	1,07	1,03	1,11	1,18	1,15	1,21
20 à 79 ans	1,44	1,40	1,48	1,04	0,97	1,11	1,14	1,08	1,20	1,27	1,24	1,30
6 à 79 ans	1,42	1,38	1,46	1,03	0,97	1,09	1,12	1,07	1,17	1,25	1,22	1,28
Hommes												
6 à 11 ans	1,44	1,40	1,48	1,15	1,07	1,23	1,21	1,16	1,26	1,29	1,25	1,33
12 à 19 ans	1,27	1,24	1,29	1,01	0,92	1,10	1,05	1,00	1,10	1,13	1,09	1,17
20 à 39 ans	1,31	1,26	1,35	0,93	0,73	1,13	1,07	0,97	1,17	1,18	1,13	1,23
40 à 59 ans	1,37	1,32	1,41	1,02	0,92	1,12	1,06	0,97	1,15	1,24	1,19	1,29
60 à 79 ans	1,39	1,34	1,44	1,04	0,98	1,10	1,11	1,04	1,18	1,24	1,20	1,28
6 à 19 ans	1,34	1,31	1,36	1,03	0,97	1,09	1,08	1,04	1,12	1,19	1,16	1,22
20 à 79 ans	1,35	1,31	1,38	1,01	0,89	1,13	1,07	1,00	1,14	1,21	1,17	1,25
6 à 79 ans	1,34	1,31	1,38	1,02	0,93	1,11	1,07	1,01	1,13	1,20	1,16	1,24
Femmes												
6 à 11 ans	1,36	1,30	1,42	1,01	0,90	1,12	1,10	1,01	1,19	1,24	1,16	1,32
12 à 19 ans	1,30	1,26	1,34	1,00	0,95	1,05	1,05	1,01	1,09	1,15	1,10	1,20
20 à 39 ans	1,48	1,43	1,54	1,12	1,06	1,18	1,21	1,17	1,25	1,29	1,24	1,34
40 à 59 ans	1,53	1,46	1,60	1,09	0,96	1,22	1,20	1,08	1,32	1,34	1,26	1,42
60 à 79 ans	1,61	1,55	1,68	1,19	1,12	1,26	1,28	1,23	1,33	1,42	1,37	1,47
6 à 19 ans	1,32	1,28	1,37	1,01	0,96	1,06	1,06	1,01	1,11	1,17	1,13	1,21
20 à 79 ans	1,53	1,48	1,59	1,12	1,05	1,19	1,21	1,16	1,26	1,32	1,27	1,37
6 à 79 ans	1,49	1,44	1,55	1,09	1,03	1,15	1,17	1,11	1,23	1,29	1,25	1,33

	Concentration d'apolipoprotéine A1 dans le sérum - sous-échantillon à jeun											
	50 ^e percentile		75 ^e percentile		90 ^e percentile		95 ^e percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance
		de à		de à		de à		de à		de à		de à
	grammes par litre											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	1,40	1,36	1,44	1,53	1,47	1,59	1,65	1,58	1,72	1,77	1,68	1,86
12 à 19 ans	1,26	1,23	1,29	1,39	1,35	1,43	1,55	1,48	1,62	1,67	1,58	1,76
20 à 39 ans	1,36	1,33	1,39	1,54	1,47	1,61	1,70	1,62	1,78	1,90	1,75	2,05
40 à 59 ans	1,43	1,38	1,48	1,61	1,54	1,68	1,80	1,72	1,88	1,94	1,85	2,03
60 à 79 ans	1,46	1,41	1,51	1,67	1,61	1,73	1,87	1,77	1,97	2,06	1,94	2,18
6 à 19 ans	1,31	1,28	1,34	1,47	1,43	1,51	1,62	1,57	1,67	1,71	1,64	1,78
20 à 79 ans	1,40	1,36	1,44	1,59	1,54	1,64	1,80	1,74	1,86	1,95	1,88	2,02
6 à 79 ans	1,38	1,34	1,42	1,57	1,53	1,61	1,76	1,70	1,82	1,91	1,83	1,99
Hommes												
6 à 11 ans	1,44	1,39	1,49	1,59	1,54	1,64	1,66	1,56	1,76	1,84	1,75	1,93
12 à 19 ans	1,26	1,23	1,29	1,36	1,32	1,40	1,53	1,48	1,58	1,62	1,55	1,69
20 à 39 ans	1,30	1,26	1,34	1,43	1,39	1,47	1,57	1,51	1,63	1,64	1,58	1,70
40 à 59 ans	1,34	1,30	1,38	1,50	1,44	1,56	1,67	1,53	1,81	1,80	1,64	1,96
60 à 79 ans	1,35	1,30	1,40	1,49	1,41	1,57	1,73	1,64	1,82	1,80	1,71	1,89
6 à 19 ans	1,31	1,29	1,33	1,48	1,44	1,52	1,62	1,58	1,66	1,70	1,62	1,78
20 à 79 ans	1,33	1,30	1,36	1,46	1,42	1,50	1,63	1,57	1,69	1,76	1,69	1,83
6 à 79 ans	1,33	1,31	1,35	1,47	1,44	1,50	1,62	1,57	1,67	1,76	1,69	1,83
Femmes												
6 à 11 ans	1,37	1,32	1,42	1,49	1,44	1,54	1,61	1,51	1,71	1,71	1,62	1,80
12 à 19 ans	1,27	1,22	1,32	1,41	1,34	1,48	1,61	1,47	1,75	1,70	1,58	1,82
20 à 39 ans	1,41	1,33	1,49	1,65	1,58	1,72	1,83	1,68	1,98	2,02	1,86	2,18
40 à 59 ans	1,50	1,44	1,56	1,71	1,63	1,79	1,88	1,77	1,99	1,98	1,83	2,13
60 à 79 ans	1,59	1,53	1,65	1,76	1,68	1,84	2,01	1,85	2,17	2,13	1,89	2,37
6 à 19 ans	1,31	1,26	1,36	1,45	1,40	1,50	1,61	1,51	1,71	1,71	1,62	1,80
20 à 79 ans	1,50	1,45	1,55	1,70	1,64	1,76	1,91	1,82	2,00	2,06	1,95	2,17
6 à 79 ans	1,46	1,41	1,51	1,67	1,62	1,72	1,85	1,77	1,93	2,01	1,91	2,11

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans basée sur le sous-échantillon des répondants ayant jeûné, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 54
Distribution de la population à domicile (sous-échantillon à jeun) selon la concentration d'apolipoprotéine B dans le sérum, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Concentration d'apolipoprotéine B dans le sérum - sous-échantillon à jeun											
	Moyenne		5 ^e percentile		10 ^e percentile		25 ^e percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance
		de à		de à		de à		de à		de à		de à
	grammes par litre											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	0,71	0,68	0,73	0,48	0,42	0,54	0,52	0,48	0,56	0,61	0,58	0,64
12 à 19 ans	0,71	0,67	0,75	0,46	0,42	0,50	0,50	0,47	0,53	0,57	0,54	0,60
20 à 39 ans	0,84	0,81	0,87	0,53	0,47	0,59	0,59	0,55	0,63	0,68	0,65	0,71
40 à 59 ans	0,96	0,92	0,99	0,57	0,50	0,64	0,65	0,60	0,70	0,79	0,75	0,83
60 à 79 ans	0,99	0,96	1,02	0,58	0,52	0,64	0,69	0,62	0,76	0,82	0,78	0,86
Hommes												
6 à 19 ans	0,71	0,67	0,74	0,46	0,42	0,50	0,52	0,49	0,55	0,59	0,56	0,62
20 à 79 ans	0,92	0,89	0,94	0,56	0,52	0,60	0,63	0,60	0,66	0,75	0,72	0,78
6 à 79 ans	0,88	0,85	0,90	0,52	0,48	0,56	0,59	0,56	0,62	0,70	0,67	0,73
Femmes												
6 à 11 ans	0,71	0,69	0,74	0,50	0,47	0,53	0,55	0,51	0,59	0,62	0,59	0,65
12 à 19 ans	0,69	0,65	0,74	0,48	0,38	0,58	0,50	0,47	0,53	0,58	0,55	0,61
20 à 39 ans	0,87	0,84	0,90	0,58	0,54	0,62	0,64	0,61	0,67	0,72	0,68	0,76
40 à 59 ans	0,97	0,93	1,01	0,59	0,49	0,69	0,68	0,62	0,74	0,78	0,73	0,83
60 à 79 ans	0,98	0,93	1,03	0,57	0,50	0,64	0,66	0,58	0,74	0,77	0,71	0,83
6 à 19 ans	0,70	0,67	0,74	0,48	0,44	0,52	0,52	0,49	0,55	0,59	0,56	0,62
20 à 79 ans	0,93	0,90	0,96	0,58	0,54	0,62	0,65	0,62	0,68	0,76	0,74	0,78
6 à 79 ans	0,89	0,86	0,92	0,54	0,50	0,58	0,60	0,57	0,63	0,71	0,68	0,74
50^e percentile												
6 à 11 ans	0,70	0,66	0,74	0,42	0,35	0,49	0,51	0,42	0,60	0,60	0,56	0,64
12 à 19 ans	0,72	0,67	0,77	0,45	0,40	0,50	0,50	0,46	0,54	0,56	0,50	0,62
20 à 39 ans	0,80	0,75	0,85	0,49	0,41	0,57	0,56	0,49	0,63	0,65	0,61	0,69
40 à 59 ans	0,95	0,90	0,99	0,57	0,49	0,65	0,64	0,57	0,71	0,79	0,72	0,86
60 à 79 ans	1,00	0,97	1,02	0,60	0,51	0,69	0,73	0,65	0,81	0,83	0,79	0,87
6 à 19 ans	0,71	0,67	0,75	0,44	0,40	0,48	0,51	0,47	0,55	0,59	0,54	0,64
20 à 79 ans	0,90	0,87	0,93	0,56	0,50	0,62	0,61	0,57	0,65	0,73	0,69	0,77
6 à 79 ans	0,87	0,84	0,89	0,51	0,46	0,56	0,57	0,53	0,61	0,69	0,65	0,73
75^e percentile												
6 à 11 ans	0,69	0,66	0,72	0,79	0,75	0,83	0,92	0,88	0,96	0,96	0,94	0,98
12 à 19 ans	0,70	0,66	0,74	0,82	0,78	0,86	0,91	0,85	0,97	1,03	0,92	1,14
20 à 39 ans	0,81	0,77	0,85	0,98	0,93	1,03	1,11	1,08	1,14	1,19	1,15	1,23
40 à 59 ans	0,94	0,90	0,98	1,10	1,06	1,14	1,27	1,21	1,33	1,34	1,28	1,40
60 à 79 ans	0,97	0,93	1,01	1,15	1,12	1,18	1,30	1,25	1,35	1,39	1,36	1,42
6 à 19 ans	0,70	0,67	0,73	0,81	0,77	0,85	0,91	0,87	0,95	0,97	0,91	1,03
20 à 79 ans	0,90	0,87	0,93	1,07	1,04	1,10	1,22	1,19	1,25	1,32	1,28	1,36
6 à 79 ans	0,85	0,82	0,88	1,03	1,00	1,06	1,20	1,17	1,23	1,30	1,26	1,34
90^e percentile												
6 à 11 ans	0,69	0,66	0,72	0,79	0,75	0,83	0,89	0,85	0,93	0,94	0,90	0,98
12 à 19 ans	0,68	0,63	0,73	0,80	0,75	0,85	0,92	0,83	1,01	1,01	0,87	1,15
20 à 39 ans	0,85	0,80	0,90	1,03	0,99	1,07	1,12	1,08	1,16	1,19	1,15	1,23
40 à 59 ans	0,95	0,91	0,99	1,11	1,05	1,17	1,27	1,21	1,33	1,35	1,26	1,44
60 à 79 ans	0,96	0,89	1,03	1,16	1,11	1,21	1,28	1,21	1,35	1,39	1,32	1,46
6 à 19 ans	0,68	0,64	0,72	0,80	0,77	0,83	0,90	0,84	0,96	0,96	0,87	1,05
20 à 79 ans	0,92	0,88	0,96	1,09	1,05	1,13	1,23	1,18	1,28	1,31	1,25	1,37
6 à 79 ans	0,86	0,82	0,90	1,06	1,02	1,10	1,20	1,16	1,24	1,30	1,25	1,35
95^e percentile												
6 à 11 ans	0,69	0,64	0,74	0,80	0,74	0,86	0,93	0,88	0,98	0,97	0,92	1,02
12 à 19 ans	0,70	0,65	0,75	0,84	0,79	0,89	0,91	0,85	0,97	1,05	0,88	1,22
20 à 39 ans	0,76	0,71	0,81	0,90	0,83	0,97	1,10	1,03	1,17	1,18	1,09	1,27
40 à 59 ans	0,92	0,87	0,97	1,09	1,05	1,13	1,23	1,14	1,32	1,32	1,22	1,42
60 à 79 ans	0,98	0,95	1,01	1,14	1,08	1,20	1,32	1,24	1,40	1,40	1,22	1,58
6 à 19 ans	0,70	0,66	0,74	0,82	0,77	0,87	0,92	0,88	0,96	1,00	0,92	1,08
20 à 79 ans	0,88	0,85	0,91	1,05	1,02	1,08	1,22	1,16	1,28	1,32	1,25	1,39
6 à 79 ans	0,84	0,81	0,87	1,02	0,99	1,05	1,20	1,15	1,25	1,31	1,24	1,38

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans basée sur le sous-échantillon des répondants ayant jeûné, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent. Pour plus de renseignements concernant les critères d'exclusion et la limite de détection de l'apolipoprotéine B dans le sérum, veuillez consulter le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 55

Distribution de la population à domicile (sous-échantillon à jeun) selon la concentration de glucose dans le plasma, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Concentration de glucose dans le plasma - sous-échantillon à jeun											
	Moyenne		5 ^e percentile		10 ^e percentile		25 ^e percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance
		de à		de à		de à		de à		de à		de à
	millimoles par litre											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	4,5	4,5	4,6	3,9	3,8	4,0	4,1	4,0	4,2	4,3	4,2	4,4
12 à 19 ans	4,6	4,5	4,7	3,9	3,8	4,0	4,1	3,9	4,3	4,4	4,3	4,5
20 à 39 ans	4,8	4,7	4,9	4,1	4,0	4,2	4,2	4,0	4,4	4,5	4,4	4,6
40 à 59 ans	5,2	5,1	5,3	4,3	4,2	4,4	4,4	4,3	4,5	4,7	4,6	4,8
60 à 79 ans	5,5	5,3	5,6	4,4	4,2	4,6	4,6	4,5	4,7	4,9	4,8	5,0
6 à 19 ans	4,6	4,5	4,7	3,9	3,8	4,0	4,1	4,0	4,2	4,4	4,3	4,5
20 à 79 ans	5,1	5,1	5,2	4,2	4,1	4,3	4,3	4,2	4,4	4,6	4,5	4,7
6 à 79 ans	5,0	5,0	5,1	4,1	4,0	4,2	4,3	4,2	4,4	4,5	4,4	4,6
Hommes												
6 à 11 ans	4,6	4,5	4,6	4,0	3,8	4,2	4,2	4,1	4,3	4,4	4,3	4,5
12 à 19 ans	4,7	4,6	4,8	3,9	3,7	4,1	4,2	4,0	4,4	4,5	4,4	4,6
20 à 39 ans	4,9	4,8	5,1	4,2	4,0	4,4	4,3	4,2	4,4	4,6	4,5	4,7
40 à 59 ans	5,3	5,1	5,4	4,3	4,1	4,5	4,5	4,3	4,7	4,7	4,6	4,8
60 à 79 ans	5,7	5,4	5,9	4,5	4,3	4,7	4,7	4,5	4,9	5,1	5,0	5,2
6 à 19 ans	4,7	4,6	4,7	3,9	3,7	4,1	4,2	4,1	4,3	4,4	4,3	4,5
20 à 79 ans	5,2	5,1	5,3	4,3	4,2	4,4	4,5	4,3	4,7	4,7	4,6	4,8
6 à 79 ans	5,1	5,1	5,2	4,2	4,1	4,3	4,3	4,2	4,4	4,6	4,5	4,7
Femmes												
6 à 11 ans	4,5	4,4	4,6	3,9	3,7	4,1	4,0	3,9	4,1	4,3	4,1	4,5
12 à 19 ans	4,5	4,4	4,7	3,8	3,6	4,0	4,0	3,8	4,2	4,3	4,1	4,5
20 à 39 ans	4,7	4,6	4,7	4,0	3,8	4,2	4,1	4,0	4,2	4,4	4,3	4,5
40 à 59 ans	5,1	5,0	5,3	4,2	4,1	4,3	4,4	4,3	4,5	4,6	4,5	4,7
60 à 79 ans	5,3	5,1	5,5	4,3	4,1	4,5	4,5	4,3	4,7	4,8	4,8	4,8
6 à 19 ans	4,5	4,4	4,6	3,9	3,8	4,0	4,0	3,8	4,2	4,3	4,1	4,5
20 à 79 ans	5,0	4,9	5,1	4,1	4,0	4,2	4,3	4,2	4,4	4,5	4,4	4,6
6 à 79 ans	4,9	4,8	5,0	4,0	3,9	4,1	4,2	4,1	4,3	4,5	4,4	4,6

	Concentration de glucose dans le plasma - sous-échantillon à jeun											
	50 ^e percentile		75 ^e percentile		90 ^e percentile		95 ^e percentile					
	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance
		de à		de à		de à		de à		de à		de à
	millimoles par litre											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	4,5	4,4	4,6	4,7	4,6	4,8	5,0	4,9	5,1	5,2	5,1	5,3
12 à 19 ans	4,6	4,5	4,7	4,9	4,8	5,0	5,1	4,9	5,3	5,4	5,2	5,6
20 à 39 ans	4,7	4,6	4,8	5,0	4,9	5,1	5,3	5,1	5,5	5,5	5,4	5,6
40 à 59 ans	5,0	4,9	5,1	5,4	5,3	5,5	6,1	5,8	6,4	6,7	6,1	7,3
60 à 79 ans	5,2	5,1	5,3	5,7	5,5	5,9	6,6	6,1	7,1	7,7	6,9	8,5
6 à 19 ans	4,6	4,5	4,7	4,8	4,7	4,9	5,1	5,0	5,2	5,3	5,1	5,5
20 à 79 ans	4,9	4,8	5,0	5,3	5,2	5,4	5,9	5,7	6,1	6,5	6,2	6,8
6 à 79 ans	4,8	4,7	4,9	5,2	5,1	5,3	5,7	5,5	5,9	6,3	6,0	6,6
Hommes												
6 à 11 ans	4,5	4,4	4,6	4,8	4,7	4,9	5,0	4,9	5,1	5,2	5,0	5,4
12 à 19 ans	4,7	4,6	4,8	5,0	4,9	5,1	5,2	4,9	5,5	5,6	5,4	5,8
20 à 39 ans	4,8	4,7	4,9	5,1	5,0	5,2	5,5	5,3	5,7	5,6	5,5	5,7
40 à 59 ans	5,1	5,0	5,2	5,5	5,3	5,7	6,2	5,9	6,5	6,7	6,3	7,1
60 à 79 ans	5,4	5,2	5,6	5,9	5,6	6,2	7,0	6,1	7,9	8,1	7,2	9,0
6 à 19 ans	4,7	4,6	4,8	4,9	4,8	5,0	5,2	5,0	5,4	5,4	5,2	5,6
20 à 79 ans	5,0	4,9	5,1	5,4	5,3	5,5	6,1	5,9	6,3	6,7	6,4	7,0
6 à 79 ans	5,0	4,9	5,1	5,3	5,2	5,4	5,9	5,7	6,1	6,4	6,1	6,7
Femmes												
6 à 11 ans	4,5	4,4	4,6	4,7	4,6	4,8	4,9	4,8	5,0	5,2	5,0	5,4
12 à 19 ans	4,6	4,5	4,7	4,8	4,7	4,9	5,0	4,9	5,1	5,1	4,9	5,3
20 à 39 ans	4,6	4,5	4,7	4,9	4,8	5,0	5,2	5,0	5,4	5,5	5,3	5,7
40 à 59 ans	4,9	4,8	5,0	5,3	5,2	5,4	5,9	5,3	6,5	6,7	5,2	8,2
60 à 79 ans	5,1	5,0	5,2	5,5	5,3	5,7	6,2	5,7	6,7	7,0	6,0	8,0
6 à 19 ans	4,5	4,4	4,6	4,7	4,6	4,8	5,0	4,9	5,1	5,1	4,9	5,3
20 à 79 ans	4,8	4,8	4,8	5,2	5,1	5,3	5,7	5,5	5,9	6,3	5,8	6,8
6 à 79 ans	4,8	4,7	4,9	5,1	5,0	5,2	5,6	5,4	5,8	6,2	5,8	6,6

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans basée sur le sous-échantillon des répondants jeûné, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 56
Prévalence de l'anticorps de l'hépatite A dans la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Prévalence de l'anticorps de l'hépatite A		
	Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à
pourcentage			
Les deux sexes			
14 à 19 ans	17,3 ^E	11,5	23,0
20 à 39 ans	28,0	21,4	34,5
40 à 59 ans	42,7	35,6	49,8
60 à 79 ans	64,6	59,6	69,5
14 à 79 ans	39,5	34,3	44,7
Hommes			
14 à 19 ans	14,5 ^E	6,9	22,0
20 à 39 ans	27,0	20,6	33,4
40 à 59 ans	42,0	31,9	52,2
60 à 79 ans	66,9	60,9	72,9
14 à 79 ans	38,8	32,5	45,0
Femmes			
14 à 19 ans	20,0 ^E	13,2	26,9
20 à 39 ans	28,9	21,2	36,7
40 à 59 ans	43,4	37,0	49,7
60 à 79 ans	62,5	56,6	68,3
14 à 79 ans	40,2	35,2	45,2

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

Note(s) : Population à domicile âgée de 14 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 57
Prévalence de l'anticorps de surface de l'hépatite B dans la population à domicile, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Prévalence de l'anticorps de surface de l'hépatite B		
	Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à
pourcentage			
Les deux sexes			
14 à 19 ans	69,7	66,1	73,2
20 à 39 ans	40,6	35,0	46,2
40 à 59 ans	18,1	12,9	23,2
60 à 79 ans	12,5	9,2	15,8
14 à 79 ans	29,4	25,7	33,1
Hommes			
14 à 19 ans	72,7	68,1	77,3
20 à 39 ans	36,1	28,8	43,3
40 à 59 ans	14,7 ^E	9,0	20,4
60 à 79 ans	10,9 ^E	5,9	16,0
14 à 79 ans	26,8	22,3	31,3
Femmes			
14 à 19 ans	66,7	61,1	72,2
20 à 39 ans	45,3	38,3	52,4
40 à 59 ans	21,4	15,1	27,8
60 à 79 ans	13,9	10,1	17,7
14 à 79 ans	32,0	27,7	36,4

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

Note(s) : Population à domicile âgée de 14 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent (voir le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*).

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 58
Distribution de la population à domicile selon la concentration de bisphénol A dans l'urine, selon l'âge et le sexe,
Canada, 2007 à 2009

	Concentration de bisphénol A dans l'urine											
	Moyenne géométrique			5 ^e percentile		10 ^e percentile			25 ^e percentile			
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		
		de	à				de	à		de	à	
	microgrammes par litre											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	1,30	1,17	1,45	L ...		0,32	0,22	0,42		0,69	0,58	0,81
12 à 19 ans	1,50	1,28	1,77	L ...		0,34	0,27	0,41		0,80	0,59	1,00
20 à 39 ans	1,33	1,18	1,49	L ...		0,29 ^E	0,13	0,46		0,68	0,52	0,85
40 à 59 ans	1,04	0,96	1,12	L ...		L		0,50	0,42	0,57
60 à 79 ans	0,90	0,82	0,99	L ...		L		0,46	0,40	0,52
6 à 79 ans	1,16	1,08	1,24	L ...		F		0,60	0,53	0,66
Hommes												
6 à 11 ans	1,27	1,07	1,52	L ...		0,38	0,26	0,49		0,67	0,49	0,85
12 à 19 ans	1,44	1,15	1,81	L ...		0,38	0,24	0,52		0,83	0,58	1,08
20 à 39 ans	1,40	1,24	1,58	L ...		0,33 ^E	0,16	0,50		0,73	0,52	0,94
40 à 59 ans	1,25	1,13	1,39	L ...		F		0,75	0,63	0,87
60 à 79 ans	1,08	0,94	1,24	L ...		0,23 ^E	0,11	0,35		0,53	0,36	0,70
6 à 79 ans	1,29	1,20	1,38	L ...		0,29^E	0,19	0,40		0,71	0,62	0,81
Femmes												
6 à 11 ans	1,33	1,09	1,61	L ...		0,30	0,21	0,39		0,70	0,58	0,82
12 à 19 ans	1,57	1,29	1,92	L ...		0,30 ^E	0,18	0,41		0,79	0,50	1,08
20 à 39 ans	1,26	1,06	1,49	L ...		F		0,64	0,48	0,81
40 à 59 ans	0,86	0,77	0,96	L ...		L		0,36	0,28	0,45
60 à 79 ans	0,76	0,65	0,88	L ...		L		0,40	0,29	0,50
6 à 79 ans	1,04	0,94	1,16	L ...		L		0,49	0,42	0,57

	Concentration de bisphénol A dans l'urine											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		
		de	à				de	à		de	à	de
	microgrammes par litre											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	1,39	1,15	1,64	2,65	2,28	3,01	4,51	3,88	5,13	7,16	5,56	8,76
12 à 19 ans	1,68	1,38	1,97	3,00	2,31	3,70	5,90	4,78	7,02	8,40	6,22	10,58
20 à 39 ans	1,48	1,29	1,67	2,83	2,52	3,15	4,80	4,18	5,42	7,30	5,17	9,43
40 à 59 ans	1,26	1,13	1,40	2,46	2,05	2,87	4,40	3,51	5,30	6,58	4,81	8,36
60 à 79 ans	1,00	0,84	1,16	1,89	1,56	2,23	3,78	3,33	4,24	5,22	3,83	6,60
6 à 79 ans	1,33	1,17	1,49	2,56	2,28	2,84	4,62	4,09	5,15	7,01	5,68	8,33
Hommes												
6 à 11 ans	1,38	1,10	1,66	2,55	2,15	2,94	4,20	3,40	5,00	6,79	4,69	8,88
12 à 19 ans	1,60	1,22	1,99	2,76	2,12	3,41	5,62 ^E	3,48	7,76	8,20	5,58	10,82
20 à 39 ans	1,57	1,29	1,85	2,89	2,60	3,19	4,55	3,88	5,22	6,55	4,97	8,13
40 à 59 ans	1,40	1,21	1,59	2,60	2,17	3,03	4,21	3,23	5,19	6,41	4,29	8,54
60 à 79 ans	1,23	1,03	1,42	2,16	1,80	2,53	3,98	3,40	4,56	5,92	4,04	7,81
6 à 79 ans	1,43	1,26	1,59	2,66	2,33	3,00	4,48	3,91	5,05	6,77	5,37	8,18
Femmes												
6 à 11 ans	1,42	1,02	1,81	2,79	2,14	3,43	4,87	3,93	5,81	7,52	5,43	9,62
12 à 19 ans	1,83	1,47	2,19	3,87	3,16	4,57	6,47	5,15	7,79	8,10	5,44	10,76
20 à 39 ans	1,41	1,17	1,66	2,73	2,18	3,28	5,07	3,79	6,35	8,08 ^E	4,98	11,19
40 à 59 ans	1,02	0,84	1,20	2,04	1,58	2,50	4,71	3,40	6,02	6,61	4,66	8,56
60 à 79 ans	0,80	0,63	0,97	1,64	1,33	1,95	3,42	2,49	4,35	4,88	3,54	6,23
6 à 79 ans	1,17	0,99	1,35	2,41	2,08	2,75	4,90	4,25	5,56	7,04	5,40	8,68

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)
^F trop peu fiable pour être publié (données avec un coefficient de variation (CV) de plus de 33,3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage)
^L sous la limite de détection
Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent.
 Pour plus de renseignements concernant les critères d'exclusion et la limite de détection de bisphénol A dans l'urine, veuillez consulter le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*. Ce tableau a été produit en utilisant le progiciel SUDAAN.
Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 59
Distribution de la population à domicile selon la concentration de bisphénol A dans l'urine normalisée par la créatinine dans l'urine, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Concentration de bisphénol A dans l'urine normalisée par la créatinine dans l'urine											
	Moyenne géométrique			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	microgrammes par gramme de créatinine											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	2,00	1,79	2,23	0,40	0,27	0,53	0,65	0,54	0,76	1,14	0,99	1,29
12 à 19 ans	1,31	1,17	1,46	0,31 ^E	0,19	0,42	0,42	0,35	0,49	0,75	0,63	0,86
20 à 39 ans	1,49	1,41	1,57	0,32	0,23	0,40	0,44	0,35	0,54	0,87	0,79	0,95
40 à 59 ans	1,33	1,20	1,47	0,21 ^E	0,12	0,29	0,35 ^E	0,21	0,49	0,76	0,61	0,91
60 à 79 ans	1,26	1,14	1,40	0,23	0,15	0,30	0,34	0,26	0,43	0,68	0,60	0,76
6 à 79 ans	1,40	1,32	1,49	0,27	0,20	0,34	0,42	0,35	0,49	0,79	0,72	0,86
Hommes												
6 à 11 ans	1,93	1,75	2,13	0,34 ^E	0,16	0,52	0,65	0,50	0,79	1,17	0,99	1,35
12 à 19 ans	1,22	1,02	1,45	0,34 ^E	0,18	0,49	0,41	0,33	0,49	0,71	0,54	0,89
20 à 39 ans	1,30	1,17	1,45	0,31	0,24	0,39	0,44	0,35	0,53	0,75	0,64	0,85
40 à 59 ans	1,23	1,08	1,40	0,21 ^E	0,11	0,30	0,32 ^E	0,14	0,50	0,69	0,56	0,82
60 à 79 ans	1,14	1,02	1,27	0,20 ^E	0,07	0,33	0,32	0,21	0,43	0,64	0,55	0,74
6 à 79 ans	1,28	1,18	1,38	0,27	0,19	0,34	0,41	0,32	0,50	0,72	0,65	0,79
Femmes												
6 à 11 ans	2,08	1,77	2,45	0,45	0,33	0,56	0,65	0,51	0,79	1,12	0,94	1,30
12 à 19 ans	1,41	1,28	1,56	0,28 ^E	0,08	0,48	0,45	0,36	0,55	0,79	0,69	0,90
20 à 39 ans	1,70	1,53	1,89	0,33 ^E	0,20	0,46	0,50	0,36	0,64	1,02	0,87	1,16
40 à 59 ans	1,43	1,27	1,62	0,20 ^E	0,07	0,33	0,37 ^E	0,22	0,52	0,82	0,61	1,03
60 à 79 ans	1,39	1,23	1,56	0,26	0,21	0,32	0,34	0,23	0,46	0,72	0,61	0,82
6 à 79 ans	1,54	1,44	1,64	0,27	0,18	0,36	0,44	0,36	0,52	0,88	0,82	0,94

	Concentration de bisphénol A dans l'urine normalisée par la créatinine dans l'urine											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	microgrammes par gramme de créatinine											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	1,94	1,64	2,23	3,54	2,93	4,15	5,99	4,85	7,13	9,80	7,29	12,31
12 à 19 ans	1,27	1,09	1,44	2,31	1,89	2,74	4,23	3,37	5,09	6,43 ^E	4,03	8,83
20 à 39 ans	1,47	1,32	1,62	2,61	2,39	2,83	4,39	3,38	5,39	6,83	5,93	7,73
40 à 59 ans	1,34	1,20	1,47	2,35	1,96	2,74	4,74	3,79	5,69	7,45	6,13	8,78
60 à 79 ans	1,27	1,15	1,38	2,31	1,91	2,72	4,28	2,97	5,58	7,63	5,40	9,86
6 à 79 ans	1,39	1,27	1,50	2,50	2,26	2,75	4,74	4,08	5,41	7,23	6,45	8,01
Hommes												
6 à 11 ans	1,99	1,67	2,30	3,31	2,71	3,91	5,24	4,12	6,35	7,88	5,61	10,14
12 à 19 ans	1,17	1,00	1,35	2,14	1,56	2,71	4,04	3,31	4,77	5,78 ^E	2,64	8,92
20 à 39 ans	1,32	1,07	1,58	2,28	1,85	2,71	3,75	3,06	4,43	5,08	4,12	6,03
40 à 59 ans	1,27	1,13	1,41	2,17	1,68	2,66	3,75	2,82	4,67	6,19	4,60	7,79
60 à 79 ans	1,22	1,09	1,36	2,06	1,76	2,35	3,76	2,52	5,00	5,96	4,47	7,45
6 à 79 ans	1,29	1,17	1,41	2,29	1,99	2,59	3,93	3,51	4,34	6,08	5,32	6,85
Femmes												
6 à 11 ans	1,90	1,58	2,23	3,77	2,89	4,64	6,68	4,82	8,55	11,89 ^E	6,33	17,44
12 à 19 ans	1,43	1,20	1,67	2,50	2,04	2,95	4,81 ^E	3,02	6,60	F
20 à 39 ans	1,58	1,27	1,88	2,93	2,56	3,30	6,08	5,13	7,03	7,87	5,78	9,95
40 à 59 ans	1,40	1,20	1,61	2,67	1,94	3,39	5,77	4,15	7,39	8,79 ^E	5,46	12,13
60 à 79 ans	1,40	1,22	1,58	2,44	1,78	3,09	4,89 ^E	2,30	7,47	8,89 ^E	4,92	12,86
6 à 79 ans	1,51	1,39	1,63	2,79	2,43	3,15	5,86	4,92	6,80	8,59	6,98	10,19

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)
^F trop peu fiable pour être publié (données avec un coefficient de variation (CV) de plus de 33,3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage)
Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent.
 Pour plus de renseignements concernant les critères d'exclusion et la limite de détection de bisphénol A dans l'urine et de créatinine dans l'urine, veuillez consulter le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*.
 Ce tableau a été produit en utilisant le progiciel SUDAAN et les variables LAB_BPA et LAB_UCRE.
Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 60
Distribution de la population à domicile selon la concentration de plomb dans le sang total in micromoles per litre, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Concentration de plomb dans le sang total											
	Moyenne géométrique			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	micromoles par litre											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	0,04	0,04	0,05	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
12 à 19 ans	0,04	0,04	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
20 à 39 ans	0,05	0,05	0,06	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,04
40 à 59 ans	0,08	0,07	0,08	0,03	0,03	0,04	0,04	0,03	0,05	0,06	0,05	0,06
60 à 79 ans	0,10	0,09	0,11	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,06	0,07	0,06	0,08
6 à 79 ans	0,06	0,06	0,07	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05
Hommes												
6 à 11 ans	0,04	0,04	0,05	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04
12 à 19 ans	0,04	0,04	0,05	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
20 à 39 ans	0,07	0,06	0,07	0,03	0,02	0,03	0,04	0,03	0,04	0,05	0,04	0,05
40 à 59 ans	0,08	0,08	0,09	0,04	0,03	0,05	0,05	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07
60 à 79 ans	0,11	0,10	0,12	0,04	0,04	0,05	0,06	0,05	0,06	0,08	0,07	0,08
6 à 79 ans	0,07	0,07	0,08	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05
Femmes												
6 à 11 ans	0,04	0,04	0,05	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
12 à 19 ans	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03
20 à 39 ans	0,04	0,04	0,05	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03
40 à 59 ans	0,07	0,06	0,08	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,04	0,06
60 à 79 ans	0,09	0,08	0,10	0,04	0,03	0,04	0,05	0,04	0,05	0,06	0,06	0,07
6 à 79 ans	0,06	0,05	0,06	0,02	0,02	0,03	0,03	0,02	0,03	0,04	0,03	0,04

	Concentration de plomb dans le sang total											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	micromoles par litre											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	0,04	0,04	0,05	0,06	0,05	0,06	0,08	0,07	0,09	0,09	0,08	0,11
12 à 19 ans	0,04	0,03	0,04	0,05	0,05	0,05	0,06	0,05	0,08	0,08	0,07	0,09
20 à 39 ans	0,05	0,05	0,05	0,08	0,07	0,09	0,11	0,10	0,13	0,15	0,13	0,17
40 à 59 ans	0,08	0,07	0,08	0,11	0,09	0,12	0,15	0,13	0,18	0,19	0,15	0,22
60 à 79 ans	0,10	0,09	0,11	0,15	0,13	0,16	0,20	0,17	0,23	0,25	0,20	0,30
6 à 79 ans	0,06	0,06	0,07	0,10	0,09	0,11	0,15	0,13	0,16	0,18	0,16	0,21
Hommes												
6 à 11 ans	0,04	0,04	0,05	0,06	0,05	0,06	0,08	0,07	0,09	0,09	0,09	0,10
12 à 19 ans	0,04	0,04	0,05	0,06	0,05	0,06	0,07	0,06	0,09	0,09	0,06	0,11
20 à 39 ans	0,06	0,06	0,07	0,10	0,08	0,11	0,14	0,13	0,16	0,18	0,14	0,21
40 à 59 ans	0,08	0,07	0,09	0,11	0,09	0,13	0,16	0,13	0,19	0,19	0,15	0,24
60 à 79 ans	0,11	0,10	0,12	0,16	0,14	0,18	0,23	0,19	0,28	0,30	0,24	0,36
6 à 79 ans	0,07	0,07	0,08	0,11	0,10	0,12	0,16	0,14	0,18	0,20	0,18	0,23
Femmes												
6 à 11 ans	0,04	0,04	0,05	0,06	0,05	0,07	0,08	0,07	0,09	0,09	0,06	0,13
12 à 19 ans	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05	0,06	0,05	0,06	0,07	0,06	0,08
20 à 39 ans	0,04	0,04	0,05	0,06	0,05	0,06	0,08	0,07	0,09	0,10	0,09	0,11
40 à 59 ans	0,07	0,06	0,08	0,10	0,09	0,12	0,15	0,12	0,18	0,18	0,15	0,22
60 à 79 ans	0,09	0,08	0,11	0,13	0,11	0,15	0,18	0,15	0,20	0,22	0,18	0,25
6 à 79 ans	0,06	0,05	0,06	0,08	0,07	0,10	0,13	0,11	0,15	0,17	0,15	0,19

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent.
 Pour plus de renseignements concernant les critères d'exclusion et la limite de détection de plomb dans le sang total, veuillez consulter le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*.
 Ce tableau a été produit en utilisant le progiciel SUDAAN.
Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 61
Distribution de la population à domicile selon la concentration de plomb dans le sang total en microgrammes par décilitre, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Concentration de plomb dans le sang total											
	Moyenne géométrique			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	microgrammes par décilitre											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	0,90	0,81	0,99	0,46	0,38	0,53	0,53	0,49	0,57	0,65	0,59	0,70
12 à 19 ans	0,80	0,74	0,85	0,41	0,37	0,45	0,47	0,44	0,51	0,57	0,53	0,62
20 à 39 ans	1,12	1,04	1,21	0,50	0,43	0,57	0,57	0,52	0,62	0,76	0,69	0,82
40 à 59 ans	1,60	1,46	1,75	0,64	0,54	0,73	0,82	0,70	0,95	1,15	1,06	1,24
60 à 79 ans	2,08	1,90	2,29	0,83	0,79	0,87	1,04	0,93	1,14	1,44	1,33	1,56
6 à 79 ans	1,34	1,24	1,44	0,52	0,48	0,55	0,60	0,56	0,65	0,86	0,79	0,93
Hommes												
6 à 11 ans	0,92	0,85	0,99	0,49	0,45	0,54	0,54	0,50	0,58	0,66	0,61	0,72
12 à 19 ans	0,88	0,82	0,96	0,45	0,39	0,51	0,51	0,46	0,55	0,65	0,60	0,69
20 à 39 ans	1,41	1,28	1,55	0,59	0,48	0,70	0,75	0,65	0,85	0,97	0,87	1,07
40 à 59 ans	1,74	1,57	1,92	0,81	0,67	0,95	0,98	0,89	1,08	1,25	1,15	1,35
60 à 79 ans	2,31	2,08	2,57	0,91	0,72	1,10	1,20	1,07	1,34	1,55	1,37	1,73
6 à 79 ans	1,51	1,40	1,63	0,59	0,55	0,62	0,71	0,66	0,76	1,01	0,95	1,08
Femmes												
6 à 11 ans	0,87	0,77	0,99	0,41	0,34	0,48	0,51	0,46	0,57	0,64	0,57	0,70
12 à 19 ans	0,71	0,66	0,77	0,39	0,34	0,43	0,43	0,37	0,49	0,53	0,48	0,58
20 à 39 ans	0,89	0,81	0,98	0,44	0,37	0,50	0,52	0,46	0,57	0,64	0,60	0,68
40 à 59 ans	1,47	1,31	1,65	0,59	0,52	0,65	0,71	0,59	0,82	1,05	0,90	1,19
60 à 79 ans	1,89	1,69	2,12	0,77	0,71	0,83	0,94	0,81	1,07	1,34	1,15	1,52
6 à 79 ans	1,18	1,08	1,30	0,48	0,43	0,52	0,55	0,50	0,60	0,74	0,68	0,81

	Concentration de plomb dans le sang total											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	microgrammes par décilitre											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	0,87	0,77	0,97	1,19	1,05	1,34	1,61	1,47	1,76	1,95	1,65	2,26
12 à 19 ans	0,76	0,70	0,83	1,05	0,99	1,11	1,34	1,11	1,56	1,64	1,47	1,82
20 à 39 ans	1,05	0,99	1,11	1,58	1,39	1,77	2,35	2,02	2,68	3,12	2,75	3,49
40 à 59 ans	1,55	1,43	1,67	2,22	1,95	2,50	3,17	2,71	3,63	3,87	3,16	4,57
60 à 79 ans	2,07	1,90	2,24	3,02	2,68	3,37	4,17	3,53	4,81	5,19	4,20	6,18
6 à 79 ans	1,30	1,21	1,39	2,03	1,83	2,22	3,07	2,77	3,37	3,79	3,32	4,26
Hommes												
6 à 11 ans	0,89	0,79	1,00	1,21	1,10	1,31	1,64	1,44	1,83	1,96	1,78	2,13
12 à 19 ans	0,87	0,79	0,95	1,16	1,05	1,27	1,53	1,29	1,77	1,79	1,28	2,29
20 à 39 ans	1,30	1,15	1,46	2,00	1,68	2,33	2,94	2,59	3,30	3,65	2,88	4,42
40 à 59 ans	1,61	1,46	1,77	2,35	1,92	2,77	3,31	2,77	3,85	3,95	3,02	4,88
60 à 79 ans	2,24	1,98	2,49	3,27	2,86	3,68	4,86	3,96	5,75	6,17	4,95	7,39
6 à 79 ans	1,44	1,34	1,54	2,21	2,01	2,42	3,26	2,87	3,66	4,22	3,71	4,72
Femmes												
6 à 11 ans	0,85	0,73	0,97	1,16	0,93	1,39	1,61	1,37	1,86	1,93	1,26	2,60
12 à 19 ans	0,68	0,62	0,75	0,91	0,79	1,04	1,16	0,98	1,33	1,46	1,25	1,67
20 à 39 ans	0,86	0,77	0,96	1,19	1,08	1,30	1,64	1,38	1,91	2,05	1,78	2,32
40 à 59 ans	1,46	1,27	1,64	2,11	1,81	2,41	3,11	2,49	3,74	3,78	3,05	4,52
60 à 79 ans	1,93	1,69	2,18	2,67	2,27	3,06	3,69	3,20	4,17	4,53	3,81	5,25
6 à 79 ans	1,14	1,04	1,25	1,74	1,51	1,97	2,73	2,35	3,12	3,50	3,03	3,97

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent.
 Pour plus de renseignements concernant les critères d'exclusion et la limite de détection de plomb dans le sang total, veuillez consulter le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*.
 Ce tableau a été produit en utilisant le progiciel SUDAAN.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 62

Distribution de la population à domicile selon la concentration de mercure dans le sang total en nanomoles par litre, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Concentration de mercure dans le sang total											
	Moyenne géométrique			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
nanomoles par litre												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	1,33	1,11	1,61	L	L	L
12 à 19 ans	1,53	1,17	2,01	L	L	0,67	0,45	0,88
20 à 39 ans	3,26	2,60	4,09	L	0,60	0,42	0,78	1,50	1,22	1,79
40 à 59 ans	5,07	4,04	6,36	0,67 ^E	0,35	0,98	1,33	0,93	1,74	2,78	2,09	3,47
60 à 79 ans	4,34	3,27	5,76	0,51 ^E	0,19	0,82	0,86 ^E	0,41	1,31	2,34	1,63	3,06
6 à 79 ans	3,46	2,79	4,29	L			0,60	0,47	0,72	1,62	1,30	1,94
Hommes												
6 à 11 ans	1,22	0,95	1,56	L	L	L
12 à 19 ans	1,42 ^E	1,00	2,03	L	L	0,58 ^E	0,33	0,83
20 à 39 ans	3,08	2,37	4,00	L	L	1,36	0,94	1,79
40 à 59 ans	5,18	4,08	6,57	0,66 ^E	0,23	1,10	1,38	0,93	1,83	2,94	2,17	3,72
60 à 79 ans	4,87	3,62	6,55	0,72 ^E	0,44	0,99	1,03 ^E	0,51	1,55	2,57	1,83	3,31
6 à 79 ans	3,41	2,75	4,22	L	0,52	0,33	0,70	1,58	1,23	1,93
Femmes												
6 à 11 ans	1,47	1,24	1,74	L	L	0,57	0,39	0,75
12 à 19 ans	1,66	1,32	2,07	L	L	0,75 ^E	0,46	1,04
20 à 39 ans	3,47	2,62	4,60	L	0,81	0,52	1,11	1,63	1,17	2,09
40 à 59 ans	4,96	3,86	6,37	0,67 ^E	0,32	1,03	1,18 ^E	0,67	1,68	2,63	1,82	3,44
60 à 79 ans	3,92	2,94	5,21	L	0,67 ^E	0,27	1,07	1,97 ^E	1,04	2,91
6 à 79 ans	3,51	2,80	4,42	L	0,66	0,50	0,82	1,64	1,27	2,00

	Concentration de mercure dans le sang total											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
nanomoles par litre												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	1,41	1,14	1,67	3,29	2,34	4,25	6,84	5,34	8,34	10,36 ^E	6,36	14,37
12 à 19 ans	1,61	1,20	2,03	3,80 ^E	2,34	5,26	6,80 ^E	2,63	10,96	11,20 ^E	4,66	17,75
20 à 39 ans	3,84	3,07	4,60	7,45 ^E	4,62	10,28	15,48	9,82	21,13	24,36 ^E	12,24	36,48
40 à 59 ans	5,56	4,28	6,83	9,61	7,47	11,76	17,88	11,52	24,24	31,87 ^E	15,11	48,63
60 à 79 ans	4,81	3,51	6,12	9,40	6,12	12,69	17,00	12,14	21,86	24,07 ^E	13,63	34,51
6 à 79 ans	4,03	3,21	4,85	8,01	5,85	10,17	15,31	11,00	19,61	23,41^E	13,03	33,80
Hommes												
6 à 11 ans	1,28	0,90	1,65	3,07 ^E	1,93	4,20	5,96 ^E	2,61	9,29	10,20 ^E	4,79	15,62
12 à 19 ans	1,38 ^E	0,84	1,92	3,18 ^E	0,93	5,42	7,37 ^E	2,05	12,70	F
20 à 39 ans	3,64	2,79	4,50	7,53 ^E	3,58	11,49	15,87 ^E	8,53	23,21	23,00 ^E	12,96	33,04
40 à 59 ans	5,32	4,06	6,57	9,14	7,58	10,70	17,07 ^E	6,40	27,73	F
60 à 79 ans	5,22	3,45	6,98	10,97	8,01	13,92	17,81 ^E	8,98	26,65	F
6 à 79 ans	3,94	3,20	4,69	8,03	5,72	10,34	15,78	10,85	20,70	25,59^E	13,45	37,74
Femmes												
6 à 11 ans	1,49	1,25	1,72	3,97	2,71	5,24	7,16	6,01	8,31	10,74 ^E	5,37	16,11
12 à 19 ans	1,80	1,36	2,24	4,12	3,00	5,23	5,96 ^E	2,14	9,78	11,14 ^E	6,58	15,69
20 à 39 ans	4,01	2,95	5,06	7,42	4,80	10,05	13,33 ^E	8,45	18,21	23,77 ^E	10,34	37,21
40 à 59 ans	5,77	4,38	7,16	10,07	7,18	12,95	18,21 ^E	11,00	25,41	26,66 ^E	10,07	43,25
60 à 79 ans	4,57	3,54	5,59	8,45	5,99	10,91	16,60	12,29	20,90	21,79	14,82	28,75
6 à 79 ans	4,12	3,12	5,12	7,86	5,75	9,97	14,97	10,65	19,30	22,21^E	12,71	31,71

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

^F trop peu fiable pour être publié (données avec un coefficient de variation (CV) de plus de 33,3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage)

L sous la limite de détection

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent.

Pour plus de renseignements concernant les critères d'exclusion et la limite de détection de mercure dans le sang total, veuillez consulter le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*.

Ce tableau a été produit en utilisant le progiciel SUDAAN.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 63
Distribution de la population à domicile selon la concentration de mercure dans le sang total en microgrammes par litre, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Concentration de mercure dans le sang total											
	Moyenne géométrique			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
microgrammes par litre												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	0,27	0,22	0,32	L	L	L
12 à 19 ans	0,31	0,23	0,40	L	L	0,13	0,09	0,18
20 à 39 ans	0,65	0,52	0,82	L	0,12	0,08	0,16	0,30	0,24	0,36
40 à 59 ans	1,02	0,81	1,27	0,13 ^E	0,07	0,20	0,27	0,19	0,35	0,56	0,42	0,70
60 à 79 ans	0,87	0,66	1,16	0,10 ^E	0,04	0,17	0,17 ^E	0,08	0,26	0,47	0,33	0,61
6 à 79 ans	0,69	0,56	0,86	L	0,12	0,10	0,14	0,33	0,26	0,39
Hommes												
6 à 11 ans	0,24	0,19	0,31	L	L	L
12 à 19 ans	0,29 ^E	0,20	0,41	L	L	0,12 ^E	0,07	0,17
20 à 39 ans	0,62	0,47	0,80	L	L	0,27	0,19	0,36
40 à 59 ans	1,04	0,82	1,32	0,13 ^E	0,05	0,22	0,28	0,19	0,37	0,59	0,43	0,75
60 à 79 ans	0,98	0,73	1,31	0,14 ^E	0,09	0,20	0,21 ^E	0,10	0,31	0,51	0,37	0,66
6 à 79 ans	0,68	0,55	0,85	L	0,10	0,07	0,14	0,32	0,25	0,39
Femmes												
6 à 11 ans	0,29	0,25	0,35	L	L	0,11	0,08	0,15
12 à 19 ans	0,33	0,26	0,42	L	L	0,15 ^E	0,09	0,21
20 à 39 ans	0,70	0,52	0,92	L	0,16	0,10	0,22	0,33	0,23	0,42
40 à 59 ans	0,99	0,77	1,28	0,14 ^E	0,06	0,21	0,24 ^E	0,14	0,34	0,53	0,36	0,69
60 à 79 ans	0,79	0,59	1,05	L	0,13 ^E	0,05	0,22	0,40 ^E	0,21	0,58
6 à 79 ans	0,70	0,56	0,89	L	0,13	0,10	0,16	0,33	0,25	0,40

	Concentration de mercure dans le sang total											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
microgrammes par litre												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	0,28	0,23	0,34	0,66	0,47	0,85	1,37	1,07	1,67	2,08 ^E	1,27	2,88
12 à 19 ans	0,32	0,24	0,41	0,76 ^E	0,47	1,06	1,36 ^E	0,53	2,20	2,25 ^E	0,93	3,56
20 à 39 ans	0,77	0,62	0,92	1,49 ^E	0,93	2,06	3,10	1,97	4,24	4,89 ^E	2,45	7,32
40 à 59 ans	1,11	0,86	1,37	1,93	1,50	2,36	3,59	2,31	4,86	6,39 ^E	3,03	9,76
60 à 79 ans	0,97	0,70	1,23	1,89	1,23	2,54	3,41	2,43	4,38	4,83 ^E	2,73	6,92
6 à 79 ans	0,81	0,64	0,97	1,61	1,17	2,04	3,07	2,21	3,93	4,70^E	2,61	6,78
Hommes												
6 à 11 ans	0,26	0,18	0,33	0,62 ^E	0,39	0,84	1,19 ^E	0,52	1,86	2,05 ^E	0,96	3,13
12 à 19 ans	0,28 ^E	0,17	0,39	0,64 ^E	0,19	1,09	1,48 ^E	0,41	2,55	F
20 à 39 ans	0,73	0,56	0,90	1,51 ^E	0,72	2,30	3,18 ^E	1,71	4,65	4,61 ^E	2,60	6,63
40 à 59 ans	1,07	0,81	1,32	1,83	1,52	2,15	3,42 ^E	1,28	5,56	F
60 à 79 ans	1,05	0,69	1,40	2,20	1,61	2,79	3,57 ^E	1,80	5,34	F
6 à 79 ans	0,79	0,64	0,94	1,61	1,15	2,07	3,16	2,18	4,15	5,13^E	2,70	7,57
Femmes												
6 à 11 ans	0,30	0,25	0,34	0,80	0,54	1,05	1,44	1,21	1,67	2,15 ^E	1,08	3,23
12 à 19 ans	0,36	0,27	0,45	0,83	0,60	1,05	1,19 ^E	0,43	1,96	2,23 ^E	1,32	3,15
20 à 39 ans	0,80	0,59	1,02	1,49	0,96	2,02	2,67 ^E	1,69	3,65	4,77 ^E	2,07	7,46
40 à 59 ans	1,16	0,88	1,44	2,02	1,44	2,60	3,65 ^E	2,21	5,10	5,35 ^E	2,02	8,67
60 à 79 ans	0,92	0,71	1,12	1,70	1,20	2,19	3,33	2,47	4,19	4,37	2,97	5,77
6 à 79 ans	0,83	0,63	1,03	1,58	1,15	2,00	3,00	2,14	3,87	4,45^E	2,55	6,36

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)
^F trop peu fiable pour être publié (données avec un coefficient de variation (CV) de plus de 33,3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage)
L sous la limite de détection
Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent.
Pour plus de renseignements concernant les critères d'exclusion et la limite de détection de mercure dans le sang total, veuillez consulter le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*.
Ce tableau a été produit en utilisant le progiciel SUDAAN.
Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 64

Distribution de la population à domicile selon la concentration de cadmium dans le sang total en nanomoles par litre, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Concentration de cadmium dans le sang total											
	Moyenne géométrique			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	nanomoles par litre											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	0,86	0,78	0,95	L	0,45	0,35	0,55	0,69	0,63	0,75
12 à 19 ans	1,52	1,27	1,84	0,46	0,34	0,58	0,63	0,44	0,82	0,94	0,81	1,06
20 à 39 ans	3,10	2,77	3,47	0,66	0,46	0,86	0,89	0,76	1,03	1,30	1,18	1,42
40 à 59 ans	4,32	3,87	4,81	0,99	0,81	1,18	1,26	1,07	1,45	1,87	1,66	2,08
60 à 79 ans	4,02	3,69	4,38	1,26	1,05	1,47	1,58	1,47	1,70	2,22	2,09	2,34
6 à 79 ans	3,09	2,84	3,36	0,67	0,55	0,79	0,88	0,79	0,96	1,35	1,23	1,48
Hommes												
6 à 11 ans	0,83	0,75	0,92	L	0,44	0,29	0,59	0,66	0,59	0,73
12 à 19 ans	1,46	1,19	1,79	0,46	0,35	0,56	0,56	0,37	0,75	0,87	0,67	1,08
20 à 39 ans	2,96	2,38	3,68	0,52 ^E	0,27	0,77	0,77	0,54	1,01	1,18	0,99	1,36
40 à 59 ans	3,59	2,95	4,37	0,90	0,68	1,12	1,05	0,84	1,25	1,59	1,34	1,84
60 à 79 ans	3,65	3,13	4,25	0,98	0,63	1,32	1,41	1,24	1,58	2,02	1,89	2,15
6 à 79 ans	2,77	2,46	3,13	0,56	0,46	0,67	0,78	0,68	0,89	1,21	1,09	1,33
Femmes												
6 à 11 ans	0,89	0,79	1,01	L	0,46	0,32	0,60	0,73	0,66	0,81
12 à 19 ans	1,60	1,33	1,93	0,46 ^E	0,23	0,69	0,76	0,63	0,88	0,96	0,83	1,10
20 à 39 ans	3,24	2,87	3,67	0,81	0,69	0,94	0,99	0,85	1,14	1,50	1,28	1,73
40 à 59 ans	5,18	4,56	5,88	1,26	0,93	1,58	1,68	1,43	1,93	2,44	2,13	2,76
60 à 79 ans	4,39	3,88	4,98	1,40	1,16	1,64	1,72	1,51	1,93	2,49	2,21	2,78
6 à 79 ans	3,44	3,18	3,74	0,78	0,67	0,90	0,98	0,88	1,09	1,60	1,45	1,76

	Concentration de cadmium dans le sang total											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
	nanomoles par litre											
Les deux sexes												
6 à 11 ans	0,90	0,81	0,99	1,20	1,08	1,33	1,69	1,44	1,94	2,04	1,72	2,36
12 à 19 ans	1,30	1,15	1,45	1,91	1,70	2,13	F	F
20 à 39 ans	2,18	1,94	2,41	6,03 ^E	3,82	8,25	23,36	18,69	28,03	30,54	27,63	33,45
40 à 59 ans	3,26	2,85	3,68	8,86	6,30	11,41	28,09	20,83	35,34	37,45	32,98	41,91
60 à 79 ans	3,50	3,35	3,65	6,34	5,32	7,37	15,41	10,72	20,11	24,54	20,14	28,95
6 à 79 ans	2,46	2,25	2,66	5,60	4,91	6,29	21,52	17,88	25,16	32,28	27,93	36,64
Hommes												
6 à 11 ans	0,86	0,77	0,96	1,20	1,04	1,35	1,67	1,41	1,94	1,89	1,38	2,40
12 à 19 ans	1,21	1,04	1,38	1,84	1,58	2,11	F	F
20 à 39 ans	1,87	1,43	2,31	6,81 ^E	3,48	10,13	25,45	18,69	32,21	32,26	28,16	36,35
40 à 59 ans	2,48	2,16	2,80	7,61 ^E	2,95	12,26	25,14 ^E	15,49	34,79	34,46	25,23	43,68
60 à 79 ans	3,13	2,77	3,50	5,91	3,88	7,95	14,98 ^E	8,55	21,40	24,25	16,50	31,99
6 à 79 ans	2,04	1,82	2,26	5,20	3,92	6,47	20,92	16,90	24,95	30,97	25,71	36,24
Femmes												
6 à 11 ans	0,94	0,86	1,02	1,21	1,09	1,32	1,69	1,33	2,04	2,06	1,73	2,39
12 à 19 ans	1,38	1,18	1,59	2,07	1,78	2,36	4,95 ^E	1,82	8,08	F
20 à 39 ans	2,43	2,02	2,85	5,64	4,03	7,25	22,13	17,17	27,10	28,84	24,36	33,32
40 à 59 ans	3,88	3,30	4,47	9,97 ^E	5,86	14,08	32,94	25,44	40,44	39,39	34,83	43,96
60 à 79 ans	3,81	3,33	4,30	6,79	5,75	7,83	15,74 ^E	8,62	22,87	24,42	16,90	31,94
6 à 79 ans	2,94	2,61	3,26	5,82	5,05	6,59	22,43	18,31	26,54	33,17	27,66	38,67

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)

^F trop peu fiable pour être publié (données avec un coefficient de variation (CV) de plus de 33,3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage)

L sous la limite de détection

Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent.

Pour plus de renseignements concernant les critères d'exclusion et la limite de détection de cadmium dans le sang total, veuillez consulter le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*.

Ce tableau a été produit en utilisant le progiciel SUDAAN.

Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Tableau 65
Distribution de la population à domicile selon la concentration de cadmium dans le sang total en microgrammes par litre, selon l'âge et le sexe, Canada, 2007 à 2009

	Concentration de cadmium dans le sang total											
	Moyenne géométrique			5 ^e percentile			10 ^e percentile			25 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
microgrammes par litre												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	0,10	0,09	0,11	L	0,05	0,04	0,06	0,08	0,07	0,08
12 à 19 ans	0,17	0,14	0,21	0,05	0,04	0,06	0,07	0,05	0,09	0,11	0,09	0,12
20 à 39 ans	0,35	0,31	0,39	0,07	0,05	0,10	0,10	0,09	0,12	0,15	0,13	0,16
40 à 59 ans	0,49	0,44	0,54	0,11	0,09	0,13	0,14	0,12	0,16	0,21	0,19	0,23
60 à 79 ans	0,45	0,42	0,49	0,14	0,12	0,17	0,18	0,17	0,19	0,25	0,24	0,26
6 à 79 ans	0,35	0,32	0,38	0,08	0,06	0,09	0,10	0,09	0,11	0,15	0,14	0,17
Hommes												
6 à 11 ans	0,09	0,08	0,10	L	0,05	0,03	0,07	0,07	0,07	0,08
12 à 19 ans	0,16	0,13	0,20	0,05	0,04	0,06	0,06	0,04	0,08	0,10	0,08	0,12
20 à 39 ans	0,33	0,27	0,41	0,06 ^E	0,03	0,09	0,09	0,06	0,11	0,13	0,11	0,15
40 à 59 ans	0,40	0,33	0,49	0,10	0,08	0,13	0,12	0,09	0,14	0,18	0,15	0,21
60 à 79 ans	0,41	0,35	0,48	0,11	0,07	0,15	0,16	0,14	0,18	0,23	0,21	0,24
6 à 79 ans	0,31	0,28	0,35	0,06	0,05	0,08	0,09	0,08	0,10	0,14	0,12	0,15
Femmes												
6 à 11 ans	0,10	0,09	0,11	L	0,05	0,04	0,07	0,08	0,07	0,09
12 à 19 ans	0,18	0,15	0,22	0,05 ^E	0,03	0,08	0,08	0,07	0,10	0,11	0,09	0,12
20 à 39 ans	0,36	0,32	0,41	0,09	0,08	0,11	0,11	0,10	0,13	0,17	0,14	0,19
40 à 59 ans	0,58	0,51	0,66	0,14	0,10	0,18	0,19	0,16	0,22	0,27	0,24	0,31
60 à 79 ans	0,49	0,44	0,56	0,16	0,13	0,18	0,19	0,17	0,22	0,28	0,25	0,31
6 à 79 ans	0,39	0,36	0,42	0,09	0,08	0,10	0,11	0,10	0,12	0,18	0,16	0,20

	Concentration de cadmium dans le sang total											
	50 ^e percentile			75 ^e percentile			90 ^e percentile			95 ^e percentile		
	Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance		Estimation	Intervalle de confiance	
		de	à		de	à		de	à		de	à
microgrammes par litre												
Les deux sexes												
6 à 11 ans	0,10	0,09	0,11	0,14	0,12	0,15	0,19	0,16	0,22	0,23	0,19	0,26
12 à 19 ans	0,15	0,13	0,16	0,22	0,19	0,24	F	F
20 à 39 ans	0,24	0,22	0,27	0,68 ^E	0,43	0,93	2,63	2,10	3,15	3,43	3,11	3,76
40 à 59 ans	0,37	0,32	0,41	1,00	0,71	1,28	3,16	2,34	3,97	4,21	3,71	4,71
60 à 79 ans	0,39	0,38	0,41	0,71	0,60	0,83	1,73	1,20	2,26	2,76	2,26	3,25
6 à 79 ans	0,28	0,25	0,30	0,63	0,55	0,71	2,42	2,01	2,83	3,63	3,14	4,12
Hommes												
6 à 11 ans	0,10	0,09	0,11	0,13	0,12	0,15	0,19	0,16	0,22	0,21	0,16	0,27
12 à 19 ans	0,14	0,12	0,16	0,21	0,18	0,24	F	F
20 à 39 ans	0,21	0,16	0,26	0,77 ^E	0,39	1,14	2,86	2,10	3,62	3,63	3,17	4,09
40 à 59 ans	0,28	0,24	0,31	0,86 ^E	0,33	1,38	2,83 ^E	1,74	3,91	3,87	2,84	4,91
60 à 79 ans	0,35	0,31	0,39	0,66	0,44	0,89	1,68 ^E	0,96	2,41	2,73	1,86	3,60
6 à 79 ans	0,23	0,20	0,25	0,58	0,44	0,73	2,35	1,90	2,80	3,48	2,89	4,07
Femmes												
6 à 11 ans	0,11	0,10	0,11	0,14	0,12	0,15	0,19	0,15	0,23	0,23	0,19	0,27
12 à 19 ans	0,16	0,13	0,18	0,23	0,20	0,27	0,56 ^E	0,20	0,91	F
20 à 39 ans	0,27	0,23	0,32	0,63	0,45	0,81	2,49	1,93	3,05	3,24	2,74	3,75
40 à 59 ans	0,44	0,37	0,50	1,12 ^E	0,66	1,58	3,70	2,86	4,55	4,43	3,92	4,94
60 à 79 ans	0,43	0,37	0,48	0,76	0,65	0,88	1,77 ^E	0,97	2,57	2,75	1,90	3,59
6 à 79 ans	0,33	0,29	0,37	0,65	0,57	0,74	2,52	2,06	2,98	3,73	3,11	4,35

^E à utiliser avec prudence (données avec un coefficient de variation (CV) de 16,6 % à 33,3 %)
^F trop peu fiable pour être publié (données avec un coefficient de variation (CV) de plus de 33,3 %; supprimées en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage)
^L sous la limite de détection
Note(s) : Population à domicile âgée de 6 à 79 ans, sauf ceux à qui les critères d'exclusion s'appliquent.
 Pour plus de renseignements concernant les critères d'exclusion et la limite de détection de cadmium dans le sang total, veuillez consulter le *Guide de l'utilisateur des données de l'Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS) : cycle 1*.
 Ce tableau a été produit en utilisant le progiciel SUDAAN.
Source(s) : Enquête canadienne sur les mesures de la santé, cycle 1.

Methodologie

Notes

1. Les **moyennes géométriques** sont utilisées dans les tableaux 58 à 65 plutôt que les **moyennes arithmétiques**, qui sont utilisées dans les tableaux 1 à 57. Le calcul de la moyenne géométrique diffère de celui de la moyenne arithmétique comme suit :

- Pour calculer une moyenne arithmétique, il faut additionner toutes les observations, puis la somme est divisée par le nombre d'observations.

- Pour calculer une moyenne géométrique, il faut multiplier ensemble toutes les observations, puis extraire la racine n^{e} du produit, où n est le nombre d'observations.

Les substances mesurées aux tableaux 58 à 65 sont des contaminants environnementaux, qu'on trouve généralement en très faible quantité dans le corps humain. Les distributions comprennent donc un grand nombre de très petites valeurs et un faible nombre de valeurs plus grandes en comparaison. Étant donné le caractère asymétrique de ces distributions, la moyenne géométrique produit une estimation nettement plus près du centre réel de la distribution que ce que produirait la moyenne arithmétique, qui serait beaucoup plus influencée par le petit nombre de valeurs très élevées comprises dans la distribution.

2. Certains tableaux ont été produits à l'aide de différentes méthodes de programmation statistique. Les tableaux 1 à 57 ont été produits à l'aide de BOOTVAR, un programme conçu par Statistique Canada et intégré au progiciel statistique SAS afin d'estimer les variances dans le cas des enquêtes ayant un plan de sondage complexe, par exemple l'ECMS. Toutefois, comme les moyennes géométriques ne peuvent être calculées à l'aide de BOOTVAR, les tableaux 58 à 65 ont été produits à l'aide du progiciel SUDAAN.

Comme SUDAAN et BOOTVAR utilisent des méthodes différentes pour calculer la variance, si on utilise SUDAAN pour reproduire les tableaux produits à l'aide de BOOTVAR (ou l'inverse), les estimations de variance risquent d'être légèrement différentes.