

Du 7 février au 13 février 2016 (semaine de déclaration 06)

Sommaire global


- Une augmentation du nombre d'éclotions déclarées dans la semaine 06 a été notée. La majorité des éclotions signalées étaient attribuables à la grippe A.
- Les jeunes adultes et les adultes d'âge moyen représentent une proportion croissante des hospitalisations signalées par les provinces et territoires participants.
- Le nombre d'hospitalisations signalé par le réseau IMPACT a considérablement augmenté au cours des dernières semaines. Le nombre d'hospitalisation a atteint 76 au cours de la semaine 6.
- Le virus de la grippe A(H1N1) est le sous-type de grippe le plus commun en circulation au Canada.
- Avec le début tardif de la saison grippale, on s'attend à ce que l'activité grippale continue d'augmenter au cours des semaines à venir.
- Pour obtenir de plus amples renseignements sur la grippe, consultez notre page Web sur [la grippe](#).

Êtes-vous un praticien de soins de santé primaires (médecin généraliste, infirmière praticienne ou infirmière autorisée) qui souhaiterait devenir sentinelle pour le programme *Surveillance de l'influenza* pour la saison grippale 2015-2016? Communiquez avec nous à l'adresse FluWatch@phac-aspc.gc.ca

Activité grippale et pseudogrippale (propagation géographique)

Au cours de la semaine 06, l'activité grippale/pseudogrippale a augmenté. Trente régions du Canada ont signalé une activité grippale et pseudogrippale sporadique. Une activité localisée a été signalée dans 14 régions au Canada

Figure 1 – Carte de l'activité grippale et pseudogrippale globale par province et territoire, Canada, semaine 06




Note : Les niveaux d'activité, tels que représentés sur cette carte, sont attribués et enregistrés par les ministères de la santé provinciaux et territoriaux. Ceci est basé sur les confirmations de laboratoire, les taux de consultation de syndrome grippal des médecins sentinelles et les éclotions. Veuillez vous référer aux définitions détaillées de la dernière page. Les rapports de semaines précédentes, y compris les mises à jour rétrospectives, sont disponibles sur le site Web de [Surveillance de l'influenza](#).

Détections de la grippe et d'autres virus respiratoires


Le nombre de cas de grippe confirmés en laboratoire continue d'augmenter. Le pourcentage de détections positives pour la grippe a augmenté, passant de 20,6 % au cours de la semaine 05 à 26,2 % au cours de la semaine 06 (figure 2). Par rapport aux cinq dernières saisons, le pourcentage de tests positifs (26,2 %) signalé au cours de la semaine 06 était supérieur à la moyenne des cinq dernières années pour la semaine visée et au-dessus les limites attendues (de 12,9 % à 21,5 %). Avec le début tardif de la saison grippale de 2015-2016, ces niveaux au-dessus de la normale ne sont pas inattendus mais plutôt typique des niveaux maximum de la saison.

Figure 2 – Nombre et pourcentage de tests de détection de la grippe positifs, par type, sous-type et semaine de surveillance, Canada, 2015-16



Au cours de la semaine 06, 1 862 détections de cas de grippe en laboratoire ont été signalées. Le sous-type de virus de la grippe A(H1N1) était prédominant. Jusqu'à présent, 82 % des cas de grippe détectés ont été des cas de grippe A, et le sous-type le plus courant était celui de la grippe A(H1N1) [82%,(2819/3448)].

Figure 3 – Nombre cumulé d'échantillons positifs pour la grippe, par type/sous-type et province, Canada, 2015-16



Les échantillons des T.N.-O., du Yn et du Nt sont envoyés à des laboratoires de référence dans d'autres provinces. Les données cumulatives comprennent les mises à jour des semaines précédentes.

À ce jour cette saison, des renseignements détaillés sur l'âge et le type/sous-type ont été signalés pour 5 580 cas. Les adultes âgés de 20-44 ans représentaient la proportion la plus importante des cas de grippe signalés. Les adultes âgés 20-44 ans et 45-64 ans représentaient 58 % des cas signalés de grippe A(H1N1). Les enfants âgés de 5-19 ans et les adultes âgés de 20-44 ans représentaient 61% des cas signalés de la grippe B.

Tableau 1 – Nombre hebdomadaire et cumulatif d'échantillons positifs pour la grippe, par type, sous-type et groupe d'âge, en fonction des rapports détaillés des cas confirmés en laboratoire¹, Canada, 2015-16

Groupes d'âge (ans)	Hebdomadaire (7 fév 2016 au 13 fév 2016)					Cumulatif (30 août 2015 au 13 février 2016)						
	Influenza A				B	Influenza A				B	Influenza A et B	
	A Total	A(H1) pdm09	A(H3)	A (non sous-typé) ³	Total	A Total	A(H1) pdm09	A(H3)	A (non sous-typé) ³	Total	#	%
<5	215	96	1	118	31	747	463	39	245	112	859	15.4%
5-19	137	63	1	73	62	528	324	58	146	307	835	15.0%
20-44	365	175	5	185	50	1304	834	91	379	298	1602	28.7%
45-64	320	147	12	161	28	1172	677	131	364	139	1311	23.5%
65+	198	76	15	107	20	802	302	237	263	141	943	16.9%
Inconnu	10	5	2	3	0	28	17	8	3	2	30	0.5%
Total	1,245	562	36	647	191	4581	2617	564	1400	999	5580	100.0%
% ²	86.7%	45.1%	2.9%	52.0%	13.3%	82.1%	57.1%	12.3%	30.6%	17.9%		

1 Le tableau 1 comprend les échantillons pour lesquels des informations démographiques ont été fournies. Il représente une partie de tous les cas positifs de grippe signalés.

2 Les pourcentages de tests positifs pour les sous-types de la grippe A sont un pourcentage de toutes les détections de la grippe A.


3 Non sous-typé: L'échantillon a été typé en tant que grippe A, mais aucun résultat n'était disponible pour ce qui est du sous-type.

Pour plus de détails, veuillez consulter le [Rapport hebdomadaire de détection des virus respiratoires au Canada](#).

Taux de consultation pour le syndrome grippal

Au cours de la semaine 06, le taux de consultations nationales pour le syndrome grippal était de 50,9 consultations par 1 000 visites comparé à 75,4 consultations par 1 000 visites lors de la semaine 05. Au cours de la semaine 06, les taux de consultation les plus élevés pour le syndrome grippal ont été observés chez les personnes âgées de 0 à 4 ans (86,1 pour 1 000) et le taux le plus faible a été observé chez le groupe d'âge des personnes âgées de 65 ans ou plus (11,6 per 1,000) (figure 4).

Figure 4 – Taux de consultation pour le syndrome grippal (SG), par groupe d'âge et par semaine de déclaration, Canada, 2015-16




Certains délais quant à la soumission des rapports peuvent affecter les données de façon rétrospective. En C.-B., en Alb. et en Sask., les données sont compilées par un programme de surveillance sentinelle provincial pour ensuite être signalé au programme Surveillance de l'influenza. Pas tous les médecins sentinelles soumettent des rapports chaque semaine.

Surveillance des éclosions de la grippe

Au cours de la semaine 06, 21 nouvelles éclosions de grippe confirmées en laboratoire ont été signalées: dix dans des établissements de soins de longue durée, huit en milieu hospitalier et trois dans un autre établissement ou milieu communautaire (figure 5). Parmi les éclosions présentant des souches ou sous-types connus, sept éclosions étaient dues à la grippe A (dont deux étaient dues à la grippe A(H3N2), une était due à la grippe A(H1N1) et quatre étaient dues à la grippe de type A (non sous-typé)), une éclosion était due à la grippe B et une éclosion était due aux gripes A et B.

À date cette saison, 102 éclosions ont été signalées. À titre de comparaison, au cours de la semaine 06 de la saison 2014-2015 1 177 éclosions ont été signalées et au cours de la saison 2013-2014 101 éclosions ont été signalées.

Figure 5 – Nombre total de nouvelles éclosions de la grippe confirmée en laboratoire par semaine, Canada, 2015-16



¹L'ensemble des provinces et territoires, à l'exception du Nt, déclarent les éclosions de la grippe dans les établissements de soins de longue durée. L'ensemble des provinces et territoires, à l'exception du Nt et du Qc, signalent les éclosions dans les hôpitaux. Les éclosions de la grippe ou du syndrome grippal dans d'autres établissements sont déclarées au programme Surveillance de l'influenza, mais les déclarations varient selon la région. La définition d'une éclosion est donnée à la fin du rapport.

Surveillance de la grippe chez les enfants dans les hôpitaux sentinelles

Hospitalisations et décès associés à la grippe chez les enfants


Au cours de la semaine 06, 76 hospitalisations ont été signalées par le réseau du Programme canadien de surveillance active de l'immunisation (IMPACT) (figure 6). Vingt hospitalisations étaient dues à la grippe A(H1N1) et le reste était dues à la grippe de type A (non sous-typé). La proportion la plus importante des cas (29 %) ont été signalés chez les enfants âgés 2-4 ans.

Jusqu'à présent cette saison, 259 hospitalisations pédiatriques (enfants âgés de 16 ans ou moins) associées à la grippe confirmée en laboratoire ont été signalées par le réseau de l'IMPACT : 205 hospitalisations étaient attribuables à la grippe A et 54 cas étaient attribuables à la grippe B. La proportion la plus importante des cas (33 %) ont été signalés chez les enfants âgés 2-4 ans. Jusqu'à présent, 36 cas ont été admis en unité de soins intensifs. La proportion la plus importante des admissions en unité de soins intensifs ont été signalées chez des enfants âgés de 5 à 9 ans (30%). Parmi les admissions en unité de soins intensifs pour lesquels le sous-type de grippe A était connu, 86% étaient attribuables au virus A(H1N1). Parmi les admissions à l'unité de soins intensifs, 19 cas (70 %) présentaient au moins une comorbidité. Moins de cinq décès ont été déclarés.

Tableau 2– Nombre cumulatif d'hospitalisations pédiatriques associées à la grippe signalées par le réseau IMPACT, Canada, 2015-16

Groupes d'âge (ans)	Cumulatif (30 août 2015 au 13 février 2016)					
	Influenza A				Influenza B	Influenza A et B (#(%))
	A Total	A(H1) pdm09	A(H3)	A (non sous-typé)	B Total	
0-5m	26	10	3	13	6	32 (12%)
6-23m	51	28	3	20	8	59 (23%)
2-4a	70	31	4	35	15	85 (33%)
5-9a	41	18	0	23	18	59 (23%)
10-16a	41	18	0	23	18	24 (9%)
Total	205	97	11	97	54	259 (100%)

Figure 6 – Nombre de cas de grippe déclarés par les réseaux d'hôpitaux sentinelles, par semaine, Canada, 2015-16, hospitalisations pédiatriques et adultes (≤16 ans, IMPACT; ≥16 ans, CIRN-SOS)



*Deux cas IMPACT non inclus dans la le tableau 2 et la figure 6 étaient attribuables à des co-infections par le virus de la grippe A et B.

Hospitalisations et décès associés à la grippe chez les adultes


Au cours de la semaine 06, 33 hospitalisations ont été signalées par le réseau du Programme canadien de surveillance active de l'immunisation (CIRN-SOS) (figure 6). La proportion la plus élevée des hospitalisations au cours de la semaine 06 a été observée chez les adultes de 65 ans et plus (42 %), suivis des adultes âgés de 45 à 64 ans. La majorité des étaient attribuables à la grippe A (81%).

À date cette saison, 128 hospitalisations associées à la grippe confirmée en laboratoire chez les adultes (âgés de 16 ans ou plus) ont été signalées par le réseau CIRN-SOS. La majorité des hospitalisations s'est produite chez des adultes âgés de 65 ans ou plus (54%). Le virus de la grippe A représentait 80 % des hospitalisations. Dix admissions en unité de soins intensifs (USI) ont été signalées; parmi celles-ci, neuf (90%) étaient dues à la grippe de type A. Moins de cinq décès ont été signalés cette saison.

Tableau 3 – Nombre cumulatif d’hospitalisations d’adultes (≥16 ans) associées à la grippe signalées par le réseau CIRN-SOS, Canada, 2015-16

Groupes d'âge (ans)	Cumulatif (1 nov. 2015 au 13 fév. 2016)					
	Influenza A				B	Influenza A et B
	A Total	A(H1) pdm09	A(H3)	A(non sous-typé)	Total	# (%)
16-20	1	1	0	0	0	1 (1%)
20-44	16	6	0	10	12	28 (17%)
45-64	45	12	2	31	6	51 (31%)
65+	71	12	14	45	14	85 (51%)
Total	134	31	16	87	32	166
%	81%	23%	12%	65%	19%	100%

Figure 7 – Pourcentage d’hospitalisations, d’admissions en unité de soins intensifs et de décès associés à la grippe, par groupe d’âge (≥16 ans), Canada, 2015-16




Remarque : Le nombre d'hospitalisations signalées par CIRN-SOS et IMPACT représente un sous-groupe de toutes les hospitalisations associées à la grippe chez les adultes et les enfants au Canada. Certains délais quant à la soumission des rapports peuvent affecter les données de façon rétrospective.

Hospitalisations et décès associés à la grippe déclarés par les provinces et territoires

Au cours de la semaine 06, 125 hospitalisations ont été signalées dans les provinces et les territoires participants*. La majorité des hospitalisations étaient dues à la grippe de type A (86%). Les groupes d'âge de 0 à 4 ans et de 45 à 64 ans représentaient la plus grande proportion de cas signalés au cours de la semaine 06, chacun représentant 26 % des cas hospitalisés. La proportion élevée d'hospitalisations signalées dans ces groupes d'âge au cours de la semaine 06 a également été signalée dans les réseaux d'hôpitaux sentinelles.

Depuis le début de la saison 2015-2016, 867 hospitalisations associées à la grippe confirmée en laboratoire ont été signalées. Un total de 767 (89%) étaient attribuables à la grippe A et 100 cas (11%) étaient attribuable à la grippe B. Parmi les cas pour lesquels le sous-type de grippe A était connu, 86% (433/502) étaient attribuables au virus A(H1N1). La proportion la plus importante (30%) des patients hospitalisés étaient âgés d'au moins 65 ans. Quarante-neuf admissions en unité de soins intensifs ont été signalées et 45% concernaient des personnes de 45 à 64 ans. Parmi les admissions en unité de soins intensifs pour lesquels le sous-type de grippe A était connu, 92% étaient attribuables au virus A(H1N1). Un total de 22 décès ont été signalés, tous dus à la grippe de type A. La majorité des décès étaient âgés 65 ans ou plus (46%).

Figure 8 – Pourcentage d'hospitalisations, d'admissions en unité de soins intensifs et de décès associés à la grippe, par groupe d'âge, Canada, 2015-1



* Remarque : La C.-B., le Qc, et le Nt ne signalent pas les hospitalisations attribuables à l'influenza à l'Agence de la santé publique du Canada. Seules les hospitalisations nécessitant des soins médicaux intensifs sont signalées par la Sask. Les admissions aux unités de soins intensifs ne sont pas distinguées parmi les hospitalisations signalées en Ont.. Parmi ces données, on peut retrouver des cas rapportés par les réseaux IMPACT et CIRN-SOS. Le nombre de nouvelles hospitalisations et de décès liés à la grippe signalés pour la semaine en cours peut comprendre des cas de l'Ont. qui sont survenus au cours des semaines précédentes, en raison des mises à jour rétrospectives du total cumulatif. Il est important de noter qu'il n'est pas nécessaire que l'hospitalisation ou le décès soit imputable à la grippe; une épreuve de laboratoire positive est suffisante pour la production de rapports.

Il est possible d'obtenir des données supplémentaires sur les [hospitalisations et décès imputables à la grippe déclarés au Canada de 2011-2012 à 2015-2016](#) sur le site de l'Agence de la santé publique du Canada.

Caractérisation des souches grippales

Pendant la saison grippale 2015-16, le Laboratoire national de microbiologie (LNM) a caractérisé les antigènes de 411 virus de la grippe [118 virus A(H3N2), 206 A(H1N1) et 87 virus de la grippe B].

Grippe A(H3N2): Par suite du test d'inhibition de l'hémagglutination (IH), on a caractérisé antigéniquement 23 H3N2 comme semblable au virus A/Switzerland/9715293/2013 à l'aide de l'antisérum contre la souche virale A/Switzerland/9715293/2013 propagée en culture cellulaire.

L'analyse séquentielle de 95 virus H3N2 a démontré que les 95 virus appartenaient à un groupe génétique dont la plupart des virus présentaient des antigènes apparentés au virus A/Switzerland/9715293/2013.

Le virus A/Switzerland/9715293/2013 est le composant A(H3N2) du vaccin destiné à l'hémisphère Nord.

Grippe A(H1N1): 206 virus de la grippe A(H1N1) était antigéniquement semblables à la souche A/California/7/2009, le composant A(H1N1) du vaccin destiné à l'hémisphère Nord

Grippe B: 36 virus grippaux B caractérisés étaient antigéniquement semblables à B/Phuket/3073/2013, le composant B du vaccin trivalent destiné à l'hémisphère Nord. 51 virus de la grippe B ont été caractérisés comme étant semblable au virus B/Brisbane/60/2008, soit l'une des composantes de la grippe B du vaccin quadrivalent de la grippe de l'hémisphère Nord 2015-2016

Les composants recommandés pour le vaccin trivalent contre la grippe pour la saison 2015-2016 dans l'hémisphère Nord sont les suivants : un virus analogue au virus A/California/7/2009(H1N1)pdm09, un virus analogue au virus A/Switzerland/9715293/2013(H3N2), et un virus de type B analogue à B/Phuket/3073/2013 (lignée Yamagata). Pour les vaccins quadrivalent, l'ajout d'un virus analogue au virus B/Brisbane/60/2008 est recommandé.

Le LNM reçoit une partie des échantillons positifs pour la grippe envoyés par les laboratoires provinciaux afin de caractériser les souches et de tester la résistance aux antiviraux. Les données de caractérisation reflètent les résultats des tests d'inhibition de l'hémagglutination comparés aux souches grippales de référence recommandées par l'[Organisation mondiale de la Santé](#).

Résistance aux antiviraux

Pendant la saison grippale 2015-2016, le LNM a soumis 384 virus grippaux à des tests de résistance à l'oseltamivir, et 383 virus au zanamivir. Les virus étaient tous sensibles à l'oseltamivir. À l'exception d'un virus, tous les virus étaient sensibles au zanamivir. Au total, 304 virus de la grippe A (99,7 % des cas soumis au test) étaient résistants à l'amantadine (tableau 4).

Tableau 4 – Résistance aux antiviraux selon le type et le sous-type du virus de la grippe, Canada, 2015-16

Type et sous-type de virus	Oseltamivir		Zanamivir		Amantadine	
	N ^{bre} testé	N ^{bre} résistant (%)	N ^{bre} testé	N ^{bre} résistant (%)	N ^{bre} testé	N ^{bre} résistant (%)
A (H3N2)	110	0	110	0	118	117 (99.2%)
A (H1N1)	196	1	195	0	187	187 (100%)
B	78	0	78	0	S/O ¹	S/O ¹
TOTAL	384	1	383	0	305	304

¹S/O – sans objet

Rapports internationaux sur la grippe

[Mise à jour de l'influenza par l'Organisation mondiale de la Santé \(en anglais seulement\)](#)

[FluNet de l'Organisation mondiale de la Santé \(en anglais seulement\)](#)

[OMS – Rapport sur l'influenza à l'interface homme-animal \(en anglais seulement\)](#)

[Rapport sur l'influenza saisonnière des CDC \(en anglais seulement\)](#)

[Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies – données épidémiologiques \(en anglais seulement\)](#)

[Rapport de surveillance de l'influenza de l'Afrique du Sud \(en anglais seulement\)](#)

[Surveillance de la santé publique de la Nouvelle-Zélande \(en anglais seulement\)](#)

[Rapport de l'influenza de l'Australie \(en anglais seulement\)](#)

[Rapport de situation de l'Organisation panaméricaine de la santé \(en anglais et en espagnol\)](#)

Les définitions du programme Surveillance pour la saison 2015-2016

Abréviations : Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.), Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.É.), Nouveau-Brunswick (N.-B.), Nouvelle-Écosse (N.-É.), Québec (Qc), Ontario (Ont.), Manitoba (Man.), Saskatchewan (Sask.), Alberta (Alb.), Colombie-Britannique (C.-B.), Yukon (Yn), Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.), Nunavut (Nt).

Définitions du syndrome grippal (SG) : Apparition soudaine d'une maladie respiratoire avec fièvre et toux accompagnée d'un ou de plusieurs des symptômes suivants - mal de gorge, arthralgie, myalgie ou prostration - qui pourrait être attribuable à l'influenza. Chez les enfants de moins de 5 ans, des symptômes gastro-intestinaux peuvent également se manifester. Chez les patients de moins de 5 ans ou de 65 ans et plus, il est possible que la fièvre ne soit pas très importante.

Définition d'une éclosion de la grippe/SG

Écoles : un taux d'absentéisme de plus de 10 % (ou un taux d'absentéisme étant plus élevé (p.ex. >5-10 %) que les niveaux de base attendus tels que déterminés par les autorités scolaires ou de santé publique), et ce, apparemment attribuable au SG. Veuillez noter qu'il est recommandé que les éclosions de SG dans les écoles soient confirmées en laboratoire au début de la saison de l'influenza puisqu'il peut s'agir du premier indicateur de transmission dans une communauté d'une région donnée.

Hôpitaux et établissements résidentiels : deux cas ou plus de SG sur une période de sept jours comprenant au moins un cas confirmé en laboratoire. Les établissements résidentiels incluent, mais ne sont pas limités aux établissements de soins de longue durée et prisons.

Les lieux de travail : un taux d'absentéisme de plus de 10 % apparemment attribuable au SG.

Autres emplacements : deux cas ou plus de SG sur une période de sept jours comprenant au moins un cas confirmé en laboratoire; c.-à-d., communautés fermées.

Veuillez prendre en note que la déclaration des éclosions d'influenza / SG à partir de différents types d'établissements varient selon la région.

Définition des niveaux d'activité grippale:

- 1 = Aucune activité signalée** : aucune détection de l'influenza confirmée en laboratoire au cours de la semaine de déclaration; cependant, il peut y avoir des signalements sporadiques de SG
- 2 = Sporadique** : signalements sporadiques de SG et détection(s) d'influenza confirmée(s) en laboratoire avec **aucune éclosion de SG/influenza** détectée à l'intérieur de la région de surveillance†
- 3 = Localisée** : (1) évidence d'augmentation de SG* et
(2) détection(s) d'influenza confirmée(s) en laboratoire avec
(3) **présence d'éclosions** dans des écoles, hôpitaux, établissements résidentiels ou d'autres types d'institutions survenant dans **moins de 50 % de la région de surveillance**†
- 4 = Étendue** : (1) évidence d'augmentation de SG* et
(2) détection(s) d'influenza confirmée(s) en laboratoire avec
(3) **présence d'éclosions** dans des écoles, hôpitaux, établissements résidentiels et/ou d'autres types d'institutions survenant **dans 50 % ou plus de la région de surveillance**†

À noter : Les données de SG peuvent être rapportées à partir des médecins sentinelles, des visites en salle d'urgence ou de la ligne téléphonique info-santé.

*Signifiant des signalements plus que sporadiques tels que déterminé par l'épidémiologiste de la province ou du territoire.

† Sous-régions à l'intérieur de la province ou du territoire telles que définies par l'épidémiologiste de la province ou du territoire.

Nous voudrions remercier tous les partenaires participant au programme Surveillance de l'influenza cette année.
Ce rapport est disponible sur le site Web de l'Agence de la santé publique du Canada à l'adresse <http://www.phac-aspc.gc.ca/fluwatch/index-fra.php>. This report is available in both official languages.