

6.3



Catalogue 82-218


Cancer in Canada

1990

Catalogue 82-218

Le cancer au Canada

1990



Statistics
Canada

Statistique
Canada

Canada

Data in Many Forms...

Statistics Canada disseminates data in a variety of forms. In addition to publications, both standard and special tabulations are offered. Data are available on CD, diskette, computer printouts, microfiche and microfilm, and magnetic tape. Maps and other geographic reference materials are available for some types of data. Direct online access to aggregated information is possible through CANSIM, Statistics Canada's machine-readable database and retrieval system.

How to Obtain More Information

Inquiries about this table and related statistics or services should be directed to:

Information Requests Section
Health Statistics Division

Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6 (Telephone: 951-1746) or to the Statistics Canada reference centre in:

| | | | |
|----------|------------------|-----------|------------------|
| Halifax | (1-902-426-5331) | Regina | (1-306-780-5405) |
| Montreal | (1-514-283-5725) | Edmonton | (1-403-495-3027) |
| Ottawa | (1-613-951-8116) | Calgary | (1-403-292-6717) |
| Toronto | (1-416-973-6586) | Vancouver | (1-604-666-3691) |
| Winnipeg | (1-204-983-4020) | | |

Toll-free access is provided in all provinces and territories, for users who reside outside the local dialing area of any of the regional reference centres.

| | |
|--|----------------|
| Newfoundland, Labrador, Nova Scotia, New Brunswick and Prince Edward Island | 1-800-565-7192 |
| Quebec | 1-800-361-2831 |
| Ontario | 1-800-263-1136 |
| Saskatchewan | 1-800-667-7164 |
| Manitoba | 1-800-661-7828 |
| Southern Alberta | 1-800-882-5616 |
| Alberta and Northwest Territories | 1-800-563-7828 |
| British Columbia and Yukon | 1-800-663-1551 |

| | |
|---|----------------|
| Telecommunications Device for the Hearing Impaired | 1-800-363-7629 |
| Toll-Free Order Only Line (Canada and United States) | 1-800-267-6677 |

How to Order Publications

This and other Statistics Canada publications may be purchased from local authorized agents and other community bookstores, through the local Statistics Canada offices, or by mail order to Marketing Division, Sales and Service, Statistics Canada, Ottawa, K1A 0T6.

Telephone: 1-613-951-7277
Facsimile Number: 1-613-951-1584
Toronto Credit Card Only: 1-416-973-8018

Standards of Service to the Public

To maintain quality service to the public, Statistics Canada follows established standards covering statistical products and services, delivery of statistical information, cost-recovered services and services to respondents. To obtain a copy of these service standards, please contact your nearest Statistics Canada Regional Reference Centre.

Des données sous plusieurs formes...

Statistique Canada diffuse les données sous formes diverses. Outre les publications, des totalisations habituelles et spéciales sont offertes. Les données sont disponibles sur disque compact, disquette, imprimé d'ordinateur, microfiche et microfilm et bande magnétique. Des cartes et d'autres documents de référence géographiques sont disponibles pour certaines sortes de données. L'accès direct à des données agrégées est possible par le truchement de CANSIM, la base de données ordinolingué et le système d'extraction de Statistique Canada.

Comment obtenir d'autres renseignements

Toute demande de renseignements au sujet de ce tableau ou de statistiques et services connexes doit être adressée à la:

Section des demandes d'information
Division des statistiques sur la santé

Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6 (téléphone: 951-1746) ou au centre de consultation de Statistique Canada à:

| | | | |
|----------|------------------|-----------|------------------|
| Halifax | (1-902-426-5331) | Regina | (1-306-780-5405) |
| Montréal | (1-514-283-5725) | Edmonton | (1-403-495-3027) |
| Ottawa | (1-613-951-8116) | Calgary | (1-403-292-6717) |
| Toronto | (1-416-973-6586) | Vancouver | (1-604-666-3691) |
| Winnipeg | (1-204-983-4020) | | |

Un service d'appel interurbain sans frais est offert, dans toutes les provinces et dans les territoires, aux utilisateurs qui habitent à l'extérieur des zones de communication locale des centres régionaux de consultation.

| | |
|---|----------------|
| Terre-Neuve et Labrador, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et île-du-Prince-Édouard | 1-800-565-7192 |
| Québec | 1-800-361-2831 |
| Ontario | 1-800-263-1136 |
| Saskatchewan | 1-800-667-7164 |
| Manitoba | 1-800-661-7828 |
| Sud de l'Alberta | 1-800-882-5616 |
| Alberta et Territoires du Nord-Ouest | 1-800-563-7828 |
| Colombie-Britannique et Yukon | 1-800-663-1551 |

| | |
|--|----------------|
| Appareils de télécommunications pour les malentendants | 1-800-363-7629 |
| Numéro sans frais pour commander seulement (Canada et États-Unis) | 1-800-267-6677 |

Comment commander les publications

On peut se procurer cette publication et les autres publications de Statistique Canada auprès des agents autorisés et des autres librairies locales, par l'entremise des bureaux locaux de Statistique Canada, ou en écrivant à la Division du marketing, Ventes et Service, Statistique Canada, Ottawa, K1A 0T6.

Téléphone: 1-613-951-7277
Télécopieur: 1-613-951-1584
Toronto, Carte de crédit seulement: 1-416-973-8018

Normes de service au public

Afin de maintenir la qualité du service au public, Statistique Canada observe des normes établies en matière de produits et de services statistiques, de diffusion d'information statistique, de services à recouvrement des coûts et de services aux répondants. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec le Centre de consultation régional de Statistique Canada le plus près de chez vous.



Statistics Canada
Health Statistics Division

Cancer in Canada

1990

Statistique Canada
Division des statistiques sur la santé

Le cancer au Canada

1990

Published by authority of the Minister
responsible for Statistics Canada

© Minister of Industry,
Science and Technology, 1994

All rights reserved. No part of this publication
may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, electronic,
mechanical, photocopying, recording or otherwise
without prior written permission from Licence
Services, Marketing Division, Statistics Canada,
Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

November 1994

Price: Canada: \$25.00
United States: US\$30.00
Other Countries: US\$35.00

Catalogue No. 82-218

ISSN 1195-406X

Ottawa

Cover Photo:
Allen Lee Page/Masterfile

Note of Appreciation

Canada owes the success of its statistical system to a long-standing cooperation involving Statistics Canada, the citizens of Canada, its businesses, governments and other institutions. Accurate and timely statistical information could not be produced without their continued cooperation and goodwill.

Publication autorisée par le ministre
responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, des Sciences
et de la Technologie, 1994

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la présente publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, photographique, ou autre, ou de l'emmager dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable des Services de concession des droits de licence, Division du marketing, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Novembre 1994

Prix : Canada : 25 \$
États-Unis : 30 \$ US
Autres pays : 35 \$ US

N° 82-218 au catalogue

ISSN 1195-406X

Ottawa

Photo de la couverture:
Allen Lee Page/Masterfile

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises, les administrations canadiennes et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- figures not available or not applicable or zero.
- amount too small to be expressed.
- P preliminary figures.
- R revised figures.
- X confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

ABBREVIATIONS

N.S. not stated

These tables and explanatory text were prepared under the direction of:

- **Janet Hagey**, Director,
Health Statistics Division
- **Jane Gentleman**, Chief,
Health Status Section
- **Leslie Gaudette**, Senior Analyst
Health Status Section
- **Judy Lee**, Research Analyst
Health Status Section

ACKNOWLEDGEMENT

The cooperation of provincial and territorial cancer registries and vital statistics registrars who supply the data to Statistics Canada is gratefully acknowledged.

The paper used in this publication meets the minimum requirements of American National Standard for Information Sciences - Permanence of Paper for Printed Library Materials, ANSI Z39.48 - 1984. ☐

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- nombres indisponibles ou n'ayant pas lieu de figurer ou zéro.
- nombres infimes.
- P nombres provisoires.
- R nombres rectifiés.
- X confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

ABRÉVIATIONS

N.P. non précisé(e)

Ces tableaux et le texte explicatif ont été rédigés sous la direction de:

- **Janet Hagey**, directrice,
Division des statistiques sur la santé
- **Jane Gentleman**, chef,
Section de l'état de santé
- **Leslie Gaudette**, analyste principale
Section de l'état de santé
- **Judy Lee**, analyste de recherche
Section de l'état de santé

REMERCIEMENTS

Nous désirons rendre hommage aux registres des tumeurs et aux bureaux de la statistique de l'état civil des provinces et des territoires qui ont bien voulu fournir les données à Statistique Canada.

Le papier utilisé dans la présente publication répond aux exigences minimales de l'"American National Standard for Information Sciences" - "Permanence of Paper for Printed Library Materials". ANSI Z39.48 - 1984. ☐

TABLE OF CONTENTS

| | Page | | Page |
|---|-------------|---|-------------|
| Introduction | v | Introduction | v |
| Methodology and Data Quality Report | | | |
| New Primary Sites of Cancer | ix | Nouveaux sièges primaires de cancer | ix |
| History | ix | Historique | ix |
| Data Sources | ix | Provenance des données | ix |
| Data Collection and Processing | x | Collecte et traitement des données | x |
| Coverage and Comparability | xi | Champs d'observation et comparabilité | xi |
| Cancer Mortality | xiv | Décès causés par le cancer | xiv |
| History and Sources of Data | xiv | Historique et provenance des données | xiv |
| Data Processing | xiv | Traitement des données | xiv |
| Glossary and Explanatory Notes | | | |
| References | xx | Références | xx |
| Table | | | |
| New Primary Sites of Cancer | | | |
| 1. New Primary Sites of Cancer by Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 | 2 | 1. Nouveaux sièges primaires de cancer selon le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 | 2 |
| 2. New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 | 4 | 2. Nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 | 4 |
| 3. Age-standardized, Crude, and Age-specific Rates of New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 | 28 | 3. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 | 28 |
| 4. New Primary Sites of Carcinoma in Situ by ICD-9 Diagnosis and Sex, Canada and Provinces, 1990 | 56 | 4. Nouveaux sièges primaires de carcinome in situ selon le diagnostic de la CIM-9 et le sexe, Canada et provinces, 1990 | 56 |
| 5. New Primary Sites of "Other Skin Cancer" (ICD-9 173) by Sex and Age group, Canada and Provinces, 1990 | 60 | 5. Nouveaux sièges primaires des "autres cancers de la peau" (CIM-9 173) selon le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 | 60 |
| 6. New Primary Sites of Carcinoma in Situ of Cervix Uteri and Cancer of Cervix Uteri by ICD-9 Diagnosis, Canada and Provinces, 1990 | 62 | 6. Nouveaux sièges primaires de carcinome in situ du col de l'utérus et cancer du col de l'utérus selon le diagnostic de la CIM-9, Canada et provinces, 1990 | 62 |
| 7. New Primary Sites of Carcinoma in Situ of Cervix Uteri and Cancer of Cervix Uteri by ICD-9 Diagnosis and Age Group, Canada, 1990 | 62 | 7. Nouveaux sièges primaires de carcinome in situ du col de l'utérus et cancer du col de l'utérus selon le diagnostic de la CIM-9 et le groupe d'âge, Canada, 1990 | 62 |

TABLE DES MATIÈRES

TABLE OF CONTENTS - Concluded

| Table | Page | Page |
|--|------|--|
| New Primary Sites of Cancer - Concluded | | |
| 8. New Primary Sites of Cancer by Most Confirmed Method of Diagnosis and Sex, Canada and Provinces, 1990 | 63 | 8. Nouveaux sièges primaires de cancer suivant la méthode de diagnostic la plus éprouvée et le sexe, Canada et provinces, 1990 |
| 9. New Primary Sites of Cancer by Most Confirmed Method of Diagnosis, Sex and Age Group, Canada, 1990 | 64 | 9. Nouveaux sièges primaires de cancer suivant la méthode de diagnostic la plus éprouvée, le sexe et le groupe d'âge, Canada, 1990 |
| 10. New Primary Sites of Cancer Cases Discovered by Death Certificates Only by Sex, Canada and Provinces, 1990 | 65 | 10. Nouveaux sièges primaires de cancer découverts par les certificats de décès uniquement selon le sexe, Canada et provinces, 1990 |
| 11. New Primary Sites of Cancer Cases Discovered by Death Certificates Only by Sex and Age Group, Canada, 1990 | 66 | 11. Nouveaux sièges primaires de cancer découverts par les certificats de décès uniquement selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 1990 |
| 12. New Primary Sites of Cancer by Province of Notification and Province of Residence, 1990 | 67 | 12. Nouveaux sièges primaires de cancer, selon la province de déclaration et la province de résidence, 1990 |
| Cancer Mortality | | |
| 13. Number of Deaths due to Cancer by Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 | 70 | 13. Nombre de décès causés par le cancer selon le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 |
| 14. Number of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 | 72 | 14. Nombre de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 |
| 15. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of Death due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 | 96 | 15. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de décès dus au cancer, selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 |
| Historical Tables | | |
| 16. New Primary Sites of Cancer by Sex, Canada and Provinces, 1969 to 1990 | 126 | 16. Nouveaux sièges primaires de cancer selon le sexe, Canada et provinces, 1969 à 1990 |
| 17. Age-standardized Rates for New Primary Sites of Cancer by Sex, Canada and Provinces, 1969 to 1990 | 127 | 17. Taux normalisés selon l'âge, de nouveaux sièges primaires de cancer selon le sexe, Canada et provinces, 1969 à 1990 |
| Appendix | | |
| Postcensal Population Estimates, by Sex and Age Group, Canada and Provinces, July 1 st , 1990 | 128 | Estimations postcensitaires de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1 ^{er} juillet, 1990 |
| Formula: Calculation of Age-standardized Rates | 131 | Formule de calcul des taux normalisés par âge |
| TABLE DES MATIÈRES - fin | | |
| Tableau | | |
| Nouveaux sièges primaires de cancer - fin | | |
| 8. Nouveaux sièges primaires de cancer suivant la méthode de diagnostic la plus éprouvée et le sexe, Canada et provinces, 1990 | 63 | |
| 9. Nouveaux sièges primaires de cancer suivant la méthode de diagnostic la plus éprouvée, le sexe et le groupe d'âge, Canada, 1990 | 64 | |
| 10. Nouveaux sièges primaires de cancer découverts par les certificats de décès uniquement selon le sexe, Canada et provinces, 1990 | 65 | |
| 11. Nouveaux sièges primaires de cancer découverts par les certificats de décès uniquement selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 1990 | 66 | |
| 12. Nouveaux sièges primaires de cancer, selon la province de déclaration et la province de résidence, 1990 | 67 | |
| Décès causés par le cancer | | |
| 13. Nombre de décès causés par le cancer selon le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 | 70 | |
| 14. Nombre de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 | 72 | |
| 15. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de décès dus au cancer, selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 | 96 | |
| Tableaux Historiques | | |
| 16. Nouveaux sièges primaires de cancer selon le sexe, Canada et provinces, 1969 à 1990 | 126 | |
| 17. Taux normalisés selon l'âge, de nouveaux sièges primaires de cancer selon le sexe, Canada et provinces, 1969 à 1990 | 127 | |
| Appendice | | |
| Estimations postcensitaires de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1 ^{er} juillet, 1990 | 128 | |
| Formule de calcul des taux normalisés par âge | 131 | |

INTRODUCTION

This twenty-second annual report presenting cancer incidence data from the National Cancer Incidence Reporting System demonstrates the ongoing progress being made to improve cancer registration procedures in the provincial/territorial registries and at the national level, and thereby provide a more accurate picture of cancer patterns across Canada.

Cancer incidence data, the principal type of data included in this report, are based on reports from provincial and territorial cancer registries. Data on cancer deaths taken from national mortality data are also presented in formats which facilitate comparisons with the cancer incidence data. Taken together, these data describe the extent of cancer in Canada, indicate the different types of cancer that occur, and show how cancer patterns vary by province, age and sex.

Rates cannot be directly compared to those published in previous years for the main reasons outlined below. Please also see definitions and explanatory notes for more information.

First, the rates are calculated using population estimates which have been adjusted for net census undercoverage and include non-permanent residents. As this is a larger population base, *age-specific* and *crude* rates will be somewhat lower than if the previous population base were used.

Second, age-standardized rates are calculated using the 1991 Census population. The standardized rates are generally much higher than those published in previous years. This occurs because the 1991 standard population is much older than the 1971 population previously used; and the process of standardization will therefore give more weight to the older age groups which have higher rates of cancer incidence and mortality.

Age-standardized rates in previous reports were also sex-standardized. Sex-standardization has been eliminated this year to permit direct comparison between rates for males and females.

Additional information on new primary sites of cancer by ICD-9 4 digit diagnosis, on morphology by site of cancer, and on the ranking of cancer by age group is published and available by contacting the Information Requests Unit at Health Statistics Division. Special tabulations or preparation of data files for statistical analysis are also available on a cost recovery basis. Finally, a set of historical tables providing cancer incidence rates from 1969-1991 using the revised population and the 1991 standard population is in preparation to enable comparisons to be made with previous year.

Le vingt deuxième rapport annuel comprenant les données sur l'incidence du cancer, obtenues au moyen du Système national de déclaration des cas de cancer, est la preuve des efforts constants visant à améliorer les méthodes d'enregistrement des cas de cancer accomplis, d'une part, par les registres provinciaux et territoriaux et, d'autre part, à l'échelle nationale. Ainsi, il est possible de brosser un tableau plus complet de l'évolution du cancer au Canada.

Les données sur l'incidence du cancer, dont traite surtout le rapport, sont fondées sur celles des registres provinciaux et territoriaux du cancer. Viennent s'y ajouter, sous une forme qui facilite la comparaison, les données sur les décès par cancer, extraites des données nationales concernant la mortalité. Réunies, ces données montrent l'étendue du cancer au pays, les différents types et les variations selon la province, l'âge et le sexe.

Les taux ne peuvent pas être comparés directement à ceux publiés des années antérieures pour les raisons qui sont énoncées ci-dessous. Pour plus de renseignements, voir les définitions et les notes explicatives.

Premièrement, les taux sont calculés d'après des estimations démographiques qui ont été rajustées en fonction du sous-dénombrement net et qui incluent les résidents non permanents. Comme il s'agit d'une base démographique plus grande, les *taux par âge* et les *taux bruts* seront légèrement plus bas que s'ils avaient été calculés d'après l'ancienne base démographique.

Deuxièmement, les taux comparatifs sont calculés d'après la population du recensement de 1991. Les taux comparatifs sont généralement beaucoup plus élevés que ceux publiés les années précédentes parce que la population-type de 1991 est beaucoup plus âgée que celle de 1971 utilisée auparavant. Par conséquent, le processus de normalisation donnera plus de poids aux groupes plus âgés qui affichent des taux plus élevés d'incidence du cancer et de décès causés par le cancer.

Les taux comparatifs des rapports antérieurs tenaient compte non seulement de différences de structures dans la répartition par âges mais également de différences pour le sexe. Ce dernier facteur a fait l'objet d'estimations cette année afin que diverses comparaisons entre les hommes et les femmes soient possibles.

On peut obtenir des données supplémentaires sur les nouveaux sièges primaires du cancer selon le diagnostic de la CIM-9 (rubrique à 4 chiffres), sur la morphologie selon le siège et sur le classement du cancer selon le groupe d'âge en s'adressant à la Sous-section des demandes d'information de la Division de la santé. Des totalisations spéciales pour la préparation des fichiers de données aux fins d'analyse statistique sont également accessibles selon le principe de la récupération des coûts. Enfin, on prépare actuellement une série de tableaux chronologiques sur les taux d'incidence du cancer de 1969 à 1991 d'après la base démographique révisée et la population-type de 1991 afin de permettre les comparaisons avec les données des années antérieures.

Methodology and Data Quality Report

Méthodologie et qualité des données

NEW PRIMARY SITES OF CANCER

History

A primary objective of the National Cancer Incidence Reporting System (NCIRS) is to provide a large base of data to study cancer patterns and trends and to monitor differences in cancer risks among different populations.¹

The system was established in 1969 at Statistics Canada in co-operation with the National Cancer Institute of Canada and nine of the ten existing provincial cancer registries. The tenth registry, Ontario, joined to the national system in 1981. As of the 1992 data year, a Canadian Cancer Registries being established as a person-oriented data base, which will include mechanisms for updating and death clearing records.

Data are collected for a variety of purposes within each province, such as to monitor trends and plan operations for the cancer clinics at which the majority of cancer patients are treated, or to use in research studies aimed at improving treatment methods or determining the cause of cancer. In the majority of provinces, a legal requirement exists that cancer cases be reported to the appropriate agency. Nine registries have signed legal agreements with Statistics Canada which provide a legal basis for transfer of personal identifying information to the national level; these are British Columbia, Saskatchewan, Northwest Territories, Ontario, Quebec, New Brunswick, Prince Edward Island, Nova Scotia and Newfoundland. As part of these agreements, the Canadian Council of Cancer Registries has been formed and includes representation from each provincial/territorial cancer registry and Statistics Canada. The Council meets annually with representatives of major user groups to discuss issues of mutual concern and to make recommendations which lead to improvements to the cancer registration system.

Information from the system is published in a variety of ways, including: annual and special reports issued by provincial cancer control agencies; this report "Cancer in Canada"; a summary publication "Canadian Cancer Statistics",² and "Health Reports", a Statistics Canada quarterly journal. A monograph "The Making of the Canadian Cancer Registry"³ describes the history of cancer registration in Canada and provides summary charts and tables of cancer incidence data from 1969-1988. More detailed historical tables from 1969-1991 are now in preparation.

Data Sources

The aim of the National Cancer Incidence Reporting System is to gather complete and comparable information for every new case of cancer in the country. Data are reported to the national system by provincial and territorial cancer registries with data for the Yukon Territory being reported by British Columbia.

NOUVEAUX SIÈGES PRIMAIRE DE CANCER

Historique

Le Système national de déclaration des cas de cancer (SNDCC) vise surtout, au moyen d'une grande base de données, à étudier la répartition et les tendances du cancer et à observer les variations des risques de cancer dans les couches de la population.¹

Le système a été mis sur pied en 1969 à Statistique Canada avec la collaboration de l'Institut national du cancer et des neuf provinces ayant alors un registre du cancer. La dixième, l'Ontario, s'est jointe au système national en 1981. En 1992, le registre canadien du cancer a été établi en tant que base de données axée sur les personnes comprenant des mécanismes de mise à jour des enregistrements et de confirmation des décès.

Les données obtenues dans les provinces servent, notamment, à observer les tendances et planifier les opérations des centres anticancéreux où sont traités la majorité des malades atteints du cancer; et à appuyer la recherche en vue d'améliorer les méthodes de traitement ou de cerner la cause du cancer. La plupart des provinces sont tenues par la loi de déclarer les cas de cancer à l'organisme compétent. neuf registres ont signé des accords juridiques avec Statistique Canada en vertu desquels les renseignements personnels sont transmis au système national. Il s'agit des registres de la Colombie-britannique, de la Saskatchewan, des Territoires du Nord-Ouest, de l'Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve. Suite à la signature de ces accords, on a formé le Conseil canadien des registres du cancer composé de représentants de chacun des registres provinciaux et territoriaux du cancer et de Statistique Canada. Le Conseil se réunit chaque année avec les représentants des principaux groupes d'utilisateurs afin de discuter de questions d'intérêt commun et de faire des recommandations sur les améliorations à apporter au système national d'enregistrement des cas de cancer.

Les données du système sont publiées sous diverses formes, comme le présent rapport sur le cancer au Canada, les rapports annuels ou spéciaux des agences provinciales de lutte anticancéreuse, les statistiques sommaires sur le cancer au Canada² et les "Rapports sur la santé", une revue trimestrielle de Statistique Canada. Par ailleurs, une monographie, *Développement du Registre canadien du cancer*,³ raconte l'histoire de l'enregistrement des cas de cancer au Canada et offre des tableaux et des graphiques sommaires des données sur l'incidence du cancer entre 1969 et 1988.

Provenance des données

Le Système national de déclaration des cas de cancer a pour objet de réunir des données complètes et comparables sur chaque nouveau cas de cancer au pays. Les données sont fournies au Système par les registres provinciaux et territoriaux de cancer, celles du Yukon étant déclarées par la Colombie-Britannique.

Each registry attempts to record all new cases of cancer in its population using a variety of data sources. These may include cancer clinic and general hospital records, pathology and other laboratory reports, radiology reports, reports from physicians in private practice, reports on causes of cancer through the provincial medicare systems and reports on cancer deaths from Vital Statistics Registrars. As far as possible, each registry follows common standards of recording and classifying new cases of cancer. However differences occur which contribute to variations in coverage of registration, as well as in the detail and accuracy of information reported for each case. These differences, which may influence the reported incidence rates for all cancers and the incidence of individual cancer sites, include use and ease of access to various sources of information, whether or not the reporting of new cancer cases is a legal requirement, varying capabilities to detect cancers (particularly those of borderline malignancy) and definitions used to determine what is an invasive or non-invasive malignancy.

Because of the diverse sources that must be consulted, and because of the complex computer systems developed in the two largest provinces in the early 1980s, considerable delays have occurred in provision of data to Statistics Canada in recent years; data since the 1981 data year have been published about five years after the fact. However, improvements in timeliness are occurring (this issue is within four years), and the provincial registry directors have agreed to work toward the goal of reporting data within 20 months of the end of the calendar year. However, as is the case with most other centralized cancer registries, a time lag of two to three years will remain before data can be published.

Variables collected by the system include those needed for basic patient identification, description of the diagnosis, descriptive epidemiology, and death. Key variables include patient name, health insurance number, provincial registry identifier, birthplace (province or country), sex, date of birth, marital status, age at diagnosis, method of diagnosis, death certificate source, ICD-O topography and morphology, ICD-9 code of diagnosis, primary site number, date of diagnosis, reporting year, place-name of residence, standard geographic code of residence, patient status, death registration number and date of death. Some information on definitions is given in the section on Glossary and Explanatory Notes. Additional information is contained in the Cancer Records Officers Manual.³

Data Collection and Processing

Provincial and territorial registries send Statistics Canada notifications containing basic patient and diagnostic information for each newly discovered primary malignant neoplasm. As of 1985, all provinces have submitted data annually on magnetic tape.

Because notifications received on magnetic tape vary in format and content from province to province, data are reformatted and recoded at Statistics Canada to a standard record based on a standard set of codes.

Chaque registre vise à consigner tous les nouveaux cas de cancer relevés dans la population, à partir des données obtenues de diverses sources: les dossiers des centres anticancéreux et des hôpitaux généraux, les rapports des laboratoires de pathologie, de radiologie ou autres, les rapports des médecins en pratique privée, les rapports des régimes provinciaux d'assurance-maladie sur les causes du cancer et les rapports des bureaux de l'état civil sur les décès causés par le cancer. Autant que possible, les nouveaux cas sont consignés et classifiés selon des normes générales. On note toutefois des divergences dans l'utilisation des sources de données et leur facilité d'accès, que la déclaration soit obligatoire ou non, dans les capacités de dépistage (surtout les cas limites de tumeurs malignes) ainsi que dans les définitions appliquées aux tumeurs malignes invasives ou autres. Ces divergences entraînent des variations en ce qui concerne le champ d'observation ainsi que le détail et l'exactitude des données déclarées pour chaque cas et peuvent influer sur les taux d'incidence déclarés pour l'ensembles des cancers et sur le taux d'incidence pour les divers sièges de cancer.

Vu la diversité des sources à consulter et la complexité des systèmes informatiques adoptés au début des années 80 dans les deux plus grandes provinces, Statistique Canada a connu ces dernières années de longs retards dans l'obtention des données. Depuis 1981, ces retards sont de cinq ans environ. On constate toutefois une amélioration des délais de parution (cette publication paraît en dedans de quatre ans) et les directeurs des registres provinciaux ont pour but de faire la déclaration de données à environ 20 mois de la fin de l'année civile. Il subsistera malgré tout un décalage de deux ou trois ans avant la publication des données, comme pour la plupart des autres registres centralisés du cancer.

Les variables du Système servent à consigner, notamment, les données-repères sur le malade, le diagnostic, l'épidémiologie descriptive et le décès. Les principales: nom du malade, numéro d'assurance-maladie et celui du registre provincial, lieu de naissance (province ou pays), sexe, date de naissance, état matrimonial, âge au moment du diagnostic, méthode diagnostique, source du certificat de décès, code de localisation et de morphologie de la CIM-O, code de diagnostic de la CIM-9, numéro du siège primaire, date du diagnostic, année de déclaration, lieu de résidence (nom et code géographique type), état du malade, numéro du certificat de décès et date du décès. Certains renseignements sont définis dans le glossaire et les notes explicatives, et d'autres précisions figurent dans le Manuel des responsables des dossiers de cas de cancer.³

Collecte et traitement des données

Les registres provinciaux et territoriaux envoient à Statistique Canada les données-repères sur le malade et le diagnostic pour chaque nouveau siège primaire de tumeur maligne. À partir de 1985, toutes les provinces ont soumis les données chaque année sur bandes magnétiques.

Comme les données reçues sur bandes magnétiques varient d'une province à l'autre quant à la structure et au contenu, elles sont reformatées et récrites à Statistique Canada en fonction d'un enregistrement type qui s'appuie sur des codes de référence.

For the Northwest and Yukon Territories only, and starting with the 1985 diagnosis year, duplicate records reported by other provinces are removed from the NCIRS after consultation with the province of reporting and territory of residence.

Data reported by registries coding diagnostic information in ICD-O are converted to ICD-9. Any conflicts resulting from this process are listed for review, for example where the ICD-O site and morphology codes do not permit conversion, or where the resulting ICD-9 code does not agree with the ICD-9 code provided by some registries.

All data are then edited by computer to ensure the validity of each field and to check on the compatibility of different data elements within a record. For example, a record may fail an edit because:

- information is missing or invalid codes are detected;
- the geographic code indicates the patient resides outside of Canada;
- the diagnosis reported is not compatible with the sex or age of the patient;
- date of diagnosis, date of birth and age of the patient are not compatible with each other.

Any queries arising from the clerical or computer edit processes are resolved by consulting the reporting provinces. In general, the proportion of records queried in any one province is two per cent or less.

Coverage and Comparability

Coverage of registration at the Canada level is currently thought to be at or above the accepted standard of 95 per cent, although lower coverage has occurred in some provinces, especially in earlier years. Comparability of data are affected by both under-and over-registration⁴. Sources of under-registration include: lack of use of important sources such as death certificates, cytology reports, or other health records; lack of reporting of cancer cases treated in a province other than the province or territory of residence; and lack of reporting late registrations (or cases diagnosed after a registry has reported that year's cases to Statistics Canada). Over-registration can result from several factors including: presence of duplicate records for the same case of cancer; and lack of consistent definitions for multiple primary cancers. For example, a patient resident in one province but treated in another could be reported by both. Duplicates may also appear within a provincial registry if records are not examined regularly for records pertaining to the same person.

Comparability of registration will be affected by coding practices used in individual registries and changes in definitions as to what is a cancer.⁴ The following notes concerning gaps in coverage and other factors that may limit comparability are included to facilitate interpretation

Dans le cas des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon uniquement, et pour l'année de diagnostic 1985 et les années suivantes, les enregistrements en double fournis par les provinces sont éliminés du SNDCC après avoir consulté la province de déclaration et le territoire de résidence.

Les données déclarées d'après les codes de la CIM-O sont converties à ceux de la CIM-9. Les difficultés entraînées par cette démarche sont consignées aux fins d'examen, par exemple lorsque les codes de siège et de morphologie de la CIM-O ne se prêtent pas à la conversion, ou lorsque le code résultant de la CIM-9 ne correspond pas à celui que fournissent certains registres.

Toutes les données font ensuite l'objet d'une vérification informatique qui permet d'assurer la validité de chaque zone et la compatibilité des différents éléments d'information déclarés. Au nombre des motifs de rejet d'une fiche:

- les données sont incomplètes ou les codes sont erronés;
- le code géographique indique que le malade réside à l'extérieur du Canada;
- le diagnostic déclaré est incompatible avec le sexe ou l'âge du malade;
- la date du diagnostic, la date de naissance et l'âge du malade sont incompatibles.

Les provinces déclarantes sont consultées s'il faut obtenir des précisions par suite de la vérification manuelle ou informatique. En général, les fiches nécessitant la consultation d'une province comptent pour au plus 2%.

Champ d'observation et comparabilité

Le taux de déclaration pour tout le pays atteint ou dépasse actuellement le seuil accepté de 95%, mais il a été moins élevé dans certaines provinces, surtout au cours des années antérieures. Tant la sous-déclaration que la sur-déclaration influencent la comparabilité des données⁴. Parmi les facteurs de sous-déclaration on retrouve d'abord l'omission d'utiliser des ressources importantes comme les certificats de décès, les rapports de cytologie ou autres dossiers de soins. Ensuite il y a l'omission de déclarer les cas où le malade s'est fait soigner dans une autre province ou un autre territoire et, enfin, l'omission de déclarer les enregistrements (ou cas) tardifs pour lesquels le diagnostic a été établi après l'envoi, par le registre, des cas de l'année à Statistique Canada. Quant à la sur-déclaration, elle peut tenir à l'enregistrement d'un cas en double; ou à l'absence de définitions cohérentes pour de multiples cancers primaires. Par exemple, il peut y avoir déclaration en double lorsque le malade s'est fait soigner dans une autre province; ou lorsque les dossiers de chaque cas enregistré ne sont pas soumis périodiquement à une vérification.

La comparabilité des données est aussi influencée par les méthodes de codage des enregistrements; et par les modifications apportées aux définitions du cancer.⁴ Les notes ci-après traitent des lacunes du champ d'observation et d'autres facteurs pouvant limiter la comparabilité; et elles visent à faciliter l'interprétation des données.

of the data. Notwithstanding these limitations, it is clear from tabulations in this and preceding reports that real differences in cancer incidence exist between different parts of Canada.

- Coding and processing practices sometimes differ among registries, which can lead to non-comparable rates. For example, in previous years, rates for invasive cervical cancer were reported as being much higher in Manitoba due to inclusion of cases which in other registries would be coded as *in situ* cancers. This problem has now been corrected in the provincial registry; correct data are now being supplied to NCIRS, and Manitoba rates for cancer of the cervix are now comparable to those for other provinces.
- Quebec relies entirely on hospital records to register new cases so that registration of certain cancers that are frequently treated outside a hospital, such as skin cancers, as well as cases often discovered at death only, such as cancers in older persons, will be relatively incomplete.
- With respect to historical data, the Quebec tumour registry estimates that under-reporting of cancer cases was as high as 30% up to the end of 1976. Following administrative changes, major efforts to improve the registration system were successful and resulted in large increases in the number of cases registered for 1977 and 1978. However, the number of notifications from Quebec hospitals declined in 1979 and 1980. In 1981, reporting of cancer cases to the Quebec tumour registry became compulsory. This resulted in temporary over-registration of cancer cases because any cancers that were diagnosed in earlier years but reported only in 1981 or subsequent years were considered to be new cases in the year first reported. Quebec data from 1981 through 1983 are therefore not comparable with those reported in 1979 or 1980. The 8.4% of cancer cases diagnosed in day care units were not included in the registry until 1984. Stringent validation procedures also implemented in 1984 have eliminated multiple reports. In summary, data for 1984 onwards are considered relatively complete and comparable.
- Nova Scotia has implemented improved methods of cancer registration whereby as of 1983, cancers are now registered directly from the pathology report, rather than only after receipt of a completed Provincial Cancer Registry form. As of 1986, Nova Scotia also started to use death certificates as a source of information. These additional information sources have contributed to important increases in incidence rates for Nova Scotia between 1982 and 1983, and 1985 and 1986. As of 1986, age-standardized rates are comparable to those of the rest of Canada.

Les tableaux montrent quand même, comme ceux des années précédentes, les variations réelles de l'incidence du cancer d'une région à l'autre du pays.

- Le codage et le traitement des données varient parfois d'un registre à l'autre, ce qui peut empêcher de comparer les taux. Par exemple dans les années précédentes, le taux pour le cancer envahissant du col de l'utérus est considérablement supérieur au Manitoba. En effet, le registre de cette province intègre des cas qui, ailleurs, seraient codés comme des cancers *in situ*. Le problème a toutefois été corrigé; des données précises sont fournies au SNDCC, et le taux du cancer du col de l'utérus au Manitoba est maintenant comparable à celui des autres provinces.
- Le Québec a recours uniquement aux dossiers d'hôpitaux pour enregistrer les nouveaux cas de cancer. C'est pourquoi l'enregistrement de certains cancers fréquemment traités à l'extérieur des hôpitaux, par exemple le cancer de la peau, ainsi que les cas de cancer découverts seulement au décès, par exemple les cancers chez les personnes âgées, est relativement incomplet.
- Pour ce qui est des données chronologiques, le fichier des tumeurs du Québec révèle que, pour les années allant jusqu'à la fin de 1976, le pourcentage des cas de cancer non signalés pouvait atteindre 30%. À la suite des changements administratifs apportés, les efforts considérables déployés pour l'amélioration du système d'enregistrement ont été couronnés de succès et se sont soldés par une hausse sensible du nombre de cas déclarés pour 1977 et 1978. Cependant, le nombre de déclarations des hôpitaux du Québec a baissé en 1979 et en 1980. En 1981 devenait obligatoire la déclaration des cas de cancer au fichier des tumeurs du Québec. Il s'en est suivi une surdéclaration temporaire des cas de cancer parce que tout cas diagnostiqué au cours des années antérieures, mais déclaré en 1981 seulement ou dans les années suivantes était considéré comme un nouveau cas de l'année où il a été déclaré. Les données pour le Québec de 1981 à 1983 ne sont donc pas comparables à celles déclarées en 1979 ou en 1980. Les cas de cancer dont le diagnostic a été fait dans les unités de jour n'ont pas été inclus dans les registres avant 1984. Des procédures de validité rigoureuses, aussi introduites en 1984, ont eu pour effet d'éliminer des rapports multiples. En somme, les données à partir de 1984 sont considérées comme étant complètes et comparables.
- La Nouvelle-Écosse a amélioré son mode d'enregistrement des cas de cancer: ainsi, depuis 1983, les cas sont consignés directement à partir du rapport de pathologie. Auparavant, ils l'étaient après réception de la fiche remplie du registre provincial du cancer. En outre, la Nouvelle-Écosse se sert, depuis 1986, des certificats de décès comme source de renseignements. Ces sources d'information supplémentaires contribuent aux importantes hausses du taux d'incidence observées en Nouvelle-Écosse entre 1982 et 1983 et entre 1985 et 1986. Depuis 1986, les taux comparatifs sont semblables à ceux du reste du Canada.

- "Other skin cancers" (ICD-9 173) are reported by all registries except Ontario. For this site, comparability across the country is not satisfactory: crude rates in 1990 ranged from a low of 3.6 per 100,000 in Yukon to a high of 180.1 per 100,000 in Prince Edward Island. The lower rates for British Columbia this year reflect incomplete reporting. However six registries report "other skin cancer" crude rates of between 114 to 180 per 100,000 indicating some degree of consistency.
- For some cancer sites, differences in diagnostic practices may affect rates. In this year's report, the high rate of prostate cancer incidence among British Columbia men is at least partly a result of early diagnostic techniques such as the prostate specific antigen (PSA) test and prostatic ultrasound followed by biopsy. Additional prostate cancer may also have been diagnosed incidentally as a result of trans-urethral prostatectomy.²
- The unit of registration is a new primary cancer rather than a person with cancer. While guidelines exist for reporting more than one independent primary tumour in an individual, practices vary across the country and may contribute to variations in reported incidence for some sites.^{4,5}
- Following publication of annual data, updates to the file may affect any of the previous years so that incidence rates for earlier years, if tabulated now, would differ from figures originally published. This affects the 1989 data used in this report.

Despite these limitations in comparability, registration systems are generally improving. Mortality/Incidence ratios* are becoming more consistent at just over 50% for most provinces (including Nova Scotia and Quebec),^{5,6,8} suggesting that provincial cancer registries are becoming more comparable in their case ascertainment procedures.

More information on data quality and completeness is available from Statistics Canada. In particular, item by item tables of availability have been prepared,⁷ while a comprehensive examination of major quality indicators has also been undertaken.⁵ Data quality indicators over time are included in, "The Making of the Canadian Cancer Registry".⁸

* The number of deaths due to cancer in a given period multiplied by 100 and divided by the number of new incident cancers for this period.

- Les "autres cancers de la peau" (CIM-9 173) sont déclarés par tous les registres, sauf celui de l'Ontario. La comparabilité nationale n'est pas satisfaisante pour ce siège: les taux bruts de 1990 variaient entre un très bas niveau de 3.6 pour 100,000 habitants au Yukon et un sommet de 180.1 pour 100,000 habitants en l'île-du-Prince-Édouard. Toutefois, six registres provinciaux font état de taux bruts pour les "autres cancers de la peau" qui sont compris entre 114 et 180 pour 100,000 habitants, ce qui révèle une certaine uniformité.
- Les différentes méthodes servant à poser un diagnostic peuvent influencer les taux observés pour certains sièges. Dans le rapport de cette année, le taux élevé de nouveaux cas de cancer de la prostate en Colombie-Britannique est au moins en partie attribuable à l'emploi de techniques de dépistage précoce telles que le test basé sur l'antigène prostatique spécifique et l'échogramme prostatique suivi d'une biopsie. D'autres cas de cancer de la prostate ont pu être diagnostiqués incidentellement par suite d'une prostatectomie transurétrale.²
- L'unité de déclaration est le nouveau cas de tumeur primaire plutôt que le sujet atteint. Malgré les directives sur la déclaration de chaque cas de cancer primaire, les pratiques sont différentes à l'échelle nationale et peuvent faire varier l'incidence déclarée de certains sièges.^{4,5}
- Une fois publiées, les données annuelles peuvent être mises à jour, ce qui explique les divergences entre les taux d'incidence publiés pour les années antérieures et ceux qui s'appliquent maintenant. Cela influe sur les données de 1989 qui sont utilisées dans ce rapport.

Malgré les limitations de la comparabilité, les modes de déclaration s'améliorent en général. Les ratios mortalité-incidence deviennent plus uniformes, un peu plus de 50% pour la plupart des provinces (dont la Nouvelle-Écosse et le Québec),^{5,6,8} ce qui semble indiquer la comparabilité accrue des procédures de déclaration par les registres provinciaux.

Statistique Canada peut fournir plus de précisions sur la qualité et l'intégralité de l'information. Des tableaux détaillés des données disponibles sont en préparation,⁷ et une étude complète des principaux indicateurs de qualité a commencé.⁵ Les indicateurs de qualité des données sont inclus dans, "Développement du registre canadien du cancer".⁸

* Le nombre de décès par cancer pour une période donnée, multiplié par 100 et divisé par le nombre de nouveaux cas de cancer pour cette période.

CANCER MORTALITY

History and Sources of Data

Tables on deaths due to cancer included in this section are based on the 1990 official mortality statistics of Canada to correspond to the time period used for incidence data.

Under a federal-provincial agreement, the registration of births, marriages and deaths is the responsibility of the provinces and territories under the appropriate Vital Statistics and other related acts. Under this agreement microfilm copies of the registrations are supplied to Statistics Canada for compilation of vital statistics. National mortality statistics have been published since 1921. Mortality data for more recent years (up to 1991) have already been published in the annual publication **Causes of Death**, Catalogue 84-208 (formerly Catalogue 84-203) which presents data on deaths according to three-digit categories and four-digit sub-categories of the ICD-9, by sex and province of residence of the deceased and by sex and five-year age groups for Canada.

Data Processing

In addition to microfilm copies of death registrations supplied to Statistics Canada by all provinces, the majority of provinces supply machine-readable statistical abstracts of the events registered. Data for the remaining provinces are converted to machine-readable form at Statistics Canada. In addition, Statistics Canada codes the cause of death and other data for Newfoundland, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick and the Territories.

Prior to tabulation, all machine-readable vital statistics data are subjected to a computer edit. This identifies all records in which the coded information does not match predetermined values or ranges of values and where certain correlations among coded data items do not meet specified rules. All records so identified are compared to corresponding registrations.

DÉCÈS CAUSÉS PAR LE CANCER

Historique et provenance des données

Les tableaux ci-inclus sur les décès causés par le cancer utilisent la statistique des décès au Canada de 1990, afin que la période corresponde à celle des taux d'incidence.

Un accord fédéral-provincial stipule que les provinces et les territoires doivent enregistrer les naissances, les mariages et les décès selon les lois de la statistique de l'état civil et les lois connexes. Statistique Canada établit la statistique de l'état civil à partir des données reçues sur microfilm. Les statistiques sur les décès au Canada sont publiées depuis 1921. Ces dernières années (jusqu'en 1991), elles figurent annuellement dans les **Causes de décès**, n° 84-208 au catalogue (anciennement n° 84-203 au catalogue), d'après les rubriques à trois chiffres et les sous-rubriques à quatre chiffres de la CIM-9, par sexe et province de résidence du décédé et par sexe et groupe d'âge quinquennal pour le Canada.

Traitements des données

En plus des enregistrements des décès que les provinces font parvenir sur microfilm à Statistique Canada, la majorité d'entre elles y joignent un résumé statistique des faits sous forme ordinolingué. Statistique Canada convertit l'information non présentée sous cette forme; et code les causes de décès et d'autres données reçues de Terre-Neuve, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et des Territoires.

Avant de totaliser les statistiques de l'état civil reçues sous forme ordinolingué, on les vérifie par ordinateur pour en repérer les éléments non conformes aux valeurs ou échelles de valeurs préétablies, ainsi que les corrélations qui ne respectent pas les stipulations. Une fois repérées, ces données sont comparées aux enregistrements correspondants.

GLOSSARY AND EXPLANATORY NOTES

Cancer Incidence

The number of new cases of primary malignant neoplasms diagnosed during the year.

The basic unit of reporting is a new primary malignant neoplasm rather than an individual person.

The incidence figures published in this report should be considered **provisional** as some cases diagnosed this year will be registered and reported in subsequent years.

Cancer Mortality

The number of deaths due to cancer that occurred during the year.

Data show the overall mortality from cancer and do not refer solely to deaths of those persons registered by cancer registries during the year. The count of deaths will thus include deaths of persons diagnosed in earlier years, persons newly diagnosed during the year as well as persons for whom a diagnosis of cancer is made only after death. Not included are deaths of persons who had cancer at some time during their life, were cured and died of another disease, or persons in whom cancer was a contributing cause but not the underlying cause of death.

Classification of Diagnosis

In this report malignant neoplasms are classified according to the Ninth Revision of the International Classification of Diseases (ICD-9) which came into effect in Canada in 1979. In the case of diagnoses for new cases of cancer, which were for the most part reported in the more detailed International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O), the tabulated ICD-9 codes are based on a conversion from the ICD-O* for most provinces.

With the adoption of the ICD-O classification by provincial cancer registries, uniform information on histologic types of newly diagnosed cancers is now available since 1982.

GLOSSAIRE ET NOTES EXPLICATIVES

Incidence du cancer

Nombre de nouveaux cas de tumeurs malignes primaires diagnostiqués pendant l'année.

L'unité de déclaration de base est le nouveau cas de tumeur maligne primaire plutôt que le sujet.

Les taux d'incidence ci-inclus sont **provisoires**, puisque certains cas diagnostiqués pendant l'année seront consignés et déclarés ultérieurement.

Décès causés par le cancer

Nombre de décès qui sont attribuables au cancer et qui surviennent pendant l'année.

Les données concernent tous les décès dus au cancer et non seulement ceux qui sont consignés par les registres du cancer pendant l'année. Elles incluent les cas où le diagnostic de cancer s'est fait avant ou pendant l'année; et les cas où le cancer n'est constaté qu'au décès. Elles excluent les cas où le sujet a vaincu le cancer, puis a succombé à une autre cause de décès; et les cas où le cancer a contribué au décès, sans en être la cause principale.

Classification du diagnostic

Aux fins du présent rapport, la classification des tumeurs malignes suit la Neuvième révision de la Classification internationale des maladies (CIM-9), qui a pris effet au Canada en 1979. S'il s'agit de nouveaux cas de cancer, en grande partie rapportés dans la CIM-Oncologie (CIM-O) détaillée, les codes de la CIM-9 mis en tableaux proviennent de la conversion des codes de la CIM-O* pour la plupart des provinces.

L'adoption de la CIM-O par la majorité des registres du cancer a permis l'obtention de données uniformes sur le type histologique des nouveaux cas de cancer diagnostiqués.

* A conversion program developed by the United States Department of Health, Education and Welfare was used.

* À l'aide d'un mode de conversion établi aux États-Unis par le ministère Santé, Éducation et Bien-être social.

Up to 1978, annual reports were based on the Eighth Revision of the ICD, adapted for use in the United States(ICDA-8). Restructuring of the Classification has resulted in some break in continuity. Therefore, any comparisons of ICD-9 categories, either by category number or by disease title, should be made with reference to both classifications.

Prior to 1981, all neoplasms classifiable to categories 140-208 were included in the main tables. Starting in 1981, skin cancers (ICD-9 173) other than malignant melanoma were excluded from most cancer incidence tables, and presented separately. Data for carcinoma in situ (ICD-9 230-234) were also published in separate tables (see section on carcinoma in situ below).

Malignant Neoplasms (Cancers)

Tumours characterized by unrestrained growth of cells which invade local tissues and may spread (metastasize), through the blood or lymph system, to other parts of the body.

Primary Malignant Site. The tissue or organ in which a malignant neoplasm originates.

Secondary Site. The site at which a malignant neoplasm develops as a result of metastatic extension from a primary site.

Data for newly diagnosed secondary sites or for deaths due to a malignant neoplasm at a secondary site (ICD-9 196-198) are included only if the primary site of the malignant neoplasms is unknown.

Carcinoma In Situ. A neoplasm confined to the site of origin without the invasion of neighbouring tissues.

In annual reports up to 1978, newly diagnosed cases of carcinoma in situ were reported and tabulated with malignant neoplasms for the same site with the exception of carcinoma in situ of cervix uteri (coded to ICDA-8 234.0 rather than to "malignant" neoplasm of cervix uteri", ICDA-8 180) for which data were published in separate tables.

In reports since 1979, data for carcinoma in situ of cervix uteri (ICD-9 233.1) continue to be presented in separate tables. In addition, data for all reported carcinomas in situ (ICD-9 230-234) are published in a separate table instead of being included with malignant neoplasms for the same site.

Cause of Death. This is based on the concept of the underlying cause, i.e., the disease or injury which initiated the sequence of events which led to death.

All deaths in which the underlying cause was a malignant neoplasm are included in this report.

Jusqu'en 1978, les rapports annuels étaient fondés sur la Huitième révision de la CIM, adaptée aux besoins des États-Unis(CIMA-8). La refonte de la Classification a rompu en quelque sorte la continuité. D'où la nécessité de faire mention des deux classifications quand sont comparées les rubriques de la CIM-9, soit par numéro de rubrique ou nom de maladie.

Avant 1981, on incluait dans les tableaux principaux toutes les tumeurs qui correspondaient aux rubriques 140 à 208. Depuis 1981, les cancers de la peau (CIM-9 173) autres que le mélanome malin étaient exclus de la majorité des tableaux sur l'incidence du cancer et présentés à part. Les données sur le carcinome in situ (CIM-9 230-234) figuraient aussi dans des tableaux distincts (voir ci-après).

Tumeurs malignes (cancers)

Tumeurs qui se distinguent par la prolifération cellulaire anarchique, le caractère envahissant et la propension à diffuser dans l'organisme (métastases), par voie sanguine ou lymphatique.

Siège primaire de tumeur maligne. Tissu ou organe d'où prend naissance une tumeur maligne.

Siège secondaire de tumeur maligne. Siège qui se développe sous l'effet de métastases émanant d'un siège primaire.

Les données sur les sièges secondaires nouvellement diagnostiqués ou sur les décès par tumeur maligne secondaire (CIM-9 196-198) ne sont incluses que si le siège primaire de la tumeur maligne est inconnu.

Carcinome in situ. Tumeur qui est limitée au siège d'origine et qui ne se propage pas aux tissus voisins.

Jusqu'en 1978, les nouveaux cas de carcinome in situ sont déclarés et totalisés dans les rapports annuels avec les tumeurs malignes du même siège, sauf pour le carcinome in situ du col de l'utérus (classifié sous CIMA-8 234.0, au lieu de CIMA-8 180, "tumeur maligne du col de l'utérus"), dont les données figurent dans des tableaux distincts.

Depuis 1979, on continue de présenter, sous forme distincte dans les rapports, les données sur le carcinome in situ du col de l'utérus (CIM-9 233.1). On fait de même pour tous les cas déclarés de carcinome in situ (CIM-9 230-234), plutôt que de les totaliser avec les tumeurs malignes du même siège.

Cause du décès. Il s'agit de la cause principale de décès, soit la maladie ou la lésion à l'origine de la séquence qui a mené au décès.

Le présent rapport concerne tous les décès dus principalement à une tumeur maligne.

Method of Diagnosis

For most registries this represents the **most confirmed method** which was used to diagnose the reported malignant neoplasm. Exceptions are Manitoba and Quebec where this is the **first** method.⁴

Microscopically confirmed. A diagnosis based on microscopic examination of tissues to determine abnormalities in their structure, composition and function. Autopsies, histopathological, and cytological diagnoses are included in this category.

Radiological. A diagnosis made using X-rays, or other investigations involving radioactive materials.

Clinical. A diagnosis based on symptoms shown, irrespective of morbid changes producing them.

Other. This category includes clinical and unknown methods of diagnosis.

New Cases Discovered by Death Certificate Only (DCO)

As of 1986, all registries except Quebec and Yukon use this data source to ensure complete registration, since a proportion of persons with cancer are not diagnosed during their lifetime or if diagnosed, are not reported to the registry and are therefore discovered only from this source.

Some differences occur among provinces in the definition of this item. Most registries include cases for which the **only** source of information is the death certificate; however in British Columbia and New Brunswick, this variable may indicate cases which **first** came to their attention through a death certificate and for which further confirmation is then obtained from other sources. The proportion of cancers found by this method also varies depending upon whether **all** causes of death mentioned on the death certificate are used to identify non-registered cancers, or whether (as in Ontario, Saskatchewan and Alberta) just the **underlying** cause of death is used.⁴

Starting with Cancer in Canada 1989, the DCO cases are identified as those where Vital Statistics Source = Yes and Method of Diagnosis = Unknown or Clinical.⁸ As a result, some provinces will now have a slightly lower DCO percentage than in previous years, because of exclusion of cases where a more confirmed method of diagnosis (ie. microscopic, radiologic, clinical) has supplemented the information first discovered through death certificates.

Province

For cancer incidence and mortality data, this is the province or territory of the individual's permanent residence at time of diagnosis or death, which may or

Méthode de diagnostic

Pour la plupart des registres, c'est la **méthode la plus éprouvée** pour le diagnostic de la tumeur maligne déclarée, sauf au Manitoba et au Québec, où c'est la **première** méthode.⁴

Examen microscopique. Fondé sur l'étude microscopique des tissus permettant de relever les altérations de forme, de structure et de fonctionnement. Cette catégorie comprend les diagnostics établis lors d'autopsies, d'examens histologiques ou d'examens cytologiques.

Examen radiologique. Établi à partir de radio-graphies.

Examen clinique. Fondé sur l'observation des symptômes, sans égard aux changements d'état morbide.

Autres. Cette catégorie comprend les méthodes diagnostiques qui sont inconnues.

Nouveaux cas confirmés par certificat de décès uniquement

À partir de 1986, cette source de données est utilisée par tous les registres, sauf le Québec et le Yukon, et permet d'obtenir un enregistrement complet, par l'inclusion des cas de cancer relevés après le décès; ou des cas diagnostiqués mais non déclarés aux registres.

Cette catégorie varie quelque peu d'une province à l'autre. La plupart des registres y incluent les cas où le certificat de décès est la **seule** source de données; mais la Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick, y indiquent les cas qui leur sont **d'abord** signalés par un certificat de décès et dont ils obtiennent la confirmation d'autres sources. Le taux de cancers ainsi obtenu varie selon qu'on utilise **toutes** les causes dont fait mention le certificat de décès, afin de repérer les cas de cancer non déclarés, ou seulement la cause **principale** comme c'est l'usage en Ontario, en Saskatchewan ou en Alberta.⁴

Avec la publication *Le Cancer au Canada 1989*, les cas de cancer confirmés par certificat de décès uniquement seront dorénavant ceux pour lesquels on a répondu <>oui<> à <>état civil<> et <>inconnu<> ou <>examen clinique<> à <>méthode de diagnostic<>.⁸ Dans certaines provinces, le pourcentage de cas confirmés par certificat de décès seulement sera inférieur en raison de l'élimination des cas d'abord établis par certificat de décès puis confirmés par une autre méthode plus sûre (soit un examen microscopique, radiologique ou clinique).

Province

S'il s'agit de l'incidence du cancer ou des décès attribuables au cancer, c'est la province ou le territoire où réside habituellement le sujet au moment du diagnostic ou du décès et qui peut différer de

may not be identical to the province in which the new malignant neoplasm or the cancer death was registered.

Age

The age of the patient (in completed years) at the time of diagnosis or death.

Rates

Crude rates. The number of new cases of cancer or cancer deaths during the year expressed as a rate per 100,000 population. This rate includes cases whose age is unknown.

Age-specific rates. The number of new cases of cancer or cancer deaths during the year expressed as a rate per 100,000 persons in a given age group.

Age-standardized rates (see Appendix for formula). The number of new cases of cancer or cancer deaths that would have occurred during the year in a given province if the actual age-specific rates observed in the province had prevailed in a standard population. This rate is based only on cases whose age is known and has not been adjusted for persons of unknown age.

In this report, the standard population is the 1991 Census population of Canada, which replaces the 1971 population used in previous years. Rates in this publication therefore can not be directly compared to those published previously. Rates standardized to the 1991 population are generally much higher than those standardized to the 1971 population, because the population in 1991 is much older than in 1971. The process of standardization will therefore give more weight to the older age groups which have higher rates of cancer incidence and mortality. Rates standardized to the 1991 population will more closely reflect the actual (or crude) rate of the cancer burden on the population.

Age-standardized rates in previous reports were also sex-standardized. Sex-standardization has been eliminated this year to permit direct comparison between rates for males and females.

Age-standardized rates permit comparisons among provinces by allowing for the effect of differences in the age structure in the different populations. However, these rates are only a summary indicator of possible differences between provinces. The figures of greatest value in interprovincial comparisons are the age-specific rates.

Population

Rates are calculated using final Postcensal estimates for July 1, 1990, as provided by Demography Division at Statistics Canada.

celle où l'on consigne la nouvelle tumeur maligne ou le décès par cancer.

Âge

Âge du malade (en années révolues) au moment du diagnostic, ou décès.

Taux

Taux brut. Nombre de nouveaux cas de cancer ou de décès par cancer relevés pendant l'année pour 100,000 habitants. Le taux brut englobe les personnes dont l'âge est inconnu.

Taux par âge. Nombre de nouveaux cas de cancer ou de décès par cancer qui sont relevés pendant l'année pour 100,000 personnes d'un groupe d'âge donné.

Taux comparatif (voir la formule à l'Annexe.) Nombre de nouveaux cas de cancer ou de décès par cancer qui seraient relevés pendant l'année dans une province si on appliquait les taux par âge réels de la province aux effectifs d'âge correspondants d'une population-type, en l'occurrence celle du recensement de 1991. Le taux comparatif tient compte seulement des personnes dont l'âge est connu et n'a pas été ajusté pour les personnes d'âge inconnu.

Dans le présent rapport, la population-type est la population du recensement du Canada de 1991, qui remplace celle du recensement de 1971 utilisée auparavant. Les taux publiés dans ce rapport ne peuvent donc pas être comparés directement à ceux publiés précédemment. Les taux comparatifs calculés d'après la population de 1991 sont généralement beaucoup plus élevés que ceux calculés d'après la population de 1971 étant donné que la population de 1991 est beaucoup plus âgée que celle de 1971. Le processus de normalisation donnera donc plus de poids aux groupes plus âgés qui affichent des taux plus élevés d'incidence du cancer et de décès causés par le cancer. Toutefois, les taux comparatifs calculés d'après la population de 1991 correspondront davantage aux taux réels (ou bruts).

Les taux comparatifs des rapports antérieurs tenaient compte non seulement de différences de structures dans la répartition par âges mais également de différences pour le sexe. Ce dernier facteur a fait l'objet d'estimations cette année afin que diverses comparaisons entre les hommes et les femmes soient possibles.

Les taux comparatifs permettent d'établir des comparaisons parmi les provinces, en tenant compte des différences de la structure par âge de leurs populations. Ils ne sont toutefois qu'un indicateur sommaire des différences possibles entre les provinces. Les taux par âge permettent des comparaisons plus fiables d'une province à l'autre.

Population

Les taux sont calculés au moyen des estimations postcensitaires finales au 1^{er} juillet 1990 fournies par la Division de la démographie de Statistique Canada.

In 1993, Statistics Canada introduced a new series of population estimates which include non-permanent residents and adjustments for net census undercoverage. The series for provinces and territories comprises annual population estimates by age, sex and marital status beginning with 1971. Annual estimates by age and sex for Census Division and Census Metropolitan Areas as of 1986 will be available in the near future.

Non-permanent residents were added to the census universe in 1991. Estimates of counts of these persons for census years prior to 1991 are based on administrative data obtained from Employment and Immigration Canada.

Estimates of net census undercoverage are based on results of Statistics Canada's Reverse Record Check (RRC) and Overcoverage Study. Census undercoverage has been measured with the RRC since 1966, while overcoverage has only been measured since 1991. Net census undercoverage prior to 1991 was estimated by applying to RRC results the ratio of overcoverage and undercoverage levels observed in 1991.

Definitions

Population: Persons whose usual place of residence is somewhere in Canada or who are non-permanent residents. In census years, this is the enumerated population adjusted for net census undercoverage, while population estimates are used for intercensal years.

Non-permanent residents: The following five groups of persons residing in Canada, referred to globally as "non-permanent residents", were added to the census population universe in 1991: persons claiming refugee status; persons holding a student authorization; persons holding an employment authorization; persons holding a minister's permit; and all non-Canadian-born dependants of the above individuals.

Net census undercoverage: The difference between census undercoverage and census overcoverage. The former refers to persons not enumerated in the census but who were part of the census universe, while the latter refers to persons either enumerated more than once or enumerated but not part of the census universe. Undercoverage exceeds overcoverage with few exceptions at all levels of demographic and geographic disaggregation.

More Information

More information on definitions used, coding instructions and procedures is available from the Cancer Records Officers (CRO) Manual³, or upon request from Statistics Canada.

En 1993, Statistique Canada a introduit une nouvelle série d'estimations de la population qui comprennent les résidents non permanents et qui sont rajustées pour tenir compte du sous-dénombrement net du recensement. Les séries pour les provinces et les territoires comprennent des estimations annuelles de la population selon l'âge, le sexe et la situation matrimoniale à partir de 1971. Des estimations annuelles selon l'âge et le sexe fondées sur les données de 1986 sortiront bientôt pour les divisions de recensement et les régions métropolitaines de recensement.

Les résidents non permanents ont été ajoutés à l'univers du recensement en 1991. Les estimations des chiffres pour ces personnes concernant les années de recensement antérieures à 1991 sont fondées sur des données administratives fournies par Emploi et Immigration Canada.

Les estimations du sous-dénombrement net du recensement s'appuient sur les résultats de la contre-vérification des dossiers (CVD) et d'une étude du surdénombrement. Le sous-dénombrement du recensement est mesuré à l'aide de la CVD depuis 1966, alors que le surdénombrement n'est mesuré que depuis 1991. Avant 1991, le sous-dénombrement net du recensement était estimé par l'application aux résultats de la CVD des ratios de surdénombrement et de sous-dénombrement observés en 1991.

Définitions

Population. Personnes dont le lieu habituel de résidence est au Canada ou résidents non permanents. Dans les années de recensement, il s'agit de la population dénombrée après rajustement pour tenir compte du sous-dénombrement net du recensement. Dans les années intercensitaires, il s'agit de la population estimée.

Résidents non permanents. Cinq groupes de personnes résidant au Canada, réunis globalement sous le vocable de «résidents non permanents», ont été ajoutés à l'univers de la population du recensement en 1991. Il s'agit de personnes qui demandent le statut de réfugié ou qui détiennent un permis de séjour pour étudiant, un permis de travail ou un permis ministériel, ainsi que les personnes à charge nées à l'étranger des personnes susmentionnées.

Sous-dénombrement net du recensement. Il s'agit de la différence entre le sous-dénombrement et le surdénombrement du recensement. Le sous-dénombrement fait référence aux personnes qui n'ont pas été recensées mais qui faisaient partie de l'univers du recensement alors que le surdénombrement renvoie aux personnes recensées plus d'une fois ou recensées bien qu'elles ne fassent pas partie de l'univers du recensement. Le sous-dénombrement dépasse le surdénombrement à quelques exceptions près à tous les niveaux de désagrégation démographique et géographique.

Renseignements complémentaires

Pour plus de détails sur les définitions, les instructions de codage et les procédures, consulter le Manuel des responsables des dossiers de cas de cancer³ ou s'adresser à Statistique Canada.

References - Références

- 1E. Gaudette LA (1988) "The National Cancer Incidence Reporting System". *Chronic Diseases in Canada* 9: 52-55.
- 1F. Gaudette LA (1988) "Le Système national de déclaration des cas de cancer". *Maladies chroniques au Canada* vol. 9, p. 56-60.
- 2E. National Cancer Institute of Canada (1994) "Canadian Cancer Statistics - 1994" Canadian Cancer Society, Toronto, Ontario.
- 2F. Institut national du cancer (1994). "Statistiques canadiennes sur le cancer, 1994". Société canadienne du cancer, Toronto, Ontario.
- 3E. National Cancer Institute of Canada and Statistics Canada (1988) "Manual for Cancer Records Officers, second edition". Miller AB (Ed.) Health Statistics Division, Statistics Canada, Ottawa.
- 3F. Institut national du cancer et Statistique Canada (1988). Manuel des responsables des dossiers de cas de cancer, 2^e éd., Miller, A.B. (éd.), Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada, Ottawa.
- 4E. Dolson DD and Gaudette LA (1988) "Estimating Current Year Cancer Incidence and Mortality in Canada: An Evaluation of Data Sources and Methodology". Available from Health Statistics Division, Statistics Canada.
- 4F. Dolson DD et Gaudette LA (1988) "Estimation de l'incidence du cancer et des décès causés par le cancer pour l'année courante au Canada: Une évaluation des sources de données et de la méthodologie employée" Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada.
- 5E. Langlet ER and Gaudette LA (1989) "Data Quality Assessment for the National Cancer Incidence Reporting System, Canada and the Provinces 1969-1984". Available from the Health Statistics Division, Statistics Canada, Ottawa.
- 5F. Langlet ER et Gaudette LA (1989) "Data Quality Assessment for the National Cancer Incidence Reporting System, Canada and the provinces 1969-1984". Disponible à la Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada, Ottawa.
- 6E. Gaudette, LA "Cancer in Canada 1984" Health Reports Volume 1, No. 2, 189-209, Statistics Canada. Catalogue 82-003, March 1990.
- 6F. Gaudette LA "Le cancer au Canada 1984". Rapports sur la santé, vol. 1, n° 2, 189-209, Statistique Canada, au catalogue 82-003, mars 1990.
- 7E. Occupational and Environmental Health Research Section "Availability of Information from the Canadian Cancer Data Base by Province of Residence and Year of Diagnosis 1970-1984". Available from the Health Statistics Division, Statistics Canada, Ottawa.
- 7F. Section de la recherche sur l'hygiène du travail et du milieu. "Availability of Information from the Canadian Cancer Data Base by Province of Residence and Year of Diagnosis 1970-1984". Disponible à la Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada, Ottawa.
- 8E. Band PR, Gaudette LA, Hill GB, Holowaty EJ, Huchcroft SA, Johnston GM, Makomaski Iiling EM, Mao Y, Semenciw R. "The Making of the Canadian Cancer Registry: Cancer Incidence in Canada and its Regions, 1969 to 1988". Canadian Council of Cancer Registries, Health and Welfare Canada, Statistics Canada, Ottawa, 1993.
- 8F. Band PR, Gaudette LA, Hill GB, Holowaty EJ, Huchcroft SA, Johnston GM, Makomaski Iiling EM, Mao Y, Semenciw R. "Développement du registre canadien du cancer: Incidence du cancer au Canada et dans les régions, de 1969 à 1988". Conseil canadien des registres du cancer, Santé et Bien-être social Canada, Statistique Canada, Ottawa, 1993.

New Primary Sites of Cancer

Nouveaux sièges primaires de cancer

TABLE 1. New Primary Sites of Cancer by Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)
 TABLEAU 1. Nouveaux sièges primaires de cancer selon le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| | Canada | Nfld. | P.E.I. | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. |
|---------------------------------|---------|-------|--------|---|---------------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--------|
| | | | | N.S. T.-N.-É. | N.B. N.-B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alb. | C.-B. | | | | |
| Number of cases - Nombre de cas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Both sexes Les deux sexes | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 104,653 | 1,575 | 562 | 3,912 | 2,832 | 26,587 | 39,887 | 4,549 | 4,229 | 7,346 | 13,027 | 41 | 106 | | |
| 0-4 | 467 | 7 | 1 | 19 | 24 | 106 | 199 | 15 | 16 | 39 | 39 | 2 | - | | |
| 5-9 | 238 | 4 | - | 6 | 3 | 62 | 98 | 10 | 9 | 18 | 27 | - | 1 | | |
| 10-14 | 202 | 1 | 1 | 9 | 6 | 47 | 87 | 3 | 9 | 16 | 23 | - | - | | |
| 15-19 | 403 | 7 | 5 | 18 | 14 | 87 | 163 | 14 | 12 | 34 | 46 | 1 | 2 | | |
| 20-24 | 595 | 18 | 3 | 20 | 10 | 148 | 260 | 16 | 16 | 48 | 55 | - | - | | |
| 25-29 | 1,161 | 12 | 8 | 31 | 30 | 248 | 506 | 40 | 42 | 109 | 134 | - | 1 | | |
| 30-34 | 1,722 | 26 | 9 | 70 | 45 | 414 | 693 | 71 | 45 | 158 | 183 | 3 | 5 | | |
| 35-39 | 2,447 | 57 | 9 | 88 | 54 | 598 | 943 | 86 | 93 | 231 | 280 | 3 | 5 | | |
| 40-44 | 3,775 | 73 | 24 | 138 | 95 | 974 | 1,467 | 128 | 129 | 298 | 442 | 2 | 5 | | |
| 45-49 | 4,790 | 82 | 28 | 167 | 122 | 1,343 | 1,836 | 182 | 135 | 359 | 524 | 2 | 10 | | |
| 50-54 | 6,059 | 82 | 30 | 213 | 151 | 1,620 | 2,363 | 226 | 206 | 458 | 694 | 4 | 12 | | |
| 55-59 | 8,840 | 146 | 35 | 280 | 220 | 2,384 | 3,588 | 359 | 355 | 652 | 1,002 | 7 | 14 | | |
| 60-64 | 12,866 | 200 | 61 | 465 | 329 | 3,477 | 4,974 | 489 | 416 | 921 | 1,515 | 6 | 13 | | |
| 65-69 | 16,347 | 239 | 78 | 563 | 413 | 4,201 | 6,315 | 699 | 641 | 1,039 | 2,143 | 2 | 14 | | |
| 70-74 | 15,237 | 234 | 87 | 589 | 467 | 3,880 | 5,517 | 716 | 646 | 1,005 | 2,079 | 2 | 15 | | |
| 75-79 | 13,705 | 218 | 78 | 545 | 392 | 3,345 | 5,013 | 680 | 648 | 879 | 1,900 | 2 | 5 | | |
| 80-84 | 9,026 | 106 | 54 | 388 | 262 | 2,158 | 3,363 | 480 | 443 | 620 | 1,148 | 2 | 2 | | |
| 85+ | 6,723 | 63 | 51 | 303 | 195 | 1,495 | 2,653 | 335 | 370 | 461 | 793 | 2 | 2 | | |
| N.S./N.P. | 50 | - | - | - | - | - | 49 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Males Hommes | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 54,803 | 836 | 295 | 2,041 | 1,529 | 14,016 | 20,610 | 2,429 | 2,300 | 3,751 | 6,920 | 21 | 55 | | |
| 0-4 | 265 | 4 | 1 | 11 | 10 | 59 | 115 | 9 | 13 | 24 | 17 | 2 | - | | |
| 5-9 | 127 | 3 | - | 3 | - | 34 | 52 | 6 | 2 | 11 | 16 | - | - | | |
| 10-14 | 112 | - | 1 | 5 | 4 | 22 | 51 | 2 | 3 | 8 | 16 | - | - | | |
| 15-19 | 196 | 3 | 2 | 9 | 8 | 44 | 77 | 6 | 4 | 19 | 23 | - | 1 | | |
| 20-24 | 307 | 10 | 3 | 14 | 4 | 76 | 139 | 8 | 6 | 22 | 24 | 1 | - | | |
| 25-29 | 514 | 2 | 3 | 13 | 6 | 110 | 230 | 24 | 14 | 46 | 66 | - | - | | |
| 30-34 | 687 | 11 | 4 | 18 | 14 | 175 | 286 | 28 | 17 | 51 | 79 | 1 | 3 | | |
| 35-39 | 888 | 22 | 2 | 33 | 14 | 240 | 327 | 22 | 38 | 84 | 105 | - | 1 | | |
| 40-44 | 1,319 | 28 | 9 | 57 | 31 | 336 | 544 | 44 | 42 | 88 | 139 | - | 1 | | |
| 45-49 | 1,833 | 23 | 11 | 66 | 55 | 564 | 681 | 73 | 57 | 116 | 180 | 1 | 6 | | |
| 50-54 | 2,641 | 40 | 8 | 115 | 71 | 723 | 1,035 | 90 | 96 | 180 | 276 | 2 | 5 | | |
| 55-59 | 4,596 | 83 | 15 | 134 | 126 | 1,303 | 1,754 | 174 | 170 | 325 | 503 | 1 | 8 | | |
| 60-64 | 7,165 | 118 | 32 | 247 | 182 | 1,941 | 2,770 | 269 | 237 | 514 | 842 | 5 | 8 | | |
| 65-69 | 9,398 | 141 | 45 | 326 | 243 | 2,462 | 3,601 | 391 | 348 | 582 | 1,248 | 2 | 9 | | |
| 70-74 | 8,857 | 132 | 56 | 334 | 279 | 2,259 | 3,169 | 436 | 373 | 600 | 1,209 | 2 | 8 | | |
| 75-79 | 7,864 | 123 | 47 | 316 | 235 | 1,891 | 2,813 | 406 | 408 | 504 | 1,116 | 2 | 3 | | |
| 80-84 | 4,877 | 63 | 30 | 211 | 151 | 1,101 | 1,773 | 259 | 270 | 356 | 661 | 1 | 1 | | |
| 85+ | 3,132 | 30 | 26 | 129 | 96 | 676 | 1,169 | 182 | 202 | 220 | 400 | 1 | 1 | | |
| N.S./N.P. | 25 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Females Femmes | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 49,850 | 739 | 267 | 1,871 | 1,303 | 12,571 | 19,277 | 2,120 | 1,929 | 3,595 | 6,107 | 20 | 51 | | |
| 0-4 | 202 | 3 | - | 8 | 14 | 47 | 84 | 6 | 3 | 15 | 22 | - | - | | |
| 5-9 | 111 | 1 | - | 3 | 3 | 28 | 46 | 4 | 7 | 11 | - | - | 1 | | |
| 10-14 | 90 | 1 | - | 4 | 2 | 25 | 36 | 1 | 6 | 8 | 7 | - | - | | |
| 15-19 | 207 | 4 | 3 | 9 | 6 | 43 | 86 | 8 | 8 | 15 | 23 | 1 | 1 | | |
| 20-24 | 288 | 8 | - | 6 | 6 | 72 | 121 | 8 | 10 | 26 | 31 | - | - | | |
| 25-29 | 647 | 10 | 5 | 18 | 24 | 138 | 276 | 16 | 28 | 63 | 68 | - | 1 | | |
| 30-34 | 1,035 | 15 | 5 | 52 | 31 | 239 | 407 | 43 | 28 | 107 | 104 | 2 | 2 | | |
| 35-39 | 1,559 | 35 | 7 | 55 | 40 | 358 | 616 | 64 | 55 | 147 | 175 | 3 | 4 | | |
| 40-44 | 2,456 | 45 | 15 | 81 | 64 | 638 | 923 | 84 | 87 | 210 | 303 | 2 | 4 | | |
| 45-49 | 2,957 | 59 | 17 | 101 | 67 | 779 | 1,155 | 109 | 78 | 263 | 344 | 1 | 4 | | |
| 50-54 | 3,418 | 42 | 22 | 98 | 80 | 897 | 1,328 | 136 | 110 | 278 | 418 | 2 | 7 | | |
| 55-59 | 4,244 | 63 | 20 | 146 | 94 | 1,081 | 1,634 | 185 | 183 | 327 | 499 | 6 | 6 | | |
| 60-64 | 5,701 | 82 | 29 | 218 | 147 | 1,536 | 2,204 | 220 | 179 | 407 | 673 | 1 | 5 | | |
| 65-69 | 6,949 | 98 | 33 | 237 | 170 | 1,739 | 2,714 | 308 | 293 | 457 | 895 | - | 5 | | |
| 70-74 | 6,380 | 102 | 31 | 255 | 188 | 1,621 | 2,348 | 280 | 273 | 405 | 870 | - | 7 | | |
| 75-79 | 5,841 | 95 | 31 | 229 | 157 | 1,454 | 2,200 | 274 | 240 | 375 | 784 | - | 2 | | |
| 80-84 | 4,149 | 43 | 24 | 177 | 111 | 1,057 | 1,590 | 221 | 173 | 264 | 487 | 1 | 1 | | |
| 85+ | 3,591 | 33 | 25 | 174 | 99 | 819 | 1,484 | 153 | 168 | 241 | 393 | 1 | 1 | | |
| N.S./N.P. | 25 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) Table includes all cancers except "other skin cancer" (ICD-9 140 to 208, excluding 173).

(1) Le tableau inclus tous les cancers sauf "autres cancers de la peau" (CIM-9 140 à 208, excluant 173).

(2) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(2) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

TABLE 1. New Primary Sites of Cancer by Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)
 TABLEAU 1. Nouveaux sièges primaires de cancer selon le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | | N.W.T. | |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | | |
| T.-N. I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | | | | | | | Alb. | C.-B. | | T.N.-O. | |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | |
| Both sexes Les deux sexes | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 376.6 | 272.1 | 428.9 | 428.7 | 381.2 | 378.7 | 385.7 | 410.4 | 418.4 | 287.4 | 394.7 | 146.3 | 178.6 |
| 0-4 | 24.1 | 18.2 | 10.2 | 30.8 | 48.8 | 23.9 | 27.6 | 18.0 | 19.8 | 18.4 | 17.4 | 80.5 | - |
| 5-9 | 12.3 | 9.0 | - | 9.7 | 5.8 | 13.3 | 14.0 | 12.4 | 10.9 | 8.8 | 11.9 | - | 16.1 |
| 10-14 | 10.7 | 2.0 | 10.0 | 14.3 | 10.9 | 9.7 | 13.1 | 3.8 | 11.4 | 8.7 | 10.8 | - | - |
| 15-19 | 20.8 | 12.7 | 48.8 | 26.0 | 23.4 | 18.8 | 22.7 | 17.1 | 16.2 | 18.7 | 21.2 | 51.2 | 39.0 |
| 20-24 | 27.7 | 35.5 | 30.5 | 27.8 | 17.2 | 28.3 | 31.5 | 19.0 | 22.6 | 23.4 | 23.0 | 47.4 | - |
| 25-29 | 44.6 | 24.0 | 72.9 | 37.1 | 45.2 | 37.7 | 50.5 | 40.5 | 49.5 | 42.9 | 46.5 | - | 15.2 |
| 30-34 | 67.6 | 53.1 | 84.7 | 87.0 | 69.7 | 62.6 | 73.9 | 75.2 | 53.2 | 61.1 | 61.4 | 95.5 | 86.7 |
| 35-39 | 106.8 | 120.4 | 91.9 | 121.7 | 89.1 | 100.1 | 112.7 | 100.7 | 123.8 | 104.9 | 100.6 | 99.9 | 107.5 |
| 40-44 | 183.0 | 171.9 | 251.8 | 206.7 | 171.2 | 179.8 | 191.2 | 169.5 | 207.6 | 164.5 | 173.4 | 80.6 | 131.6 |
| 45-49 | 299.4 | 267.8 | 612.3 | 327.3 | 296.6 | 304.8 | 311.0 | 313.0 | 279.0 | 267.6 | 269.5 | 114.9 | 600.6 |
| 50-54 | 465.9 | 334.8 | 505.4 | 508.2 | 459.5 | 469.0 | 480.6 | 467.5 | 482.4 | 425.0 | 443.7 | 347.5 | 647.2 |
| 55-59 | 713.4 | 664.4 | 635.6 | 712.3 | 716.8 | 719.1 | 722.0 | 766.9 | 815.4 | 656.5 | 672.6 | 726.9 | 970.9 |
| 60-64 | 1,089.8 | 982.1 | 1,184.7 | 1,264.2 | 1,117.3 | 1,117.5 | 1,103.0 | 1,047.2 | 954.2 | 1,032.5 | 1,040.7 | 890.2 | 1,351.4 |
| 65-69 | 1,529.5 | 1,347.5 | 1,577.7 | 1,588.9 | 1,460.2 | 1,564.7 | 1,541.2 | 1,524.2 | 1,539.7 | 1,560.8 | 1,538.5 | 441.5 | 2,232.9 |
| 70-74 | 1,908.3 | 1,545.3 | 2,011.6 | 1,963.4 | 2,051.0 | 1,978.0 | 1,894.7 | 1,949.7 | 1,794.1 | 1,760.0 | 1,930.9 | 694.4 | 3,658.5 |
| 75-79 | 2,257.6 | 1,937.8 | 2,170.3 | 2,379.6 | 2,239.4 | 2,315.0 | 2,255.4 | 2,287.0 | 2,246.8 | 2,050.3 | 2,285.7 | 1,111.1 | 1,730.1 |
| 80-84 | 2,462.7 | 1,767.6 | 2,434.6 | 2,853.2 | 2,469.1 | 2,488.8 | 2,480.3 | 2,608.0 | 2,472.2 | 2,523.4 | 2,366.2 | 2,127.7 | 1,190.5 |
| 85+ | 2,434.6 | 1,480.3 | 2,659.0 | 2,897.9 | 2,375.4 | 2,491.5 | 2,521.8 | 2,267.5 | 2,575.0 | 2,227.5 | 2,198.6 | 3,333.3 | 1,470.6 |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Males Hommes | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 397.7 | 287.8 | 454.4 | 452.4 | 414.7 | 405.0 | 403.2 | 441.5 | 455.9 | 290.8 | 421.2 | 143.0 | 177.0 |
| 0-4 | 26.8 | 20.4 | 20.1 | 34.9 | 39.6 | 26.0 | 31.1 | 21.1 | 31.4 | 22.1 | 14.8 | 157.4 | - |
| 5-9 | 12.8 | 13.3 | - | 9.5 | - | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 4.8 | 10.4 | 13.8 | - | - |
| 10-14 | 11.6 | - | 19.4 | 15.5 | 14.1 | 8.9 | 14.9 | 5.0 | 7.5 | 8.4 | 14.7 | - | - |
| 15-19 | 19.8 | 10.5 | 37.7 | 25.3 | 26.1 | 18.7 | 21.0 | 14.2 | 10.6 | 20.5 | 20.8 | - | 38.2 |
| 20-24 | 28.2 | 39.0 | 60.6 | 38.2 | 13.5 | 28.5 | 33.3 | 18.5 | 16.6 | 21.3 | 19.8 | 91.7 | - |
| 25-29 | 38.9 | 8.0 | 54.2 | 30.7 | 17.9 | 32.8 | 45.3 | 47.5 | 32.5 | 35.8 | 45.1 | - | - |
| 30-34 | 53.4 | 45.3 | 76.4 | 44.6 | 43.1 | 52.3 | 60.8 | 57.9 | 39.4 | 38.3 | 53.0 | 64.0 | 98.0 |
| 35-39 | 77.4 | 92.7 | 40.9 | 92.0 | 46.3 | 80.1 | 79.0 | 51.4 | 98.5 | 79.1 | 75.2 | - | 39.6 |
| 40-44 | 126.8 | 129.8 | 187.4 | 169.7 | 109.7 | 123.5 | 141.6 | 115.4 | 131.7 | 94.8 | 107.1 | - | 47.3 |
| 45-49 | 227.0 | 147.2 | 319.8 | 255.5 | 261.0 | 256.3 | 229.0 | 248.5 | 233.5 | 169.0 | 181.1 | 97.7 | 432.6 |
| 50-54 | 403.8 | 318.6 | 267.3 | 545.3 | 427.9 | 423.3 | 418.5 | 370.9 | 447.9 | 326.1 | 344.7 | 315.5 | 489.7 |
| 55-59 | 744.1 | 735.0 | 538.0 | 690.8 | 836.3 | 809.0 | 748.8 | 783.7 | 637.3 | 657.7 | 180.8 | 995.0 | - |
| 60-64 | 1,256.4 | 1,162.7 | 1,252.0 | 1,412.6 | 1,299.5 | 1,327.0 | 1,268.5 | 1,194.4 | 1,107.3 | 1,150.4 | 1,171.2 | 1,201.9 | 1,462.5 |
| 65-69 | 1,924.2 | 1,618.6 | 1,940.5 | 1,988.4 | 1,864.2 | 2,050.4 | 1,932.3 | 1,887.2 | 1,760.8 | 1,623.7 | 1,932.3 | 787.4 | 2,571.4 |
| 70-74 | 2,543.8 | 1,859.2 | 2,891.1 | 2,525.1 | 2,740.9 | 2,747.1 | 2,494.7 | 2,674.8 | 2,278.8 | 2,318.4 | 2,542.1 | 1,428.6 | 3,493.4 |
| 75-79 | 3,156.5 | 2,499.5 | 3,098.2 | 3,320.4 | 3,183.9 | 3,379.7 | 3,086.1 | 3,261.8 | 3,279.5 | 2,786.4 | 3,145.5 | 2,222.2 | 1,960.8 |
| 80-84 | 3,586.2 | 2,595.8 | 3,363.2 | 4,006.8 | 3,759.0 | 3,686.5 | 3,626.5 | 3,668.6 | 3,663.0 | 3,337.7 | 3,405.3 | 2,173.9 | 1,204.8 |
| 85+ | 3,715.0 | 2,093.5 | 4,220.8 | 4,153.3 | 3,799.0 | 3,943.5 | 3,875.9 | 3,883.9 | 3,797.0 | 3,022.4 | 3,346.2 | 3,846.2 | 1,754.6 |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Females Femmes | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 355.8 | 256.2 | 403.9 | 405.5 | 348.1 | 353.2 | 368.6 | 379.7 | 381.0 | 283.8 | 368.5 | 149.9 | 180.4 |
| 0-4 | 21.4 | 15.8 | - | 26.4 | 58.6 | 21.7 | 23.9 | 14.7 | 7.6 | 14.5 | 20.1 | - | - |
| 5-9 | 11.7 | 4.6 | - | 9.9 | 11.8 | 12.3 | 13.5 | 10.2 | 17.3 | 7.0 | 9.9 | - | 33.3 |
| 10-14 | 9.8 | 4.2 | - | 13.0 | 7.5 | 10.6 | 11.1 | 2.6 | 15.6 | 8.9 | 6.8 | - | - |
| 15-19 | 21.9 | 15.0 | 60.7 | 26.7 | 20.5 | 19.0 | 24.6 | 20.1 | 21.9 | 16.9 | 21.5 | 106.4 | 39.8 |
| 20-24 | 27.2 | 32.0 | - | 17.0 | 20.9 | 28.1 | 29.6 | 19.5 | 28.7 | 25.7 | 26.3 | - | - |
| 25-29 | 50.4 | 39.9 | 91.8 | 43.7 | 73.0 | 43.0 | 55.8 | 33.2 | 66.8 | 50.3 | 47.6 | - | 31.1 |
| 30-34 | 82.0 | 60.8 | 92.7 | 129.7 | 96.7 | 73.1 | 87.1 | 93.4 | 67.5 | 85.2 | 69.9 | 126.7 | 73.9 |
| 35-39 | 136.3 | 148.2 | 142.8 | 151.0 | 131.7 | 120.1 | 145.8 | 150.2 | 150.6 | 137.7 | 126.1 | 208.6 | 188.1 |
| 40-44 | 240.2 | 215.3 | 317.1 | 244.1 | 235.2 | 236.7 | 241.0 | 224.7 | 287.6 | 237.7 | 242.3 | 170.8 | 237.5 |
| 45-49 | 373.2 | 393.4 | 507.3 | 400.8 | 333.9 | 353.1 | 394.3 | 378.7 | 325.4 | 370.9 | 361.9 | 139.5 | 360.7 |
| 50-54 | 528.6 | 351.7 | 747.5 | 470.7 | 491.7 | 513.7 | 543.5 | 565.0 | 517.0 | 528.8 | 547.6 | 386.8 | 840.3 |
| 55-59 | 683.0 | 589.7 | 735.6 | 733.2 | 601.6 | 634.2 | 695.3 | 786.8 | 847.2 | 676.7 | 688.2 | 1,463.4 | 940.4 |
| 60-64 | 934.2 | 802.7 | 1,118.4 | 1,129.7 | 952.0 | 931.6 | 947.6 | 910.0 | 806.6 | 914.2 | 913.4 | 387.6 | 1,204.8 |
| 65-69 | 1,197.3 | 1,085.8 | 1,257.1 | 1,244.9 | 1,114.8 | 1,171.8 | 1,215.0 | 1,225.9 | 1,339.9 | 1,128.1 | 1,198.1 | - | 1,805.1 |
| 70-74 | 1,416.9 | 1,265.5 | 1,298.2 | 1,520.4 | 1,493.2 | 1,422.9 | 1,430.3 | 1,371.0 | 1,390.2 | 1,270.4 | 1,447.4 | - | 3,867.4 |
| 75-79 | 1,632.0 | 1,501.0 | 1,492.5 | 1,710.7 | 1,550.8 | 1,642.2 | 1,677.9 | 1,585.1 | 1,463.4 | 1,513.1 | 1,645.5 | - | 1,470.6 |
| 80-84 | 1,799.9 | 1,204.5 | 1,810.0 | 2,124.1 | 1,683.3 | 1,859.5 | 1,834.0 | 1,948.0 | 1,640.1 | 1,648.0 | 1,673.3 | 2,083.3 | 1,176.5 |
| 85+ | 1,871.9 | 1,169.0 | 1,920.1 | 2,367.3 | 1,742.3 | 1,910.8 | 1,977.6 | 1,516.7 | 1,856.6 | 1,796.2 | 1,629.8 | 2,941.2 | 1,265.8 |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) Table includes all cancers except "other skin cancer" (ICD-9 140 to 208, excluding 173).

(1) Le tableau inclus tous les cancers sauf "autres cancers de la peau" (CIM-9 140 à 208, excluant 173).

(2) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(2) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

TABLE 2. New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 2. Nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| | Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. | | | | | |
|---|--------|---|--------|------------------------|---------------|---------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--------|--|--|--|--|--|
| | | Nfld. | P.E.I. | N.S. T.-N. I.-P.-É. | N.B. N.-É. | Qué. N.-B. | Ont. | Man. | Sask. | Alb. | C.-B. | | | | | | | | | |
| Number of cases - Nombre de cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 to 208 (excl. 173) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| All cancers except "other skin cancer" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 à 208 (excl. 173) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tous les cancers à l'exception des "autres cancers de la peau" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 54,803 | 836 | 295 | 2,041 | 1,529 | 14,816 | 20,610 | 2,429 | 2,300 | 3,751 | 6,920 | 21 | 55 | | | | | | | |
| 0-24 | 1,007 | 20 | 7 | 42 | 26 | 235 | 434 | 31 | 28 | 84 | 96 | 3 | 1 | | | | | | | |
| 25-34 | 1,201 | 13 | 7 | 31 | 20 | 285 | 516 | 52 | 31 | 97 | 145 | 1 | 3 | | | | | | | |
| 35-44 | 2,207 | 50 | 11 | 90 | 45 | 576 | 871 | 66 | 80 | 172 | 244 | - | 2 | | | | | | | |
| 45-54 | 4,474 | 63 | 19 | 181 | 126 | 1,287 | 1,716 | 163 | 153 | 296 | 456 | 3 | 11 | | | | | | | |
| 55-64 | 11,761 | 201 | 47 | 381 | 308 | 3,244 | 4,524 | 443 | 407 | 839 | 1,345 | 6 | 16 | | | | | | | |
| 65-74 | 18,255 | 273 | 101 | 660 | 522 | 6,721 | 6,770 | 827 | 721 | 1,182 | 2,457 | 4 | 17 | | | | | | | |
| 75-84 | 12,701 | 186 | 77 | 527 | 386 | 2,992 | 4,586 | 665 | 678 | 860 | 1,777 | 3 | 4 | | | | | | | |
| 85+ | 3,132 | 30 | 26 | 129 | 96 | 676 | 1,169 | 182 | 202 | 220 | 400 | 1 | 1 | | | | | | | |
| N.S./N.P. | 25 | - | - | - | - | 24 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 140 Lip | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 Lèvre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 588 | 38 | 10 | 24 | 21 | 83 | 202 | 50 | 64 | 53 | 43 | - | - | - | - | | | | | |
| 0-24 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 25-34 | 6 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 35-44 | 25 | 4 | - | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | | | | | |
| 45-54 | 59 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 28 | 6 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | | | | | |
| 55-64 | 124 | 5 | 3 | 2 | 4 | 16 | 54 | 7 | 13 | 13 | 7 | - | - | - | - | | | | | |
| 65-74 | 178 | 18 | - | 7 | 7 | 20 | 59 | 14 | 19 | 19 | 15 | - | - | - | - | | | | | |
| 75-84 | 156 | 6 | 4 | 7 | 3 | 31 | 40 | 15 | 19 | 16 | 15 | - | - | - | - | | | | | |
| 85+ | 38 | - | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | | | | | |
| N.S./N.P. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 141 Tongue | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 Langue | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 381 | 5 | 2 | 10 | 5 | 98 | 164 | 13 | 10 | 25 | 49 | - | - | - | - | | | | | |
| 0-24 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 25-34 | 13 | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | | | | | |
| 35-44 | 29 | 3 | - | - | - | 5 | 10 | 3 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | | | | | |
| 45-54 | 69 | - | - | 1 | 1 | 28 | 29 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | | | | | |
| 55-64 | 122 | - | 2 | 5 | 2 | 27 | 61 | 2 | 3 | 8 | 12 | - | - | - | - | | | | | |
| 65-74 | 97 | 1 | - | 2 | 1 | 23 | 45 | 3 | 3 | 7 | 12 | - | - | - | - | | | | | |
| 75-84 | 35 | 1 | - | 1 | 1 | 7 | 12 | 2 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | | | | | |
| 85+ | 13 | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | | | | | |
| N.S./N.P. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 142 Major salivary glands | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 Glandes salivaires principales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 128 | 3 | - | 4 | 8 | 41 | 46 | 6 | 6 | 1 | 14 | - | - | - | - | | | | | |
| 0-24 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 25-34 | 12 | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | | | | | |
| 35-44 | 12 | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 45-54 | 14 | 1 | - | - | - | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 55-64 | 23 | - | - | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | | | | | |
| 65-74 | 30 | - | - | - | 3 | 13 | 9 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | | | | | |
| 75-84 | 27 | 2 | - | 1 | - | 7 | 14 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 85+ | 9 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 143 Gum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 Gencives | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 42 | - | - | 1 | 2 | 18 | 17 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 25-34 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 35-44 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 45-54 | 5 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | | | | |
| 55-64 | 10 | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 65-74 | 12 | - | - | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | | | | | |
| 75-84 | 11 | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | | | | | |
| 85+ | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

TABLE 2. New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 2. Nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| | Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Province of residence - Province de résidence | | | | | | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. | | | | | | | | | | |
|---|--------|-------|--------|-------|-------|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alb. | C.-B. | | | | | | | | | | | | | | |
| Number of cases - Nombre de cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 to 208 (excl. 173) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| All cancers except "other skin cancer" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 à 208 (excl. 173) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tous les cancers à l'exception des "autres cancers de la peau" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 49,850 | 739 | 267 | 1,871 | 1,383 | 12,571 | 19,277 | 2,120 | 1,929 | 3,595 | 6,107 | 20 | 51 | | | | | | | | | | | | |
| 0-24 | 898 | 17 | 3 | 30 | 31 | 215 | 373 | 27 | 34 | 71 | 94 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 25-34 | 1,682 | 25 | 10 | 70 | 55 | 377 | 683 | 59 | 56 | 170 | 172 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 35-44 | 4,015 | 80 | 22 | 136 | 104 | 996 | 1,539 | 148 | 142 | 357 | 478 | 5 | 8 | | | | | | | | | | | | |
| 45-54 | 6,375 | 101 | 39 | 199 | 147 | 1,676 | 2,483 | 245 | 188 | 521 | 762 | 3 | 11 | | | | | | | | | | | | |
| 55-64 | 9,945 | 145 | 49 | 364 | 241 | 2,617 | 3,838 | 405 | 362 | 734 | 1,172 | 7 | 11 | | | | | | | | | | | | |
| 65-74 | 13,329 | 200 | 64 | 492 | 358 | 3,360 | 5,062 | 588 | 566 | 862 | 1,765 | - | 12 | | | | | | | | | | | | |
| 75-84 | 9,990 | 138 | 55 | 406 | 268 | 2,511 | 3,790 | 495 | 413 | 639 | 1,271 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 85+ | 3,591 | 33 | 25 | 174 | 99 | 819 | 1,484 | 153 | 168 | 241 | 393 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | | 25 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 140 Lip | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 Lèvre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 129 | 2 | - | 1 | 1 | 21 | 73 | 3 | 5 | 15 | 8 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 25-34 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 35-44 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 45-54 | 12 | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 55-64 | 20 | 1 | - | 1 | - | 5 | 8 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 65-74 | 29 | - | - | - | 1 | 2 | 17 | - | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 75-84 | 40 | - | - | - | - | 5 | 26 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 85+ | 22 | - | - | - | - | 5 | 14 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 141 Tongue | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 Langue | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 154 | 1 | 1 | 3 | 2 | 27 | 62 | 11 | 6 | 10 | 30 | - | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 0-24 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 25-34 | 6 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 35-44 | 12 | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 45-54 | 14 | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 55-64 | 36 | 1 | 1 | - | 2 | 7 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 65-74 | 40 | - | - | 1 | - | 11 | 12 | 2 | 2 | 1 | 11 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 75-84 | 29 | - | - | 1 | - | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 85+ | 12 | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 142 Major salivary glands | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 Glandes salivaires principales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 102 | 2 | 1 | 4 | 3 | 21 | 46 | 4 | 3 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 0-24 | 8 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 25-34 | 10 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 35-44 | 12 | - | - | - | - | 6 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 45-54 | 11 | 2 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 55-64 | 17 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 65-74 | 21 | - | - | - | - | 5 | 11 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 75-84 | 16 | - | - | 1 | - | - | 12 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 85+ | 7 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 143 Gum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 Gencives | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 33 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 25-34 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 35-44 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 45-54 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 55-64 | 7 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 65-74 | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 75-84 | 11 | - | - | 1 | - | 1 | 5 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 85+ | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |

TABLE 2. New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 2. Nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| | Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | Province of residence - Province de résidence | | | | | | B.C. | Yukon | N.W.T. | | | | | | | | |
|---|--------|-------|--------|------|---|------|------|------|------|-------|------|-------|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | N.-E. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | | | | | | | | | | | |
| Number of cases - Nombre de cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 Floor of mouth | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 Plancher de la bouche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 206 | 4 | 1 | 8 | 3 | 58 | 88 | 6 | 6 | 13 | 27 | - | - | - | | | | | | | |
| 0-24 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 25-34 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | | | | | | |
| 35-44 | 13 | - | - | 1 | - | 4 | 6 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | | | | | | | |
| 45-54 | 36 | 2 | - | 3 | 1 | 10 | 12 | 3 | 1 | - | 4 | - | - | - | | | | | | | |
| 55-64 | 68 | 1 | - | 3 | - | 17 | 27 | 3 | 1 | 6 | 10 | - | - | - | | | | | | | |
| 65-74 | 56 | - | - | 1 | - | 19 | 22 | - | 4 | 3 | 7 | - | - | - | | | | | | | |
| 75-84 | 28 | 1 | 1 | - | - | 8 | 12 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | | | | | | | |
| 85+ | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 145 Other and unspecified parts of mouth | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 Autre parties non précisée de la bouche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 191 | 3 | 1 | 14 | 5 | 47 | 69 | 10 | 4 | 11 | 27 | - | - | - | | | | | | | |
| 0-24 | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | | | | | | | |
| 25-34 | 6 | - | - | - | - | 4 | 8 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | | | | | | | |
| 35-44 | 15 | - | - | - | - | 11 | 9 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | | | | | | | |
| 45-54 | 32 | - | - | 5 | 2 | 12 | 27 | 6 | 1 | 4 | 12 | - | - | - | | | | | | | |
| 55-64 | 67 | 2 | - | 3 | - | 4 | 17 | 3 | - | 2 | 6 | - | - | - | | | | | | | |
| 65-74 | 65 | 1 | - | 3 | 1 | 12 | 17 | - | 3 | 1 | 4 | - | - | - | | | | | | | |
| 75-84 | 22 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | - | 3 | 1 | 4 | - | - | - | | | | | | | |
| 85+ | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 146 Oropharynx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 Rhinopharynx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 223 | 4 | 2 | 9 | 6 | 66 | 83 | 12 | 8 | 6 | 27 | - | - | - | | | | | | | |
| 0-24 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 25-34 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 35-44 | 20 | - | - | 1 | - | 5 | 13 | - | - | - | 1 | - | - | - | | | | | | | |
| 45-54 | 32 | 1 | - | - | 1 | 13 | 14 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | | | | | | | |
| 55-64 | 73 | 2 | - | 1 | 2 | 20 | 24 | 7 | 4 | - | 13 | - | - | - | | | | | | | |
| 65-74 | 70 | 1 | 2 | 5 | 2 | 17 | 23 | 3 | 1 | 5 | 11 | - | - | - | | | | | | | |
| 75-84 | 21 | - | - | 1 | 1 | 9 | 7 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | | | | | | | |
| 85+ | 5 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 147 Nasopharynx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 Rhinopharynx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 123 | 2 | - | - | 2 | 30 | 47 | 4 | 2 | 12 | 20 | - | 4 | - | | | | | | | |
| 0-24 | 6 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | | | | | | | |
| 25-34 | 12 | - | - | - | - | 1 | 9 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | | | | | | | |
| 35-44 | 29 | - | - | - | - | 6 | 10 | - | 2 | 2 | 9 | - | - | - | | | | | | | |
| 45-54 | 19 | - | - | - | - | 4 | 6 | 2 | - | 5 | - | - | 2 | - | | | | | | | |
| 55-64 | 31 | 1 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 7 | 2 | - | 1 | - | | | | | | | |
| 65-74 | 17 | 1 | - | - | - | 5 | 5 | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | | | | | | | |
| 75-84 | 8 | - | - | - | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | | | | | | | |
| 85+ | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 148 Hypopharynx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 195 | 5 | - | 13 | 3 | 63 | 56 | 14 | 18 | 11 | 20 | - | - | - | | | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 25-34 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 35-44 | 7 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | | | | | | | |
| 45-54 | 26 | 1 | - | 2 | - | 12 | 4 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | | | | | | | |
| 55-64 | 65 | 3 | - | 4 | 3 | 27 | 17 | 5 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | | | | | | | |
| 65-74 | 68 | 1 | - | 3 | 3 | 15 | 25 | 4 | 3 | 5 | 9 | - | - | - | | | | | | | |
| 75-84 | 27 | - | - | 3 | - | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | | | | | | | |
| 85+ | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 149 Other and ill-defined sites | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 Sièges autres et mal définis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 92 | 2 | 1 | 3 | - | 30 | 39 | 4 | 3 | 3 | 7 | - | - | - | | | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 25-34 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 35-44 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 45-54 | 18 | 1 | - | - | - | 2 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 55-64 | 31 | - | - | 2 | - | 10 | 9 | 1 | - | 3 | 6 | - | - | - | | | | | | | |
| 65-74 | 34 | 1 | 1 | 1 | - | 11 | 16 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | | | | | | | |
| 75-84 | 12 | - | - | - | - | 6 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 85+ | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |

TABLE 2. New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 2. Nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| | Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. T.-N. I.-P.-É. | N.B. N.-É. | Province of residence - Province de résidence | | | | | | Alta. | B.C. C.-B. | Yukon | N.W.T. T.N.-O. | | | | | | | | | | |
|---|--------|-------|--------|------------------------|---------------|---|------|------|-------|---|----|-------|---------------|-------|-------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Number of cases - Nombre de cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 Floor of mouth | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 Plancher de la bouche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 89 | - | - | 1 | 1 | 1 | 18 | 45 | 2 | 5 | 4 | 12 | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 0-24 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 25-34 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 35-44 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 45-54 | 12 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 55-64 | 29 | - | - | 1 | - | - | 7 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 65-74 | 24 | - | - | - | 1 | - | 3 | 13 | - | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 75-84 | 15 | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 85+ | 6 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 145 Other and unspecified parts of mouth | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 Autre parties non précisée de la bouche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 123 | 3 | - | 8 | 5 | 20 | 62 | 3 | 5 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 0-24 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 25-34 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 35-44 | 8 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 45-54 | 18 | - | - | 2 | - | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 55-64 | 25 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 14 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 65-74 | 33 | 2 | - | 1 | 1 | 6 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 75-84 | 26 | - | - | 2 | 3 | 4 | 10 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 85+ | 9 | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 146 Oropharynx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 101 | 1 | - | 6 | 3 | 18 | 45 | 5 | 1 | 4 | 18 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 0-24 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 25-34 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 35-44 | 8 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 45-54 | 14 | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 55-64 | 28 | - | - | 2 | 1 | 3 | 16 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 65-74 | 29 | - | - | 3 | - | 5 | 12 | 2 | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 75-84 | 16 | - | - | - | - | 4 | 8 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 85+ | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 147 Nasopharynx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 Rhinopharynx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 48 | - | - | - | - | - | 8 | 21 | 2 | 1 | 2 | 12 | - | - | - | 2 | | | | | | | | | |
| 0-24 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 25-34 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 35-44 | 12 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | | | | | | | | | |
| 45-54 | 10 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 55-64 | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | | | | | | | | | |
| 65-74 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 75-84 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 85+ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 148 Hypopharynx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 34 | - | - | 3 | 1 | 12 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 35-44 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 45-54 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 55-64 | 11 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 65-74 | 13 | - | - | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 75-84 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 85+ | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 149 Other and ill-defined sites | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 Sièges autres et mal définis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 34 | 1 | - | 4 | 2 | 6 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 0-24 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 25-34 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 35-44 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 45-54 | 8 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 55-64 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 65-74 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 75-84 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 85+ | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |

TABLE 2. New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 2. Nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| | Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Province of residence - Province de résidence | | | | | | N.W.T. | | | | | | |
|--|--------|----------------|--------|-------|------|---|-------|------|-------|-------|------|--------|---|---|--|--|--|--|
| | | | | | | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | | | | | | | |
| | | T.-N. I.-P.-É. | N.-E. | N.-B. | | Number of cases - Nombre de cas | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 Esophagus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 Oesophage | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 693 | 15 | 6 | 22 | 18 | 184 | 273 | 30 | 30 | 27 | 89 | - | - | 1 | | | | |
| 0-24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | | | | |
| 25-34 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 35-44 | 11 | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | | | | |
| 45-54 | 69 | - | - | 4 | 3 | 17 | 28 | 2 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | | | | |
| 55-64 | 164 | 2 | - | 6 | 3 | 46 | 78 | 6 | 3 | 5 | 15 | - | - | - | | | | |
| 65-74 | 259 | 9 | 2 | 8 | 6 | 76 | 96 | 12 | 8 | 10 | 31 | - | - | 1 | | | | |
| 75-84 | 157 | 4 | 2 | 3 | 6 | 39 | 51 | 8 | 12 | 4 | 28 | - | - | - | | | | |
| 85+ | 30 | - | - | 1 | - | 4 | 14 | 1 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 151 Stomach | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 Estomac | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1,856 | 60 | 11 | 87 | 56 | 481 | 636 | 90 | 71 | 129 | 232 | - | - | 3 | | | | |
| 0-24 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | | | | |
| 25-34 | 14 | - | - | 1 | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | | | | |
| 35-44 | 64 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 26 | 4 | - | 7 | 9 | - | - | - | | | | |
| 45-54 | 165 | 3 | - | 7 | 3 | 40 | 67 | 7 | 5 | 13 | 19 | - | - | 1 | | | | |
| 55-64 | 375 | 14 | 1 | 16 | 8 | 98 | 133 | 17 | 11 | 29 | 45 | - | - | 1 | | | | |
| 65-74 | 620 | 22 | 5 | 23 | 22 | 146 | 227 | 27 | 28 | 39 | 80 | - | - | - | | | | |
| 75-84 | 487 | 14 | 4 | 28 | 19 | 137 | 141 | 27 | 21 | 32 | 64 | - | - | - | | | | |
| 85+ | 127 | 5 | - | 10 | 2 | 41 | 36 | 7 | 5 | 8 | 13 | - | - | - | | | | |
| N.S./N.P. | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 152 Small intestine, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>including duodenum</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 Intestin grêle, y compris le duodénum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 142 | 3 | - | 5 | 3 | 42 | 46 | 7 | 12 | 9 | 15 | - | - | - | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 35-44 | 7 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 45-54 | 17 | 1 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | | | | |
| 55-64 | 40 | 2 | - | 1 | 1 | 16 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | | | | |
| 65-74 | 40 | - | - | 2 | - | 8 | 14 | 1 | 7 | 2 | 6 | - | - | - | | | | |
| 75-84 | 29 | - | - | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | | | | |
| 85+ | 9 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 153 Colon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 Colon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 4,736 | 86 | 25 | 200 | 137 | 1,081 | 2,047 | 216 | 206 | 273 | 461 | 2 | 6 | | | | | |
| 0-24 | 4 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 25-34 | 36 | - | - | 1 | - | 14 | 14 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | | | | |
| 35-44 | 160 | 2 | 2 | 6 | 2 | 39 | 67 | 5 | 8 | 10 | 19 | - | - | 2 | | | | |
| 45-54 | 371 | 13 | 2 | 23 | 5 | 90 | 153 | 16 | 14 | 23 | 30 | - | - | 2 | | | | |
| 55-64 | 1,042 | 20 | 6 | 37 | 33 | 255 | 472 | 31 | 37 | 70 | 79 | 1 | - | 1 | | | | |
| 65-74 | 1,572 | 27 | 7 | 68 | 52 | 375 | 696 | 63 | 47 | 75 | 163 | - | - | - | | | | |
| 75-84 | 1,228 | 21 | 7 | 54 | 34 | 253 | 509 | 72 | 72 | 78 | 128 | - | - | - | | | | |
| 85+ | 322 | 3 | 1 | 11 | 11 | 55 | 134 | 27 | 26 | 14 | 40 | - | - | - | | | | |
| N.S./N.P. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 154 Rectum, rectosigmoid junction and anus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 Rectum, jonction recto-sigmoidienne et anus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2,700 | 45 | 12 | 113 | 62 | 755 | 969 | 116 | 112 | 191 | 341 | 2 | 2 | | | | | |
| 0-24 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | | | | | |
| 25-34 | 7 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | | | | | |
| 35-44 | 98 | 3 | - | 5 | 3 | 28 | 37 | 3 | 1 | 8 | 10 | - | - | | | | | |
| 45-54 | 272 | 2 | 1 | 11 | 7 | 95 | 83 | 12 | 12 | 19 | 28 | 1 | 1 | | | | | |
| 55-64 | 666 | 10 | 1 | 21 | 12 | 203 | 249 | 25 | 15 | 60 | 70 | - | - | | | | | |
| 65-74 | 949 | 17 | 6 | 45 | 21 | 257 | 336 | 36 | 40 | 53 | 137 | - | - | 1 | | | | |
| 75-84 | 568 | 11 | 3 | 26 | 15 | 143 | 193 | 31 | 30 | 42 | 74 | - | - | - | | | | |
| 85+ | 136 | 2 | 1 | 5 | 3 | 27 | 47 | 8 | 14 | 8 | 20 | 1 | - | - | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |

TABLE 2. New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 2. Nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| | Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | Yukon | N.W.T. | | | |
|---|--------|---|--------|------------------------|---------------|---------------|-------|------|-------|-------|---------------|-------|--------|--|--|--|
| | | Nfld. | P.E.I. | N.S. T.-N. I.-P.-É. | N.B. N.-É. | Qué. N.-B. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. C.-B. | | | | | |
| Number of cases - Nombre de cas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 Esophagus | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150.0 Esophage | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 299 | 1 | - | 12 | 7 | 67 | 124 | 13 | 13 | 12 | 50 | - | - | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 25-34 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 35-44 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 45-54 | 12 | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | 1 | 2 | - | - | | | |
| 55-64 | 56 | - | - | - | - | 15 | 22 | 3 | 1 | 3 | 12 | - | - | | | |
| 65-74 | 97 | 1 | - | 6 | 5 | 21 | 42 | 5 | 3 | 4 | 10 | - | - | | | |
| 75-84 | 88 | - | - | 3 | 2 | 19 | 33 | 3 | 4 | 3 | 21 | - | - | | | |
| 85+ | 43 | - | - | 3 | - | 7 | 20 | 2 | 5 | 1 | 5 | - | - | | | |
| N.S./N.P. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 151 Stomach | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151.0 Stomac | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1,075 | 24 | 6 | 48 | 22 | 315 | 383 | 47 | 35 | 76 | 125 | - | 2 | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 25-34 | 18 | - | - | - | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | | | |
| 35-44 | 38 | 1 | - | 4 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | | | |
| 45-54 | 76 | 1 | - | - | 4 | 24 | 24 | 6 | 2 | 9 | 6 | - | - | | | |
| 55-64 | 147 | 3 | - | 4 | 2 | 37 | 62 | 6 | 5 | 11 | 16 | - | 1 | | | |
| 65-74 | 287 | 7 | 2 | 12 | 7 | 94 | 105 | 9 | 8 | 14 | 29 | - | - | | | |
| 75-84 | 369 | 9 | 3 | 11 | 6 | 116 | 115 | 17 | 11 | 25 | 56 | - | - | | | |
| 85+ | 140 | 3 | 1 | 9 | 1 | 30 | 59 | 7 | 6 | 15 | 11 | - | - | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 152 Small intestine, including duodenum | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152.0 Intestin grêle, y compris le duodénum | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 135 | - | - | 8 | 1 | 32 | 65 | 5 | 3 | 13 | 8 | - | - | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 25-34 | 4 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | | | |
| 35-44 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | | | |
| 45-54 | 9 | - | - | 1 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 55-64 | 32 | - | - | 2 | - | 7 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | | | |
| 65-74 | 47 | - | - | 1 | - | 9 | 25 | 2 | 2 | 5 | 3 | - | - | | | |
| 75-84 | 31 | - | - | 3 | 1 | 3 | 16 | 1 | - | 4 | 3 | - | - | | | |
| 85+ | 8 | - | - | - | - | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 153 Colon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153.0 Côlon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 4,902 | 100 | 32 | 216 | 137 | 1,272 | 1,955 | 202 | 179 | 270 | 535 | 1 | 3 | | | |
| 0-24 | 9 | 2 | - | 1 | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | | | |
| 25-34 | 25 | 1 | - | - | - | 5 | 14 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | | | |
| 35-44 | 141 | 5 | 2 | 7 | 5 | 38 | 55 | 2 | 3 | 11 | 13 | - | - | | | |
| 45-54 | 361 | 6 | 2 | 19 | 8 | 101 | 150 | 13 | 10 | 12 | 38 | 1 | 1 | | | |
| 55-64 | 874 | 19 | 3 | 29 | 23 | 258 | 343 | 38 | 25 | 52 | 84 | - | - | | | |
| 65-74 | 1,413 | 39 | 10 | 51 | 39 | 368 | 559 | 62 | 57 | 76 | 151 | - | 1 | | | |
| 75-84 | 1,487 | 22 | 14 | 75 | 42 | 362 | 595 | 63 | 56 | 81 | 177 | - | - | | | |
| 85+ | 592 | 6 | 1 | 34 | 20 | 139 | 235 | 22 | 28 | 37 | 69 | - | 1 | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 154 Rectum, rectosigmoid junction and anus | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154.0 Rectum, jonction recto-sigmoidienne et anus | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2,055 | 29 | 7 | 76 | 63 | 593 | 691 | 84 | 82 | 160 | 265 | 1 | 4 | | | |
| 0-24 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | | | |
| 25-34 | 18 | - | - | 2 | - | 4 | 7 | - | - | 2 | 3 | - | - | | | |
| 35-44 | 76 | 3 | - | 3 | 2 | 22 | 22 | 1 | 2 | 9 | 11 | - | - | | | |
| 45-54 | 184 | 2 | 2 | 4 | 4 | 62 | 56 | 5 | 3 | 19 | 26 | - | 1 | | | |
| 55-64 | 443 | 7 | 1 | 21 | 11 | 130 | 151 | 14 | 14 | 41 | 52 | - | 1 | | | |
| 65-74 | 590 | 10 | 3 | 17 | 23 | 174 | 190 | 33 | 22 | 47 | 70 | - | - | | | |
| 75-84 | 530 | 6 | - | 18 | 17 | 144 | 182 | 23 | 27 | 27 | 85 | 1 | - | | | |
| 85+ | 212 | 1 | 1 | 11 | 5 | 57 | 83 | 8 | 14 | 15 | 17 | - | - | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |

TABLE 2. New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 2. Nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| | Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | N.W.T. T.N.-O. | | |
|---|--------|---|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|--|--|
| | | Nfld. T.-N. I.-P.-É. | P.E.I. N.-É. | N.S. N.-B. | N.B. N.-B. | Qué. Qué. | Ont. Ont. | Man. Man. | Sask. Sask. | Alta. Alb. | B.C. C.-B. | | | |
| Number of cases - Nombre de cas | | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 Liver and intrahepatic bile ducts | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 Foie et voies biliaires intrahépatiques | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 546 | 4 | 2 | 8 | 7 | 166 | 281 | 32 | 15 | 34 | 76 | - | | |
| 0-24 | 14 | - | - | - | - | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | | |
| 25-34 | 9 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | | |
| 35-44 | 28 | - | - | 1 | - | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | | |
| 45-54 | 56 | - | - | - | 3 | 13 | 25 | 4 | - | 4 | 7 | - | | |
| 55-64 | 120 | - | 1 | 2 | - | 48 | 41 | 4 | 1 | 9 | 13 | - | | |
| 65-74 | 183 | 2 | - | 1 | - | 55 | 74 | 10 | 6 | 13 | 22 | - | | |
| 75-84 | 113 | 2 | - | 4 | 4 | 31 | 33 | 9 | 3 | 3 | 24 | - | | |
| 85+ | 23 | - | 1 | - | - | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 156 Gallbladder and extrahepatic bile ducts | | | | | | | | | | | | | | |
| 156 Vésicule et voies biliaires extrahépatiques | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 336 | 5 | 2 | 10 | 6 | 108 | 113 | 19 | 10 | 17 | 45 | - | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | | |
| 25-34 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 35-44 | 9 | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - | 1 | - | | |
| 45-54 | 32 | 2 | - | - | 1 | 11 | 11 | - | - | 4 | 3 | - | | |
| 55-64 | 57 | 2 | - | 2 | 2 | 14 | 19 | 7 | 1 | 2 | 8 | - | | |
| 65-74 | 122 | - | - | 4 | 2 | 42 | 39 | 5 | 4 | 5 | 20 | - | | |
| 75-84 | 91 | 1 | 2 | 3 | 1 | 26 | 34 | 6 | 3 | 5 | 10 | - | | |
| 85+ | 24 | - | - | 1 | - | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 157 Pancreas | | | | | | | | | | | | | | |
| 157 Pancréas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1,287 | 18 | 10 | 58 | 41 | 319 | 450 | 70 | 52 | 118 | 157 | - | | |
| 0-24 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | | |
| 25-34 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | | |
| 35-44 | 38 | 1 | - | 1 | - | 10 | 16 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | | |
| 45-54 | 105 | - | - | 6 | 6 | 27 | 41 | 4 | 4 | 7 | 10 | - | | |
| 55-64 | 285 | 5 | - | 13 | 10 | 78 | 108 | 9 | 9 | 25 | 27 | - | | |
| 65-74 | 447 | 2 | 6 | 14 | 10 | 119 | 158 | 24 | 16 | 45 | 54 | - | | |
| 75-84 | 311 | 1 | 3 | 18 | 12 | 66 | 93 | 24 | 17 | 27 | 50 | - | | |
| 85+ | 97 | 1 | 1 | 5 | 3 | 18 | 33 | 5 | 5 | 14 | 12 | - | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 158 Retroperitoneum and peritoneum | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 Tissu rétropéritonéal et péritoine | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 79 | - | 1 | 4 | - | 34 | 23 | 2 | 3 | 5 | 7 | - | | |
| 0-24 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | | |
| 25-34 | 10 | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | - | 1 | - | | |
| 35-44 | 7 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | | |
| 45-54 | 7 | - | - | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | | |
| 55-64 | 14 | - | - | 1 | - | 6 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | | |
| 65-74 | 23 | - | - | 1 | - | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | | |
| 75-84 | 11 | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | - | | |
| 85+ | 4 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 159 Other and ill-defined sites | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 Sièges autres ou non précisés | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 207 | 1 | 1 | 4 | 9 | 54 | 108 | 5 | 4 | 5 | 15 | - | | |
| 0-24 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 25-34 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | | |
| 35-44 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | | |
| 45-54 | 15 | - | - | - | 1 | 3 | 10 | - | - | 1 | - | - | | |
| 55-64 | 45 | - | - | - | - | 19 | 22 | 1 | - | - | 3 | - | | |
| 65-74 | 55 | - | - | 2 | 4 | 14 | 29 | - | 1 | 1 | 4 | - | | |
| 75-84 | 58 | 1 | - | 1 | 2 | 13 | 30 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | | |
| 85+ | 24 | - | - | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

TABLE 2. New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 2. Nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| | Canada | Nfld. | P.E.I. | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. | | | | | | | |
|---|--------|-------|--------|---|------------------|---------------|---------------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | N.S. T.-N. | N.B. I.-P.-É. | Qué. N.-É. | Ont. N.-B. | Man. | Sask. | Alb. | C.-B. | | | | | | | | | | | |
| Number of cases - Nombre de cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 Liver and intrahepatic bile ducts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 Foie et voies biliaires intrahépatiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 267 | 1 | - | 8 | 8 | 79 | 115 | 12 | 8 | 14 | 22 | - | - | - | - | | | | | | | |
| 0-24 | 9 | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | | | | | | | |
| 25-34 | 11 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | | | | | | | |
| 35-44 | 8 | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | | | | | | | |
| 45-54 | 21 | - | - | - | 6 | 9 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | | | | | | | |
| 55-64 | 35 | - | - | 1 | 2 | 13 | 16 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | | | | | | | |
| 65-74 | 81 | 1 | - | 3 | 1 | 26 | 32 | 3 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | - | | | | | | | |
| 75-84 | 67 | - | - | 2 | 4 | 18 | 28 | 5 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | | | | | | | |
| 85+ | 34 | - | - | 2 | - | 9 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | | | | | | | |
| N.S./N.P. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 156 Gallbladder and extrahepatic bile ducts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156 Vésicule et voies biliaires extrahépatiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 487 | 7 | 3 | 12 | 3 | 140 | 171 | 24 | 24 | 28 | 74 | 1 | - | - | - | | | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 25-34 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 35-44 | 7 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | | | | | | | |
| 45-54 | 33 | 2 | - | - | - | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | | | | | | | |
| 55-64 | 74 | 2 | 1 | 3 | 2 | 29 | 22 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | | | | | | | |
| 65-74 | 160 | 2 | - | 6 | - | 48 | 58 | 9 | 7 | 9 | 21 | - | - | - | - | | | | | | | |
| 75-84 | 128 | 1 | 1 | 2 | - | 30 | 40 | 10 | 10 | 11 | 23 | - | - | - | - | | | | | | | |
| 85+ | 84 | - | 1 | 1 | 1 | 23 | 37 | 2 | 3 | 4 | 12 | - | - | - | - | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 157 Pancreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 157 Pancréas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1,280 | 12 | 7 | 57 | 34 | 333 | 469 | 56 | 70 | 96 | 146 | - | - | - | - | | | | | | | |
| 0-24 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 25-34 | 6 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 35-44 | 23 | 1 | - | 1 | - | 6 | 11 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | | | | | | | |
| 45-54 | 71 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21 | 23 | 3 | 3 | 7 | 7 | - | - | - | - | | | | | | | |
| 55-64 | 186 | 2 | 1 | 12 | 5 | 55 | 64 | 9 | 9 | 9 | 20 | - | - | - | - | | | | | | | |
| 65-74 | 441 | 4 | 3 | 14 | 10 | 113 | 164 | 17 | 27 | 39 | 50 | - | - | - | - | | | | | | | |
| 75-84 | 384 | 3 | 1 | 14 | 11 | 109 | 132 | 16 | 23 | 27 | 48 | - | - | - | - | | | | | | | |
| 85+ | 167 | 1 | 1 | 12 | 6 | 27 | 71 | 9 | 8 | 14 | 18 | - | - | - | - | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 158 Retropertitoneum and peritoneum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 Tissu rétropéritonéal et péritoine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 95 | 1 | - | 1 | - | 40 | 17 | 6 | 2 | 17 | 11 | - | - | - | - | | | | | | | |
| 0-24 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 25-34 | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 35-44 | 11 | - | - | - | - | 8 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 45-54 | 6 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | | | | | | |
| 55-64 | 22 | - | - | - | - | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | | | | | | | |
| 65-74 | 22 | 1 | - | 1 | - | 10 | 2 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | | | | | | | |
| 75-84 | 22 | - | - | - | - | 8 | 6 | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | | | | | | | |
| 85+ | 5 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 159 Other and ill-defined sites | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 Sièges autres ou non précisés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 191 | 2 | - | 5 | 6 | 53 | 97 | 3 | 6 | 6 | 16 | - | - | - | 1 | | | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 25-34 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 35-44 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 45-54 | 11 | - | - | - | - | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | | | | | | | |
| 55-64 | 28 | - | - | 1 | - | 10 | 14 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | | | | | | | |
| 65-74 | 50 | 1 | - | 4 | 3 | 15 | 21 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | | | | | | | |
| 75-84 | 54 | 1 | - | 1 | 1 | 15 | 32 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | | | | | | | |
| 85+ | 44 | - | - | - | 2 | 5 | 25 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | | | | | | | |
| N.S./N.P. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |

TABLE 2. New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 2. Nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| | Canada | Nfld. | P.E.I. | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | N.W.T. | |
|---|--------|----------------|--------|---|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--------|---------|
| | | | | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | | |
| | | T.-N. I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | | | | | | | | | T.N.-O. |
| Number of cases - Nombre de cas | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | | |
| 160 Nasal cavities, middle ear and sinuses | | | | | | | | | | | | | |
| 160 Fosses nasales, de l'oreille moyenne et sinuses annexes | Total | 106 | 4 | - | 4 | 4 | 16 | 51 | - | 3 | 13 | 10 | - |
| 0-24 | | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 25-34 | | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 35-44 | | 8 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 3 | - | - |
| 45-54 | | 15 | - | - | 2 | - | 3 | 6 | - | - | 2 | 1 | - |
| 55-64 | | 29 | 4 | - | 1 | - | 3 | 14 | - | - | 3 | 4 | - |
| 65-74 | | 27 | - | - | - | 1 | 3 | 15 | - | - | 4 | 4 | - |
| 75-84 | | 17 | - | - | 1 | 1 | 4 | 8 | - | 2 | - | 1 | - |
| 85+ | | 6 | - | - | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 161 Larynx | Total | 973 | 15 | 5 | 42 | 24 | 327 | 339 | 22 | 27 | 68 | 103 | - |
| 0-24 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 35-44 | | 39 | 1 | - | 2 | - | 14 | 15 | 1 | - | 2 | 4 | - |
| 45-54 | | 115 | 1 | 1 | 4 | 5 | 41 | 43 | 1 | 1 | 10 | 8 | - |
| 55-64 | | 317 | 8 | 1 | 7 | 10 | 123 | 94 | 3 | 13 | 22 | 36 | - |
| 65-74 | | 331 | 3 | - | 18 | 3 | 101 | 134 | 12 | 4 | 23 | 33 | - |
| 75-84 | | 148 | 2 | 3 | 11 | 6 | 41 | 48 | 4 | 6 | 9 | 17 | - |
| 85+ | | 22 | - | - | - | - | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 162 Trachea, bronchus and lung | | | | | | | | | | | | | |
| 162 Trachée, des bronches et du poumon | Total | 11,191 | 155 | 49 | 432 | 356 | 3,452 | 3,939 | 430 | 427 | 653 | 1,277 | 4 |
| 0-24 | | 7 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 |
| 25-34 | | 28 | - | - | 1 | - | 7 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 35-44 | | 199 | 4 | 1 | 4 | 7 | 71 | 68 | 6 | 9 | 10 | 18 | 1 |
| 45-54 | | 953 | 4 | 6 | 38 | 32 | 335 | 329 | 27 | 35 | 47 | 97 | 3 |
| 55-64 | | 3,025 | 47 | 11 | 96 | 89 | 985 | 1,118 | 103 | 80 | 174 | 314 | 2 |
| 65-74 | | 6,175 | 65 | 21 | 166 | 137 | 1,282 | 1,446 | 166 | 169 | 244 | 473 | 1 |
| 75-84 | | 2,390 | 32 | 9 | 108 | 76 | 667 | 814 | 109 | 111 | 148 | 314 | 2 |
| 85+ | | 411 | 3 | 1 | 18 | 15 | 103 | 144 | 17 | 22 | 28 | 60 | - |
| N.S./N.P. | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
| 163 Pleura | | | | | | | | | | | | | |
| 163 Plèvre | Total | 169 | 1 | - | 6 | 2 | 64 | 45 | 6 | 6 | 15 | 24 | - |
| 0-24 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 35-44 | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 45-54 | | 21 | - | - | - | - | 12 | 6 | - | - | 1 | 2 | - |
| 55-64 | | 45 | - | - | 1 | - | 14 | 15 | 2 | 1 | 3 | 9 | - |
| 65-74 | | 56 | 1 | - | 3 | 1 | 19 | 18 | 2 | 2 | 6 | 4 | - |
| 75-84 | | 40 | - | - | 2 | 1 | 17 | 4 | - | 3 | 5 | 8 | - |
| 85+ | | 4 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 164 Thymus, heart and mediastinum | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Thymus, cœur et mésostin | Total | 89 | - | 1 | 3 | 1 | 24 | 41 | 3 | - | 4 | 12 | - |
| 0-24 | | 17 | - | - | 1 | - | 7 | 7 | - | - | 1 | 1 | - |
| 25-34 | | 13 | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | 5 | - | - |
| 35-44 | | 10 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 2 | 2 | - |
| 45-54 | | 11 | - | - | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - |
| 55-64 | | 7 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - |
| 65-74 | | 16 | - | 1 | - | - | 5 | 7 | 2 | - | 1 | - | - |
| 75-84 | | 13 | - | - | 1 | - | 6 | 3 | 1 | - | - | 2 | - |
| 85+ | | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

TABLE 2. New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 2. Nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| | Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | N.W.T. |
|---|-----------|---|--------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | |
| | | T.-N. I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | |
| Number of cases - Nombre de cas | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 160 Nasal cavities, middle ear and sinuses | | | | | | | | | | | | |
| 160 Fosses nasales, de l'oreille moyenne et sinuses annexes | Total | 62 | 2 | - | 3 | 2 | 12 | 24 | 1 | 2 | 5 | 11 |
| 0-24 | 0-24 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 25-34 | 4 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - |
| 35-44 | 35-44 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 45-54 | 45-54 | 11 | 1 | - | 1 | - | 1 | 5 | - | - | 2 | 1 |
| 55-64 | 55-64 | 16 | - | - | - | - | 6 | 3 | - | - | 2 | 5 |
| 65-74 | 65-74 | 15 | - | - | 1 | 1 | - | 9 | - | 2 | 1 | 1 |
| 75-84 | 75-84 | 11 | - | - | 1 | - | 4 | 5 | 1 | - | 2 | - |
| 85+ | 85+ | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 161 Larynx | Total | 206 | 2 | - | 5 | 4 | 92 | 61 | 6 | 4 | 6 | 25 |
| 0-24 | 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 25-34 | 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 35-44 | 7 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 45-54 | 45-54 | 38 | 1 | - | 1 | 1 | 21 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 55-64 | 55-64 | 66 | 1 | - | 1 | 1 | 32 | 18 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 65-74 | 65-74 | 69 | - | - | - | 2 | 27 | 23 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 75-84 | 75-84 | 23 | - | - | 2 | - | 8 | 10 | - | - | 3 | - |
| 85+ | 85+ | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| N.S./N.P. | N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 162 Trachea, bronchus and lung | | | | | | | | | | | | |
| 162 Trachée, des bronches et du poumon | Total | 5,403 | 52 | 39 | 281 | 138 | 1,411 | 2,001 | 263 | 176 | 312 | 794 |
| 0-24 | 0-24 | 6 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 25-34 | 25-34 | 37 | 1 | - | 2 | 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 35-44 | 35-44 | 188 | - | 3 | 5 | 3 | 77 | 60 | 6 | 7 | 6 | 21 |
| 45-54 | 45-54 | 645 | 9 | 8 | 21 | 23 | 179 | 227 | 26 | 17 | 50 | 83 |
| 55-64 | 55-64 | 1,398 | 16 | 9 | 56 | 31 | 380 | 528 | 59 | 52 | 70 | 190 |
| 65-74 | 65-74 | 1,887 | 18 | 10 | 64 | 51 | 455 | 709 | 86 | 58 | 113 | 316 |
| 75-84 | 75-84 | 1,029 | 8 | 8 | 42 | 20 | 257 | 377 | 75 | 27 | 60 | 155 |
| 85+ | 85+ | 213 | - | 1 | 10 | 7 | 50 | 88 | 10 | 13 | 10 | 24 |
| N.S./N.P. | N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 163 Pleura | | | | | | | | | | | | |
| 163 Plèvre | Total | 36 | - | - | 1 | 1 | 16 | 18 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 0-24 | 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 35-44 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 45-54 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 55-64 | 55-64 | 6 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - |
| 65-74 | 65-74 | 13 | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 3 | - |
| 75-84 | 75-84 | 9 | - | - | - | - | 5 | 3 | - | 1 | - | - |
| 85+ | 85+ | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| N.S./N.P. | N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 164 Thymus, heart and mediastinum | | | | | | | | | | | | |
| 164 Thymus, cœur et médiastin | Total | 65 | - | - | 1 | 1 | 17 | 26 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 0-24 | 0-24 | 6 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - | - |
| 25-34 | 25-34 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 35-44 | 35-44 | 9 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 2 | - | 1 |
| 45-54 | 45-54 | 8 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 1 | 2 | - |
| 55-64 | 55-64 | 12 | - | - | - | - | 4 | 6 | - | 1 | 1 | - |
| 65-74 | 65-74 | 15 | - | - | 1 | - | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 75-84 | 75-84 | 11 | - | - | - | - | 2 | 5 | - | 2 | - | - |
| 85+ | 85+ | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

TABLE 2. New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 2. Nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | N.W.T. |
|--|---|--------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|---------|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | |
| | T.-N. I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | T.N.-O. |
| Number of cases - Nombre de cas | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | |
| 165 Other and ill-defined sites | | | | | | | | | | | |
| 165 Sièges autres ou non précisés | | | | | | | | | | | |
| Total | 9 | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 1 | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 55-64 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 65-74 | 5 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 75-84 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 85+ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 170 Bone and articular cartilage | | | | | | | | | | | |
| 170 Os et cartilage articulaire | | | | | | | | | | | |
| Total | 159 | 2 | 1 | 9 | 7 | 47 | 54 | 7 | 10 | 8 | 14 |
| 0-24 | 47 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 25-34 | 17 | - | - | 2 | - | 7 | 6 | 1 | - | 1 | - |
| 35-44 | 18 | 1 | - | - | 2 | 5 | 6 | - | - | 2 | 2 |
| 45-54 | 13 | - | - | - | - | 3 | 4 | 1 | 2 | - | 3 |
| 55-64 | 15 | - | - | - | - | 5 | 7 | - | - | 2 | 1 |
| 65-74 | 21 | - | - | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | - | 1 | 2 |
| 75-84 | 20 | - | - | 1 | - | 6 | 4 | 1 | 6 | - | 2 |
| 85+ | 8 | - | - | - | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 171 Connective and other soft tissue | | | | | | | | | | | |
| 171 Tissu conjonctif et autres tissus mous | | | | | | | | | | | |
| Total | 371 | 12 | 3 | 23 | 3 | 94 | 151 | 9 | 13 | 27 | 36 |
| 0-24 | 54 | 2 | - | 4 | - | 12 | 26 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 25-34 | 24 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 9 | 1 | - | 3 | 2 |
| 35-44 | 43 | 1 | - | 2 | - | 10 | 17 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| 45-54 | 50 | 3 | 1 | 1 | - | 16 | 17 | - | - | 6 | 6 |
| 55-64 | 46 | 1 | - | 2 | 1 | 16 | 15 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 65-74 | 90 | 4 | - | 7 | 1 | 23 | 38 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| 75-84 | 47 | - | 1 | 4 | 1 | 10 | 20 | - | 2 | 2 | - |
| 85+ | 16 | - | - | 2 | - | 1 | 8 | 1 | 2 | - | 2 |
| N.S./N.P. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 172 Malignant melanoma of skin | | | | | | | | | | | |
| 172 Mélanome malin de la peau | | | | | | | | | | | |
| Total | 1,264 | 9 | 11 | 60 | 29 | 165 | 626 | 40 | 41 | 107 | 178 |
| 0-24 | 20 | - | - | - | - | 6 | 4 | 2 | - | 2 | 6 |
| 25-34 | 117 | 1 | 2 | 3 | 3 | 17 | 63 | 2 | - | 13 | 13 |
| 35-44 | 211 | 1 | 3 | 14 | 7 | 23 | 96 | 4 | 9 | 19 | 35 |
| 45-54 | 210 | 1 | - | 10 | 6 | 40 | 94 | 8 | 5 | 18 | 28 |
| 55-64 | 275 | 2 | 2 | 12 | 4 | 33 | 136 | 12 | 9 | 26 | 39 |
| 65-74 | 251 | 2 | 2 | 12 | 3 | 28 | 126 | 8 | 13 | 18 | 39 |
| 75-84 | 132 | 1 | - | 6 | 3 | 13 | 79 | 3 | 2 | 9 | 16 |
| 85+ | 44 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 22 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| N.S./N.P. | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 174 Female breast | | | | | | | | | | | |
| 174 Sein chez la femme | | | | | | | | | | | |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

TABLE 2. New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 2. Nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| | Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | Aits. | B.C. | Yukon | N.W.T. | | | |
|--|--------|---|--------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--------|--|--|--|
| | | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alb. | C.-B. | | | | | | | |
| Number of cases - Nombre de cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Other and ill-defined sites | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Sièges autres ou non précisés | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 45-54 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 65-74 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 85+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 170 Bone and articular cartilage | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 Os et cartilage articulaire | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 130 | 1 | 1 | 3 | 3 | 40 | 53 | 7 | - | 8 | 14 | - | - | - | - | | | |
| 0-24 | 39 | - | - | 1 | 1 | 7 | 22 | 2 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | | | |
| 25-34 | 9 | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | | | |
| 35-44 | 20 | - | - | - | - | 6 | 9 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | | | |
| 45-54 | 11 | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | | | |
| 55-64 | 16 | - | - | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | | | |
| 65-74 | 18 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 4 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | | | |
| 75-84 | 11 | - | - | - | 1 | 4 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | | | |
| 85+ | 6 | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 171 Connective and other soft tissue | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 Tissu conjonctif et autres tissus mous | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 288 | 4 | 1 | 13 | 6 | 76 | 123 | 8 | 11 | 17 | 29 | - | - | - | - | | | |
| 0-24 | 34 | - | - | 2 | - | 8 | 15 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | | | |
| 25-34 | 28 | - | - | 3 | - | 10 | 10 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | | | |
| 35-44 | 22 | - | - | 1 | - | 3 | 12 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | | | |
| 45-54 | 27 | - | - | 1 | - | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | | | |
| 55-64 | 35 | 1 | - | 1 | 3 | 7 | 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | | | |
| 65-74 | 68 | 1 | - | 2 | 2 | 22 | 25 | 3 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | | | |
| 75-84 | 54 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 20 | 2 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | | | |
| 85+ | 18 | - | - | 1 | - | 6 | 8 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | | | |
| N.S./N.P. | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 172 Malignant melanoma of skin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 Mélanome malin de la peau | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1,209 | 20 | 6 | 63 | 46 | 172 | 485 | 52 | 43 | 143 | 179 | - | - | - | - | | | |
| 0-24 | 54 | 3 | - | 2 | 2 | 7 | 17 | 1 | 1 | 11 | 10 | - | - | - | - | | | |
| 25-34 | 155 | 2 | 2 | 6 | 12 | 19 | 50 | 4 | 4 | 28 | - | - | - | - | - | | | |
| 35-44 | 251 | 4 | 1 | 12 | 10 | 28 | 111 | 8 | 11 | 31 | 35 | - | - | - | - | | | |
| 45-54 | 197 | 2 | 1 | 13 | 5 | 31 | 77 | 7 | 7 | 27 | - | - | - | - | - | | | |
| 55-64 | 203 | 2 | 1 | 12 | 7 | 31 | 91 | 12 | 4 | 16 | 27 | - | - | - | - | | | |
| 65-74 | 183 | 4 | 1 | 8 | 6 | 31 | 71 | 9 | 8 | 12 | 33 | - | - | - | - | | | |
| 75-84 | 129 | 2 | - | 8 | 2 | 20 | 52 | 10 | 6 | 15 | 14 | - | - | - | - | | | |
| 85+ | 36 | 1 | - | 2 | 2 | 5 | 15 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | | | |
| N.S./N.P. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 174 Female breast | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 Sein chez la femme | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 14,097 | 207 | 75 | 505 | 353 | 3,422 | 5,276 | 623 | 598 | 1,128 | 1,894 | 6 | 10 | - | - | | | |
| 0-24 | 12 | - | - | - | 1 | 2 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | | |
| 25-34 | 358 | 5 | 2 | 8 | 12 | 103 | 131 | 14 | 15 | 26 | 41 | 1 | - | - | - | | | |
| 35-44 | 1,683 | 39 | 7 | 56 | 49 | 416 | 611 | 66 | 53 | 161 | 220 | 2 | 3 | - | - | | | |
| 45-54 | 2,626 | 42 | 18 | 76 | 52 | 671 | 1,028 | 106 | 76 | 235 | 317 | 1 | 4 | - | - | | | |
| 55-64 | 2,972 | 35 | 15 | 97 | 76 | 743 | 1,087 | 132 | 135 | 252 | 398 | 1 | 1 | - | - | | | |
| 65-74 | 3,500 | 38 | 17 | 131 | 90 | 820 | 1,286 | 163 | 178 | 251 | 525 | - | 1 | - | - | | | |
| 75-84 | 2,230 | 40 | 10 | 98 | 56 | 534 | 823 | 108 | 98 | 158 | 304 | - | 1 | - | - | | | |
| 85+ | 712 | 8 | 6 | 39 | 17 | 133 | 298 | 34 | 43 | 45 | 88 | 1 | - | - | - | | | |
| N.S./N.P. | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |

TABLE 2. New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 2. Nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| | Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | N.W.T. |
|---|--------|---|--------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|---------|
| | | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | |
| | | T.-N. I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | T.N.-O. |
| Number of cases - Nombre de cas | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 175 Male breast | | | | | | | | | | | | |
| 175 Sein chez l'homme | | | | | | | | | | | | |
| Total | 96 | 2 | - | 2 | 5 | 26 | 37 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 |
| 0-24 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 35-44 | 5 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
| 45-54 | 6 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
| 55-64 | 24 | - | - | 1 | 1 | 6 | 11 | - | - | 2 | 2 | - |
| 65-74 | 32 | - | - | 1 | 3 | 11 | 11 | - | 1 | 3 | 2 | - |
| 75-84 | 19 | 1 | - | - | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 85+ | 6 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 179 Uterus, NOS | | | | | | | | | | | | |
| 179 Utérus, SAI | | | | | | | | | | | | |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 180 Cervix uteri | | | | | | | | | | | | |
| 180 Col de l'utérus | | | | | | | | | | | | |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 181 Placenta | | | | | | | | | | | | |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 182 Body of uterus | | | | | | | | | | | | |
| 182 Corps de l'utérus | | | | | | | | | | | | |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 183 Ovary and other uterine adnexa | | | | | | | | | | | | |
| 183 Ovaire et autres annexes de l'utérus | | | | | | | | | | | | |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

TABLE 2. New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 2. Nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| | Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | Province of residence - Province de résidence | | | | | | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. | | | | |
|--|--------|----------------|--------|-------|---|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|--------|------------------|---|---|---|
| | | | | | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alb. | | | | | | | | |
| | | T.-N. I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Number of cases - Nombre de cas | | | | | | | | | | Females - Femmes | | | |
| 175 Male breast | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 Sein chez l'homme | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 179 Uterus, NOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 Utérus, SAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 123 | 2 | 1 | * | * | 61 | 37 | 2 | 2 | 6 | 11 | * | * | * | * | * | 1 | * |
| 0-24 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 8 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 22 | 1 | 1 | - | - | 8 | 8 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | 19 | 1 | - | - | - | 9 | 7 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | 31 | - | - | - | - | 21 | 5 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | 29 | - | - | - | - | 14 | 9 | - | - | 1 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | - |
| 85+ | 12 | - | - | - | - | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 180 Cervix uteri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 Col de l'utérus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1,493 | 34 | 8 | 69 | 36 | 321 | 604 | 60 | 57 | 139 | 158 | 2 | 5 | * | * | * | * | * |
| 0-24 | 14 | - | - | - | - | 3 | 8 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 307 | 8 | 2 | 18 | 7 | 59 | 124 | 11 | 8 | 36 | 32 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 349 | 9 | 4 | 14 | 10 | 67 | 129 | 17 | 19 | 38 | 40 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 220 | 3 | - | 7 | 4 | 48 | 97 | 7 | 7 | 21 | 25 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | 198 | 8 | 1 | 6 | 5 | 33 | 92 | 8 | 5 | 17 | 21 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 65-74 | 219 | 3 | 1 | 10 | 6 | 64 | 85 | 9 | 7 | 14 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | 151 | 2 | - | 12 | 2 | 39 | 55 | 7 | 9 | 9 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85+ | 34 | 1 | - | 2 | 2 | 8 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 181 Placenta | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 8 | * | * | * | * | 4 | 3 | * | * | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 0-24 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 6 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 182 Body of uterus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 Corps de l'utérus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2,701 | 58 | 9 | 102 | 73 | 695 | 1,034 | 127 | 84 | 198 | 318 | 1 | 2 | * | * | * | * | * |
| 0-24 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 16 | - | - | 2 | - | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 133 | 5 | - | 9 | 5 | 34 | 44 | 9 | 4 | 6 | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 348 | 10 | - | 9 | 6 | 101 | 124 | 18 | 8 | 22 | 49 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 55-64 | 752 | 15 | 3 | 26 | 18 | 199 | 290 | 36 | 16 | 68 | 79 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 65-74 | 910 | 19 | 3 | 32 | 27 | 214 | 369 | 39 | 34 | 62 | 111 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | 444 | 8 | 2 | 17 | 14 | 119 | 165 | 23 | 18 | 26 | 52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85+ | 95 | - | 1 | 7 | 3 | 24 | 35 | - | 3 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 183 Ovary and other uterine adnexa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 Ovaire et autres annexes de l'utérus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1,966 | 30 | 6 | 64 | 46 | 493 | 804 | 73 | 80 | 148 | 221 | * | * | * | * | * | * | * |
| 0-24 | 36 | - | 1 | 1 | - | 11 | 9 | 1 | 3 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 77 | 3 | - | 5 | 2 | 17 | 32 | 2 | 3 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 190 | - | - | 2 | 3 | 53 | 86 | 7 | 10 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 312 | 3 | 1 | 6 | 10 | 87 | 124 | 11 | 9 | 20 | 40 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 55-64 | 449 | 8 | 2 | 12 | 8 | 111 | 193 | 14 | 20 | 35 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | 473 | 9 | 1 | 27 | 11 | 113 | 190 | 18 | 15 | 29 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | 330 | 5 | - | 9 | 11 | 75 | 132 | 14 | 16 | 21 | 47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85+ | 98 | 2 | 1 | 4 | 1 | 26 | 37 | 6 | 4 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

TABLE 2. New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 2. Nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | N.W.T. T.N.-O. | |
|---|---|--------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------------|--------------|
| | Nfld. T.-N. | P.E.I. I.-P.-É. | N.S. N.-É. | N.B. N.-B. | Qué. Québec | Ont. Ontario | Man. Manitoba | Sask. Saskatchewan | Alta. Alberta | B.C. Colombie-Britannique | | |
| Number of cases • Nombre de cas | | | | | | | | | | | | |
| Males • Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 184 Female genital organs, other and NOS | | | | | | | | | | | | |
| 184 Organes génitaux féminins, autres et SAI | | | | | | | | | | | | |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 185 Prostate | Total | 11,377 | 130 | 69 | 339 | 320 | 2,346 | 4,066 | 599 | 548 | 840 | 2,113 |
| 0-24 | 5 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 4 |
| 25-34 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 8 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - |
| 45-54 | 197 | 1 | 1 | 7 | 1 | 50 | 65 | 8 | 7 | 10 | 47 | - |
| 55-64 | 1,746 | 24 | 6 | 41 | 54 | 373 | 606 | 83 | 82 | 159 | 317 | 1 |
| 65-74 | 4,612 | 43 | 33 | 123 | 113 | 983 | 1,641 | 242 | 179 | 337 | 914 | 1 |
| 75-84 | 3,816 | 52 | 20 | 133 | 117 | 745 | 1,385 | 198 | 216 | 256 | 692 | 1 |
| 85+ | 984 | 10 | 9 | 34 | 32 | 191 | 357 | 68 | 63 | 78 | 142 | - |
| N.S./N.P. | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 186 Testis | Total | 648 | 9 | 2 | 29 | 14 | 130 | 270 | 21 | 27 | 64 | 81 |
| 0-24 | 112 | 1 | - | 7 | 3 | 23 | 53 | 3 | 4 | 9 | 9 | - |
| 25-34 | 264 | 3 | 2 | 13 | 5 | 51 | 111 | 7 | 12 | 23 | 36 | 1 |
| 35-44 | 175 | 3 | - | 8 | 4 | 38 | 67 | 7 | 8 | 20 | 20 | - |
| 45-54 | 48 | - | - | - | 2 | 8 | 19 | - | - | 8 | 11 | - |
| 55-64 | 28 | 1 | - | - | - | 6 | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | - |
| 65-74 | 12 | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 | 2 | - | 2 | - | - |
| 75-84 | 7 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 85+ | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 187 Other male genital organs | Total | 127 | 2 | 2 | 3 | 6 | 37 | 58 | 1 | 6 | 9 | 5 |
| 0-24 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - |
| 25-34 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 14 | - | - | - | - | 4 | 8 | - | 1 | 1 | - | - |
| 55-64 | 26 | - | 1 | - | - | 8 | 12 | - | 1 | 2 | 2 | - |
| 65-74 | 31 | - | - | 1 | 1 | 7 | 19 | - | 2 | - | 1 | - |
| 75-84 | 33 | 1 | 1 | 1 | - | 12 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | - |
| 85+ | 10 | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 188 Bladder | Total | 3,186 | 71 | 17 | 123 | 128 | 991 | 1,029 | 151 | 148 | 256 | 266 |
| 0-24 | 5 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| 25-34 | 24 | 2 | - | 1 | 1 | 10 | 4 | 4 | - | 2 | - | - |
| 35-44 | 101 | 6 | - | 4 | 3 | 36 | 24 | 3 | 6 | 14 | 5 | - |
| 45-54 | 240 | 6 | 1 | 6 | 13 | 78 | 73 | 12 | 9 | 23 | 18 | 1 |
| 55-64 | 726 | 17 | - | 28 | 28 | 225 | 256 | 24 | 32 | 60 | 54 | - |
| 65-74 | 1,044 | 22 | 5 | 37 | 43 | 333 | 336 | 46 | 48 | 78 | 94 | 1 |
| 75-84 | 818 | 17 | 8 | 34 | 33 | 248 | 250 | 48 | 38 | 67 | 74 | - |
| 85+ | 228 | 1 | 3 | 12 | 7 | 61 | 84 | 13 | 15 | 11 | 21 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

TABLE 2. New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 2. Nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|------|------|---|-------|-------|------|------|------|-------|-------|------|-------|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | T.-N. I.-P.-E. | N.-É. | N.-B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | | | | | | | | | | | | | |
| Number of cases - Nombre de cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 Female genital organs, other and NOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 Organes génitaux féminins, autres et SAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 389 | 9 | 6 | 18 | 8 | 80 | 168 | 12 | 6 | 30 | 51 | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 0-24 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 27 | - | - | 1 | 1 | 8 | 14 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 37 | 1 | - | 1 | - | 9 | 15 | 1 | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 58 | - | 1 | 5 | - | 9 | 24 | 3 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 93 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 | 43 | - | 2 | 5 | 14 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 91 | 2 | - | 5 | 4 | 14 | 39 | 6 | 3 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 85+ | 49 | 3 | 2 | 1 | - | 12 | 21 | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 185 Prostate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 85+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 186 Testis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 Testicule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 85+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 187 Other male genital organs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 Autres organes génitaux masculins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 85+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 188 Bladder | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 Vessie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1,102 | 16 | 7 | 58 | 34 | 319 | 396 | 46 | 48 | 81 | 97 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 0-24 | 6 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 13 | - | - | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 46 | - | - | 5 | - | 19 | 14 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 80 | 4 | 1 | 5 | 1 | 22 | 24 | 5 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 191 | 5 | 2 | 13 | 7 | 51 | 69 | 7 | 7 | 18 | 12 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 305 | 2 | - | 11 | 11 | 94 | 100 | 13 | 18 | 21 | 35 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 329 | 3 | 2 | 16 | 8 | 95 | 133 | 10 | 11 | 23 | 28 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 85+ | 134 | 2 | 2 | 7 | 4 | 34 | 54 | 7 | 7 | 6 | 11 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |

TABLE 2. New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 2. Nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Province of residence - Province de résidence | | | | | | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|------|------|---|-------|-------|------|------|------|-------|------|-------|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | T.-N. I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Qué. | Ont. | Man. | | | | | | | | | | | | | |
| Number of cases - Nombre de cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 Kidney and other urinary organs NOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 Rein et organes urinaires autres ou SAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1,790 | 31 | 13 | 71 | 45 | 466 | 689 | 77 | 84 | 135 | 177 | - | - | - | 2 | | | | | | | | |
| 0-24 | 37 | - | - | 1 | - | 7 | 22 | - | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 26 | - | - | - | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 105 | 5 | 1 | 6 | 3 | 31 | 36 | 3 | 4 | 8 | 8 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 226 | 5 | 2 | 13 | 5 | 49 | 95 | 7 | 11 | 20 | 18 | - | - | - | 1 | | | | | | | | |
| 55-64 | 452 | 3 | 2 | 16 | 10 | 127 | 177 | 17 | 16 | 33 | 50 | - | - | - | 1 | | | | | | | | |
| 65-74 | 561 | 13 | 2 | 19 | 18 | 144 | 209 | 26 | 28 | 45 | 57 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 317 | 5 | 5 | 11 | 6 | 82 | 123 | 19 | 19 | 17 | 30 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 85+ | 66 | - | 1 | 5 | 2 | 19 | 19 | 4 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 190 Eye | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 Oeil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 132 | 1 | - | 6 | 4 | 36 | 46 | 8 | 7 | 11 | 13 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 0-24 | 10 | - | - | 1 | - | 3 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 11 | 1 | - | 1 | - | 3 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 15 | - | - | - | - | 6 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 42 | - | - | 2 | 3 | 13 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 29 | - | - | 2 | - | 6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 12 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 85+ | 8 | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 191 Brain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 Encéphale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1,009 | 8 | 4 | 31 | 22 | 254 | 427 | 38 | 30 | 76 | 115 | 3 | 1 | - | - | | | | | | | | |
| 0-24 | 145 | 2 | 1 | 2 | 2 | 29 | 59 | 4 | 6 | 18 | 21 | 1 | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 99 | 1 | - | 1 | 1 | 27 | 39 | 6 | 1 | 8 | 14 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 104 | 4 | - | 2 | 1 | 25 | 53 | 3 | 2 | 6 | 8 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 146 | 1 | 1 | 6 | 4 | 36 | 65 | 3 | 8 | 11 | 10 | 1 | - | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 191 | - | 2 | 8 | 6 | 53 | 73 | 7 | 6 | 13 | 22 | 1 | - | - | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 220 | - | - | 7 | 3 | 55 | 97 | 12 | 5 | 13 | 26 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 91 | - | - | 4 | 4 | 27 | 36 | 3 | 2 | 6 | 9 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 85+ | 13 | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 192 Other parts of nervous system | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 192 Autres parties du système nerveux | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 77 | - | - | 1 | 1 | 21 | 36 | 4 | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 0-24 | 16 | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 7 | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 9 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 9 | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 12 | - | - | - | - | 2 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 17 | - | - | - | 1 | 5 | 7 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 85+ | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 193 Thyroid gland | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 Corps thyroïde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 287 | 6 | 4 | 5 | 7 | 56 | 128 | 11 | 25 | 25 | 22 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 0-24 | 16 | - | 1 | - | 1 | 5 | 6 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 32 | - | - | - | - | 4 | 21 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 63 | 1 | - | 1 | 1 | 13 | 28 | 2 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 61 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 26 | - | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 50 | 2 | 1 | - | - | 9 | 25 | 2 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 45 | - | - | 1 | 2 | 9 | 15 | 3 | 5 | 7 | 3 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 18 | - | 1 | 1 | - | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 85+ | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |

TABLE 2. New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 2. Nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. | | | | | | | | |
|---|-------|--------|------|---|-------|-------|------|------|------|-------|------|-------|------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | T.-M. I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alb. | | | | | | | | | | | | |
| Number of Cases - Nombre de cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 Kidney and other urinary organs NOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 Rein et organes urinaires autres ou SAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1,178 | 21 | 7 | 48 | 37 | 308 | 455 | 52 | 55 | 88 | 113 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 0-24 | 33 | - | - | - | 2 | 11 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | | | | | | | | | | |
| 25-34 | 28 | 3 | - | - | 2 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | | | | | | | | | | |
| 35-44 | 72 | - | - | 1 | 1 | 16 | 38 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | - | | | | | | | | | | |
| 45-54 | 144 | 2 | - | 1 | 3 | 37 | 63 | 5 | 5 | 14 | 14 | - | - | | | | | | | | | | |
| 55-64 | 244 | 3 | 2 | 12 | 10 | 68 | 88 | 11 | 9 | 21 | 20 | - | - | | | | | | | | | | |
| 65-74 | 318 | 8 | 1 | 13 | 10 | 81 | 121 | 18 | 14 | 15 | 37 | - | - | | | | | | | | | | |
| 75-84 | 247 | 4 | 4 | 9 | 6 | 67 | 91 | 10 | 15 | 17 | 24 | - | - | | | | | | | | | | |
| 85+ | 92 | 1 | - | 4 | 3 | 23 | 31 | 4 | 6 | 13 | 7 | - | - | | | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 190 Eye | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 Oeil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 116 | - | - | 4 | 2 | 32 | 52 | 8 | 1 | 8 | 9 | - | - | | | | | | | | | | |
| 0-24 | 11 | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | | | | | | | | | | |
| 25-34 | 6 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 35-44 | 10 | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 45-54 | 14 | - | - | 2 | - | 4 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 55-64 | 30 | - | - | 1 | - | 6 | 20 | - | - | 1 | 2 | - | - | | | | | | | | | | |
| 65-74 | 20 | - | - | 1 | - | 6 | 8 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | | | | | | | | | | |
| 75-84 | 20 | - | - | - | - | 6 | 7 | 2 | - | 2 | 3 | - | - | | | | | | | | | | |
| 85+ | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | | | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 191 Brain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 Encéphale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 802 | 5 | 5 | 17 | 26 | 213 | 354 | 27 | 26 | 46 | 83 | - | - | | | | | | | | | | |
| 0-24 | 129 | 2 | 1 | 4 | 6 | 28 | 60 | 2 | 7 | 5 | 14 | - | - | | | | | | | | | | |
| 25-34 | 63 | - | - | 4 | 3 | 17 | 24 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 35-44 | 72 | - | 1 | - | 4 | 15 | 33 | 2 | 3 | 5 | 9 | - | - | | | | | | | | | | |
| 45-54 | 76 | 2 | - | 1 | 2 | 17 | 33 | 2 | 4 | 4 | 11 | - | - | | | | | | | | | | |
| 55-64 | 149 | - | - | 6 | 2 | 47 | 64 | 5 | - | 11 | 16 | - | - | | | | | | | | | | |
| 65-74 | 183 | 1 | 2 | 3 | 3 | 52 | 84 | 5 | 7 | 11 | 15 | - | - | | | | | | | | | | |
| 75-84 | 98 | - | 1 | 1 | 4 | 27 | 43 | 4 | 1 | 5 | 12 | - | - | | | | | | | | | | |
| 85+ | 32 | - | - | - | 2 | 10 | 13 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | | | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 192 Other parts of nervous system | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 192 Autres parties du système nerveux | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 70 | - | - | 2 | 1 | 21 | 42 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | | | | | | | | | | |
| 0-24 | 12 | - | - | - | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 25-34 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | | | | | | | | | | |
| 35-44 | 15 | - | - | - | 1 | 8 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 45-54 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 55-64 | 14 | - | - | 1 | - | 1 | 11 | - | - | 1 | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 65-74 | 10 | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 75-84 | 6 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 85+ | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 193 Thyroid gland | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 Corps thyroïde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 827 | 9 | 7 | 25 | 14 | 188 | 376 | 25 | 33 | 74 | 75 | - | - | | | | | | | | | | |
| 0-24 | 84 | - | - | 6 | 2 | 17 | 36 | 5 | 3 | 9 | 6 | - | - | | | | | | | | | | |
| 25-34 | 185 | - | 3 | 7 | 1 | 28 | 97 | 10 | 5 | 18 | 16 | - | - | | | | | | | | | | |
| 35-44 | 182 | 3 | 1 | 6 | 4 | 37 | 82 | 4 | 8 | 18 | 18 | - | - | | | | | | | | | | |
| 45-54 | 145 | 4 | 1 | 2 | 3 | 32 | 65 | 1 | 6 | 14 | 17 | - | - | | | | | | | | | | |
| 55-64 | 99 | 1 | - | 1 | 2 | 26 | 46 | 2 | 5 | 7 | 9 | - | - | | | | | | | | | | |
| 65-74 | 81 | 1 | 1 | 3 | 1 | 31 | 28 | 3 | 3 | 4 | 6 | - | - | | | | | | | | | | |
| 75-84 | 38 | - | 1 | - | - | 11 | 19 | - | 2 | 2 | 3 | - | - | | | | | | | | | | |
| 85+ | 13 | - | - | - | 1 | 6 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | | | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |

TABLE 2. New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 2. Nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| | Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Province of residence - Province de résidence | | | | | | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. | | | | | | | | |
|--|--------|-------|--------|------|------|---|-------|-------|------|------|------|-------|------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | T.-N. I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | | | | | | | | | | | |
| Number of cases - Nombre de cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194 Other endocrine glands and related structures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194 Autres glandes endocrines et structures apparentes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 70 | - | - | 1 | 2 | 29 | 28 | 3 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 0-24 | 33 | - | - | 1 | 1 | 14 | 11 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 4 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 8 | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 6 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 9 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 85+ | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 195 Other and ill-defined sites | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 Sièges autres et mal définis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 101 | 1 | 1 | 2 | 3 | 30 | 57 | - | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 0-24 | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 14 | - | 1 | 1 | - | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 9 | - | - | - | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 29 | - | - | 1 | - | 11 | 16 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 24 | 1 | - | - | 2 | 6 | 11 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 85+ | 18 | - | - | - | - | 4 | 12 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 196 Lymph nodes, secondary and NOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 Ganglion lymphatiques, secondaires et SAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 132 | 5 | - | - | 1 | 24 | 60 | 6 | 9 | - | 27 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 0-24 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 9 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 20 | - | - | - | - | 7 | 7 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 28 | - | - | - | 1 | 5 | 15 | - | 2 | - | 7 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 41 | 3 | - | - | - | 6 | 18 | 2 | 4 | - | 8 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 21 | 1 | - | - | - | 2 | 10 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 85+ | 8 | 1 | - | - | - | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 197 Secondary, respiratory and digestive | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 197 Secondaires, respiratoire et digestif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 430 | 13 | - | - | - | 90 | 225 | 18 | 18 | - | 66 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 0-24 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 6 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 15 | - | - | - | - | 3 | 9 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 23 | - | - | - | - | 6 | 12 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 90 | 5 | - | - | - | 18 | 44 | 3 | 3 | - | 17 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 147 | 4 | - | - | - | 37 | 73 | 10 | 6 | - | 19 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 113 | 2 | - | - | - | 18 | 62 | 3 | 9 | - | 19 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 85+ | 33 | - | - | - | - | 7 | 20 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 198 Secondary of other specified sites | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 Seconde d'autres sièges précisés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 244 | 12 | - | - | 1 | 47 | 120 | 7 | 10 | - | 47 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 0-24 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 8 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 17 | 1 | - | - | - | 3 | 9 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 45 | 4 | - | - | - | 12 | 21 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 83 | 3 | - | - | - | 18 | 38 | 4 | 3 | - | 17 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 64 | 3 | - | - | 1 | 5 | 36 | 3 | 6 | - | 10 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 85+ | 23 | 1 | - | - | - | 5 | 12 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |

TABLE 2. New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 2. Nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| | Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Province of residence - Province de résidence | | | | | | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. | | | | | | | | | |
|--|--------|-------|--------|------|------|---|-------|-------|------|------|------|-------|------|-------|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | T.-N. I.-P.-E. | N.-É. | N.-B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | | | | | | | | | | | | |
| Number of cases - Nombre de cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194 Other endocrine glands and related structures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194 Autres glandes endocrines et structures apparentes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 74 | 1 | - | 1 | 1 | 27 | 31 | - | 3 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 0-24 | 31 | - | - | - | - | 11 | 13 | - | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 7 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 8 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 9 | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 15 | - | - | 1 | 1 | 7 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 85+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 195 Other and ill-defined sites | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 Sièges autres et mal définis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 150 | 7 | - | 1 | 4 | 48 | 77 | 4 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 0-24 | 11 | 3 | - | - | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 6 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 22 | 1 | - | - | - | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 25 | 1 | - | 1 | 1 | 10 | 10 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 46 | 2 | - | - | - | 11 | 27 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 85+ | 31 | - | - | - | 2 | 9 | 15 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 196 Lymph nodes, secondary and NOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 Ganglion lymphatiques, secondaires et SAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 107 | 1 | - | - | - | 21 | 54 | 4 | 7 | - | 20 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 0-24 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 10 | - | - | - | - | 5 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 16 | - | - | - | - | 2 | 10 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 26 | 1 | - | - | - | 8 | 11 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 31 | - | - | - | - | 2 | 14 | 1 | 4 | - | 10 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 18 | - | - | - | - | 5 | 9 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 85+ | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 197 Secondary, respiratory and digestive | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 197 Secondaires, respiratoire et digestif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 429 | 11 | - | - | - | 89 | 221 | 15 | 22 | - | 71 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 0-24 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 21 | 1 | - | - | - | 3 | 11 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 34 | - | - | - | - | 5 | 23 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 62 | - | - | - | - | 16 | 27 | 1 | 3 | - | 15 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 118 | 4 | - | - | - | 19 | 63 | 4 | 4 | - | 24 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 140 | 6 | - | - | - | 32 | 67 | 7 | 11 | - | 17 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 85+ | 49 | - | - | - | - | 12 | 28 | 1 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 198 Secondary of other specified sites | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 Secondaire d'autres sièges précisés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 235 | 7 | - | - | - | 50 | 112 | 7 | 10 | - | 49 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 0-24 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 17 | 1 | - | - | - | 2 | 6 | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 23 | - | - | - | - | 6 | 11 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 32 | 1 | - | - | - | 8 | 14 | - | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 64 | 1 | - | - | - | 11 | 31 | 1 | 4 | - | 16 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 62 | 3 | - | - | - | 18 | 28 | 3 | 1 | - | 9 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 85+ | 33 | 1 | - | - | - | 5 | 19 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |

TABLE 2. New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 2. Nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | N.W.T. T.N.-O. | |
|---|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------------|--|
| | Nfld. T.-N. I.-P.-É. | P.E.I. N.-É. | N.S. N.-É. | N.B. N.-B. | Qué. Québec | Ont. Ontario | Man. Manitoba | Sask. Saskatchewan | Alta. Alberta | B.C. Colombie-Britannique | | |
| Number of cases - Nombre de cas | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 199 Site unspecified | | | | | | | | | | | | |
| 199 Siège non précisé | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1,007 | - | 8 | 83 | 46 | 216 | 378 | 32 | 22 | 135 | 85 | |
| 0-24 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | |
| 25-34 | 21 | - | - | - | 2 | 4 | 10 | - | 1 | 3 | 1 | |
| 35-44 | 26 | - | - | 2 | - | 13 | 7 | - | 1 | 3 | 1 | |
| 45-54 | 65 | - | - | 8 | 3 | 15 | 23 | 4 | 1 | 11 | - | |
| 55-64 | 172 | - | 1 | 14 | 8 | 41 | 68 | 7 | 5 | 18 | 10 | |
| 65-74 | 324 | - | 3 | 31 | 15 | 76 | 115 | 10 | 6 | 38 | 28 | |
| 75-84 | 292 | - | 1 | 23 | 14 | 52 | 110 | 8 | 4 | 44 | 36 | |
| 85+ | 99 | - | 3 | 5 | 4 | 15 | 37 | 3 | 5 | 18 | 9 | |
| N.S./N.P. | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| 200 Lymphosarcoma and reticulosarcoma | | | | | | | | | | | | |
| 200 Lymphosarcome et réticulosarcome | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1,009 | 10 | 6 | 43 | 29 | 152 | 478 | 55 | 40 | 64 | 131 | |
| 0-24 | 51 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 21 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
| 25-34 | 65 | 1 | - | 4 | - | 12 | 31 | - | 1 | 6 | 10 | |
| 35-44 | 87 | 2 | - | 4 | 1 | 10 | 47 | 3 | 1 | 5 | 14 | |
| 45-54 | 129 | 3 | - | 4 | 5 | 20 | 63 | 10 | 1 | 7 | 16 | |
| 55-64 | 205 | 2 | 2 | 8 | 6 | 24 | 104 | 10 | 11 | 14 | 23 | |
| 65-74 | 256 | - | 1 | 12 | 9 | 51 | 116 | 14 | 8 | 13 | 32 | |
| 75-84 | 173 | - | 1 | 7 | 5 | 16 | 78 | 15 | 13 | 12 | 26 | |
| 85+ | 42 | - | - | 3 | 1 | 8 | 17 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| N.S./N.P. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 201 Hodgkin's disease | | | | | | | | | | | | |
| 201 Maladie de Hodgkin | | | | | | | | | | | | |
| Total | 471 | 7 | 3 | 15 | 12 | 135 | 181 | 18 | 18 | 35 | 47 | |
| 0-24 | 113 | 2 | 1 | 5 | 4 | 29 | 48 | 5 | 3 | 6 | 10 | |
| 25-34 | 125 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 | 53 | 7 | 5 | 13 | 16 | |
| 35-44 | 90 | 1 | 1 | 3 | - | 36 | 30 | 1 | 4 | 6 | 8 | |
| 45-54 | 52 | 1 | - | 2 | 1 | 16 | 24 | - | 3 | 3 | 2 | |
| 55-64 | 40 | 1 | - | 1 | - | 13 | 12 | 2 | 2 | 5 | 4 | |
| 65-74 | 31 | - | - | - | 5 | 10 | 9 | 3 | - | 1 | 3 | |
| 75-84 | 18 | - | - | 2 | 1 | 5 | 4 | - | 1 | 1 | 4 | |
| 85+ | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 202 Other of lymphoid and histiocytic tissue | | | | | | | | | | | | |
| 202 Autres des tissus lymphoïdes et histiocytaires | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1,215 | 13 | 1 | 38 | 22 | 416 | 613 | 62 | 40 | 71 | 158 | |
| 0-24 | 50 | 2 | - | 2 | 2 | 15 | 22 | - | 2 | 2 | 3 | |
| 25-34 | 94 | - | - | - | 2 | 37 | 31 | 1 | 2 | 7 | 14 | |
| 35-44 | 163 | 2 | - | 8 | 3 | 58 | 58 | 1 | 5 | 9 | 18 | |
| 45-54 | 191 | 3 | - | 5 | 2 | 69 | 66 | 7 | 2 | 11 | 26 | |
| 55-64 | 232 | 3 | - | 9 | - | 76 | 78 | 11 | 11 | 19 | 25 | |
| 65-74 | 268 | 2 | 1 | 8 | 10 | 89 | 91 | 11 | 7 | 12 | 37 | |
| 75-84 | 174 | - | - | 4 | 3 | 55 | 55 | 9 | 8 | 10 | 30 | |
| 85+ | 43 | 1 | - | 2 | - | 17 | 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 203 Multiple myeloma and immunoproliferative neoplasms | | | | | | | | | | | | |
| 203 Myélome multiple et tumeurs immuno-prolifératives | | | | | | | | | | | | |
| Total | 699 | 11 | 1 | 21 | 13 | 147 | 298 | 37 | 30 | 62 | 79 | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| 35-44 | 24 | 1 | - | 2 | - | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | - | |
| 45-54 | 60 | - | - | - | 4 | 12 | 27 | 1 | 3 | 8 | 5 | |
| 55-64 | 157 | 5 | - | 7 | 2 | 35 | 66 | 6 | 3 | 15 | 18 | |
| 65-74 | 223 | 2 | 1 | 6 | 6 | 51 | 91 | 13 | 13 | 12 | 27 | |
| 75-84 | 182 | 2 | - | 6 | 1 | 32 | 76 | 12 | 10 | 20 | 23 | |
| 85+ | 48 | - | - | - | - | 8 | 27 | 4 | 1 | 5 | 3 | |
| N.S./N.P. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |

TABLE 2. New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 2. Nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | N.W.T. | |
|---|---|--------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|--------|---|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | | |
| T.-N. I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | | | | | | | Alb. | C.-B. | | |
| Number of cases - Nombre de cas | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 199 Site unspecified | | | | | | | | | | | | |
| 199 Siège non précisé | | | | | | | | | | | | |
| Total | 873 | 2 | 8 | 68 | 59 | 204 | 257 | 45 | 26 | 136 | 68 | . |
| 0-24 | 4 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 18 | - | - | 4 | 2 | 4 | 8 | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 35 | 1 | - | 2 | 2 | 7 | 15 | 3 | - | 5 | 2 | - |
| 45-54 | 53 | - | - | 8 | 4 | 13 | 16 | - | 3 | 5 | 4 | - |
| 55-64 | 137 | 1 | - | 10 | 7 | 38 | 42 | 8 | 2 | 22 | 7 | - |
| 65-74 | 216 | - | 2 | 16 | 15 | 51 | 55 | 14 | 6 | 43 | 14 | - |
| 75-84 | 246 | - | 3 | 19 | 24 | 62 | 55 | 10 | 9 | 43 | 21 | - |
| 85+ | 160 | - | 3 | 9 | 5 | 28 | 61 | 10 | 6 | 18 | 20 | - |
| N.S./N.P. | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 200 Lymphosarcoma and reticulosarcoma | | | | | | | | | | | | |
| 200 Lymphosarcome et réticulosarcome | | | | | | | | | | | | |
| Total | 838 | 6 | 7 | 29 | 32 | 128 | 392 | 43 | 47 | 45 | 111 | . |
| 0-24 | 23 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
| 25-34 | 29 | - | - | 1 | 2 | 2 | 14 | - | - | 6 | 4 | - |
| 35-44 | 47 | - | 1 | - | - | 10 | 24 | 2 | 3 | 1 | 6 | - |
| 45-54 | 88 | - | 1 | 3 | 3 | 16 | 42 | 6 | 2 | 5 | 10 | - |
| 55-64 | 159 | - | - | 6 | 5 | 25 | 71 | 9 | 11 | 10 | 22 | - |
| 65-74 | 250 | 3 | 2 | 9 | 11 | 35 | 124 | 7 | 12 | 12 | 35 | - |
| 75-84 | 190 | - | 2 | 8 | 8 | 22 | 91 | 11 | 14 | 8 | 26 | - |
| 85+ | 52 | - | - | 2 | 2 | 13 | 17 | 6 | 4 | 1 | 7 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 201 Hodgkin's disease | | | | | | | | | | | | |
| 201 Maladie de Hodgkin | | | | | | | | | | | | |
| Total | 375 | 5 | 1 | 14 | 11 | 107 | 151 | 12 | 14 | 24 | 35 | 1 |
| 0-24 | 122 | 4 | - | 4 | 3 | 33 | 51 | 5 | 3 | 6 | 12 | 1 |
| 25-34 | 89 | - | 1 | 5 | 4 | 20 | 40 | 5 | 3 | 7 | 6 | - |
| 35-44 | 42 | - | - | 2 | - | 9 | 16 | - | 3 | 6 | 6 | - |
| 45-54 | 26 | - | - | - | 1 | 11 | 6 | 2 | 1 | - | 5 | - |
| 55-64 | 22 | - | - | - | 1 | 8 | 8 | - | 1 | 3 | 1 | - |
| 65-74 | 51 | 1 | - | 2 | 1 | 19 | 20 | - | 2 | 2 | 4 | - |
| 75-84 | 21 | - | - | - | 1 | 7 | 9 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| 85+ | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 202 Other of lymphoid and histiocytic tissue | | | | | | | | | | | | |
| 202 Autres des tissus lymphoïdes et histiocytaires | | | | | | | | | | | | |
| Total | 975 | 18 | 4 | 35 | 23 | 333 | 319 | 40 | 31 | 62 | 107 | 3 |
| 0-24 | 22 | - | - | 1 | 1 | 7 | 9 | - | 1 | 1 | 2 | - |
| 25-34 | 41 | 1 | - | 1 | 1 | 13 | 17 | - | 1 | 2 | 5 | - |
| 35-44 | 80 | 2 | 1 | 1 | - | 28 | 30 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 |
| 45-54 | 110 | 1 | 1 | 2 | 4 | 28 | 43 | 3 | 5 | 12 | 11 | - |
| 55-64 | 178 | 2 | 1 | 7 | 2 | 71 | 49 | 5 | 6 | 12 | 23 | - |
| 65-74 | 274 | 7 | 1 | 12 | 6 | 96 | 82 | 14 | 11 | 17 | 27 | - |
| 75-84 | 198 | 5 | - | 10 | 6 | 66 | 60 | 14 | 4 | 13 | 19 | 1 |
| 85+ | 72 | - | - | 1 | 3 | 24 | 29 | 2 | 1 | 1 | 11 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 203 Multiple myeloma and immunoproliferative neoplasms | | | | | | | | | | | | |
| 203 Myélome multiple et tumeurs immuno-prolifératives | | | | | | | | | | | | |
| Total | 614 | 10 | 3 | 22 | 11 | 153 | 247 | 32 | 21 | 47 | 67 | 1 |
| 0-24 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 10 | 1 | - | - | - | 2 | 4 | 1 | - | 2 | - | - |
| 45-54 | 57 | - | - | 3 | 1 | 13 | 27 | 1 | 1 | 7 | 4 | - |
| 55-64 | 110 | 2 | 1 | 5 | 1 | 27 | 50 | 4 | 1 | 4 | 14 | 1 |
| 65-74 | 192 | 5 | - | 8 | 3 | 44 | 74 | 9 | 11 | 14 | 24 | - |
| 75-84 | 173 | 2 | - | 5 | 4 | 49 | 59 | 15 | 8 | 13 | 18 | - |
| 85+ | 70 | - | 2 | 1 | 1 | 18 | 32 | 2 | - | 7 | 7 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

TABLE 2. New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 2. Nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| | Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | Province of residence - Province de résidence | | | | | | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. | | | | | | | | | |
|--|--------|-------|--------|------|---|------|------|------|-------|----------------|-------|------|-------|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | T.-N. I.-P.-É. | | | | | | | | | | | | | |
| Number of cases - Nombre de cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 Lymphoid leukemia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 Leucémie lymphoïde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 809 | 6 | 2 | 20 | 17 | 214 | 349 | 36 | 46 | 60 | 58 | 1 | - | - | - | | | | | | | | |
| 0-24 | 141 | 4 | - | 6 | 3 | 33 | 62 | 5 | 4 | 8 | 15 | 1 | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 12 | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 29 | - | - | 1 | 1 | 6 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 60 | - | - | 1 | 2 | 13 | 29 | 5 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 160 | 2 | 2 | 2 | 1 | 43 | 73 | 7 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 194 | - | - | 4 | 5 | 50 | 83 | 10 | 16 | 15 | 11 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 159 | - | - | 3 | 3 | 53 | 57 | 7 | 12 | 13 | 11 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 85+ | 54 | - | - | 3 | 2 | 12 | 26 | 1 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 205 Myeloid leukemia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 Leucémie myéloïde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 581 | 6 | 4 | 13 | 9 | 138 | 264 | 31 | 26 | 37 | 61 | - | 2 | - | - | | | | | | | | |
| 0-24 | 48 | - | 1 | - | - | 11 | 21 | 2 | - | 5 | 7 | - | 1 | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 39 | - | 1 | - | 2 | 6 | 17 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | 1 | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 45 | 2 | - | 1 | - | 7 | 22 | 4 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 63 | 1 | - | 2 | - | 18 | 29 | 3 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 109 | 1 | 1 | 5 | 2 | 21 | 50 | 2 | 5 | 4 | 18 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 135 | 1 | 1 | 2 | 4 | 31 | 57 | 10 | 7 | 8 | 14 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 110 | 1 | - | 3 | 1 | 28 | 56 | 5 | 7 | 5 | 6 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 85+ | 31 | - | - | - | - | 8 | 11 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 206 Monocytic leukemia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 Leucémie monocytaire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 27 | - | - | 4 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 12 | - | - | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | | | | | | | | |
| 85+ | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 207 Other specified leukemia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 Autres leucémies précises | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 25 | - | 1 | - | - | 15 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 0-24 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 4 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 7 | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | | | | | | | | |
| 85+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 208 Leukemia of unspecified cell type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 Leucémie à cellules non précises | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 172 | 1 | 2 | 15 | 3 | 61 | 60 | 4 | 5 | 6 | 15 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 0-24 | 9 | 1 | - | 1 | - | - | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 8 | - | - | 1 | - | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 9 | - | - | 2 | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 27 | - | - | - | - | 14 | 8 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 50 | - | 1 | 5 | - | 16 | 19 | 3 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 46 | - | - | 4 | 2 | 16 | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 85+ | 19 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |

TABLE 2. New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 2. Nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. T.-N. | N.B. I.-P.-É. | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | A.I.A. | B.C. C.-B. | Yukon | N.W.T. T.N.-O. | | | | | | | | |
|--|-------|--------|---------------|------------------|---|------|------|-------|----|----|----|--------|---------------|-------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Number of cases - Nombre de cas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 Lymphoid leukemia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 Leucémie lymphoïde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 583 | 4 | 2 | 11 | 11 | 140 | 273 | 13 | 35 | 46 | 48 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 0-24 | 113 | 1 | - | 3 | 1 | 22 | 51 | 2 | 5 | 14 | 14 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 11 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 13 | - | - | - | 2 | 2 | 7 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 37 | - | - | - | 1 | 10 | 14 | 1 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 83 | - | - | 3 | 1 | 11 | 47 | - | 5 | 10 | 6 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 129 | 2 | 1 | 1 | 1 | 37 | 61 | 3 | 10 | 5 | 8 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 125 | - | 1 | 3 | 4 | 35 | 52 | 6 | 9 | 7 | 8 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 85+ | 72 | 1 | - | 1 | 1 | 20 | 37 | 1 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 205 Myeloid leukemia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 Leucémie myéloïde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 487 | 7 | 4 | 16 | 13 | 114 | 226 | 18 | 23 | 25 | 42 | 1 | - | - | - | | | | | | | | |
| 0-24 | 30 | - | - | 1 | - | 10 | 9 | - | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 27 | - | - | - | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 54 | 2 | - | 1 | 1 | 16 | 22 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 46 | - | 1 | 3 | 1 | 11 | 23 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 74 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 | 35 | 2 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 109 | - | - | 4 | 2 | 18 | 56 | 8 | 7 | 3 | 11 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 97 | - | 1 | 4 | 3 | 23 | 48 | 4 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 85+ | 50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 24 | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 206 Monocytic leukemia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 Leucémie monocyttaire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 26 | - | - | 2 | - | 10 | 8 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 0-24 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 6 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 85+ | 6 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 207 Other specified leukemia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 Autres leucémies précisées | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 27 | 1 | - | - | - | 20 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 0-24 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 8 | 1 | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 85+ | 4 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 208 Leukemia of unspecified cell type | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 Leucémie à cellules non précisées | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 149 | 2 | 1 | 11 | 6 | 54 | 42 | 4 | 5 | 8 | 16 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 0-24 | 7 | - | - | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 8 | - | - | 1 | - | 4 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 9 | - | - | 1 | - | 7 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 12 | 1 | - | 1 | 1 | 15 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 37 | - | - | 3 | 1 | 13 | 18 | 3 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 48 | 1 | - | 2 | 2 | 7 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 85+ | 26 | - | 1 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |

TABLE 3. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis,

Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 3. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| | Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. |
|--------------------------------------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | T.-N. I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | | T.N.-O. |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | | |
| 140 to 208 (excl. 173) | | | | | | | | | | | | | |
| All cancers except | | | | | | | | | | | | | |
| "other skin cancer" | | | | | | | | | | | | | |
| 140 à 208 (excl. 173) | | | | | | | | | | | | | |
| Tous les cancers à | | | | | | | | | | | | | |
| l'exception des | | | | | | | | | | | | | |
| "autres cancers de la | | | | | | | | | | | | | |
| peau" | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 454.9 | 362.8 | 466.6 | 488.8 | 465.0 | 481.2 | 459.4 | 457.9 | 444.3 | 395.7 | 434.2 | 285.1 | 447.8 |
| Crude/Brut | 397.7 | 287.8 | 454.4 | 452.4 | 414.7 | 405.0 | 403.2 | 441.5 | 455.9 | 290.8 | 421.2 | 143.0 | 177.0 |
| 0-24 | 20.0 | 16.4 | 27.6 | 25.1 | 18.5 | 19.3 | 23.4 | 14.8 | 14.2 | 16.6 | 16.8 | 53.0 | 6.5 |
| 25-34 | 46.0 | 26.5 | 65.0 | 37.5 | 30.3 | 42.5 | 52.8 | 52.6 | 36.0 | 37.1 | 49.1 | 33.7 | 46.5 |
| 35-44 | 100.9 | 110.4 | 113.4 | 129.5 | 76.9 | 100.8 | 109.2 | 81.6 | 113.5 | 83.4 | 90.6 | - | 43.1 |
| 45-54 | 306.1 | 223.6 | 295.4 | 385.8 | 334.5 | 329.3 | 315.1 | 303.9 | 333.6 | 239.0 | 254.1 | 180.9 | 456.8 |
| 55-64 | 990.0 | 937.5 | 879.5 | 1,033.0 | 1,059.5 | 1,055.5 | 999.5 | 966.8 | 944.4 | 876.9 | 906.6 | 619.2 | 1,184.3 |
| 65-74 | 2,182.1 | 1,726.6 | 2,373.1 | 2,228.1 | 2,248.6 | 2,333.6 | 2,160.3 | 2,234.0 | 1,995.5 | 1,915.0 | 2,190.9 | 1,015.2 | 2,936.1 |
| 75-84 | 3,308.2 | 2,531.3 | 3,196.3 | 3,564.9 | 3,386.6 | 3,486.4 | 3,274.7 | 3,409.0 | 3,422.2 | 2,990.9 | 3,237.4 | 2,205.9 | 1,694.9 |
| 85+ | 3,715.0 | 2,093.5 | 4,220.8 | 4,153.3 | 3,799.0 | 3,943.5 | 3,875.9 | 3,883.9 | 3,797.0 | 3,022.4 | 3,546.2 | 3,846.2 | 1,754.4 |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 Lip | | | | | | | | | | | | | |
| 140 Lèvre | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 6.9 | 16.0 | 15.8 | 5.7 | 6.4 | 3.1 | 4.4 | 9.5 | 12.4 | 5.7 | 2.8 | - | - |
| Crude/Brut | 4.3 | 13.1 | 15.4 | 5.3 | 5.7 | 2.4 | 4.0 | 9.1 | 12.7 | 4.1 | 2.6 | - | - |
| 0-24 | -- | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 0.2 | 2.0 | - | - | - | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 1.2 | - | - | - | - |
| 35-44 | 1.1 | 8.8 | - | 5.8 | 5.1 | 0.2 | 1.0 | 2.5 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | - | - |
| 45-54 | 4.0 | 14.2 | 15.5 | 6.4 | 5.3 | 1.3 | 5.1 | 11.2 | 10.9 | 3.2 | 0.6 | - | - |
| 55-64 | 10.4 | 23.3 | 56.1 | 5.4 | 13.8 | 5.2 | 11.9 | 15.3 | 30.2 | 13.6 | 4.7 | - | - |
| 65-74 | 21.3 | 113.8 | - | 23.6 | 30.2 | 9.9 | 18.8 | 37.8 | 52.6 | 30.8 | 13.4 | - | - |
| 75-84 | 40.5 | 81.7 | 166.0 | 47.4 | 26.3 | 36.1 | 28.6 | 76.9 | 95.9 | 55.6 | 27.3 | - | - |
| 85+ | 45.1 | - | 324.7 | 32.2 | 79.1 | 46.7 | 33.2 | 106.7 | 112.8 | - | 33.5 | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 Tongue | | | | | | | | | | | | | |
| 141 Langue | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 3.0 | 2.0 | 3.2 | 2.3 | 1.5 | 3.1 | 3.4 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.1 | - | - |
| Crude/Brut | 2.8 | 1.7 | 3.1 | 2.2 | 1.4 | 2.8 | 3.2 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 3.0 | - | - |
| 0-24 | -- | - | - | 0.6 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 0.5 | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | 2.0 | - | 0.4 | 1.4 | - | - |
| 35-44 | 1.3 | 6.6 | - | - | - | 0.9 | 1.3 | 3.7 | - | 1.5 | 1.9 | - | - |
| 45-54 | 4.7 | - | - | 2.1 | 2.7 | 7.2 | 5.3 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 3.3 | - | - |
| 55-64 | 10.3 | - | 37.4 | 13.6 | 6.9 | 8.8 | 13.5 | 4.4 | 7.0 | 8.4 | 8.1 | - | - |
| 65-74 | 11.6 | 6.3 | - | 6.8 | 4.3 | 11.4 | 14.4 | 8.1 | 8.3 | 11.3 | 10.7 | - | - |
| 75-84 | 9.1 | 13.6 | - | 6.8 | 8.8 | 8.2 | 8.6 | 10.3 | 10.1 | 10.4 | 10.9 | - | - |
| 85+ | 15.4 | - | - | - | - | 23.3 | 9.9 | - | 18.8 | 13.7 | 33.5 | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 142 Major salivary glands | | | | | | | | | | | | | |
| 142 Glandes salivaires | | | | | | | | | | | | | |
| principales | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 1.1 | 1.4 | - | 1.0 | 2.5 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | - | 6.4 |
| Crude/Brut | 0.9 | 1.0 | - | 0.9 | 2.2 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | - | 3.2 |
| 0-24 | -- | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 0.5 | - | - | - | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | - | - | 1.0 | - | - |
| 35-44 | 0.5 | - | - | 1.4 | - | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 2.8 | - | 0.7 | - | - |
| 45-54 | 1.0 | 3.5 | - | - | - | 1.0 | 1.3 | - | - | - | 1.1 | - | - |
| 55-64 | 1.9 | - | - | 2.7 | 10.3 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | - | - | 1.3 | - | 74.0 |
| 65-74 | 3.6 | - | - | - | 12.9 | 6.4 | 2.9 | 2.7 | - | 1.6 | 2.7 | - | - |
| 75-84 | 7.0 | 27.2 | - | 6.8 | - | 8.2 | 10.0 | 10.3 | 5.0 | - | - | - | - |
| 85+ | 10.7 | - | - | 32.2 | 39.6 | 5.8 | 9.9 | - | 18.8 | - | 16.7 | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.
(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 3. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis,

Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 3. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. | |
|---|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | T.-N. I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | | T.N.-O. | |
| Rate per 100,000 • Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | | |
| 140 to 208 (excl. 173) | | | | | | | | | | | | | |
| All cancers except "other skin cancer" | | | | | | | | | | | | | |
| 140 à 208 (excl. 173) | | | | | | | | | | | | | |
| Tous les cancers à l'exception des "autres cancers de la peau" | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 333.4 | 284.7 | 368.2 | 364.7 | 325.6 | 326.6 | 342.7 | 334.1 | 335.2 | 317.8 | 327.7 | 221.8 | 438.6 |
| Crude/Brut | 355.8 | 256.2 | 403.9 | 405.5 | 348.1 | 353.2 | 368.6 | 379.7 | 381.0 | 283.8 | 368.5 | 149.9 | 180.4 |
| 0-24 | 18.6 | 14.6 | 12.3 | 18.7 | 23.1 | 18.5 | 21.0 | 13.6 | 17.9 | 14.7 | 17.1 | 18.9 | 13.5 |
| 25-34 | 66.1 | 50.3 | 92.3 | 86.1 | 84.7 | 58.2 | 71.0 | 62.6 | 67.2 | 67.8 | 59.0 | 66.1 | 50.7 |
| 35-44 | 185.3 | 179.7 | 228.4 | 195.4 | 180.6 | 175.5 | 191.0 | 185.0 | 212.7 | 183.0 | 181.2 | 191.6 | 210.0 |
| 45-54 | 443.1 | 374.9 | 619.6 | 432.4 | 404.6 | 424.1 | 462.2 | 463.6 | 415.5 | 441.2 | 444.6 | 243.1 | 566.4 |
| 55-64 | 807.5 | 693.8 | 922.4 | 928.4 | 775.8 | 780.5 | 820.8 | 849.2 | 826.6 | 790.6 | 801.7 | 1,047.9 | 1,044.6 |
| 65-74 | 1,293.2 | 1,170.5 | 1,276.7 | 1,373.9 | 1,286.0 | 1,280.8 | 1,306.2 | 1,291.0 | 1,363.7 | 1,190.8 | 1,309.2 | - | 2,620.1 |
| 75-84 | 1,697.7 | 1,394.1 | 1,616.2 | 1,869.3 | 1,603.1 | 1,727.2 | 1,740.0 | 1,728.9 | 1,532.6 | 1,566.1 | 1,656.0 | 724.6 | 1,357.5 |
| 85+ | 1,871.9 | 1,169.0 | 1,920.1 | 2,367.3 | 1,742.3 | 1,910.8 | 1,977.6 | 1,516.7 | 1,056.6 | 1,796.2 | 1,629.8 | 2,941.2 | 1,265.8 |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 Lip | | | | | | | | | | | | | |
| 140 Lèvre | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.8 | 0.8 | - | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | - | - |
| Crude/Brut | 0.9 | 0.7 | - | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | -- | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 0.2 | 2.2 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 1.0 | - | - | - |
| 45-54 | 0.8 | - | - | - | - | 1.0 | 0.9 | - | - | 1.7 | 0.6 | - | - |
| 55-64 | 1.6 | 4.8 | - | 2.6 | - | 1.5 | 1.7 | - | 2.3 | 4.3 | - | - | - |
| 65-74 | 2.8 | - | - | - | 3.6 | 0.8 | 4.4 | - | 4.8 | 6.9 | 1.5 | - | - |
| 75-84 | 6.8 | - | - | - | - | 3.4 | 11.9 | 7.0 | 7.4 | 2.5 | 5.2 | - | - |
| 85+ | 11.5 | - | - | - | - | 11.7 | 18.7 | 9.9 | - | 7.5 | 4.1 | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 Tongue | | | | | | | | | | | | | |
| 141 Langue | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 1.0 | 0.4 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 0.9 | 1.6 | - | 2.4 |
| Crude/Brut | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | - | 3.5 |
| 0-24 | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | 6.8 |
| 25-34 | 0.2 | - | - | - | - | 0.2 | 0.3 | - | - | 0.8 | - | - | - |
| 35-44 | 0.6 | - | - | - | - | 0.2 | 0.6 | 1.3 | - | 0.5 | 1.5 | - | - |
| 45-54 | 1.0 | - | - | - | - | 0.8 | 0.9 | 5.7 | - | - | 1.8 | - | - |
| 55-64 | 2.9 | 4.8 | 18.8 | - | 6.4 | 2.1 | 3.2 | 4.2 | 4.6 | 3.2 | 2.1 | - | - |
| 65-74 | 3.9 | - | - | 2.8 | - | 4.2 | 3.1 | 4.4 | 4.8 | 1.4 | 8.2 | - | - |
| 75-84 | 4.9 | - | - | 4.6 | - | 1.4 | 6.4 | 3.5 | 7.4 | 4.9 | 9.1 | - | - |
| 85+ | 6.3 | - | - | 13.6 | - | 2.3 | 6.7 | 19.8 | - | 7.5 | 8.3 | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 142 Major salivary glands | | | | | | | | | | | | | |
| 142 Glandes salivaires | | | | | | | | | | | | | |
| principales | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | - | - |
| Crude/Brut | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | - | - |
| 0-24 | 0.2 | - | - | - | - | 0.1 | 0.2 | - | - | 0.2 | 0.4 | - | - |
| 25-34 | 0.4 | - | - | - | 1.5 | 0.3 | 0.3 | - | 1.2 | 0.8 | 0.3 | - | - |
| 35-44 | 0.6 | - | - | - | - | 1.1 | 0.4 | 1.3 | - | 0.5 | 0.4 | - | - |
| 45-54 | 0.8 | 7.4 | - | - | 2.8 | 0.5 | 0.6 | - | 2.2 | 1.7 | - | - | - |
| 55-64 | 1.4 | - | 18.8 | 5.1 | 3.2 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.3 | - | 0.7 | - | - |
| 65-74 | 2.0 | - | - | - | - | 1.9 | 2.8 | 4.4 | - | 1.4 | 1.5 | - | - |
| 75-84 | 2.7 | - | - | 4.6 | - | - | 5.5 | - | - | - | 3.9 | - | - |
| 85+ | 3.6 | - | - | 13.6 | - | 2.3 | 5.3 | - | - | - | 4.1 | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 3. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 3. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. |
|---|----------------|--------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | T.-N. I.-P.-E. | N.-É. | N.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | | T.N.-O. |
| Rate per 100,000 • Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 143 Gum | | | | | | | | | | | | |
| 143 Gencives | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.3 | - | - | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | - |
| Crude/Brut | 0.3 | - | - | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | -- | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - |
| 35-44 | -- | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 0.3 | - | - | - | 0.3 | 0.4 | - | 2.2 | - | 0.6 | - | - |
| 55-64 | 0.8 | - | - | - | 3.4 | 1.0 | 1.1 | 2.2 | - | - | - | - |
| 65-74 | 1.4 | - | - | 3.4 | 4.3 | 2.0 | 1.0 | - | - | 3.2 | 0.9 | - |
| 75-84 | 2.9 | - | - | - | - | 2.3 | 2.9 | 10.3 | - | 3.5 | 3.6 | - |
| 85+ | 2.4 | - | - | - | - | - | 3.3 | - | - | - | 8.4 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 144 Floor of mouth | | | | | | | | | | | | |
| 144 Plancher de la bouche | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | - |
| Crude/Brut | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 0.8 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | - |
| 0-24 | -- | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - |
| 35-44 | 0.6 | - | - | 1.4 | - | 0.7 | 0.8 | - | - | 0.5 | 0.4 | - |
| 45-54 | 2.5 | 7.1 | - | 6.4 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 5.6 | 2.2 | - | 2.2 | - |
| 55-64 | 5.7 | 4.7 | - | 8.1 | - | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 2.3 | 6.3 | 6.7 | - |
| 65-74 | 6.7 | - | - | 3.4 | - | 9.4 | 7.0 | - | 11.1 | 4.9 | 6.2 | - |
| 75-84 | 7.3 | 13.6 | 41.5 | - | - | 9.3 | 8.6 | - | - | 7.0 | 7.3 | - |
| 85+ | 3.6 | - | - | - | 39.6 | - | 3.3 | - | - | - | 8.4 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 145 Other and unspecified parts of mouth | | | | | | | | | | | | |
| 145 Autre parties non précisées de la bouche | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | - |
| Crude/Brut | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 3.1 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | - |
| 0-24 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - |
| 25-34 | 0.2 | - | - | - | - | 0.4 | 0.2 | 1.0 | - | - | - | - |
| 35-44 | 0.7 | - | - | - | - | 0.7 | 1.0 | - | - | 1.0 | 0.4 | - |
| 45-54 | 2.2 | - | - | 10.7 | 5.3 | 2.8 | 1.7 | - | - | 1.6 | 1.7 | - |
| 55-64 | 5.6 | 9.3 | - | 8.1 | - | 3.9 | 6.0 | 13.1 | 2.3 | 4.2 | 8.1 | - |
| 65-74 | 5.4 | 6.3 | - | 10.1 | 4.3 | 5.9 | 5.4 | 8.1 | - | 3.2 | 5.4 | - |
| 75-84 | 5.7 | - | 41.5 | 13.5 | 17.5 | 4.7 | 3.6 | - | 15.1 | 3.5 | 7.3 | - |
| 85+ | 3.6 | - | - | 32.2 | - | 5.8 | 3.3 | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 146 Oropharynx | | | | | | | | | | | | |
| 146 Rhinopharynx | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 1.8 | 1.6 | 3.2 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 0.7 | 1.6 | - |
| Crude/Brut | 1.6 | 1.4 | 3.1 | 2.0 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | - |
| 0-24 | -- | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | -- | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 0.9 | - | - | 1.4 | - | 0.9 | 1.6 | - | - | - | 0.4 | - |
| 45-54 | 2.2 | 3.5 | - | - | 2.7 | 3.3 | 2.6 | 3.7 | - | - | 0.6 | - |
| 55-64 | 6.1 | 9.3 | - | 2.7 | 6.9 | 6.5 | 5.3 | 15.3 | 9.3 | - | 8.8 | - |
| 65-74 | 8.4 | 6.3 | 47.0 | 16.9 | 8.6 | 8.4 | 7.3 | 8.1 | 2.8 | 8.1 | 9.8 | - |
| 75-84 | 5.5 | - | - | 6.8 | 8.8 | 10.5 | 5.0 | - | 10.1 | 3.5 | - | - |
| 85+ | 5.9 | - | - | - | - | 5.8 | 6.6 | - | 18.8 | - | 8.4 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 147 Nasopharynx | | | | | | | | | | | | |
| 147 Rhinopharynx | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.9 | 0.8 | - | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | - | 27.1 |
| Crude/Brut | 0.9 | 0.7 | - | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | - | 12.9 |
| 0-24 | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 0.2 | - | - | 0.2 | - | - | - |
| 25-34 | 0.5 | - | - | - | 0.1 | 0.9 | 1.0 | - | 0.4 | - | - | - |
| 35-44 | 1.3 | - | - | - | 1.0 | 1.3 | - | 2.8 | 1.0 | 3.3 | - | - |
| 45-54 | 1.3 | - | - | - | 1.0 | 1.1 | 3.7 | - | - | 2.8 | - | 83.1 |
| 55-64 | 2.6 | 4.7 | - | - | 3.3 | 2.2 | - | - | 7.3 | 1.3 | - | 74.0 |
| 65-74 | 2.0 | 6.3 | - | - | 2.5 | 1.6 | 2.7 | - | 1.6 | 2.7 | - | 172.7 |
| 75-84 | 2.1 | - | - | 17.5 | 3.5 | 1.4 | - | - | - | 1.8 | - | - |
| 85+ | 1.2 | - | - | - | - | 3.3 | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 3. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 3. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | T.-N. | I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 143 Gum Gencives | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. Crude/Brut | 0.2 0.2 | . | 1.6 1.5 | 0.4 0.4 | 0.5 0.5 | 0.1 0.1 | 0.2 0.2 | 0.1 0.2 | 0.1 0.2 | 0.1 0.1 | 0.5 0.5 | . | | | | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 0.1 | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | -- | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 0.1 | - | - | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 0.6 | - | 18.8 | - | 3.2 | 0.3 | 0.6 | - | - | - | 0.6 | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 0.6 | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | 2.2 | - | - | 0.7 | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 1.9 | - | - | 4.6 | - | 0.7 | 2.3 | - | - | - | 2.2 | - | | | | | | | | |
| 85+ | 2.1 | - | - | - | 17.6 | - | 1.3 | - | 11.1 | - | 3.9 | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.1 | - | | | | | | | | |
| 144 Floor of mouth | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. Crude/Brut | 0.6 0.6 | . | 1.6 1.5 | 0.2 0.2 | 0.2 0.3 | 0.5 0.5 | 0.8 0.9 | 0.3 0.4 | 1.0 1.0 | 0.6 0.3 | 0.6 0.7 | . | | | | | | | | |
| 0-24 | -- | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | -- | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 0.8 | - | - | - | - | 0.8 | 1.1 | - | 2.2 | 0.8 | 0.6 | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 2.4 | - | 18.8 | - | - | 2.1 | 3.0 | 2.1 | 4.6 | 1.1 | 2.1 | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 2.3 | - | - | 2.8 | - | 1.1 | 3.4 | - | 4.8 | 1.4 | 3.0 | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 2.5 | - | - | - | - | 2.1 | 3.7 | 3.5 | - | - | 3.9 | - | | | | | | | | |
| 85+ | 3.1 | - | - | - | 17.6 | 4.7 | 2.7 | - | - | 7.5 | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 145 Other and unspecified parts of mouth | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 Autre parties non précisées de la bouche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. Crude/Brut | 0.8 0.9 | 1.2 1.0 | . | 1.7 1.7 | 1.2 1.3 | 0.5 0.6 | 1.1 1.2 | 0.6 0.5 | 1.0 1.0 | 0.8 0.7 | 0.6 0.5 | . | | | | | | | | |
| 0-24 | -- | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.2 | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 0.2 | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 0.4 | - | - | 1.4 | - | 0.4 | 0.4 | 1.3 | - | 0.5 | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 1.3 | - | - | 4.3 | - | 0.8 | 1.7 | 4.4 | 4.4 | 0.8 | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 2.0 | 4.8 | - | 5.1 | 3.2 | 0.9 | 3.0 | - | 2.3 | 3.2 | - | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 3.2 | 11.7 | - | 2.8 | 3.6 | 2.3 | 4.1 | 2.2 | 4.8 | 4.1 | 0.7 | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 4.1 | - | - | 9.2 | 17.9 | 2.8 | 4.6 | - | - | - | 6.5 | - | | | | | | | | |
| 85+ | 4.7 | - | - | - | - | 4.7 | 6.7 | - | - | 7.5 | 4.1 | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 146 Oropharynx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. Crude/Brut | 0.7 0.7 | 0.4 0.3 | . | 1.2 1.3 | 0.9 0.8 | 0.5 0.5 | 0.8 0.9 | 0.9 0.9 | 0.2 0.2 | 0.4 0.3 | 1.0 1.1 | . | | | | | | | | |
| 0-24 | -- | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.3 | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 0.4 | - | - | - | - | - | 0.2 | 1.3 | - | 0.5 | 1.5 | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 1.0 | 3.7 | - | 2.2 | 5.5 | 1.5 | 0.6 | - | - | 0.8 | 0.6 | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 2.3 | - | - | 5.1 | 3.2 | 0.9 | 3.4 | 4.2 | 2.3 | - | 2.1 | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 2.8 | - | - | 8.4 | - | 1.9 | 3.1 | 4.4 | - | 2.8 | 3.7 | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 2.7 | - | - | - | - | 2.8 | 3.7 | - | - | - | 5.2 | - | | | | | | | | |
| 85+ | 1.6 | - | - | - | - | 2.3 | 2.7 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 147 Nasopharynx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 Rhinopharynx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. Crude/Brut | 0.3 0.3 | . | . | . | . | 0.2 0.2 | 0.4 0.4 | 0.3 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.7 0.7 | . | | | | | | | | |
| 0-24 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.2 | 0.2 | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 0.1 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | 0.7 | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 0.6 | - | - | - | - | 0.2 | 0.9 | 1.3 | - | - | 0.8 | 26.2 | | | | | | | | |
| 45-54 | 0.7 | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | 2.3 | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 0.8 | - | - | - | - | 0.3 | 1.1 | - | - | 1.1 | 1.4 | 95.0 | | | | | | | | |
| 65-74 | 0.7 | - | - | - | 1.9 | 0.3 | - | 2.4 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 0.2 | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 85+ | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.1 | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

**TABLE 3. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis,
Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)**

**TABLEAU 3. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de nouveaux sièges primaires de cancer selon le
diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)**

| | Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. T.N.-O. | | | | | | | | | |
|--|--------|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | T.-N. I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 Hypopharynx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 1.5 | 2.0 | - | 3.0 | 0.9 | 2.0 | 1.2 | 2.6 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | - | - | | | | | | | | | |
| Crude/Brut | 1.4 | 1.7 | - | 2.9 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | 1.2 | - | - | | | | | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 25-34 | -- | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 35-44 | 0.3 | - | - | 1.4 | - | 0.2 | 0.3 | - | 1.4 | 0.5 | 0.4 | - | - | | | | | | | | | |
| 45-54 | 1.6 | 3.5 | - | 4.3 | - | 3.1 | 0.7 | 1.9 | 4.4 | - | 1.1 | - | - | | | | | | | | | |
| 55-64 | 5.5 | 14.0 | - | 10.8 | - | 8.8 | 3.8 | 10.9 | 4.6 | 1.0 | 4.0 | - | - | | | | | | | | | |
| 65-74 | 8.1 | 6.3 | - | 10.1 | 12.9 | 7.4 | 8.0 | 10.8 | 8.3 | 8.1 | 8.0 | - | - | | | | | | | | | |
| 75-84 | 7.0 | - | - | 20.3 | - | 7.0 | 5.0 | 20.5 | 10.1 | 13.9 | 1.8 | - | - | | | | | | | | | |
| 85+ | 3.6 | - | - | - | - | 5.8 | 3.3 | - | - | - | 8.4 | - | - | | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 149 Other and ill-defined sites | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 Sièges autres et mal définis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | - | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | - | - | | | | | | | | | |
| Crude/Brut | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | - | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | - | - | | | | | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 25-34 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 35-44 | 0.1 | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 45-54 | 0.7 | 3.5 | - | - | - | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 2.2 | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 55-64 | 2.6 | - | - | 5.4 | - | 3.3 | 2.0 | 2.2 | - | 3.1 | 4.0 | - | - | | | | | | | | | |
| 65-74 | 4.1 | 6.3 | 23.5 | 3.4 | - | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 2.8 | - | 0.9 | - | - | | | | | | | | | |
| 75-84 | 3.1 | - | - | - | - | 7.0 | 3.6 | - | 5.0 | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 85+ | 1.2 | - | - | - | - | - | 3.3 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 150 Esophagus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 Oesophage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 5.7 | 6.6 | 6.2 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 6.0 | 5.6 | 5.8 | 2.8 | 5.6 | - | 11.8 | | | | | | | | | |
| Crude/Brut | 5.0 | 5.2 | 6.2 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 2.1 | 5.4 | - | 3.2 | | | | | | | | | |
| 0-24 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | | | | | | | | | |
| 25-34 | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 35-44 | 0.5 | - | - | - | - | 0.2 | 0.6 | 1.2 | - | 0.5 | 1.1 | - | - | | | | | | | | | |
| 45-54 | 4.7 | - | - | 8.5 | 8.0 | 4.3 | 5.1 | 3.7 | 8.7 | 4.0 | 3.3 | - | - | | | | | | | | | |
| 55-64 | 13.8 | 9.3 | - | 16.3 | 10.3 | 15.0 | 17.2 | 13.1 | 7.0 | 5.2 | 10.1 | - | - | | | | | | | | | |
| 65-74 | 31.0 | 56.9 | 47.0 | 27.0 | 25.8 | 37.6 | 30.6 | 32.4 | 22.1 | 16.2 | 27.6 | - | 172.7 | | | | | | | | | |
| 75-84 | 40.8 | 54.4 | 83.0 | 20.3 | 52.6 | 45.4 | 36.4 | 41.0 | 60.6 | 13.9 | 51.0 | - | - | | | | | | | | | |
| 85+ | 35.6 | - | - | 32.2 | - | 23.3 | 46.4 | 21.3 | 56.4 | 27.5 | 41.8 | - | - | | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 151 Stomach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 Estomac | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 15.6 | 27.3 | 17.2 | 21.4 | 17.0 | 17.5 | 14.2 | 17.0 | 13.6 | 13.8 | 14.6 | - | 22.6 | | | | | | | | | |
| Crude/Brut | 13.5 | 20.7 | 16.9 | 19.3 | 15.2 | 13.9 | 12.4 | 16.4 | 14.1 | 10.0 | 14.1 | - | 9.7 | | | | | | | | | |
| 0-24 | 0.1 | 0.8 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | 0.4 | - | - | | | | | | | | | |
| 25-34 | 0.5 | - | - | 1.2 | - | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | - | - | - | | | | | | | | | |
| 35-44 | 2.9 | 2.2 | 10.3 | 2.9 | 3.4 | 2.1 | 3.3 | 4.9 | - | 3.4 | 3.3 | - | - | | | | | | | | | |
| 45-54 | 11.3 | 10.6 | - | 14.9 | 8.0 | 10.2 | 12.3 | 13.0 | 10.9 | 10.5 | 10.6 | - | 41.5 | | | | | | | | | |
| 55-64 | 31.4 | 65.3 | 18.7 | 43.4 | 27.5 | 31.9 | 29.4 | 37.1 | 25.5 | 30.3 | 30.3 | - | 74.0 | | | | | | | | | |
| 65-74 | 74.1 | 139.1 | 117.5 | 77.6 | 94.8 | 72.2 | 72.4 | 72.9 | 77.5 | 63.2 | 71.3 | - | 172.7 | | | | | | | | | |
| 75-84 | 126.4 | 190.5 | 166.0 | 189.4 | 166.7 | 159.6 | 100.7 | 138.4 | 106.0 | 111.3 | 116.6 | - | - | | | | | | | | | |
| 85+ | 150.6 | 348.9 | - | 322.0 | 79.1 | 239.2 | 119.4 | 149.4 | 94.0 | 109.9 | 108.8 | - | - | | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 152 Small intestine, including duodenum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 Intestin grêle, y compris le duodénum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 1.2 | 1.2 | - | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 0.9 | 1.0 | - | - | | | | | | | | | |
| Crude/Brut | 1.0 | 1.0 | - | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 2.4 | 0.7 | 0.9 | - | - | | | | | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 35-44 | 0.3 | - | - | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 45-54 | 1.2 | 3.5 | - | - | - | 1.0 | 1.5 | - | - | 2.4 | 0.6 | - | - | | | | | | | | | |
| 55-64 | 3.4 | 9.3 | - | 2.7 | 3.4 | 5.2 | 2.7 | 2.2 | 4.6 | 2.1 | 2.0 | - | - | | | | | | | | | |
| 65-74 | 4.8 | - | - | 6.8 | - | 4.0 | 4.5 | 2.7 | 19.4 | 3.2 | 5.4 | - | - | | | | | | | | | |
| 75-84 | 7.5 | - | - | 6.8 | 8.8 | 10.5 | 5.7 | 20.5 | 10.1 | 3.5 | 5.5 | - | - | | | | | | | | | |
| 85+ | 10.7 | - | - | - | - | 17.5 | 3.3 | 21.3 | 18.8 | 13.7 | 16.7 | - | - | | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 3. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 3. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| | Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. |
|--|--------|----------------|--------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | | T.-N. I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | | T.N.-O. |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | | |
| 148 Hypopharynx | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 0.2 | - | - | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | - |
| Crude/Brut | 0.2 | - | - | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | -- | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 0.4 | - | - | - | - | 0.3 | 0.9 | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | 0.9 | - | - | 2.6 | - | 0.6 | 0.4 | 4.2 | 2.3 | - | 2.1 | - | - |
| 65-74 | 1.3 | - | - | 2.8 | 3.6 | 2.7 | 0.3 | 4.4 | - | 1.4 | - | - | - |
| 75-84 | 0.3 | - | - | - | - | 0.7 | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
| 85+ | 0.5 | - | - | 13.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 Other and ill-defined sites | | | | | | | | | | | | | |
| 149 Sièges autres et mal définis | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 0.2 | 0.4 | - | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | - | - |
| Crude/Brut | 0.2 | 0.3 | - | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | - | - |
| 0-24 | -- | - | - | 0.6 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 0.1 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | 1.2 | - | - | - | - |
| 35-44 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 0.6 | - | - | 2.2 | 2.8 | 0.3 | 0.7 | 1.9 | - | - | - | - | - |
| 55-64 | 0.5 | - | - | - | 3.2 | 0.6 | 0.4 | - | - | 1.1 | - | - | - |
| 65-74 | 0.7 | 5.9 | - | - | - | 0.4 | 0.8 | - | 2.4 | - | 0.7 | - | - |
| 75-84 | 0.8 | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 85+ | 1.0 | - | - | 27.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 Esophagus | | | | | | | | | | | | | |
| 150 Oesophage | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 1.9 | 0.4 | - | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 2.5 | - | - |
| Crude/Brut | 2.1 | 0.3 | - | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 0.9 | 3.0 | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | -- | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | -- | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 0.8 | - | - | - | - | 1.0 | 0.9 | - | - | 0.8 | 1.2 | - | - |
| 55-64 | 4.5 | - | - | - | - | 4.5 | 4.7 | 6.3 | 2.3 | 3.2 | 8.2 | - | - |
| 65-74 | 9.4 | 5.9 | - | 16.8 | 18.0 | 8.0 | 10.8 | 11.0 | 7.2 | 5.5 | 7.4 | - | - |
| 75-84 | 15.0 | - | - | 13.8 | 12.0 | 13.1 | 15.2 | 10.5 | 14.8 | 7.4 | 27.4 | - | - |
| 85+ | 22.4 | - | - | 40.8 | - | 16.3 | 26.7 | 19.8 | 55.3 | 7.5 | 20.7 | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 151 Stomach | | | | | | | | | | | | | |
| 151 Estomac | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 6.9 | 9.1 | 6.7 | 7.1 | 5.5 | 8.0 | 6.5 | 6.9 | 5.6 | 6.6 | 6.3 | - | 11.3 |
| Crude/Brut | 7.7 | 8.3 | 9.1 | 8.7 | 5.9 | 8.8 | 7.3 | 8.4 | 6.9 | 6.0 | 7.5 | - | 7.1 |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 0.7 | - | - | - | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 2.4 | 1.2 | 0.7 | - | 16.9 |
| 35-44 | 1.8 | 2.2 | - | 5.7 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 1.9 | - | - |
| 45-54 | 5.3 | 3.7 | - | - | 11.0 | 6.1 | 4.5 | 11.4 | 4.4 | 7.6 | 3.5 | - | - |
| 55-64 | 11.9 | 14.4 | - | 10.2 | 6.4 | 11.0 | 13.3 | 12.6 | 11.4 | 11.8 | 10.9 | - | 95.0 |
| 65-74 | 27.8 | 61.0 | 39.9 | 33.5 | 25.1 | 35.8 | 27.1 | 19.8 | 19.3 | 19.3 | 21.5 | - | - |
| 75-84 | 62.7 | 90.9 | 88.2 | 58.6 | 35.9 | 79.8 | 52.8 | 59.4 | 40.8 | 61.3 | 73.0 | - | - |
| 85+ | 73.0 | 106.3 | 76.8 | 122.4 | 17.6 | 70.0 | 78.6 | 69.4 | 66.3 | 96.9 | 45.6 | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 152 Small intestine, including duodenum | | | | | | | | | | | | | |
| 152 Intestin grêle, y compris le duodénum | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 0.9 | - | - | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | - | - |
| Crude/Brut | 1.0 | - | - | 1.7 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 0.2 | - | - | - | - | 0.3 | 0.1 | - | - | 0.4 | - | - | - |
| 35-44 | 0.2 | - | - | 1.4 | - | 0.4 | - | - | - | 0.5 | - | - | - |
| 45-54 | 0.6 | - | - | 2.2 | - | 1.5 | 0.4 | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | 2.6 | - | - | 5.1 | - | 2.1 | 3.6 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1.4 | - | - |
| 65-74 | 4.6 | - | - | 2.8 | - | 3.4 | 6.5 | 4.4 | 4.8 | 6.9 | 2.2 | - | - |
| 75-84 | 5.3 | - | - | 13.8 | 6.0 | 2.1 | 7.3 | 3.5 | - | 9.8 | 3.9 | - | - |
| 85+ | 4.2 | - | - | - | - | 7.0 | 5.3 | 9.9 | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 3. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis,

Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 3. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| | Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. |
|--|--------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| | | T.-N. | I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | | | | | Alb. | C.-B. | | T.N.-O. |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | | |
| 153 Colon | | | | | | | | | | | | | |
| 153 Côlon | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 39.9 | 37.7 | 39.6 | 47.9 | 42.2 | 37.6 | 46.3 | 41.1 | 39.4 | 29.2 | 29.3 | 26.2 | 18.1 |
| Crude/Brut | 34.4 | 29.6 | 38.5 | 44.3 | 37.2 | 31.2 | 40.0 | 39.3 | 40.4 | 21.2 | 28.1 | 13.6 | 12.9 |
| 0-24 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.5 | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 1.4 | - | - | 1.2 | - | 2.1 | 1.4 | 1.0 | - | 1.1 | 0.7 | - | 15.5 |
| 35-44 | 7.3 | 4.4 | 20.6 | 8.6 | 3.4 | 6.8 | 8.4 | 6.2 | 11.4 | 4.8 | 7.1 | - | - |
| 45-54 | 25.4 | 46.1 | 31.1 | 49.0 | 13.3 | 23.0 | 28.1 | 29.8 | 30.5 | 18.6 | 16.7 | - | 83.1 |
| 55-64 | 87.7 | 93.3 | 112.3 | 100.3 | 113.5 | 83.0 | 104.3 | 67.7 | 85.9 | 73.2 | 53.2 | 103.2 | 74.0 |
| 65-74 | 187.9 | 170.8 | 164.5 | 229.6 | 224.0 | 185.4 | 221.5 | 170.2 | 130.1 | 121.5 | 145.3 | 255.8 | - |
| 75-84 | 318.9 | 285.8 | 290.6 | 365.3 | 298.3 | 294.8 | 363.5 | 369.1 | 363.4 | 271.3 | 233.2 | - | - |
| 85+ | 381.9 | 209.4 | 162.3 | 354.2 | 435.3 | 320.8 | 444.3 | 576.2 | 488.7 | 192.3 | 334.6 | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 154 Rectum, rectosigmoid junction and anus | | | | | | | | | | | | | |
| 154 Rectum, jonction recto-sigmoidienne et anus | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 22.3 | 20.0 | 19.0 | 26.9 | 18.7 | 25.4 | 21.0 | 21.9 | 21.7 | 20.0 | 21.3 | 45.8 | 16.2 |
| Crude/Brut | 19.6 | 15.5 | 18.5 | 25.0 | 16.8 | 21.8 | 18.6 | 21.1 | 22.2 | 14.8 | 20.8 | 13.6 | 6.4 |
| 0-24 | 0.1 | - | - | - | 0.7 | 0.1 | - | 0.5 | - | 0.2 | - | - | - |
| 25-34 | 0.3 | - | - | - | - | 0.1 | 0.4 | - | - | - | 0.7 | - | - |
| 35-44 | 4.5 | 6.6 | - | 7.2 | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 3.7 | 1.4 | 3.9 | 3.7 | - | - |
| 45-54 | 18.6 | 7.1 | 15.5 | 23.4 | 18.6 | 24.3 | 15.2 | 22.4 | 26.2 | 15.3 | 15.6 | 60.3 | 41.5 |
| 55-64 | 56.1 | 46.6 | 18.7 | 56.9 | 41.3 | 60.0 | 55.0 | 54.6 | 34.8 | 62.7 | 47.2 | - | - |
| 65-74 | 113.4 | 107.5 | 141.0 | 151.9 | 90.5 | 127.0 | 107.2 | 97.2 | 110.7 | 85.9 | 122.2 | - | 172.7 |
| 75-84 | 147.5 | 149.7 | 124.5 | 175.9 | 131.6 | 166.6 | 137.8 | 158.9 | 151.4 | 146.1 | 134.8 | - | - |
| 85+ | 161.3 | 139.6 | 162.3 | 161.0 | 118.7 | 157.5 | 155.8 | 170.7 | 263.2 | 109.9 | 167.3 | 3,846.2 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 155 Liver and intrahepatic bile ducts | | | | | | | | | | | | | |
| 155 Foie et voies biliaires intrahépatiques | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 4.5 | 1.8 | 3.3 | 1.9 | 2.1 | 5.6 | 4.4 | 6.1 | 2.9 | 3.4 | 4.8 | - | 6.4 |
| Crude/Brut | 4.0 | 1.4 | 3.1 | 1.8 | 1.9 | 4.8 | 3.9 | 5.8 | 3.0 | 2.6 | 4.6 | - | 3.2 |
| 0-24 | 0.3 | - | - | - | - | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | - | - |
| 25-34 | 0.3 | - | - | - | - | 0.3 | 0.4 | - | 1.2 | 0.4 | 0.3 | - | - |
| 35-44 | 1.3 | - | - | 1.4 | - | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | - | - |
| 45-54 | 3.8 | - | - | - | 8.0 | 3.3 | 4.6 | 7.5 | - | 3.2 | 3.9 | - | - |
| 55-64 | 10.1 | - | 18.7 | 5.4 | - | 15.6 | 9.1 | 8.7 | 2.3 | 9.4 | 8.8 | - | 74.0 |
| 65-74 | 21.9 | 12.6 | - | 3.4 | - | 27.2 | 23.6 | 27.0 | 16.6 | 21.1 | 19.6 | - | - |
| 75-84 | 29.3 | 27.2 | - | 27.1 | 35.1 | 36.1 | 23.6 | 46.1 | 15.1 | 10.4 | 43.7 | - | - |
| 85+ | 27.3 | - | 162.3 | - | - | 35.0 | 19.9 | 64.0 | 37.6 | 13.7 | 33.5 | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 156 Gallbladder and extrahepatic bile ducts | | | | | | | | | | | | | |
| 156 Vésicule et voies biliaires extrahépatiques | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 2.9 | 2.1 | 3.0 | 2.4 | 1.8 | 3.9 | 2.6 | 3.6 | 1.9 | 1.8 | 2.8 | - | 11.8 |
| Crude/Brut | 2.4 | 1.7 | 3.1 | 2.2 | 1.6 | 3.1 | 2.2 | 3.5 | 2.0 | 1.3 | 2.7 | - | 3.2 |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - |
| 35-44 | 0.4 | - | - | - | - | 1.2 | 0.1 | - | - | - | 0.4 | - | - |
| 45-54 | 2.2 | 7.1 | - | - | 2.7 | 2.8 | 2.0 | - | - | 3.2 | 1.7 | - | - |
| 55-64 | 4.8 | 9.3 | - | 5.4 | 6.9 | 4.6 | 4.2 | 15.3 | 2.3 | 2.1 | 5.4 | - | - |
| 65-74 | 14.6 | - | - | 13.5 | 8.6 | 20.8 | 12.4 | 13.5 | 11.1 | 8.1 | 17.8 | - | 172.7 |
| 75-84 | 23.6 | 13.6 | 83.0 | 20.3 | 8.8 | 30.3 | 24.3 | 30.8 | 15.1 | 17.4 | 18.2 | - | - |
| 85+ | 28.5 | - | - | 32.2 | - | 46.7 | 29.8 | 21.3 | 37.6 | 13.7 | 16.7 | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 3. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 3. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. |
|--|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | T.-N. I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | | T.N.-O. |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 153 Colon | | | | | | | | | | | | |
| 153 Côlon | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 31.6 | 38.7 | 40.7 | 39.4 | 32.3 | 32.6 | 33.6 | 29.7 | 28.0 | 24.0 | 27.1 | 8.7 |
| Crude/Brut | 35.0 | 36.7 | 48.4 | 46.8 | 36.6 | 35.7 | 37.4 | 36.2 | 35.4 | 21.3 | 32.3 | 7.5 |
| 0-24 | 0.2 | 1.7 | - | 0.6 | - | 0.1 | 0.2 | 0.5 | - | - | - | - |
| 25-34 | 1.0 | 2.0 | - | - | - | 0.8 | 1.5 | 1.1 | - | 0.4 | 1.0 | - |
| 35-44 | 6.5 | 11.2 | 20.8 | 10.1 | 8.7 | 6.7 | 6.8 | 2.5 | 4.5 | 5.6 | 4.9 | - |
| 45-54 | 25.1 | 22.3 | 31.8 | 41.3 | 22.0 | 25.6 | 27.9 | 24.6 | 22.1 | 10.2 | 22.2 | 81.0 |
| 55-64 | 71.0 | 90.9 | 56.5 | 74.0 | 74.0 | 76.9 | 73.4 | 79.7 | 57.1 | 56.0 | 57.5 | - |
| 65-74 | 137.1 | 228.3 | 199.5 | 142.4 | 140.1 | 140.3 | 144.2 | 136.1 | 137.3 | 105.0 | 112.0 | - |
| 75-84 | 252.7 | 222.2 | 411.4 | 345.3 | 251.2 | 249.0 | 273.2 | 220.0 | 207.8 | 198.5 | 230.6 | - |
| 85+ | 308.6 | 212.5 | 76.8 | 462.6 | 352.0 | 324.5 | 313.2 | 218.1 | 309.4 | 275.8 | 286.1 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,265.8 |
| 154 Rectum, rectosigmoid junction and anus | | | | | | | | | | | | |
| 154 Rectum, jonction recto-sigmoidienne et anus | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 13.4 | 11.3 | 9.9 | 14.4 | 15.2 | 15.2 | 11.9 | 12.4 | 12.7 | 14.4 | 13.8 | 25.9 |
| Crude/Brut | 14.7 | 10.1 | 10.6 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 13.2 | 15.0 | 16.2 | 12.6 | 16.0 | 7.5 |
| 0-24 | -- | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | 0.2 | - |
| 25-34 | 0.7 | - | - | 2.5 | - | 0.6 | 0.7 | - | - | 0.8 | 1.0 | - |
| 35-44 | 3.5 | 6.7 | - | 4.3 | 3.5 | 3.9 | 2.7 | 1.3 | 3.0 | 4.6 | 4.2 | - |
| 45-54 | 12.8 | 7.4 | 31.8 | 8.7 | 11.0 | 15.7 | 10.4 | 9.5 | 6.6 | 16.1 | 15.2 | - |
| 55-64 | 36.0 | 33.5 | 18.8 | 53.6 | 35.4 | 38.8 | 32.3 | 29.4 | 32.0 | 44.2 | 35.6 | - |
| 65-74 | 57.2 | 58.5 | 59.8 | 47.5 | 82.6 | 66.3 | 49.0 | 72.5 | 53.0 | 64.9 | 51.9 | - |
| 75-84 | 90.1 | 60.6 | - | 82.9 | 101.7 | 99.0 | 85.6 | 80.3 | 100.2 | 66.2 | 110.7 | 724.6 |
| 85+ | 110.5 | 35.4 | 76.8 | 149.7 | 88.0 | 133.0 | 110.6 | 79.3 | 154.7 | 111.8 | 70.5 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 155 Liver and intrahepatic bile ducts | | | | | | | | | | | | |
| 155 Foie et voies biliaires intrahépatiques | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 1.7 | 0.4 | - | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - |
| Crude/Brut | 1.9 | 0.3 | - | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | - |
| 0-24 | 0.2 | - | - | - | 0.7 | 0.3 | 0.2 | - | - | - | 0.4 | - |
| 25-34 | 0.4 | - | - | - | - | 0.5 | 0.6 | - | - | 0.4 | 0.3 | - |
| 35-44 | 0.4 | - | - | - | - | 0.2 | 0.6 | - | - | 0.5 | 0.4 | - |
| 45-54 | 1.5 | - | - | - | - | 1.5 | 1.7 | 3.8 | - | - | 2.3 | - |
| 55-64 | 2.8 | - | - | 2.6 | 6.4 | 3.9 | 3.4 | - | - | - | 2.1 | - |
| 65-74 | 7.9 | 5.9 | - | 8.4 | 3.6 | 9.9 | 8.3 | 6.6 | 9.6 | 5.5 | 5.2 | - |
| 75-84 | 11.4 | - | - | 9.2 | 23.9 | 12.4 | 12.9 | 17.5 | 11.1 | 9.8 | 3.9 | - |
| 85+ | 17.7 | - | - | 27.2 | - | 21.0 | 20.0 | 19.8 | 11.1 | 29.8 | 4.1 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 156 Gallbladder and extrahepatic bile ducts | | | | | | | | | | | | |
| 156 Vésicule et voies biliaires extrahépatiques | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 3.1 | 2.8 | 3.5 | 2.3 | 0.7 | 3.6 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 2.5 | 3.7 | 12.9 |
| Crude/Brut | 3.5 | 2.4 | 4.5 | 2.6 | 0.8 | 3.9 | 3.3 | 4.3 | 4.7 | 2.2 | 4.5 | 7.5 |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | -- | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 0.3 | - | - | - | - | 0.4 | 0.1 | - | - | 0.5 | 1.1 | - |
| 45-54 | 2.3 | 7.4 | - | - | - | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 0.8 | 4.7 | - |
| 55-64 | 6.0 | 9.6 | 18.8 | 7.7 | 6.4 | 8.6 | 4.7 | 6.2 | 6.9 | 2.2 | 4.8 | 149.7 |
| 65-74 | 15.5 | 11.7 | - | 16.8 | - | 18.3 | 15.0 | 19.8 | 16.9 | 12.4 | 15.6 | - |
| 75-84 | 21.8 | 10.1 | 29.4 | 9.2 | - | 20.6 | 18.4 | 34.9 | 37.1 | 27.0 | 30.0 | - |
| 85+ | 43.8 | - | 76.8 | 13.6 | 17.6 | 53.7 | 49.3 | 19.8 | 33.2 | 29.8 | 49.8 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 3. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 3. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| | Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. |
|--|--------|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | | T.-N. I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | | T.N.-O. |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | | |
| 157 Pancreas | | | | | | | | | | | | | |
| 157 Pancréas | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 10.9 | 4.4 | 15.7 | 14.1 | 12.6 | 11.1 | 10.1 | 13.2 | 10.0 | 13.1 | 10.0 | - | 18.2 |
| Crude/Brut | 9.3 | 3.4 | 15.4 | 12.9 | 11.1 | 9.2 | 8.8 | 12.7 | 10.3 | 9.1 | 9.6 | - | 6.4 |
| 0-24 | -- | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 1.0 | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 1.7 | 2.2 | - | 1.4 | - | 1.7 | 2.0 | 3.7 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | - | - |
| 45-54 | 7.2 | - | - | 12.8 | 15.9 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | 8.7 | 5.7 | 5.6 | - | - |
| 55-64 | 24.0 | 23.3 | - | 35.2 | 34.4 | 25.4 | 23.9 | 19.6 | 20.9 | 26.1 | 18.2 | - | 74.0 |
| 65-74 | 53.4 | 12.6 | 141.0 | 47.3 | 43.1 | 58.8 | 50.4 | 64.8 | 44.3 | 69.7 | 48.2 | - | 172.7 |
| 75-84 | 80.8 | 13.6 | 124.5 | 121.8 | 105.3 | 76.9 | 66.4 | 123.0 | 85.8 | 93.9 | 91.1 | - | - |
| 85+ | 115.1 | 69.8 | 162.3 | 161.0 | 118.7 | 105.0 | 109.4 | 106.7 | 94.0 | 192.3 | 100.4 | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 158 Retroperitoneum and peritoneum | | | | | | | | | | | | | |
| 158 Tissu rétropéritonéal et péritoïne | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 0.6 | - | 1.6 | 0.9 | - | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | - | - |
| Crude/Brut | 0.6 | - | 1.5 | 0.9 | - | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | - | - |
| 0-24 | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 0.4 | - | - | - | - | 0.9 | 0.3 | - | - | - | 0.3 | - | - |
| 35-44 | 0.3 | - | - | 1.4 | - | 0.5 | - | - | - | 1.0 | 0.4 | - | - |
| 45-54 | 0.5 | - | - | 2.1 | - | 1.0 | 0.4 | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | 1.2 | - | 18.7 | 2.7 | - | 2.0 | 0.7 | 2.2 | - | - | 1.3 | - | - |
| 65-74 | 2.7 | - | - | 3.4 | - | 4.4 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 1.6 | 2.7 | - | - |
| 75-84 | 2.9 | - | - | - | - | 3.5 | 3.6 | - | 5.0 | 7.0 | - | - | - |
| 85+ | 4.7 | - | - | - | - | 11.7 | 3.3 | - | 18.8 | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 159 Other and ill-defined sites | | | | | | | | | | | | | |
| 159 Sièges autres ou non précisés | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.0 | 2.7 | 1.9 | 2.5 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | - | 18.0 |
| Crude/Brut | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | 1.6 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | - | 3.2 |
| 0-24 | -- | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 0.2 | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 0.2 | - | 10.3 | - | - | 0.2 | 0.4 | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 1.0 | - | - | - | 2.7 | 0.8 | 1.8 | - | - | 0.8 | - | - | - |
| 55-64 | 3.8 | - | - | - | - | 6.2 | 4.9 | 2.2 | - | - | 2.0 | - | - |
| 65-74 | 6.6 | - | - | 6.8 | 17.2 | 6.9 | 9.3 | - | 2.8 | 1.6 | 3.6 | - | - |
| 75-84 | 15.1 | 13.6 | - | 6.8 | 17.5 | 15.1 | 21.4 | 10.3 | 10.1 | 7.0 | 9.1 | - | - |
| 85+ | 28.5 | - | - | 32.2 | 39.6 | 23.3 | 33.2 | 42.7 | 18.8 | 13.7 | 25.1 | - | 1,754.4 |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 160 Nasal cavities, middle ear and sinuses | | | | | | | | | | | | | |
| 160 Fosses nasales, de l'oreille moyenne et sinuses annexes | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 0.9 | 1.6 | - | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | - | 0.5 | 1.2 | 0.6 | - | 4.5 |
| Crude/Brut | 0.8 | 1.4 | - | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | - | 0.6 | 1.0 | 0.6 | - | 3.2 |
| 0-24 | -- | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.2 | - | - | - |
| 25-34 | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 0.4 | - | - | - | 1.7 | 0.3 | 0.3 | - | - | 1.5 | - | - | - |
| 45-54 | 1.0 | - | - | 4.3 | - | 0.8 | 1.1 | - | - | 1.6 | 0.6 | - | 41.5 |
| 55-64 | 2.4 | 18.7 | - | 2.7 | - | 1.0 | 3.1 | - | - | 3.1 | 2.7 | - | - |
| 65-74 | 3.2 | - | - | - | 4.3 | 1.5 | 4.8 | - | - | 6.5 | 3.6 | - | - |
| 75-84 | 4.4 | - | - | 6.8 | 8.8 | 4.7 | 5.7 | - | 10.1 | - | 1.8 | - | - |
| 85+ | 7.1 | - | - | - | 39.6 | - | 16.6 | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 3. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 3. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. | | | | | | | |
|--|-------|----------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| | T.-N. | I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | | | | | | Alb. | | | | | | | | | |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 157 Pancreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 157 Pancréas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 8.2 | 4.6 | 9.2 | 10.4 | 7.9 | 8.5 | 8.0 | 8.1 | 10.9 | 8.6 | 7.3 | - | | | | | | | |
| Crude/Brut | 9.1 | 4.2 | 10.6 | 12.4 | 9.1 | 9.4 | 9.0 | 10.0 | 13.8 | 7.6 | 8.8 | - | | | | | | | |
| 0-24 | -- | - | - | 0.6 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | | | | | | | |
| 25-34 | 0.2 | - | - | - | - | 0.3 | 0.4 | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 35-44 | 1.1 | 2.2 | - | 1.4 | - | 1.1 | 1.4 | 1.3 | - | - | 1.1 | - | | | | | | | |
| 45-54 | 4.9 | 3.7 | 15.9 | 6.5 | 5.5 | 5.3 | 4.3 | 5.7 | 6.6 | 5.9 | 4.1 | - | | | | | | | |
| 55-64 | 15.1 | 9.6 | 18.8 | 30.6 | 16.1 | 16.4 | 13.7 | 18.9 | 20.6 | 9.7 | 13.7 | - | | | | | | | |
| 65-74 | 42.8 | 23.4 | 59.8 | 39.1 | 35.9 | 43.1 | 42.3 | 37.3 | 65.1 | 53.9 | 37.1 | - | | | | | | | |
| 75-84 | 65.3 | 30.3 | 29.4 | 64.5 | 65.8 | 75.0 | 60.6 | 55.9 | 85.3 | 66.2 | 62.5 | - | | | | | | | |
| 85+ | 87.1 | 35.4 | 76.8 | 163.3 | 105.6 | 63.0 | 94.6 | 89.2 | 88.4 | 104.3 | 74.6 | - | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 158 Retroperitoneum and peritoneum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 Tissu rétropéritonéal et péritoine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.6 | 0.4 | - | 0.2 | - | 1.1 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | - | | | | | | | |
| Crude/Brut | 0.7 | 0.3 | - | 0.2 | - | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | - | | | | | | | |
| 0-24 | 0.1 | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 25-34 | 0.2 | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.4 | - | - | | | | | | | |
| 35-44 | 0.5 | - | - | - | - | 1.4 | 0.1 | 1.3 | - | 0.5 | - | - | | | | | | | |
| 45-54 | 0.4 | - | - | - | - | 0.8 | 0.4 | - | - | - | 0.6 | - | | | | | | | |
| 55-64 | 1.8 | - | - | - | - | 1.8 | 0.6 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 3.4 | - | | | | | | | |
| 65-74 | 2.1 | 5.9 | - | 2.8 | - | 3.8 | 0.5 | 4.4 | - | 2.8 | 3.0 | - | | | | | | | |
| 75-84 | 3.7 | - | - | - | - | 5.5 | 2.8 | - | - | 17.2 | 1.3 | - | | | | | | | |
| 85+ | 2.6 | - | - | - | - | 4.7 | - | 9.9 | - | 14.9 | - | - | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 159 Other and ill-defined sites | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 Sièges autres ou non précisés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 1.2 | 0.8 | - | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | - | | | | | | | |
| Crude/Brut | 1.4 | 0.7 | - | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | - | | | | | | | |
| 0-24 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 25-34 | -- | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 35-44 | 0.1 | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 45-54 | 0.8 | - | - | - | - | 1.8 | 0.4 | 1.9 | - | - | - | 51.5 | | | | | | | |
| 55-64 | 2.3 | - | - | 2.6 | - | 3.0 | 3.0 | - | - | 1.1 | 1.4 | - | | | | | | | |
| 65-74 | 4.9 | 5.9 | - | 11.2 | 10.8 | 5.7 | 5.4 | - | 2.6 | - | 3.7 | - | | | | | | | |
| 75-84 | 9.2 | 10.1 | - | - | 6.0 | 10.3 | 14.7 | 3.5 | - | 4.9 | 2.6 | - | | | | | | | |
| 85+ | 22.9 | - | - | - | 35.2 | 11.7 | 33.3 | 9.9 | 33.2 | 7.5 | 29.0 | - | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 160 Nasal cavities, middle ear and sinuses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 Fosses nasales, de l'oreille moyenne et sinuses annexes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.4 | 0.8 | - | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | - | | | | | | | |
| Crude/Brut | 0.4 | 0.7 | - | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | - | | | | | | | |
| 0-24 | -- | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 25-34 | 0.2 | - | - | - | 1.5 | - | 0.2 | - | - | - | 0.3 | - | | | | | | | |
| 35-44 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | | | | | | | |
| 45-54 | 0.8 | 3.7 | - | 2.2 | - | 0.3 | 0.9 | - | - | 1.7 | 0.6 | - | | | | | | | |
| 55-64 | 1.3 | - | - | - | - | 1.8 | 0.6 | - | - | 2.2 | 3.4 | - | | | | | | | |
| 65-74 | 1.5 | - | - | 2.8 | 3.6 | - | 2.3 | - | 4.8 | 1.4 | 0.7 | - | | | | | | | |
| 75-84 | 1.9 | - | - | 4.6 | - | 2.8 | 1.4 | 3.5 | - | - | 2.6 | - | | | | | | | |
| 85+ | 1.6 | 35.4 | - | - | - | - | 2.7 | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 3. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 3. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| | Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. T.N.-O. | | | |
|---|--------|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--|--|--|
| | | T.-N. I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | | | | | | | | | | | | |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 161 Larynx | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$./M. | 7.8 | 6.2 | 7.7 | 9.8 | 7.2 | 10.5 | 7.3 | 4.1 | 5.3 | 6.9 | 6.3 | . | 15.1 | | | |
| Crude/Brut | 7.1 | 5.2 | 7.7 | 9.3 | 6.5 | 9.4 | 6.6 | 4.0 | 5.4 | 5.3 | 6.3 | . | 3.2 | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | | | |
| 35-44 | 1.8 | 2.2 | - | 2.9 | - | 2.4 | 1.9 | 1.2 | - | 1.0 | 1.5 | - | - | | | |
| 45-54 | 7.9 | 3.5 | 15.5 | 8.5 | 13.3 | 10.5 | 7.9 | 1.9 | 2.2 | 8.1 | 4.5 | - | - | | | |
| 55-64 | 26.7 | 37.3 | 18.7 | 19.0 | 34.4 | 40.0 | 20.8 | 6.5 | 30.2 | 23.0 | 24.3 | - | - | | | |
| 65-74 | 39.6 | 19.0 | - | 60.8 | 12.9 | 49.9 | 42.8 | 32.4 | 11.1 | 37.3 | 29.4 | - | - | | | |
| 75-84 | 38.4 | 27.2 | 124.5 | 74.4 | 52.6 | 47.8 | 34.3 | 20.5 | 30.3 | 31.3 | 31.0 | - | 423.7 | | | |
| 85+ | 26.1 | - | - | - | - | 40.8 | 16.6 | 21.3 | 56.4 | 27.5 | 33.5 | - | - | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 162 Trachea, bronchus and lung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 Trachée, des bronches et du poumon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$./M. | 91.9 | 67.6 | 78.1 | 102.8 | 107.6 | 116.3 | 86.6 | 80.6 | 82.6 | 69.9 | 79.6 | 41.3 | 144.3 | | | |
| Crude/Brut | 81.2 | 53.4 | 75.5 | 95.8 | 96.6 | 99.7 | 77.1 | 78.2 | 84.6 | 50.6 | 77.7 | 27.2 | 54.7 | | | |
| 0-24 | 0.1 | - | - | 0.6 | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | 17.7 | - | | | |
| 25-34 | 1.1 | - | - | 1.2 | - | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | - | - | | | |
| 35-44 | 9.1 | 8.8 | 10.3 | 5.8 | 12.0 | 12.4 | 8.5 | 7.4 | 12.8 | 4.8 | 6.7 | - | 21.5 | | | |
| 45-54 | 65.2 | 14.2 | 93.3 | 81.0 | 85.0 | 85.7 | 60.4 | 50.3 | 76.3 | 37.9 | 54.1 | - | 124.6 | | | |
| 55-64 | 254.6 | 219.2 | 205.8 | 260.3 | 306.1 | 320.5 | 247.0 | 224.8 | 185.6 | 181.9 | 211.6 | 206.4 | 444.1 | | | |
| 65-74 | 499.1 | 411.1 | 493.4 | 560.4 | 590.2 | 633.7 | 461.4 | 448.4 | 467.7 | 395.3 | 421.8 | 253.8 | 863.6 | | | |
| 75-84 | 620.6 | 435.5 | 373.6 | 730.6 | 666.8 | 777.2 | 581.3 | 558.8 | 560.3 | 514.7 | 572.1 | - | 847.5 | | | |
| 85+ | 487.5 | 209.4 | 162.3 | 579.5 | 593.6 | 600.9 | 477.4 | 362.8 | 413.5 | 384.7 | 501.9 | - | - | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 163 Pleura | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 Plèvre | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$./M. | 1.4 | 0.4 | - | 1.4 | 0.6 | 2.2 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | - | - | | | |
| Crude/Brut | 1.2 | 0.3 | - | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | - | - | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 25-34 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 | 1.0 | - | - | - | - | - | | | |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | | | |
| 45-54 | 1.4 | - | - | - | - | 3.1 | 1.1 | - | - | 0.8 | 1.1 | - | - | | | |
| 55-64 | 3.8 | - | - | 2.7 | - | 4.6 | 3.3 | 4.4 | 2.3 | 3.1 | 6.1 | - | - | | | |
| 65-74 | 6.7 | 6.3 | - | 10.1 | 4.3 | 9.4 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 9.7 | 3.6 | - | - | | | |
| 75-84 | 10.4 | - | - | 13.5 | 8.8 | 19.8 | 2.9 | - | 15.1 | 17.4 | 14.6 | - | - | | | |
| 85+ | 4.7 | - | - | - | - | 11.7 | 3.3 | 21.3 | - | - | - | - | - | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 164 Thymus, heart and mediastinum | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Thymus, cœur et médiastin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$./M. | 0.7 | - | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | - | 0.3 | 0.8 | - | - | | | |
| Crude/Brut | 0.6 | - | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | - | 0.3 | 0.7 | - | - | | | |
| 0-24 | 0.3 | - | - | 0.6 | - | 0.6 | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - | | | |
| 25-34 | 0.5 | - | - | - | - | 0.1 | 0.7 | - | - | - | 1.7 | - | - | | | |
| 35-44 | 0.5 | - | - | - | - | 0.2 | 0.6 | - | - | 1.0 | 0.7 | - | - | | | |
| 45-54 | 0.8 | - | - | 2.1 | 2.7 | 0.3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 55-64 | 0.6 | - | - | - | - | 1.0 | 0.7 | - | - | - | 0.7 | - | - | | | |
| 65-74 | 1.9 | - | 23.5 | - | - | 2.5 | 2.2 | 5.4 | - | 1.6 | - | - | - | | | |
| 75-84 | 3.4 | - | - | 6.8 | - | 7.0 | 2.1 | 5.1 | - | - | 3.6 | - | - | | | |
| 85+ | 2.4 | - | - | - | - | - | 3.3 | - | - | - | 8.4 | - | - | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 165 Other and ill-defined sites | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Sièges autres ou non précisés | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$./M. | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - | - | | | |
| Crude/Brut | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - | - | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 45-54 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 55-64 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 65-74 | 0.6 | - | - | - | - | 1.5 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 75-84 | 0.3 | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 85+ | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.7 | - | - | - | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 3. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 3. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| | Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. | | | | | |
|---|--------|----------------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--|--|--|--|--|
| | | T.-N. I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Alb. | C.-B. | T.N.-O. | | | | | | | | | | | |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 161 Larynx | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 1.4 | 0.8 | - | 1.0 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | - | 14.9 | | | | | |
| Crude/Brut | 1.5 | 0.7 | - | 1.1 | 1.1 | 2.6 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | - | 3.5 | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 35-44 | 0.3 | - | - | 1.4 | - | 0.5 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 45-54 | 2.6 | 3.7 | - | 2.2 | 2.8 | 5.3 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | - | - | | | | | |
| 55-64 | 5.4 | 4.8 | - | 2.6 | 3.2 | 9.5 | 5.8 | 4.2 | 2.3 | 1.1 | 6.2 | - | - | | | | | |
| 65-74 | 6.7 | - | - | - | 7.2 | 10.3 | 5.9 | 6.6 | 4.8 | 2.8 | 6.7 | - | 218.3 | | | | | |
| 75-84 | 3.9 | - | - | 9.2 | - | 5.5 | 4.6 | - | - | - | 3.9 | - | - | | | | | |
| 85+ | 1.6 | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | 7.5 | 4.1 | - | - | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 162 Trachea, bronchus and lung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 Trachée, des bronches et du poumon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 36.2 | 20.6 | 56.0 | 39.5 | 35.1 | 36.5 | 35.6 | 40.6 | 31.0 | 28.4 | 42.2 | 38.8 | 148.1 | | | | | |
| Crude/Brut | 38.6 | 18.0 | 59.0 | 43.6 | 36.9 | 39.6 | 38.3 | 47.1 | 34.8 | 24.6 | 47.9 | 22.5 | 46.0 | | | | | |
| 0-24 | 0.1 | - | - | 0.6 | 1.5 | - | 0.1 | - | - | - | 0.2 | - | - | | | | | |
| 25-34 | 1.5 | 2.0 | - | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.1 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | - | - | | | | | |
| 35-44 | 8.7 | - | 31.1 | 7.2 | 5.2 | 13.6 | 7.4 | 7.5 | 10.5 | 3.1 | 8.0 | - | - | | | | | |
| 45-54 | 44.8 | 33.4 | 127.1 | 45.6 | 63.3 | 45.3 | 42.3 | 49.2 | 37.6 | 42.3 | 48.4 | - | 103.0 | | | | | |
| 55-64 | 113.5 | 76.6 | 169.4 | 142.8 | 99.8 | 113.3 | 112.9 | 123.7 | 118.7 | 75.4 | 130.0 | 449.1 | 379.9 | | | | | |
| 65-74 | 183.1 | 105.3 | 199.5 | 178.7 | 183.2 | 173.4 | 183.0 | 188.8 | 139.7 | 156.1 | 234.4 | - | 1,528.4 | | | | | |
| 75-84 | 174.9 | 80.8 | 235.1 | 193.4 | 119.6 | 176.8 | 173.1 | 262.0 | 100.2 | 147.1 | 202.0 | - | - | | | | | |
| 85+ | 111.0 | - | 76.8 | 156.1 | 123.2 | 116.7 | 117.3 | 99.1 | 143.7 | 74.5 | 99.5 | - | - | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 163 Pleura | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 Plèvre | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 0.2 | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | - | - | | | | | |
| Crude/Brut | 0.3 | - | - | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | - | - | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 35-44 | 0.1 | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 45-54 | 0.2 | - | - | - | - | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 55-64 | 0.5 | - | - | - | - | 1.2 | 0.2 | - | - | 1.1 | - | - | - | | | | | |
| 65-74 | 1.3 | - | - | 2.8 | 3.6 | 1.1 | 1.0 | - | - | 1.4 | 2.2 | - | - | | | | | |
| 75-84 | 1.5 | - | - | - | - | 3.4 | 1.4 | - | 3.7 | - | - | - | - | | | | | |
| 85+ | 1.6 | - | - | - | - | 2.5 | 1.3 | 9.9 | - | - | - | - | - | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 164 Thymus, heart and mediastinum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Thymus, cœur et médiastin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | - | - | | | | | |
| Crude/Brut | 0.5 | - | - | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | - | - | | | | | |
| 0-24 | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | 0.2 | - | - | 0.2 | - | - | - | | | | | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | | | | | |
| 35-44 | 0.4 | - | - | - | - | 0.7 | 0.2 | - | 3.0 | - | 0.4 | - | - | | | | | |
| 45-54 | 0.6 | - | - | - | - | 0.5 | 0.6 | - | - | 0.8 | 1.2 | - | - | | | | | |
| 55-64 | 1.0 | - | - | - | - | 1.2 | 1.3 | - | - | 1.1 | 0.7 | - | - | | | | | |
| 65-74 | 1.5 | - | - | 2.8 | - | 1.1 | 1.3 | 2.2 | 2.4 | 1.4 | 2.2 | - | - | | | | | |
| 75-84 | 1.9 | - | - | - | - | 1.4 | 2.3 | - | - | 4.9 | 2.6 | - | - | | | | | |
| 85+ | 1.6 | - | - | - | 17.6 | 2.3 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 165 Other and ill-defined sites | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Sièges autres ou non précisés | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | -- | - | - | - | - | -- | 0.1 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| Crude/Brut | -- | - | - | - | - | -- | 0.1 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 45-54 | 0.1 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 65-74 | 0.3 | - | - | - | - | 0.4 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 85+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 3. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis,

Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 3. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. | | | | | | | | |
|--|----------------|--------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | T.-N. I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Alb. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rate per 100,000 • Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 Bone and articular cartilage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 Os et cartilage articulaire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | - | | | | | | | | |
| Crude/Brut | 1.2 | 0.7 | 1.5 | 2.0 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.9 | - | | | | | | | | |
| 0-24 | 0.9 | 0.8 | 3.9 | 2.4 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 0.7 | - | - | 2.4 | - | 1.0 | 0.6 | 1.0 | - | - | 0.3 | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 0.8 | 2.2 | - | - | 3.4 | 0.9 | 0.8 | - | - | 1.0 | 0.7 | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 0.9 | - | - | - | - | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 4.4 | - | 1.7 | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 1.3 | - | - | - | - | 1.6 | 1.5 | - | - | 2.1 | 0.7 | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 2.5 | - | - | 6.8 | 8.6 | 3.0 | 1.9 | 5.4 | - | 1.6 | 1.8 | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 5.2 | - | - | 6.8 | - | 7.0 | 2.9 | 5.1 | 30.3 | - | 3.6 | - | | | | | | | | |
| 85+ | 9.5 | - | - | - | 39.6 | 35.0 | 3.3 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 171 Connective and other soft tissue | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 Tissu conjonctif et autres tissus mous | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 2.9 | 4.6 | 4.8 | 5.5 | 0.9 | 2.9 | 3.2 | 1.7 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | - | | | | | | | | |
| Crude/Brut | 2.7 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 0.8 | 2.7 | 3.0 | 1.6 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | - | | | | | | | | |
| 0-24 | 1.1 | 1.6 | - | 2.4 | - | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 0.9 | 2.0 | 9.3 | 1.2 | - | 0.9 | 0.9 | 1.0 | - | 1.1 | 0.7 | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 2.0 | 2.2 | - | 2.9 | - | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 5.7 | 1.0 | 1.9 | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 3.4 | 10.6 | 15.5 | 2.1 | - | 4.1 | 3.1 | - | - | 4.8 | 3.3 | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 3.9 | 4.7 | - | 5.4 | 3.4 | 5.2 | 3.3 | 6.5 | 2.3 | 3.1 | 2.7 | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 10.8 | 25.3 | - | 23.6 | 4.3 | 11.4 | 12.1 | 2.7 | 5.5 | 11.3 | 6.2 | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 12.2 | - | 41.5 | 27.1 | 8.8 | 11.7 | 14.3 | - | 10.1 | 7.0 | 12.8 | - | | | | | | | | |
| 85+ | 19.0 | - | - | 64.4 | - | 5.8 | 26.5 | 21.3 | 37.6 | - | 16.7 | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 172 Malignant melanoma of skin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 Mélanome malin de la peau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 9.8 | 4.0 | 18.1 | 14.2 | 8.7 | 5.1 | 13.1 | 7.6 | 8.4 | 9.8 | 10.8 | - | | | | | | | | |
| Crude/Brut | 9.2 | 3.1 | 16.9 | 13.3 | 7.9 | 4.8 | 12.2 | 7.3 | 8.1 | 8.3 | 10.8 | - | | | | | | | | |
| 0-24 | 0.4 | - | - | - | - | 0.5 | 0.2 | 1.0 | - | 0.4 | 1.1 | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 4.5 | 2.0 | 18.6 | 3.6 | 4.5 | 2.5 | 6.4 | 2.0 | - | 5.0 | 4.4 | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 9.6 | 2.2 | 38.9 | 20.2 | 12.0 | 4.0 | 12.0 | 4.9 | 12.8 | 9.2 | 13.0 | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 14.4 | 3.5 | - | 21.3 | 15.9 | 10.2 | 17.3 | 14.9 | 10.9 | 14.5 | 15.6 | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 23.1 | 9.3 | 37.4 | 32.5 | 13.8 | 10.7 | 30.0 | 26.2 | 20.9 | 27.2 | 26.3 | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 30.0 | 12.6 | 47.0 | 40.5 | 12.9 | 13.8 | 40.2 | 21.6 | 36.0 | 29.2 | 34.8 | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 34.3 | 13.6 | - | 40.6 | 26.3 | 15.1 | 56.4 | 15.4 | 10.1 | 31.3 | 29.1 | - | | | | | | | | |
| 85+ | 52.2 | 69.8 | 324.7 | 96.6 | 118.7 | 29.2 | 72.9 | 21.3 | 56.4 | 27.5 | 16.7 | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 174 Female breast | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 Sein chez la femme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| Crude/Brut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 85+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 175 Male breast | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 Sein chez l'homme | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 0.8 | 1.2 | - | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 26.3 | | | | | | | | |
| Crude/Brut | 0.7 | 0.7 | - | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 3.2 | | | | | | | | |
| 0-24 | -- | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 | 1.0 | - | 0.4 | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 0.2 | - | - | - | - | 0.2 | 0.3 | - | 1.4 | 0.5 | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 0.4 | - | - | - | - | 0.5 | 0.4 | - | 4.4 | - | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 2.0 | - | - | 2.7 | 3.4 | 2.0 | 2.4 | - | - | 2.1 | 1.3 | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 3.8 | - | - | 3.4 | 12.9 | 5.4 | 3.5 | - | 2.8 | 4.9 | 1.8 | 74.0 | | | | | | | | |
| 75-84 | 4.9 | 13.6 | - | - | 8.8 | 5.8 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 3.5 | 1.8 | 735.3 | | | | | | | | |
| 85+ | 7.1 | 69.8 | - | - | - | 5.8 | 6.6 | - | 18.8 | - | 8.4 | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 3. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 3. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. |
|---|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | T.-N. I.-P.-E. | N.-É. | N.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | | T.N.-O. |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | |
| Females • Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 170 Bone and articular cartilage | | | | | | | | | | | | |
| 170 Os et cartilage articulaire | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | - | 0.7 | 0.8 | - |
| Crude/Brut | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | - | 0.6 | 0.8 | - |
| 0-24 | 0.8 | - | - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | - | 0.2 | 0.9 | - |
| 25-34 | 0.4 | - | - | - | - | 0.3 | 0.5 | - | - | 0.4 | 0.3 | - |
| 35-44 | 0.9 | - | - | - | - | 1.1 | 1.1 | 2.5 | - | 1.5 | - | - |
| 45-54 | 0.8 | - | - | - | - | 1.8 | 0.4 | - | - | 1.7 | - | - |
| 55-64 | 1.3 | - | - | 2.6 | 3.2 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | - | 1.1 | 2.1 | - |
| 65-74 | 1.7 | 5.9 | 19.9 | 2.8 | - | 2.7 | 1.0 | 2.2 | - | - | 2.2 | - |
| 75-84 | 1.9 | - | - | - | 6.0 | 2.8 | 1.8 | - | - | - | 2.6 | - |
| 85+ | 3.1 | - | - | - | - | 9.3 | 1.3 | 9.9 | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 171 Connective and other soft tissue | | | | | | | | | | | | |
| 171 Tissu conjonctif et autres tissus mous | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | - |
| Crude/Brut | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 2.8 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 1.4 | 2.2 | 1.3 | 1.7 | - |
| 0-24 | 0.7 | - | - | 1.2 | - | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | - |
| 25-34 | 1.1 | - | - | 3.7 | - | 1.5 | 1.0 | - | - | 1.2 | 0.7 | - |
| 35-44 | 1.0 | - | - | 1.6 | - | 0.5 | 1.5 | - | - | 1.5 | 1.1 | - |
| 45-54 | 1.9 | - | - | 2.2 | - | 1.5 | 2.4 | 1.9 | 4.4 | 2.5 | 0.6 | - |
| 55-64 | 2.8 | 4.8 | - | 2.6 | 9.7 | 2.1 | 3.8 | 2.1 | 4.6 | 1.1 | 0.7 | - |
| 65-74 | 6.6 | 5.9 | - | 5.6 | 7.2 | 8.4 | 6.5 | 6.6 | 2.4 | 5.5 | 5.9 | - |
| 75-84 | 9.2 | 20.2 | 29.4 | 9.2 | 6.0 | 9.6 | 9.2 | 7.0 | 14.8 | 4.9 | 7.8 | - |
| 85+ | 9.4 | - | - | 13.6 | - | 14.0 | 10.7 | - | - | - | 12.4 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 172 Malignant melanoma of skin | | | | | | | | | | | | |
| 172 Mélanome malin de la peau | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 8.4 | 7.4 | 9.7 | 13.3 | 12.3 | 4.6 | 9.0 | 8.8 | 8.5 | 12.0 | 10.3 | - |
| Crude/Brut | 8.6 | 6.9 | 9.1 | 13.7 | 12.3 | 4.8 | 9.3 | 9.3 | 8.5 | 11.3 | 10.8 | - |
| 0-24 | 1.1 | 2.6 | - | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 1.8 | - |
| 25-34 | 6.1 | 4.0 | 18.5 | 7.4 | 18.5 | 2.9 | 5.2 | 4.2 | 4.8 | 11.2 | 9.6 | - |
| 35-44 | 11.6 | 9.0 | 10.4 | 17.2 | 17.4 | 4.9 | 13.8 | 10.0 | 16.5 | 15.9 | 13.3 | - |
| 45-54 | 13.7 | 7.4 | 15.9 | 28.2 | 13.8 | 7.8 | 14.3 | 13.2 | 15.5 | 22.9 | 15.8 | - |
| 55-64 | 16.5 | 9.6 | 18.8 | 30.6 | 22.5 | 9.2 | 19.5 | 25.2 | 9.1 | 17.2 | 18.5 | - |
| 65-74 | 17.8 | 23.4 | 19.9 | 22.3 | 21.6 | 11.8 | 18.3 | 19.8 | 19.3 | 16.6 | 24.5 | - |
| 75-84 | 21.9 | 20.2 | - | 36.8 | 12.0 | 13.8 | 23.9 | 34.9 | 22.3 | 36.8 | 18.2 | - |
| 85+ | 18.8 | 35.4 | - | 27.2 | 35.2 | 11.7 | 20.0 | 9.9 | 22.1 | 22.4 | 20.7 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 174 Female breast | | | | | | | | | | | | |
| 174 Sein chez la femme | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 96.0 | 79.5 | 108.4 | 100.2 | 90.8 | 89.6 | 95.5 | 102.6 | 107.7 | 100.7 | 103.7 | 70.0 |
| Crude/Brut | 100.6 | 71.8 | 113.4 | 109.5 | 94.3 | 96.1 | 100.9 | 111.6 | 118.1 | 89.1 | 114.3 | 45.0 |
| 0-24 | 0.2 | - | - | 0.7 | 0.2 | 0.5 | - | - | - | 0.2 | - | - |
| 25-34 | 14.1 | 10.1 | 18.5 | 9.8 | 18.5 | 15.9 | 13.6 | 14.9 | 18.0 | 10.4 | 14.1 | 33.0 |
| 35-44 | 77.7 | 87.6 | 72.7 | 80.4 | 85.1 | 73.3 | 75.8 | 82.5 | 79.4 | 82.5 | 83.4 | 76.7 |
| 45-54 | 182.5 | 155.9 | 206.0 | 165.1 | 143.1 | 169.8 | 191.3 | 200.6 | 168.0 | 199.0 | 185.0 | 81.0 |
| 55-64 | 241.3 | 167.5 | 202.4 | 247.4 | 244.6 | 221.6 | 232.5 | 276.8 | 308.3 | 271.4 | 272.2 | 149.7 |
| 65-74 | 339.6 | 222.4 | 339.1 | 365.8 | 323.3 | 312.6 | 331.8 | 357.9 | 428.9 | 346.7 | 389.4 | 95.0 |
| 75-84 | 379.0 | 404.1 | 293.9 | 451.2 | 335.0 | 367.3 | 377.8 | 377.2 | 363.7 | 387.2 | 396.1 | 218.3 |
| 85+ | 371.1 | 283.4 | 448.8 | 530.6 | 299.2 | 310.3 | 397.1 | 337.0 | 475.2 | 335.4 | 364.9 | 452.5 |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 175 Male breast | | | | | | | | | | | | |
| 175 Sein chez l'homme | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Crude/Brut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 3. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 3. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. |
|--|----------------|--------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | T.-N. I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | | T.N.-O. |
| Rate per 100,000 • Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | |
| Males • Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 179 Uterus, NOS | | | | | | | | | | | | |
| 179 Utérus, SAI | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Crude/Brut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 180 Cervix uteri | | | | | | | | | | | | |
| 180 Col de l'utérus | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Crude/Brut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 181 Placenta | | | | | | | | | | | | |
| 181 Corps de l'utérus | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Crude/Brut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 182 Body of uterus | | | | | | | | | | | | |
| 182 Corps de l'utérus | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Crude/Brut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 183 Ovary and other uterine adnexa | | | | | | | | | | | | |
| 183 Ovaire et autres annexes de l'utérus | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Crude/Brut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.
(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.
(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.
(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 3. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 3. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. T.N.-O. | | | | | | | |
|--|-------------------|--------|-------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | T.-N. I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | | | | | | | Alb. | | | | | | | | | |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 Uterus, NOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 Utérus, SAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.8 | 0.8 | 1.7 | - | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | - | 16.2 | | | | | | | |
| Crude/Brut | 0.9 | 0.7 | 1.5 | - | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | - | 3.5 | | | | | | | |
| 0-24 | -- | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 25-34 | -- | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 35-44 | 0.4 | - | - | - | 0.7 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 45-54 | 1.5 | 3.7 | 15.9 | - | 2.0 | 1.5 | - | - | 1.7 | 1.2 | - | - | | | | | | | |
| 55-64 | 1.5 | 4.8 | - | - | 2.7 | 1.5 | - | 2.3 | - | 0.7 | - | - | | | | | | | |
| 65-74 | 3.0 | - | - | - | 8.0 | 1.3 | 2.2 | - | 2.8 | 1.5 | - | - | | | | | | | |
| 75-84 | 4.9 | - | - | - | 9.6 | 4.1 | - | - | 2.5 | 5.2 | - | 452.5 | | | | | | | |
| 85+ | 6.3 | - | - | - | 7.0 | 5.3 | 9.9 | 11.1 | 7.5 | 8.3 | - | - | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 180 Cervix uteri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 Col de l'utérus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 10.4 | 12.9 | 13.0 | 14.4 | 9.6 | 8.6 | 11.3 | 10.7 | 11.6 | 9.2 | 14.8 | 26.8 | | | | | | | |
| Crude/Brut | 10.7 | 11.8 | 12.1 | 15.0 | 9.6 | 9.0 | 11.5 | 10.7 | 11.3 | 11.0 | 9.5 | 15.0 | | | | | | | |
| 0-24 | 0.3 | - | - | - | 0.3 | 0.5 | - | - | 0.5 | 0.4 | - | - | | | | | | | |
| 25-34 | 12.1 | 16.1 | 18.5 | 22.1 | 10.8 | 9.1 | 12.9 | 11.7 | 9.6 | 14.3 | 11.0 | 33.8 | | | | | | | |
| 35-44 | 16.1 | 20.2 | 41.5 | 20.1 | 17.4 | 11.8 | 16.0 | 21.5 | 28.5 | 19.5 | 15.2 | 38.3 | | | | | | | |
| 45-54 | 15.3 | 11.1 | - | 15.2 | 11.0 | 12.1 | 18.1 | 13.2 | 15.5 | 17.8 | 14.6 | 26.2 | | | | | | | |
| 55-64 | 16.1 | 38.3 | 18.8 | 15.3 | 16.1 | 9.8 | 19.7 | 16.8 | 11.4 | 18.3 | 14.4 | - | | | | | | | |
| 65-74 | 21.2 | 17.6 | 19.9 | 27.9 | 21.6 | 24.4 | 21.9 | 19.8 | 16.9 | 19.3 | 14.8 | - | | | | | | | |
| 75-84 | 25.7 | 20.2 | - | 55.3 | 12.0 | 26.8 | 25.3 | 26.4 | 33.4 | 22.1 | 20.8 | - | | | | | | | |
| 85+ | 17.7 | 35.4 | - | 27.2 | 35.2 | 18.7 | 17.3 | 9.9 | 11.1 | 29.8 | 8.3 | - | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 181 Placenta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - | - | | | | | | | |
| Crude/Brut | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - | - | | | | | | | |
| 0-24 | -- | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.2 | - | - | - | | | | | | | |
| 25-34 | 0.2 | - | - | - | 0.5 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 182 Body of uterus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 Corps de l'utérus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 18.2 | 22.7 | 11.8 | 20.2 | 18.3 | 18.0 | 18.5 | 21.1 | 14.5 | 18.0 | 17.2 | 12.9 | | | | | | | |
| Crude/Brut | 19.3 | 20.1 | 13.6 | 22.1 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 22.7 | 16.6 | 15.6 | 19.2 | 7.5 | | | | | | | |
| 0-24 | -- | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 25-34 | 0.6 | - | - | 2.5 | - | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | - | - | | | | | | | |
| 35-44 | 6.1 | 11.2 | - | 12.9 | 8.7 | 6.0 | 5.5 | 11.5 | 6.0 | 3.1 | 6.4 | - | | | | | | | |
| 45-54 | 24.2 | 37.1 | - | 19.6 | 16.5 | 25.6 | 23.1 | 34.1 | 17.7 | 18.6 | 28.6 | 51.5 | | | | | | | |
| 55-64 | 61.1 | 71.8 | 56.5 | 66.3 | 57.9 | 59.3 | 62.0 | 75.5 | 36.5 | 73.2 | 54.0 | 149.7 | | | | | | | |
| 65-74 | 88.3 | 111.2 | 59.8 | 89.4 | 97.0 | 81.6 | 95.2 | 85.6 | 81.9 | 85.6 | 82.3 | - | | | | | | | |
| 75-84 | 75.5 | 80.8 | 58.8 | 78.3 | 83.7 | 81.9 | 75.8 | 80.3 | 66.8 | 63.7 | 67.8 | - | | | | | | | |
| 85+ | 49.5 | - | 76.8 | 95.2 | 52.8 | 56.0 | 46.6 | - | 33.2 | 89.4 | 41.5 | - | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 183 Ovary and other uterine adnexa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 Ovaire et autres annexes de l'utérus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 13.3 | 11.7 | 8.5 | 12.6 | 11.8 | 12.9 | 14.5 | 11.8 | 14.7 | 12.9 | 11.9 | - | | | | | | | |
| Crude/Brut | 14.0 | 10.4 | 9.1 | 13.9 | 12.3 | 13.9 | 15.4 | 13.1 | 15.8 | 11.7 | 13.3 | - | | | | | | | |
| 0-24 | 0.7 | - | 4.1 | 0.6 | - | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | - | | | | | | | |
| 25-34 | 3.0 | 6.0 | - | 3.7 | 3.1 | 2.6 | 3.3 | 2.1 | 3.6 | 5.2 | 0.7 | - | | | | | | | |
| 35-44 | 8.8 | - | - | 2.9 | 5.2 | 9.3 | 10.7 | 8.8 | 15.0 | 7.7 | 5.3 | - | | | | | | | |
| 45-54 | 21.7 | 11.1 | 15.9 | 13.0 | 27.5 | 22.0 | 23.1 | 20.8 | 19.9 | 16.9 | 23.3 | - | | | | | | | |
| 55-64 | 36.5 | 38.3 | 37.7 | 30.6 | 25.8 | 33.1 | 41.3 | 29.4 | 45.7 | 37.7 | 31.5 | - | | | | | | | |
| 65-74 | 45.9 | 52.7 | 19.9 | 75.4 | 39.5 | 45.1 | 49.0 | 39.5 | 36.1 | 40.1 | 44.5 | - | | | | | | | |
| 75-84 | 56.1 | 50.5 | - | 41.4 | 65.8 | 51.6 | 60.6 | 48.9 | 59.4 | 51.5 | 61.2 | - | | | | | | | |
| 85+ | 51.1 | 70.8 | 76.8 | 54.4 | 17.6 | 60.7 | 49.3 | 59.5 | 44.2 | 44.7 | 45.6 | - | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 3. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 3. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Mfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. |
|---|----------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | T.-N. I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | | T.N.-O. |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 184 Female genital organs, other and NOS | | | | | | | | | | | | |
| 184 Organes génitaux féminins, autres et NOS | | | | | | | | | | | | |
| SAI | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Crude/Brut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 185 Prostate | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 99.2 | 61.0 | 108.9 | 83.1 | 99.9 | 87.5 | 96.1 | 113.0 | 103.2 | 95.3 | 134.1 | 52.5 |
| Crude/Brut | 82.6 | 44.8 | 106.3 | 75.1 | 86.8 | 67.8 | 79.5 | 108.9 | 108.6 | 65.1 | 128.6 | 20.4 |
| 0-24 | 0.1 | - | - | 0.6 | 2.1 | - | 0.1 | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 0.1 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 0.4 | - | - | - | - | 0.7 | 0.3 | - | 1.4 | - | 0.4 | - |
| 45-54 | 13.5 | 3.5 | 15.5 | 14.9 | 2.7 | 12.8 | 11.9 | 14.9 | 15.3 | 8.1 | 26.2 | - |
| 55-64 | 147.0 | 111.9 | 112.3 | 111.2 | 185.8 | 121.4 | 133.9 | 181.1 | 190.3 | 166.2 | 213.7 | 103.2 |
| 65-74 | 551.3 | 272.0 | 775.4 | 415.2 | 486.8 | 485.9 | 523.6 | 653.7 | 495.4 | 546.0 | 815.0 | 253.8 |
| 75-84 | 990.8 | 707.7 | 830.2 | 899.7 | 1,026.5 | 868.1 | 989.0 | 1,015.0 | 1,090.2 | 890.3 | 1,260.7 | 735.3 |
| 85+ | 1,167.2 | 697.8 | 1,461.0 | 1,094.7 | 1,266.3 | 1,114.2 | 1,183.6 | 1,451.1 | 1,184.2 | 1,071.6 | 1,187.9 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 186 Testis | | | | | | | | | | | | |
| 186 Testicule | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 4.6 | 3.3 | 3.4 | 6.4 | 3.8 | 3.6 | 5.2 | 3.9 | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 6.1 |
| Crude/Brut | 4.7 | 3.1 | 3.1 | 6.4 | 3.8 | 3.8 | 5.3 | 3.8 | 5.4 | 5.0 | 4.9 | 6.8 |
| 0-24 | 2.2 | 0.8 | - | 4.2 | 2.1 | 1.9 | 2.9 | 1.4 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | - |
| 25-34 | 10.1 | 6.1 | 18.6 | 15.7 | 7.6 | 7.6 | 11.3 | 7.1 | 13.9 | 8.8 | 12.2 | 33.7 |
| 35-44 | 8.0 | 6.6 | - | 11.5 | 6.8 | 6.6 | 8.4 | 8.7 | 11.4 | 9.7 | 7.4 | - |
| 45-54 | 3.3 | - | - | - | 5.3 | 2.0 | 3.5 | - | - | 6.5 | 6.1 | - |
| 55-64 | 2.4 | 4.7 | - | - | - | 2.0 | 2.7 | 2.2 | 4.6 | 2.1 | 2.7 | - |
| 65-74 | 1.4 | 6.3 | - | 3.4 | - | 1.0 | 1.3 | 5.4 | - | 3.2 | - | - |
| 75-84 | 1.8 | - | - | - | - | 2.3 | 1.4 | 5.1 | 5.0 | - | 1.8 | - |
| 85+ | 2.4 | - | - | - | - | 6.6 | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 187 Other male genital organs | | | | | | | | | | | | |
| 187 Autres organes génitaux masculins | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 1.1 | 0.8 | 3.1 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | - |
| Crude/Brut | 0.9 | 0.7 | 3.1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | - |
| 0-24 | 0.1 | 0.8 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.4 | - | - |
| 25-34 | 0.2 | - | - | - | 1.5 | 0.1 | 0.3 | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 0.2 | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 1.0 | - | - | - | - | 1.0 | 1.5 | - | 2.2 | 0.8 | - | - |
| 55-64 | 2.2 | - | 18.7 | - | - | 2.6 | 2.7 | - | 2.3 | 2.1 | 1.3 | - |
| 65-74 | 3.7 | - | - | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 6.1 | - | 5.5 | - | 0.9 | - |
| 75-84 | 8.6 | 13.6 | 41.5 | 6.8 | - | 14.0 | 8.6 | 5.1 | 10.1 | 7.0 | 1.8 | - |
| 85+ | 11.9 | - | - | 32.2 | 79.1 | 17.5 | 3.3 | - | - | 27.5 | 8.4 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 188 Bladder | | | | | | | | | | | | |
| 188 Vessie | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 26.8 | 30.5 | 26.5 | 30.0 | 38.9 | 34.9 | 23.5 | 28.5 | 28.7 | 27.2 | 16.8 | 50.1 |
| Crude/Brut | 23.1 | 24.4 | 26.2 | 27.3 | 34.7 | 28.6 | 20.1 | 27.4 | 29.3 | 19.8 | 16.2 | 20.4 |
| 0-24 | 0.1 | - | - | 0.6 | - | - | 0.1 | 0.5 | - | 0.2 | - | - |
| 25-34 | 0.9 | 4.1 | - | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 4.0 | - | 0.8 | - | - |
| 35-44 | 4.6 | 13.2 | - | 5.8 | 5.1 | 6.3 | 3.0 | 3.7 | 8.5 | 6.8 | 1.9 | - |
| 45-54 | 16.4 | 21.3 | 15.5 | 12.8 | 34.5 | 20.0 | 13.4 | 22.4 | 19.6 | 18.6 | 10.0 | 60.3 |
| 55-64 | 61.1 | 79.3 | - | 75.9 | 96.3 | 73.2 | 56.6 | 52.4 | 74.3 | 62.7 | 36.4 | - |
| 65-74 | 124.8 | 139.1 | 117.5 | 124.9 | 185.2 | 164.6 | 107.2 | 124.3 | 132.8 | 126.4 | 83.8 | 253.8 |
| 75-84 | 212.4 | 231.4 | 332.1 | 230.0 | 289.5 | 289.0 | 178.5 | 246.1 | 191.8 | 233.0 | 134.8 | 735.3 |
| 85+ | 270.4 | 69.8 | 487.0 | 386.3 | 277.0 | 355.9 | 278.5 | 277.4 | 282.0 | 151.1 | 175.7 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.
(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 3. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 3. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. |
|---|----------------|--------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | T.-N. I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | | T.N.-O. |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 184 Female genital organs, other and NOS | | | | | | | | | | | | |
| 184 Organes génitaux féminins, autres et SAI | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 2.6 | 3.4 | 7.6 | 3.6 | 1.9 | 2.1 | 2.9 | 1.9 | 1.0 | 2.7 | 2.7 | 6.0 |
| Crude/Brut | 2.8 | 3.1 | 9.1 | 3.9 | 2.1 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 1.2 | 2.4 | 3.1 | 7.5 |
| 0-24 | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25-34 | 1.1 | -- | -- | 1.2 | -- | 1.2 | 1.5 | -- | -- | -- | 1.0 | 33.0 |
| 35-44 | 1.5 | 2.2 | 10.4 | 2.9 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | -- |
| 45-54 | 2.6 | 3.7 | -- | 2.2 | -- | 2.3 | 2.8 | 1.9 | -- | 4.2 | 2.9 | -- |
| 55-64 | 4.7 | -- | 18.8 | 12.8 | -- | 2.7 | 5.1 | 6.3 | -- | 8.6 | 5.5 | -- |
| 65-74 | 9.0 | 11.7 | 39.9 | 8.4 | 10.8 | 7.2 | 11.1 | -- | 4.8 | 6.9 | 10.4 | -- |
| 75-84 | 15.5 | 20.2 | -- | 23.0 | 23.9 | 9.6 | 17.9 | 21.0 | 11.1 | 14.7 | 15.6 | -- |
| 85+ | 25.5 | 106.3 | 153.6 | 13.6 | -- | 28.0 | 28.0 | -- | -- | 29.8 | 24.9 | -- |
| N.S./N.P. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 185 Prostate | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Crude/Brut | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25-34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35-44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45-54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55-64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65-74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75-84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85+ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| N.S./N.P. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 186 Testis | | | | | | | | | | | | |
| 186 Testicule | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Crude/Brut | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25-34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35-44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45-54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55-64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65-74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75-84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85+ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| N.S./N.P. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 187 Other male genital organs | | | | | | | | | | | | |
| 187 Autres organes génitaux masculins | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Crude/Brut | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 0-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25-34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35-44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45-54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55-64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 65-74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75-84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85+ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| N.S./N.P. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 188 Bladder | | | | | | | | | | | | |
| 188 Vessie | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 7.1 | 6.3 | 8.6 | 11.1 | 8.2 | 8.1 | 6.7 | 7.0 | 7.8 | 7.2 | 4.9 | -- |
| Crude/Brut | 7.9 | 5.5 | 10.6 | 12.6 | 9.1 | 9.0 | 7.6 | 8.2 | 9.5 | 6.4 | 5.9 | -- |
| 0-24 | 0.1 | -- | -- | -- | 1.5 | -- | -- | -- | -- | 0.4 | -- | -- |
| 25-34 | 0.5 | -- | -- | 3.7 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | -- | 0.4 | 0.3 | -- |
| 35-44 | 2.1 | -- | -- | 4.3 | -- | 3.3 | 1.7 | 3.8 | 3.0 | 2.0 | 0.4 | -- |
| 45-54 | 5.6 | 14.8 | 15.9 | 10.9 | 2.8 | 5.6 | 4.5 | 9.5 | 6.6 | 5.1 | 5.3 | -- |
| 55-64 | 15.5 | 23.9 | 37.7 | 33.2 | 22.5 | 15.2 | 14.8 | 14.7 | 16.0 | 19.4 | 8.2 | -- |
| 65-74 | 29.6 | 11.7 | -- | 30.7 | 39.5 | 35.8 | 25.8 | 28.5 | 43.4 | 29.0 | 26.0 | -- |
| 75-84 | 55.9 | 30.3 | 58.8 | 73.7 | 47.9 | 65.3 | 61.1 | 34.9 | 40.8 | 56.4 | 36.5 | -- |
| 85+ | 69.8 | 70.8 | 153.6 | 95.2 | 70.4 | 79.3 | 72.0 | 69.4 | 77.4 | 44.7 | 45.6 | -- |
| N.S./N.P. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 3. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 3. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| | Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. |
|---|--------|-------|----------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | | T.-N. | I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | | | | | Alb. | C.-B. | | T.N.-O. |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | | |
| 189 Kidney and other urinary organs NOS | | | | | | | | | | | | | |
| 189 Rein et organes urinaires autres ou SAI | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 14.5 | 12.9 | 20.5 | 17.0 | 13.5 | 15.6 | 14.9 | 14.5 | 16.6 | 13.7 | 10.9 | - | 10.8 |
| Crude/Brut | 13.0 | 10.7 | 20.0 | 15.7 | 12.2 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 16.7 | 10.5 | 10.8 | - | 6.4 |
| 0-24 | 0.7 | - | - | 0.6 | - | 0.6 | 1.2 | - | 0.5 | 0.6 | 0.5 | - | - |
| 25-34 | 1.0 | - | - | - | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 2.3 | 1.1 | 1.4 | - | - |
| 35-44 | 4.8 | 11.0 | 10.3 | 8.6 | 5.1 | 5.4 | 4.5 | 3.7 | 5.7 | 3.9 | 3.0 | - | - |
| 45-54 | 15.5 | 17.7 | 31.1 | 27.7 | 13.3 | 12.5 | 17.4 | 13.0 | 24.0 | 16.1 | 10.0 | - | 41.5 |
| 55-64 | 38.0 | 14.0 | 37.4 | 43.4 | 34.4 | 41.3 | 39.1 | 37.1 | 37.1 | 34.5 | 33.7 | - | 74.0 |
| 65-74 | 67.1 | 82.2 | 47.0 | 64.1 | 77.5 | 71.2 | 66.7 | 70.2 | 77.5 | 72.9 | 50.8 | - | - |
| 75-84 | 82.3 | 68.0 | 207.6 | 74.4 | 52.6 | 95.6 | 87.8 | 97.4 | 95.9 | 59.1 | 54.7 | - | - |
| 85+ | 78.3 | - | 162.3 | 161.0 | 79.1 | 110.8 | 63.0 | 85.4 | 56.4 | 82.4 | 58.6 | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 190 Eye | | | | | | | | | | | | | |
| 190 Oeil | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 1.0 | 0.4 | - | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | - | - |
| Crude/Brut | 1.0 | 0.3 | - | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | - | - |
| 0-24 | 0.2 | - | - | 0.6 | - | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - |
| 25-34 | 0.2 | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 2.0 | - | - | 0.3 | - | - |
| 35-44 | 0.5 | 2.2 | - | 1.4 | - | 0.5 | 0.5 | - | 1.4 | 0.5 | - | - | - |
| 45-54 | 1.0 | - | - | - | - | 1.5 | 0.9 | 3.7 | - | 0.8 | 0.6 | - | - |
| 55-64 | 3.5 | - | - | 5.4 | 10.3 | 4.2 | 3.1 | 4.4 | 4.6 | 2.1 | 2.7 | - | - |
| 65-74 | 3.5 | - | - | 6.8 | - | 3.0 | 3.2 | 2.7 | 8.3 | 6.5 | 2.7 | - | - |
| 75-84 | 3.1 | - | - | - | 8.8 | 3.5 | 2.9 | - | 5.0 | 7.0 | 1.8 | - | - |
| 85+ | 9.5 | - | - | - | - | 11.7 | 9.9 | 21.3 | - | - | 16.7 | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 191 Brain | | | | | | | | | | | | | |
| 191 Encéphale | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 7.7 | 2.7 | 6.3 | 7.3 | 6.5 | 7.8 | 8.8 | 7.0 | 6.1 | 6.7 | 7.1 | 21.6 | 2.8 |
| Crude/Brut | 7.3 | 2.8 | 6.2 | 6.9 | 6.0 | 7.3 | 8.4 | 6.9 | 5.9 | 5.9 | 7.0 | 20.4 | 3.2 |
| 0-24 | 2.9 | 1.6 | 3.9 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 3.2 | 1.9 | 3.0 | 3.6 | 3.7 | 17.7 | - |
| 25-34 | 3.8 | 2.0 | - | 1.2 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 6.1 | 1.2 | 3.1 | 4.7 | - | 15.5 |
| 35-44 | 4.8 | 8.8 | - | 2.9 | 1.7 | 4.4 | 6.6 | 3.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | - | - |
| 45-54 | 10.0 | 3.5 | 15.5 | 12.8 | 10.6 | 9.2 | 11.9 | 5.6 | 17.4 | 8.9 | 5.6 | 60.3 | - |
| 55-64 | 16.1 | - | 37.4 | 21.7 | 20.6 | 17.2 | 16.1 | 15.3 | 13.9 | 13.6 | 14.8 | 103.2 | - |
| 65-74 | 26.3 | - | - | 23.6 | 12.9 | 27.2 | 31.0 | 32.4 | 13.8 | 21.1 | 25.0 | - | - |
| 75-84 | 23.6 | - | - | 27.1 | 35.1 | 31.5 | 25.7 | 15.4 | 10.1 | 20.9 | 16.4 | - | - |
| 85+ | 15.4 | - | - | 32.2 | 39.6 | 11.7 | 16.6 | - | - | 13.7 | 25.1 | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 192 Other parts of nervous system | | | | | | | | | | | | | |
| 192 Autres parties du système nerveux | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 0.6 | - | - | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | - | - |
| Crude/Brut | 0.6 | - | - | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | - | - |
| 0-24 | 0.3 | - | - | - | - | 0.5 | 0.4 | - | - | 0.6 | - | - | - |
| 25-34 | 0.3 | - | - | - | - | 0.1 | 0.3 | 2.0 | - | - | 0.3 | - | - |
| 35-44 | 0.4 | - | - | - | - | 0.2 | 0.6 | - | - | 0.5 | 0.7 | - | - |
| 45-54 | 0.6 | - | - | - | - | 1.3 | 0.6 | - | - | - | 0.6 | - | - |
| 55-64 | 1.0 | - | - | - | - | 0.7 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | - | - | - | - |
| 65-74 | 2.0 | - | - | - | 4.3 | 2.5 | 2.2 | - | - | 1.6 | 2.7 | - | - |
| 75-84 | 1.6 | - | - | 6.8 | - | 1.2 | 1.4 | 5.1 | - | 3.5 | - | - | - |
| 85+ | 1.2 | - | - | - | - | - | 3.3 | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 193 Thyroid gland | | | | | | | | | | | | | |
| 193 Corps thyroïde | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 2.2 | 1.5 | 6.1 | 1.2 | 2.0 | 1.7 | 2.6 | 2.1 | 5.3 | 2.3 | 1.3 | - | - |
| Crude/Brut | 2.1 | 1.4 | 6.2 | 1.1 | 1.9 | 1.6 | 2.5 | 2.0 | 5.0 | 1.9 | 1.3 | - | - |
| 0-24 | 0.3 | - | 3.9 | - | 0.7 | 0.4 | 0.3 | - | - | 0.4 | 0.2 | - | - |
| 25-34 | 1.2 | - | - | - | - | 0.6 | 2.1 | 3.0 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | - | - |
| 35-44 | 2.9 | 2.2 | - | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 3.5 | 2.5 | 7.1 | 3.4 | 1.9 | - | - |
| 45-54 | 4.2 | 3.5 | 15.5 | 4.3 | 8.0 | 3.1 | 4.8 | - | 13.1 | 3.2 | 3.3 | - | - |
| 55-64 | 4.2 | 9.3 | 18.7 | - | - | 2.9 | 5.5 | 4.4 | 13.9 | 1.0 | 2.7 | - | - |
| 65-74 | 5.4 | - | - | 3.4 | 8.6 | 4.4 | 4.8 | 8.1 | 13.8 | 11.3 | 2.7 | - | - |
| 75-84 | 4.7 | - | 41.5 | 6.8 | - | 4.7 | 4.3 | 5.1 | 10.1 | 3.5 | 3.6 | - | - |
| 85+ | 2.4 | - | - | - | - | 3.3 | - | - | - | 13.7 | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 3. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 3. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| | Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. |
|---|--------|-------------------|--------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | | T.-N. I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | | T.N.-O. |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | | |
| 189 Kidney and other urinary organs NOS | | | | | | | | | | | | | |
| 189 Rein et organes urinaires autres ou SAI | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 7.9 | 8.1 | 8.8 | 7.6 | 9.3 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 9.2 | 7.8 | 6.0 | 6.1 | 2.4 |
| Crude/Brut | 8.4 | 7.3 | 10.6 | 8.7 | 9.9 | 8.7 | 8.7 | 9.3 | 10.9 | 6.9 | 6.8 | 7.5 | 3.5 |
| 0-24 | 0.7 | - | - | - | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | - | 6.8 |
| 25-34 | 1.1 | 6.0 | - | - | 3.1 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | - | - |
| 35-44 | 3.3 | - | - | 1.4 | 1.7 | 2.8 | 4.7 | 1.3 | 4.5 | 3.1 | 1.9 | 38.3 | - |
| 45-54 | 10.0 | 7.4 | - | 2.2 | 8.3 | 9.4 | 11.7 | 9.5 | 11.1 | 11.9 | 8.2 | - | - |
| 55-64 | 19.8 | 14.4 | 37.7 | 30.6 | 32.2 | 20.3 | 18.8 | 23.1 | 20.6 | 22.6 | 13.7 | - | - |
| 65-74 | 30.9 | 46.8 | 19.9 | 36.3 | 35.9 | 30.9 | 31.2 | 39.5 | 33.7 | 20.7 | 27.4 | - | - |
| 75-84 | 42.0 | 40.4 | 117.5 | 41.4 | 35.9 | 46.1 | 41.8 | 34.9 | 55.7 | 61.7 | 31.3 | - | - |
| 85+ | 48.0 | 35.4 | - | 54.4 | 52.8 | 53.7 | 41.3 | 39.7 | 66.3 | 96.9 | 29.0 | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 190 Eye | | | | | | | | | | | | | |
| 190 Oeil | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.8 | - | - | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | - | - |
| Crude/Brut | 0.8 | - | - | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | - | - |
| 0-24 | 0.2 | - | - | - | 1.5 | 0.3 | 0.1 | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - |
| 25-34 | 0.2 | - | - | - | - | 0.5 | 0.2 | - | - | 0.4 | - | - | - |
| 35-44 | 0.5 | - | - | - | - | 0.5 | 0.7 | - | - | - | 0.4 | - | - |
| 45-54 | 1.0 | - | - | 4.3 | - | 1.0 | 1.3 | - | - | 0.8 | - | - | - |
| 55-64 | 2.4 | - | - | 2.6 | - | 1.8 | 4.3 | - | - | 1.1 | 1.4 | - | - |
| 65-74 | 1.9 | - | - | 2.8 | - | 2.3 | 2.1 | 6.6 | - | 1.4 | 0.7 | - | - |
| 75-84 | 3.4 | - | - | - | - | 4.1 | 3.2 | 7.0 | - | 4.9 | 3.9 | - | - |
| 85+ | 2.6 | - | - | - | - | 2.3 | - | 9.9 | 11.1 | 7.5 | 4.1 | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 191 Brain | | | | | | | | | | | | | |
| 191 Encéphale | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 5.5 | 1.8 | 6.9 | 3.6 | 6.6 | 5.7 | 6.5 | 4.5 | 5.1 | 4.0 | 4.7 | - | - |
| Crude/Brut | 5.7 | 1.7 | 7.6 | 3.7 | 6.9 | 6.0 | 6.8 | 4.8 | 5.1 | 3.6 | 5.0 | - | - |
| 0-24 | 2.7 | 1.7 | 4.1 | 2.5 | 4.5 | 2.4 | 3.4 | 1.0 | 3.7 | 1.0 | 2.6 | - | - |
| 25-34 | 2.5 | - | - | 4.9 | 4.6 | 2.6 | 2.5 | 5.3 | 4.8 | 1.6 | 0.7 | - | - |
| 35-44 | 3.3 | - | 10.4 | - | 6.9 | 2.6 | 4.1 | 2.5 | 4.5 | 2.6 | 3.4 | - | - |
| 45-54 | 5.3 | 7.4 | - | 2.2 | 5.5 | 4.3 | 6.1 | 3.8 | 8.8 | 3.4 | 6.4 | - | - |
| 55-64 | 12.1 | - | - | 10.2 | 6.4 | 14.0 | 13.7 | 10.5 | - | 11.8 | 10.9 | - | - |
| 65-74 | 17.8 | 5.9 | 39.9 | 8.4 | 10.8 | 19.8 | 21.7 | 11.0 | 16.9 | 15.2 | 11.1 | - | - |
| 75-84 | 16.7 | - | 29.4 | 4.6 | 23.9 | 18.6 | 19.7 | 14.0 | 3.7 | 12.3 | 15.6 | - | - |
| 85+ | 16.7 | - | - | - | 35.2 | 23.3 | 17.3 | 19.8 | - | 7.5 | 16.6 | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 192 Other parts of nervous system | | | | | | | | | | | | | |
| 192 Autres parties du système nerveux | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.5 | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | - | 0.2 | 0.1 | - | - |
| Crude/Brut | 0.5 | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | - | 0.2 | 0.1 | - | - |
| 0-24 | 0.2 | - | - | - | - | 0.3 | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 0.2 | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | 0.3 | - | - |
| 35-44 | 0.7 | - | - | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 0.4 | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | 1.1 | - | - | 2.6 | - | 0.3 | 2.4 | - | - | 1.1 | - | - | - |
| 65-74 | 1.0 | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | 1.0 | - | - | - | - | 1.4 | 1.4 | - | - | 2.5 | - | - | - |
| 85+ | 1.6 | - | - | 15.6 | - | 4.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 193 Thyroid gland | | | | | | | | | | | | | |
| 193 Corps thyroïde | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 5.9 | 3.5 | 10.8 | 5.5 | 3.8 | 5.1 | 7.2 | 4.6 | 6.8 | 6.1 | 4.5 | - | 4.2 |
| Crude/Brut | 5.9 | 3.1 | 10.6 | 5.4 | 3.7 | 5.3 | 7.2 | 4.5 | 6.5 | 5.8 | 4.5 | - | 3.5 |
| 0-24 | 1.7 | - | - | 3.7 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.6 | 1.9 | 1.1 | - | - |
| 25-34 | 7.3 | - | 27.7 | 8.6 | 1.5 | 4.3 | 10.1 | 10.6 | 6.0 | 7.2 | 5.5 | - | - |
| 35-44 | 8.4 | 6.7 | 10.4 | 8.6 | 6.9 | 6.5 | 10.2 | 5.0 | 12.0 | 9.2 | 6.8 | - | 26.2 |
| 45-54 | 10.1 | 14.8 | 15.9 | 4.3 | 8.3 | 8.1 | 12.1 | 1.9 | 13.3 | 11.9 | 9.9 | - | - |
| 55-64 | 8.0 | 4.8 | - | 2.6 | 6.4 | 7.8 | 9.8 | 4.2 | 11.4 | 7.5 | 6.2 | - | - |
| 65-74 | 7.9 | 5.9 | 19.9 | 8.4 | 3.6 | 11.8 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 5.5 | 4.5 | - | - |
| 75-84 | 6.5 | - | 29.4 | - | - | 7.6 | 8.7 | - | 7.4 | 4.9 | 3.9 | - | - |
| 85+ | 6.8 | - | - | - | 17.6 | 14.0 | 4.0 | - | 11.1 | 14.9 | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 3. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 3. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. | | | | | | | | |
|---|----------------|--------|-------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | T.-N. I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194 Other endocrine glands and related structures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194 Autres glandes endocrines et structures apparentes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.5 | - | - | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | - | | | | | | | | |
| Crude/Brut | 0.5 | - | - | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | - | | | | | | | | |
| 0-24 | 0.7 | - | - | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | - | 0.6 | 0.4 | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 0.2 | - | - | - | - | 0.4 | 0.1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 0.4 | - | - | - | - | 0.5 | 0.6 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 0.4 | - | - | - | 2.7 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 0.5 | - | - | - | - | 1.0 | 0.4 | - | 2.3 | - | - | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 1.1 | - | - | - | - | 2.0 | 1.3 | - | - | 1.6 | - | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 0.8 | - | - | - | - | 1.2 | 0.7 | 5.1 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 85+ | 1.2 | - | - | - | - | - | 3.3 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 195 Other and ill-defined sites | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 Sièges autres et mal définis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.9 | 0.5 | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | - | 0.2 | 0.2 | 0.3 | - | | | | | | | | |
| Crude/Brut | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | | | | | | | | |
| 0-24 | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | 0.2 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | -- | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 1.0 | - | 15.5 | 2.1 | - | 1.3 | 1.3 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 0.8 | - | - | - | 3.4 | 0.7 | 1.3 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 3.5 | - | - | 3.4 | - | 5.4 | 5.1 | - | - | - | 0.9 | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 6.2 | 13.6 | - | - | 17.5 | 7.0 | 7.9 | - | - | 7.0 | 3.6 | - | | | | | | | | |
| 85+ | 21.4 | - | - | - | - | 23.3 | 39.8 | - | 18.8 | - | 8.4 | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 196 Lymph nodes, secondary and NOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 Ganglion lymphatiques, secondaires et SAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 1.1 | 2.5 | - | - | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | - | 1.6 | - | | | | | | | | |
| Crude/Brut | 1.0 | 1.7 | - | - | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | - | 1.6 | - | | | | | | | | |
| 0-24 | -- | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 0.2 | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | 0.3 | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 0.4 | - | - | - | - | 0.3 | 0.5 | - | - | - | 1.1 | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 1.4 | - | - | - | - | 1.8 | 1.5 | 3.7 | 4.4 | - | 1.1 | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 2.4 | - | - | - | 3.4 | 1.6 | 2.9 | - | 4.6 | - | 4.7 | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 4.9 | 19.0 | - | - | - | 3.0 | 5.7 | 5.4 | 11.1 | - | 7.1 | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 5.5 | 13.6 | - | - | - | 2.3 | 7.1 | 10.3 | - | - | 10.9 | - | | | | | | | | |
| 85+ | 9.5 | 69.8 | - | - | - | 5.8 | 16.6 | - | 18.8 | - | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 197 Secondary, respiratory and digestive | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 197 Secondaires, respiratoire et digestif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 3.6 | 5.4 | - | - | - | 3.2 | 5.2 | 3.4 | 3.4 | - | 4.1 | - | | | | | | | | |
| Crude/Brut | 3.1 | 4.5 | - | - | - | 2.6 | 4.4 | 3.3 | 3.6 | - | 4.0 | - | | | | | | | | |
| 0-24 | 0.1 | 0.8 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 0.2 | 2.0 | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 0.3 | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 0.7 | - | - | - | - | 0.5 | 1.1 | 1.2 | - | - | 0.7 | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 1.6 | - | - | - | - | 1.5 | 2.2 | - | - | - | 2.8 | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 7.6 | 23.3 | - | - | - | 5.9 | 9.7 | 6.5 | 7.0 | - | 11.5 | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 17.6 | 25.3 | - | - | - | 18.3 | 23.3 | 27.0 | 11.1 | - | 16.9 | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 29.3 | 27.2 | - | - | - | 21.0 | 44.3 | 15.4 | 45.4 | - | 34.6 | - | | | | | | | | |
| 85+ | 39.1 | - | - | - | - | 60.8 | 66.3 | 21.5 | 37.6 | - | 25.1 | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 3. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 3. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. T.N.-O. | | | | | | |
|--|----------------|--------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| | T.-N. I.-P.-E. | N.-E. | N.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | | | | | | | | |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194 Other endocrine glands and related structures | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194 Autres glandes endocrines et structures apparentes | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.5 | 0.4 | - | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | - | 0.6 | 0.5 | 0.2 | - | | | | | | |
| Crude/Brut | 0.5 | 0.3 | - | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | - | 0.6 | 0.5 | 0.2 | - | | | | | | |
| 0-24 | 0.6 | - | - | - | - | 0.9 | 0.7 | - | 0.5 | 0.6 | 0.5 | - | | | | | | |
| 25-34 | 0.3 | 2.0 | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.4 | - | - | | | | | | |
| 35-44 | 0.4 | - | - | - | - | 0.2 | 0.5 | - | 1.5 | 1.0 | - | - | | | | | | |
| 45-54 | 0.2 | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 55-64 | 0.7 | - | - | - | - | 0.9 | 1.3 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 65-74 | 1.3 | - | - | 2.8 | 3.6 | 2.7 | 0.5 | - | 2.4 | - | 0.7 | - | | | | | | |
| 75-84 | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 85+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 195 Other and ill-defined sites | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 Sièges autres et mal définis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.9 | 2.4 | - | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | - | 0.3 | - | | | | | | |
| Crude/Brut | 1.1 | 2.4 | - | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | - | 0.4 | - | | | | | | |
| 0-24 | 0.2 | 2.6 | - | - | 0.7 | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 25-34 | 0.1 | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 35-44 | 0.2 | - | - | - | - | 0.2 | 0.4 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 45-54 | 0.4 | - | - | - | - | 0.5 | 0.7 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 55-64 | 1.8 | 4.8 | - | - | - | 3.0 | 2.4 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 65-74 | 2.4 | 5.9 | - | 2.8 | 3.6 | 3.8 | 2.6 | - | 2.4 | - | 0.7 | - | | | | | | |
| 75-84 | 7.8 | 20.2 | - | - | - | 7.6 | 12.4 | 10.5 | - | - | 3.9 | - | | | | | | |
| 85+ | 16.2 | - | - | - | 35.2 | 21.0 | 20.0 | 9.9 | 22.1 | - | 8.3 | - | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 196 Lymph nodes, secondary and NOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 Ganglion lymphatiques, secondaires et SAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.7 | 0.4 | - | - | - | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | - | 1.1 | - | | | | | | |
| Crude/Brut | 0.8 | 0.3 | - | - | - | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | - | 1.2 | - | | | | | | |
| 0-24 | -- | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 25-34 | 0.1 | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | 1.1 | - | - | - | - | | | | | | |
| 35-44 | 0.5 | - | - | - | - | 0.5 | 0.7 | - | - | - | 0.4 | - | | | | | | |
| 45-54 | 1.1 | - | - | - | - | 0.5 | 1.9 | 1.9 | - | - | 1.8 | - | | | | | | |
| 55-64 | 1.9 | 4.8 | - | - | - | 2.4 | 2.4 | - | 4.6 | - | 1.4 | - | | | | | | |
| 65-74 | 3.0 | - | - | - | - | 0.8 | 3.6 | 2.2 | 9.6 | - | 7.4 | - | | | | | | |
| 75-84 | 3.1 | - | - | - | - | 3.4 | 4.1 | 3.5 | - | - | 3.9 | - | | | | | | |
| 85+ | 2.1 | - | - | - | - | - | 2.7 | - | 11.1 | - | 4.1 | - | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 197 Secondary, respiratory and digestive | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 197 Secondaires, respiratoire et digestif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 2.8 | 4.1 | - | - | - | 2.3 | 3.8 | 2.2 | 3.5 | - | 3.7 | - | | | | | | |
| Crude/Brut | 3.1 | 3.8 | - | - | - | 2.5 | 4.2 | 2.7 | 4.3 | - | 4.3 | - | | | | | | |
| 0-24 | -- | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | 0.2 | - | | | | | | |
| 25-34 | 0.1 | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 35-44 | 1.0 | 2.2 | - | - | - | 0.5 | 1.4 | - | 3.0 | - | 1.5 | - | | | | | | |
| 45-54 | 2.4 | - | - | - | - | 1.3 | 4.3 | 3.8 | 2.2 | - | 1.8 | - | | | | | | |
| 55-64 | 5.0 | - | - | - | - | 4.8 | 5.8 | 2.1 | 6.9 | - | 10.3 | - | | | | | | |
| 65-74 | 11.4 | 23.4 | - | - | - | 7.2 | 16.3 | 8.8 | 9.6 | - | 17.8 | - | | | | | | |
| 75-84 | 23.8 | 60.6 | - | - | - | 22.0 | 30.8 | 24.4 | 40.8 | - | 22.1 | - | | | | | | |
| 85+ | 25.5 | - | - | - | - | 28.0 | 37.3 | 9.9 | 11.1 | - | 29.0 | - | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 3. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 3. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Mfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. | | | | | | | | |
|---|----------------|--------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | T.-N. I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 Secondary of other specified sites | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 Seconde d'autres sièges précisés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 2.1 | 5.5 | - | - | 0.3 | 1.6 | 2.8 | 1.3 | 1.8 | - | 3.0 | - | | | | | | | | |
| Crude/Brut | 1.8 | 4.1 | - | - | 0.3 | 1.4 | 2.3 | 1.3 | 2.0 | - | 2.9 | - | | | | | | | | |
| 0-24 | -- | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | 0.2 | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 0.4 | - | - | - | - | 0.5 | 0.3 | - | - | - | 1.1 | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 1.2 | 3.5 | - | - | - | 0.8 | 1.7 | - | - | - | 2.2 | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 3.8 | 18.7 | - | - | - | 3.9 | 4.6 | - | - | - | 5.4 | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 9.9 | 19.0 | - | - | - | 8.9 | 12.1 | 10.8 | 8.3 | - | 15.2 | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 16.6 | 40.8 | - | - | 8.8 | 5.8 | 25.7 | 15.4 | 30.3 | - | 18.2 | - | | | | | | | | |
| 85+ | 27.3 | 69.8 | - | - | - | 29.2 | 39.8 | - | 18.8 | - | 33.5 | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 199 Site unspecified | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 Siège non précisé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 8.7 | - | 12.9 | 19.9 | 16.2 | 7.7 | 8.8 | 6.1 | 4.3 | 15.2 | 5.5 | - | | | | | | | | |
| Crude/Brut | 7.3 | - | 12.3 | 18.4 | 12.5 | 6.2 | 7.4 | 5.8 | 4.4 | 10.5 | 5.2 | - | | | | | | | | |
| 0-24 | 0.1 | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 0.8 | - | - | - | 3.0 | 0.6 | 1.0 | - | 1.2 | 1.1 | 0.3 | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 1.2 | - | - | 2.9 | - | 2.3 | 0.9 | - | - | 1.5 | 0.4 | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 4.4 | - | - | 17.1 | 8.0 | 3.8 | 4.2 | 7.5 | 2.2 | 8.9 | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 14.5 | - | 18.7 | 38.0 | 27.5 | 13.3 | 15.0 | 15.3 | 11.6 | 18.8 | 6.7 | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 38.7 | - | 70.5 | 104.7 | 64.6 | 37.6 | 36.7 | 27.0 | 16.6 | 61.6 | 25.0 | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 75.8 | - | 41.5 | 155.6 | 122.8 | 60.6 | 78.5 | 41.0 | 20.2 | 153.0 | 65.6 | - | | | | | | | | |
| 85+ | 117.4 | - | 487.0 | 161.0 | 158.3 | 87.5 | 122.7 | 64.0 | 94.0 | 247.3 | 75.3 | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 200 Lymphosarcoma and reticulosarcoma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 Lymphosarcome et réticulosarcome | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 8.1 | 3.6 | 9.1 | 10.2 | 8.6 | 5.0 | 10.2 | 10.4 | 7.7 | 6.2 | 8.1 | 8.9 | | | | | | | | |
| Crude/Brut | 7.3 | 3.4 | 9.2 | 9.5 | 7.9 | 4.4 | 9.4 | 10.0 | 7.9 | 5.0 | 8.0 | 6.8 | | | | | | | | |
| 0-24 | 1.0 | 1.6 | 7.9 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 2.5 | 2.0 | - | 4.8 | - | 1.8 | 3.2 | - | 1.2 | 2.3 | 3.4 | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 4.0 | 4.4 | - | 5.8 | 1.7 | 1.7 | 5.9 | 3.7 | 1.4 | 2.4 | 5.2 | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 8.8 | 10.6 | - | 8.5 | 13.3 | 5.1 | 11.6 | 18.6 | 2.2 | 5.7 | 8.9 | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 17.3 | 9.3 | 37.4 | 21.7 | 20.6 | 7.8 | 23.0 | 21.8 | 25.5 | 14.6 | 15.5 | 103.2 | | | | | | | | |
| 65-74 | 30.6 | - | 23.5 | 40.5 | 38.8 | 25.2 | 37.0 | 37.8 | 22.1 | 21.1 | 28.5 | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 44.9 | - | 41.5 | 47.4 | 43.9 | 18.6 | 55.7 | 76.9 | 65.6 | 41.7 | 47.4 | - | | | | | | | | |
| 85+ | 49.8 | - | - | 96.6 | 39.6 | 46.7 | 56.4 | 21.3 | 75.2 | 27.5 | 50.2 | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 201 Hodgkin's disease | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 Maladie de Hodgkin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 3.4 | 2.5 | 4.7 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 2.7 | 2.9 | - | | | | | | | | |
| Crude/Brut | 3.4 | 2.4 | 4.6 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 2.7 | 2.9 | - | | | | | | | | |
| 0-24 | 2.2 | 1.6 | 3.9 | 3.0 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 4.8 | 4.1 | 9.3 | 2.4 | 1.5 | 3.7 | 5.4 | 7.1 | 5.8 | 5.0 | 5.4 | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 4.1 | 2.2 | 10.3 | 4.3 | - | 6.3 | 3.8 | 1.2 | 5.7 | 2.9 | 3.0 | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 3.6 | 3.5 | - | 4.3 | 2.7 | 4.1 | 4.4 | - | 6.5 | 2.4 | 1.1 | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 3.4 | 4.7 | - | 2.7 | - | 4.2 | 2.7 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 2.7 | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 3.7 | - | - | - | 21.5 | 4.9 | 2.9 | 8.1 | - | 1.6 | 2.7 | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 4.7 | - | - | 13.5 | 8.8 | 5.8 | 2.9 | - | 5.0 | 3.5 | 7.3 | - | | | | | | | | |
| 85+ | 2.4 | - | - | - | - | 5.8 | 3.3 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 3. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 3. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. |
|--|----------------|--------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | T.-N. I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | | T.N.-O. |
| Rate per 100,000 • Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 198 Secondary of other specified sites | | | | | | | | | | | | |
| 198 Secondaire d'autres sièges précisés | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 1.5 | 2.6 | - | - | 1.3 | 1.9 | 0.9 | 1.9 | - | 2.6 | - | - |
| Crude/Brut | 1.7 | 2.4 | - | - | 1.4 | 2.1 | 1.3 | 2.0 | - | 3.0 | - | - |
| 0-24 | -- | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | -- | - | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - |
| 35-44 | 0.8 | 2.2 | - | - | 0.4 | 0.7 | - | 3.0 | - | 2.3 | - | - |
| 45-54 | 1.6 | - | - | - | 1.5 | 2.0 | 1.9 | - | - | 2.9 | - | - |
| 55-64 | 2.6 | 4.8 | - | - | 2.4 | 3.0 | - | 4.6 | - | 4.8 | - | - |
| 65-74 | 6.2 | 5.9 | - | - | 4.2 | 8.0 | 2.2 | 9.6 | - | 11.9 | - | - |
| 75-84 | 10.5 | 30.3 | - | - | 12.4 | 12.9 | 10.5 | 3.7 | - | 11.7 | - | - |
| 85+ | 17.2 | 35.4 | - | - | 11.7 | 25.3 | 19.8 | - | - | 24.9 | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 199 Site unspecified | | | | | | | | | | | | |
| 199 Siège non précisé | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 5.5 | 0.8 | 8.2 | 12.8 | 13.9 | 5.2 | 4.3 | 6.4 | 4.0 | 12.1 | 3.3 | - |
| Crude/Brut | 6.2 | 0.7 | 12.1 | 14.7 | 15.8 | 5.7 | 4.9 | 8.1 | 5.1 | 10.7 | 4.1 | - |
| 0-24 | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 0.2 | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 0.7 | - | - | 4.9 | 3.1 | 0.6 | 0.8 | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 1.6 | 2.2 | - | 2.9 | 3.5 | 1.2 | 1.6 | 3.8 | - | 2.6 | 0.8 | - |
| 45-54 | 3.7 | - | - | 17.4 | 11.0 | 3.5 | 3.0 | - | 6.6 | 4.2 | 2.3 | - |
| 55-64 | 11.1 | 4.8 | - | 25.5 | 22.5 | 11.3 | 9.0 | 16.8 | 4.6 | 23.7 | 4.8 | - |
| 65-74 | 21.0 | - | 39.9 | 44.7 | 53.9 | 19.4 | 14.2 | 30.7 | 14.5 | 59.4 | 10.4 | - |
| 75-84 | 41.8 | - | 88.2 | 87.5 | 143.6 | 42.6 | 25.3 | 54.9 | 33.4 | 105.4 | 27.4 | - |
| 85+ | 83.4 | - | 230.4 | 122.4 | 88.0 | 65.3 | 81.3 | 99.1 | 66.3 | 134.2 | 82.9 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 Lymphosarcoma and reticulosarcoma | | | | | | | | | | | | |
| 200 Lymphosarcome et réticulosarcome | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 5.6 | 1.5 | 9.6 | 5.6 | 7.9 | 3.3 | 7.0 | 6.6 | 7.8 | 4.0 | 5.9 | - |
| Crude/Brut | 6.0 | 1.4 | 10.6 | 6.3 | 8.5 | 3.6 | 7.5 | 7.7 | 9.3 | 3.6 | 6.7 | - |
| 0-24 | 0.5 | 0.9 | 4.1 | - | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | - |
| 25-34 | 1.1 | - | - | 1.2 | 3.1 | 0.3 | 1.5 | - | - | 2.4 | 1.4 | - |
| 35-44 | 2.2 | - | 10.4 | - | - | 1.8 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 2.3 | - |
| 45-54 | 6.1 | - | 15.9 | 6.5 | 8.3 | 4.0 | 7.8 | 11.4 | 4.4 | 4.2 | 5.8 | - |
| 55-64 | 12.9 | - | - | 15.3 | 16.1 | 7.5 | 15.2 | 18.9 | 25.1 | 10.8 | 15.0 | - |
| 65-74 | 24.3 | 17.6 | 39.9 | 25.1 | 39.5 | 13.3 | 32.0 | 15.4 | 28.9 | 16.6 | 26.0 | - |
| 75-84 | 32.3 | - | 58.8 | 36.8 | 47.9 | 15.1 | 41.8 | 38.4 | 52.0 | 19.6 | 33.9 | - |
| 85+ | 27.1 | - | - | 27.2 | 35.2 | 30.3 | 22.7 | 59.5 | 44.2 | 7.5 | 29.0 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 201 Hodgkin's disease | | | | | | | | | | | | |
| 201 Maladie de Hodgkin | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 2.7 | 1.6 | 1.7 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.1 | 2.8 | 1.9 | 2.1 | 6.6 |
| Crude/Brut | 2.7 | 1.7 | 1.5 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.1 | 2.8 | 1.9 | 2.1 | 7.5 |
| 0-24 | 2.5 | 3.4 | - | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 2.2 | 18.9 |
| 25-34 | 3.5 | - | 9.2 | 6.2 | 6.2 | 3.1 | 4.2 | 3.2 | 3.6 | 2.8 | 2.1 | - |
| 35-44 | 1.9 | - | - | 2.9 | - | 1.6 | 2.0 | - | 4.5 | 3.1 | 2.3 | - |
| 45-54 | 1.8 | - | - | - | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 3.8 | 2.2 | - | 2.9 | - |
| 55-64 | 1.8 | - | - | - | 3.2 | 2.4 | 1.7 | - | 2.3 | 3.2 | 0.7 | - |
| 65-74 | 4.9 | 5.9 | - | 5.6 | 3.6 | 7.2 | 5.2 | - | 4.8 | 2.8 | 3.0 | - |
| 75-84 | 3.6 | - | - | - | 6.0 | 4.8 | 4.1 | 7.0 | 3.7 | - | 1.3 | - |
| 85+ | 1.0 | - | - | 13.6 | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 3. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 3. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. |
|---|----------------|--------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | T.-N. I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | | T.N.-O. |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 202 Other of lymphoid and histiocytic tissue | | | | | | | | | | | | |
| 202 Autres des tissus lymphoïdes et histiocytaires | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 9.6 | 5.2 | 1.6 | 9.0 | 6.3 | 13.4 | 8.7 | 8.0 | 7.9 | 6.7 | 9.8 | - |
| Crude/Brut | 8.8 | 4.5 | 1.5 | 8.4 | 6.0 | 12.0 | 8.1 | 7.6 | 7.9 | 5.5 | 9.6 | - |
| 0-24 | 1.0 | 1.6 | - | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | - | 1.0 | 0.4 | 0.5 | - |
| 25-34 | 3.6 | - | - | - | 3.0 | 5.5 | 3.2 | 1.0 | 2.3 | 2.7 | 4.7 | - |
| 35-44 | 7.5 | 4.4 | - | 11.5 | 5.1 | 10.1 | 7.5 | 1.2 | 7.1 | 4.4 | 6.7 | - |
| 45-54 | 13.1 | 10.6 | - | 10.7 | 5.3 | 17.7 | 12.1 | 13.0 | 4.4 | 8.9 | 14.5 | - |
| 55-64 | 19.5 | 14.0 | - | 24.4 | - | 24.7 | 17.2 | 24.0 | 25.5 | 19.9 | 16.9 | - |
| 65-74 | 32.0 | 12.6 | 23.5 | 27.0 | 43.1 | 44.0 | 29.0 | 29.7 | 19.4 | 19.4 | 33.0 | - |
| 75-84 | 45.2 | - | - | 27.1 | 26.3 | 64.1 | 39.3 | 46.1 | 40.4 | 34.8 | 54.7 | - |
| 85+ | 51.0 | 69.8 | - | 64.4 | - | 99.2 | 39.8 | 42.7 | 56.4 | 13.7 | 41.8 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 203 Multiple myeloma and immunoproliferative neoplasms | | | | | | | | | | | | |
| 203 Myélome multiple et tumeurs immuno-prolifératives | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 5.9 | 4.6 | 1.6 | 4.9 | 3.8 | 5.1 | 6.8 | 7.0 | 5.8 | 6.7 | 4.9 | - |
| Crude/Brut | 5.1 | 3.8 | 1.5 | 4.7 | 3.5 | 6.2 | 5.8 | 6.7 | 5.9 | 4.8 | 4.8 | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 0.2 | - | - | - | - | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 1.1 | 2.2 | - | 2.9 | - | 1.2 | 1.0 | 1.2 | - | 1.0 | 1.1 | - |
| 45-54 | 4.1 | - | - | - | 10.6 | 3.1 | 5.0 | 1.9 | 6.5 | 6.5 | 2.8 | - |
| 55-64 | 13.2 | 23.3 | - | 19.0 | 6.9 | 11.4 | 14.6 | 13.1 | 7.0 | 15.7 | 12.1 | - |
| 65-74 | 26.7 | 19.0 | 23.5 | 20.3 | 25.8 | 25.2 | 29.0 | 35.1 | 36.0 | 19.4 | 24.1 | - |
| 75-84 | 47.3 | 27.2 | - | 40.6 | 8.8 | 37.3 | 54.3 | 61.5 | 50.5 | 69.6 | 41.9 | - |
| 85+ | 56.9 | - | - | - | - | 66.7 | 89.5 | 85.4 | 18.8 | 68.7 | 25.1 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 204 Lymphoid leukemia | | | | | | | | | | | | |
| 204 Leucémie lymphoïde | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 6.6 | 2.0 | 3.2 | 4.8 | 5.1 | 7.4 | 7.7 | 6.7 | 8.9 | 6.2 | 3.6 | 6.2 |
| Crude/Brut | 5.9 | 2.1 | 3.1 | 4.4 | 4.6 | 6.2 | 6.8 | 6.5 | 9.1 | 4.7 | 3.5 | 6.8 |
| 0-24 | 2.8 | 3.3 | - | 3.6 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 2.6 | 17.7 |
| 25-34 | 0.5 | - | - | - | - | 0.6 | 0.5 | - | - | 0.4 | 0.7 | - |
| 35-44 | 1.3 | - | - | 1.4 | 1.7 | 1.0 | 1.8 | 1.2 | 4.3 | 1.0 | 0.4 | - |
| 45-54 | 4.1 | - | - | 2.1 | 5.3 | 3.3 | 5.3 | 9.3 | 6.5 | 5.2 | 1.7 | - |
| 55-64 | 13.5 | 9.3 | 37.4 | 5.4 | 3.4 | 14.0 | 16.1 | 15.3 | 16.2 | 11.5 | 8.1 | - |
| 65-74 | 23.2 | - | - | 13.5 | 21.5 | 24.7 | 26.5 | 27.0 | 44.3 | 24.3 | 9.8 | - |
| 75-84 | 41.3 | - | - | 20.3 | 26.3 | 61.8 | 40.7 | 35.9 | 60.6 | 45.2 | 20.0 | - |
| 85+ | 64.1 | - | - | 96.6 | 79.1 | 70.0 | 86.2 | 21.3 | 18.8 | 82.4 | 25.1 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 205 Myeloid leukemia | | | | | | | | | | | | |
| 205 Leucémie myéloïde | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 4.7 | 2.4 | 6.3 | 3.0 | 2.6 | 4.4 | 5.7 | 5.9 | 4.6 | 3.6 | 3.8 | - |
| Crude/Brut | 4.2 | 2.1 | 6.2 | 2.9 | 2.4 | 3.8 | 5.2 | 5.6 | 4.8 | 2.9 | 3.7 | - |
| 0-24 | 1.0 | - | 3.9 | - | - | 0.9 | 1.1 | 1.0 | - | 1.0 | 1.2 | - |
| 25-34 | 1.5 | - | 9.3 | - | 3.0 | 0.9 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 1.1 | 1.7 | - |
| 35-44 | 2.1 | 4.4 | - | 1.4 | - | 1.2 | 2.8 | 4.9 | - | 2.9 | 1.1 | - |
| 45-54 | 4.3 | 3.5 | - | 4.3 | - | 4.6 | 5.3 | 5.6 | 2.2 | 1.6 | 3.9 | - |
| 55-64 | 9.2 | 4.7 | 18.7 | 13.6 | 6.9 | 6.8 | 11.0 | 4.4 | 11.6 | 4.2 | 12.1 | - |
| 65-74 | 16.1 | 6.3 | 23.5 | 6.8 | 17.2 | 15.3 | 18.2 | 27.0 | 19.4 | 13.0 | 12.5 | - |
| 75-84 | 28.6 | 13.6 | - | 20.3 | 8.8 | 32.6 | 40.0 | 25.6 | 35.3 | 17.4 | 7.3 | - |
| 85+ | 36.8 | - | - | - | - | 46.7 | 36.5 | 64.0 | 37.6 | 55.0 | 25.1 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 3. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 3. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. T.N.-O. | | | | | | | |
|---|----------------|--------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | T.-N. I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Alb. | | | | | | C.-B. | | | | | | | | | |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 Other of lymphoid and histiocytic tissue | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 Autres des tissus lymphoïdes et histiocytaires | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 6.5 | 6.9 | 6.3 | 6.8 | 5.6 | 8.6 | 5.7 | 6.0 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | - 35.2 | | | | | | | |
| Crude/Brut | 7.0 | 6.2 | 6.1 | 7.6 | 6.1 | 9.4 | 6.1 | 7.2 | 6.1 | 4.9 | 6.5 | - 10.6 | | | | | | | |
| 0-24 | 0.5 | - | - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | - | 0.5 | 0.2 | 0.4 | - | | | | | | | |
| 25-34 | 1.6 | 2.0 | - | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | - | 1.2 | 0.8 | 1.7 | - | | | | | | | |
| 35-44 | 3.7 | 4.5 | 10.4 | 1.4 | - | 4.9 | 3.7 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 3.4 | - 26.2 | | | | | | | |
| 45-54 | 7.6 | 3.7 | 15.9 | 4.3 | 11.0 | 7.1 | 8.0 | 5.7 | 11.1 | 10.2 | 6.4 | - | | | | | | | |
| 55-64 | 14.5 | 9.6 | 18.8 | 17.9 | 6.4 | 21.2 | 10.5 | 10.5 | 13.7 | 12.9 | 15.7 | - | | | | | | | |
| 65-74 | 26.6 | 41.0 | 19.9 | 33.5 | 21.6 | 36.6 | 21.2 | 30.7 | 26.5 | 23.5 | 20.0 | - 218.3 | | | | | | | |
| 75-84 | 33.6 | 50.5 | - | 46.0 | 35.9 | 45.4 | 27.5 | 48.9 | 14.8 | 31.9 | 24.8 | - 452.5 | | | | | | | |
| 85+ | 37.5 | - | - | 13.6 | 52.8 | 56.0 | 38.6 | 19.8 | 11.1 | 7.5 | 45.6 | - | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 203 Multiple myeloma and immunoproliferative neoplasms | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 Myélome multiple et tumeurs immuno-prolifératives | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 4.0 | 3.9 | 3.2 | 4.3 | 2.6 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 3.3 | 4.2 | 3.4 | 12.9 | | | | | | | |
| Crude/Brut | 4.4 | 3.5 | 4.5 | 4.8 | 2.9 | 4.3 | 4.7 | 5.7 | 4.1 | 3.7 | 4.0 | 7.5 | | | | | | | |
| 0-24 | -- | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 25-34 | -- | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 35-44 | 0.5 | 2.2 | - | - | - | 0.4 | 0.5 | 1.3 | - | 1.0 | - | - | | | | | | | |
| 45-54 | 4.0 | - | - | 6.5 | 2.8 | 3.3 | 5.0 | 1.9 | 2.2 | 5.9 | 2.3 | - | | | | | | | |
| 55-64 | 8.9 | 9.6 | 18.8 | 12.8 | 3.2 | 8.1 | 10.7 | 8.4 | 2.3 | 4.3 | 9.6 | 149.7 | | | | | | | |
| 65-74 | 18.6 | 29.3 | - | 22.3 | 10.8 | 16.8 | 19.1 | 19.8 | 26.5 | 19.3 | 17.8 | - | | | | | | | |
| 75-84 | 29.4 | 20.2 | - | 23.0 | 23.9 | 33.7 | 27.1 | 52.4 | 29.7 | 31.9 | 23.5 | - | | | | | | | |
| 85+ | 36.5 | - | 153.6 | 13.6 | 17.6 | 42.0 | 42.6 | 19.8 | - | 52.2 | 29.0 | - | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 204 Lymphoid leukemia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 Leucémie lymphoïde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 3.9 | 1.5 | 2.6 | 2.1 | 2.7 | 3.7 | 4.8 | 1.9 | 6.0 | 3.8 | 2.7 | - | | | | | | | |
| Crude/Brut | 4.2 | 1.4 | 3.0 | 2.4 | 2.9 | 3.9 | 5.2 | 2.3 | 6.9 | 3.6 | 2.9 | - | | | | | | | |
| 0-24 | 2.3 | 0.9 | - | 1.9 | 0.7 | 1.9 | 2.9 | 1.0 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | - | | | | | | | |
| 25-34 | 0.4 | - | - | - | - | 0.5 | 0.4 | - | 1.2 | 0.4 | 0.7 | - | | | | | | | |
| 35-44 | 0.6 | - | - | - | 3.5 | 0.4 | 0.9 | - | - | 0.5 | 0.4 | - | | | | | | | |
| 45-54 | 2.6 | - | - | - | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 1.9 | 8.8 | 1.7 | 2.9 | - | | | | | | | |
| 55-64 | 6.7 | - | - | 7.7 | 3.2 | 3.3 | 10.1 | - | 11.4 | 10.8 | 4.1 | - | | | | | | | |
| 65-74 | 12.5 | 11.7 | 19.9 | 2.8 | 3.6 | 14.1 | 15.7 | 6.6 | 24.1 | 6.9 | 5.9 | - | | | | | | | |
| 75-84 | 21.2 | - | 29.4 | 13.8 | 23.9 | 24.1 | 23.9 | 21.0 | 33.4 | 17.2 | 10.4 | - | | | | | | | |
| 85+ | 37.5 | 35.4 | - | 13.6 | 17.6 | 46.7 | 49.3 | 9.9 | 11.1 | 44.7 | 16.6 | - | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 205 Myeloid leukemia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 Leucémie myéloïde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 3.2 | 2.7 | 5.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 4.0 | 2.8 | 4.0 | 2.1 | 2.3 | 6.1 | | | | | | | |
| Crude/Brut | 3.5 | 2.4 | 6.1 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 4.3 | 3.2 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 7.5 | | | | | | | |
| 0-24 | 0.6 | - | - | 0.6 | - | 0.9 | 0.5 | - | 2.1 | 0.2 | 0.9 | - | | | | | | | |
| 25-34 | 1.1 | - | - | - | 3.1 | 1.1 | 0.7 | 2.1 | 3.6 | 1.2 | 1.0 | - | | | | | | | |
| 35-44 | 2.5 | 4.5 | - | 1.4 | 1.7 | 2.8 | 2.7 | 1.3 | - | 2.6 | 1.9 | 38.3 | | | | | | | |
| 45-54 | 3.2 | - | 15.9 | 6.5 | 2.8 | 2.8 | 4.3 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | - | | | | | | | |
| 55-64 | 6.0 | 19.1 | 18.8 | 2.6 | 3.2 | 5.4 | 7.5 | 4.2 | 4.6 | 2.2 | 5.5 | - | | | | | | | |
| 65-74 | 10.6 | - | - | 11.2 | 7.2 | 6.9 | 14.5 | 17.6 | 16.9 | 4.1 | 8.2 | - | | | | | | | |
| 75-84 | 16.5 | - | 29.4 | 18.4 | 17.9 | 15.8 | 22.0 | 14.0 | 18.6 | 14.7 | 3.9 | - | | | | | | | |
| 85+ | 26.1 | 35.4 | 76.8 | 27.2 | 52.8 | 25.7 | 32.0 | - | 11.1 | 22.4 | 16.6 | - | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 3. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 3. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. T.N.-O. | | | | | | |
|--|----------------|--------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| | T.-N. I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | | | | | | | | |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 Monocytic leukemia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 Leucémie monocytaire | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.2 | - | - | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | - | - | | | | | | |
| Crude/Brut | 0.2 | - | - | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 25-34 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 35-44 | -- | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 45-54 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | | | | | | |
| 55-64 | 0.2 | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 65-74 | 0.7 | - | - | - | 4.3 | 0.5 | - | 2.7 | 2.8 | 1.6 | 0.9 | - | | | | | | |
| 75-84 | 3.1 | - | - | 20.3 | - | 3.5 | 2.1 | - | - | 3.5 | 3.6 | - | | | | | | |
| 85+ | 3.6 | - | - | 32.2 | - | 5.8 | 3.3 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 207 Other specified leukemia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 Autres leucémies précisées | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.2 | - | 1.6 | - | - | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - | 0.1 | - | | | | | | |
| Crude/Brut | 0.2 | - | 1.5 | - | - | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - | 0.1 | - | | | | | | |
| 0-24 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.5 | - | - | - | | | | | | |
| 25-34 | -- | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 35-44 | 0.1 | - | 10.3 | - | - | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 45-54 | 0.3 | - | - | - | - | 0.8 | 0.2 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 55-64 | 0.2 | - | - | - | - | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 65-74 | 0.8 | - | - | - | - | 2.5 | 0.5 | 2.7 | - | - | - | - | | | | | | |
| 75-84 | 1.3 | - | - | - | - | 4.7 | - | - | - | - | 1.8 | - | | | | | | |
| 85+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 208 Leukemia of unspecified cell type | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 Leucémie à cellules non précisées | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 1.5 | 0.3 | 3.3 | 3.7 | 1.0 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | - | | | | | | |
| Crude/Brut | 1.2 | 0.3 | 3.1 | 3.3 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.9 | - | | | | | | |
| 0-24 | 0.2 | 0.8 | - | 0.6 | - | - | 0.3 | - | - | 0.2 | 0.2 | - | | | | | | |
| 25-34 | 0.3 | - | - | 1.2 | - | 0.7 | 0.1 | - | - | - | 0.3 | - | | | | | | |
| 35-44 | 0.2 | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 45-54 | 0.6 | - | - | 4.3 | - | 1.0 | 0.6 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 55-64 | 2.3 | - | - | - | - | 4.6 | 1.8 | - | 4.6 | 2.1 | 0.7 | - | | | | | | |
| 65-74 | 6.0 | - | 23.5 | 16.9 | - | 7.9 | 6.1 | 8.1 | 5.5 | - | 3.6 | - | | | | | | |
| 75-84 | 11.9 | - | - | 27.1 | 17.5 | 18.6 | 10.0 | 5.1 | 5.0 | 7.0 | 10.9 | - | | | | | | |
| 85+ | 22.5 | - | 162.3 | 64.4 | 39.6 | 11.7 | 33.2 | - | - | 13.7 | 16.7 | - | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 3. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of New Primary Sites of Cancer by ICD-9 3-digit Diagnosis, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 3. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de nouveaux sièges primaires de cancer selon le diagnostic de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Mfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. | | | | | | |
|--|----------------|--------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|
| | T.-N. f.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | | | | | | | | |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 Monocytic leukemia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 Leucémie monocytaire | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.2 | - | - | 0.4 | - | 0.2 | 0.1 | - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - | | | | | | |
| Crude/Brut | 0.2 | - | - | 0.4 | - | 0.3 | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | | | | | | |
| 0-24 | -- | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 25-34 | -- | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 35-44 | -- | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 55-64 | 0.4 | - | - | 2.6 | - | 0.3 | 0.4 | - | 2.3 | - | - | - | | | | | | |
| 65-74 | 0.6 | - | - | 2.8 | - | 0.4 | 0.3 | - | - | 1.4 | 1.5 | - | | | | | | |
| 75-84 | 1.0 | - | - | - | - | 1.4 | 0.9 | - | - | 2.5 | 1.3 | - | | | | | | |
| 85+ | 3.1 | - | - | - | - | 11.7 | 1.3 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 207 Other specified leukemia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 Autres leucémies précisées | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.2 | 0.4 | - | - | - | 0.5 | 0.1 | - | - | 0.2 | - | - | | | | | | |
| Crude/Brut | 0.2 | 0.3 | - | - | - | 0.6 | 0.1 | - | - | 0.2 | - | - | | | | | | |
| 0-24 | -- | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 25-34 | 0.1 | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 35-44 | -- | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 45-54 | 0.3 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | 0.8 | - | - | | | | | | |
| 55-64 | 0.2 | - | - | - | - | 0.3 | 0.4 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 65-74 | 0.3 | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 75-84 | 1.4 | 10.1 | - | - | - | 3.4 | 0.5 | - | - | 2.5 | - | - | | | | | | |
| 85+ | 2.1 | - | - | - | - | 7.0 | 1.3 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 208 Leukemia of unspecified cell type | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 Leucémie à cellules non précisées | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 2.1 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | - | | | | | | |
| Crude/Brut | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | - | | | | | | |
| 0-24 | 0.1 | - | - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 25-34 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.3 | - | | | | | | |
| 35-44 | 0.4 | - | - | 1.4 | - | 0.5 | 0.1 | - | - | 1.0 | 0.4 | - | | | | | | |
| 45-54 | 0.6 | - | - | 2.2 | - | 1.0 | 0.6 | - | 2.2 | - | - | - | | | | | | |
| 55-64 | 1.0 | 4.8 | - | 2.6 | - | 2.1 | 0.4 | - | - | 1.1 | - | - | | | | | | |
| 65-74 | 3.6 | - | - | 8.4 | 3.6 | 5.7 | 1.8 | - | 4.8 | 2.8 | 5.2 | - | | | | | | |
| 75-84 | 8.2 | 10.1 | - | 9.2 | 12.0 | 8.9 | 8.3 | 10.5 | 7.4 | 4.9 | 6.5 | - | | | | | | |
| 85+ | 13.6 | - | 76.8 | 27.2 | 35.2 | 16.3 | 13.3 | 9.9 | - | 7.5 | 8.3 | - | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.M.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 4. New Primary Sites of Carcinoma in Situ by ICD-9 Diagnosis and Sex, Canada and Provinces, 1990 (1)
 TABLEAU 4. Nouveaux sièges primaires de carcinome in situ selon le diagnostic de la CIM-9 et le sexe,
 Canada et provinces, 1990 (1)

| | Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | N.W.T. |
|--|--------|---|-------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|---------------|--------|
| | | Nfld. T.-N. | P.E.I. I.-P.-É | N.S. N.-É. | N.B. N.-B. | Qué. Q. | Ont. O. | Man. M. | Sask. S. | Alta. A. | B.C. C.-B. | |
| Number of cases - Nombre de cas | | | | | | | | | | | | |
| 230 to 234 Carcinoma in situ | | | | | | | | | | | | |
| 230 à 234 Carcinome in situ | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | 1,421 | 46 | 2 | 80 | 63 | 223 | - | 124 | 86 | 204 | 588 | 4 |
| Females - Femmes | 5,496 | 155 | 24 | 328 | 134 | 1,267 | - | 510 | 160 | 1,457 | 1,436 | 9 |
| 230 Carcinoma in situ of digestive organs | | | | | | | | | | | | |
| 230 Carcinome in situ de l'appareil digestif | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | 246 | 5 | - | 8 | 6 | 64 | - | 38 | 21 | 28 | 74 | 2 |
| Females - Femmes | 167 | 3 | 1 | 6 | 8 | 52 | - | 18 | 14 | 16 | 49 | - |
| 230.0 Lip, oral cavity and pharynx | | | | | | | | | | | | |
| 230.0 Lèvre, cavité buccale et pharynx | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | 42 | 1 | - | 3 | - | 10 | - | 5 | 6 | 4 | 13 | - |
| Females - Femmes | 16 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 7 | - |
| 230.1 Esophagus | | | | | | | | | | | | |
| 230.1 Oesophage | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
| Females - Femmes | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
| 230.2 Stomach | | | | | | | | | | | | |
| 230.2 Estomac | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | 6 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - |
| Females - Femmes | 5 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| 230.3 Colon | | | | | | | | | | | | |
| 230.3 Côlon | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | 95 | 1 | - | 2 | 5 | 24 | - | 21 | 10 | 8 | 23 | 1 |
| Females - Femmes | 76 | 2 | - | 3 | 5 | 25 | - | 7 | 8 | 7 | 19 | - |
| 230.4 Rectum | | | | | | | | | | | | |
| 230.4 Recte | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | 81 | 1 | - | 3 | 1 | 21 | - | 10 | 5 | 9 | 30 | 1 |
| Females - Femmes | 49 | 1 | - | 3 | 1 | 14 | - | 6 | 3 | 3 | 18 | - |
| 230.5 Anal canal | | | | | | | | | | | | |
| 230.5 Canal anal | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Females - Femmes | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 230.6 Anus, unspecified | | | | | | | | | | | | |
| 230.6 Anus, sans précision | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | 5 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - |
| Females - Femmes | 7 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 2 | - |
| 230.7 Other and unspecified part, intestine | | | | | | | | | | | | |
| 230.7 Partie autre non précisée, intestin | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| Females - Femmes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 230.8 Liver and biliary system | | | | | | | | | | | | |
| 230.8 Foie et voies biliaires | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - |
| Females - Femmes | 8 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - |
| 230.9 Other and unspecified part, other and non specified | | | | | | | | | | | | |
| 230.9 Parties autres et non précisées | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Females - Femmes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 231 Carcinoma in situ of respiratory system | | | | | | | | | | | | |
| 231 Carcinome in situ de l'appareil respiratoire | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | 77 | 7 | - | 4 | 3 | 30 | - | 3 | 2 | 7 | 21 | - |
| Females - Femmes | 14 | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | 3 | 7 | - |
| 231.0 Larynx | | | | | | | | | | | | |
| 231.0 Larynx | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | 57 | 4 | - | 4 | 3 | 20 | - | 3 | 2 | 5 | 16 | - |
| Females - Femmes | 7 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | 1 | - |

(1) Ontario does not report data for carcinoma in situ.

(1) L'Ontario ne déclare aucune donnée sur le carcinome in situ.

TABLE 4. New Primary Sites of Carcinoma in Situ by ICD-9 Diagnosis and Sex, Canada and Provinces, 1990 (1)
 TABLEAU 4. Nouveaux sièges primaires de carcinome in situ selon le diagnostic de la CIM-9 et le sexe,
 Canada et provinces, 1990 (1)

| | Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | N.W.T. |
|---|--------|---|--------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|---------|
| | | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | |
| | | T.-N. T.-P.-É | N.-É. | N.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | T.N.-O. |
| Number of cases - Nombre de cas | | | | | | | | | | | | |
| 231.1 Trachea | | | | | | | | | | | | |
| 231.1 Trachée | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Females - Femmes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 231.2 Bronchus and lung | | | | | | | | | | | | |
| 231.2 Bronches et poumon | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | 14 | 2 | - | - | - | 8 | - | - | - | 1 | 3 | - |
| Females - Femmes | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - |
| 231.8 Other specified parts | | | | | | | | | | | | |
| 231.8 Autres parties | | | | | | | | | | | | |
| précisées | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | 4 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| Females - Femmes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 231.9 Part unspecified | | | | | | | | | | | | |
| 231.9 Sans précision | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Females - Femmes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 232 Carcinoma in situ of skin | | | | | | | | | | | | |
| 232 Carcinome in situ de la peau | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | 684 | 25 | 1 | 61 | 49 | 57 | - | 70 | 55 | 148 | 216 | 1 |
| Females - Femmes | 669 | 20 | 5 | 78 | 40 | 47 | - | 76 | 61 | 145 | 196 | 1 |
| 232.0 Skin of lip | | | | | | | | | | | | |
| 232.0 Face cutanée des lèvres | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | 14 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - |
| Females - Femmes | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - |
| 232.1 Eyelid, including canthus | | | | | | | | | | | | |
| 232.1 Paupières, y compris canthus | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | 17 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 3 | 5 | - |
| Females - Femmes | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | - |
| 232.2 Ear and external auricular canal | | | | | | | | | | | | |
| 232.2 Oreille et conduit auditif externe | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | 87 | 4 | - | 7 | 5 | 6 | - | 6 | 7 | 25 | 27 | - |
| Females - Femmes | 6 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | - |
| 232.3 Other and unspecified parts of face | | | | | | | | | | | | |
| 232.3 Autres et non précisées de la face | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | 210 | 5 | - | 19 | 16 | 14 | - | 27 | 20 | 51 | 57 | 1 |
| Females - Femmes | 260 | 8 | - | 29 | 20 | 12 | - | 43 | 27 | 64 | 57 | - |
| 232.4 Scalp and skin of neck | | | | | | | | | | | | |
| 232.4 Cuir chevelu et peau du cou | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | 49 | 1 | - | 3 | 4 | 5 | - | 4 | 2 | 15 | 15 | - |
| Females - Femmes | 30 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 15 | - |
| 232.5 Trunk, except scrotum | | | | | | | | | | | | |
| 232.5 Tronc, à l'exception du scrotum | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | 115 | 2 | 1 | 12 | 7 | 10 | - | 11 | 5 | 24 | 43 | - |
| Females - Femmes | 104 | 2 | 2 | 10 | 5 | 16 | - | 9 | 9 | 17 | 34 | - |
| 232.6 Upper limb, including shoulder | | | | | | | | | | | | |
| 232.6 Membre supérieur, y compris épaule | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | 118 | 5 | - | 10 | 12 | 9 | - | 8 | 15 | 24 | 34 | - |
| Females - Femmes | 105 | 6 | 1 | 21 | 5 | 7 | - | 3 | 9 | 26 | 26 | 1 |

(1) Ontario does not report data for carcinoma in situ.
 (1) L'Ontario ne déclare aucune donnée sur le carcinome in situ.

TABLE 4. New Primary Sites of Carcinoma in Situ by ICD-9 Diagnosis and Sex, Canada and Provinces, 1990 (1)
 TABLEAU 4. Nouveaux sièges primaires de carcinome in situ selon le diagnostic de la CIM-9 et le sexe,
 Canada et provinces, 1990 (1)

| | Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | B.C. | N.W.T. |
|--|--------|---|----------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|---------|--------|
| | | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | Yukon | | |
| | | T.-N. | I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | | | | | Alb. | C.-B. | T.N.-O. | |
| | | Number of cases - Nombre de cas | | | | | | | | | | | |
| 232.7 Lower limb, including hip | | | | | | | | | | | | | |
| 232.7 Membre inférieur, y compris hanche | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | 51 | 3 | - | 7 | 2 | 9 | - | 7 | 6 | 4 | 15 | - | - |
| Females - Femmes | 133 | 4 | 1 | 15 | 6 | 8 | - | 15 | 9 | 27 | 48 | - | - |
| 232.8 Other specified sites | | | | | | | | | | | | | |
| 232.8 Autres sièges précisés | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Females - Femmes | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 232.9 Site unspecified | | | | | | | | | | | | | |
| 232.9 Siège non précisé | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | 20 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 16 | - | - |
| Females - Femmes | 16 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 11 | - | - |
| 233 Carcinoma in situ of breast and genitourinary system | | | | | | | | | | | | | |
| 233 Carcinome in situ du sein et de l'appareil génito-urinaire | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | 402 | 9 | 1 | 6 | 4 | 64 | - | 13 | 6 | 21 | 277 | 1 | - |
| Females - Femmes | 4,640 | 132 | 18 | 244 | 86 | 1,162 | - | 414 | 85 | 1,291 | 1,184 | 9 | 15 |
| 233.0 Breast | | | | | | | | | | | | | |
| 233.0 Sein | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Females - Femmes | 577 | 9 | 4 | 32 | 18 | 179 | - | 36 | 43 | 84 | 171 | - | 1 |
| 233.1 Cervix uteri | | | | | | | | | | | | | |
| 233.1 Col de l'utérus | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Females - Femmes | 3,619 | 114 | 14 | 195 | 64 | 815 | - | 355 | 32 | 1,160 | 847 | 9 | 14 |
| 233.2 Other and unspecified part of uterus | | | | | | | | | | | | | |
| 233.2 Partie autre et non précisée, utérus | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Females - Femmes | 63 | 1 | - | 2 | 2 | 25 | - | 5 | 6 | 2 | 20 | - | - |
| 233.3 Female genital organs other and NOS | | | | | | | | | | | | | |
| 233.3 Organes génitaux féminins autres SAI | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Females - Femmes | 266 | 5 | - | 15 | 1 | 121 | - | 17 | 3 | 39 | 65 | - | - |
| 233.4 Prostate | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | 30 | - | - | 1 | - | 15 | - | 2 | - | 2 | 10 | - | - |
| Females - Femmes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 233.5 Penis | | | | | | | | | | | | | |
| 233.5 Pénis | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | 29 | - | - | 2 | 2 | 7 | - | 1 | 2 | 7 | 8 | - | - |
| Females - Femmes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 233.6 Male genital organs other and NOS | | | | | | | | | | | | | |
| 233.6 Organes génitaux masculins autres SAI | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Females - Femmes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 233.7 Bladder | | | | | | | | | | | | | |
| 233.7 Vessie | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | 321 | 7 | 1 | 3 | 1 | 40 | - | 8 | 6 | 11 | 245 | 1 | - |
| Females - Femmes | 100 | 3 | - | - | - | 19 | - | - | 1 | 4 | 73 | - | - |
| 233.9 Other and unspecified urinary organs | | | | | | | | | | | | | |
| 233.9 Organes urinaires autres ou SAI | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | 16 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 13 | - | - |
| Females - Femmes | 15 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 2 | 8 | - |

(1) Ontario does not report data for carcinoma in situ.

(1) L'Ontario ne déclare aucune donnée sur le carcinome in situ.

TABLE 4. New Primary Sites of Carcinoma in Situ by ICD-9 Diagnosis and Sex, Canada and Provinces, 1990 (1)
 TABLEAU 4. Nouveaux sièges primaires de carcinome in situ selon le diagnostic de la CIM-9 et le sexe,
 Canada et provinces, 1990 (1)

| | Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | N.W.T. | |
|---------------------------------|---|---|--------|-------|------|------|------|------|-------|-------|--------|---------|
| | | Nfld. | P.E.I. | M.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | | |
| | | T.-N. I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | T.N.-O. |
| Number of cases - Nombre de cas | | | | | | | | | | | | |
| 234 | Carcinoma in situ of other and unspecified sites | | | | | | | | | | | |
| 234 | Carcinome in situ des sièges autres et non précisés | | | | | | | | | | | |
| | Males - Hommes | 12 | - | - | 1 | 1 | 8 | - | - | 2 | - | |
| | Females - Femmes | 6 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | |
| 234.0 | Eye | | | | | | | | | | | |
| 234.0 | Oeil | | | | | | | | | | | |
| | Males - Hommes | 9 | - | - | 1 | 1 | 5 | - | - | 2 | - | |
| | Females - Femmes | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | |
| 234.8 | Other specified sites | | | | | | | | | | | |
| 234.8 | Autres sièges précisés | | | | | | | | | | | |
| | Males - Hommes | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| | Females - Femmes | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | |
| 234.9 | Site unspecified | | | | | | | | | | | |
| 234.9 | Siège non précisé | | | | | | | | | | | |
| | Males - Hommes | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | Females - Femmes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

(1) Ontario does not report data for carcinoma in situ.
 (1) L'Ontario ne déclare aucune donnée sur le carcinome in situ.

TABLE 5. New Primary Sites of "Other Skin Cancer" (ICD-9 173) by Sex and Age Group,
Canada and Provinces, 1990 (1,2)TABLEAU 5. Nouveaux sièges primaires des "autres cancers de la peau" (CIM-9 173) selon le sexe et le groupe d'âge,
Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | N.W.T. T.N.-O. | |
|---------------------------------|---|--------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------------|--|
| | Nfld. T.-N. | P.E.I. I.-P.-É. | N.S. N.-É. | N.B. N.-B. | Qué. Québec | Ont. Ontario | Man. Manitoba | Sask. Saskatchewan | Alta. Alberta | B.C. Colombie-Britannique | | |
| Number of cases - Nombre de cas | | | | | | | | | | | | |
| Both sexes | | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| Total | 12,597 | 450 | 236 | 1,521 | 895 | 1,861 | - | 1,593 | 1,336 | 2,917 | 1,767 | |
| 0-4 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 5-9 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 10-14 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | |
| 15-19 | 10 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| 20-24 | 30 | 2 | - | 2 | - | 7 | - | 2 | 2 | 9 | 6 | |
| 25-29 | 107 | 4 | 1 | 9 | 6 | 20 | - | 9 | 5 | 34 | 18 | |
| 30-34 | 235 | 7 | 5 | 15 | 16 | 49 | - | 28 | 17 | 64 | 32 | |
| 35-39 | 403 | 8 | 6 | 39 | 22 | 81 | - | 36 | 20 | 121 | 67 | |
| 40-44 | 580 | 17 | 14 | 56 | 30 | 102 | - | 65 | 45 | 165 | 83 | |
| 45-49 | 667 | 16 | 12 | 93 | 44 | 113 | - | 64 | 42 | 190 | 92 | |
| 50-54 | 750 | 31 | 10 | 79 | 54 | 99 | - | 83 | 58 | 226 | 109 | |
| 55-59 | 969 | 34 | 21 | 120 | 66 | 131 | - | 98 | 99 | 274 | 125 | |
| 60-64 | 1,363 | 53 | 24 | 162 | 96 | 177 | - | 174 | 135 | 338 | 200 | |
| 65-69 | 1,664 | 63 | 20 | 223 | 123 | 233 | - | 223 | 183 | 347 | 247 | |
| 70-74 | 1,773 | 73 | 35 | 246 | 135 | 226 | - | 231 | 221 | 362 | 244 | |
| 75-79 | 1,673 | 61 | 39 | 205 | 130 | 221 | - | 235 | 198 | 327 | 256 | |
| 80-84 | 1,216 | 39 | 25 | 124 | 89 | 213 | - | 178 | 171 | 232 | 144 | |
| 85+ | 1,144 | 41 | 24 | 146 | 78 | 185 | - | 165 | 139 | 222 | 143 | |
| N.S./N.P. | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | |
| Males | | | | | | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | | | | | | |
| Total | 7,089 | 242 | 132 | 868 | 512 | 1,068 | - | 876 | 761 | 1,601 | 1,017 | |
| 0-4 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 5-9 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 10-14 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 15-19 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 20-24 | 13 | - | - | - | - | 6 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 25-29 | 64 | 3 | - | 5 | 4 | 16 | - | 4 | 3 | 19 | 10 | |
| 30-34 | 127 | 3 | 2 | 9 | 10 | 37 | - | 13 | 4 | 29 | 19 | |
| 35-39 | 207 | - | 3 | 16 | 14 | 53 | - | 10 | 8 | 64 | 39 | |
| 40-44 | 315 | 7 | 10 | 27 | 17 | 62 | - | 31 | 26 | 82 | 50 | |
| 45-49 | 377 | 10 | 6 | 55 | 30 | 70 | - | 40 | 20 | 98 | 48 | |
| 50-54 | 412 | 19 | 5 | 48 | 30 | 44 | - | 41 | 36 | 135 | 54 | |
| 55-59 | 600 | 17 | 11 | 85 | 38 | 72 | - | 52 | 68 | 169 | 87 | |
| 60-64 | 807 | 35 | 13 | 88 | 54 | 109 | - | 112 | 91 | 185 | 117 | |
| 65-69 | 1,010 | 34 | 13 | 135 | 69 | 151 | - | 137 | 110 | 208 | 151 | |
| 70-74 | 1,037 | 44 | 18 | 146 | 80 | 127 | - | 132 | 132 | 211 | 147 | |
| 75-79 | 965 | 36 | 25 | 120 | 70 | 126 | - | 129 | 120 | 185 | 153 | |
| 80-84 | 632 | 16 | 14 | 64 | 60 | 100 | - | 96 | 86 | 126 | 70 | |
| 85+ | 514 | 18 | 12 | 69 | 32 | 92 | - | 77 | 56 | 88 | 69 | |
| N.S./N.P. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Females | | | | | | | | | | | | |
| Femmes | | | | | | | | | | | | |
| Total | 5,508 | 208 | 104 | 653 | 383 | 793 | - | 717 | 575 | 1,316 | 750 | |
| 0-4 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 5-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10-14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| 15-19 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| 20-24 | 17 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 7 | 3 | |
| 25-29 | 43 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | 5 | 2 | 15 | 8 | |
| 30-34 | 108 | 4 | 3 | 6 | 6 | 12 | - | 15 | 13 | 35 | 13 | |
| 35-39 | 196 | 8 | 3 | 23 | 8 | 28 | - | 26 | 12 | 57 | 28 | |
| 40-44 | 265 | 10 | 4 | 29 | 13 | 40 | - | 34 | 19 | 83 | 33 | |
| 45-49 | 290 | 6 | 6 | 38 | 14 | 63 | - | 24 | 22 | 92 | 44 | |
| 50-54 | 338 | 12 | 5 | 31 | 24 | 55 | - | 42 | 22 | 91 | 55 | |
| 55-59 | 369 | 17 | 10 | 35 | 28 | 59 | - | 46 | 31 | 105 | 38 | |
| 60-64 | 556 | 18 | 11 | 74 | 42 | 68 | - | 62 | 44 | 153 | 83 | |
| 65-69 | 654 | 29 | 7 | 88 | 54 | 82 | - | 86 | 73 | 139 | 96 | |
| 70-74 | 736 | 29 | 17 | 100 | 55 | 99 | - | 99 | 89 | 151 | 97 | |
| 75-79 | 708 | 25 | 14 | 85 | 60 | 95 | - | 106 | 78 | 142 | 103 | |
| 80-84 | 584 | 23 | 11 | 60 | 29 | 113 | - | 82 | 85 | 106 | 74 | |
| 85+ | 630 | 23 | 12 | 77 | 46 | 93 | - | 88 | 83 | 134 | 74 | |
| N.S./N.P. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | |

(1) Canada total excludes Ontario, which does not report data for "other skin cancer" (ICD-9 173).
(1) Le total du Canada ne comprend pas l'Ontario, qui ne déclare aucune donnée sur les "autres cancers de la peau" (CIM-9 173).

(2) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(2) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

TABLE 5. New Primary Sites of "Other Skin Cancer" (ICD-9 173) by Sex and Age Group,

Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 5. Nouveaux sièges primaires des "autres cancers de la peau" (CIM-9 173) selon le sexe et le groupe d'âge,

Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Nfld. | P.E.I. | Province of residence - Province de résidence | | | | | | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. | |
|--------------------------------------|-------|---------|---|---------------|---------------|-------|------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|
| | | | N.S. T.-M. I.-P.-É. | N.B. N.-É. | Qué. N.-B. | Ont. | Man. | Sask. | | | | | |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | |
| Both sexes | | | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 72.2 | 77.7 | 180.1 | 166.7 | 120.5 | 26.5 | - | 143.7 | 132.2 | 114.1 | 53.5 | 3.6 | 33.7 |
| 0-4 | 0.4 | - | - | - | 8.1 | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - |
| 5-9 | 0.1 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-14 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 1.1 | - | - | - |
| 15-19 | 0.8 | 1.8 | - | 2.9 | 1.7 | 0.6 | - | 1.2 | 1.3 | 0.6 | - | - | - |
| 20-24 | 2.3 | 3.9 | - | 2.8 | - | 1.3 | - | 2.4 | 2.8 | 4.4 | 2.5 | - | - |
| 25-29 | 6.7 | 8.0 | 9.1 | 10.8 | 9.0 | 3.0 | - | 9.1 | 5.9 | 13.4 | 6.2 | - | 15.2 |
| 30-34 | 14.6 | 14.3 | 47.0 | 18.6 | 24.8 | 7.4 | - | 29.7 | 20.1 | 24.7 | 10.7 | - | 34.7 |
| 35-39 | 27.7 | 16.9 | 61.3 | 53.9 | 36.3 | 13.6 | - | 42.2 | 26.6 | 55.0 | 24.1 | - | 64.5 |
| 40-44 | 44.8 | 40.0 | 146.9 | 83.9 | 54.1 | 18.8 | - | 86.1 | 72.4 | 91.1 | 32.6 | - | 78.9 |
| 45-49 | 66.1 | 52.3 | 176.7 | 182.3 | 107.0 | 25.6 | - | 110.1 | 86.8 | 141.6 | 47.3 | - | 40.1 |
| 50-54 | 92.7 | 126.6 | 168.5 | 188.5 | 164.3 | 28.7 | - | 171.7 | 135.8 | 209.7 | 69.7 | - | 53.9 |
| 55-59 | 125.9 | 154.7 | 381.3 | 305.3 | 215.0 | 39.5 | - | 209.3 | 228.7 | 275.9 | 85.9 | - | 69.3 |
| 60-64 | 186.8 | 260.3 | 466.1 | 440.4 | 326.0 | 56.9 | - | 372.6 | 309.7 | 378.9 | 137.4 | - | 415.8 |
| 65-69 | 252.5 | 355.2 | 404.5 | 629.4 | 434.9 | 86.8 | - | 486.5 | 439.6 | 454.5 | 177.3 | - | 319.0 |
| 70-74 | 349.5 | 481.5 | 809.2 | 820.0 | 592.9 | 115.2 | - | 629.0 | 613.8 | 626.7 | 226.6 | - | - |
| 75-79 | 434.8 | 542.2 | 1,085.1 | 895.1 | 742.6 | 152.9 | - | 790.4 | 686.5 | 762.8 | 308.0 | - | 346.0 |
| 80-84 | 526.6 | 650.3 | 1,127.1 | 911.8 | 838.8 | 245.6 | - | 967.1 | 954.3 | 869.4 | 296.8 | 1,063.8 | - |
| 85+ | 669.2 | 963.3 | 1,251.3 | 1,396.3 | 950.2 | 308.5 | - | 1,116.8 | 967.4 | 1,072.7 | 396.5 | - | 735.3 |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Males | | | | | | | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 81.8 | 83.3 | 203.3 | 192.4 | 138.9 | 30.9 | - | 159.2 | 150.9 | 124.1 | 61.9 | - | 38.6 |
| 0-4 | 0.5 | - | - | - | 11.9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5-9 | 0.2 | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-14 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - |
| 15-19 | 0.5 | - | - | 2.8 | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20-24 | 1.9 | - | - | - | - | 2.2 | - | 2.3 | 2.8 | 1.9 | 2.5 | - | - |
| 25-29 | 7.9 | 12.1 | - | 11.8 | 12.0 | 4.8 | - | 7.9 | 7.0 | 14.8 | 6.8 | - | - |
| 30-34 | 15.6 | 12.4 | 38.2 | 22.3 | 30.8 | 11.1 | - | 26.9 | 9.3 | 21.8 | 12.7 | - | 32.7 |
| 35-39 | 28.3 | - | 61.3 | 44.6 | 46.3 | 17.7 | - | 23.4 | 20.7 | 56.4 | 27.9 | - | - |
| 40-44 | 48.0 | 32.5 | 208.2 | 80.4 | 60.1 | 22.8 | - | 81.3 | 81.6 | 88.3 | 38.5 | - | 141.8 |
| 45-49 | 73.9 | 64.0 | 174.4 | 212.9 | 142.3 | 31.8 | - | 136.2 | 81.9 | 142.7 | 48.3 | - | - |
| 50-54 | 101.3 | 151.4 | 167.1 | 227.6 | 180.8 | 25.8 | - | 168.9 | 168.0 | 244.6 | 67.4 | - | - |
| 55-59 | 156.5 | 150.5 | 394.5 | 458.2 | 252.2 | 44.7 | - | 223.2 | 313.5 | 331.4 | 113.8 | - | 124.4 |
| 60-64 | 229.3 | 344.9 | 508.6 | 503.3 | 385.6 | 74.5 | - | 497.3 | 425.2 | 414.1 | 162.7 | - | 548.4 |
| 65-69 | 334.4 | 390.3 | 560.6 | 825.4 | 529.3 | 125.8 | - | 661.3 | 556.6 | 580.3 | 233.8 | - | 571.4 |
| 70-74 | 468.9 | 619.7 | 929.3 | 1,103.8 | 785.9 | 154.4 | - | 809.8 | 806.5 | 815.3 | 309.1 | - | - |
| 75-79 | 610.8 | 731.6 | 1,648.0 | 1,260.9 | 948.4 | 225.2 | - | 1,036.4 | 964.6 | 1,022.8 | 431.2 | - | 653.6 |
| 80-84 | 725.6 | 659.3 | 1,569.5 | 1,215.3 | 1,493.7 | 334.8 | - | 1,359.8 | 1,166.7 | 1,181.3 | 360.6 | - | - |
| 85+ | 949.3 | 1,256.1 | 1,948.1 | 2,221.5 | 1,266.3 | 536.7 | - | 1,643.2 | 1,052.6 | 1,209.0 | 577.2 | - | 1,754.4 |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Females | | | | | | | | | | | | | |
| Femmes | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 62.7 | 72.1 | 157.3 | 141.5 | 102.3 | 22.3 | - | 128.4 | 113.6 | 103.9 | 45.3 | 7.5 | 28.3 |
| 0-4 | 0.3 | - | - | - | 4.2 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - |
| 5-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-14 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | - | - | - |
| 15-19 | 1.2 | 3.7 | - | 3.0 | 3.4 | 0.4 | - | 2.5 | 2.7 | 1.1 | - | - | - |
| 20-24 | 2.6 | 8.0 | - | 5.7 | - | 0.4 | - | 2.4 | 2.9 | 6.9 | 2.5 | - | - |
| 25-29 | 5.5 | 4.0 | 18.4 | 9.7 | 6.1 | 1.2 | - | 10.4 | 4.8 | 12.0 | 5.6 | - | 31.1 |
| 30-34 | 13.6 | 16.2 | 55.6 | 15.0 | 18.7 | 3.7 | - | 32.6 | 31.4 | 27.9 | 8.7 | - | 37.0 |
| 35-39 | 27.2 | 33.9 | 61.2 | 63.1 | 26.3 | 9.4 | - | 61.0 | 32.9 | 53.4 | 20.2 | - | 141.1 |
| 40-44 | 41.4 | 47.9 | 84.6 | 87.4 | 47.8 | 14.8 | - | 90.9 | 62.8 | 93.9 | 26.4 | - | - |
| 45-49 | 58.1 | 60.0 | 179.1 | 150.8 | 69.8 | 19.5 | - | 83.4 | 91.8 | 140.4 | 46.3 | - | 90.2 |
| 50-54 | 84.0 | 100.5 | 169.9 | 148.9 | 147.5 | 31.5 | - | 174.5 | 103.4 | 173.1 | 72.1 | - | 120.0 |
| 55-59 | 95.5 | 159.1 | 367.8 | 175.8 | 179.2 | 34.6 | - | 195.6 | 143.5 | 217.3 | 52.4 | - | - |
| 60-64 | 147.2 | 176.2 | 424.2 | 385.5 | 272.0 | 41.2 | - | 256.4 | 198.3 | 343.7 | 112.6 | - | 241.0 |
| 65-69 | 183.2 | 321.3 | 266.7 | 462.2 | 354.1 | 55.3 | - | 342.3 | 333.8 | 343.1 | 128.5 | - | - |
| 70-74 | 257.2 | 359.8 | 711.9 | 596.2 | 436.9 | 86.9 | - | 484.7 | 453.2 | 473.7 | 161.4 | - | - |
| 75-79 | 312.2 | 395.0 | 674.0 | 635.0 | 592.7 | 107.3 | - | 613.2 | 475.6 | 573.0 | 216.2 | - | - |
| 80-84 | 406.1 | 644.3 | 829.6 | 720.0 | 439.8 | 198.8 | - | 722.8 | 805.8 | 661.1 | 254.3 | 2,083.3 | - |
| 85+ | 539.4 | 814.7 | 921.7 | 1,047.6 | 809.6 | 217.0 | - | 872.3 | 917.2 | 998.7 | 306.9 | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) Canada total excludes Ontario, which does not report data for "other skin cancer" (ICD-9 173).

(1) Le total du Canada ne comprend pas l'Ontario, qui ne déclare aucune donnée sur les "autres cancers de la peau" (CIM-9 173).

(2) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(2) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

TABLE 6. New Primary Sites of Carcinoma In Situ of Cervix Uteri and Cancer of Cervix Uteri by ICD-9 Diagnosis, Canada and Provinces, 1990 (1,2,3)
 TABLEAU 6. Nouveaux sièges primaires de carcinome in situ du col de l'utérus et cancer du col de l'utérus selon le diagnostic de la CIM-9, Canada et provinces, 1990 (1,2,3)

| | Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | | N.W.T. |
|--|--------|---|--------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | |
| | | T.-N. I.-P.-E. | N.-É. | N.-B. | | | | | | | | | |
| Number of cases Nombre de cas | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 4,508 | 148 | 22 | 264 | 100 | 1,136 | - | 415 | 89 | 1,299 | 1,005 | 11 | 19 |
| 233.1 Carcinoma in situ of cervix uteri | | | | | | | | | | | | | |
| 233.1 Carcinoma in situ du col de l'utérus | 3,619 | 114 | 14 | 195 | 64 | 815 | - | 355 | 32 | 1,160 | 847 | 9 | 14 |
| 180 Malignant neoplasm of cervix uteri | | | | | | | | | | | | | |
| 180 Tumeur maligne du col de l'utérus | 889 | 34 | 8 | 69 | 36 | 321 | - | 60 | 57 | 139 | 158 | 2 | 5 |
| Rate per 100,000 females Taux pour 100 000 femmes | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 51.3 | 51.3 | 33.3 | 57.2 | 26.7 | 31.9 | - | 74.3 | 17.6 | 102.6 | 60.6 | 82.4 | 67.2 |
| 233.1 Carcinoma in situ of cervix uteri | | | | | | | | | | | | | |
| 233.1 Carcinoma in situ du col de l'utérus | 41.2 | 39.5 | 21.2 | 42.3 | 17.1 | 22.9 | - | 63.6 | 6.3 | 91.6 | 51.1 | 67.5 | 49.5 |
| 180 Malignant neoplasm of cervix uteri | | | | | | | | | | | | | |
| 180 Tumeur maligne du col de l'utérus | 10.1 | 11.8 | 12.1 | 15.0 | 9.6 | 9.0 | - | 10.7 | 11.3 | 11.0 | 9.5 | 15.0 | 17.7 |

(1) Canada total excludes Ontario, which does not report data for carcinoma in situ.

(1) Le total du Canada ne comprend pas l'Ontario, qui ne déclare aucune donnée sur le carcinome in situ.

(2) Ontario data for ICD-9 180 may be found in Tables 2 and 5.

(2) On trouvera les données de l'Ontario pour la CIM-9 180 aux tableaux 2 et 3.

(3) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(3) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

TABLE 7. New Primary Sites of Carcinoma In Situ of Cervix Uteri and Cancer of Cervix Uteri by ICD-9 Diagnosis and Age Group, Canada, 1990 (1)
 TABLEAU 7. Nouveaux sièges primaires de carcinome in situ du col de l'utérus et cancer du col de l'utérus selon le diagnostic de la CIM-9 et le groupe d'âge, Canada, 1990 (1)

| | Total | 0-24 | 25-34 | 35-44 | Age group - Groupe d'âge | | | | | | 85+ N.S./N.P. | |
|--|-------|------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|---|---------------|--|
| | | | | | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+ | | | |
| Number of cases Nombre de cas | | | | | | | | | | | | |
| Total | 4,508 | 570 | 1,964 | 1,054 | 359 | 231 | 198 | 108 | 23 | 1 | | |
| 233.1 Carcinoma in situ of cervix uteri | | | | | | | | | | | | |
| 233.1 Carcinoma in situ du col de l'utérus | 3,619 | 564 | 1,781 | 834 | 236 | 125 | 64 | 12 | 2 | 1 | | |
| 180 Malignant neoplasm of cervix uteri | | | | | | | | | | | | |
| 180 Tumeur maligne du col de l'utérus | 889 | 6 | 183 | 220 | 123 | 106 | 134 | 96 | 21 | - | | |
| Rate per 100,000 females Taux pour 100 000 femmes | | | | | | | | | | | | |
| Total | 51.3 | 18.8 | 124.0 | 77.4 | 39.8 | 30.2 | 30.8 | 29.1 | 19.7 | - | | |
| 233.1 Carcinoma in situ of cervix uteri | | | | | | | | | | | | |
| 233.1 Carcinoma in situ du col de l'utérus | 41.2 | 18.6 | 112.4 | 61.3 | 26.2 | 16.4 | 10.0 | 3.2 | 1.7 | - | | |
| 180 Malignant neoplasm of cervix uteri | | | | | | | | | | | | |
| 180 Tumeur maligne du col de l'utérus | 10.1 | 0.2 | 11.6 | 16.2 | 13.6 | 13.9 | 20.8 | 25.9 | 18.0 | - | | |

(1) Canada total excludes Ontario, which does not report data for carcinoma in situ.

(1) Le total du Canada ne comprend pas l'Ontario, qui ne déclare aucune donnée sur le carcinome in situ.

TABLE 8. New Primary Sites of Cancer by Most Confirmed Method of Diagnosis and Sex,
Canada and Provinces, 1990 (1,2,3)TABLEAU 8. Nouveaux sièges primaires de cancer suivant la méthode de diagnostic la plus éprouvée et le sexe,
Canada et provinces, 1990 (1,2,3)

| | Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. T.N.-O. |
|--|---------|---|--------|---------------------------|---------------|---------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------------------|
| | | Nfld. | P.E.I. | N.S. T.-N. I.-P.-É. | N.B. N.-É. | Qué. N.-B. | Ont. | Man. | Sask. | Alb. | | | | | |
| Number of cases Nombre de cas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Both sexes | | | | | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | | | | |
| All cases | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tous les cas | 104,653 | 1,575 | 562 | 3,912 | 2,832 | 26,587 | 39,887 | 4,549 | 4,229 | 7,346 | 13,027 | 41 | 106 | | |
| Microscopic | | | | | | | | | | | | | | | |
| Microscopique | 88,671 | 1,523 | 518 | 3,456 | 2,563 | 19,518 | 34,573 | 3,622 | 3,847 | 6,855 | 12,062 | 40 | 94 | | |
| Radiological | | | | | | | | | | | | | | | |
| Radiologique | 3,695 | 37 | 23 | 85 | 229 | 1,776 | 155 | 768 | 161 | 325 | 134 | - | 2 | | |
| Other | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres | 12,287 | 15 | 21 | 371 | 40 | 5,293 | 5,159 | 159 | 221 | 166 | 831 | 1 | 10 | | |
| Males | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | | | | | | | | | |
| All cases | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tous les cas | 54,803 | 836 | 295 | 2,041 | 1,529 | 14,016 | 20,610 | 2,429 | 2,300 | 3,751 | 6,920 | 21 | 55 | | |
| Microscopic | | | | | | | | | | | | | | | |
| Microscopique | 46,123 | 808 | 275 | 1,781 | 1,382 | 10,066 | 17,822 | 1,948 | 2,084 | 3,469 | 6,419 | 21 | 48 | | |
| Radiological | | | | | | | | | | | | | | | |
| Radiologique | 2,079 | 20 | 11 | 50 | 127 | 1,020 | 88 | 392 | 99 | 189 | 81 | - | 2 | | |
| Other | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres | 6,601 | 8 | 9 | 210 | 20 | 2,930 | 2,700 | 89 | 117 | 93 | 420 | - | 5 | | |
| Females | | | | | | | | | | | | | | | |
| Femmes | | | | | | | | | | | | | | | |
| All cases | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tous les cas | 49,850 | 739 | 267 | 1,871 | 1,303 | 12,571 | 19,277 | 2,120 | 1,929 | 3,595 | 6,107 | 20 | 51 | | |
| Microscopic | | | | | | | | | | | | | | | |
| Microscopique | 42,548 | 715 | 243 | 1,675 | 1,181 | 9,452 | 16,751 | 1,674 | 1,763 | 3,386 | 5,643 | 19 | 46 | | |
| Radiological | | | | | | | | | | | | | | | |
| Radiologique | 1,616 | 17 | 12 | 35 | 102 | 756 | 67 | 376 | 62 | 136 | 53 | - | - | | |
| Other | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres | 5,686 | 7 | 12 | 161 | 20 | 2,363 | 2,459 | 70 | 104 | 73 | 411 | 1 | 5 | | |
| Percentage distribution Répartition proportionnelle | | | | | | | | | | | | | | | |
| Both sexes | | | | | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | | | | |
| All cases | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tous les cas | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| Microscopic | | | | | | | | | | | | | | | |
| Microscopique | 84.7 | 96.7 | 92.2 | 88.3 | 90.5 | 73.4 | 86.7 | 79.6 | 91.0 | 93.3 | 92.6 | 97.6 | 88.7 | | |
| Radiological | | | | | | | | | | | | | | | |
| Radiologique | 3.5 | 2.3 | 4.1 | 2.2 | 8.1 | 6.7 | 0.4 | 16.9 | 3.8 | 4.4 | 1.0 | - | 1.9 | | |
| Other | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres | 11.7 | 1.0 | 3.7 | 9.5 | 1.4 | 19.9 | 12.9 | 3.5 | 5.2 | 2.3 | 6.4 | 2.4 | 9.4 | | |
| Males | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | | | | | | | | | |
| All cases | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tous les cas | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| Microscopic | | | | | | | | | | | | | | | |
| Microscopique | 84.2 | 96.7 | 93.2 | 87.3 | 90.4 | 71.8 | 86.5 | 80.2 | 90.6 | 92.5 | 92.8 | 100.0 | 87.3 | | |
| Radiological | | | | | | | | | | | | | | | |
| Radiologique | 3.8 | 2.4 | 3.7 | 2.4 | 8.3 | 7.3 | 0.4 | 16.1 | 4.3 | 5.0 | 1.2 | - | 3.6 | | |
| Other | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres | 12.0 | 1.0 | 3.1 | 10.3 | 1.3 | 20.9 | 15.1 | 3.7 | 5.1 | 2.5 | 6.1 | - | 9.1 | | |
| Females | | | | | | | | | | | | | | | |
| Femmes | | | | | | | | | | | | | | | |
| All cases | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tous les cas | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| Microscopic | | | | | | | | | | | | | | | |
| Microscopique | 85.4 | 96.8 | 91.0 | 89.5 | 90.6 | 75.2 | 86.9 | 79.0 | 91.4 | 94.2 | 92.4 | 95.0 | 90.2 | | |
| Radiological | | | | | | | | | | | | | | | |
| Radiologique | 3.2 | 2.3 | 4.5 | 1.9 | 7.8 | 6.0 | 0.3 | 17.7 | 3.2 | 3.8 | 0.9 | - | - | | |
| Other | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres | 11.4 | 0.9 | 4.5 | 8.6 | 1.5 | 18.8 | 12.8 | 3.3 | 5.4 | 2.0 | 6.7 | 5.0 | 9.8 | | |

(1) Table includes all cancers except "other skin cancer" (ICD-9 140 to 208, excluding 173).

(1) Le tableau inclus tous les cancers sauf "autres cancers de la peau" (CIM-9 140 à 208, excluant 173).

(2) Data are reported by Manitoba and Québec according to the first method of diagnosis.

(2) Le Manitoba et Québec déclarent les données selon la première méthode de diagnostic.

(3) Percentages may not add to 100 due to rounding.

(3) En raison de l'arrondissement, les distributions en pourcentage peuvent ne pas atteindre 100.

TABLE 9. New Primary Sites of Cancer by Most Confirmed Method of Diagnosis, Sex and Age Group, Canada, 1990 (1,2)
TABLEAU 9. Nouveaux sièges primaires de cancer suivant la méthode de diagnostic la plus éprouvée,
le sexe et le groupe d'âge, Canada, 1990 (1,2)

| | Total | 0-24 | 25-34 | 35-44 | Age group - Groupe d'âge | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+ N.S./N.P. |
|------------------------------------|---------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|-------|---------------|
| Number of cases | | | | | | | | | | |
| Nombre de cas | | | | | | | | | | |
| Both sexes | | | | | | | | | | |
| Tous les deux sexes | | | | | | | | | | |
| All cases | 104,653 | 1,905 | 2,883 | 6,222 | 10,849 | 21,706 | 31,584 | 22,731 | 6,723 | 50 |
| Tous les cas | | | | | | | | | | |
| Microscopic | | | | | | | | | | |
| Microscopique | 88,671 | 1,693 | 2,625 | 5,701 | 9,758 | 19,206 | 27,266 | 18,067 | 4,314 | 41 |
| Radiological | | | | | | | | | | |
| Radiologique | 3,695 | 69 | 29 | 100 | 243 | 613 | 1,053 | 1,136 | 452 | - |
| Other | | | | | | | | | | |
| Autres | 12,287 | 143 | 229 | 421 | 848 | 1,887 | 3,265 | 3,528 | 1,957 | 9 |
| Males | | | | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | | | | |
| All cases | 54,883 | 1,007 | 1,201 | 2,207 | 4,474 | 11,761 | 18,255 | 12,741 | 3,132 | 25 |
| Tous les cas | | | | | | | | | | |
| Microscopic | | | | | | | | | | |
| Microscopique | 46,123 | 881 | 1,089 | 1,957 | 3,912 | 10,262 | 15,676 | 10,207 | 2,117 | 22 |
| Radiological | | | | | | | | | | |
| Radiologique | 2,079 | 39 | 15 | 60 | 118 | 390 | 635 | 628 | 194 | - |
| Other | | | | | | | | | | |
| Autres | 6,601 | 87 | 97 | 190 | 444 | 1,109 | 1,944 | 1,906 | 821 | 3 |
| Females | | | | | | | | | | |
| Femmes | | | | | | | | | | |
| All cases | 49,850 | 898 | 1,682 | 4,015 | 6,375 | 9,945 | 13,329 | 9,990 | 3,591 | 25 |
| Tous les cas | | | | | | | | | | |
| Microscopic | | | | | | | | | | |
| Microscopique | 42,548 | 812 | 1,536 | 3,744 | 5,846 | 8,944 | 11,590 | 7,860 | 2,197 | 19 |
| Radiological | | | | | | | | | | |
| Radiologique | 1,616 | 38 | 14 | 40 | 125 | 223 | 418 | 508 | 258 | - |
| Other | | | | | | | | | | |
| Autres | 5,686 | 56 | 132 | 231 | 404 | 778 | 1,321 | 1,622 | 1,136 | 6 |
| Percentage distribution | | | | | | | | | | |
| Repartition proportionnelle | | | | | | | | | | |
| Both sexes | | | | | | | | | | |
| Tous les deux sexes | | | | | | | | | | |
| All cases | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Tous les cas | | | | | | | | | | |
| Microscopic | | | | | | | | | | |
| Microscopique | 84.7 | 88.9 | 91.1 | 91.6 | 89.9 | 88.5 | 86.3 | 79.5 | 64.2 | 82.0 |
| Radiological | | | | | | | | | | |
| Radiologique | 3.5 | 3.6 | 1.0 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 5.0 | 6.7 | - |
| Other | | | | | | | | | | |
| Autres | 11.7 | 7.5 | 7.9 | 6.8 | 7.8 | 8.7 | 10.3 | 15.5 | 29.1 | 18.0 |
| Males | | | | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | | | | |
| All cases | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Tous les cas | | | | | | | | | | |
| Microscopic | | | | | | | | | | |
| Microscopique | 84.2 | 87.5 | 90.7 | 88.7 | 87.4 | 87.3 | 85.9 | 80.1 | 67.6 | 88.0 |
| Radiological | | | | | | | | | | |
| Radiologique | 3.8 | 3.9 | 1.2 | 2.7 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 4.9 | 6.2 | - |
| Other | | | | | | | | | | |
| Autres | 12.0 | 8.6 | 8.1 | 8.6 | 9.9 | 9.4 | 10.6 | 15.0 | 26.2 | 12.0 |
| Females | | | | | | | | | | |
| Femmes | | | | | | | | | | |
| All cases | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Tous les cas | | | | | | | | | | |
| Microscopic | | | | | | | | | | |
| Microscopique | 85.4 | 90.4 | 91.3 | 93.3 | 91.7 | 89.9 | 87.0 | 78.7 | 61.2 | 76.0 |
| Radiological | | | | | | | | | | |
| Radiologique | 3.2 | 3.3 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 2.2 | 3.1 | 5.1 | 7.2 | - |
| Other | | | | | | | | | | |
| Autres | 11.4 | 6.2 | 7.8 | 5.8 | 6.3 | 7.8 | 9.9 | 16.2 | 31.6 | 24.0 |

(1) Table includes all cancers except "other skin cancer" (ICD-9 140 to 208, excluding 173).

(2) Percentages may not add to 100 due to rounding.

(1) Le tableau inclus tous les cancers sauf "autres cancers de la peau" (CIM-9 140 à 208, excluant 173).

(2) En raison de l'arrondissement, les distributions en pourcentage peuvent ne pas atteindre 100.

TABLE 10. New Primary Sites of Cancer Cases Discovered by Death Certificates Only by Sex, Canada and Provinces, 1990 (1,2,3)
 TABLEAU 10. Nouveaux sièges primaires de cancer découverts par les certificats de décès uniquement
 selon le sexe, Canada et provinces, 1990 (1,2,3)

| | Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | | | N.W.T. |
|-----------------------------|---------|---|----------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|---------|--------|
| | | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | T.N.-O. | |
| | | T.-N. | I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | | | | | | | | | |
| Number of cases | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de cas | | | | | | | | | | | | | | |
| All cases | | | | | | | | | | | | | | |
| Tous les cas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 104,653 | 1,575 | 562 | 3,912 | 2,832 | 26,587 | 39,887 | 4,549 | 4,229 | 7,346 | 13,027 | 41 | 106 | |
| Males - Hommes | 54,803 | 836 | 295 | 2,041 | 1,529 | 14,016 | 20,610 | 2,429 | 2,300 | 3,751 | 6,920 | 21 | 55 | |
| Females - Femmes | 49,850 | 739 | 267 | 1,871 | 1,303 | 12,571 | 19,277 | 2,120 | 1,929 | 3,595 | 6,107 | 20 | 51 | |
| Deaths certificates | | | | | | | | | | | | | | |
| Certificats de décès | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1,947 | - | 16 | 291 | 20 | - | 685 | 60 | 114 | 70 | 689 | - | 2 | |
| Males - Hommes | 986 | - | 7 | 161 | 11 | - | 321 | 32 | 58 | 41 | 354 | - | 1 | |
| Females - Femmes | 961 | - | 9 | 130 | 9 | - | 364 | 28 | 56 | 29 | 335 | - | 1 | |
| Other | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 102,706 | 1,575 | 546 | 3,621 | 2,812 | 26,587 | 39,202 | 4,489 | 4,115 | 7,276 | 12,338 | 41 | 104 | |
| Males - Hommes | 53,817 | 836 | 288 | 1,880 | 1,518 | 14,016 | 20,289 | 2,397 | 2,242 | 3,710 | 6,566 | 21 | 54 | |
| Females - Femmes | 48,889 | 739 | 258 | 1,741 | 1,294 | 12,571 | 18,913 | 2,092 | 1,873 | 3,566 | 5,772 | 20 | 50 | |
| Percentage distribution | | | | | | | | | | | | | | |
| Répartition proportionnelle | | | | | | | | | | | | | | |
| All cases | | | | | | | | | | | | | | |
| Tous les cas | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| Males - Hommes | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| Females - Femmes | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| Deaths certificates | | | | | | | | | | | | | | |
| Certificats de décès | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1.9 | - | 2.8 | 7.4 | 0.7 | - | 1.7 | 1.3 | 2.7 | 1.0 | 5.3 | - | 1.9 | |
| Males - Hommes | 1.8 | - | 2.4 | 7.9 | 0.7 | - | 1.6 | 1.5 | 2.5 | 1.1 | 5.1 | - | 1.8 | |
| Females - Femmes | 1.9 | - | 3.4 | 6.9 | 0.7 | - | 1.9 | 1.3 | 2.9 | 0.8 | 5.5 | - | 2.0 | |
| Other | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 98.1 | 100.0 | 97.2 | 92.6 | 99.3 | 100.0 | 98.3 | 98.7 | 97.3 | 99.0 | 94.7 | 100.0 | 98.1 | |
| Males - Hommes | 98.2 | 100.0 | 97.6 | 92.1 | 99.3 | 100.0 | 98.4 | 98.7 | 97.5 | 98.9 | 94.9 | 100.0 | 98.2 | |
| Females - Femmes | 98.1 | 100.0 | 96.6 | 93.1 | 99.3 | 100.0 | 98.1 | 98.7 | 97.1 | 99.2 | 94.5 | 100.0 | 98.0 | |

(1) Table includes all cancers except "other skin cancer" (ICD-9 140 to 208, excluding 173).

(1) Le tableau inclus tous les cancers sauf "autres cancers de la peau" (CIM-9 140 à 208, excluant 173).

(2) Considerable variation occurs from province to province in reporting cases discovered by this method. See Explanatory Notes.

(2) La déclaration des cas découverts par cette méthode varie considérablement d'une province à l'autre. Voir notes explicatives.

(3) A new definition is used this year. See Explanatory Notes.

(3) Une nouvelle définition est utilisée cette année. Voir notes explicatives.

TABLE 11. New Primary Sites of Cancer Cases Discovered by Death Certificates Only by Sex and Age Group, Canada, 1990 (1,2,3)
 TABLEAU 11. Nouveaux sièges primaires de cancer découverts par les certificats de décès uniquement
 selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 1990 (1,2,3)

| | Total | 0-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+ | N.S./N.P. |
|--|---------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-----------|
| Age group - Groupe d'âge | | | | | | | | | | |
| Number of cases Nombre de cas | | | | | | | | | | |
| All cases | | | | | | | | | | |
| Tous les cas | | | | | | | | | | |
| Total | 104,653 | 1,905 | 2,883 | 6,222 | 10,849 | 21,706 | 31,584 | 22,731 | 6,723 | 50 |
| Males - Hommes | 54,803 | 1,007 | 1,201 | 2,207 | 4,474 | 11,761 | 18,255 | 12,741 | 3,132 | 25 |
| Females - Femmes | 49,850 | 898 | 1,682 | 4,015 | 6,375 | 9,945 | 13,329 | 9,990 | 3,591 | 25 |
| Deaths certificates | | | | | | | | | | |
| Certificats de décès | | | | | | | | | | |
| Total | 1,947 | 6 | 10 | 26 | 46 | 156 | 407 | 681 | 617 | - |
| Males - Hommes | 986 | 4 | 6 | 12 | 28 | 93 | 240 | 375 | 228 | - |
| Females - Femmes | 961 | 2 | 4 | 12 | 18 | 63 | 167 | 306 | 389 | - |
| Other | | | | | | | | | | |
| Autres | | | | | | | | | | |
| Total | 102,706 | 1,899 | 2,873 | 6,198 | 10,803 | 21,550 | 31,177 | 22,050 | 6,106 | 50 |
| Males - Hommes | 53,817 | 1,003 | 1,195 | 2,195 | 4,446 | 11,668 | 18,015 | 12,366 | 2,904 | 25 |
| Females - Femmes | 48,889 | 896 | 1,678 | 4,003 | 6,357 | 9,882 | 13,162 | 9,684 | 3,202 | 25 |
| Percentage distribution Partition proportionnelle | | | | | | | | | | |
| All cases | | | | | | | | | | |
| Tous les cas | | | | | | | | | | |
| Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Males - Hommes | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Females - Femmes | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Deaths certificates | | | | | | | | | | |
| Certificats de décès | | | | | | | | | | |
| Total | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 3.0 | 9.2 | - |
| Males - Hommes | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 2.9 | 7.3 | - |
| Females - Femmes | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 3.1 | 10.8 | - |
| Other | | | | | | | | | | |
| Autres | | | | | | | | | | |
| Total | 98.1 | 99.7 | 99.7 | 99.6 | 99.6 | 99.3 | 98.7 | 97.0 | 90.8 | 100.0 |
| Males - Hommes | 98.2 | 99.6 | 99.5 | 99.5 | 99.4 | 99.2 | 98.7 | 97.1 | 92.7 | 100.0 |
| Females - Femmes | 98.1 | 99.8 | 99.8 | 99.7 | 99.7 | 99.4 | 98.7 | 96.9 | 89.2 | 100.0 |

(1) Table includes all cancers except "other skin cancer" (ICD-9 140 to 208, excluding 173).

(1) Le tableau inclus tous les cancers sauf "autres cancers de la peau" (CIM-9 140 à 208, excluant 173).

(2) Considerable variation occurs from province to province in reporting cases discovered by this method. See Explanatory Notes.

(2) La déclaration des cas découverts par cette méthode varie considérablement d'une province à l'autre. Voir notes explicatives.

(3) A new definition is used this year. See Explanatory Notes.

(3) Une nouvelle définition est utilisée cette année. Voir notes explicatives.

TABLE 12. New Primary Sites of Cancer by Province of Notification and Province of Residence, 1990 (1)
 TABLEAU 12. Nouveaux sièges primaires de cancer selon la province de déclaration et la province de résidence, 1990 (1)

| Province of notification Province de déclaration | Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | N.W.T. T.N.-O. | |
|---|---------|---|-------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-----|
| | | Nfld. T.-N. | P.E.I. I.-P.-É | N.S. N.-É. | N.B. N.-B. | Qué. Québec | Ont. Ontario | Man. Manitoba | Sask. Saskatchewan | Alta. Alberta | B.C. Colombie-Britannique | | |
| Number of cases - Nombre de cas | | | | | | | | | | | | | |
| Canada | 104,653 | 1,575 | 562 | 3,912 | 2,832 | 26,587 | 39,887 | 4,549 | 4,229 | 7,346 | 13,027 | 41 | 106 |
| Newfoundland Terre-Neuve | 1,575 | 1,575 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard | 562 | - | 562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nova Scotia Nouvelle-Écosse | 3,912 | - | - | 3,912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| New Brunswick Nouveau-Brunswick | 2,832 | - | - | - | 2,832 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Québec | 26,587 | - | - | - | - | 26,587 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ontario | 39,887 | - | - | - | - | - | 39,887 | - | - | - | - | - | - |
| Manitoba | 4,549 | - | - | - | - | - | - | 4,549 | - | - | - | - | - |
| Saskatchewan | 4,229 | - | - | - | - | - | - | - | 4,229 | - | - | - | - |
| Alberta | 7,346 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,346 | - | - | - |
| British Columbia Colombie-Britannique | 13,027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,027 | 41 | - |
| Yukon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 |

(1) Table includes all cancers except "other skin cancer" (ICD-9 140 to 208, excluding 173).

(1) Le tableau inclus tous les cancers sauf "autres cancers de la peau" (CIM-9 140 à 208, excluant 173).

Cancer Mortality

Décès causés par le cancer

TABLE 13. Number of Deaths due to Cancer by Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)
 TABLEAU 13. Nombre de décès causés par le cancer selon le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | | N.W.T. T.N.-O. | |
|--|---|--------|------------------------|---------------|---------------|--------|--------|-------|-------|---------------|-------|-------------------|----|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. T.-N. I.-P.-É. | N.B. N.-É. | Qué. N.-B. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. C.-B. | Yukon | | |
| Number of deaths - Nombre de décès | | | | | | | | | | | | | |
| Both sexes Les deux sexes | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 52,426 | 950 | 306 | 2,064 | 1,478 | 14,280 | 19,076 | 2,321 | 2,026 | 3,600 | 6,259 | 27 | 39 |
| 0-4 | 64 | - | - | 5 | 3 | 22 | 15 | 2 | 4 | 4 | 9 | - | - |
| 5-9 | 61 | - | 1 | 2 | 1 | 19 | 15 | 4 | 3 | 8 | 8 | - | - |
| 10-14 | 64 | 2 | - | 1 | 2 | 19 | 21 | 2 | 1 | 8 | 8 | - | - |
| 15-19 | 77 | 2 | 1 | 4 | 3 | 23 | 35 | 2 | 4 | 3 | 2 | - | - |
| 20-24 | 111 | 6 | 2 | 5 | 2 | 28 | 45 | 2 | 4 | 13 | 4 | - | - |
| 25-29 | 175 | 7 | - | 5 | 6 | 43 | 65 | 12 | 3 | 19 | 14 | - | 1 |
| 30-34 | 352 | 8 | 2 | 19 | 4 | 105 | 130 | 7 | 14 | 30 | 32 | - | 1 |
| 35-39 | 627 | 16 | 3 | 25 | 9 | 179 | 214 | 26 | 14 | 59 | 81 | - | 1 |
| 40-44 | 1,058 | 14 | 4 | 41 | 20 | 319 | 399 | 24 | 30 | 83 | 121 | 2 | 1 |
| 45-49 | 1,709 | 29 | 8 | 61 | 50 | 542 | 587 | 70 | 56 | 101 | 203 | 1 | 1 |
| 50-54 | 2,566 | 52 | 11 | 102 | 71 | 706 | 967 | 102 | 88 | 199 | 262 | 2 | 4 |
| 55-59 | 4,133 | 78 | 18 | 163 | 98 | 1,223 | 1,534 | 163 | 138 | 266 | 443 | 3 | 6 |
| 60-64 | 6,193 | 92 | 37 | 219 | 153 | 1,839 | 2,332 | 242 | 196 | 430 | 643 | 3 | 7 |
| 65-69 | 8,039 | 139 | 40 | 297 | 256 | 2,170 | 3,014 | 332 | 270 | 531 | 980 | 5 | 5 |
| 70-74 | 8,150 | 149 | 56 | 332 | 229 | 2,204 | 2,868 | 358 | 332 | 582 | 1,011 | 4 | 5 |
| 75-79 | 7,806 | 142 | 50 | 312 | 210 | 2,065 | 2,822 | 372 | 315 | 499 | 1,013 | 3 | 3 |
| 80-84 | 6,015 | 128 | 31 | 251 | 203 | 1,496 | 2,118 | 310 | 289 | 398 | 787 | 2 | 2 |
| 85+ | 5,245 | 86 | 42 | 220 | 158 | 1,278 | 1,897 | 290 | 265 | 367 | 638 | 2 | 2 |
| N.S./N.P. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Females Femmes | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 28,866 | 538 | 169 | 1,120 | 831 | 8,055 | 10,326 | 1,274 | 1,154 | 2,009 | 3,348 | 16 | 26 |
| 0-4 | 33 | - | - | 1 | - | 9 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | - |
| 5-9 | 37 | - | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 5 | 5 | - | - |
| 10-14 | 33 | 1 | - | 1 | - | 13 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - |
| 15-19 | 46 | - | - | 2 | 3 | 14 | 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 20-24 | 78 | 3 | 1 | 4 | 2 | 21 | 30 | 2 | 2 | 11 | 2 | - | - |
| 25-29 | 87 | 2 | - | 3 | 2 | 24 | 28 | 5 | 2 | 13 | 7 | - | 1 |
| 30-34 | 153 | 4 | 1 | 1 | 3 | 51 | 52 | 2 | 7 | 15 | 17 | - | - |
| 35-39 | 263 | 7 | 2 | 10 | 5 | 84 | 85 | 13 | 6 | 19 | 31 | - | 1 |
| 40-44 | 447 | 5 | 2 | 17 | 10 | 138 | 163 | 10 | 14 | 33 | 53 | 1 | 1 |
| 45-49 | 834 | 12 | 7 | 30 | 22 | 288 | 277 | 28 | 25 | 46 | 98 | 1 | - |
| 50-54 | 1,338 | 30 | 4 | 55 | 30 | 399 | 505 | 42 | 41 | 103 | 124 | 1 | 4 |
| 55-59 | 2,302 | 37 | 15 | 88 | 60 | 712 | 840 | 88 | 82 | 140 | 233 | 2 | 5 |
| 60-64 | 3,682 | 58 | 19 | 127 | 95 | 1,114 | 1,391 | 148 | 113 | 248 | 365 | 1 | 3 |
| 65-69 | 4,711 | 89 | 24 | 164 | 150 | 1,349 | 1,731 | 200 | 152 | 309 | 535 | 5 | 3 |
| 70-74 | 4,751 | 94 | 32 | 191 | 142 | 1,316 | 1,666 | 218 | 195 | 347 | 546 | 1 | 3 |
| 75-79 | 4,439 | 81 | 29 | 191 | 121 | 1,172 | 1,581 | 209 | 188 | 295 | 567 | 2 | 3 |
| 80-84 | 3,262 | 74 | 17 | 145 | 120 | 781 | 1,094 | 166 | 181 | 229 | 453 | 1 | 1 |
| 85+ | 2,369 | 41 | 15 | 89 | 65 | 560 | 833 | 136 | 139 | 187 | 302 | 1 | 1 |
| N.S./N.P. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |

(1) Table includes all cancers (ICD-9 140 to 208).

(1) Le tableau inclus tous les cancers (CIM-9 140 à 208).

(2) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(2) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

TABLE 13. Number of Deaths due to Cancer by Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)
 TABLEAU 13. Nombre de décès causés par le cancer selon le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | | | N.W.T. T.N.-O. |
|--------------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | | |
| | T.-N. I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | | | |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | |
| Both sexes | | | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 188.6 | 164.1 | 233.5 | 226.2 | 198.9 | 203.4 | 184.5 | 209.4 | 200.4 | 140.8 | 189.7 | 96.3 | 65.7 |
| 0-4 | 3.3 | - | - | 8.1 | 6.1 | 5.0 | 2.1 | 2.4 | 4.9 | 1.9 | 4.0 | - | - |
| 5-9 | 3.1 | - | 10.2 | 3.2 | 1.9 | 4.1 | 2.1 | 5.0 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | - | - |
| 10-14 | 3.4 | 4.0 | - | 1.6 | 3.6 | 3.9 | 3.2 | 2.5 | 1.3 | 4.3 | 3.8 | - | - |
| 15-19 | 4.0 | 3.6 | 9.8 | 5.8 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 2.4 | 5.4 | 1.7 | 0.9 | - | - |
| 20-24 | 5.2 | 11.8 | 20.3 | 7.0 | 3.4 | 5.4 | 5.4 | 2.4 | 5.6 | 6.3 | 1.7 | - | - |
| 25-29 | 6.7 | 14.0 | - | 6.0 | 9.0 | 6.5 | 6.5 | 12.2 | 3.5 | 7.5 | 4.8 | - | 15.2 |
| 30-34 | 13.8 | 16.3 | 18.8 | 23.6 | 6.2 | 15.9 | 13.9 | 7.4 | 16.6 | 11.6 | 10.7 | - | 17.5 |
| 35-39 | 27.4 | 33.8 | 30.6 | 34.6 | 14.9 | 30.0 | 25.6 | 30.5 | 18.6 | 26.8 | 29.1 | - | 21.5 |
| 40-44 | 51.3 | 33.0 | 42.0 | 61.4 | 36.0 | 58.9 | 52.0 | 31.8 | 48.3 | 45.8 | 47.5 | 80.6 | 26.3 |
| 45-49 | 106.8 | 94.7 | 117.8 | 119.5 | 121.5 | 123.0 | 99.4 | 120.4 | 115.7 | 75.3 | 104.4 | 57.4 | 40.1 |
| 50-54 | 197.3 | 212.3 | 185.3 | 243.4 | 216.1 | 204.4 | 196.7 | 211.0 | 206.1 | 184.6 | 167.5 | 173.8 | 215.7 |
| 55-59 | 333.6 | 354.9 | 326.9 | 414.7 | 319.3 | 368.9 | 326.9 | 348.2 | 318.8 | 267.8 | 297.4 | 311.5 | 416.1 |
| 60-64 | 524.6 | 451.8 | 718.6 | 595.4 | 519.6 | 591.0 | 517.1 | 518.2 | 449.6 | 482.1 | 441.7 | 445.1 | 727.7 |
| 65-69 | 752.1 | 783.7 | 809.1 | 838.2 | 905.1 | 808.3 | 735.6 | 724.2 | 648.6 | 695.5 | 703.6 | 1,103.8 | 797.4 |
| 70-74 | 1,018.2 | 982.8 | 1,294.8 | 1,106.7 | 1,005.8 | 1,123.6 | 984.9 | 974.9 | 922.1 | 1,007.6 | 939.0 | 1,388.9 | 1,219.5 |
| 75-79 | 1,285.9 | 1,262.2 | 1,391.2 | 1,362.3 | 1,199.7 | 1,429.1 | 1,269.6 | 1,251.1 | 1,092.2 | 1,164.0 | 1,218.7 | 1,666.7 | 1,038.1 |
| 80-84 | 1,641.2 | 2,134.4 | 1,397.7 | 1,845.7 | 1,913.1 | 1,725.3 | 1,562.1 | 1,684.3 | 1,612.8 | 1,491.5 | 1,622.1 | 2,127.7 | 1,190.5 |
| 85+ | 1,899.3 | 2,020.7 | 2,189.8 | 2,104.1 | 1,924.7 | 2,129.9 | 1,803.2 | 1,962.9 | 1,844.2 | 1,773.3 | 1,768.9 | 5,353.3 | 1,470.6 |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Males | | | | | | | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 209.5 | 185.2 | 260.3 | 248.3 | 225.4 | 232.7 | 202.0 | 231.6 | 228.8 | 155.8 | 203.8 | 109.0 | 83.7 |
| 0-4 | 3.3 | - | - | 3.2 | - | 4.0 | 2.7 | 2.3 | 4.8 | 3.7 | 5.2 | - | - |
| 5-9 | 3.7 | - | 20.0 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 3.1 | 4.8 | 2.4 | 4.7 | 4.3 | - | - |
| 10-14 | 3.4 | 3.9 | - | 3.1 | - | 5.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 4.2 | 2.8 | - | - |
| 15-19 | 4.7 | - | - | 5.6 | 9.8 | 5.9 | 5.4 | 4.7 | 7.9 | 1.1 | 0.9 | - | - |
| 20-24 | 7.2 | 11.7 | 20.2 | 10.9 | 6.7 | 7.9 | 7.2 | 4.6 | 5.5 | 10.6 | 1.7 | - | - |
| 25-29 | 6.6 | 8.0 | - | 7.1 | 6.0 | 7.1 | 5.5 | 9.9 | 4.6 | 10.1 | 4.8 | - | 29.5 |
| 30-34 | 11.9 | 16.5 | 19.1 | 2.5 | 9.2 | 15.2 | 11.1 | 4.1 | 16.2 | 11.3 | 11.4 | - | - |
| 35-39 | 22.9 | 29.5 | 40.9 | 27.9 | 16.5 | 28.1 | 20.5 | 30.4 | 15.5 | 16.8 | 22.2 | - | 39.6 |
| 40-44 | 43.0 | 23.2 | 41.6 | 50.6 | 35.4 | 50.7 | 42.4 | 26.2 | 43.9 | 35.5 | 40.8 | 76.3 | 47.3 |
| 45-49 | 103.3 | 76.8 | 203.5 | 116.1 | 104.4 | 130.9 | 93.2 | 95.3 | 102.3 | 67.0 | 98.6 | 97.7 | - |
| 50-54 | 204.6 | 239.0 | 133.6 | 260.8 | 180.8 | 233.6 | 204.2 | 173.1 | 191.3 | 186.6 | 154.8 | 157.7 | 391.8 |
| 55-59 | 372.7 | 327.7 | 538.0 | 453.7 | 398.2 | 442.0 | 358.6 | 377.7 | 378.0 | 274.5 | 304.7 | 361.7 | 621.9 |
| 60-64 | 645.6 | 571.5 | 743.3 | 726.3 | 678.3 | 761.6 | 637.0 | 657.2 | 527.9 | 555.1 | 507.7 | 240.4 | 548.4 |
| 65-69 | 964.6 | 1,021.7 | 1,034.9 | 1,000.3 | 1,150.7 | 1,123.5 | 928.9 | 965.3 | 769.1 | 862.1 | 828.3 | 1,968.5 | 857.1 |
| 70-74 | 1,364.5 | 1,323.9 | 1,652.0 | 1,444.0 | 1,395.0 | 1,600.3 | 1,311.5 | 1,337.4 | 1,191.3 | 1,340.8 | 1,148.0 | 714.3 | 1,310.0 |
| 75-79 | 1,781.7 | 1,646.0 | 1,911.7 | 2,006.9 | 1,639.3 | 2,094.7 | 1,734.5 | 1,679.1 | 1,511.1 | 1,630.9 | 1,598.1 | 2,222.2 | 1,960.8 |
| 80-84 | 2,398.6 | 3,049.0 | 1,905.8 | 2,753.5 | 2,987.3 | 2,615.0 | 2,237.7 | 2,351.3 | 2,455.6 | 2,147.0 | 2,333.7 | 2,173.9 | 1,204.8 |
| 85+ | 2,810.0 | 2,861.1 | 2,435.1 | 2,865.4 | 2,572.2 | 3,266.8 | 2,761.8 | 2,902.3 | 2,612.8 | 2,569.0 | 2,526.4 | 3,846.2 | 1,754.4 |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Females | | | | | | | | | | | | | |
| Femmes | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 168.2 | 142.8 | 207.2 | 204.6 | 172.9 | 174.9 | 167.3 | 187.5 | 172.2 | 125.6 | 175.7 | 82.4 | 46.0 |
| 0-4 | 3.3 | - | - | 13.2 | 12.5 | 6.0 | 1.4 | 2.5 | 5.1 | - | 2.7 | - | - |
| 5-9 | 2.5 | - | - | 3.3 | - | 4.0 | 1.2 | 5.1 | 5.0 | 3.0 | 2.7 | - | - |
| 10-14 | 3.4 | 4.2 | - | - | 7.5 | 2.5 | 3.7 | 2.6 | - | 4.5 | 4.8 | - | - |
| 15-19 | 3.3 | 7.5 | 20.2 | 5.9 | - | 4.0 | 3.7 | - | 2.7 | 2.2 | 0.9 | - | - |
| 20-24 | 3.1 | 12.0 | 20.4 | 2.8 | - | 2.7 | 3.7 | - | 5.7 | 2.0 | 1.7 | - | - |
| 25-29 | 6.9 | 20.0 | - | 4.9 | 12.2 | 5.9 | 7.5 | 14.5 | 2.4 | 4.8 | 4.9 | - | - |
| 30-34 | 15.8 | 16.2 | 18.5 | 44.9 | 3.1 | 16.5 | 16.7 | 10.9 | 16.9 | 11.9 | 10.1 | - | 37.0 |
| 35-39 | 31.8 | 38.1 | 20.4 | 41.2 | 13.2 | 31.9 | 30.5 | 30.5 | 21.9 | 37.5 | 36.0 | - | - |
| 40-44 | 59.8 | 43.1 | 42.3 | 72.3 | 36.7 | 67.1 | 61.6 | 37.4 | 52.9 | 56.6 | 54.4 | 85.4 | - |
| 45-49 | 110.4 | 113.4 | 29.8 | 123.0 | 139.6 | 115.1 | 105.8 | 145.9 | 129.3 | 83.9 | 110.5 | - | 90.2 |
| 50-54 | 189.9 | 184.2 | 237.9 | 225.7 | 252.0 | 175.8 | 189.1 | 249.3 | 220.9 | 182.6 | 180.8 | 193.4 | - |
| 55-59 | 294.7 | 348.5 | 110.3 | 376.7 | 243.2 | 299.8 | 295.3 | 319.0 | 259.2 | 260.8 | 289.6 | 243.9 | 156.7 |
| 60-64 | 411.5 | 332.8 | 694.2 | 476.8 | 375.6 | 439.7 | 404.6 | 388.8 | 374.0 | 408.8 | 377.3 | 775.2 | 963.9 |
| 65-69 | 573.4 | 554.0 | 609.5 | 698.6 | 695.1 | 553.2 | 574.4 | 525.4 | 539.6 | 548.0 | 595.7 | - | 722.0 |
| 70-74 | 750.4 | 682.4 | 1,005.0 | 840.7 | 691.0 | 779.5 | 732.2 | 685.5 | 697.6 | 737.1 | 773.6 | 2,027.0 | 1,105.0 |
| 75-79 | 940.7 | 963.8 | 1,011.1 | 903.9 | 879.1 | 1,008.6 | 946.5 | 943.0 | 774.4 | 823.1 | 936.1 | 1,111.1 | - |
| 80-84 | 1,194.3 | 1,512.6 | 1,055.8 | 1,272.1 | 1,258.7 | 1,257.9 | 1,181.1 | 1,269.3 | 1,023.9 | 1,055.0 | 1,147.6 | 2,083.3 | 1,176.5 |
| 85+ | 1,499.2 | 1,594.0 | 2,073.7 | 1,782.3 | 1,636.7 | 1,675.2 | 1,417.9 | 1,526.6 | 1,392.4 | 1,341.6 | 1,393.4 | 2,941.2 | 1,265.8 |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) Table includes all cancers (ICD-9 140 to 208).

(1) Le tableau inclus tous les cancers (CIM-9 140 à 208).

(2) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(2) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

TABLE 14. Number of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 14. Nombre de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | | N.W.T. | |
|---|---|----------|-------|-------|------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--------|----|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. | M.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | | |
| | T.-N. | I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | | | | | Alb. | C.-B. | T.N.-O. | | |
| Number of deaths - Nombre de décès | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | | |
| 140 to 208 All cancers | | | | | | | | | | | | | |
| 140 à 208 Tous les cancers | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 28,866 | 538 | 169 | 1,120 | 831 | 8,055 | 10,326 | 1,274 | 1,154 | 2,009 | 3,348 | 16 | 26 |
| 0-24 | 227 | 4 | 2 | 9 | 6 | 67 | 80 | 8 | 9 | 25 | 17 | - | - |
| 25-34 | 240 | 6 | 1 | 4 | 5 | 75 | 80 | 7 | 9 | 28 | 24 | - | 1 |
| 35-44 | 710 | 12 | 4 | 27 | 15 | 222 | 248 | 23 | 20 | 52 | 84 | 1 | 2 |
| 45-54 | 2,172 | 42 | 11 | 85 | 52 | 687 | 782 | 70 | 66 | 149 | 222 | 2 | 4 |
| 55-64 | 5,984 | 95 | 34 | 215 | 155 | 1,826 | 2,231 | 236 | 195 | 388 | 598 | 3 | 8 |
| 65-74 | 9,462 | 183 | 56 | 355 | 292 | 2,665 | 3,397 | 418 | 347 | 656 | 1,081 | 6 | 6 |
| 75-84 | 7,701 | 155 | 46 | 336 | 241 | 1,953 | 2,675 | 375 | 369 | 524 | 1,020 | 3 | 4 |
| 85 + | 2,369 | 41 | 15 | 89 | 65 | 560 | 833 | 136 | 139 | 187 | 302 | 1 | 1 |
| N.S./N.P. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 140 Lip | | | | | | | | | | | | | |
| 140 Lèvre | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 14 | 1 | - | 1 | - | 1 | 7 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 75-84 | 7 | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 85 + | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 Tongue | | | | | | | | | | | | | |
| 141 Langue | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 133 | - | - | 2 | 7 | 35 | 57 | 3 | 2 | 11 | 16 | - | - |
| 0-24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 25-34 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 35-44 | 7 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | - |
| 45-54 | 21 | - | - | - | 2 | 7 | 6 | 2 | - | 2 | 2 | - | - |
| 55-64 | 39 | - | - | 2 | 1 | 11 | 14 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - |
| 65-74 | 36 | - | - | - | 2 | 6 | 20 | - | - | 2 | 6 | - | - |
| 75-84 | 21 | - | - | - | 2 | 6 | 11 | - | - | 2 | - | - | - |
| 85 + | 7 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 142 Major salivary glands | | | | | | | | | | | | | |
| 142 Glandes salivaires principales | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 39 | - | - | 3 | 4 | 11 | 13 | 2 | - | 1 | 4 | - | 1 |
| 0-24 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 35-44 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 45-54 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | 10 | - | - | - | 1 | 4 | 3 | - | - | - | 2 | - | - |
| 65-74 | 7 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - |
| 75-84 | 8 | - | - | 2 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
| 85 + | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 143 Gum | | | | | | | | | | | | | |
| 143 Gencives | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 12 | - | - | 1 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 144 Floor of mouth | | | | | | | | | | | | | |
| 144 Plancher de la bouche | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 44 | 1 | - | - | - | 21 | 15 | 3 | - | 3 | 1 | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 5 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 55-64 | 17 | - | - | - | - | 6 | 8 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| 65-74 | 11 | - | - | - | - | 6 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 75-84 | 8 | 1 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | - |
| 85 + | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

TABLE 14. Number of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 14. Nombre de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| | Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | | N.W.T. |
|---|--------|---|--------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | |
| | | T.-N. T.-N.P.-É | N.-É. | N.-B. | | | | | | Aib. | C.-B. | | T.N.-O. |
| Number of deaths - Nombre de décès | | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | | |
| 140 to 208 All cancers | | | | | | | | | | | | | |
| 140 à 208 Tous les cancers | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 23,560 | 412 | 137 | 946 | 647 | 6,225 | 8,750 | 1,047 | 872 | 1,591 | 2,911 | 11 | 13 |
| 0-24 | 150 | 6 | 2 | 8 | 5 | 44 | 49 | 4 | 7 | 11 | 14 | - | - |
| 25-34 | 287 | 9 | 1 | 20 | 5 | 73 | 115 | 12 | 8 | 21 | 22 | - | 1 |
| 35-44 | 975 | 18 | 3 | 39 | 14 | 276 | 365 | 27 | 24 | 90 | 118 | 1 | - |
| 45-54 | 2,103 | 39 | 8 | 78 | 69 | 561 | 772 | 102 | 78 | 151 | 243 | 1 | 1 |
| 55-64 | 4,342 | 75 | 21 | 167 | 96 | 1,236 | 1,635 | 169 | 139 | 308 | 488 | 3 | 5 |
| 65-74 | 6,707 | 105 | 40 | 274 | 193 | 1,709 | 2,485 | 272 | 255 | 457 | 910 | 3 | 4 |
| 75-84 | 6,120 | 115 | 35 | 227 | 172 | 1,608 | 2,265 | 307 | 235 | 373 | 780 | 2 | 1 |
| 85 + | 2,876 | 45 | 27 | 131 | 93 | 718 | 1,064 | 154 | 126 | 180 | 336 | 1 | 1 |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 Lip | | | | | | | | | | | | | |
| 140 Lèvre | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 + | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 Tongue | | | | | | | | | | | | | |
| 141 Langue | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 66 | 1 | - | - | 1 | 16 | 23 | 7 | 2 | 2 | 14 | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - |
| 55-64 | 15 | - | - | - | - | 7 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| 65-74 | 15 | 1 | - | - | - | 3 | 6 | 2 | 1 | - | 2 | - | - |
| 75-84 | 15 | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | - | - | 8 | - | - |
| 85 + | 12 | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 142 Major salivary glands | | | | | | | | | | | | | |
| 142 Glandes salivaires principales | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 25 | - | - | 2 | - | 10 | 8 | - | 2 | 1 | 2 | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 45-54 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 55-64 | 6 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | 5 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 75-84 | 5 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
| 85 + | 5 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 143 Gum | | | | | | | | | | | | | |
| 143 Gencives | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 10 | - | - | - | 2 | - | 5 | 1 | - | - | 2 | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | 3 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - |
| 85 + | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 144 Floor of mouth | | | | | | | | | | | | | |
| 144 Plancher de la bouche | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 22 | - | - | 2 | - | 7 | 6 | 1 | - | 2 | 4 | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 55-64 | 7 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 2 | - | - |
| 65-74 | 6 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 85 + | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

TABLE 14. Number of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 14. Nombre de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | | N.W.T. | |
|--|---|----------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|---------|--------|--|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | | |
| | T.-N. | I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | | | | | Alb. | C.-B. | T.M.-O. | | |
| Number of deaths - Nombre de décès | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | | |
| 145 Other and unspecified parts of mouth | | | | | | | | | | | | | |
| 145 Autre parties non précisée de la bouche | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 92 | 2 | - | 5 | 1 | 25 | 34 | 2 | 3 | 8 | 12 | - | |
| 0-24 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35-44 | 4 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 45-54 | 8 | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 55-64 | 28 | 1 | - | 1 | - | 7 | 9 | 1 | - | 5 | 4 | - | |
| 65-74 | 30 | - | - | 2 | - | 9 | 14 | - | - | 2 | 3 | - | |
| 75-84 | 19 | - | - | 2 | - | 4 | 7 | - | 1 | - | 5 | - | |
| 85 + | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 146 Oropharynx | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 87 | 1 | 1 | 3 | 3 | 31 | 34 | 3 | 4 | 2 | 5 | - | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35-44 | 5 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 45-54 | 13 | - | - | - | 1 | 7 | 4 | - | 1 | - | - | - | |
| 55-64 | 30 | - | 1 | 3 | 1 | 8 | 12 | 1 | - | 1 | 3 | - | |
| 65-74 | 26 | 1 | - | - | 1 | 8 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | |
| 75-84 | 7 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | |
| 85 + | 6 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 147 Nasopharynx | | | | | | | | | | | | | |
| 147 Rhinopharynx | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 58 | 1 | - | 4 | - | 9 | 14 | 1 | 5 | 8 | 15 | - | |
| 0-24 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35-44 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | |
| 45-54 | 10 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - | |
| 55-64 | 19 | - | - | 1 | - | 4 | 7 | - | 3 | 3 | 1 | - | |
| 65-74 | 14 | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | - | |
| 75-84 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 148 Hypopharynx | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 62 | - | - | 1 | - | 23 | 22 | 6 | 2 | 1 | 7 | - | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45-54 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 55-64 | 26 | - | - | 1 | - | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | |
| 65-74 | 22 | - | - | - | - | 11 | 9 | 1 | - | - | 1 | - | |
| 75-84 | 8 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 3 | - | |
| 85 + | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 149 Other and ill-defined sites | | | | | | | | | | | | | |
| 149 Sièges autres et mal définis | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 146 | 2 | 2 | 4 | 2 | 53 | 51 | 6 | 4 | 8 | 16 | - | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35-44 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| 45-54 | 15 | - | 1 | - | - | 5 | 5 | - | 2 | - | 2 | - | |
| 55-64 | 50 | - | - | 1 | 1 | 15 | 19 | 3 | 1 | 2 | 8 | - | |
| 65-74 | 44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 14 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | |
| 75-84 | 27 | - | - | - | - | 12 | 12 | - | - | 2 | 1 | - | |
| 85 + | 7 | - | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 150 Esophagus | | | | | | | | | | | | | |
| 150 Desophage | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 736 | 16 | 2 | 21 | 27 | 150 | 309 | 43 | 31 | 54 | 84 | - | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 35-44 | 15 | - | - | - | 1 | 5 | 5 | - | - | 2 | 2 | - | |
| 45-54 | 71 | - | - | 4 | 5 | 13 | 28 | 5 | 1 | 8 | 7 | - | |
| 55-64 | 181 | 2 | 1 | 4 | 7 | 39 | 83 | 10 | 5 | 10 | 20 | - | |
| 65-74 | 263 | 2 | - | 9 | 10 | 48 | 116 | 18 | 11 | 21 | 27 | - | |
| 75-84 | 167 | 9 | 1 | 3 | 4 | 36 | 62 | 8 | 12 | 9 | 23 | - | |
| 85 + | 37 | 1 | - | 1 | - | 8 | 14 | 2 | 2 | 4 | 5 | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

TABLE 14. Number of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 14. Nombre de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | N.W.T. |
|---|---|----------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|---------|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | |
| | T.-N. | I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | | | | | Alb. | C.-B. | T.N.-O. |
| Number of deaths - Nombre de décès | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | |
| 145 Other and unspecified parts of mouth | | | | | | | | | | | |
| 145 Autre parties non précisée de la bouche | | | | | | | | | | | |
| Total | 41 | - | - | 3 | 1 | 6 | 24 | - | 4 | 1 | 2 |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 55-64 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 1 | 1 |
| 65-74 | 10 | - | - | 1 | - | 1 | 5 | - | 2 | - | 1 |
| 75-84 | 12 | - | - | - | 1 | 2 | 8 | - | 1 | - | - |
| 85 + | 7 | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 146 Oropharynx | | | | | | | | | | | |
| Total | 29 | - | - | - | - | 2 | 15 | 4 | - | - | 7 |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 25-34 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 35-44 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 45-54 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 55-64 | 9 | - | - | - | - | 1 | 5 | 2 | - | - | 1 |
| 65-74 | 7 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | - |
| 75-84 | 9 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 3 | 1 |
| 85 + | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 147 Nasopharynx | | | | | | | | | | | |
| 147 Rhinopharynx | | | | | | | | | | | |
| Total | 28 | 2 | 1 | - | 2 | 6 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 0-24 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 25-34 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 45-54 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 55-64 | 6 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 1 |
| 65-74 | 8 | - | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
| 75-84 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 148 Hypopharynx | | | | | | | | | | | |
| Total | 7 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 65-74 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 75-84 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 Other and ill-defined sites | | | | | | | | | | | |
| 149 Sièges autres et mal définis | | | | | | | | | | | |
| Total | 43 | - | - | 4 | 1 | 13 | 14 | 2 | - | 2 | 7 |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 8 | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
| 55-64 | 8 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | 1 |
| 65-74 | 11 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | - | - | - | 5 |
| 75-84 | 14 | - | - | 1 | - | 4 | 6 | 1 | - | 2 | - |
| 85 + | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| N.S./N.P. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 Esophagus | | | | | | | | | | | |
| 150 Oesophage | | | | | | | | | | | |
| Total | 273 | 3 | - | 12 | 5 | 46 | 113 | 13 | 10 | 20 | 51 |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| 35-44 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 45-54 | 15 | 1 | - | - | - | 1 | 8 | - | - | 1 | 4 |
| 55-64 | 58 | - | - | 1 | 1 | 14 | 17 | 1 | 2 | 8 | 14 |
| 65-74 | 85 | 1 | - | 3 | 4 | 12 | 40 | 8 | 1 | 4 | 12 |
| 75-84 | 63 | - | - | 3 | - | 12 | 28 | 1 | 2 | 5 | 12 |
| 85 + | 45 | - | - | 5 | - | 5 | 18 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

TABLE 14. Number of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 14. Nombre de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | | N.W.T. T.N.-O. | |
|---|---|----------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | | |
| | T.-N. | I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | | | | | Alb. | C.-B. | | | |
| Number of deaths - Nombre de décès | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | | |
| 151 Stomach | | | | | | | | | | | | | |
| 151 Estomac | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1,305 | 49 | 7 | 54 | 41 | 348 | 429 | 63 | 63 | 97 | 152 | 1 | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | |
| 35-44 | 36 | 2 | - | 2 | 2 | 10 | 11 | - | 1 | 5 | 3 | - | |
| 45-54 | 103 | 5 | - | 4 | 3 | 22 | 37 | 5 | 6 | 9 | 11 | 1 | |
| 55-64 | 254 | 10 | 2 | 14 | 6 | 79 | 78 | 6 | 12 | 18 | 28 | - | |
| 65-74 | 420 | 14 | 4 | 11 | 19 | 109 | 139 | 22 | 17 | 31 | 54 | - | |
| 75-84 | 359 | 9 | 1 | 15 | 8 | 97 | 123 | 21 | 18 | 25 | 42 | - | |
| 85 + | 128 | 8 | - | 8 | 3 | 30 | 40 | 9 | 9 | 8 | 13 | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 152 Small intestine, including duodenum | | | | | | | | | | | | | |
| 152 Intestin grêle, y compris le duodénum | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 57 | 1 | - | 2 | 2 | 14 | 17 | 5 | 5 | 3 | 8 | - | |
| 0-24 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 35-44 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| 45-54 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | |
| 55-64 | 12 | - | - | - | - | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 65-74 | 16 | - | - | - | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | |
| 75-84 | 13 | - | - | 1 | - | 1 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | |
| 85 + | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 153 Colon | | | | | | | | | | | | | |
| 153 Côlon | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2,216 | 47 | 8 | 65 | 55 | 629 | 848 | 107 | 82 | 141 | 233 | - | |
| 0-24 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| 25-34 | 8 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | |
| 35-44 | 58 | 2 | - | 1 | - | 25 | 18 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | |
| 45-54 | 171 | 4 | - | 5 | 2 | 54 | 68 | 4 | 4 | 14 | 16 | - | |
| 55-64 | 441 | 8 | - | 12 | 11 | 148 | 162 | 18 | 14 | 30 | 37 | - | |
| 65-74 | 706 | 24 | 5 | 17 | 15 | 199 | 280 | 32 | 17 | 44 | 73 | - | |
| 75-84 | 629 | 9 | 1 | 26 | 19 | 153 | 241 | 35 | 35 | 37 | 73 | - | |
| 85 + | 200 | - | 2 | 4 | 7 | 47 | 76 | 16 | 10 | 9 | 29 | - | |
| N.S./N.P. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 154 Rectum, rectosigmoid junction and anus | | | | | | | | | | | | | |
| 154 Rectum, jonction recto- sigmoïdienne et anus | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 777 | 11 | 3 | 22 | 20 | 258 | 274 | 44 | 31 | 45 | 69 | - | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| 35-44 | 20 | 2 | - | - | - | 8 | 6 | - | - | 1 | 3 | - | |
| 45-54 | 67 | 3 | - | 3 | 1 | 22 | 20 | 1 | - | 7 | 10 | - | |
| 55-64 | 163 | - | 1 | 5 | 3 | 55 | 63 | 10 | 4 | 10 | 12 | - | |
| 65-74 | 253 | 5 | 1 | 4 | 14 | 87 | 76 | 16 | 12 | 17 | 21 | - | |
| 75-84 | 209 | 1 | 1 | 9 | 1 | 67 | 78 | 15 | 12 | 7 | 18 | - | |
| 85 + | 62 | - | - | 1 | 1 | 19 | 28 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 155 Liver and intrahepatic bile ducts | | | | | | | | | | | | | |
| 155 Foie et voies biliaires intrahépatiques | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 492 | 10 | 2 | 16 | 14 | 131 | 178 | 24 | 14 | 45 | 66 | - | |
| 0-24 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| 25-34 | 8 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | |
| 35-44 | 21 | - | - | 1 | - | 4 | 10 | 1 | - | - | 5 | - | |
| 45-54 | 44 | 1 | - | - | 3 | 13 | 19 | 1 | - | 4 | 3 | - | |
| 55-64 | 111 | 2 | 1 | 3 | - | 28 | 47 | 5 | 2 | 11 | 12 | - | |
| 65-74 | 175 | 4 | - | 3 | 5 | 52 | 58 | 8 | 5 | 16 | 24 | - | |
| 75-84 | 106 | 3 | - | 8 | 5 | 24 | 27 | 6 | 5 | 10 | 18 | - | |
| 85 + | 24 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

TABLE 14. Number of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 14. Nombre de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | | N.W.T. | | | | |
|---|---|--------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|---------|--------|--|--|--|--|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | | | | | |
| | T.-N. I.-P.-É | N.-É. | N.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | T.N.-O. | | | | | |
| Number of deaths - Nombre de décès | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 Stomach | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 Estomac | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 795 | 31 | 12 | 38 | 15 | 235 | 272 | 35 | 38 | 49 | 84 | - | | | | |
| 0-24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | | | | |
| 25-34 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | | | | |
| 35-44 | 15 | - | - | 1 | - | 6 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | - | | | | |
| 45-54 | 38 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 10 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | | | | |
| 55-64 | 95 | 5 | - | 4 | 1 | 25 | 38 | 6 | 6 | 4 | 7 | 1 | | | | |
| 65-74 | 211 | 7 | 3 | 7 | 6 | 74 | 69 | 5 | 7 | 14 | 19 | - | | | | |
| 75-84 | 282 | 14 | 4 | 8 | 5 | 83 | 97 | 15 | 11 | 12 | 33 | - | | | | |
| 85 + | 148 | 4 | 2 | 7 | 2 | 39 | 54 | 5 | 6 | 13 | 16 | - | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 152 Small intestine, including duodenum | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 Intestin grêle, y compris le duodénum | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 39 | 1 | - | 3 | 1 | 13 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 25-34 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 35-44 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 45-54 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 55-64 | 7 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | | | | |
| 65-74 | 14 | 1 | - | 1 | - | 5 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | | | | |
| 75-84 | 14 | - | - | - | - | 4 | 6 | 2 | 1 | - | 1 | - | | | | |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 153 Colon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 Côlon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2,215 | 46 | 11 | 73 | 56 | 667 | 809 | 82 | 86 | 133 | 251 | - | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 25-34 | 10 | 1 | - | - | - | 2 | 6 | - | - | 1 | - | - | | | | |
| 35-44 | 47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 11 | 2 | - | 2 | 8 | - | | | | |
| 45-54 | 136 | 4 | - | 2 | 3 | 39 | 50 | 6 | 9 | 11 | 12 | - | | | | |
| 55-64 | 349 | 10 | - | 9 | 5 | 121 | 125 | 12 | 11 | 19 | 37 | - | | | | |
| 65-74 | 575 | 12 | 1 | 22 | 10 | 170 | 221 | 17 | 19 | 35 | 68 | - | | | | |
| 75-84 | 692 | 10 | 7 | 19 | 20 | 204 | 261 | 27 | 26 | 41 | 79 | - | | | | |
| 85 + | 406 | 7 | 2 | 20 | 17 | 112 | 135 | 18 | 23 | 24 | 47 | 1 | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 154 Rectum, rectosigmoid junction and anus | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 Rectum, jonction recto- sigmoïdienne et anus | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 577 | 8 | - | 19 | 10 | 187 | 216 | 26 | 15 | 34 | 62 | - | | | | |
| 0-24 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 25-34 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 35-44 | 15 | - | - | - | - | 2 | 10 | - | - | 2 | 1 | - | | | | |
| 45-54 | 35 | 1 | - | 2 | - | 10 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | | | | |
| 55-64 | 81 | 1 | - | 2 | - | 39 | 25 | 2 | 1 | 5 | 6 | - | | | | |
| 65-74 | 164 | 3 | - | 5 | 5 | 48 | 59 | 10 | 2 | 10 | 22 | - | | | | |
| 75-84 | 175 | 3 | - | 5 | 1 | 66 | 59 | 7 | 5 | 10 | 19 | - | | | | |
| 85 + | 105 | - | - | 5 | 4 | 21 | 51 | 4 | 4 | 5 | 11 | - | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 155 Liver and intrahepatic bile ducts | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 Foie et voies biliaires intrahépatiques | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 349 | 9 | - | 14 | 11 | 104 | 115 | 11 | 13 | 35 | 37 | - | | | | |
| 0-24 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | | | | |
| 25-34 | 6 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | | | | |
| 35-44 | 9 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 2 | 2 | - | | | | |
| 45-54 | 26 | - | - | - | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | | | | |
| 55-64 | 62 | - | - | 2 | 2 | 16 | 26 | 2 | 1 | 5 | 8 | - | | | | |
| 65-74 | 103 | 1 | - | 5 | 2 | 34 | 38 | 1 | 3 | 9 | 10 | - | | | | |
| 75-84 | 94 | 3 | - | 2 | 5 | 25 | 30 | 4 | 7 | 8 | 10 | - | | | | |
| 85 + | 45 | 3 | - | 4 | 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 7 | 2 | - | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |

TABLE 14. Number of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 14. Nombre de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | | N.W.T. T.N.-O. |
|---|---|--------|------------------------|---------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. T.-N. I.-P.-É. | N.B. N.-É. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | |
| | | | | | | | | | Alb. | C.-B. | | |
| Number of deaths - Nombre de décès | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 156 Gallbladder and extrahepatic bile ducts | | | | | | | | | | | | |
| 156 Vésicule et voies biliaires extrahépatiques | Total | 205 | 3 | 2 | 3 | 5 | 65 | 63 | 9 | 6 | 15 | 34 |
| | 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 25-34 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 35-44 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| | 45-54 | 10 | - | - | - | - | 3 | 5 | 1 | - | - | 1 |
| | 55-64 | 34 | - | - | 1 | 1 | 8 | 14 | 3 | - | 2 | 5 |
| | 65-74 | 78 | 3 | - | 1 | 2 | 25 | 22 | 3 | 3 | 4 | 15 |
| | 75-84 | 57 | - | 2 | 1 | 2 | 19 | 14 | 2 | 1 | 7 | 9 |
| | 85 + | 22 | - | - | - | - | 8 | 7 | - | 2 | 2 | 3 |
| | N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 157 Pancreas | | | | | | | | | | | | |
| 157 Pancréas | Total | 1,329 | 21 | 12 | 55 | 42 | 332 | 463 | 71 | 50 | 117 | 164 |
| | 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | 25-34 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| | 35-44 | 26 | - | - | 3 | - | 7 | 13 | 1 | 1 | 1 | - |
| | 45-54 | 108 | 2 | - | 4 | 2 | 34 | 37 | 4 | 2 | 10 | 13 |
| | 55-64 | 275 | 5 | 3 | 12 | 10 | 75 | 99 | 11 | 7 | 22 | 29 |
| | 65-74 | 468 | 5 | 4 | 18 | 14 | 123 | 170 | 25 | 20 | 37 | 52 |
| | 75-84 | 351 | 6 | 4 | 14 | 12 | 76 | 112 | 23 | 15 | 32 | 57 |
| | 85 + | 98 | 3 | 1 | 4 | 4 | 17 | 31 | 6 | 5 | 14 | 13 |
| | N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 158 Retroperitoneum and peritoneum | | | | | | | | | | | | |
| 158 Tissu rétropéritonéal et péritoine | Total | 48 | 1 | - | - | - | 17 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| | 0-24 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| | 25-34 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| | 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 45-54 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| | 55-64 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 65-74 | 13 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 3 |
| | 75-84 | 8 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | - | 1 | - | - |
| | 85 + | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| | N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 159 Other and ill-defined sites | | | | | | | | | | | | |
| 159 Sièges autres ou non précisés | Total | 659 | 18 | 15 | 48 | 33 | 120 | 240 | 30 | 34 | 35 | 85 |
| | 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 25-34 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 35-44 | 13 | - | 3 | - | - | 5 | 3 | - | 1 | - | - |
| | 45-54 | 42 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | 3 | 3 | - | 6 |
| | 55-64 | 134 | 3 | 3 | 10 | 6 | 23 | 56 | 3 | 5 | 7 | 18 |
| | 65-74 | 205 | 6 | 3 | 18 | 10 | 42 | 69 | 10 | 8 | 12 | 27 |
| | 75-84 | 192 | 3 | 5 | 16 | 10 | 28 | 70 | 10 | 11 | 14 | 25 |
| | 85 + | 72 | 4 | - | 3 | 3 | 14 | 27 | 4 | 6 | 2 | 8 |
| | N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 160 Nasal cavities, middle ear and sinuses | | | | | | | | | | | | |
| 160 Fosses nasales, de l'oreille moyenne et sinuses annexes | Total | 36 | - | - | 1 | 2 | 10 | 17 | - | - | 3 | 3 |
| | 0-24 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 25-34 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 35-44 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| | 45-54 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
| | 55-64 | 9 | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | 1 | - |
| | 65-74 | 10 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - |
| | 75-84 | 5 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - |
| | 85 + | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| | N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

TABLE 14. Number of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 14. Nombre de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | | N.W.T. T.N.-O. | |
|--|---|--------|-----------------------|---------------|------|------|------|-------|-------|------|---------------------|-------------------|--|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. T.-N. I.-P.-É | N.B. N.-É. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon Alb. C.-B. | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Number of deaths - Nombre de décès | | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | | |
| 156 Gallbladder and extrahepatic bile ducts | | | | | | | | | | | | | |
| 156 Vésicule et voies biliaires extrahépatiques | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 305 | 9 | 2 | 10 | 3 | 95 | 92 | 14 | 14 | 20 | 46 | - | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 35-44 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 45-54 | 12 | 1 | - | - | 1 | 6 | 2 | - | - | - | 2 | - | |
| 55-64 | 47 | 3 | 1 | 3 | - | 16 | 12 | 4 | 3 | - | 5 | - | |
| 65-74 | 101 | 4 | - | 5 | 1 | 35 | 25 | 4 | 5 | 8 | 14 | - | |
| 75-84 | 86 | - | - | - | - | 23 | 31 | 5 | 4 | 7 | 16 | - | |
| 85 + | 54 | - | 1 | 2 | 1 | 15 | 20 | 1 | 2 | 4 | 8 | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 157 Pancreas | | | | | | | | | | | | | |
| 157 Pancréas | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1,282 | 18 | 10 | 53 | 31 | 334 | 450 | 56 | 73 | 82 | 175 | - | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | |
| 35-44 | 25 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | - | 6 | - | |
| 45-54 | 61 | 1 | - | 3 | 1 | 16 | 21 | 2 | 4 | 6 | 7 | - | |
| 55-64 | 187 | 2 | 2 | 6 | 4 | 62 | 65 | 8 | 12 | 9 | 17 | - | |
| 65-74 | 432 | 7 | 4 | 18 | 10 | 102 | 153 | 18 | 20 | 33 | 67 | - | |
| 75-84 | 393 | 4 | 2 | 16 | 9 | 104 | 128 | 20 | 29 | 21 | 60 | - | |
| 85 + | 181 | 3 | 2 | 9 | 6 | 45 | 72 | 7 | 6 | 13 | 18 | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 158 Retropertitoneum and peritoneum | | | | | | | | | | | | | |
| 158 Tissu rétropéritonéal et péritoine | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 57 | 2 | - | 1 | - | 15 | 25 | 2 | 4 | 5 | 3 | - | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 35-44 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 45-54 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
| 55-64 | 12 | - | - | 1 | - | 4 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 65-74 | 17 | - | - | - | - | 5 | 8 | - | - | 3 | 1 | - | |
| 75-84 | 18 | 1 | - | - | - | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | |
| 85 + | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 159 Other and ill-defined sites | | | | | | | | | | | | | |
| 159 Sièges autres ou non précisés | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 672 | 20 | 9 | 44 | 33 | 151 | 245 | 29 | 27 | 42 | 72 | - | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 35-44 | 13 | 2 | - | 1 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 45-54 | 43 | 2 | - | 5 | - | 12 | 14 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | |
| 55-64 | 81 | 4 | 2 | 4 | 3 | 18 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | - | |
| 65-74 | 175 | 5 | 2 | 9 | 7 | 30 | 71 | 8 | 5 | 18 | 20 | - | |
| 75-84 | 209 | 4 | 3 | 16 | 14 | 47 | 76 | 9 | 9 | 6 | 25 | - | |
| 85 + | 150 | 3 | 2 | 9 | 8 | 39 | 49 | 9 | 8 | 8 | 15 | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 160 Nasal cavities, middle ear and sinuses | | | | | | | | | | | | | |
| 160 Fosses nasales, de l'oreille moyenne et sinuses annexes | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 20 | - | - | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35-44 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 45-54 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 55-64 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 65-74 | 7 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | |
| 75-84 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 85 + | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

TABLE 14. Number of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 14. Nombre de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| Canada | Nfld. | P.E.I. | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | N.W.T. | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------|---|----------------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | | | | | | | | | | | | |
| | | | T.-N. I.-P.-É | N.-É. N.-B. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Number of deaths - Nombre de décès | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 161 Larynx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 434 | 6 | 3 | 17 | 5 | 174 | 130 | 23 | 18 | 24 | 34 | - | | | | | | | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 35-44 | 8 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | | | | | | | | | | | |
| 45-54 | 45 | - | 1 | 3 | - | 20 | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | | | | | | | | | | | |
| 55-64 | 138 | 2 | 1 | 4 | 2 | 57 | 41 | 8 | 5 | 9 | 9 | - | | | | | | | | | | | |
| 65-74 | 126 | 4 | - | 5 | 2 | 46 | 40 | 9 | 7 | 6 | 7 | - | | | | | | | | | | | |
| 75-84 | 95 | - | 1 | 4 | 1 | 41 | 27 | 4 | 4 | 3 | 10 | - | | | | | | | | | | | |
| 85 + | 22 | - | - | - | - | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | | | | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 162 Trachea, bronchus and lung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 Trachée, des bronches et du poumon | 9,536 | 163 | 50 | 376 | 274 | 3,052 | 3,302 | 346 | 322 | 580 | 1,051 | 6 | | | | | | | | | | | |
| Total | 9,536 | 163 | 50 | 376 | 274 | 3,052 | 3,302 | 346 | 322 | 580 | 1,051 | 6 | | | | | | | | | | | |
| 0-24 | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 25-34 | 9 | - | - | - | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 35-44 | 140 | 2 | - | 2 | 4 | 52 | 49 | 7 | 3 | 6 | 14 | - | | | | | | | | | | | |
| 45-54 | 745 | 14 | 6 | 33 | 12 | 276 | 257 | 19 | 20 | 42 | 63 | - | | | | | | | | | | | |
| 55-64 | 2,346 | 36 | 10 | 75 | 68 | 798 | 836 | 84 | 72 | 146 | 215 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 65-74 | 3,573 | 63 | 19 | 150 | 106 | 1,145 | 1,235 | 124 | 125 | 222 | 379 | 3 | | | | | | | | | | | |
| 75-84 | 2,265 | 44 | 10 | 96 | 69 | 654 | 763 | 90 | 84 | 130 | 320 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 85 + | 455 | 4 | 4 | 20 | 15 | 125 | 153 | 22 | 18 | 34 | 60 | - | | | | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 163 Pleura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 Plèvre | 77 | 1 | - | 2 | - | 36 | 15 | 2 | 2 | 3 | 16 | - | | | | | | | | | | | |
| Total | 77 | 1 | - | 2 | - | 36 | 15 | 2 | 2 | 3 | 16 | - | | | | | | | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 25-34 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 35-44 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | | | | | | | | | | | |
| 45-54 | 17 | - | - | - | - | 9 | 5 | - | - | 1 | 2 | - | | | | | | | | | | | |
| 55-64 | 13 | 1 | - | 1 | - | 6 | 2 | - | - | - | 3 | - | | | | | | | | | | | |
| 65-74 | 23 | - | - | - | - | 12 | 5 | - | - | 1 | 5 | - | | | | | | | | | | | |
| 75-84 | 18 | - | - | 1 | - | 8 | 2 | - | 1 | 1 | 5 | - | | | | | | | | | | | |
| 85 + | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 164 Thymus, heart and mediastinum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Thymus, cœur et médiastin | 32 | - | - | 2 | - | 8 | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | | | | | | | | | | | |
| Total | 32 | - | - | 2 | - | 8 | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | | | | | | | | | | | |
| 0-24 | 5 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | | | | | | | | | | | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 35-44 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 45-54 | 7 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | | | | | | | | | | | |
| 55-64 | 5 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | | | | | | | | | | | |
| 65-74 | 8 | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | | | | | | | | | | | |
| 75-84 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | | | | | | | | | | | |
| 85 + | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 165 Other and ill-defined sites | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Sièges autres ou non précisés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | |

TABLE 14. Number of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 14. Nombre de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| | Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | N.W.T. | |
|--|--------|---|--------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|---------|--|
| | | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | | |
| | | T.-N. I.-P.-É | N.-É. | N.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | T.N.-O. | |
| Number of deaths - Nombre de décès | | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | | |
| 161 Larynx | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 79 | 2 | - | 4 | - | 29 | 27 | 1 | 2 | 6 | 10 | - | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45-54 | 7 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 2 | - | |
| 55-64 | 25 | - | - | - | - | 9 | 12 | - | - | 2 | 2 | - | |
| 65-74 | 29 | - | - | 1 | - | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | |
| 75-84 | 15 | 2 | - | 3 | - | 6 | 5 | - | - | 1 | - | - | |
| 85 + | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 162 Trachea, bronchus and lung | | | | | | | | | | | | | |
| 162 Trachée, des bronches et du poumon | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 4,168 | 40 | 28 | 175 | 116 | 1,054 | 1,546 | 179 | 116 | 266 | 640 | 3 | |
| 0-24 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | 24 | - | - | 1 | - | 13 | 6 | 1 | 1 | - | 2 | - | |
| 35-44 | 122 | - | - | 4 | - | 45 | 46 | 2 | 2 | 7 | 16 | - | |
| 45-54 | 431 | 5 | 5 | 17 | 21 | 113 | 152 | 21 | 11 | 26 | 60 | - | |
| 55-64 | 979 | 9 | 7 | 54 | 22 | 257 | 373 | 34 | 27 | 65 | 128 | 3 | |
| 65-74 | 1,468 | 15 | 8 | 56 | 44 | 358 | 535 | 54 | 39 | 97 | 258 | 2 | |
| 75-84 | 912 | 9 | 7 | 32 | 22 | 214 | 346 | 53 | 26 | 58 | 144 | 1 | |
| 85 + | 230 | 2 | 1 | 11 | 7 | 53 | 87 | 14 | 10 | 13 | 32 | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 163 Pleura | | | | | | | | | | | | | |
| 163 Plèvre | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 17 | - | - | - | 1 | 7 | 7 | - | 1 | - | 1 | - | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45-54 | 4 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 55-64 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| 65-74 | 6 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 75-84 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | |
| 85 + | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 164 Thymus, heart and mediastinum | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Thymus, cœur et médiastin | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 22 | - | - | 2 | 2 | 7 | 6 | - | - | 2 | 3 | - | |
| 0-24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 25-34 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 35-44 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 45-54 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 55-64 | 5 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | |
| 65-74 | 10 | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 1 | - | |
| 75-84 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 85 + | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 165 Other and ill-defined sites | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Sièges autres ou non précisés | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55-64 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

TABLE 14. Number of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 14. Nombre de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | N.W.T. |
|--|---|--------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|---------|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | |
| | T.-N. I.-P.-É | N.-É. | N.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | T.N.-O. |
| Number of deaths - Nombre de décès | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | |
| 170 Bone and articular cartilage | | | | | | | | | | | |
| 170 Os et cartilage articulaire | | | | | | | | | | | |
| Total | 73 | 1 | - | 1 | 3 | 30 | 25 | - | 2 | 5 | 6 |
| 0-24 | 24 | - | - | - | 1 | 7 | 16 | - | - | - | - |
| 25-34 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 35-44 | 6 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 45-54 | 5 | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - |
| 55-64 | 14 | - | - | 1 | - | 7 | 3 | - | - | 2 | 1 |
| 65-74 | 7 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 1 | - |
| 75-84 | 8 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 3 |
| 85 + | 6 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 171 Connective and other soft tissue | | | | | | | | | | | |
| 171 Tissu conjonctif et autres tissus mous | | | | | | | | | | | |
| Total | 132 | - | 1 | 6 | 4 | 45 | 36 | 3 | 8 | 16 | 13 |
| 0-24 | 13 | - | - | 1 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | 1 |
| 25-34 | 8 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 3 | - |
| 35-44 | 10 | - | - | 2 | - | 3 | 2 | - | - | 2 | 1 |
| 45-54 | 14 | - | - | - | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | - |
| 55-64 | 29 | - | 1 | 2 | - | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 65-74 | 33 | - | - | 1 | - | 17 | 5 | - | 2 | 5 | 3 |
| 75-84 | 19 | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 85 + | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 2 |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 172 Malignant melanoma of skin | | | | | | | | | | | |
| 172 Mélanome malin de la peau | | | | | | | | | | | |
| Total | 318 | 1 | 3 | 15 | 11 | 62 | 132 | 7 | 11 | 23 | 53 |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 19 | - | 1 | - | - | 2 | 6 | - | 1 | 3 | 6 |
| 35-44 | 45 | - | - | 3 | - | 7 | 16 | 1 | 3 | 4 | 11 |
| 45-54 | 54 | - | - | - | 2 | 18 | 18 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 55-64 | 66 | - | - | 6 | 2 | 10 | 34 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 65-74 | 65 | - | 2 | 5 | 3 | 15 | 20 | 1 | 2 | 5 | 12 |
| 75-84 | 51 | 1 | - | 1 | 3 | 10 | 24 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 85 + | 18 | - | - | - | 1 | - | 14 | 1 | - | 1 | 1 |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 173 Other of skin | | | | | | | | | | | |
| 173 Autres de la peau | | | | | | | | | | | |
| Total | 92 | 4 | - | 3 | 1 | 36 | 23 | 2 | 3 | 7 | 13 |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 35-44 | 6 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 45-54 | 8 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 55-64 | 9 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 1 | - | 1 |
| 65-74 | 21 | 1 | - | 1 | - | 6 | 6 | 1 | - | 2 | 4 |
| 75-84 | 26 | 1 | - | 2 | - | 11 | 7 | - | 1 | 3 | 2 |
| 85 + | 20 | 1 | - | - | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 174 Female breast | | | | | | | | | | | |
| 174 Sein chez la femme | | | | | | | | | | | |
| Total | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

TABLE 14. Number of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 14. Nombre de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | Nfld. | P.E.I. | M.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | N.W.T. |
| | T.-N. I.-P.-É | N.-É. | N.-B. | | | | | | | Yukon | |
| Number of deaths - Nombre de décès | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | |
| 170 Bone and articular cartilage | | | | | | | | | | | |
| 170 Os et cartilage articulaire | | | | | | | | | | | |
| Total | 44 | - | - | - | 1 | - | 23 | 10 | 2 | 1 | 2 |
| 0-24 | 7 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 |
| 25-34 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 35-44 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 45-54 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - |
| 55-64 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - |
| 65-74 | 12 | - | - | - | - | - | 6 | 3 | - | 1 | 2 |
| 75-84 | 8 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | 1 |
| 85 + | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 171 Connective and other soft tissue | | | | | | | | | | | |
| 171 Tissu conjonctif et autres tissus mous | | | | | | | | | | | |
| Total | 118 | 3 | 2 | 7 | 5 | 33 | 30 | 10 | 3 | 15 | 10 |
| 0-24 | 9 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 2 |
| 25-34 | 9 | - | - | 1 | - | 5 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 35-44 | 13 | - | - | 2 | - | 4 | 2 | - | - | 4 | 1 |
| 45-54 | 12 | - | - | - | - | 5 | 3 | 1 | - | 3 | - |
| 55-64 | 15 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 65-74 | 23 | 2 | - | - | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 75-84 | 30 | - | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 4 | - | 2 | 1 |
| 85 + | 7 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 172 Malignant melanoma of skin | | | | | | | | | | | |
| 172 Mélanome malin de la peau | | | | | | | | | | | |
| Total | 179 | - | - | 8 | 3 | 39 | 67 | 14 | 9 | 13 | 26 |
| 0-24 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 25-34 | 11 | - | - | - | - | 3 | 4 | 2 | - | 1 | 1 |
| 35-44 | 24 | - | - | 2 | - | 6 | 8 | - | 2 | 3 | 5 |
| 45-54 | 28 | - | - | 2 | - | 7 | 10 | 3 | - | 1 | 5 |
| 55-64 | 26 | - | - | 2 | - | 6 | 9 | 4 | 1 | - | 2 |
| 65-74 | 37 | - | - | 1 | - | 7 | 14 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 75-84 | 38 | - | - | - | 1 | 10 | 16 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 85 + | 13 | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 2 | - | 2 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 173 Other of skin | | | | | | | | | | | |
| 173 Autres de la peau | | | | | | | | | | | |
| Total | 43 | 1 | - | - | - | 14 | 20 | - | - | 2 | 6 |
| 0-24 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 65-74 | 5 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - |
| 75-84 | 9 | 1 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 2 | - |
| 85 + | 23 | - | - | - | - | 6 | 13 | - | - | 2 | 2 |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 174 Female breast | | | | | | | | | | | |
| 174 Sein chez la femme | | | | | | | | | | | |
| Total | 4,712 | 70 | 21 | 184 | 114 | 1,289 | 1,775 | 200 | 183 | 318 | 556 |
| 0-24 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 25-34 | 65 | 2 | - | 5 | - | 15 | 28 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 35-44 | 374 | 6 | 1 | 11 | 6 | 113 | 143 | 10 | 7 | 38 | 39 |
| 45-54 | 618 | 7 | - | 22 | 15 | 174 | 241 | 30 | 19 | 42 | 68 |
| 55-64 | 1,067 | 16 | 6 | 42 | 17 | 281 | 404 | 38 | 34 | 76 | 132 |
| 65-74 | 1,205 | 14 | 8 | 54 | 58 | 318 | 446 | 53 | 52 | 75 | 146 |
| 75-84 | 962 | 16 | 3 | 39 | 23 | 269 | 354 | 44 | 47 | 59 | 108 |
| 85 + | 440 | 9 | 3 | 11 | 15 | 119 | 158 | 22 | 23 | 23 | 57 |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

TABLE 14. Number of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 14. Nombre de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | N.W.T. T.N.-O. | |
|--|---|--------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------------------|---|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | |
| | T.-N. I.-P.-É | N.-É. | N.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | |
| Number of deaths - Nombre de décès | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | |
| 175 Male breast | | | | | | | | | | | |
| 175 Sein chez l'homme | | | | | | | | | | | |
| Total | 41 | - | - | - | 2 | 2 | 13 | 14 | 1 | 2 | 5 |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 55-64 | 7 | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | - | - | - |
| 65-74 | 13 | - | - | - | 1 | - | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 75-84 | 16 | - | - | - | - | 2 | 3 | 7 | - | 3 | 1 |
| 85 + | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 179 Uterus, NOS | | | | | | | | | | | |
| 179 Utérus, SAI | | | | | | | | | | | |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 180 Cervix uteri | | | | | | | | | | | |
| 180 Col de l'utérus | | | | | | | | | | | |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 181 Placenta | | | | | | | | | | | |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 182 Body of uterus | | | | | | | | | | | |
| 182 Corps de l'utérus | | | | | | | | | | | |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 183 Ovary and other uterine adnexa | | | | | | | | | | | |
| 183 Ovaire et autres annexes de l'utérus | | | | | | | | | | | |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

TABLE 14. Number of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 14. Nombre de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | N.W.T. |
| | T.-N. I.-P.-É | N.-É. | N.-B. | | | | | | | Yukon | |
| Number of deaths - Nombre de décès | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | |
| 175 Male breast | | | | | | | | | | | |
| 175 Sein chez l'homme | | | | | | | | | | | |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 179 Uterus, NOS | | | | | | | | | | | |
| 179 Utérus, SAI | | | | | | | | | | | |
| Total | 265 | 5 | 2 | 2 | 16 | 95 | 57 | 18 | 14 | 19 | 36 |
| 0-24 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 25-34 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 35-44 | 7 | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 1 | - |
| 45-54 | 20 | 1 | - | - | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 55-64 | 43 | 2 | - | - | 3 | 18 | 10 | 3 | - | 4 | 3 |
| 65-74 | 75 | 1 | - | 1 | 5 | 25 | 17 | 6 | 5 | 4 | 11 |
| 75-84 | 78 | 1 | 1 | - | 3 | 31 | 18 | 4 | 5 | 3 | 11 |
| 85 + | 39 | - | 1 | 1 | 3 | 11 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 180 Cervix uteri | | | | | | | | | | | |
| 180 Col de l'utérus | | | | | | | | | | | |
| Total | 443 | 9 | - | 21 | 16 | 89 | 201 | 17 | 18 | 29 | 43 |
| 0-24 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - |
| 25-34 | 25 | - | - | 3 | 1 | 6 | 9 | - | 1 | 3 | 2 |
| 35-44 | 66 | - | - | 4 | 1 | 11 | 28 | 5 | 1 | 9 | 7 |
| 45-54 | 63 | 1 | - | 1 | 4 | 14 | 29 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 55-64 | 73 | 2 | - | 2 | 3 | 13 | 41 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 65-74 | 95 | 2 | - | 5 | 4 | 20 | 37 | 4 | 5 | 4 | 14 |
| 75-84 | 78 | 2 | - | 4 | 3 | 17 | 37 | 4 | 3 | - | 8 |
| 85 + | 37 | 1 | - | 2 | - | 7 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 181 Placenta | | | | | | | | | | | |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 182 Body of uterus | | | | | | | | | | | |
| 182 Corps de l'utérus | | | | | | | | | | | |
| Total | 341 | 6 | - | 7 | 3 | 97 | 154 | 12 | 6 | 26 | 30 |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 35-44 | 7 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| 45-54 | 11 | - | - | - | - | 4 | 6 | 1 | - | - | - |
| 55-64 | 51 | 1 | - | 1 | 1 | 18 | 20 | 1 | 3 | 5 | - |
| 65-74 | 118 | 4 | - | 1 | - | 26 | 61 | 2 | 3 | 9 | 12 |
| 75-84 | 112 | - | - | 3 | 2 | 35 | 47 | 6 | 1 | 9 | 9 |
| 85 + | 41 | - | - | 2 | - | 11 | 17 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 183 Ovary and other uterine adnexa | | | | | | | | | | | |
| 183 Ovaire et autres annexes de l'utérus | | | | | | | | | | | |
| Total | 1,222 | 14 | 4 | 51 | 27 | 299 | 471 | 59 | 51 | 85 | 159 |
| 0-24 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 25-34 | 18 | 1 | - | 3 | - | 4 | 4 | 2 | - | 2 | - |
| 35-44 | 49 | - | - | - | - | 14 | 16 | - | 3 | 4 | 12 |
| 45-54 | 146 | 3 | - | 7 | 4 | 34 | 58 | 4 | 8 | 12 | 15 |
| 55-64 | 259 | 3 | - | 11 | 4 | 75 | 101 | 14 | 7 | 16 | 27 |
| 65-74 | 349 | 4 | 2 | 11 | 5 | 83 | 140 | 14 | 11 | 26 | 53 |
| 75-84 | 296 | 3 | - | 13 | 12 | 66 | 110 | 18 | 17 | 21 | 36 |
| 85 + | 103 | - | 2 | 6 | 2 | 22 | 42 | 7 | 4 | 4 | 14 |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

TABLE 14. Number of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 14. Nombre de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| | Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | N.W.T. | | |
|--|--------|---|-------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|--------|--|--|
| | | Nfld. T.-N. | P.E.I. I.-P.-É | N.S. N.-É. | N.B. N.-B. | Qué. - | Ont. - | Man. - | Sask. - | Alta. - | B.C. - | | | |
| Number of deaths - Nombre de décès | | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 Female genital organs, other and NOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 Organes génitaux féminins, autres et SAI | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 185 Prostate | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 3,212 | 61 | 26 | 126 | 92 | 753 | 1,129 | 182 | 172 | 253 | 415 | 3 | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 35-44 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | | |
| 45-54 | 37 | 1 | - | 3 | 1 | 7 | 12 | - | 4 | 4 | 5 | - | | |
| 55-64 | 278 | 2 | 1 | 9 | 5 | 71 | 108 | 12 | 12 | 18 | 40 | - | | |
| 65-74 | 945 | 16 | 12 | 36 | 26 | 239 | 335 | 46 | 40 | 79 | 115 | 1 | | |
| 75-84 | 1,379 | 32 | 11 | 53 | 48 | 307 | 473 | 89 | 77 | 109 | 179 | 1 | | |
| 85 + | 570 | 10 | 2 | 25 | 12 | 126 | 201 | 35 | 39 | 43 | 76 | 1 | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 186 Testis | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 Testicule | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 37 | - | - | 2 | 1 | 8 | 16 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | | |
| 0-24 | 6 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | | |
| 25-34 | 12 | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - | - | 2 | - | | |
| 35-44 | 6 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | | |
| 45-54 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | | |
| 55-64 | 5 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | | |
| 65-74 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | | |
| 75-84 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | | |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 187 Other male genital organs | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 Autres organes génitaux masculins | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 40 | 1 | - | 1 | 1 | 11 | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | | |
| 0-24 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 35-44 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | | |
| 45-54 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | | |
| 55-64 | 12 | - | - | 1 | - | 1 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | | |
| 65-74 | 10 | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | | |
| 75-84 | 5 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | | |
| 85 + | 8 | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | - | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 188 Bladder | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 Vessie | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 821 | 18 | 6 | 25 | 25 | 202 | 311 | 40 | 30 | 68 | 102 | 2 | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 25-34 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | | |
| 35-44 | 10 | - | - | - | - | 2 | 5 | - | 2 | 1 | - | - | | |
| 45-54 | 27 | - | - | - | - | 10 | 6 | - | 2 | 2 | 7 | - | | |
| 55-64 | 118 | 6 | - | 1 | 3 | 33 | 52 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | | |
| 65-74 | 220 | 1 | - | 2 | 8 | 49 | 94 | 13 | 6 | 19 | 28 | - | | |
| 75-84 | 293 | 9 | 2 | 18 | 9 | 77 | 99 | 13 | 10 | 18 | 37 | 1 | | |
| 85 + | 151 | 2 | 4 | 4 | 5 | 31 | 53 | 8 | 7 | 14 | 23 | - | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

TABLE 14. Number of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 14. Nombre de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| Canada | | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | N.W.T. |
|---|-----|---|--------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|---------|
| | | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | |
| | | T.-N. I.-P.-É | N.-É. | N.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | T.N.-O. |
| Number of deaths - Nombre de décès | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 184 Female genital organs, other and NOS | | | | | | | | | | | | |
| 184 Organes génitaux féminins, autres et SAI | | | | | | | | | | | | |
| Total | 102 | 1 | 1 | 6 | 4 | 24 | 40 | 7 | 3 | 7 | 9 | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 45-54 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - |
| 55-64 | 10 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 65-74 | 24 | - | - | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | - | 2 | 1 | - |
| 75-84 | 23 | 1 | - | 1 | - | 6 | 11 | 1 | - | - | 3 | - |
| 85 + | 34 | - | 1 | 2 | 1 | 7 | 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 185 Prostate | | | | | | | | | | | | |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 186 Testis | | | | | | | | | | | | |
| 186 Testicule | | | | | | | | | | | | |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 187 Other male genital organs | | | | | | | | | | | | |
| 187 Autres organes génitaux masculins | | | | | | | | | | | | |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 188 Bladder | | | | | | | | | | | | |
| 188 Vessie | | | | | | | | | | | | |
| Total | 366 | 10 | 2 | 14 | 12 | 117 | 114 | 14 | 12 | 23 | 48 | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
| 45-54 | 7 | - | - | 1 | - | 2 | 7 | 9 | - | 1 | 2 | - |
| 55-64 | 27 | 1 | - | - | 2 | 4 | 31 | 15 | 1 | 2 | 5 | - |
| 65-74 | 77 | 2 | - | 3 | 4 | 30 | 55 | 8 | 3 | 7 | 11 | - |
| 75-84 | 150 | 2 | - | 6 | 5 | 40 | 55 | 8 | 3 | 11 | 20 | - |
| 85 + | 103 | 5 | 2 | 4 | 1 | 36 | 32 | 3 | 5 | 3 | 12 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

TABLE 14. Number of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 14. Nombre de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|-------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. | | | | | | | |
| | T.-N. T.-P.-É | N.-É. | N.-B. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Number of deaths - Nombre de décès | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 Kidney and other urinary organs NOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 Rein et organes urinaires autres ou SAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 711 | 14 | 7 | 34 | 24 | 188 | 238 | 29 | 31 | 55 | 91 | - | | | | | | | |
| 0-24 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 25-34 | 6 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | | | | | | | |
| 35-44 | 20 | 1 | - | 2 | 1 | 7 | 5 | - | - | 1 | 3 | - | | | | | | | |
| 45-54 | 75 | 1 | - | 4 | 1 | 24 | 28 | 4 | 1 | 8 | 4 | - | | | | | | | |
| 55-64 | 152 | 4 | 4 | 9 | 1 | 45 | 54 | 7 | - | 9 | 19 | - | | | | | | | |
| 65-74 | 231 | 5 | - | 6 | 15 | 56 | 75 | 10 | 15 | 15 | 34 | - | | | | | | | |
| 75-84 | 178 | 2 | 3 | 9 | 5 | 46 | 60 | 6 | 10 | 11 | 26 | - | | | | | | | |
| 85 + | 48 | 1 | - | 4 | 1 | 8 | 13 | 2 | 3 | 11 | 5 | - | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 190 Eye | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 Oeil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 22 | - | - | - | 1 | 6 | 10 | - | 3 | - | 2 | - | | | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 35-44 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | | | | | | | |
| 45-54 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 55-64 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 65-74 | 9 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | | | | | | | |
| 75-84 | 5 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | | | | | | | |
| 85 + | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 191 Brain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 Encéphale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 742 | 11 | 5 | 21 | 24 | 196 | 284 | 31 | 26 | 56 | 89 | 1 | | | | | | | |
| 0-24 | 45 | 1 | - | 1 | 3 | 15 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | - | | | | | | | |
| 25-34 | 39 | 1 | - | 2 | 1 | 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | - | | | | | | | |
| 35-44 | 72 | 3 | - | 3 | - | 19 | 26 | 3 | 1 | 9 | 8 | - | | | | | | | |
| 45-54 | 111 | 1 | 1 | 4 | 5 | 20 | 53 | 5 | 3 | 5 | 13 | 1 | | | | | | | |
| 55-64 | 197 | 3 | 4 | 5 | 5 | 56 | 77 | 9 | 9 | 11 | 18 | - | | | | | | | |
| 65-74 | 193 | 1 | - | 5 | 6 | 50 | 77 | 8 | 5 | 15 | 26 | - | | | | | | | |
| 75-84 | 69 | 1 | - | - | 3 | 17 | 27 | 2 | 3 | 5 | 11 | - | | | | | | | |
| 85 + | 16 | - | - | 1 | 1 | 5 | 6 | - | - | 1 | 2 | - | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 192 Other parts of nervous system | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 192 Autres parties du système nerveux | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 23 | - | - | 1 | - | 4 | 9 | - | - | 4 | 5 | - | | | | | | | |
| 0-24 | 6 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | | | | | | | |
| 25-34 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | | | | | | | |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 45-54 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 55-64 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 65-74 | 5 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | | | | | | | |
| 75-84 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | | | | | | | |
| 85 + | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 193 Thyroid gland | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 Corps thyroïde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 41 | - | - | 1 | 2 | 13 | 16 | 1 | - | 3 | 5 | - | | | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 35-44 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 45-54 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | | | | | | | |
| 55-64 | 13 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 3 | 2 | - | | | | | | | |
| 65-74 | 9 | - | - | - | 1 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - | | | | | | | |
| 75-84 | 12 | - | - | 1 | - | 3 | 6 | 1 | - | - | 1 | - | | | | | | | |
| 85 + | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |

TABLE 14. Number of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 14. Nombre de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | | N.W.T. |
|--|---|--------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|---------|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | |
| T.-N. I.-P.-É | N.-É. | N.-B. | | | | | | | | Alb. | C.-B. | T.N.-O. |
| Number of deaths - Nombre de décès | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 189 Kidney and other urinary organs NOS | | | | | | | | | | | | |
| 189 Rein et organes urinaires autres ou SAI | | | | | | | | | | | | |
| Total | 464 | 14 | 4 | 20 | 17 | 109 | 160 | 27 | 14 | 38 | 59 | 2 |
| 0-24 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 25-34 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 15 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 45-54 | 40 | 4 | - | 1 | 1 | 9 | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 | - |
| 55-64 | 76 | 3 | - | 3 | 3 | 24 | 24 | 4 | 1 | 9 | 5 | - |
| 65-74 | 121 | 5 | 1 | 6 | 4 | 24 | 38 | 7 | 7 | 7 | 22 | - |
| 75-84 | 132 | 1 | 1 | 8 | 5 | 30 | 49 | 6 | 2 | 11 | 19 | - |
| 85 + | 75 | - | 2 | 1 | 3 | 17 | 25 | 6 | 3 | 8 | 9 | 1 |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 190 Eye | | | | | | | | | | | | |
| 190 Oeil | | | | | | | | | | | | |
| Total | 23 | 2 | - | 1 | - | 5 | 11 | - | 1 | 2 | 1 | - |
| 0-24 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 65-74 | 6 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
| 75-84 | 7 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - |
| 85 + | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 191 Brain | | | | | | | | | | | | |
| 191 Encéphale | | | | | | | | | | | | |
| Total | 570 | 14 | 6 | 17 | 11 | 153 | 222 | 17 | 17 | 61 | 72 | - |
| 0-24 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | - | 2 | 5 | 2 | - |
| 25-34 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 46 | - | 1 | 3 | - | 8 | 21 | 1 | 3 | 4 | 5 | - |
| 45-54 | 69 | 2 | - | 2 | - | 17 | 24 | 6 | 3 | 2 | 13 | - |
| 55-64 | 132 | 4 | - | 1 | 3 | 41 | 47 | 2 | 3 | 14 | 17 | - |
| 65-74 | 155 | - | 2 | 5 | 3 | 43 | 64 | 3 | 5 | 11 | 19 | - |
| 75-84 | 92 | 4 | 1 | 3 | 2 | 26 | 34 | 3 | 1 | 4 | 14 | - |
| 85 + | 26 | 2 | - | - | 1 | 8 | 10 | 2 | - | 1 | 2 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 192 Other parts of nervous system | | | | | | | | | | | | |
| 192 Autres parties du système nerveux | | | | | | | | | | | | |
| Total | 13 | - | - | - | - | 3 | 8 | 1 | - | 1 | - | - |
| 0-24 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 65-74 | 7 | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| 75-84 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 193 Thyroid gland | | | | | | | | | | | | |
| 193 Corps thyroïde | | | | | | | | | | | | |
| Total | 72 | 3 | - | 2 | 2 | 21 | 28 | 4 | 2 | 4 | 6 | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 6 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - |
| 55-64 | 7 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | - |
| 65-74 | 21 | - | - | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - |
| 75-84 | 24 | 2 | - | 1 | 1 | 9 | 9 | - | - | 2 | - | - |
| 85 + | 12 | - | - | - | - | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

TABLE 14. Number of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 14. Nombre de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | N.W.T. |
| | T.-N. | I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | | | | | Alb. | C.-B. | Yukon |
| Number of deaths - Nombre de décès | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | |
| 194 Other endocrine glands and related structures | | | | | | | | | | | |
| 194 Autres glandes endocrines et structures apparentes | | | | | | | | | | | |
| Total | 40 | - | 2 | 2 | - | 14 | 16 | 3 | 1 | 1 | - |
| 0-24 | 13 | - | 1 | 1 | - | 3 | 6 | 1 | - | 1 | - |
| 25-34 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 6 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - |
| 45-54 | 5 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 55-64 | 6 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 65-74 | 8 | - | - | - | 1 | - | 4 | 3 | - | - | - |
| 75-84 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 195 Other and ill-defined sites | | | | | | | | | | | |
| 195 Sièges autres et mal définis | | | | | | | | | | | |
| Total | 48 | 2 | - | 1 | 5 | - | 18 | 3 | 3 | 8 | 8 |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 55-64 | 10 | - | - | - | 1 | - | 6 | 1 | - | 1 | 1 |
| 65-74 | 7 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 |
| 75-84 | 14 | - | - | - | 3 | - | 6 | - | 1 | 2 | 2 |
| 85 + | 14 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 196 Lymph nodes, secondary and NOS | | | | | | | | | | | |
| 196 Ganglion lymphatiques, secondaires et SAI | | | | | | | | | | | |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 197 Secondary, respiratory and digestive | | | | | | | | | | | |
| 197 Secondaires, respiratoire et digestif | | | | | | | | | | | |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 198 Secondary of other specified sites | | | | | | | | | | | |
| 198 Secundaire d'autres sièges précisés | | | | | | | | | | | |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

TABLE 14. Number of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 14. Nombre de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|-------|------|------|------|------|-------|-------|------|--------|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | N.W.T. |
| | T.-N. I.-P.-É | N.-É. | M.-B. | | | | | | Yukon | Alb. | C.-B. |
| Number of deaths - Nombre de décès | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | |
| 194 Other endocrine glands and related structures | | | | | | | | | | | |
| 194 Autres glandes endocrines et structures apparentes | | | | | | | | | | | |
| Total | 46 | - | - | 2 | 4 | 16 | 13 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 0-24 | 12 | - | - | 1 | 2 | 4 | 4 | - | 1 | - | - |
| 25-34 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - |
| 35-44 | 5 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
| 45-54 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | 12 | - | - | - | 1 | 4 | 6 | - | 1 | - | - |
| 65-74 | 6 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - |
| 75-84 | 8 | - | - | 1 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | - |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 195 Other and ill-defined sites | | | | | | | | | | | |
| 195 Sièges autres et mal définis | | | | | | | | | | | |
| Total | 86 | 7 | 1 | 5 | 3 | - | 37 | 4 | 4 | 12 | 12 |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 45-54 | 4 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - |
| 55-64 | 9 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | 2 | - |
| 65-74 | 18 | - | - | 4 | - | - | 6 | - | 2 | 3 | 2 |
| 75-84 | 28 | 4 | - | 1 | 1 | - | 13 | 2 | - | 5 | 4 |
| 85 + | 25 | 2 | 1 | - | 1 | - | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 196 Lymph nodes, secondary and NOS | | | | | | | | | | | |
| 196 Ganglion lymphatiques, secondaires et SAI | | | | | | | | | | | |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 197 Secondary, respiratory and digestive | | | | | | | | | | | |
| 197 Secondaires, respiratoire et digestif | | | | | | | | | | | |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 198 Secondary of other specified sites | | | | | | | | | | | |
| 198 Secondaire d'autres sièges précisés | | | | | | | | | | | |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

TABLE 14. Number of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 14. Nombre de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | | N.W.T. T.N.-O. |
|--|---|--------|-----------------------|---------------|---------------|------|------|-------|-------|------|-------|-------------------|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. T.-N. I.-P.-É | N.B. N.-É. | Qué. N.-B. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | |
| | Alb. | C.-B. | | | | | | | | | | |
| Number of deaths - Nombre de décès | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 199 Site unspecified | | | | | | | | | | | | |
| 199 Siège non précisé | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1,313 | 39 | 4 | 82 | 40 | 228 | 502 | 62 | 65 | 109 | 177 | 2 |
| 0-24 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| 25-34 | 17 | 2 | - | - | 1 | 2 | 8 | - | 1 | 2 | 1 | - |
| 35-44 | 23 | - | - | 1 | - | 7 | 9 | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 45-54 | 90 | 1 | 1 | 8 | 3 | 12 | 39 | 3 | 3 | 6 | 14 | - |
| 55-64 | 241 | 5 | 1 | 12 | 10 | 46 | 102 | 11 | 8 | 12 | 34 | - |
| 65-74 | 451 | 17 | 2 | 31 | 11 | 70 | 173 | 24 | 21 | 37 | 61 | 1 |
| 75-84 | 368 | 12 | - | 24 | 11 | 69 | 131 | 16 | 16 | 39 | 50 | - |
| 85 + | 118 | 2 | - | 5 | 4 | 21 | 39 | 8 | 12 | 11 | 16 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 Lymphosarcoma and reticulosarcoma | | | | | | | | | | | | |
| 200 Lymphosarcome et réticulosarcome | | | | | | | | | | | | |
| Total | 96 | 2 | - | 2 | 2 | 45 | 24 | - | 7 | 5 | 7 | - |
| 0-24 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 4 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 5 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 11 | - | - | - | - | 7 | 5 | - | - | 1 | - | - |
| 55-64 | 18 | - | - | - | - | 8 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 65-74 | 30 | 1 | - | 1 | 1 | 16 | 4 | - | 1 | 3 | 3 | - |
| 75-84 | 21 | 1 | - | - | 1 | 6 | 7 | - | 5 | - | 1 | - |
| 85 + | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 201 Hodgkin's disease | | | | | | | | | | | | |
| 201 Maladie de Hodgkin | | | | | | | | | | | | |
| Total | 98 | - | - | 5 | 4 | 38 | 26 | 5 | 4 | 7 | 9 | - |
| 0-24 | 6 | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - |
| 25-34 | 13 | - | - | - | - | 6 | 5 | 1 | - | 2 | 1 | - |
| 35-44 | 14 | - | - | - | - | 7 | 5 | - | - | 1 | 1 | - |
| 45-54 | 6 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 55-64 | 18 | - | - | 3 | 1 | 9 | 5 | - | 1 | - | 1 | - |
| 65-74 | 16 | - | - | - | 1 | 8 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 75-84 | 20 | - | - | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | - | 4 | - |
| 85 + | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 202 Other of lymphoid and histiocytic tissue | | | | | | | | | | | | |
| 202 Autres des tissus lymphoïdes et histiocytaires | | | | | | | | | | | | |
| Total | 846 | 6 | 1 | 39 | 24 | 199 | 342 | 38 | 42 | 68 | 86 | - |
| 0-24 | 14 | - | - | 1 | - | 6 | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
| 25-34 | 22 | - | - | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
| 35-44 | 41 | - | - | 2 | 1 | 9 | 16 | 1 | - | 4 | 7 | - |
| 45-54 | 94 | 2 | - | 5 | 1 | 38 | 21 | 3 | 3 | 9 | 12 | - |
| 55-64 | 175 | 2 | - | 9 | 3 | 41 | 80 | 7 | 11 | 12 | 10 | - |
| 65-74 | 223 | - | 1 | 9 | 8 | 40 | 103 | 13 | 6 | 17 | 26 | - |
| 75-84 | 208 | 1 | - | 9 | 8 | 39 | 85 | 8 | 15 | 21 | 22 | - |
| 85 + | 69 | 1 | - | 3 | 1 | 19 | 25 | 4 | 4 | 4 | 8 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 203 Multiple myeloma and immunoproliferative neoplasms | | | | | | | | | | | | |
| 203 Myélose multiple et tumeurs immuno-prolifératives | | | | | | | | | | | | |
| Total | 499 | 7 | 3 | 11 | 12 | 118 | 187 | 25 | 26 | 42 | 67 | 1 |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 11 | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - |
| 45-54 | 33 | 1 | - | 1 | 2 | 6 | 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | - |
| 55-64 | 99 | 1 | - | 2 | 2 | 28 | 35 | 3 | 4 | 11 | 13 | - |
| 65-74 | 162 | 1 | 2 | 3 | 4 | 40 | 68 | 6 | 7 | 10 | 20 | 1 |
| 75-84 | 143 | 4 | 1 | 3 | 4 | 29 | 46 | 18 | 10 | 11 | 25 | - |
| 85 + | 51 | - | - | - | - | 13 | 21 | 2 | 4 | 5 | 6 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

TABLE 14. Number of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 14. Nombre de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | | N.W.T. | |
|--|---|--------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|---------|--------|--|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | | |
| | T.-N.-I.-P.-É | N.-É. | N.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | T.N.-O. | | |
| Number of deaths - Nombre de décès | | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | | |
| 199 Site unspecified | | | | | | | | | | | | | |
| 199 Siège non précisé | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1,160 | 32 | 9 | 64 | 41 | 219 | 462 | 68 | 48 | 95 | 127 | 2 | |
| 0-24 | 4 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 35-44 | 26 | - | - | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | |
| 45-54 | 60 | - | - | 3 | 2 | 8 | 29 | - | 3 | 4 | 11 | - | |
| 55-64 | 174 | 3 | - | 6 | 5 | 36 | 69 | 8 | 11 | 19 | 17 | 2 | |
| 65-74 | 315 | 8 | 4 | 23 | 16 | 58 | 124 | 16 | 11 | 26 | 28 | 1 | |
| 75-84 | 369 | 16 | 3 | 15 | 13 | 77 | 134 | 19 | 14 | 34 | 44 | - | |
| 85 + | 208 | 4 | 2 | 14 | 6 | 38 | 89 | 16 | 7 | 9 | 25 | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 200 Lymphosarcoma and reticulosarcoma | | | | | | | | | | | | | |
| 200 Lymphosarcome et réticulosarcome | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 83 | - | - | 2 | 3 | 43 | 21 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | |
| 0-24 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 25-34 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| 35-44 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 45-54 | 6 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
| 55-64 | 14 | - | - | 1 | - | 9 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
| 65-74 | 18 | - | - | - | - | 8 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| 75-84 | 25 | - | - | 1 | 2 | 14 | 5 | - | 1 | - | 2 | - | |
| 85 + | 10 | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 201 Hodgkin's disease | | | | | | | | | | | | | |
| 201 Maladie de Hodgkin | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 64 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 28 | 3 | 3 | 1 | 7 | - | |
| 0-24 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | 16 | - | - | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | - | - | - | - | |
| 35-44 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 45-54 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| 55-64 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | |
| 65-74 | 18 | - | 1 | - | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | - | 2 | - | |
| 75-84 | 16 | - | - | - | - | 3 | 9 | - | 1 | 1 | 2 | - | |
| 85 + | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 202 Other of lymphoid and histiocytic tissue | | | | | | | | | | | | | |
| 202 Autres des tissus lymphoïdes et histiocytaires | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 763 | 13 | 2 | 29 | 27 | 192 | 294 | 46 | 27 | 49 | 84 | - | |
| 0-24 | 7 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 25-34 | 12 | 1 | - | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 35-44 | 16 | 2 | - | 2 | - | 4 | 4 | - | - | 3 | 1 | - | |
| 45-54 | 65 | 1 | - | 2 | 5 | 17 | 18 | 4 | 2 | 7 | 9 | - | |
| 55-64 | 111 | 1 | - | 1 | 4 | 35 | 40 | 7 | 2 | 11 | 10 | - | |
| 65-74 | 222 | 2 | 1 | 10 | 8 | 50 | 101 | 10 | 12 | 12 | 16 | - | |
| 75-84 | 248 | 6 | 1 | 6 | 8 | 59 | 98 | 16 | 9 | 12 | 33 | - | |
| 85 + | 82 | - | - | 6 | 2 | 22 | 27 | 8 | 1 | 2 | 14 | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 203 Multiple myeloma and immunoproliferative neoplasms | | | | | | | | | | | | | |
| 203 Myélome multiple et tumeurs immuno-prolifératives | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 425 | 5 | 4 | 21 | 11 | 110 | 152 | 27 | 18 | 31 | 46 | - | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35-44 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 45-54 | 23 | 1 | - | 1 | 1 | 10 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | - | |
| 55-64 | 72 | - | 1 | 6 | 3 | 21 | 26 | 1 | 1 | 6 | 7 | - | |
| 65-74 | 138 | 1 | 1 | 4 | 2 | 35 | 50 | 5 | 11 | 13 | 16 | - | |
| 75-84 | 142 | 3 | 1 | 10 | 2 | 33 | 52 | 15 | 4 | 6 | 16 | - | |
| 85 + | 48 | - | - | 1 | - | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 5 | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

TABLE 14. Number of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 14. Nombre de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | | N.W.T. T.N.-O. | |
|--|---|-------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------|-------------------|--|
| | Nfld. T.-N. | P.E.I. I.-P.-É | N.S. N.-É. | N.B. N.-B. | Qué. Québec | Ont. Ontario | Man. Manitoba | Sask. Saskatchewan | Alta. Alberta | B.C. Colombie-Britannique | Yukon | | |
| Number of deaths - Nombre de décès | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | | |
| 204 Lymphoid leukemia | | | | | | | | | | | | | |
| 204 Leucémie lymphoïde | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 327 | 6 | 2 | 9 | 4 | 94 | 138 | 6 | 7 | 29 | 34 | - | |
| 0-24 | 39 | 2 | - | - | - | 11 | 16 | 1 | 1 | 6 | 2 | - | |
| 25-34 | 8 | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | |
| 35-44 | 6 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | |
| 45-54 | 9 | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | 1 | - | - | |
| 55-64 | 49 | - | - | 2 | - | 21 | 15 | - | 2 | 4 | 5 | - | |
| 65-74 | 90 | 2 | - | 3 | - | 23 | 42 | 1 | 1 | 8 | 10 | - | |
| 75-84 | 93 | - | 2 | 2 | 2 | 28 | 38 | 3 | 2 | 6 | 10 | - | |
| 85 + | 33 | - | - | 1 | 2 | 6 | 13 | 1 | - | 3 | 7 | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 205 Myeloid leukemia | | | | | | | | | | | | | |
| 205 Leucémie myéloïde | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 341 | 11 | - | 10 | 2 | 72 | 149 | 16 | 12 | 25 | 44 | - | |
| 0-24 | 11 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | |
| 25-34 | 17 | 2 | - | - | - | 6 | 3 | 1 | - | 3 | 2 | - | |
| 35-44 | 25 | - | - | - | - | 4 | 15 | 1 | - | 1 | 4 | - | |
| 45-54 | 35 | 2 | - | - | - | 7 | 25 | - | - | - | 1 | - | |
| 55-64 | 72 | 2 | - | 2 | 1 | 17 | 32 | 4 | 1 | 2 | 11 | - | |
| 65-74 | 80 | 2 | - | 2 | 1 | 15 | 31 | 5 | 6 | 3 | 15 | - | |
| 75-84 | 72 | 3 | - | 5 | - | 15 | 30 | 2 | 3 | 7 | 7 | - | |
| 85 + | 29 | - | - | - | - | 6 | 11 | 2 | 1 | 5 | 4 | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 206 Monocytic leukemia | | | | | | | | | | | | | |
| 206 Leucémie monocyttaire | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 17 | - | - | 1 | - | 6 | 5 | 1 | - | - | 4 | - | |
| 0-24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35-44 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55-64 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 65-74 | 7 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | |
| 75-84 | 5 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | |
| 85 + | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 207 Other specified leukemia | | | | | | | | | | | | | |
| 207 Autres leucémies précises | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | |
| 0-24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55-64 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75-84 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 208 Leukemia of unspecified cell type | | | | | | | | | | | | | |
| 208 Leucémie à cellules non précisées | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 316 | 3 | 2 | 12 | 9 | 118 | 105 | 16 | 14 | 12 | 25 | - | |
| 0-24 | 16 | - | - | - | - | 5 | 3 | 1 | - | 4 | 3 | - | |
| 25-34 | 11 | - | - | - | - | 7 | 3 | - | 1 | - | - | - | |
| 35-44 | 8 | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 45-54 | 23 | - | - | 1 | - | 12 | 8 | - | - | 2 | - | - | |
| 55-64 | 42 | - | - | - | 2 | 14 | 15 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | |
| 65-74 | 90 | 2 | - | 6 | 2 | 31 | 27 | 8 | 4 | 3 | 7 | - | |
| 75-84 | 97 | 1 | 1 | 5 | 5 | 33 | 33 | 4 | 6 | 2 | 7 | - | |
| 85 + | 29 | - | 1 | - | - | 10 | 14 | 1 | - | 1 | 2 | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

TABLE 14. Number of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990
 TABLEAU 14. Nombre de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres,
 le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | N.W.T. | | | | | |
|--|---|--------|-------|------|------|------|------|-------|-------|---------|--------|--|--|--|--|--|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | | | | | | |
| | T.-N. I.-P.-É | N.-É. | N.-B. | Alb. | | | | | C.-B. | T.N.-O. | | | | | | |
| Number of deaths - Nombre de décès | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 Lymphoid leukemia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 Leucémie lymphoïde | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 213 | 3 | . | 7 | 9 | 52 | 88 | 8 | 4 | 26 | 23 | | | | | |
| 0-24 | 24 | - | - | 1 | - | 9 | 11 | 1 | - | 2 | - | | | | | |
| 25-34 | 7 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | | | | | |
| 35-44 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | | | | | |
| 45-54 | 13 | - | - | - | - | 4 | 5 | 2 | - | 1 | - | | | | | |
| 55-64 | 25 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | - | 6 | 2 | | | | | |
| 65-74 | 37 | 1 | - | 1 | 3 | 11 | 10 | - | 1 | 4 | 6 | | | | | |
| 75-84 | 63 | 1 | - | 3 | 4 | 15 | 21 | 2 | 1 | 8 | 8 | | | | | |
| 85 + | 41 | - | - | - | - | 8 | 20 | 2 | 2 | 5 | 4 | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 205 Myeloid leukemia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 Leucémie myéloïde | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 326 | 3 | 1 | 12 | 10 | 57 | 151 | 12 | 14 | 24 | 42 | | | | | |
| 0-24 | 15 | 2 | - | - | 1 | 3 | 6 | 2 | - | - | 1 | | | | | |
| 25-34 | 9 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 1 | 1 | | | | | |
| 35-44 | 28 | - | - | 3 | 1 | 5 | 14 | - | 1 | 4 | - | | | | | |
| 45-54 | 34 | - | - | - | 3 | 4 | 19 | - | 2 | 1 | 5 | | | | | |
| 55-64 | 49 | 1 | 1 | - | 1 | 13 | 23 | - | 2 | 3 | 5 | | | | | |
| 65-74 | 79 | - | - | 4 | 1 | 10 | 25 | 7 | 8 | 8 | 16 | | | | | |
| 75-84 | 73 | - | - | 2 | 1 | 14 | 39 | 3 | 1 | 6 | 7 | | | | | |
| 85 + | 39 | - | - | 3 | 2 | 8 | 18 | - | - | 5 | 3 | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 206 Monocytic leukemia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 Leucémie monocytaire | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 11 | - | - | 1 | - | 6 | 6 | - | 1 | - | 1 | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 35-44 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | | | | | |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 55-64 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | | | | | |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 75-84 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | | | | | |
| 85 + | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 207 Other specified leukemia | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 Autres leucémies précises | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 75-84 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | | | | | |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 208 Leukemia of unspecified cell type | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 Leucémie à cellules non précisées | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 261 | 4 | 4 | 7 | 13 | 97 | 88 | 10 | 11 | 12 | 15 | | | | | |
| 0-24 | 11 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | | | | | |
| 25-34 | 3 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | | | | | |
| 35-44 | 9 | - | - | 1 | - | 5 | 1 | - | - | 2 | - | | | | | |
| 45-54 | 19 | - | - | 2 | - | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | | | | | |
| 55-64 | 31 | 1 | - | - | - | 16 | 8 | 2 | - | 2 | 2 | | | | | |
| 65-74 | 64 | - | 1 | 1 | 2 | 20 | 28 | 2 | 6 | - | 4 | | | | | |
| 75-84 | 72 | 2 | - | 1 | 5 | 25 | 27 | 2 | 3 | 5 | - | | | | | |
| 85 + | 52 | - | 2 | 2 | 4 | 17 | 17 | 3 | 1 | 4 | 2 | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

TABLE 15. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause,
Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)
TABLEAU 15. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9
suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | | | N.W.T. T.N.-O. |
|---|---|---------|-----------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. T.-N. I.-P.-É | N.B. N.-É. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | | |
| | | | | | | | | | | | | Alb. | C.-B. |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | | |
| 140 to 208 All cancers | | | | | | | | | | | | | |
| 140 à 208 Tous les cancers | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 245.3 | 245.5 | 267.2 | 271.0 | 255.5 | 285.0 | 236.4 | 241.1 | 221.4 | 219.6 | 213.6 | 267.3 | 227.9 |
| Crude/Brut | 209.5 | 185.2 | 260.3 | 248.3 | 225.4 | 232.7 | 202.0 | 231.6 | 228.8 | 155.8 | 203.8 | 109.0 | 83.7 |
| 0-24 | 4.5 | 3.5 | 7.9 | 5.4 | 4.3 | 5.5 | 4.3 | 3.8 | 4.6 | 5.0 | 3.0 | - | - |
| 25-34 | 9.2 | 12.2 | 9.3 | 4.8 | 7.6 | 11.2 | 8.2 | 7.1 | 10.4 | 10.7 | 8.1 | - | 15.5 |
| 35-44 | 32.5 | 26.5 | 41.2 | 38.9 | 25.6 | 38.8 | 31.1 | 28.4 | 28.4 | 25.2 | 31.2 | 34.8 | 43.1 |
| 45-54 | 148.6 | 149.1 | 171.0 | 181.2 | 138.1 | 175.8 | 143.6 | 130.5 | 143.9 | 120.3 | 123.7 | 120.6 | 166.1 |
| 55-64 | 503.7 | 443.1 | 636.2 | 582.9 | 533.2 | 594.1 | 492.9 | 515.0 | 452.5 | 405.5 | 403.1 | 309.6 | 592.2 |
| 65-74 | 1,151.0 | 1,157.4 | 1,315.8 | 1,198.4 | 1,257.9 | 1,317.3 | 1,084.0 | 1,129.2 | 960.4 | 1,062.8 | 963.9 | 1,522.8 | 1,036.3 |
| 75-84 | 1,999.6 | 2,109.7 | 1,909.5 | 2,272.9 | 2,114.4 | 2,275.7 | 1,910.1 | 1,922.4 | 1,862.5 | 1,822.4 | 1,858.3 | 2,205.9 | 1,694.9 |
| 85 + | 2,810.0 | 2,861.1 | 2,435.1 | 2,865.4 | 2,572.2 | 3,266.8 | 2,761.8 | 2,902.3 | 2,612.8 | 2,569.0 | 2,526.4 | 3,846.2 | 1,754.4 |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 Lip | | | | | | | | | | | | | |
| 140 Lèvre | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.1 | 0.7 | - | 0.2 | - | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - | 0.1 | - | - |
| Crude/Brut | 0.1 | 0.3 | - | 0.2 | - | -- | 0.1 | 0.4 | 0.2 | - | 0.1 | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | 0.4 | - | - | - | - | - | 0.6 | 2.7 | - | - | - | - | - |
| 75-84 | 1.8 | - | - | 6.8 | - | - | 2.9 | 5.1 | - | - | 1.8 | - | - |
| 85 + | 4.7 | 69.8 | - | - | - | 5.8 | 3.3 | - | 18.8 | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 Tongue | | | | | | | | | | | | | |
| 141 Langue | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 1.1 | - | - | 0.5 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | - | - |
| Crude/Brut | 1.0 | - | - | 0.6 | 1.9 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | - | - |
| 0-24 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - |
| 25-34 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - |
| 35-44 | 0.3 | - | - | - | - | 0.5 | 0.4 | - | - | - | 0.4 | - | - |
| 45-54 | 1.4 | - | - | - | 5.3 | 1.8 | 1.1 | 3.7 | - | 1.6 | 1.1 | - | - |
| 55-64 | 3.3 | - | - | 5.4 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 2.2 | 2.3 | 4.2 | 3.4 | - | - |
| 65-74 | 4.3 | - | - | - | 8.6 | 3.0 | 6.4 | - | - | 3.2 | 5.4 | - | - |
| 75-84 | 5.5 | - | - | - | 17.5 | 7.0 | 7.9 | - | - | 7.0 | - | - | - |
| 85 + | 8.3 | - | - | - | - | 11.7 | 9.9 | - | 18.8 | 13.7 | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 142 Major salivary glands | | | | | | | | | | | | | |
| 142 Glandes salivaires principales | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.3 | - | - | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | - | 0.1 | 0.2 | - | 2.8 |
| Crude/Brut | 0.3 | - | - | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | - | 0.1 | 0.2 | - | 3.2 |
| 0-24 | -- | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 15.5 |
| 35-44 | 0.2 | - | - | - | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | - | - | 0.4 | - | - |
| 45-54 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | 0.8 | - | - | - | 3.4 | 1.3 | 0.7 | - | - | - | 1.3 | - | - |
| 65-74 | 0.8 | - | - | 3.4 | 4.3 | - | 1.3 | - | - | 1.6 | - | - | - |
| 75-84 | 2.1 | - | - | 13.5 | - | 3.5 | 1.4 | - | - | - | 1.8 | - | - |
| 85 + | 4.7 | - | - | - | 39.6 | 5.8 | 3.3 | 21.3 | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 143 Gum | | | | | | | | | | | | | |
| 143 Goncives | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.1 | - | - | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
| Crude/Brut | 0.1 | - | - | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 0.1 | - | - | - | 2.7 | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | 0.3 | - | - | - | - | 0.7 | 0.2 | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | 0.5 | - | - | - | - | 0.5 | 1.0 | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | 0.8 | - | - | 6.8 | - | 1.2 | 0.7 | - | - | - | - | - | - |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 15. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 15. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | | N.W.T. | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Nfld. | P.E.I. | M.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | | |
| T.-N. I.-P.-É | N.-É. | N.-B. | | | | | | | Alb. | C.-B. | T.N.-O. | | |
| Rate per 100,000 • Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | |
| Females • Femmes | | | | | | | | | | | | | |
| 140 to 208 All cancers | | | | | | | | | | | | | |
| 140 à 208 Tous les cancers | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 153.3 | 157.8 | 169.7 | 177.9 | 154.5 | 159.3 | 151.4 | 154.4 | 142.8 | 141.5 | 150.1 | 194.5 | 138.3 |
| Crude/Brut | 168.2 | 142.8 | 207.2 | 204.6 | 172.9 | 174.9 | 167.3 | 187.5 | 172.2 | 125.6 | 175.7 | 82.4 | 46.8 |
| 0-24 | 3.1 | 5.1 | 8.2 | 5.0 | 3.7 | 3.8 | 2.8 | 2.0 | 3.7 | 2.3 | 2.6 | - | - |
| 25-34 | 11.3 | 18.1 | 9.2 | 24.6 | 7.7 | 11.3 | 12.0 | 12.7 | 9.6 | 8.4 | 7.5 | - | 16.9 |
| 35-44 | 45.0 | 40.4 | 31.1 | 56.0 | 26.3 | 48.6 | 45.3 | 33.8 | 35.9 | 46.1 | 44.7 | 38.5 | - |
| 45-54 | 146.2 | 144.8 | 127.1 | 169.5 | 189.9 | 142.0 | 143.7 | 193.0 | 172.4 | 127.9 | 161.8 | 81.0 | 51.5 |
| 55-64 | 352.5 | 358.9 | 395.3 | 425.9 | 309.0 | 368.6 | 349.7 | 354.4 | 317.4 | 331.7 | 333.8 | 449.1 | 474.8 |
| 65-74 | 650.7 | 614.5 | 797.9 | 765.1 | 693.3 | 651.5 | 641.2 | 597.2 | 614.4 | 631.3 | 675.0 | 864.6 | 873.4 |
| 75-84 | 1,040.1 | 1,161.7 | 1,028.5 | 1,045.2 | 1,028.8 | 1,106.0 | 1,039.9 | 1,072.3 | 872.0 | 914.2 | 1,016.3 | 1,449.3 | 452.5 |
| 85 + | 1,499.2 | 1,594.0 | 2,073.7 | 1,782.5 | 1,636.7 | 1,675.2 | 1,617.9 | 1,526.6 | 1,392.4 | 1,341.6 | 1,395.4 | 2,941.2 | 1,265.8 |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 Lip | | | | | | | | | | | | | |
| 140 Lèvre | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | .. | . | . | . | . | . | . | . | 0.1 | . | . | .. | . |
| Crude/Brut | .. | . | . | . | . | . | . | . | 0.2 | . | . | 0.1 | . |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 + | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 9.9 | - | - | 4.1 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 141 Tongue | | | | | | | | | | | | | |
| 141 Langue | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 0.4 | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | - | - |
| Crude/Brut | 0.5 | 0.3 | - | - | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | -- | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 0.1 | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.4 | 1.9 | - | - | 1.2 | - | - |
| 55-64 | 1.2 | - | - | - | - | 2.1 | 1.1 | 2.1 | - | 1.1 | 0.7 | - | - |
| 65-74 | 1.5 | 5.9 | - | - | - | 1.1 | 1.5 | 4.4 | 2.4 | - | 1.5 | - | - |
| 75-84 | 2.5 | - | - | - | - | 0.7 | 2.3 | 3.5 | - | - | 10.4 | - | - |
| 85 + | 6.3 | - | - | - | 17.6 | 9.3 | 4.0 | 9.9 | 11.1 | 7.5 | 4.1 | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 142 Major salivary glands | | | | | | | | | | | | | |
| 142 Glandes salivaires principales | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 0.2 | - | . | 0.3 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.4 | 0.1 | 0.1 | - | - |
| Crude/Brut | 0.2 | - | . | 0.4 | - | 0.3 | 0.2 | - | 0.4 | 0.1 | 0.1 | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 0.1 | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - |
| 45-54 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | - | - | - | - |
| 55-64 | 0.5 | - | - | - | - | 0.6 | 0.6 | - | 2.3 | - | - | - | - |
| 65-74 | 0.5 | - | 2.8 | - | - | 1.1 | - | - | - | - | 0.7 | - | - |
| 75-84 | 0.8 | - | - | - | - | 1.4 | 0.9 | - | - | - | 1.3 | - | - |
| 85 + | 2.6 | - | - | 13.6 | - | 2.3 | 4.0 | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 143 Gum | | | | | | | | | | | | | |
| 143 Gencives | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 0.1 | - | . | 0.5 | - | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - | - |
| Crude/Brut | 0.1 | - | . | 0.5 | - | 0.1 | 0.2 | - | - | 0.1 | - | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | 0.2 | - | - | 3.2 | - | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | 0.1 | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | 0.7 | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | 2.6 | - | - | - |
| 85 + | 1.0 | - | - | 17.6 | - | 9.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 15. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause,
Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)
TABLEAU 15. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9
suivant la rubrique à 3 chiffres, la sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | N.W.T. T.N.-O. |
|---|---|--------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------------------|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. | M.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | |
| | T.-N. I.-P.-E | N.-É. | N.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | |
| 144 Floor of mouth | | | | | | | | | | | |
| 144 Plancher de la bouche | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.4 | 0.5 | - | - | - | 0.7 | 0.3 | 0.6 | - | 0.3 | 0.1 |
| Crude/Brut | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 0.6 | 0.3 | 0.5 | - | 0.2 | 0.1 |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | -- | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 0.3 | - | - | - | - | 0.8 | 0.2 | 1.9 | - | - | - |
| 55-64 | 1.4 | - | - | - | - | 2.0 | 1.8 | 2.2 | - | 1.0 | 0.7 |
| 65-74 | 1.3 | - | - | - | - | 3.0 | 1.0 | 2.7 | - | 1.6 | - |
| 75-84 | 2.1 | 13.6 | - | - | - | 4.7 | 1.4 | - | - | 3.5 | - |
| 85 + | 2.4 | - | - | - | - | 5.8 | 3.3 | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 145 Other and unspecified parts of mouth | | | | | | | | | | | |
| 145 Autre parties non précisées de la bouche | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.7 | 0.7 | - | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
| Crude/Brut | 0.7 | 0.7 | - | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| 0-24 | -- | 0.8 | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 0.2 | - | - | - | - | 0.3 | 0.1 | - | 1.4 | - | - |
| 45-54 | 0.5 | - | - | - | - | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 2.2 | - | - |
| 55-64 | 2.4 | 4.7 | - | 2.7 | - | 2.3 | 2.0 | 2.2 | - | 5.2 | 2.7 |
| 65-74 | 3.6 | - | - | 6.8 | - | 4.4 | 4.5 | - | - | 3.2 | 2.7 |
| 75-84 | 4.9 | - | - | 13.5 | - | 4.7 | 5.0 | - | 5.0 | - | 9.1 |
| 85 + | 1.2 | - | - | - | 39.6 | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 146 Oropharynx | | | | | | | | | | | |
| 146 Nasopharynx | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.3 |
| Crude/Brut | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 0.2 | - | - | - | - | 0.5 | 0.3 | - | - | - | - |
| 45-54 | 0.9 | - | - | - | 2.7 | 1.8 | 0.7 | - | 2.2 | - | - |
| 55-64 | 2.5 | - | 18.7 | 8.1 | 3.4 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | - | 1.0 | 2.0 |
| 65-74 | 3.1 | 6.3 | - | - | 4.3 | 4.0 | 3.2 | 5.4 | 5.5 | 1.6 | 0.9 |
| 75-84 | 1.8 | - | - | - | - | 3.5 | 2.1 | - | - | - | 1.8 |
| 85 + | 7.1 | - | - | - | - | 11.7 | 9.9 | - | 18.8 | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 147 Rhinopharynx | | | | | | | | | | | |
| 147 Nasopharynx | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.4 | 0.4 | - | 0.9 | - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | 0.9 |
| Crude/Brut | 0.4 | 0.3 | - | 0.9 | - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 0.6 | 0.9 |
| 0-24 | -- | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 2.2 | - |
| 45-54 | 0.7 | - | - | 2.1 | - | 0.3 | 0.4 | - | 2.2 | 0.8 | 1.7 |
| 55-64 | 1.6 | - | - | 2.7 | - | 1.3 | 1.5 | - | 7.0 | 3.1 | 0.7 |
| 65-74 | 1.7 | 6.3 | - | 3.4 | - | 1.5 | 1.0 | 2.7 | - | 3.2 | 2.7 |
| 75-84 | 1.6 | - | - | 6.8 | - | 1.2 | 0.7 | - | 5.0 | - | 3.6 |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 148 Hypopharynx | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.5 | - | - | 0.2 | - | 0.8 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 |
| Crude/Brut | 0.4 | - | - | 0.2 | - | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 0.3 | - | - | - | 0.8 | - | 1.9 | - | - | - | - |
| 55-64 | 2.2 | - | - | 2.7 | - | 2.3 | 2.2 | 6.5 | 2.3 | 1.0 | 2.0 |
| 65-74 | 2.6 | - | - | - | - | 5.4 | 2.9 | 2.7 | - | 0.9 | - |
| 75-84 | 2.1 | - | - | - | - | 1.2 | 2.1 | - | 5.0 | - | 5.5 |
| 85 + | 2.4 | - | - | - | - | 5.8 | - | 21.3 | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.
(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.
(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.
(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 15. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause,

Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 15. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | Yukon | N.W.T. | | | |
|--|---|--------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|---|--|--|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | | | | | |
| | T.-N. I.-P.-É | N.-É. | N.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | | | | | |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 Floor of mouth | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 Plancher de la bouche | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.1 | - | - | 0.3 | - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | - | - | | |
| Crude/Brut | 0.2 | - | - | 0.4 | - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | - | - | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 45-54 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | 1.9 | - | - | 0.6 | - | - | | |
| 55-64 | 0.6 | - | - | - | - | 0.6 | 0.6 | - | - | - | 1.4 | - | - | | |
| 65-74 | 0.6 | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | | |
| 75-84 | 0.8 | - | - | 4.6 | - | 0.7 | 0.5 | - | - | 2.5 | 1.3 | - | - | | |
| 85 + | 1.0 | - | - | 13.6 | - | - | - | - | - | 7.5 | - | - | - | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 145 Other and unspecified parts of mouth | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 Autre parties non précisée de la bouche | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.3 | - | - | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.7 | 0.1 | 0.1 | - | - | | |
| Crude/Brut | 0.3 | - | - | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | - | 0.8 | 0.1 | 0.1 | - | - | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 25-34 | -- | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | | |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 45-54 | 0.3 | - | - | 4.3 | - | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | | |
| 55-64 | 0.6 | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | 1.1 | 0.7 | - | - | | |
| 65-74 | 1.0 | - | - | 2.8 | - | 0.4 | 1.3 | - | 4.8 | - | 0.7 | - | - | | |
| 75-84 | 2.0 | - | - | - | 6.0 | 1.4 | 3.7 | - | 3.7 | - | - | - | - | | |
| 85 + | 3.6 | - | - | - | - | 4.7 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 146 Oropharynx | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 Rhinopharynx | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.2 | - | - | - | - | 0.1 | 0.3 | 0.7 | - | - | 0.4 | 25.9 | - | | |
| Crude/Brut | 0.2 | - | - | - | - | 0.1 | 0.3 | 0.7 | - | - | 0.4 | 7.5 | - | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 25-34 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | | |
| 35-44 | -- | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | | |
| 45-54 | 0.1 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 55-64 | 0.7 | - | - | - | - | 0.3 | 1.1 | 4.2 | - | - | 0.7 | - | - | | |
| 65-74 | 0.7 | - | - | - | - | - | 0.8 | 4.4 | - | - | 1.5 | - | - | | |
| 75-84 | 1.5 | - | - | - | - | 0.7 | 1.8 | - | - | - | 3.9 | 724.6 | - | | |
| 85 + | 0.5 | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 147 Nasopharynx | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 Rhinopharynx | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.2 | 0.8 | 1.4 | - | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - | - | | |
| Crude/Brut | 0.2 | 0.7 | 1.5 | - | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - | - | | |
| 0-24 | -- | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | | |
| 25-34 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | | |
| 35-44 | 0.2 | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 45-54 | 0.3 | 7.4 | - | - | - | 0.2 | - | 2.2 | - | - | - | - | - | | |
| 55-64 | 0.5 | - | - | - | 3.2 | 0.6 | 0.4 | - | - | - | 0.7 | - | - | | |
| 65-74 | 0.8 | - | 19.9 | - | 3.6 | 1.5 | 0.3 | 2.2 | - | - | - | - | - | | |
| 75-84 | 0.5 | - | - | - | - | 0.9 | - | - | 2.5 | - | - | - | - | | |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 148 Hypopharynx | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 Rhinopharynx | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | -- | - | - | - | -- | -- | -- | - | - | 0.1 | 0.2 | - | - | | |
| Crude/Brut | -- | - | - | - | -- | -- | -- | - | - | 0.1 | 0.2 | - | - | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 55-64 | 0.2 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | 1.1 | 0.7 | - | - | - | | |
| 65-74 | 0.2 | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | 0.7 | - | - | - | | |
| 75-84 | 0.3 | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 1.3 | - | - | - | | |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 15. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 15. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | | N.W.T. T.N.-O. | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|--------------|----------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. T.-N. | N.B. I.-P.-É | Qué. N.-É. | Ont. N.-B. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. Alb. | Yukon C.-B. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 Other and ill-defined sites | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 Sièges autres et mal définis | S./N. | 1.2 | 0.9 | 3.3 | 1.1 | 0.6 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | Crude/Brut | 1.1 | 0.7 | 3.1 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| 35-44 | 0.1 | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | - | - | - | 0.4 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 45-54 | 1.0 | - | 15.5 | - | - | 1.3 | 0.9 | - | 4.6 | - | 1.1 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 55-64 | 4.2 | - | - | 2.7 | 3.4 | 4.9 | 4.2 | 6.5 | 2.3 | 2.1 | 5.4 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 65-74 | 5.3 | 12.6 | 23.5 | 3.4 | 4.3 | 7.4 | 4.5 | 2.7 | 2.8 | 6.5 | 3.6 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 75-84 | 7.0 | - | - | - | - | 14.0 | 8.6 | - | - | 7.0 | 1.8 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 85 + | 8.3 | - | - | 64.4 | - | 29.2 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| 150 Esophagus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 Oesophage | S./N. | 6.1 | 6.8 | 3.1 | 5.0 | 8.0 | 5.2 | 6.8 | 8.1 | 5.9 | 5.8 | 5.3 | | | | | | | | | | | | | |
| | Crude/Brut | 5.3 | 4.8 | 3.1 | 4.7 | 7.3 | 4.3 | 6.0 | 7.8 | 6.1 | 4.2 | 5.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| 25-34 | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| 35-44 | 0.7 | - | - | - | - | 1.7 | 0.9 | 0.6 | - | - | 1.0 | 0.7 | | | | | | | | | | | | | |
| 45-54 | 4.9 | - | - | 8.5 | 13.3 | 3.3 | 5.1 | 9.3 | 2.2 | 6.5 | 3.9 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 55-64 | 15.2 | 9.3 | 18.7 | 10.8 | 24.1 | 12.7 | 18.3 | 21.8 | 11.6 | 10.5 | 13.5 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 65-74 | 31.4 | 12.6 | - | 30.4 | 43.1 | 23.7 | 37.0 | 48.6 | 30.4 | 34.0 | 24.1 | 172.7 | | | | | | | | | | | | | |
| 75-84 | 43.4 | 122.5 | 41.5 | 20.3 | 35.1 | 41.9 | 44.3 | 41.0 | 60.6 | 31.3 | 41.9 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 85 + | 43.9 | 69.8 | - | 32.2 | - | 46.7 | 66.4 | 42.7 | 37.6 | 55.0 | 41.8 | - | | | | | | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| 151 Stomach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 Estomac | S./N. | 11.2 | 23.1 | 11.1 | 13.4 | 12.5 | 12.6 | 10.0 | 12.0 | 12.2 | 10.5 | 9.7 | | | | | | | | | | | | | |
| | Crude/Brut | 9.5 | 16.9 | 10.8 | 12.0 | 11.1 | 10.1 | 8.4 | 11.5 | 12.5 | 7.5 | 9.3 | | | | | | | | | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| 25-34 | 0.2 | 2.0 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.4 | 0.3 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 35-44 | 1.6 | 4.4 | - | 2.9 | 3.4 | 1.7 | 1.4 | - | 1.4 | 2.4 | 1.1 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 45-54 | 7.0 | 17.7 | - | 8.5 | 8.0 | 5.6 | 6.8 | 9.3 | 13.1 | 7.3 | 6.1 | 60.3 | | | | | | | | | | | | | |
| 55-64 | 21.4 | 46.6 | 37.4 | 38.0 | 20.6 | 25.7 | 17.2 | 13.1 | 27.8 | 18.8 | 18.9 | 74.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 65-74 | 50.2 | 88.5 | 94.0 | 37.1 | 81.8 | 53.9 | 44.4 | 59.4 | 47.0 | 50.2 | 48.2 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 75-84 | 93.2 | 122.5 | 41.5 | 101.5 | 70.2 | 113.0 | 87.8 | 107.7 | 90.9 | 86.9 | 76.5 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 85 + | 151.8 | 558.3 | - | 257.6 | 118.7 | 175.0 | 132.6 | 192.1 | 169.2 | 109.9 | 108.8 | - | | | | | | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| 152 Small intestine, including duodenum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 Intestin grêle, y compris le duodénum | S./N. | 0.5 | 0.7 | - | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | |
| | Crude/Brut | 0.4 | 0.3 | - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | |
| 0-24 | -- | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| 25-34 | 0.1 | - | - | - | - | 0.3 | - | 1.0 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| 35-44 | 0.2 | - | - | - | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| 45-54 | 0.3 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.8 | 1.1 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 55-64 | 1.0 | - | - | - | - | 1.3 | 1.1 | 2.2 | 2.3 | 1.0 | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| 65-74 | 1.9 | - | - | - | 4.3 | 2.5 | 1.0 | 2.7 | 2.8 | 1.6 | 3.6 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 75-84 | 3.4 | - | - | 6.8 | - | 1.2 | 4.3 | 5.1 | 10.1 | - | 3.6 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 85 + | 3.6 | 69.8 | - | 32.2 | - | - | - | - | 18.8 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| 153 Colon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 Côlon | S./N. | 19.0 | 20.2 | 12.8 | 15.7 | 17.3 | 22.3 | 19.7 | 20.2 | 15.6 | 15.2 | 15.1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Crude/Brut | 16.1 | 16.2 | 12.3 | 14.4 | 14.9 | 18.2 | 16.6 | 19.5 | 16.3 | 10.9 | 14.2 | | | | | | | | | | | | | |
| 0-24 | -- | - | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.5 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| 25-34 | 0.3 | - | - | - | 1.5 | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.8 | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| 35-44 | 2.7 | 4.4 | - | 1.4 | - | 4.4 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 1.9 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 45-54 | 11.7 | 14.2 | - | 10.7 | 5.3 | 13.8 | 12.5 | 7.5 | 8.7 | 11.3 | 8.9 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 55-64 | 37.1 | 37.3 | - | 32.5 | 37.8 | 48.2 | 35.8 | 39.3 | 32.5 | 31.4 | 24.9 | 74.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 65-74 | 84.4 | 151.8 | 117.5 | 57.4 | 64.6 | 98.4 | 89.3 | 86.4 | 47.0 | 71.3 | 65.1 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 75-84 | 163.3 | 122.5 | 41.5 | 175.9 | 166.7 | 178.3 | 172.1 | 179.4 | 176.7 | 128.7 | 133.0 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 85 + | 237.2 | - | 324.7 | 128.8 | 277.0 | 274.2 | 252.0 | 341.4 | 188.0 | 123.6 | 242.6 | - | | | | | | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 15. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause,

Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 15. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | | N.W.T. T.N.-O. | |
|--|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | | |
| | T.-N. I.-P.-É | N.-E. | N.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | | | |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | | |
| 149 Other and ill-defined sites | | | | | | | | | | | | | |
| 149 Sièges autres et mal définis | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.3 | - | - | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | - | 0.2 | 0.4 | - | |
| Crude/Brut | 0.3 | - | - | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | - | 0.2 | 0.4 | - | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45-54 | 0.6 | - | - | 2.2 | 2.8 | 1.0 | 0.2 | 1.9 | - | - | - | - | |
| 55-64 | 0.6 | - | - | - | - | 0.9 | 0.9 | - | - | - | 0.7 | - | |
| 65-74 | 1.1 | - | - | 2.8 | - | 0.8 | 0.8 | - | - | - | 3.7 | - | |
| 75-84 | 2.4 | - | - | 4.6 | - | 2.8 | 2.8 | 3.5 | - | 4.9 | - | - | |
| 85 + | 1.0 | - | - | 13.6 | - | - | - | - | - | - | 4.1 | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 150 Esophagus | | | | | | | | | | | | | |
| 150 Oesophage | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 1.8 | 1.2 | - | 2.0 | 1.3 | 1.2 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | - | |
| Crude/Brut | 1.9 | 1.0 | - | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 3.1 | - | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | 0.1 | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | - | - | - | 0.3 | - | |
| 35-44 | 0.2 | 2.2 | - | - | - | 0.2 | 0.1 | - | 1.5 | - | - | - | |
| 45-54 | 1.0 | 3.7 | - | - | - | 0.3 | 1.5 | - | - | 0.8 | 2.3 | - | |
| 55-64 | 4.7 | - | - | 2.6 | 3.2 | 4.2 | 3.6 | 2.1 | 4.6 | 8.6 | 9.6 | - | |
| 65-74 | 8.2 | 5.9 | - | 8.4 | 14.4 | 4.6 | 10.3 | 17.6 | 2.4 | 5.5 | 8.9 | - | |
| 75-84 | 10.7 | - | - | 13.8 | - | 8.3 | 12.9 | 3.5 | 7.4 | 12.3 | 15.6 | - | |
| 85 + | 23.5 | - | - | 68.0 | - | 11.7 | 24.0 | 29.7 | 44.2 | 14.9 | 33.2 | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 151 Stomach | | | | | | | | | | | | | |
| 151 Estomac | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 5.0 | 11.8 | 15.8 | 5.4 | 3.5 | 5.9 | 4.5 | 5.0 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | - | |
| Crude/Brut | 5.7 | 10.7 | 18.2 | 6.5 | 4.0 | 6.6 | 5.2 | 6.3 | 5.9 | 3.9 | 5.1 | - | |
| 0-24 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | |
| 25-34 | 0.2 | - | - | 1.2 | - | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.4 | - | - | |
| 35-44 | 0.7 | - | - | 1.4 | - | 1.1 | 0.2 | - | 1.5 | 0.5 | 1.5 | - | |
| 45-54 | 2.6 | 3.7 | 47.7 | 4.3 | 2.8 | 1.8 | 1.9 | 7.6 | 2.2 | 3.4 | 2.3 | - | |
| 55-64 | 7.7 | 23.9 | - | 10.2 | 3.2 | 7.5 | 8.1 | 12.6 | 9.1 | 4.3 | 4.8 | - | |
| 65-74 | 20.5 | 41.0 | 59.8 | 19.5 | 21.6 | 28.2 | 17.8 | 11.0 | 16.9 | 19.3 | 14.1 | - | |
| 75-84 | 47.9 | 141.4 | 117.5 | 36.8 | 29.9 | 57.1 | 44.5 | 52.4 | 40.8 | 29.4 | 43.0 | - | |
| 85 + | 77.1 | 141.7 | 153.6 | 95.2 | 35.2 | 91.0 | 72.0 | 49.6 | 66.3 | 96.9 | 66.4 | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 152 Small intestine, including duodenum | | | | | | | | | | | | | |
| 152 Intestin grêle, y compris le duodénum | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.3 | 0.4 | - | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | |
| Crude/Brut | 0.3 | 0.3 | - | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | |
| 35-44 | 0.1 | - | - | 1.7 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45-54 | 0.1 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | |
| 55-64 | 0.6 | - | - | 5.1 | - | 0.6 | 0.4 | 2.1 | - | - | - | - | |
| 65-74 | 1.4 | 5.9 | - | 2.8 | - | 1.9 | 1.3 | - | 1.4 | 0.7 | - | - | |
| 75-84 | 2.4 | - | - | - | - | 2.8 | 2.8 | 7.0 | 3.7 | - | 1.3 | - | |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 153 Colon | | | | | | | | | | | | | |
| 153 Côlon | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 14.1 | 17.7 | 11.9 | 12.8 | 12.3 | 16.9 | 13.7 | 11.5 | 13.2 | 11.7 | 12.5 | - | |
| Crude/Brut | 15.8 | 15.9 | 16.6 | 15.8 | 15.0 | 18.7 | 15.5 | 14.7 | 17.0 | 10.5 | 15.1 | - | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | 0.4 | 2.0 | - | - | - | 0.3 | 0.6 | - | - | 0.4 | - | - | |
| 35-44 | 2.2 | 4.5 | 10.4 | 1.4 | 1.7 | 3.5 | 1.4 | 2.5 | - | 1.0 | 3.0 | - | |
| 45-54 | 9.5 | 14.8 | - | 4.3 | 8.3 | 9.9 | 9.3 | 11.4 | 19.9 | 9.3 | 7.0 | - | |
| 55-64 | 28.3 | 47.8 | - | 23.0 | 16.1 | 36.1 | 26.7 | 25.2 | 25.1 | 20.5 | 25.3 | - | |
| 65-74 | 55.8 | 70.2 | 19.9 | 61.4 | 35.9 | 64.8 | 57.0 | 37.3 | 45.8 | 44.3 | 50.4 | - | |
| 75-84 | 117.6 | 101.0 | 205.7 | 87.5 | 119.6 | 160.3 | 119.8 | 94.3 | 89.1 | 100.5 | 102.9 | - | |
| 85 + | 211.6 | 248.0 | 153.6 | 272.1 | 299.2 | 261.3 | 179.9 | 178.4 | 254.2 | 178.9 | 194.9 | - 1,265.8 | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 15. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)
TABLEAU 15. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | | | N.W.T. T.N.-O. | | | | | | | | |
|--|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | | | | | | | | | | |
| | T.-N. I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Alb. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 Rectum, rectosigmoid junction and anus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 Rectum, junction recto-sigmoidienne et anus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 6.6 | 4.5 | 4.7 | 5.3 | 6.0 | 9.2 | 6.4 | 8.2 | 5.8 | 4.8 | 4.4 | - | - | | | | | | | | |
| Crude/Brut | 5.6 | 3.8 | 4.6 | 4.9 | 5.4 | 7.5 | 5.4 | 8.0 | 6.1 | 3.5 | 4.2 | - | - | | | | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 0.9 | 4.4 | - | - | - | 1.4 | 0.8 | - | - | 0.5 | 1.1 | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 4.6 | 10.6 | - | 6.4 | 2.7 | 5.6 | 3.7 | 1.9 | - | 5.7 | 5.6 | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 13.7 | - | 18.7 | 13.6 | 10.3 | 17.9 | 13.9 | 21.8 | 9.3 | 10.5 | 8.1 | - | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 30.2 | 31.6 | 23.5 | 13.5 | 60.3 | 43.0 | 24.3 | 43.2 | 33.2 | 27.5 | 18.7 | - | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 54.3 | 13.6 | 41.5 | 60.9 | 8.8 | 78.1 | 55.7 | 76.9 | 60.6 | 24.3 | 32.8 | - | - | | | | | | | | |
| 85 + | 73.5 | - | - | 32.2 | 39.6 | 110.8 | 92.8 | 42.7 | 56.4 | 41.2 | 41.8 | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 155 Liver and intrahepatic bile ducts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 Foie et voies biliaires intrahépatiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 4.1 | 4.4 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 3.7 | 4.6 | 2.6 | 4.8 | 4.1 | - | - | | | | | | | | |
| Crude/Brut | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 4.4 | 2.8 | 3.5 | 4.0 | - | - | | | | | | | | |
| 0-24 | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.5 | - | 0.2 | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 0.3 | - | - | - | - | 0.4 | 0.2 | - | - | 0.8 | 0.3 | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 1.0 | - | - | 1.4 | - | 0.7 | 1.3 | 1.2 | - | - | 1.9 | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 3.0 | 3.5 | - | - | 8.0 | 3.3 | 3.5 | 1.9 | - | 3.2 | 1.7 | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 9.3 | 9.3 | 18.7 | 8.1 | - | 9.1 | 10.4 | 10.9 | 4.6 | 11.5 | 8.1 | - | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 20.9 | 25.3 | - | 10.1 | 21.5 | 25.7 | 18.5 | 21.6 | 13.8 | 25.9 | 21.4 | - | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 27.5 | 40.8 | - | 54.1 | 43.9 | 28.0 | 19.3 | 30.8 | 25.2 | 34.8 | 32.8 | - | - | | | | | | | | |
| 85 + | 28.5 | - | 162.3 | 32.2 | 39.6 | 35.0 | 23.2 | 64.0 | 18.8 | 27.5 | 16.7 | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 156 Gallbladder and extrahepatic bile ducts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156 Vésicule et voies biliaires extrahépatiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 1.8 | 1.3 | 3.0 | 0.7 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | - | - | | | | | | | | |
| Crude/Brut | 1.5 | 1.0 | 3.1 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | - | - | | | | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 0.1 | - | - | - | - | 0.3 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 0.7 | - | - | - | - | 0.8 | 0.9 | 1.9 | - | - | 0.6 | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 2.9 | - | - | 2.7 | 3.4 | 2.6 | 3.1 | 6.5 | - | 2.1 | 3.4 | - | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 9.3 | 19.0 | - | 3.4 | 8.6 | 12.4 | 7.0 | 8.1 | 8.3 | 6.5 | 13.4 | - | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 14.8 | - | 83.0 | 6.8 | 17.5 | 22.1 | 10.0 | 10.3 | 5.0 | 24.3 | 16.4 | - | - | | | | | | | | |
| 85 + | 26.1 | - | - | - | - | 46.7 | 23.2 | - | 37.6 | 27.5 | 25.1 | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 157 Pancreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 157 Pancréas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 11.3 | 10.0 | 18.9 | 13.3 | 13.0 | 11.6 | 10.5 | 13.4 | 9.5 | 13.0 | 10.5 | - | 12.8 | | | | | | | | |
| Crude/Brut | 9.6 | 7.2 | 18.5 | 12.2 | 11.4 | 9.6 | 9.1 | 12.9 | 9.9 | 9.1 | 10.0 | - | 6.4 | | | | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | 1.0 | - | - | 0.4 | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 1.2 | - | - | 4.3 | - | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | - | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 7.4 | 7.1 | - | 8.5 | 5.3 | 8.7 | 6.8 | 7.5 | 4.4 | 8.1 | 7.2 | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 23.1 | 23.3 | 56.1 | 32.5 | 34.4 | 24.4 | 21.9 | 24.0 | 16.2 | 23.0 | 19.5 | - | 148.0 | | | | | | | | |
| 65-74 | 55.9 | 31.6 | 94.0 | 60.8 | 60.3 | 60.8 | 54.2 | 67.5 | 55.4 | 59.9 | 46.4 | - | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 91.1 | 81.7 | 166.0 | 94.7 | 105.3 | 88.6 | 80.0 | 117.9 | 75.7 | 111.3 | 103.8 | - | - | | | | | | | | |
| 85 + | 116.2 | 209.4 | 162.3 | 128.8 | 158.3 | 99.2 | 102.8 | 128.0 | 94.0 | 192.3 | 108.8 | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 15. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 15. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | | N.W.T. | |
|--|---|--------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|---------|--------|--|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | | |
| | T.-N. I.-P.-É | N.-É. | N.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | T.N.-O. | | |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | | |
| 154 Rectum, rectosigmoid junction and anus | | | | | | | | | | | | | |
| 154 Rectum, jonction recto-sigmoidienne et anus | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 3.7 | 3.1 | - | 3.4 | 2.2 | 4.7 | 3.6 | 3.7 | 2.4 | 3.0 | 3.1 | - | |
| Crude/Brut | 4.1 | 2.8 | - | 4.1 | 2.7 | 5.3 | 4.1 | 4.7 | 3.8 | 2.7 | 3.7 | - | |
| 0-24 | -- | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | -- | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35-44 | 0.7 | - | - | - | 0.4 | 1.2 | - | - | - | 1.0 | 0.4 | - | |
| 45-54 | 2.4 | 3.7 | - | 4.3 | - | 2.5 | 2.0 | 5.7 | 6.6 | 1.7 | 1.8 | - | |
| 55-64 | 6.6 | 4.8 | - | 5.1 | - | 11.6 | 5.3 | 4.2 | 2.3 | 5.4 | 4.1 | - | |
| 65-74 | 15.9 | 17.6 | - | 14.0 | 18.0 | 18.3 | 15.2 | 22.0 | 4.8 | 13.8 | 16.3 | - | |
| 75-84 | 29.7 | 30.3 | - | 23.0 | 6.0 | 45.4 | 27.1 | 24.4 | 18.6 | 24.5 | 24.8 | - | |
| 85 + | 54.7 | - | - | 68.0 | 70.4 | 49.0 | 68.0 | 39.7 | 44.2 | 37.3 | 45.6 | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 155 Liver and intrahepatic bile ducts | | | | | | | | | | | | | |
| 155 Foie et voies biliaires intrahépatiques | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 2.3 | 3.3 | - | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 1.6 | 2.0 | 3.1 | 2.0 | - | |
| Crude/Brut | 2.5 | 3.1 | - | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.2 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | - | |
| 0-24 | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.2 | 0.4 | - | - | |
| 25-34 | 0.2 | 2.0 | - | - | 0.3 | 0.2 | - | - | - | 0.3 | - | - | |
| 35-44 | 0.4 | 2.2 | - | 1.4 | - | 0.5 | - | - | - | 1.0 | 0.8 | - | |
| 45-54 | 1.8 | - | - | - | 2.8 | 2.5 | 1.3 | 3.8 | 2.2 | 2.5 | 1.2 | - | |
| 55-64 | 5.0 | - | - | 5.1 | 6.4 | 6.8 | 5.6 | 4.2 | 2.3 | 5.4 | 5.5 | - | |
| 65-74 | 10.0 | 5.9 | - | 14.0 | 7.2 | 13.0 | 9.8 | 2.2 | 7.2 | 12.4 | 7.4 | - | |
| 75-84 | 16.0 | 30.3 | - | 9.2 | 29.9 | 17.2 | 13.8 | 14.0 | 26.0 | 19.6 | 13.0 | - | |
| 85 + | 23.5 | 106.3 | - | 54.4 | 17.6 | 32.7 | 16.7 | 19.8 | 11.1 | 52.2 | 8.3 | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 156 Gallbladder and extrahepatic bile ducts | | | | | | | | | | | | | |
| 156 Vésicule et voies biliaires extrahépatiques | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 1.9 | 3.6 | 2.4 | 1.9 | 0.7 | 2.4 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | - | |
| Crude/Brut | 2.2 | 3.1 | 3.0 | 2.2 | 0.8 | 2.7 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 1.6 | 2.8 | - | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | 0.1 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | |
| 35-44 | 0.1 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.4 | - | |
| 45-54 | 0.8 | 3.7 | - | - | 2.8 | 1.5 | 0.4 | - | - | 1.2 | - | - | |
| 55-64 | 3.8 | 14.4 | 18.8 | 7.7 | - | 4.8 | 2.6 | 8.4 | 6.9 | - | 3.4 | - | |
| 65-74 | 9.8 | 23.4 | - | 14.0 | 3.6 | 13.3 | 6.5 | 8.8 | 12.0 | 11.1 | 10.4 | - | |
| 75-84 | 14.6 | - | - | - | - | 15.8 | 14.2 | 17.5 | 14.8 | 17.2 | 20.8 | - | |
| 85 + | 28.1 | - | 76.8 | 27.2 | 17.6 | 35.0 | 26.7 | 9.9 | 22.1 | 29.8 | 33.2 | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 157 Pancreas | | | | | | | | | | | | | |
| 157 Pancréas | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 8.2 | 6.9 | 12.4 | 9.6 | 7.1 | 8.5 | 7.6 | 8.0 | 11.6 | 7.3 | 8.8 | - | |
| Crude/Brut | 9.2 | 6.2 | 15.1 | 11.5 | 8.3 | 9.4 | 8.6 | 10.0 | 14.4 | 6.5 | 10.6 | - | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | 0.1 | - | - | - | - | 0.2 | - | 1.2 | - | - | - | - | |
| 35-44 | 1.2 | 2.2 | - | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | - | 2.3 | - | |
| 45-54 | 4.2 | 3.7 | - | 6.5 | 2.8 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 8.8 | 5.1 | 4.1 | - | |
| 55-64 | 15.2 | 9.6 | 37.7 | 15.3 | 12.9 | 18.5 | 13.9 | 16.8 | 27.4 | 9.7 | 11.6 | - | |
| 65-74 | 41.9 | 41.0 | 79.8 | 50.3 | 35.9 | 38.9 | 39.5 | 39.5 | 48.2 | 45.6 | 49.7 | - | |
| 75-84 | 66.8 | 40.4 | 58.8 | 73.7 | 53.8 | 71.5 | 58.8 | 69.9 | 107.6 | 51.5 | 78.2 | - | |
| 85 + | 94.3 | 106.3 | 153.6 | 122.4 | 105.6 | 105.0 | 95.9 | 69.4 | 66.3 | 96.9 | 74.6 | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 15. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)
TABLEAU 15. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|---------|---------|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. |
| T.-N. I.-P.-É | N.-É. | N.-B. | | | | | | | Alb. | C.-B. | T.N.-O. | |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 158 Retroperitoneum and peritoneum | | | | | | | | | | | | |
| 158 Tissu rétropéritonéal et péritoïne | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 0.3 | 0.5 | - | - | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | - | - |
| Crude/Brut | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | - | - |
| 0-24 | -- | - | - | - | - | 0.1 | 0.5 | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.4 | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 0.2 | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | 0.8 | - | - | - | - | 0.7 | 0.4 | - | 2.1 | 2.0 | - | - |
| 65-74 | 1.6 | - | - | - | - | 4.0 | 1.6 | - | - | - | - | - |
| 75-84 | 2.1 | 13.6 | - | - | - | 3.5 | 2.1 | - | 5.0 | - | - | - |
| 85 + | 2.4 | - | - | - | - | - | 3.3 | - | 18.8 | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 159 Other and ill-defined sites | | | | | | | | | | | | |
| 159 Sièges autres ou non précisés | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 5.7 | 8.9 | 23.7 | 11.6 | 10.2 | 4.6 | 5.6 | 5.7 | 6.6 | 4.0 | 5.4 | - |
| Crude/Brut | 4.8 | 6.2 | 23.1 | 10.6 | 9.0 | 3.5 | 4.7 | 5.5 | 6.7 | 2.7 | 5.2 | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | -- | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 0.6 | - | 30.9 | - | - | 0.9 | 0.4 | - | 1.4 | - | 0.4 | - |
| 45-54 | 2.9 | 7.1 | 15.5 | 2.1 | 10.6 | 1.8 | 2.8 | 5.6 | 6.5 | - | 3.3 | - |
| 55-64 | 11.3 | 14.0 | 56.1 | 27.1 | 20.6 | 7.5 | 12.4 | 6.5 | 11.6 | 7.3 | 12.1 | - |
| 65-74 | 24.5 | 37.9 | 70.5 | 60.8 | 43.1 | 20.8 | 22.0 | 27.0 | 22.1 | 19.4 | 24.1 | - |
| 75-84 | 49.9 | 40.8 | 207.6 | 108.2 | 87.7 | 32.6 | 50.0 | 51.3 | 55.5 | 48.7 | 45.5 | - |
| 85 + | 85.4 | 279.1 | - | 96.6 | 118.7 | 81.7 | 89.5 | 85.4 | 112.8 | 27.5 | 66.9 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,754.4 |
| 160 Nasal cavities, middle ear and sinuses | | | | | | | | | | | | |
| 160 Fosses nasales, de l'oreille moyenne et sinuses annexes | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 0.3 | - | - | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | - | - | 0.3 | 0.2 | - |
| Crude/Brut | 0.3 | - | - | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.2 | 0.2 | - |
| 0-24 | -- | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.5 | - | - |
| 45-54 | 0.3 | - | - | 2.1 | - | 0.5 | - | - | - | 0.6 | - | - |
| 55-64 | 0.8 | - | - | - | - | 1.0 | 1.1 | - | - | 0.7 | - | - |
| 65-74 | 1.2 | - | - | - | 8.6 | 0.5 | 1.6 | - | - | 3.2 | - | - |
| 75-84 | 1.3 | - | - | - | - | 1.2 | 2.1 | - | - | - | 1.8 | - |
| 85 + | 3.6 | - | - | - | - | 5.8 | 6.6 | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 161 Larynx | | | | | | | | | | | | |
| 161 Larynx | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 3.6 | 2.5 | 4.8 | 4.0 | 1.5 | 5.9 | 2.9 | 4.3 | 3.5 | 2.5 | 2.2 | - |
| Crude/Brut | 3.1 | 2.1 | 4.6 | 3.8 | 1.4 | 5.0 | 2.5 | 4.2 | 3.6 | 1.9 | 2.1 | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 0.4 | - | - | 1.4 | - | 0.7 | 0.1 | - | - | 0.5 | 0.4 | - |
| 45-54 | 3.1 | - | 15.5 | 6.4 | - | 5.1 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | - |
| 55-64 | 11.6 | 9.3 | 18.7 | 10.8 | 6.9 | 18.5 | 9.1 | 17.5 | 11.6 | 9.4 | 6.1 | - |
| 65-74 | 15.1 | 25.3 | - | 16.9 | 8.6 | 22.7 | 12.8 | 24.3 | 19.4 | 9.7 | 6.2 | - |
| 75-84 | 24.7 | - | 41.5 | 27.1 | 8.8 | 47.8 | 19.3 | 20.5 | 20.2 | 10.4 | 18.2 | - |
| 85 + | 26.1 | - | - | - | - | 35.0 | 29.8 | 21.3 | 18.6 | 27.5 | 25.1 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 15. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 15. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | | N.W.T. |
|--|---|--------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|---------|--------|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | |
| T.-N. I.-P.-É | N.-É. | N.-B. | | | | | | | Aib. | C.-B. | T.N.-O. | |
| Rate per 100,000 • Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 158 Retroperitoneum and peritoneum | | | | | | | | | | | | |
| 158 Tissu rétropéritonéal et péritoïne | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 0.4 | 0.7 | - | 0.2 | - | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | - |
| Crude/Brut | 0.4 | 0.7 | - | 0.2 | - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 0.1 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - |
| 35-44 | -- | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 0.3 | - | - | - | - | 0.3 | 0.2 | - | 2.2 | 0.8 | - | - |
| 55-64 | 1.0 | - | - | 2.6 | - | 1.2 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | - | - | - |
| 65-74 | 1.6 | - | - | - | - | 1.9 | 2.1 | - | - | 4.1 | 0.7 | - |
| 75-84 | 3.1 | 10.1 | - | - | - | 2.1 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 2.5 | 2.6 | - |
| 85 + | 1.6 | - | - | - | - | 2.3 | 2.7 | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 159 Other and ill-defined sites | | | | | | | | | | | | |
| 159 Sièges autres ou non précisés | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 6.2 | 7.7 | 10.7 | 7.9 | 7.3 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | - |
| Crude/Brut | 6.8 | 6.9 | 13.6 | 9.5 | 8.8 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 3.3 | 4.3 | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | -- | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 0.6 | 4.5 | - | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 3.0 | 7.4 | - | 10.9 | - | 3.0 | 2.6 | 1.9 | 2.2 | 3.4 | 2.3 | - |
| 55-64 | 6.6 | 19.1 | 37.7 | 10.2 | 9.7 | 5.4 | 6.4 | 4.2 | 9.1 | 6.5 | 5.5 | - |
| 65-74 | 17.0 | 29.3 | 39.9 | 25.1 | 25.1 | 11.4 | 18.3 | 17.6 | 12.0 | 24.9 | 14.8 | - |
| 75-84 | 35.5 | 40.4 | 88.2 | 73.7 | 83.7 | 32.3 | 34.9 | 31.4 | 33.4 | 14.7 | 32.6 | - |
| 85 + | 78.2 | 106.3 | 153.6 | 122.4 | 140.8 | 91.0 | 65.3 | 89.2 | 88.4 | 59.6 | 62.2 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 160 Nasal cavities, middle ear and sinuses | | | | | | | | | | | | |
| 160 Fosses nasales, de l'oreille moyenne et sinuses annexes | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 0.1 | - | - | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | -- | - |
| Crude/Brut | 0.1 | - | - | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | -- | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 0.2 | - | - | - | - | 0.3 | 0.4 | - | - | - | - | - |
| 55-64 | 0.2 | - | - | - | 3.2 | - | 0.2 | - | - | 1.1 | - | - |
| 65-74 | 0.7 | - | - | 2.8 | - | 0.4 | 0.5 | - | 2.4 | 2.8 | - | - |
| 75-84 | 0.7 | - | - | - | - | 1.4 | - | - | - | 2.5 | 1.3 | - |
| 85 + | 1.0 | - | - | - | - | - | 2.7 | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 161 Larynx | | | | | | | | | | | | |
| 161 Larynx | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 0.5 | 0.7 | - | 0.7 | - | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | - |
| Crude/Brut | 0.6 | 0.7 | - | 0.9 | - | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 0.5 | - | - | - | - | 0.3 | 0.7 | - | - | - | 1.2 | - |
| 55-64 | 2.0 | - | - | - | - | 2.7 | 2.6 | - | - | 2.2 | 1.4 | - |
| 65-74 | 2.8 | - | - | 2.8 | - | 4.2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 1.4 | 4.5 | - |
| 75-84 | 2.5 | 20.2 | - | 13.8 | - | 4.1 | 1.4 | - | - | 2.5 | - | - |
| 85 + | 1.6 | - | - | - | - | 4.7 | - | - | 11.1 | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.M.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 15. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)
TABLEAU 15. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | N.W.T. | | | | | |
|---|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--|--|--|--|--|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | | | | | | |
| | T.-N. I.-P.-É | N.-É. | N.-B. | | | | | | | Alb. | C.-B. | | | | | |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 Trachea, bronchus and lung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 Trachée, des bronches et du poumon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 79.3 | 72.0 | 79.5 | 89.9 | 83.6 | 104.8 | 73.7 | 65.2 | 62.0 | 62.8 | 66.1 | | | | | |
| Crude/Brut | 69.2 | 56.1 | 77.0 | 83.3 | 74.3 | 88.2 | 64.6 | 62.9 | 63.8 | 45.0 | 64.0 | | | | | |
| 0-24 | 0.1 | - | 3.9 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | | | | | |
| 25-34 | 0.3 | - | - | - | - | 0.3 | 0.7 | - | - | - | - | | | | | |
| 35-44 | 6.4 | 4.4 | - | 2.9 | 6.8 | 9.1 | 6.1 | 8.7 | 4.3 | 2.9 | 5.2 | | | | | |
| 45-54 | 51.0 | 49.7 | 93.3 | 70.3 | 31.9 | 70.6 | 47.2 | 35.4 | 43.6 | 33.9 | 35.1 | | | | | |
| 55-64 | 197.5 | 167.9 | 187.1 | 203.3 | 233.9 | 259.6 | 184.7 | 183.3 | 167.1 | 152.6 | 144.9 | | | | | |
| 65-74 | 427.1 | 398.5 | 446.4 | 506.4 | 456.6 | 566.0 | 394.1 | 335.0 | 346.0 | 359.7 | 337.9 | | | | | |
| 75-84 | 588.1 | 598.8 | 415.1 | 649.4 | 605.4 | 762.1 | 544.8 | 461.4 | 424.0 | 452.1 | 583.0 | | | | | |
| 85 + | 539.7 | 279.1 | 649.4 | 643.9 | 593.6 | 729.2 | 507.3 | 469.5 | 338.3 | 467.1 | 501.9 | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 163 Pleura | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 Plèvre | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.6 | 0.4 | . | 0.5 | . | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | | | | | |
| Crude/Brut | 0.6 | 0.3 | . | 0.4 | . | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 25-34 | -- | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | | | | | |
| 35-44 | 0.1 | - | - | - | - | 0.2 | - | 1.2 | - | - | 0.4 | | | | | |
| 45-54 | 1.2 | - | - | - | - | 2.3 | 0.9 | - | - | 0.8 | 1.1 | | | | | |
| 55-64 | 1.1 | 4.7 | - | 2.7 | - | 2.0 | 0.4 | - | - | - | 2.0 | | | | | |
| 65-74 | 2.7 | - | - | - | - | 5.9 | 1.6 | - | - | 1.6 | 4.5 | | | | | |
| 75-84 | 4.7 | - | - | 6.8 | - | 9.3 | 1.4 | - | 5.0 | 3.5 | 9.1 | | | | | |
| 85 + | 2.4 | - | - | - | - | - | - | 21.3 | 18.8 | - | - | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 164 Thymus, heart and mediastinum | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Thymus, cœur et médiastin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.3 | . | . | 0.5 | . | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | | | | | |
| Crude/Brut | 0.2 | . | . | 0.4 | . | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | | | | | |
| 0-24 | 0.1 | - | - | 0.6 | - | 0.2 | - | - | 0.2 | 0.2 | - | | | | | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 35-44 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 | 1.2 | - | - | - | | | | | |
| 45-54 | 0.5 | - | - | - | - | 0.3 | 0.6 | 1.9 | - | 0.8 | 0.6 | | | | | |
| 55-64 | 0.4 | - | - | - | - | 0.7 | 0.2 | - | 2.3 | - | 0.7 | | | | | |
| 65-74 | 1.0 | - | - | - | - | 0.5 | 1.6 | 2.7 | - | - | 0.9 | | | | | |
| 75-84 | 0.8 | - | - | 6.8 | - | 1.2 | - | - | - | 1.8 | - | | | | | |
| 85 + | 2.4 | - | - | - | - | 5.8 | 3.3 | - | - | - | - | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 165 Other and ill-defined sites | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Sièges autres ou non précisés | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | | | | |
| Crude/Brut | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 15. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause,

Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 15. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | | | N.W.T. | | | | | | |
|--|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | | | | | | | | |
| | T.-N. I.-P.-É | N.-É. | N.-B. | Alb. | | | | | | | T.N.-O. | | | | | | | | |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 Trachea, bronchus and lung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 Trachée, des bronches et du poumon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 27.6 | 15.7 | 38.9 | 34.5 | 29.1 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 19.6 | 24.2 | 33.5 | 65.2 | 54.4 | | | | | | |
| Crude/Brut | 29.8 | 13.9 | 42.4 | 37.9 | 31.0 | 29.6 | 29.6 | 32.1 | 22.9 | 21.0 | 38.6 | 22.5 | 17.7 | | | | | | |
| 0-24 | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 25-34 | 0.9 | -- | -- | 1.2 | -- | 2.0 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | -- | 0.7 | -- | -- | | | | | | |
| 35-44 | 5.6 | -- | -- | 5.7 | -- | 7.9 | 5.7 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 6.1 | -- | -- | | | | | | |
| 45-54 | 30.0 | 18.6 | 79.4 | 36.9 | 57.8 | 28.6 | 28.3 | 39.7 | 24.3 | 22.0 | 35.0 | -- | -- | | | | | | |
| 55-64 | 79.5 | 43.1 | 131.8 | 137.7 | 70.8 | 76.6 | 79.8 | 71.3 | 61.7 | 70.0 | 87.6 | -- | 284.9 | | | | | | |
| 65-74 | 142.4 | 87.8 | 159.6 | 156.4 | 158.1 | 136.5 | 138.1 | 118.6 | 94.0 | 134.0 | 191.4 | 576.4 | 436.7 | | | | | | |
| 75-84 | 155.0 | 90.9 | 205.7 | 147.3 | 131.6 | 147.2 | 158.9 | 185.1 | 96.5 | 142.1 | 187.6 | 724.6 | -- | | | | | | |
| 85 + | 119.9 | 70.8 | 76.8 | 149.7 | 123.2 | 123.7 | 115.9 | 138.8 | 110.5 | 96.9 | 132.7 | -- | -- | | | | | | |
| N.S./N.P. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 163 Pleura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 Plèvre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.1 | -- | -- | -- | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -- | 0.1 | -- | 0.1 | -- | -- | | | | | | |
| Crude/Brut | 0.1 | -- | -- | -- | 0.3 | 0.2 | 0.1 | -- | 0.2 | -- | 0.1 | -- | -- | | | | | | |
| 0-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 25-34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 35-44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 45-54 | 0.3 | -- | -- | -- | -- | 0.8 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 55-64 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 65-74 | 0.6 | -- | -- | -- | 3.6 | 1.5 | -- | -- | -- | -- | 0.7 | -- | -- | | | | | | |
| 75-84 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.9 | -- | 3.7 | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 85 + | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| N.S./N.P. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 164 Thymus, heart and mediastinum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Thymus, cœur et médiastin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.1 | -- | -- | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | -- | -- | 0.2 | 0.2 | -- | -- | | | | | | |
| Crude/Brut | 0.2 | -- | -- | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | -- | -- | 0.2 | 0.2 | -- | -- | | | | | | |
| 0-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | -- | -- | | | | | | |
| 25-34 | 0.1 | -- | -- | 1.2 | -- | -- | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 35-44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 45-54 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 55-64 | 0.4 | -- | -- | -- | -- | 0.9 | -- | -- | -- | 2.2 | -- | -- | -- | | | | | | |
| 65-74 | 1.0 | -- | -- | 2.8 | 3.6 | 1.1 | 1.0 | -- | -- | -- | 0.7 | -- | -- | | | | | | |
| 75-84 | 0.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.3 | -- | -- | | | | | | |
| 85 + | 0.5 | -- | -- | -- | 17.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| N.S./N.P. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 165 Other and ill-defined sites | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Sièges autres ou non précisés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| Crude/Brut | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 0-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 25-34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 35-44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 45-54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 55-64 | 0.1 | -- | -- | -- | -- | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 65-74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 75-84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| 85 + | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |
| N.S./N.P. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | | | | | |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 15. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause,
Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)
TABLEAU 15. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9
suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | N.W.T. | | | | | |
|---|---|--------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|--------|--|--|--|--|--|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | | | | | | |
| | T.-N. I.-P.-É | N.-É. | N.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | | | | | | |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 Bone and articular cartilage | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 Os et cartilage articulaire | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 0.6 | 0.7 | - | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | - | 0.5 | 0.6 | 0.4 | | | | | |
| Crude/Brut | 0.5 | 0.3 | - | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | |
| 0-24 | 0.5 | - | - | - | 0.7 | 0.6 | 0.9 | - | - | - | - | | | | | |
| 25-34 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | | | | | |
| 35-44 | 0.3 | - | - | - | 3.4 | 0.3 | - | - | - | - | 0.7 | | | | | |
| 45-54 | 0.3 | - | - | - | - | 0.8 | - | - | 4.4 | - | - | | | | | |
| 55-64 | 1.2 | - | - | 2.7 | - | 2.3 | 0.7 | - | - | 2.1 | 0.7 | | | | | |
| 65-74 | 0.8 | - | - | - | - | 2.5 | 0.3 | - | - | 1.6 | - | | | | | |
| 75-84 | 2.1 | - | - | - | - | 3.5 | 0.7 | - | - | 3.5 | 5.5 | | | | | |
| 85 + | 7.1 | 69.8 | - | - | - | 17.5 | 3.3 | - | - | 13.7 | - | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 171 Connective and other soft tissue | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 Tissu conjonctif et autres tissus mous | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 1.1 | - | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | | | | | |
| Crude/Brut | 1.0 | - | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | | | | | |
| 0-24 | 0.3 | - | - | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 0.2 | | | | | |
| 25-34 | 0.3 | - | - | - | - | 0.4 | 0.2 | - | - | 1.1 | - | | | | | |
| 35-44 | 0.5 | - | - | 2.9 | - | 0.5 | 0.3 | - | - | 1.0 | 0.4 | | | | | |
| 45-54 | 1.0 | - | - | - | 2.7 | 1.3 | 0.7 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | - | | | | | |
| 55-64 | 2.4 | - | 18.7 | 5.4 | - | 2.9 | 2.0 | 2.2 | 4.6 | 2.1 | 2.0 | | | | | |
| 65-74 | 3.9 | - | - | 3.4 | - | 8.4 | 1.6 | - | 5.5 | 8.1 | 2.7 | | | | | |
| 75-84 | 4.9 | - | - | - | 17.5 | 4.7 | 3.6 | 5.1 | 10.1 | 7.0 | 5.5 | | | | | |
| 85 + | 7.1 | - | - | - | - | 9.9 | - | 18.8 | - | 16.7 | - | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 172 Malignant melanoma of skin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 Mélanome malin de la peau | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 2.6 | 0.5 | 4.9 | 3.5 | 3.6 | 1.9 | 3.0 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 3.2 | | | | | |
| Crude/Brut | 2.3 | 0.3 | 4.6 | 3.3 | 3.0 | 1.8 | 2.6 | 1.3 | 2.2 | 1.8 | 3.2 | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 25-34 | 0.7 | - | 9.3 | - | - | 0.3 | 0.6 | - | 1.2 | 1.1 | 2.0 | | | | | |
| 35-44 | 2.1 | - | - | 4.3 | - | 1.2 | 2.0 | 1.2 | 4.3 | 1.9 | 4.1 | | | | | |
| 45-54 | 3.7 | - | - | - | 5.3 | 4.6 | 5.3 | 1.9 | 4.4 | 2.4 | 5.6 | | | | | |
| 55-64 | 5.6 | - | - | 16.3 | 6.9 | 3.3 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | 5.2 | 4.7 | | | | | |
| 65-74 | 7.8 | - | 47.0 | 16.9 | 12.9 | 7.4 | 6.4 | 2.7 | 5.5 | 8.1 | 10.7 | | | | | |
| 75-84 | 13.2 | 13.6 | - | 6.8 | 26.3 | 11.7 | 17.1 | 10.3 | 10.1 | 7.0 | 10.9 | | | | | |
| 85 + | 21.4 | - | - | - | 39.6 | - | 46.4 | 21.3 | - | 13.7 | 8.4 | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 173 Other of skin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 Autres de la peau | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 0.8 | 2.0 | - | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | | | | | |
| Crude/Brut | 0.7 | 1.4 | - | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 25-34 | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.3 | - | | | | | |
| 35-44 | 0.3 | - | - | - | - | 0.5 | 0.1 | - | 1.4 | - | 0.4 | | | | | |
| 45-54 | 0.5 | 3.5 | - | - | - | 1.0 | - | - | - | 0.8 | 1.1 | | | | | |
| 55-64 | 0.8 | - | - | - | - | 1.0 | 0.9 | - | 2.3 | - | 0.7 | | | | | |
| 65-74 | 2.5 | 6.3 | - | 3.4 | - | 3.0 | 1.9 | 2.7 | - | 3.2 | 3.6 | | | | | |
| 75-84 | 6.8 | 13.6 | - | 13.5 | - | 12.8 | 5.0 | - | - | 10.4 | 3.6 | | | | | |
| 85 + | 23.7 | 69.8 | - | - | 39.6 | 46.7 | 16.6 | 21.3 | 18.8 | 13.7 | 16.7 | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.
(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.
(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.
(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 15. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 15. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | | N.W.T. T.N.-O. | |
|--|---|--------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|------|-------|-------------------|--|
| | Mfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | | |
| | T.-N. I.-P.-É | N.-É. | N.-B. | Alb. | C.-B. | | | | | | | | |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | | |
| 170 Bone and articular cartilage | | | | | | | | | | | | | |
| 170 Os et cartilage articulaire | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 0.3 | - | - | 0.2 | - | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | - | |
| Crude/Brut | 0.3 | - | - | 0.2 | - | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | - | |
| 0-24 | 0.1 | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | - | - | 0.2 | 0.4 | - | |
| 25-34 | 0.1 | - | - | 1.2 | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | |
| 35-44 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 | 1.3 | - | - | - | - | |
| 45-54 | 0.3 | - | - | - | - | 0.8 | - | - | 2.2 | - | - | - | |
| 55-64 | 0.4 | - | - | - | - | 0.9 | 0.2 | 2.1 | - | - | - | - | |
| 65-74 | 1.2 | - | - | - | - | 2.3 | 0.8 | - | - | 1.4 | 1.5 | - | |
| 75-84 | 1.4 | - | - | - | - | 3.4 | 0.9 | - | - | - | 1.3 | - | |
| 85 + | 2.1 | - | - | - | - | 7.0 | 1.3 | - | - | - | - | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 171 Connective and other soft tissue | | | | | | | | | | | | | |
| 171 Tissu conjonctif et autres tissus mous | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 0.8 | 1.2 | 2.7 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | - | |
| Crude/Brut | 0.8 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | - | |
| 0-24 | 0.2 | - | - | 1.2 | - | 0.2 | 0.1 | - | - | 0.2 | 0.4 | - | |
| 25-34 | 0.4 | - | - | 1.2 | - | 0.8 | 0.1 | - | - | 0.4 | 0.3 | - | |
| 35-44 | 0.6 | - | - | 2.9 | - | 0.7 | 0.2 | - | - | 2.0 | 0.4 | - | |
| 45-54 | 0.8 | - | - | - | - | 1.3 | 0.6 | 1.9 | - | 2.5 | - | - | |
| 55-64 | 1.2 | 4.8 | 18.8 | - | 3.2 | 0.6 | 0.9 | 4.2 | 2.3 | 1.1 | 1.4 | - | |
| 65-74 | 2.2 | 11.7 | - | - | 3.6 | 1.5 | 1.5 | 6.6 | 4.8 | 2.8 | 2.2 | - | |
| 75-84 | 5.1 | - | 29.4 | 9.2 | 12.0 | 6.2 | 4.1 | 14.0 | - | 4.9 | 1.3 | - | |
| 85 + | 3.6 | - | - | - | 17.6 | 4.7 | 4.0 | - | - | 7.5 | - | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 172 Malignant melanoma of skin | | | | | | | | | | | | | |
| 172 Mélanome malin de la peau | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 1.2 | - | - | 1.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | - | |
| Crude/Brut | 1.3 | - | - | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 2.5 | 1.8 | 1.0 | 1.6 | - | |
| 0-24 | -- | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | 0.4 | - | - | - | - | 0.5 | 0.4 | 2.1 | - | 0.4 | 0.3 | - | |
| 35-44 | 1.1 | - | - | 2.9 | - | 0.7 | 1.0 | - | 3.0 | 1.5 | 1.9 | - | |
| 45-54 | 1.9 | - | - | 4.3 | - | 1.8 | 1.9 | 5.7 | - | 0.8 | 2.9 | - | |
| 55-64 | 2.1 | - | - | 5.1 | 6.4 | 1.8 | 1.9 | 8.4 | 2.3 | - | 1.4 | - | |
| 65-74 | 3.6 | - | - | 2.8 | - | 2.7 | 3.6 | 2.2 | 4.8 | 5.5 | 5.9 | - | |
| 75-84 | 6.5 | - | - | - | 6.0 | 6.9 | 7.3 | 7.0 | 7.4 | 9.8 | 3.9 | - | |
| 85 + | 6.8 | - | - | 13.6 | - | 2.3 | 6.7 | 19.8 | 22.1 | - | 8.3 | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 173 Other of skin | | | | | | | | | | | | | |
| 173 Autres de la peau | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 0.3 | 0.4 | - | - | - | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.2 | 0.3 | - | |
| Crude/Brut | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 0.4 | 0.4 | - | - | 0.2 | 0.4 | - | |
| 0-24 | -- | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55-64 | 0.2 | - | - | - | - | 0.6 | 0.2 | - | - | - | - | - | |
| 65-74 | 0.5 | - | - | - | - | 0.4 | 0.5 | - | - | 1.5 | - | - | |
| 75-84 | 1.5 | 10.1 | - | - | - | 2.8 | 0.9 | - | - | 2.6 | - | - | |
| 85 + | 12.0 | - | - | - | - | 14.0 | 17.3 | - | - | 14.9 | 8.3 | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 15. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)
TABLEAU 15. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | N.W.T. T.N.-O. | |
|--------------------------------------|---|----------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|------|-------------------|--|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | | |
| | T.-N. | I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | | |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 174 Female breast | | | | | | | | | | | | |
| 174 Sein chez la femme | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Crude/Brut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 175 Male breast | | | | | | | | | | | | |
| 175 Sein chez l'homme | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 0.4 | - | - | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | |
| Crude/Brut | 0.3 | - | - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45-54 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | - | - | |
| 55-64 | 0.6 | - | - | 2.7 | - | 1.3 | 0.4 | - | - | - | - | |
| 65-74 | 1.6 | - | - | 3.4 | - | 2.5 | 1.3 | 2.7 | - | 1.6 | 0.9 | |
| 75-84 | 4.2 | - | - | - | 17.5 | 3.5 | 5.0 | - | - | 10.4 | 1.8 | |
| 85 + | 4.7 | - | - | - | - | 5.8 | 3.3 | - | 18.8 | 13.7 | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 179 Uterus, NOS | | | | | | | | | | | | |
| 179 Utérus, SAI | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Crude/Brut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 180 Cervix uteri | | | | | | | | | | | | |
| 180 Col de l'utérus | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Crude/Brut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 181 Placenta | | | | | | | | | | | | |
| 181 Placenta | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Crude/Brut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 15. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 15. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. | |
| | T.-N.-I.-P.-É. | N.-É. | M.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | | T.N.-O. | |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | | |
| 174 Female breast | | | | | | | | | | | | | |
| 174 Sein chez la femme | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 31.3 | 26.9 | 27.8 | 36.3 | 27.7 | 33.3 | 31.5 | 31.2 | 30.5 | 28.3 | 29.6 | 32.6 | - |
| Crude/Brut | 33.6 | 24.3 | 31.8 | 39.9 | 30.5 | 36.2 | 33.9 | 35.8 | 36.1 | 25.1 | 33.6 | 15.0 | - |
| 0-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 25-34 | 2.6 | 4.0 | -- | 6.2 | -- | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | -- | - |
| 35-44 | 17.3 | 13.5 | 10.4 | 15.8 | 10.4 | 19.9 | 17.8 | 12.5 | 10.5 | 19.5 | 14.8 | -- | - |
| 45-54 | 43.0 | 26.0 | -- | 47.8 | 41.3 | 44.0 | 44.9 | 56.8 | 42.0 | 35.6 | 39.7 | -- | - |
| 55-64 | 85.0 | 76.6 | 113.0 | 107.1 | 54.7 | 83.8 | 86.4 | 79.7 | 77.6 | 81.9 | 90.3 | 149.7 | - |
| 65-74 | 116.9 | 81.9 | 159.6 | 150.8 | 136.5 | 121.2 | 115.1 | 116.4 | 125.3 | 103.6 | 108.3 | 288.2 | - |
| 75-84 | 163.5 | 161.6 | 88.2 | 179.6 | 137.6 | 185.0 | 162.5 | 153.7 | 174.4 | 144.6 | 140.7 | -- | - |
| 85 + | 229.4 | 318.8 | 230.4 | 149.7 | 264.0 | 277.6 | 210.5 | 218.1 | 254.2 | 171.4 | 236.4 | -- | - |
| N.S./N.P. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 175 Male breast | | | | | | | | | | | | | |
| 175 Sein chez l'homme | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Crude/Brut | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 179 Uterus, NOS | | | | | | | | | | | | | |
| 179 Utérus, SAI | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 0.3 | 3.8 | 2.4 | 1.0 | 2.6 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | - | 16.2 |
| Crude/Brut | 1.9 | 1.7 | 3.0 | 0.4 | 4.3 | 2.7 | 1.1 | 3.2 | 2.8 | 1.5 | 2.2 | - | 3.5 |
| 0-24 | -- | - | -- | -- | -- | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| 25-34 | 0.1 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4 | 0.3 | -- | - |
| 35-44 | 0.3 | - | -- | -- | -- | 0.7 | -- | -- | -- | 1.0 | 0.4 | -- | - |
| 45-54 | 1.4 | 3.7 | -- | -- | 5.5 | 1.5 | 0.9 | 1.9 | 4.4 | 0.8 | 1.2 | -- | - |
| 55-64 | 3.5 | 9.6 | -- | -- | 9.7 | 5.4 | 2.1 | 6.3 | -- | 4.3 | 2.1 | -- | - |
| 65-74 | 7.3 | 5.9 | -- | 2.8 | 18.0 | 9.5 | 4.4 | 13.2 | 12.0 | 5.5 | 8.2 | -- | - |
| 75-84 | 13.3 | 10.1 | 29.4 | -- | 17.9 | 21.3 | 8.3 | 14.0 | 18.6 | 7.4 | 14.3 | - | 452.5 |
| 85 + | 20.3 | - | 76.8 | 13.6 | 52.8 | 25.7 | 8.0 | 39.7 | 22.1 | 29.8 | 29.0 | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 180 Cervix uteri | | | | | | | | | | | | | |
| 180 Col de l'utérus | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 3.0 | 3.4 | - | 4.2 | 4.2 | 2.3 | 3.6 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 2.3 | - | - |
| Crude/Brut | 3.2 | 3.1 | - | 4.6 | 4.3 | 2.5 | 3.8 | 3.0 | 3.6 | 2.3 | 2.6 | - | - |
| 0-24 | 0.1 | 0.9 | - | - | - | 0.1 | 0.2 | - | 0.5 | - | - | - | - |
| 25-34 | 1.0 | - | - | 3.7 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | - | 1.2 | 1.2 | 0.7 | - | - |
| 35-44 | 3.0 | - | - | 5.7 | 1.7 | 1.9 | 3.5 | 6.3 | 1.5 | 4.6 | 2.7 | - | - |
| 45-54 | 4.4 | 3.7 | - | 2.2 | 11.0 | 3.5 | 5.4 | 1.9 | 2.2 | 5.9 | 2.9 | - | - |
| 55-64 | 5.9 | 9.6 | - | 5.1 | 9.7 | 3.9 | 8.8 | 4.2 | 9.1 | 3.2 | 2.1 | - | - |
| 65-74 | 9.2 | 11.7 | - | 14.0 | 14.4 | 7.6 | 9.5 | 8.8 | 12.0 | 5.5 | 10.4 | - | - |
| 75-84 | 13.3 | 20.2 | - | 18.4 | 17.9 | 11.7 | 17.0 | 14.0 | 11.1 | - | 10.4 | - | - |
| 85 + | 19.3 | 35.4 | - | 27.2 | - | 16.3 | 22.7 | 9.9 | 22.1 | 22.4 | 16.6 | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 181 Placenta | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Crude/Brut | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 15. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)
TABLEAU 15. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. |
| T.-N. T.-N.-P.-É | N.-É. | N.-B. | | | | | | | Alb. | C.-B. | | T.N.-O. |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | |
| 182 Body of uterus | | | | | | | | | | | | |
| 182 Corps de l'utérus | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Crude/Brut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 183 Ovary and other uterine adnexa | | | | | | | | | | | | |
| 183 Ovaire et autres annexes de l'utérus | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Crude/Brut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 184 Female genital organs, other and NOS | | | | | | | | | | | | |
| 184 Organes génitaux féminins, autres et SAI | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Crude/Brut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 185 Prostate | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 29.7 | 30.8 | 40.5 | 32.1 | 29.3 | 30.6 | 28.5 | 34.7 | 32.3 | 30.3 | 27.8 | 83.0 |
| Crude/Brut | 23.3 | 21.0 | 40.0 | 27.9 | 25.0 | 21.8 | 22.1 | 33.1 | 34.1 | 19.6 | 25.3 | 20.4 |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 0.1 | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 2.5 | 3.5 | - | 6.4 | 2.7 | 1.8 | 2.2 | - | 8.7 | 3.2 | 2.8 | - |
| 55-64 | 23.4 | 9.3 | 18.7 | 24.4 | 17.2 | 23.1 | 23.9 | 26.2 | 27.8 | 18.8 | 27.0 | - |
| 65-74 | 113.0 | 101.2 | 282.0 | 121.5 | 112.0 | 118.1 | 106.9 | 124.3 | 110.7 | 128.0 | 102.5 | 253.8 |
| 75-84 | 358.1 | 435.5 | 456.6 | 358.5 | 421.1 | 357.7 | 337.8 | 456.2 | 388.7 | 379.1 | 326.1 | 735.3 |
| 85 + | 676.1 | 697.8 | 324.7 | 804.9 | 474.9 | 735.0 | 666.4 | 746.9 | 733.1 | 590.7 | 635.8 | 3,846.2 |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 186 Testis | | | | | | | | | | | | |
| 186 Testicule | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 0.3 | - | - | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | - |
| Crude/Brut | 0.3 | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - |
| 0-24 | 0.1 | - | - | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 0.5 | - | - | - | 0.6 | 0.6 | - | - | - | 0.7 | - | - |
| 35-44 | 0.3 | - | - | - | 0.2 | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | - |
| 45-54 | 0.2 | - | - | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | 0.4 | - | - | - | 0.7 | - | 4.4 | 2.3 | - | - | - | - |
| 65-74 | 0.4 | - | - | - | - | 0.3 | 2.7 | - | 1.6 | - | - | - |
| 75-84 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | 1.8 | - | - |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 15. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 15. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, la sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| | Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | | N.W.T. | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|--------|-------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | | | | | | | | | | | |
| | | T.-N.-I.-P.-É | N.-É. | N.-B. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 Body of uterus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 Corps de l'utérus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 2.2 | 2.4 | - | 1.2 | 0.7 | 2.5 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 2.3 | 1.5 | - | - | | | | | | | | | | |
| Crude/Brut | 2.4 | 2.1 | - | 1.5 | 0.8 | 2.7 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 2.1 | 1.8 | - | - | | | | | | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 25-34 | -- | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 35-44 | 0.3 | 2.2 | - | - | - | 0.5 | 0.2 | 1.3 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 45-54 | 0.8 | - | - | - | - | 1.0 | 1.1 | 1.9 | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 55-64 | 4.1 | 4.8 | - | 2.6 | 3.2 | 5.4 | 4.3 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 3.4 | - | - | | | | | | | | | | |
| 65-74 | 11.4 | 23.4 | - | 2.8 | - | 9.9 | 15.7 | 4.4 | 7.2 | 12.4 | 8.9 | - | - | | | | | | | | | | |
| 75-84 | 19.0 | - | - | 13.8 | 12.0 | 24.1 | 21.6 | 21.0 | 3.7 | 22.1 | 11.7 | - | - | | | | | | | | | | |
| 85 + | 21.4 | - | - | 27.2 | - | 25.7 | 22.7 | 9.9 | 11.1 | 37.3 | 16.6 | - | - | | | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 183 Ovary and other uterine adnexa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 Ovaire et autres annexes de l'utérus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 8.1 | 5.5 | 6.3 | 9.8 | 6.4 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 8.7 | 7.6 | 8.3 | 8.7 | 8.2 | | | | | | | | | | |
| Crude/Brut | 8.7 | 4.9 | 6.1 | 11.1 | 7.2 | 8.4 | 9.0 | 10.6 | 10.1 | 6.7 | 9.6 | 7.5 | 3.5 | | | | | | | | | | |
| 0-24 | -- | - | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 25-34 | 0.7 | 2.0 | - | 3.7 | - | 0.6 | 0.4 | 2.1 | - | 0.8 | 0.7 | - | - | | | | | | | | | | |
| 35-44 | 2.3 | - | - | - | - | 2.5 | 2.0 | - | 4.5 | 2.0 | 4.5 | - | - | | | | | | | | | | |
| 45-54 | 10.1 | 11.1 | - | 15.2 | 11.0 | 8.6 | 10.8 | 7.6 | 17.7 | 10.2 | 8.8 | 81.0 | - | | | | | | | | | | |
| 55-64 | 21.0 | 14.4 | - | 28.1 | 12.9 | 22.4 | 21.6 | 29.4 | 16.0 | 17.2 | 18.5 | - | 95.0 | | | | | | | | | | |
| 65-74 | 33.9 | 23.4 | 39.9 | 30.7 | 18.0 | 31.6 | 36.1 | 30.7 | 26.5 | 35.9 | 39.3 | - | - | | | | | | | | | | |
| 75-84 | 50.3 | 30.3 | - | 59.9 | 71.8 | 45.4 | 50.5 | 62.9 | 63.1 | 51.5 | 46.9 | - | - | | | | | | | | | | |
| 85 + | 53.7 | - | 153.6 | 81.6 | 35.2 | 51.3 | 56.0 | 69.4 | 44.2 | 29.8 | 58.1 | - | - | | | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 184 Female genital organs, other and NOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 Organes génitaux féminins, autres et NOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | - | | | | | | | | | | |
| Crude/Brut | 0.7 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | - | | | | | | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 25-34 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 35-44 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.5 | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 45-54 | 0.5 | - | - | - | 2.8 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | - | 0.8 | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 55-64 | 0.8 | - | - | - | 3.2 | 0.3 | 0.9 | 4.2 | 2.3 | 1.1 | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 65-74 | 2.3 | - | - | 8.4 | 3.6 | 3.4 | 1.5 | 4.4 | - | 2.8 | 0.7 | - | - | | | | | | | | | | |
| 75-84 | 3.9 | 10.1 | - | 4.6 | - | 4.1 | 5.1 | 3.5 | - | - | 3.9 | - | - | | | | | | | | | | |
| 85 + | 17.7 | - | 76.8 | 27.2 | 17.6 | 16.3 | 17.3 | 9.9 | 22.1 | 14.9 | 20.7 | - | - | | | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 185 Prostate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 Prostata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Crude/Brut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 186 Testis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 Testicule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| Crude/Brut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 15. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause,

Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 15. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | | N.W.T. T.N.-O. | | | | | | | | |
|---|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Mfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | | | | | | | | | |
| | T.-N. I.-P.-É | N.-É. | N.-B. | Alb. | C.-B. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 Other male genital organs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 Autres organes génitaux masculins | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.3 | 0.5 | - | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | - | | | | | | | | |
| Crude/Brut | 0.3 | 0.3 | - | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - | | | | | | | | |
| 0-24 | -- | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 | 1.2 | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 1.0 | - | - | 2.7 | - | 0.3 | 1.8 | 2.2 | - | 1.0 | - | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 1.2 | - | - | - | - | 1.0 | 1.3 | 2.7 | 2.8 | 1.6 | 0.9 | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 1.3 | 13.6 | - | - | - | 2.3 | 0.7 | - | 5.0 | - | - | - | | | | | | | | |
| 85 + | 9.5 | - | - | - | 39.6 | 29.2 | - | - | - | 13.7 | 8.4 | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 188 Bladder | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 Vessie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 7.5 | 8.7 | 9.6 | 6.4 | 8.1 | 8.0 | 7.6 | 7.7 | 5.8 | 7.1 | 6.9 | 35.2 | | | | | | | | |
| Crude/Brut | 6.0 | 6.2 | 9.2 | 5.5 | 6.8 | 5.8 | 6.1 | 7.3 | 5.9 | 4.7 | 6.2 | 13.6 | | | | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 0.5 | - | - | - | - | 0.3 | 0.6 | - | 2.8 | 0.5 | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 1.8 | - | - | - | - | 2.6 | 1.1 | - | 4.4 | 1.6 | 3.9 | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 9.9 | 28.0 | - | 2.7 | 10.3 | 10.7 | 11.5 | 13.1 | 7.0 | 6.3 | 4.7 | 103.2 | | | | | | | | |
| 65-74 | 26.3 | 6.3 | - | 6.8 | 34.5 | 24.2 | 30.0 | 35.1 | 16.6 | 30.8 | 25.0 | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 76.1 | 122.5 | 83.0 | 121.8 | 79.0 | 89.7 | 70.7 | 66.6 | 50.5 | 62.6 | 67.4 | 735.3 | | | | | | | | |
| 85 + | 179.1 | 139.6 | 649.4 | 128.8 | 197.9 | 180.8 | 175.7 | 170.7 | 131.6 | 192.3 | 192.4 | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 189 Kidney and other urinary organs NOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 Rein et organes urinaires autres ou SAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 6.0 | 6.2 | 10.9 | 8.4 | 7.2 | 6.5 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 6.2 | 5.7 | - | | | | | | | | |
| Crude/Brut | 5.2 | 4.8 | 10.8 | 7.5 | 6.5 | 5.4 | 4.7 | 5.3 | 6.1 | 4.3 | 5.5 | - | | | | | | | | |
| 0-24 | -- | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 0.2 | - | - | - | - | 0.3 | 0.2 | - | 2.3 | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 0.9 | 2.2 | - | 2.9 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | - | - | 0.5 | 1.1 | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 5.1 | 3.5 | - | 8.5 | 2.7 | 6.1 | 5.1 | 7.5 | 2.2 | 6.5 | 2.2 | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 12.8 | 18.7 | 74.9 | 24.4 | 5.4 | 14.6 | 11.9 | 15.3 | - | 9.4 | 12.8 | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 27.6 | 31.6 | - | 20.3 | 64.6 | 27.7 | 23.9 | 27.0 | 41.5 | 24.3 | 30.3 | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 46.2 | 27.2 | 124.5 | 60.9 | 43.9 | 53.6 | 42.8 | 30.8 | 50.5 | 38.3 | 67.4 | - | | | | | | | | |
| 85 + | 56.9 | 69.8 | - | 128.8 | 39.6 | 46.7 | 43.1 | 42.7 | 56.4 | 151.1 | 41.8 | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 190 Eye | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 Oeil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.2 | - | - | - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | 0.6 | - | 0.1 | - | | | | | | | | |
| Crude/Brut | 0.2 | - | - | - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | 0.6 | - | 0.1 | - | | | | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 1.4 | - | - | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 0.1 | - | - | - | - | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 55-64 | 0.3 | - | - | - | 3.4 | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 1.1 | - | - | - | - | 1.5 | 1.3 | - | 2.8 | - | 0.9 | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 1.3 | - | - | - | - | 1.2 | 2.1 | - | 5.0 | - | - | - | | | | | | | | |
| 85 + | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.4 | - | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 191 Brain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 Encéphale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 5.8 | 4.2 | 8.1 | 4.9 | 7.0 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 6.5 | | | | | | | | |
| Crude/Brut | 5.4 | 3.8 | 7.7 | 4.7 | 6.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 4.3 | 5.4 | 6.8 | | | | | | | | |
| 0-24 | 0.9 | 0.8 | - | 0.6 | 2.1 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | - | | | | | | | | |
| 25-34 | 1.5 | 2.0 | - | 2.4 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 2.0 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | - | | | | | | | | |
| 35-44 | 3.3 | 6.6 | - | 4.3 | - | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 1.4 | 4.4 | 3.0 | - | | | | | | | | |
| 45-54 | 7.6 | 3.5 | 15.5 | 8.5 | 13.3 | 5.1 | 9.7 | 9.3 | 6.5 | 4.0 | 7.2 | 60.3 | | | | | | | | |
| 55-64 | 16.6 | 14.0 | 74.9 | 13.6 | 17.2 | 18.2 | 17.0 | 19.6 | 28.9 | 11.5 | 12.1 | - | | | | | | | | |
| 65-74 | 23.1 | 6.3 | - | 16.9 | 25.8 | 24.7 | 24.6 | 21.6 | 13.8 | 24.3 | 23.2 | - | | | | | | | | |
| 75-84 | 17.9 | 13.6 | - | - | 26.3 | 19.8 | 19.3 | 10.3 | 15.1 | 17.4 | 20.0 | - | | | | | | | | |
| 85 + | 19.0 | - | - | 32.2 | 39.6 | 29.2 | 19.9 | - | - | 15.7 | 16.7 | - | | | | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 15. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause,

Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 15. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|---------|--|--|--|--|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | N.W.T. | | | | |
| | T.-N. | I.-P.-E. | N.-É. | N.-B. | | | | | Alb. | C.-B. | Yukon | | | | |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 Other male genital organs | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 Autres organes génitaux masculins | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| Crude/Brut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 188 Bladder | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 Vessie | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 2.2 | 3.7 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | | | | |
| Crude/Brut | 2.6 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 2.9 | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 35-44 | 0.1 | - | - | - | - | 0.2 | - | 1.3 | - | - | - | | | | |
| 45-54 | 0.5 | - | - | 2.2 | - | 0.5 | 0.6 | 1.9 | - | - | - | | | | |
| 55-64 | 2.2 | 4.8 | - | - | 6.4 | 2.1 | 1.9 | - | 2.3 | 2.2 | 3.4 | | | | |
| 65-74 | 7.5 | 11.7 | - | 8.4 | 14.4 | 11.8 | 3.9 | 2.2 | 7.2 | 9.7 | 8.2 | | | | |
| 75-84 | 25.5 | 20.2 | - | 27.6 | 29.9 | 27.5 | 25.3 | 27.9 | 11.1 | 27.0 | 26.1 | | | | |
| 85 + | 53.7 | 177.1 | 153.6 | 54.4 | 17.6 | 84.0 | 42.6 | 29.7 | 55.3 | 22.4 | 49.8 | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 189 Kidney and other urinary organs NOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 Rein et organes urinaires autres ou SAI | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 3.0 | 5.5 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 2.8 | 2.7 | 3.9 | 2.2 | 3.3 | 2.9 | | | | |
| Crude/Brut | 3.3 | 4.9 | 6.1 | 4.3 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 4.8 | 2.8 | 3.0 | 3.6 | | | | |
| 0-24 | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | 0.2 | - | | | | |
| 25-34 | 0.1 | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | | | | |
| 35-44 | 0.7 | 2.2 | - | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | - | - | 0.4 | | | | |
| 45-54 | 2.8 | 14.8 | - | 2.2 | 2.8 | 2.3 | 3.0 | 5.7 | 2.2 | 2.5 | 1.2 | | | | |
| 55-64 | 6.2 | 14.4 | - | 7.7 | 9.7 | 7.2 | 5.1 | 8.4 | 2.3 | 9.7 | 3.4 | | | | |
| 65-74 | 11.7 | 29.3 | 19.9 | 16.8 | 14.4 | 9.1 | 9.8 | 15.4 | 16.9 | 9.7 | 16.3 | | | | |
| 75-84 | 22.4 | 10.1 | 29.4 | 36.8 | 29.9 | 20.6 | 22.5 | 21.0 | 7.4 | 27.0 | 24.8 | | | | |
| 85 + | 39.1 | - | 153.6 | 13.6 | 52.8 | 39.7 | 33.3 | 59.5 | 33.2 | 59.6 | 37.3 | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,941.2 | | | | |
| 190 Eye | | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 Oeil | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 0.2 | 0.8 | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | .. | | | | |
| Crude/Brut | 0.2 | 0.7 | - | 0.2 | - | 0.1 | 0.2 | - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | | | | |
| 0-24 | -- | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | | | | |
| 25-34 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 35-44 | -- | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | | | | |
| 45-54 | 0.1 | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | | | | |
| 55-64 | 0.3 | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | 1.1 | - | | | | |
| 65-74 | 0.6 | 11.7 | - | - | - | - | 0.5 | - | 2.4 | 1.4 | - | | | | |
| 75-84 | 1.2 | - | - | - | - | 1.4 | 1.8 | - | - | - | 1.3 | | | | |
| 85 + | 1.0 | - | 13.6 | - | - | 1.3 | - | - | - | - | - | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 191 Brain | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 Encéphale | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 3.9 | 5.3 | 8.6 | 3.5 | 2.7 | 4.0 | 4.0 | 2.8 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | | | | |
| Crude/Brut | 6.1 | 6.9 | 9.1 | 3.7 | 2.9 | 4.3 | 4.2 | 3.0 | 3.4 | 3.2 | 4.3 | | | | |
| 0-24 | 0.6 | 0.9 | 4.1 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | - | 1.1 | 1.0 | 0.4 | | | | |
| 25-34 | 0.9 | 2.0 | 9.2 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 1.6 | - | - | - | - | | | | |
| 35-44 | 2.1 | - | 10.4 | 4.3 | - | 1.4 | 2.6 | 1.3 | 4.5 | 2.0 | 1.9 | | | | |
| 45-54 | 4.8 | 7.4 | - | 4.3 | - | 4.3 | 4.5 | 11.4 | 6.6 | 1.7 | 7.6 | | | | |
| 55-64 | 10.7 | 19.1 | - | 2.6 | 9.7 | 12.2 | 10.1 | 4.2 | 6.9 | 15.1 | 11.6 | | | | |
| 65-74 | 15.0 | - | 39.9 | 14.0 | 10.8 | 16.4 | 16.5 | 6.6 | 12.0 | 15.2 | 14.1 | | | | |
| 75-84 | 15.6 | 40.4 | 29.4 | 13.8 | 12.0 | 17.9 | 15.6 | 10.5 | 3.7 | 9.8 | 18.2 | | | | |
| 85 + | 13.6 | 70.8 | - | - | 17.6 | 18.7 | 13.3 | 19.8 | - | 7.5 | 8.3 | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 15. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)
 TABLEAU 15. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | N.W.T. |
|--|---|------------------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|---------|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | |
| | T.-N. T.-N.-P.-É | I.-P.-É N.-É. | N.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | T.N.-O. |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | |
| 192 Other parts of nervous system | | | | | | | | | | | |
| 192 Autres parties du système nerveux | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 0.2 | - | - | 0.2 | - | 0.1 | 0.2 | - | - | 0.4 | 0.3 |
| Crude/Brut | 0.2 | - | - | 0.2 | - | 0.1 | 0.2 | - | - | 0.3 | 0.3 |
| 0-24 | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | 0.2 | - | - | 0.2 | - |
| 25-34 | 0.2 | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | 0.4 | 0.3 |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - |
| 55-64 | 0.1 | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - |
| 65-74 | 0.6 | - | - | 3.4 | - | 1.0 | - | - | - | 1.6 | 0.9 |
| 75-84 | 1.0 | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | 3.5 | 3.6 |
| 85 + | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.4 |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 193 Thyroid gland | | | | | | | | | | | |
| 193 Corps thyroïde | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 0.3 | - | - | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | - | 0.3 | 0.3 |
| Crude/Brut | 0.3 | - | - | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | - | 0.2 | 0.3 |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | -- | - | - | - | 1.7 | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 0.2 | - | - | - | - | 0.3 | 0.2 | - | - | - | 0.6 |
| 55-64 | 1.1 | - | - | - | - | 1.3 | 0.9 | - | - | 3.1 | 1.3 |
| 65-74 | 1.1 | - | - | - | 4.3 | 2.0 | 1.0 | - | - | - | 0.9 |
| 75-84 | 3.1 | - | - | 6.8 | - | 3.5 | 4.3 | 5.1 | - | - | 1.8 |
| 85 + | 3.6 | - | - | - | - | 5.8 | 6.6 | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 194 Other endocrine glands and related structures | | | | | | | | | | | |
| 194 Autres glandes endocrines et structures apparentes | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 0.3 | - | 3.0 | 0.4 | - | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Crude/Brut | 0.3 | - | 3.1 | 0.4 | - | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 0-24 | 0.3 | - | 3.9 | 0.6 | - | 0.2 | 0.3 | 0.5 | - | - | 0.2 |
| 25-34 | -- | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 0.3 | - | 10.3 | - | - | 0.2 | 0.4 | 1.2 | - | - | - |
| 45-54 | 0.3 | - | - | - | - | 0.5 | 0.6 | - | - | - | - |
| 55-64 | 0.5 | - | - | - | - | 1.0 | 0.2 | - | 2.3 | 1.0 | - |
| 65-74 | 1.0 | - | - | 3.4 | - | 2.0 | 1.0 | - | - | - | - |
| 75-84 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | 5.1 | - | - | - |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 195 Other and ill-defined sites | | | | | | | | | | | |
| 195 Sièges autres et mal définis | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 0.5 | 1.1 | - | 0.3 | 1.5 | - | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 |
| Crude/Brut | 0.3 | 0.7 | - | 0.2 | 1.4 | - | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | -- | - | - | - | 1.7 | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 0.1 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - |
| 55-64 | 0.8 | - | - | 3.4 | - | 1.3 | 2.2 | - | - | 1.0 | 0.7 |
| 65-74 | 0.8 | - | - | - | - | 0.6 | 2.7 | - | - | 3.2 | 1.8 |
| 75-84 | 3.6 | - | - | 26.3 | - | 4.3 | - | 5.0 | 7.0 | 3.6 | - |
| 85 + | 16.6 | 69.8 | - | 32.2 | - | 13.3 | 21.3 | 37.6 | 27.5 | 25.1 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.
 (1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.
 (2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.
 (2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 15. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 15. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | N.W.T. |
|--|---|--------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| | Mfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | |
| | T.-N. I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | Yukon |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | |
| 192 Other parts of nervous system | | | | | | | | | | | |
| 192 Autres parties du système nerveux | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | - |
| Crude/Brut | 0.1 | - | - | - | - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - | 0.1 | - |
| 0-24 | -- | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - |
| 25-34 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | 0.2 | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | - | - |
| 65-74 | 0.7 | - | - | - | - | 0.8 | 1.0 | 2.2 | - | - | - |
| 75-84 | 0.2 | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 193 Thyroid gland | | | | | | | | | | | |
| 193 Corps thyroïde | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.5 | 1.1 | - | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| Crude/Brut | 0.5 | 1.0 | - | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | -- | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - |
| 35-44 | -- | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - |
| 45-54 | 0.4 | 3.7 | - | - | - | - | 0.4 | 1.9 | - | 1.7 | - |
| 55-64 | 0.6 | - | - | 2.6 | - | 0.5 | 0.4 | - | - | 1.1 | 1.4 |
| 65-74 | 2.0 | - | - | - | 3.6 | 1.9 | 2.6 | 4.4 | 2.4 | - | 1.5 |
| 75-84 | 4.1 | 20.2 | - | 4.6 | 6.0 | 6.2 | 4.1 | - | - | - | 2.6 |
| 85 + | 6.3 | - | - | - | - | 11.7 | 5.3 | 9.9 | 11.1 | 7.5 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 194 Other endocrine glands and related structures | | | | | | | | | | | |
| 194 Autres glandes endocrines et structures apparentes | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.3 | - | - | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
| Crude/Brut | 0.3 | - | - | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| 0-24 | 0.2 | - | - | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | - | 0.5 | - | - |
| 25-34 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - |
| 35-44 | 0.2 | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - | 0.8 |
| 45-54 | 0.1 | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - |
| 55-64 | 1.0 | - | - | - | 3.2 | 1.2 | 1.3 | - | - | 1.1 | - |
| 65-74 | 0.6 | - | - | - | 3.6 | 0.4 | 0.3 | - | - | 2.8 | 0.7 |
| 75-84 | 1.4 | - | - | 4.6 | - | 2.8 | - | 7.0 | - | - | 1.3 |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 195 Other and ill-defined sites | | | | | | | | | | | |
| 195 Sièges autres et mal définis | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.5 | 2.6 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | - | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.6 |
| Crude/Brut | 0.6 | 2.4 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | - | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.5 | - |
| 45-54 | 0.3 | - | - | - | 2.8 | - | 0.4 | - | - | 0.8 | - |
| 55-64 | 0.7 | 4.8 | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | 1.4 |
| 65-74 | 1.7 | - | - | 11.2 | - | - | 1.5 | - | 4.8 | 4.1 | 1.5 |
| 75-84 | 4.8 | 40.4 | - | 4.6 | 6.0 | - | 6.0 | 7.0 | - | 7.4 | 5.2 |
| 85 + | 13.0 | 70.8 | 76.8 | - | 17.6 | - | 12.0 | 19.8 | 22.1 | 29.8 | 16.6 |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 15. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause,
Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)
TABLEAU 15. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9
suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et la groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | | N.W.T. T.N.-O. | |
|---|---|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | | |
| | T.-N. | I.-P.-É | N.-É. | N.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | | |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | |
| Males • Hommes | | | | | | | | | | | | | |
| 196 Lymph nodes, secondary and NOS | | | | | | | | | | | | | |
| 196 Ganglion lymphatiques, secondaires et SAI | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Crude/Brut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 197 Secondary, respiratory and digestive | | | | | | | | | | | | | |
| 197 Secondaires, respiratoire et digestif | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Crude/Brut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 198 Secondary of other specified sites | | | | | | | | | | | | | |
| 198 Secundaire d'autres siéges précisés | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Crude/Brut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 199 Site unspecified | | | | | | | | | | | | | |
| 199 Siège non précisé | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 11.3 | 17.7 | 6.5 | 19.7 | 12.4 | 8.4 | 11.5 | 11.8 | 12.5 | 12.4 | 11.3 | 22.9 | 35.4 |
| Crude/Brut | 9.5 | 13.4 | 6.2 | 18.2 | 10.8 | 6.6 | 9.8 | 11.3 | 12.9 | 8.5 | 10.8 | 13.6 | 9.7 |
| 0-24 | 0.1 | - | - | 0.6 | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.5 | 0.2 | - | - | - |
| 25-34 | 0.7 | 4.1 | - | - | 1.5 | 0.3 | 0.8 | - | 1.2 | 0.8 | 0.3 | - | - |
| 35-44 | 1.1 | - | - | 1.4 | - | 1.2 | 1.1 | - | 4.3 | 0.5 | 0.4 | 34.8 | - |
| 45-54 | 6.2 | 3.5 | 15.5 | 17.1 | 8.0 | 3.1 | 7.2 | 5.6 | 6.5 | 4.8 | 7.8 | - | - |
| 55-64 | 20.3 | 23.3 | 18.7 | 32.5 | 34.4 | 15.0 | 22.5 | 24.0 | 18.6 | 12.5 | 22.9 | - | - |
| 65-74 | 53.9 | 107.5 | 47.0 | 104.7 | 47.4 | 34.6 | 55.2 | 64.8 | 58.1 | 59.9 | 54.4 | 253.8 | 518.1 |
| 75-84 | 95.6 | 163.3 | - | 162.3 | 96.5 | 80.4 | 93.5 | 82.0 | 80.8 | 135.6 | 91.1 | - | - |
| 85 + | 140.0 | 139.6 | - | 161.0 | 158.3 | 122.5 | 129.3 | 170.7 | 225.6 | 151.1 | 133.8 | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 15. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause,

Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 15. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | N.W.T. |
|---|---|--------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|------|---------|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | |
| T.-N. I.-P.-É | N.-É. | N.-B. | | | | | | | | | T.N.-O. |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | |
| 196 Lymph nodes, secondary and NOS | | | | | | | | | | | |
| 196 Ganglion lymphatiques, secondaires et SAI | | | | | | | | | | | |
| S./N. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Crude/Brut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 197 Secondary, respiratory and digestive | | | | | | | | | | | |
| 197 Secondaires, respiratoire et digestif | | | | | | | | | | | |
| S./N. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Crude/Brut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 198 Secondary of other specified sites | | | | | | | | | | | |
| 198 Secondaire d'autres sièges précises | | | | | | | | | | | |
| S./N. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Crude/Brut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 199 Site unspecified | | | | | | | | | | | |
| 199 Siège non précisé | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 7.4 | 12.0 | 10.2 | 11.5 | 9.7 | 5.5 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 8.5 | 6.3 |
| Crude/Brut | 8.3 | 11.1 | 13.6 | 13.9 | 11.0 | 6.2 | 8.8 | 10.7 | 9.5 | 7.5 | 7.7 |
| 0-24 | 0.1 | - | - | 0.6 | - | 0.2 | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 0.2 | 2.0 | - | 1.2 | - | 0.2 | - | - | - | - | 0.3 |
| 35-44 | 1.2 | - | - | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 1.3 | 3.0 | 1.5 | 0.4 |
| 45-54 | 4.2 | - | - | 6.5 | 5.5 | 2.0 | 5.4 | - | 6.6 | 3.4 | 6.4 |
| 55-64 | 14.1 | 14.4 | - | 15.3 | 16.1 | 10.1 | 14.8 | 16.8 | 25.1 | 20.5 | 11.6 |
| 65-74 | 30.6 | 46.8 | 79.8 | 64.2 | 57.5 | 22.1 | 32.0 | 35.1 | 26.5 | 35.9 | 20.8 |
| 75-84 | 62.7 | 161.6 | 88.2 | 69.1 | 77.8 | 53.0 | 61.5 | 66.4 | 52.0 | 83.3 | 57.3 |
| 85 + | 108.4 | 141.7 | 153.6 | 190.5 | 70.4 | 88.7 | 118.6 | 158.6 | 77.4 | 67.1 | 103.7 |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 15. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 15. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | N.W.T. | | | | | |
|---|---|--------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|--|--|--|--|--|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | | | | | | |
| | T.-N. I.-P.-É | N.-É. | N.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | | | | | | |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 Lymphosarcoma and reticulosarcoma | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 Lymphosarcome et réticulosarcome | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 0.8 | 0.9 | - | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | - | 1.3 | 0.5 | 0.5 | | | | | |
| Crude/Brut | 0.7 | 0.7 | - | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | - | 1.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | |
| 0-24 | -- | -- | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | | | | | |
| 25-34 | 0.2 | - | - | 1.2 | - | 0.4 | - | - | - | - | - | | | | | |
| 35-44 | 0.2 | - | - | - | - | 0.5 | 0.1 | - | - | 0.5 | - | | | | | |
| 45-54 | 0.8 | - | - | - | - | 1.8 | 0.6 | - | - | 0.6 | - | | | | | |
| 55-64 | 1.5 | - | - | - | - | 2.6 | 1.5 | - | 2.3 | 1.0 | 0.7 | | | | | |
| 65-74 | 3.6 | 6.3 | - | 3.4 | 4.3 | 7.9 | 1.3 | - | 2.8 | 4.9 | 2.7 | | | | | |
| 75-84 | 5.5 | 13.6 | - | - | 8.8 | 7.0 | 5.0 | - | 25.2 | - | 1.8 | | | | | |
| 85 + | 3.6 | - | - | - | - | 5.8 | 3.3 | - | - | - | 8.4 | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 201 Hodgkin's disease | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 Maladie de Hodgkin | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 0.8 | - | - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | | | | | |
| Crude/Brut | 0.7 | - | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | | | | | |
| 0-24 | 0.1 | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - | 0.2 | - | | | | | |
| 25-34 | 0.5 | - | - | - | - | 0.9 | 0.3 | 1.0 | - | 0.8 | 0.3 | | | | | |
| 35-44 | 0.6 | - | - | - | - | 1.2 | 0.6 | - | - | 0.5 | 0.4 | | | | | |
| 45-54 | 0.4 | - | - | - | - | 0.3 | 0.4 | - | 2.2 | 0.8 | 0.6 | | | | | |
| 55-64 | 1.5 | - | - | 8.1 | 3.4 | 2.9 | 0.7 | - | 2.3 | - | 0.7 | | | | | |
| 65-74 | 1.9 | - | - | - | 4.3 | 4.0 | 1.3 | 2.7 | - | 1.6 | 0.9 | | | | | |
| 75-84 | 5.2 | - | - | 13.5 | 17.5 | 4.7 | 4.3 | 5.1 | 5.0 | - | 7.3 | | | | | |
| 85 + | 5.9 | - | - | - | - | 5.8 | - | 42.7 | 18.8 | 13.7 | - | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 202 Other of lymphoid and histiocytic tissue | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 Autres des tissus lymphoïdes et histiocytaires | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 7.1 | 2.8 | 1.6 | 9.4 | 7.3 | 6.9 | 7.7 | 7.2 | 8.1 | 7.3 | 5.5 | | | | | |
| Crude/Brut | 6.1 | 2.1 | 1.5 | 8.6 | 6.5 | 5.7 | 6.7 | 6.9 | 8.3 | 5.3 | 5.2 | | | | | |
| 0-24 | 0.3 | - | - | 0.6 | - | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | - | - | | | | | |
| 25-34 | 0.8 | - | - | 1.2 | 3.0 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 2.3 | 0.4 | 0.3 | | | | | |
| 35-44 | 1.9 | - | - | 2.9 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 1.2 | - | 1.9 | 2.6 | | | | | |
| 45-54 | 6.4 | 7.1 | - | 10.7 | 2.7 | 9.7 | 3.9 | 5.6 | 6.5 | 7.3 | 6.7 | | | | | |
| 55-64 | 14.7 | 9.3 | - | 24.4 | 10.3 | 15.3 | 17.7 | 15.3 | 25.5 | 12.5 | 6.7 | | | | | |
| 65-74 | 26.7 | - | 23.5 | 30.4 | 34.5 | 19.8 | 32.9 | 35.1 | 16.6 | 27.5 | 23.2 | | | | | |
| 75-84 | 54.0 | 13.6 | - | 60.9 | 70.2 | 45.4 | 60.7 | 41.0 | 75.7 | 73.0 | 40.1 | | | | | |
| 85 + | 81.8 | 69.8 | - | 96.6 | 39.6 | 110.8 | 82.9 | 85.4 | 75.2 | 55.0 | 66.9 | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 203 Multiple myeloma and immunoproliferative neoplasms | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 Myélose multiple et tumeurs immuno-prolifératives | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 4.3 | 3.2 | 4.7 | 2.6 | 3.6 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 4.3 | | | | | |
| Crude/Brut | 3.6 | 2.4 | 4.6 | 2.4 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 4.5 | 5.2 | 3.3 | 4.1 | | | | | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 35-44 | 0.5 | - | - | 2.9 | - | 0.3 | 0.4 | 1.2 | - | 1.0 | 0.4 | | | | | |
| 45-54 | 2.3 | 3.5 | - | 2.1 | 5.3 | 1.5 | 2.6 | 5.6 | 2.2 | 2.4 | 1.1 | | | | | |
| 55-64 | 8.3 | 6.7 | - | 5.4 | 6.9 | 9.1 | 7.7 | 6.5 | 9.3 | 11.5 | 8.8 | | | | | |
| 65-74 | 19.4 | 6.3 | 47.0 | 10.1 | 17.2 | 19.8 | 21.7 | 16.2 | 19.4 | 16.2 | 17.8 | | | | | |
| 75-84 | 37.1 | 54.4 | 41.5 | 20.3 | 35.1 | 33.8 | 32.8 | 51.3 | 50.5 | 38.3 | 45.5 | | | | | |
| 85 + | 60.5 | - | - | - | - | 75.8 | 69.6 | 42.7 | 75.2 | 68.7 | 50.2 | | | | | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.
(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.
(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.
(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 15. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 15. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | | N.W.T. |
|---|---|--------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|---------|--------|
| | Nfld. | P.E.I. | M.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | |
| T.-N. I.-P.-É | N.-É. | N.-B. | | | | | | | Alb. | C.-B. | T.N.-O. | |
| Rate per 100,000 • Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | |
| Females • Femmes | | | | | | | | | | | | |
| 200 Lymphosarcoma and reticulosarcoma | | | | | | | | | | | | |
| 200 Lymphosarcome et réticulosarcome | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 0.5 | - | - | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | - |
| Crude/Brut | 0.6 | - | - | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | - |
| 0-24 | 0.1 | - | - | - | 0.2 | - | 0.5 | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 0.2 | - | - | - | 0.3 | - | - | 1.2 | 0.4 | - | - | - |
| 35-44 | 0.1 | - | - | - | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 0.4 | - | - | - | 0.8 | 0.2 | - | 2.2 | 0.8 | - | - | - |
| 55-64 | 1.1 | - | - | 2.6 | - | 2.7 | 0.6 | 2.1 | - | - | - | - |
| 65-74 | 1.7 | - | - | - | 3.0 | 1.8 | 2.2 | - | 1.4 | 0.7 | - | - |
| 75-84 | 4.2 | - | - | 4.6 | 12.0 | 9.6 | 2.3 | - | 3.7 | - | 2.6 | - |
| 85 + | 5.2 | - | - | - | 17.6 | 9.3 | 4.0 | 9.9 | 11.1 | - | - | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 201 Hodgkin's disease | | | | | | | | | | | | |
| 201 Maladie de Hodgkin | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | - |
| Crude/Brut | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | - |
| 0-24 | -- | 0.9 | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | 0.6 | - | - | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 2.1 | - | - | - | - |
| 35-44 | 0.1 | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 0.2 | - | - | - | 2.8 | - | - | - | - | 1.2 | - | - |
| 55-64 | 0.4 | - | - | - | - | 1.2 | - | - | 2.3 | - | - | - |
| 65-74 | 1.7 | - | 19.9 | - | 7.2 | 1.1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | - | 1.5 | - |
| 75-84 | 2.7 | - | - | - | - | 2.1 | 4.1 | - | 3.7 | 2.5 | 2.6 | - |
| 85 + | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.3 | - | - | - | 4.1 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 202 Other of lymphoid and histiocytic tissue | | | | | | | | | | | | |
| 202 Autres des tissus lymphoïdes et histiocytaires | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 4.9 | 4.9 | 2.4 | 5.3 | 6.6 | 6.9 | 5.0 | 6.6 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | - |
| Crude/Brut | 5.4 | 4.5 | 3.0 | 6.3 | 7.2 | 5.4 | 5.6 | 8.2 | 5.3 | 3.9 | 5.1 | - |
| 0-24 | 0.1 | - | - | 0.6 | - | 0.3 | 0.1 | - | - | 0.2 | - | - |
| 25-34 | 0.5 | 2.0 | - | 1.2 | - | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | - |
| 35-44 | 0.7 | 4.5 | - | 2.9 | - | 0.7 | 0.5 | - | - | 1.5 | 0.4 | - |
| 45-54 | 4.5 | 3.7 | - | 4.3 | 13.8 | 4.3 | 3.4 | 7.6 | 4.4 | 5.9 | 5.3 | - |
| 55-64 | 9.0 | 4.8 | - | 2.6 | 12.9 | 10.4 | 8.6 | 14.7 | 4.6 | 11.8 | 6.8 | - |
| 65-74 | 21.5 | 11.7 | 19.9 | 27.9 | 28.7 | 19.1 | 26.1 | 22.0 | 28.9 | 16.6 | 11.9 | - |
| 75-84 | 42.1 | 60.6 | 29.4 | 27.6 | 47.9 | 40.6 | 45.0 | 55.9 | 33.4 | 29.4 | 43.0 | - |
| 85 + | 42.7 | - | - | 81.6 | 35.2 | 51.3 | 36.0 | 79.3 | 11.1 | 14.9 | 58.1 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 203 Multiple myeloma and immunoproliferative neoplasms | | | | | | | | | | | | |
| 203 Myélose multiple et tumeurs immuno-prolifératives | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 2.7 | 1.9 | 4.8 | 4.0 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | - |
| Crude/Brut | 3.0 | 1.7 | 6.1 | 4.6 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 4.8 | 3.6 | 2.6 | 2.8 | - |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35-44 | 0.1 | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - | - |
| 45-54 | 1.6 | 3.7 | - | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 0.7 | - | 2.2 | 2.5 | 1.2 | - |
| 55-64 | 5.8 | - | 18.8 | 15.3 | 9.7 | 6.3 | 5.6 | 2.1 | 2.3 | 6.5 | 4.8 | - |
| 65-74 | 13.4 | 5.9 | 19.9 | 11.2 | 7.2 | 13.3 | 12.9 | 11.0 | 26.5 | 18.0 | 11.9 | - |
| 75-84 | 26.1 | 50.5 | 29.4 | 46.0 | 12.0 | 22.7 | 23.9 | 52.4 | 14.8 | 14.7 | 20.8 | - |
| 85 + | 25.0 | - | 76.8 | - | 52.8 | 23.3 | 25.3 | 59.5 | 11.1 | 22.4 | 20.7 | - |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 15. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)
TABLEAU 15. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|---------|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. | | N.B. | | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. |
| | T.-N. | I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | | | | | | | Alb. | C.-B. | | T.N.-O. |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 Lymphoid leukemia | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 Leucémie lymphoïde | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 2.8 | 1.4 | 3.0 | 2.2 | 1.4 | 3.3 | 3.2 | 1.1 | 1.4 | 3.0 | 2.3 | - | - | |
| Crude/Brut | 2.4 | 1.4 | 3.1 | 2.0 | 1.1 | 2.7 | 2.7 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 2.1 | - | - | |
| 0-24 | 0.8 | 1.6 | - | - | - | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | - | - | |
| 25-34 | 0.3 | - | - | - | - | 0.6 | 0.3 | - | - | 0.4 | - | - | - | |
| 35-44 | 0.3 | - | - | 1.4 | - | - | 0.5 | - | 1.4 | - | - | - | - | |
| 45-54 | 0.6 | - | - | - | - | 0.3 | 1.3 | - | - | 0.8 | - | - | - | |
| 55-64 | 4.1 | - | - | 5.4 | - | 6.8 | 3.3 | - | 4.6 | 4.2 | 3.4 | - | - | |
| 65-74 | 10.8 | 12.6 | - | 10.1 | - | 11.4 | 13.4 | 2.7 | 2.8 | 13.0 | 8.9 | - | - | |
| 75-84 | 24.1 | - | 83.0 | 13.5 | 17.5 | 32.6 | 27.1 | 15.4 | 10.1 | 20.9 | 18.2 | - | - | |
| 85 + | 39.1 | - | - | 32.2 | 79.1 | 35.0 | 43.1 | 21.3 | - | 41.2 | 58.6 | - | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 205 Myeloid leukemia | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 Leucémie myéloïde | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 2.8 | 4.6 | - | 2.3 | 0.6 | 2.5 | 3.3 | 3.0 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | - | - | |
| Crude/Brut | 2.5 | 3.8 | - | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 1.9 | 2.7 | - | - | |
| 0-24 | 0.2 | - | - | 0.6 | - | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | - | - | - | |
| 25-34 | 0.7 | 4.1 | - | - | - | 0.9 | 0.3 | 1.0 | - | 1.1 | 0.7 | - | - | |
| 35-44 | 1.1 | - | - | - | - | 0.7 | 1.9 | 1.2 | - | 0.5 | 1.5 | - | - | |
| 45-54 | 2.4 | 7.1 | - | - | - | 1.8 | 4.6 | - | - | - | 0.6 | - | - | |
| 55-64 | 6.1 | 9.3 | - | 5.4 | 3.4 | 5.5 | 7.1 | 8.7 | 2.3 | 2.1 | 7.4 | - | - | |
| 65-74 | 9.6 | 12.6 | - | 6.8 | 4.3 | 7.4 | 9.9 | 13.5 | 16.6 | 6.9 | 13.4 | - | - | |
| 75-84 | 18.7 | 40.8 | - | 33.8 | - | 17.5 | 21.4 | 10.3 | 15.1 | 24.3 | 12.8 | - | - | |
| 85 + | 34.4 | - | - | - | - | 35.0 | 36.5 | 42.7 | 18.8 | 68.7 | 33.5 | - | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 206 Monocytic leukemia | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 Leucémie monocytique | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 0.1 | - | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | - | 0.2 | - | - | |
| Crude/Brut | 0.1 | - | - | 0.2 | - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | - | 0.2 | - | - | |
| 0-24 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35-44 | 0.1 | - | - | 1.4 | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55-64 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | |
| 65-74 | 0.8 | - | - | - | - | 1.5 | 0.3 | 2.7 | - | - | 1.8 | - | - | |
| 75-84 | 1.3 | - | - | - | - | 2.3 | 1.4 | - | - | - | 1.8 | - | - | |
| 85 + | 1.2 | - | - | - | - | - | 3.3 | - | - | - | - | - | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 207 Other specified leukemia | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 Autres leucémies précises | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | -- | - | - | - | - | -- | -- | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | |
| Crude/Brut | -- | - | - | - | - | -- | -- | - | - | 0.1 | 0.1 | - | - | |
| 0-24 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55-64 | 0.2 | - | - | - | - | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75-84 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | - | - | |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 208 Leukemia of unspecified cell type | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 Leucémie à cellules non précisées | | | | | | | | | | | | | | |
| S./M. | 2.7 | 1.3 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 4.2 | 2.5 | 3.0 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | - | - | |
| Crude/Brut | 2.3 | 1.0 | 3.1 | 2.7 | 2.4 | 3.4 | 2.1 | 2.9 | 2.8 | 0.9 | 1.5 | - | - | |
| 0-24 | 0.3 | - | - | - | - | 0.4 | 0.2 | 0.5 | - | 0.8 | 0.5 | - | - | |
| 25-34 | 0.4 | - | - | - | - | 1.0 | 0.3 | - | 1.2 | - | - | - | - | |
| 35-44 | 0.4 | - | - | - | - | 1.0 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | |
| 45-54 | 1.6 | - | - | 2.1 | - | 3.1 | 1.5 | - | - | - | 1.1 | - | - | |
| 55-64 | 3.5 | - | - | - | 6.9 | 4.6 | 3.3 | 4.4 | 7.0 | 2.1 | 2.7 | - | - | |
| 65-74 | 10.8 | 12.6 | - | 20.3 | 8.6 | 15.3 | 8.6 | 21.6 | 11.1 | 4.9 | 6.2 | - | - | |
| 75-84 | 25.2 | 13.6 | 41.5 | 33.8 | 43.9 | 38.5 | 23.6 | 20.5 | 30.3 | 7.0 | 12.8 | - | - | |
| 85 + | 34.4 | - | 162.3 | - | - | 58.3 | 46.4 | 21.3 | - | 13.7 | 16.7 | - | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

TABLE 15. Age-standardized, Crude and Age-specific Rates of Deaths due to Cancer by ICD-9 3-digit Cause, Sex and Age Group, Canada and Provinces, 1990 (1,2)

TABLEAU 15. Taux normalisés selon l'âge, taux bruts et par âge, de décès dus au cancer selon la cause de la CIM-9 suivant la rubrique à 3 chiffres, le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1990 (1,2)

| Canada | Province of residence - Province de résidence | | | | | | | | | | | N.W.T. T.N.-O. | |
|--|---|--------|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------------------|--|
| | Nfld. | P.E.I. | N.S. | M.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | | |
| | T.-N. I.-P.-É | N.-É. | N.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | | | |
| Rate per 100,000 - Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | | |
| 204 Lymphoid leukemia | | | | | | | | | | | | | |
| 204 Leucémie lymphoïde | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 1.4 | 1.2 | - | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 2.3 | 1.1 | - | |
| Crude/Brut | 1.5 | 1.0 | - | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 2.1 | 1.4 | - | |
| 0-24 | 0.5 | - | - | 0.6 | - | 0.8 | 0.6 | 0.5 | - | 0.4 | - | - | |
| 25-34 | 0.3 | - | - | - | 1.5 | 0.3 | 0.2 | - | - | - | 0.3 | - | |
| 35-44 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.4 | - | |
| 45-54 | 0.9 | - | - | - | - | 1.0 | 0.9 | 3.8 | - | 0.8 | 0.6 | - | |
| 55-64 | 2.0 | 4.8 | - | 5.1 | 3.2 | 0.9 | 1.9 | 2.1 | - | 6.5 | 1.4 | - | |
| 65-74 | 3.6 | 5.9 | - | 2.8 | 10.8 | 4.2 | 2.6 | - | 2.4 | 5.5 | 4.5 | - | |
| 75-84 | 10.7 | 10.1 | - | 13.8 | 23.9 | 10.3 | 9.6 | 7.0 | 3.7 | 19.6 | 10.4 | - | |
| 85 + | 21.4 | - | - | - | 18.7 | 26.7 | 19.8 | 22.1 | 37.3 | 16.6 | - | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 205 Myeloid leukemia | | | | | | | | | | | | | |
| 205 Leucémie myéloïde | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 2.2 | 1.0 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 1.5 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 2.1 | 2.2 | - | |
| Crude/Brut | 2.3 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.7 | 1.6 | 2.9 | 2.1 | 2.8 | 1.9 | 2.5 | - | |
| 0-24 | 0.3 | 1.7 | - | - | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | - | - | 0.2 | - | |
| 25-34 | 0.4 | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | 0.4 | 0.3 | - | |
| 35-44 | 1.3 | - | - | 4.3 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | - | 1.5 | - | 1.5 | - | |
| 45-54 | 2.4 | - | - | - | 8.3 | 1.0 | 3.5 | - | 4.4 | 0.8 | 2.9 | - | |
| 55-64 | 4.0 | 4.8 | 18.8 | - | 3.2 | 3.9 | 4.9 | - | 4.6 | 3.2 | 3.4 | - | |
| 65-74 | 7.7 | - | - | 11.2 | 3.6 | 3.8 | 6.5 | 15.4 | 19.3 | 11.1 | 11.9 | - | |
| 75-84 | 12.4 | - | - | 9.2 | 6.0 | 9.6 | 17.9 | 10.5 | 3.7 | 14.7 | 9.1 | - | |
| 85 + | 20.3 | - | - | 40.8 | 35.2 | 18.7 | 24.0 | - | - | 37.3 | 12.4 | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 206 Monocytic leukemia | | | | | | | | | | | | | |
| 206 Leucémie monocyttaire | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 0.1 | - | - | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.2 | - | .. | - | |
| Crude/Brut | 0.1 | - | - | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.1 | - | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35-44 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55-64 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75-84 | 0.8 | - | - | 4.6 | - | 0.7 | 0.9 | - | - | - | 1.3 | - | |
| 85 + | 1.6 | - | - | - | - | 7.0 | - | - | - | - | - | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 207 Other specified leukemia | | | | | | | | | | | | | |
| 207 Autres leucémies précises | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Crude/Brut | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 0-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35-44 | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | |
| 45-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 65-74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 75-84 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | |
| 85 + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 208 Leukemia of unspecified cell type | | | | | | | | | | | | | |
| 208 Leucémie à cellules non précisées | | | | | | | | | | | | | |
| S./N. | 1.7 | 1.4 | 4.4 | 1.3 | 2.8 | 2.5 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | - | |
| Crude/Brut | 1.9 | 1.4 | 6.1 | 1.5 | 3.5 | 2.7 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | - | |
| 0-24 | 0.2 | 0.9 | 4.1 | - | 0.7 | 0.3 | 0.1 | - | 0.5 | - | 0.4 | - | |
| 25-34 | 0.1 | - | - | - | 1.5 | - | 0.2 | - | - | - | - | - | |
| 35-44 | 0.4 | - | - | 1.4 | - | 0.9 | 0.1 | - | - | 1.0 | - | - | |
| 45-54 | 1.3 | - | - | 4.3 | - | 2.5 | 0.7 | 1.9 | 2.2 | 0.8 | - | - | |
| 55-64 | 2.5 | 4.8 | - | - | 4.8 | 1.7 | 4.2 | - | 2.2 | 1.4 | - | - | |
| 65-74 | 6.2 | - | 19.9 | 2.8 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 4.4 | 14.5 | - | 3.0 | - | |
| 75-84 | 12.2 | 20.2 | - | 4.6 | 29.9 | 17.2 | 12.4 | 7.0 | 7.4 | 7.4 | 6.5 | - | |
| 85 + | 27.1 | - | 153.6 | 27.2 | 70.4 | 39.7 | 22.7 | 29.7 | 11.1 | 29.8 | 8.3 | - | |
| N.S./N.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

(1) Rates for Yukon and N.W.T. should be interpreted with caution due to small number of cases.

(1) On doit faire preuve de prudence dans l'interprétation des taux du Yukon et des T.N.-O. en raison du petit nombre de cas.

(2) Age-standardized rates (S.) were calculated using the Canada 1991 Census population.

(2) Les taux normalisés selon l'âge (N.) ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991.

Historical Tables

Tableaux Historiques

TABLE 16. New Primary Sites of Cancer by Sex, Canada and Provinces, 1969 to 1990 (1)
 TABLEAU 16. Nouveaux sièges primaires de cancer selon le sexe, Canada et provinces, 1969 à 1990 (1)

| Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. | |
|---------------------------------|----------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|-----|
| | T.-N. I.-P.-E. | N.-É. | N.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | | T.N.-O. | |
| Number of cases - Nombre de cas | | | | | | | | | | | | | |
| Both sexes | | | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | | |
| 1969 | 49,188 | 890 | 226 | 1,906 | 1,427 | 11,331 | 19,494 | 2,810 | 2,470 | 2,871 | 5,707 | 32 | 24 |
| 1970 | 49,344 | 928 | 229 | 1,993 | 1,502 | 11,033 | 19,183 | 2,947 | 2,427 | 3,094 | 5,927 | 39 | 42 |
| 1971 | 51,665 | 935 | 226 | 1,927 | 1,448 | 11,545 | 20,206 | 2,936 | 2,533 | 3,146 | 6,680 | 33 | 50 |
| 1972 | 53,557 | 1,084 | 264 | 1,911 | 1,510 | 11,882 | 21,387 | 3,014 | 2,659 | 3,300 | 6,463 | 39 | 44 |
| 1973 | 57,091 | 1,067 | 312 | 1,933 | 1,670 | 12,208 | 23,286 | 3,043 | 2,890 | 3,745 | 6,856 | 35 | 46 |
| 1974 | 59,186 | 974 | 281 | 1,985 | 1,708 | 12,431 | 24,467 | 3,158 | 2,888 | 3,860 | 7,435 | 36 | 43 |
| 1975 | 59,800 | 1,021 | 326 | 2,011 | 1,652 | 12,850 | 24,288 | 3,235 | 2,692 | 3,924 | 7,713 | 50 | 38 |
| 1976 | 63,324 | 1,140 | 320 | 2,211 | 1,735 | 13,326 | 26,392 | 3,374 | 2,801 | 4,165 | 7,787 | 26 | 47 |
| 1977 | 67,639 | 1,244 | 327 | 2,196 | 1,872 | 17,346 | 25,882 | 3,525 | 3,080 | 4,267 | 7,824 | 23 | 53 |
| 1978 | 72,940 | 1,319 | 303 | 2,221 | 1,980 | 18,557 | 28,362 | 3,634 | 3,090 | 4,806 | 8,611 | 27 | 50 |
| 1979 | 73,431 | 1,264 | 378 | 2,344 | 1,959 | 18,361 | 28,170 | 3,701 | 3,349 | 4,981 | 8,814 | 44 | 66 |
| 1980 | 73,669 | 1,230 | 449 | 2,389 | 2,013 | 16,396 | 29,038 | 3,887 | 3,611 | 5,162 | 9,388 | 43 | 63 |
| 1981 | 81,431 | 1,231 | 455 | 2,286 | 2,046 | 22,699 | 29,930 | 4,013 | 3,761 | 5,395 | 9,504 | 46 | 65 |
| 1982 | 82,274 | 1,328 | 467 | 2,624 | 2,139 | 22,350 | 30,385 | 3,951 | 3,557 | 5,547 | 9,799 | 45 | 82 |
| 1983 | 86,716 | 1,405 | 453 | 2,618 | 2,186 | 23,940 | 31,990 | 4,035 | 3,603 | 6,013 | 10,371 | 30 | 72 |
| 1984 | 88,957 | 1,443 | 474 | 2,947 | 2,436 | 23,522 | 33,014 | 4,129 | 3,613 | 6,239 | 11,038 | 37 | 65 |
| 1985 | 91,822 | 1,459 | 463 | 3,112 | 2,674 | 23,787 | 34,184 | 4,368 | 3,842 | 6,569 | 11,487 | 37 | 60 |
| 1986 | 92,758 | 1,517 | 384 | 3,430 | 2,408 | 24,271 | 34,580 | 4,252 | 3,924 | 6,618 | 11,265 | 38 | 71 |
| 1987 | 96,555 | 1,529 | 496 | 3,549 | 2,701 | 24,768 | 36,328 | 4,334 | 4,065 | 6,701 | 11,980 | 36 | 68 |
| 1988 | 100,395 | 1,611 | 490 | 3,587 | 2,674 | 25,011 | 38,263 | 4,547 | 3,923 | 7,230 | 12,935 | 62 | 62 |
| 1989 | 100,931 | 1,631 | 542 | 3,682 | 2,702 | 25,476 | 38,336 | 4,594 | 3,908 | 7,217 | 12,710 | 47 | 86 |
| 1990 | 104,653 | 1,575 | 562 | 3,912 | 2,832 | 26,587 | 39,887 | 4,549 | 4,229 | 7,346 | 13,027 | 41 | 106 |
| Males | | | | | | | | | | | | | |
| Hommes | | | | | | | | | | | | | |
| 1969 | 24,971 | 501 | 113 | 984 | 728 | 5,586 | 9,709 | 1,484 | 1,349 | 1,471 | 3,014 | 19 | 13 |
| 1970 | 25,135 | 540 | 122 | 1,023 | 772 | 5,613 | 9,643 | 1,603 | 1,321 | 1,595 | 3,065 | 24 | 14 |
| 1971 | 26,278 | 541 | 103 | 954 | 732 | 5,807 | 10,025 | 1,574 | 1,427 | 1,667 | 3,394 | 22 | 32 |
| 1972 | 27,067 | 601 | 124 | 968 | 729 | 5,810 | 10,706 | 1,614 | 1,463 | 1,773 | 3,243 | 13 | 23 |
| 1973 | 28,916 | 575 | 167 | 1,000 | 854 | 6,030 | 11,538 | 1,633 | 1,601 | 2,027 | 3,447 | 17 | 27 |
| 1974 | 29,907 | 565 | 137 | 989 | 886 | 6,220 | 12,101 | 1,657 | 1,563 | 1,988 | 3,757 | 19 | 25 |
| 1975 | 30,271 | 567 | 164 | 1,023 | 833 | 6,515 | 12,122 | 1,598 | 1,460 | 2,068 | 3,872 | 32 | 17 |
| 1976 | 32,392 | 677 | 145 | 1,163 | 923 | 6,887 | 13,191 | 1,741 | 1,542 | 2,165 | 3,917 | 16 | 25 |
| 1977 | 34,742 | 709 | 162 | 1,084 | 974 | 9,009 | 12,999 | 1,781 | 1,749 | 2,276 | 3,966 | 8 | 25 |
| 1978 | 37,789 | 746 | 142 | 1,116 | 1,073 | 9,519 | 14,510 | 1,929 | 1,758 | 2,551 | 4,413 | 7 | 25 |
| 1979 | 37,960 | 705 | 189 | 1,205 | 1,043 | 9,497 | 14,234 | 1,865 | 1,939 | 2,673 | 4,554 | 22 | 34 |
| 1980 | 38,335 | 709 | 244 | 1,218 | 1,063 | 8,511 | 14,799 | 1,997 | 2,038 | 2,726 | 4,967 | 26 | 37 |
| 1981 | 42,416 | 689 | 248 | 1,187 | 1,107 | 11,742 | 15,338 | 2,049 | 2,133 | 2,903 | 4,963 | 20 | 37 |
| 1982 | 43,125 | 788 | 248 | 1,361 | 1,150 | 11,780 | 15,535 | 2,043 | 2,011 | 2,977 | 5,166 | 22 | 44 |
| 1983 | 45,002 | 754 | 234 | 1,409 | 1,190 | 12,443 | 16,263 | 2,072 | 2,051 | 3,161 | 5,381 | 11 | 33 |
| 1984 | 46,469 | 802 | 264 | 1,554 | 1,309 | 12,385 | 16,902 | 2,175 | 1,984 | 3,283 | 5,750 | 20 | 41 |
| 1985 | 47,535 | 811 | 242 | 1,604 | 1,344 | 12,431 | 17,378 | 2,229 | 2,116 | 3,364 | 5,965 | 23 | 28 |
| 1986 | 48,759 | 861 | 210 | 1,840 | 1,318 | 12,852 | 17,774 | 2,279 | 2,152 | 3,496 | 5,916 | 20 | 43 |
| 1987 | 50,594 | 848 | 284 | 1,887 | 1,462 | 13,073 | 18,732 | 2,244 | 2,210 | 3,468 | 6,336 | 16 | 34 |
| 1988 | 52,244 | 889 | 256 | 1,878 | 1,464 | 13,333 | 19,434 | 2,338 | 2,149 | 3,727 | 6,695 | 43 | 38 |
| 1989 | 52,727 | 878 | 300 | 1,901 | 1,491 | 13,423 | 19,774 | 2,393 | 2,188 | 3,768 | 6,549 | 26 | 36 |
| 1990 | 54,803 | 836 | 295 | 2,041 | 1,529 | 14,016 | 20,610 | 2,429 | 2,300 | 3,751 | 6,920 | 21 | 55 |
| Females | | | | | | | | | | | | | |
| Femmes | | | | | | | | | | | | | |
| 1969 | 24,217 | 389 | 113 | 922 | 699 | 5,745 | 9,785 | 1,326 | 1,121 | 1,400 | 2,693 | 13 | 11 |
| 1970 | 24,209 | 388 | 107 | 970 | 730 | 5,620 | 9,540 | 1,344 | 1,106 | 1,499 | 2,862 | 15 | 28 |
| 1971 | 25,387 | 394 | 123 | 973 | 716 | 5,738 | 10,181 | 1,362 | 1,106 | 1,479 | 3,286 | 11 | 18 |
| 1972 | 26,490 | 483 | 140 | 943 | 781 | 6,072 | 10,681 | 1,400 | 1,196 | 1,527 | 3,220 | 26 | 21 |
| 1973 | 28,175 | 492 | 145 | 933 | 816 | 6,178 | 11,748 | 1,410 | 1,289 | 1,718 | 3,409 | 18 | 19 |
| 1974 | 29,279 | 409 | 144 | 996 | 822 | 6,211 | 12,366 | 1,501 | 1,245 | 1,872 | 3,678 | 17 | 18 |
| 1975 | 29,529 | 454 | 162 | 988 | 819 | 6,335 | 12,166 | 1,637 | 1,232 | 1,856 | 3,841 | 18 | 21 |
| 1976 | 30,932 | 463 | 175 | 1,048 | 812 | 6,439 | 13,201 | 1,633 | 1,259 | 2,000 | 3,870 | 10 | 22 |
| 1977 | 32,897 | 535 | 165 | 1,112 | 898 | 8,337 | 12,883 | 1,744 | 1,331 | 1,991 | 3,858 | 15 | 28 |
| 1978 | 35,151 | 573 | 161 | 1,105 | 907 | 9,038 | 13,832 | 1,705 | 1,332 | 2,255 | 4,198 | 20 | 25 |
| 1979 | 35,471 | 559 | 189 | 1,139 | 916 | 8,864 | 13,936 | 1,836 | 1,410 | 2,308 | 4,260 | 22 | 32 |
| 1980 | 35,334 | 521 | 205 | 1,171 | 950 | 7,885 | 14,239 | 1,890 | 1,573 | 2,436 | 4,421 | 17 | 26 |
| 1981 | 39,015 | 542 | 207 | 1,099 | 939 | 10,957 | 14,592 | 1,964 | 1,628 | 2,492 | 4,541 | 26 | 28 |
| 1982 | 39,149 | 540 | 219 | 1,263 | 989 | 10,570 | 14,850 | 1,908 | 1,546 | 2,570 | 4,633 | 23 | 38 |
| 1983 | 41,714 | 651 | 219 | 1,209 | 996 | 11,497 | 15,727 | 1,963 | 1,552 | 2,852 | 4,990 | 19 | 39 |
| 1984 | 42,488 | 641 | 210 | 1,393 | 1,127 | 11,137 | 16,112 | 1,954 | 1,629 | 2,956 | 5,288 | 17 | 24 |
| 1985 | 44,287 | 648 | 221 | 1,508 | 1,130 | 11,356 | 16,806 | 2,139 | 1,726 | 3,185 | 5,522 | 14 | 32 |
| 1986 | 43,999 | 656 | 174 | 1,590 | 1,090 | 11,419 | 16,806 | 1,973 | 1,772 | 3,124 | 5,349 | 18 | 28 |
| 1987 | 45,961 | 681 | 212 | 1,662 | 1,239 | 11,695 | 17,596 | 2,090 | 1,855 | 3,233 | 5,644 | 20 | 34 |
| 1988 | 48,151 | 722 | 234 | 1,709 | 1,210 | 11,678 | 18,829 | 2,209 | 1,774 | 3,503 | 6,240 | 19 | 24 |
| 1989 | 48,204 | 753 | 242 | 1,781 | 1,211 | 12,053 | 18,562 | 2,201 | 1,720 | 3,469 | 6,161 | 21 | 50 |
| 1990 | 49,850 | 739 | 267 | 1,871 | 1,303 | 12,571 | 19,277 | 2,120 | 1,929 | 3,595 | 6,107 | 20 | 51 |

(1) Table includes all cancers except "other skin cancer" (ICD-9 140 to 208, excluding 173).

(1) Le tableau inclus tous les cancers sauf "autres cancers de la peau" (CIM-9 140 à 208, excluant 173).

TABLE 17. Age-standardized Rates for New Primary Sites of Cancer by Sex, Canada and Provinces, 1969 to 1990 (1,2,3)

TABLEAU 17. Taux normalisés selon l'âge, de nouveaux sièges primaires de cancer selon le sexe, Canada et provinces, 1969 à 1990 (1,2,3)

| Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. | |
|--------------------------------------|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
| | T.-N. I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | | | | | | Alb. | C.-B. | | T.N.-O. | |
| Rate per 100,000 • Taux pour 100 000 | | | | | | | | | | | | | |
| Both sexes | | | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | | |
| 1969 | 297.3 | 272.4 | 219.7 | 291.9 | 287.0 | 259.3 | 326.5 | 325.2 | 289.0 | 251.0 | 314.3 | 425.7 | 199.1 |
| 1970 | 292.2 | 280.4 | 225.3 | 298.6 | 302.0 | 249.5 | 312.0 | 338.0 | 284.2 | 265.2 | 316.6 | 490.9 | 368.0 |
| 1971 | 295.8 | 275.4 | 214.5 | 281.6 | 281.2 | 256.5 | 316.2 | 328.5 | 291.6 | 257.5 | 337.7 | 368.8 | 357.0 |
| 1972 | 299.2 | 313.3 | 248.0 | 274.9 | 288.6 | 256.6 | 327.1 | 332.6 | 304.5 | 262.0 | 316.2 | 413.6 | 287.5 |
| 1973 | 313.3 | 302.0 | 284.6 | 274.4 | 312.2 | 260.7 | 347.9 | 331.2 | 330.0 | 294.0 | 326.8 | 369.7 | 283.8 |
| 1974 | 317.4 | 271.1 | 262.4 | 276.4 | 314.0 | 259.4 | 356.9 | 339.0 | 321.0 | 294.8 | 342.0 | 467.8 | 282.8 |
| 1975 | 313.6 | 276.0 | 289.9 | 276.1 | 297.7 | 262.6 | 346.3 | 342.6 | 303.2 | 291.5 | 345.1 | 420.0 | 181.0 |
| 1976 | 323.5 | 307.2 | 280.2 | 296.0 | 304.8 | 265.9 | 366.2 | 352.0 | 308.0 | 298.8 | 339.1 | 162.1 | 272.2 |
| 1977 | 336.8 | 324.2 | 282.3 | 291.2 | 321.7 | 337.6 | 349.8 | 360.7 | 333.8 | 295.6 | 331.1 | 182.4 | 283.5 |
| 1978 | 355.3 | 338.0 | 254.6 | 287.5 | 334.7 | 354.5 | 374.3 | 364.6 | 330.3 | 322.0 | 354.9 | 241.3 | 219.7 |
| 1979 | 349.5 | 319.0 | 316.0 | 299.0 | 324.9 | 344.2 | 362.6 | 365.4 | 352.4 | 324.3 | 352.3 | 342.9 | 350.8 |
| 1980 | 342.1 | 298.8 | 365.2 | 300.4 | 327.2 | 299.9 | 364.9 | 378.6 | 372.5 | 325.6 | 361.0 | 351.1 | 318.5 |
| 1981 | 369.3 | 297.6 | 368.9 | 284.7 | 326.9 | 409.2 | 367.4 | 384.5 | 382.9 | 330.3 | 353.7 | 373.9 | 332.0 |
| 1982 | 364.3 | 312.8 | 376.0 | 319.0 | 335.1 | 395.2 | 363.7 | 372.3 | 355.6 | 329.5 | 354.4 | 365.3 | 419.8 |
| 1983 | 375.7 | 324.5 | 354.9 | 312.4 | 336.6 | 415.9 | 374.0 | 374.4 | 354.4 | 347.5 | 365.6 | 232.3 | 345.4 |
| 1984 | 376.5 | 325.5 | 364.6 | 345.4 | 367.1 | 399.0 | 376.7 | 376.7 | 350.0 | 350.9 | 377.2 | 275.6 | 318.5 |
| 1985 | 379.6 | 322.9 | 353.1 | 359.1 | 366.3 | 394.1 | 380.5 | 393.2 | 365.6 | 358.5 | 381.4 | 311.1 | 242.5 |
| 1986 | 374.5 | 331.6 | 288.7 | 388.7 | 350.8 | 393.1 | 375.3 | 375.8 | 368.9 | 352.4 | 363.0 | 246.1 | 295.9 |
| 1987 | 379.3 | 327.9 | 366.7 | 395.3 | 384.4 | 389.5 | 382.4 | 376.7 | 377.9 | 348.4 | 373.9 | 244.7 | 295.2 |
| 1988 | 384.7 | 357.2 | 360.1 | 392.4 | 373.8 | 383.3 | 392.3 | 389.9 | 358.0 | 365.7 | 391.9 | 411.8 | 231.4 |
| 1989 | 376.5 | 335.0 | 399.3 | 396.2 | 370.8 | 379.9 | 381.5 | 390.2 | 355.9 | 353.8 | 372.8 | 296.4 | 351.5 |
| 1990 | 381.1 | 318.4 | 405.1 | 414.3 | 381.6 | 386.2 | 387.7 | 382.3 | 380.2 | 348.1 | 370.3 | 250.4 | 443.0 |
| Males - Hommes | | | | | | | | | | | | | |
| 1969 | 292.2 | 280.9 | 197.7 | 282.7 | 276.1 | 258.8 | 324.9 | 317.5 | 275.9 | 232.3 | 309.9 | 416.8 | 236.1 |
| 1970 | 290.0 | 298.9 | 225.7 | 289.3 | 292.3 | 248.9 | 315.0 | 342.6 | 271.9 | 247.5 | 308.7 | 512.4 | 225.4 |
| 1971 | 293.0 | 290.8 | 179.1 | 265.9 | 266.6 | 261.3 | 315.7 | 328.9 | 291.0 | 247.1 | 322.2 | 404.9 | 390.0 |
| 1972 | 296.3 | 321.6 | 215.4 | 267.0 | 265.5 | 254.6 | 330.7 | 335.9 | 298.2 | 259.6 | 299.8 | 230.4 | 303.4 |
| 1973 | 311.8 | 300.5 | 285.6 | 273.5 | 303.8 | 261.1 | 349.2 | 336.8 | 324.6 | 291.8 | 312.6 | 284.7 | 317.4 |
| 1974 | 316.3 | 291.8 | 245.4 | 265.5 | 311.9 | 264.1 | 358.1 | 339.8 | 320.7 | 284.3 | 329.9 | 463.4 | 326.1 |
| 1975 | 314.7 | 286.2 | 275.3 | 273.2 | 289.6 | 273.0 | 351.9 | 323.5 | 298.9 | 286.9 | 333.1 | 473.8 | 134.8 |
| 1976 | 328.5 | 339.4 | 243.6 | 303.6 | 313.4 | 281.7 | 372.7 | 348.4 | 309.4 | 293.1 | 328.9 | 182.0 | 245.3 |
| 1977 | 344.4 | 346.6 | 261.1 | 282.1 | 323.8 | 360.2 | 357.8 | 351.4 | 345.6 | 298.7 | 324.4 | 150.9 | 257.9 |
| 1978 | 357.2 | 358.0 | 228.3 | 285.0 | 353.5 | 373.9 | 391.0 | 372.7 | 344.3 | 325.0 | 351.9 | 95.6 | 209.5 |
| 1979 | 360.9 | 335.6 | 300.7 | 303.3 | 336.8 | 367.0 | 373.8 | 357.4 | 376.4 | 331.6 | 353.2 | 304.6 | 314.5 |
| 1980 | 356.9 | 327.0 | 379.9 | 302.1 | 337.2 | 322.1 | 380.9 | 377.4 | 385.6 | 329.6 | 372.2 | 370.0 | 326.4 |
| 1981 | 386.9 | 315.6 | 381.7 | 291.9 | 348.7 | 440.6 | 385.4 | 385.8 | 402.0 | 341.7 | 361.0 | 296.2 | 322.5 |
| 1982 | 384.7 | 350.8 | 383.9 | 327.5 | 354.1 | 433.8 | 380.9 | 376.9 | 374.1 | 342.5 | 366.4 | 371.8 | 436.7 |
| 1983 | 393.7 | 331.0 | 358.5 | 333.4 | 362.1 | 450.9 | 390.0 | 378.2 | 377.7 | 356.0 | 372.5 | 179.5 | 288.2 |
| 1984 | 397.8 | 347.4 | 399.6 | 362.4 | 392.4 | 439.4 | 395.6 | 391.7 | 360.6 | 361.2 | 387.6 | 276.0 | 354.6 |
| 1985 | 397.9 | 344.1 | 360.1 | 369.3 | 397.1 | 432.7 | 396.0 | 397.0 | 378.5 | 362.0 | 390.4 | 359.5 | 192.1 |
| 1986 | 399.1 | 362.5 | 310.6 | 416.7 | 386.0 | 437.3 | 394.9 | 399.7 | 383.1 | 366.7 | 375.7 | 241.2 | 307.2 |
| 1987 | 402.8 | 369.4 | 409.6 | 420.7 | 416.4 | 431.6 | 403.5 | 388.7 | 386.5 | 354.5 | 389.1 | 167.8 | 279.8 |
| 1988 | 405.4 | 358.4 | 370.1 | 410.6 | 409.6 | 428.7 | 407.1 | 399.9 | 370.5 | 370.5 | 397.9 | 506.3 | 260.6 |
| 1989 | 398.1 | 348.4 | 437.3 | 409.1 | 410.1 | 420.0 | 401.5 | 403.8 | 379.4 | 363.2 | 376.0 | 291.3 | 267.4 |
| 1990 | 403.2 | 325.7 | 412.6 | 433.3 | 411.8 | 426.3 | 407.5 | 404.3 | 392.5 | 350.5 | 384.3 | 248.2 | 410.4 |
| Females - Femmes | | | | | | | | | | | | | |
| 1969 | 295.2 | 250.9 | 236.6 | 293.5 | 290.7 | 254.9 | 325.8 | 318.0 | 285.9 | 257.3 | 306.3 | 339.7 | 131.7 |
| 1970 | 287.9 | 248.7 | 220.4 | 301.2 | 301.5 | 246.6 | 307.0 | 319.2 | 280.8 | 270.1 | 314.1 | 361.6 | 550.4 |
| 1971 | 292.9 | 247.6 | 246.0 | 292.2 | 289.5 | 248.0 | 315.6 | 316.5 | 277.6 | 256.1 | 342.9 | 258.3 | 249.5 |
| 1972 | 296.8 | 293.7 | 278.5 | 277.7 | 305.8 | 255.5 | 322.5 | 319.5 | 293.5 | 252.8 | 323.1 | 677.0 | 234.1 |
| 1973 | 310.1 | 297.1 | 277.7 | 270.2 | 314.4 | 258.0 | 346.5 | 314.2 | 317.9 | 282.1 | 332.0 | 477.1 | 230.8 |
| 1974 | 314.4 | 240.9 | 276.1 | 282.8 | 310.8 | 253.0 | 355.7 | 328.7 | 305.3 | 294.3 | 346.2 | 463.3 | 210.5 |
| 1975 | 308.9 | 259.2 | 298.2 | 274.7 | 300.1 | 250.9 | 341.2 | 353.8 | 294.5 | 285.9 | 349.0 | 311.2 | 241.2 |
| 1976 | 315.2 | 262.8 | 314.3 | 284.6 | 290.6 | 249.3 | 360.4 | 346.8 | 295.1 | 294.3 | 342.6 | 125.6 | 305.2 |
| 1977 | 326.3 | 290.8 | 299.7 | 296.9 | 314.2 | 314.9 | 342.8 | 364.5 | 306.7 | 281.9 | 331.7 | 235.9 | 296.7 |
| 1978 | 340.9 | 307.5 | 277.1 | 287.2 | 310.9 | 335.9 | 359.3 | 348.9 | 302.3 | 308.4 | 351.5 | 456.3 | 220.7 |
| 1979 | 335.9 | 294.0 | 325.1 | 292.2 | 308.3 | 322.7 | 353.0 | 368.1 | 314.8 | 306.3 | 345.6 | 371.7 | 381.5 |
| 1980 | 325.8 | 262.1 | 345.5 | 296.3 | 313.5 | 280.1 | 350.9 | 373.9 | 344.6 | 313.6 | 343.8 | 293.5 | 286.5 |
| 1981 | 350.9 | 271.7 | 347.4 | 275.8 | 301.4 | 381.5 | 352.1 | 379.9 | 349.2 | 311.8 | 341.5 | 458.2 | 321.6 |
| 1982 | 343.5 | 265.3 | 362.0 | 308.4 | 313.5 | 361.3 | 349.2 | 363.3 | 324.2 | 309.0 | 338.3 | 293.2 | 362.3 |
| 1983 | 357.9 | 311.6 | 349.2 | 290.1 | 308.6 | 386.1 | 360.9 | 367.6 | 320.1 | 332.0 | 355.1 | 271.5 | 605.7 |
| 1984 | 355.7 | 296.4 | 326.1 | 327.6 | 339.6 | 364.9 | 360.8 | 359.1 | 331.1 | 335.2 | 363.8 | 250.5 | 247.0 |
| 1985 | 362.0 | 294.0 | 342.5 | 348.3 | 334.3 | 362.3 | 367.6 | 387.7 | 343.8 | 349.8 | 369.7 | 224.9 | 305.0 |
| 1986 | 351.1 | 290.9 | 264.4 | 360.5 | 315.7 | 356.8 | 358.9 | 350.1 | 347.3 | 334.3 | 347.8 | 243.1 | 261.9 |
| 1987 | 357.0 | 298.4 | 319.4 | 369.8 | 351.8 | 355.0 | 364.3 | 363.6 | 361.1 | 337.7 | 356.3 | 340.4 | 305.5 |
| 1988 | 365.1 | 308.9 | 347.3 | 373.4 | 337.6 | 345.7 | 380.0 | 379.0 | 337.9 | 356.5 | 383.4 | 253.0 | 182.9 |
| 1989 | 355.9 | 314.6 | 358.3 | 382.3 | 330.9 | 347.0 | 363.8 | 375.8 | 325.1 | 340.6 | 366.7 | 286.0 | 953.0 |
| 1990 | 359.7 | 305.5 | 393.6 | 394.6 | 350.5 | 353.2 | 369.7 | 359.2 | 360.6 | 342.2 | 352.9 | 237.6 | 468.4 |

(1) Table includes all cancers except "other skin cancer" (ICD-9 140 to 208, excluding 173).

(1) Le tableau inclus tous les cancers sauf "autres cancers de la peau" (ICD-9 140 à 208, excluant 173).

(2) Age-standardized rates were calculated using the Canada 1991 Census population. See Table 3.

(2) Les taux normalisés selon l'âge ont été calculés en fonction de la population du Canada en 1991. Voir Tableau 3.

(3) July 1st adjusted population estimates are used for all years except 1969 and 1970, which used June 1st unadjusted population estimates.

(3) On a utilisé les estimations de la population ajustées en date du 1er juillet pour toutes les années sauf 1969 et 1970, pour lesquels on a utilisé les estimations de la population non-ajustées en date du 1er juin.

Postcensal Population Estimates, by Sex and Age Group, Canada and Provinces, July 1st, 1990
Estimations postcensitaires de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1er juillet, 1990

| Canada | Nfld. | P.E.I. | N.S. | N.B. | Qué. | Ont. | Man. | Sask. | Alta. | B.C. | Yukon | N.W.T. |
|-----------------------|----------------|--------|-------|-------|-------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | T.-N. I.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | C.-B. | | | | | | T.N.-O. | | |
| thousands - milliers | | | | | | | | | | | | |
| Both sexes | | | | | | | | | | | | |
| Les deux sexes | | | | | | | | | | | | |
| All ages | | | | | | | | | | | | |
| Tous les âges | 27,790.6 | 578.9 | 131.0 | 912.5 | 743.0 | 7,020.7 | 10,341.4 | 1,108.4 | 1,010.8 | 2,556.4 | 3,300.1 | 28.0 |
| 0-4 | 1,934.7 | 38.5 | 9.8 | 61.8 | 49.1 | 443.9 | 721.5 | 83.4 | 81.0 | 211.7 | 224.0 | 2.5 |
| 5-9 | 1,939.2 | 44.5 | 9.8 | 62.0 | 52.1 | 465.4 | 701.2 | 80.7 | 82.4 | 205.4 | 227.1 | 2.4 |
| 10-14 | 1,889.6 | 49.4 | 10.0 | 63.0 | 55.1 | 484.6 | 666.3 | 78.5 | 78.7 | 184.3 | 212.3 | 2.0 |
| 15-19 | 1,935.6 | 55.3 | 10.2 | 69.2 | 59.9 | 461.7 | 716.8 | 82.1 | 74.3 | 181.5 | 217.5 | 2.0 |
| 20-24 | 2,146.4 | 50.7 | 9.8 | 71.9 | 58.3 | 522.8 | 826.0 | 84.2 | 71.0 | 204.7 | 238.9 | 2.1 |
| 25-29 | 2,605.8 | 49.9 | 11.0 | 83.5 | 66.3 | 657.0 | 1,002.0 | 98.7 | 84.9 | 253.9 | 289.2 | 2.9 |
| 30-34 | 2,548.8 | 49.0 | 10.6 | 80.5 | 64.6 | 661.6 | 938.0 | 94.4 | 84.6 | 258.7 | 298.0 | 3.1 |
| 35-39 | 2,290.7 | 47.4 | 9.8 | 72.3 | 60.6 | 597.5 | 836.5 | 85.4 | 75.1 | 220.2 | 278.4 | 3.0 |
| 40-44 | 2,062.9 | 42.5 | 9.5 | 66.8 | 55.5 | 541.6 | 767.1 | 75.5 | 62.1 | 181.2 | 254.8 | 2.5 |
| 45-49 | 1,599.9 | 30.6 | 6.8 | 51.0 | 41.1 | 440.6 | 590.3 | 58.2 | 48.4 | 134.2 | 194.4 | 1.7 |
| 50-54 | 1,300.5 | 24.5 | 5.9 | 41.9 | 32.9 | 345.4 | 491.7 | 48.3 | 42.7 | 107.8 | 156.4 | 1.2 |
| 55-59 | 1,239.1 | 22.0 | 5.5 | 39.3 | 30.7 | 331.5 | 469.3 | 46.8 | 43.3 | 99.3 | 149.0 | 1.0 |
| 60-64 | 1,180.5 | 20.4 | 5.1 | 36.8 | 29.4 | 311.1 | 451.0 | 46.7 | 43.6 | 89.2 | 145.6 | 0.7 |
| 65-69 | 1,068.8 | 17.7 | 4.9 | 35.4 | 28.3 | 268.5 | 409.7 | 45.8 | 41.6 | 76.4 | 139.3 | 0.5 |
| 70-74 | 798.5 | 15.2 | 4.3 | 30.0 | 22.8 | 196.2 | 291.2 | 36.7 | 36.0 | 57.8 | 107.7 | 0.3 |
| 75-79 | 607.1 | 11.3 | 3.6 | 22.9 | 17.5 | 144.5 | 222.3 | 29.7 | 28.8 | 42.9 | 83.1 | 0.2 |
| 80-84 | 366.5 | 6.0 | 2.2 | 13.6 | 10.6 | 86.7 | 135.6 | 18.4 | 17.9 | 26.7 | 48.5 | 0.1 |
| 85+ | 276.1 | 4.3 | 1.9 | 10.5 | 8.2 | 60.0 | 105.2 | 14.8 | 14.4 | 20.7 | 36.1 | 0.1 |
| Male | | | | | | | | | | | | |
| Masculin | | | | | | | | | | | | |
| All ages | | | | | | | | | | | | |
| Tous les âges | 13,780.7 | 290.5 | 64.9 | 451.1 | 368.7 | 3,461.1 | 5,111.3 | 550.1 | 504.5 | 1,289.8 | 1,642.9 | 14.7 |
| 0-4 | 989.7 | 19.6 | 5.0 | 31.5 | 25.2 | 226.9 | 369.4 | 42.6 | 41.5 | 108.4 | 114.6 | 1.3 |
| 5-9 | 992.9 | 22.6 | 5.0 | 31.6 | 26.6 | 238.3 | 359.2 | 41.5 | 42.1 | 105.4 | 116.2 | 1.2 |
| 10-14 | 969.0 | 25.4 | 5.2 | 32.3 | 28.3 | 248.6 | 341.6 | 40.1 | 40.2 | 94.8 | 108.7 | 1.0 |
| 15-19 | 989.0 | 28.5 | 5.3 | 35.5 | 30.6 | 235.3 | 367.0 | 42.2 | 37.8 | 92.6 | 110.5 | 1.0 |
| 20-24 | 1,089.0 | 25.7 | 5.0 | 36.7 | 29.6 | 266.7 | 417.3 | 43.2 | 36.1 | 103.4 | 121.2 | 1.1 |
| 25-29 | 1,322.7 | 24.9 | 5.5 | 42.4 | 33.5 | 335.8 | 507.4 | 50.5 | 43.0 | 128.6 | 146.3 | 1.4 |
| 30-34 | 1,285.8 | 24.3 | 5.2 | 40.4 | 32.5 | 334.5 | 470.6 | 48.3 | 43.1 | 133.1 | 149.2 | 1.6 |
| 35-39 | 1,146.6 | 23.7 | 4.9 | 35.9 | 30.2 | 299.5 | 413.9 | 42.8 | 38.6 | 113.4 | 139.6 | 1.6 |
| 40-44 | 1,040.4 | 21.6 | 4.8 | 33.6 | 28.3 | 272.1 | 384.1 | 38.1 | 31.9 | 92.8 | 129.8 | 1.3 |
| 45-49 | 807.6 | 15.6 | 3.4 | 25.8 | 21.1 | 220.0 | 297.4 | 29.4 | 24.4 | 68.7 | 99.4 | 1.0 |
| 50-54 | 654.0 | 12.6 | 3.0 | 21.1 | 16.6 | 170.8 | 247.3 | 24.3 | 21.4 | 55.2 | 80.1 | 0.6 |
| 55-59 | 617.7 | 11.3 | 2.8 | 19.4 | 15.1 | 161.1 | 234.2 | 23.3 | 21.7 | 51.0 | 76.5 | 0.6 |
| 60-64 | 570.3 | 10.1 | 2.6 | 17.5 | 14.0 | 146.3 | 218.4 | 22.5 | 21.4 | 44.7 | 71.9 | 0.4 |
| 65-69 | 488.4 | 8.7 | 2.3 | 16.4 | 13.0 | 120.1 | 186.4 | 20.7 | 19.8 | 35.8 | 64.6 | 0.3 |
| 70-74 | 348.2 | 7.1 | 1.9 | 13.2 | 10.2 | 82.2 | 127.0 | 16.3 | 16.4 | 25.9 | 47.6 | 0.1 |
| 75-79 | 249.1 | 4.9 | 1.5 | 9.5 | 7.4 | 56.0 | 91.2 | 12.4 | 12.4 | 18.1 | 35.5 | 0.1 |
| 80-84 | 136.0 | 2.4 | 0.9 | 5.3 | 4.0 | 29.9 | 48.9 | 7.1 | 7.4 | 10.7 | 19.4 | -- |
| 85+ | 84.3 | 1.4 | 0.6 | 3.1 | 2.5 | 17.1 | 30.2 | 4.7 | 5.3 | 7.3 | 12.0 | -- |
| Female | | | | | | | | | | | | |
| Féminin | | | | | | | | | | | | |
| All ages | | | | | | | | | | | | |
| Tous les âges | 14,009.9 | 288.4 | 66.1 | 461.4 | 374.3 | 3,559.5 | 5,230.1 | 558.3 | 506.4 | 1,266.6 | 1,657.2 | 13.3 |
| 0-4 | 944.9 | 18.9 | 4.8 | 30.3 | 23.9 | 217.0 | 352.1 | 40.8 | 39.5 | 103.4 | 109.4 | 1.2 |
| 5-9 | 946.3 | 21.9 | 4.8 | 30.4 | 25.5 | 227.1 | 342.0 | 39.2 | 40.4 | 99.9 | 110.9 | 1.2 |
| 10-14 | 920.6 | 24.0 | 4.8 | 30.7 | 26.8 | 236.0 | 324.8 | 38.4 | 38.5 | 89.5 | 103.5 | 1.0 |
| 15-19 | 946.6 | 26.8 | 4.9 | 33.7 | 29.3 | 226.4 | 349.8 | 39.9 | 36.5 | 88.9 | 106.9 | 0.9 |
| 20-24 | 1,057.4 | 25.0 | 4.9 | 35.3 | 28.7 | 256.1 | 408.7 | 41.0 | 34.8 | 101.3 | 117.7 | 1.0 |
| 25-29 | 1,283.1 | 25.0 | 5.4 | 41.2 | 32.9 | 321.2 | 494.6 | 48.2 | 41.9 | 125.3 | 142.8 | 1.4 |
| 30-34 | 1,263.0 | 24.7 | 5.4 | 40.1 | 32.1 | 327.0 | 467.5 | 46.1 | 41.5 | 125.7 | 148.8 | 1.6 |
| 35-39 | 1,144.2 | 23.6 | 4.9 | 36.4 | 30.4 | 298.1 | 422.6 | 42.6 | 36.5 | 106.8 | 138.8 | 1.4 |
| 40-44 | 1,022.5 | 20.9 | 4.7 | 33.2 | 27.2 | 269.6 | 383.0 | 37.4 | 30.3 | 88.4 | 125.0 | 1.2 |
| 45-49 | 792.3 | 15.0 | 3.4 | 25.2 | 20.1 | 220.6 | 292.9 | 28.8 | 24.0 | 65.5 | 95.1 | 0.7 |
| 50-54 | 646.6 | 11.9 | 2.9 | 20.8 | 16.3 | 174.6 | 244.4 | 24.1 | 21.3 | 52.6 | 76.3 | 0.5 |
| 55-59 | 621.4 | 10.7 | 2.7 | 19.9 | 15.6 | 170.4 | 235.0 | 23.5 | 21.6 | 48.3 | 72.5 | 0.4 |
| 60-64 | 610.3 | 10.2 | 2.6 | 19.3 | 15.4 | 164.9 | 232.6 | 24.2 | 22.2 | 44.5 | 73.7 | 0.3 |
| 65-69 | 580.4 | 9.0 | 2.6 | 19.0 | 15.2 | 168.4 | 223.4 | 25.1 | 21.9 | 40.5 | 74.7 | 0.2 |
| 70-74 | 450.3 | 8.1 | 2.4 | 16.8 | 12.6 | 113.9 | 164.2 | 20.4 | 19.6 | 31.9 | 60.1 | 0.1 |
| 75-79 | 357.9 | 6.3 | 2.1 | 13.4 | 10.1 | 88.5 | 131.1 | 17.3 | 16.4 | 24.8 | 47.6 | 0.1 |
| 80-84 | 230.5 | 3.6 | 1.3 | 8.3 | 6.6 | 56.8 | 86.7 | 11.3 | 10.5 | 16.0 | 29.1 | -- |
| 85+ | 191.8 | 2.8 | 1.3 | 7.4 | 5.7 | 42.9 | 75.0 | 10.1 | 9.0 | 13.4 | 24.1 | -- |

Appendix

Appendice

FORMULA : CALCULATION OF AGE-STANDARDIZED RATES

The age-standardized rates for each cancer site are calculated by multiplying the actual (observed) age-specific rates in 1990 with the standard population by age group, and dividing by the total standard population, as follows:

Actual (Observed) Age-specific Rates for Each Cancer Site in 1990 (each province, territory and Canada):

| Sex - Sexe | Total | 0-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+ |
|-----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Male - Homme | - | a ₁ | a ₂ | a ₃ | a ₄ | a ₅ | a ₆ | a ₇ | a ₈ |
| Female - Femmes | - | b ₁ | b ₂ | b ₃ | b ₄ | b ₅ | b ₆ | b ₇ | b ₈ |

**Standard Population by Age Group:
(1991 Census of Canada)**

**Taux réels (observés) par âge en 1990 pour chaque siège du cancer
(chaque province, territoire et Canada):**

| | Total | 0-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75-84 | 85+ |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| Canada 1991: | 27,790,600 | 9,845,500 | 5,154,600 | 4,353,600 | 2,900,400 | 2,419,600 | 1,867,300 | 973,600 | 276,100 |

Age-standardized incidence rates for each cancer site, province, territory and Canada are calculated as follows:

**Population normalisée par groupe d'âge:
(1991 Recensement du Canada)**

Les taux d'incidence normalisés par âge pour chaque siège du cancer, province, territoire et Canada se calculent comme suit:

$$\text{Rate, Males / Taux, Hommes} = \frac{a_1(9,845,500) + a_2(5,154,600) + \dots + a_8(276,100)}{27,790,600}$$

27,790,600

$$\text{Rate, Females / Taux, Femmes} = \frac{b_1(9,845,500) + b_2(5,154,600) + \dots + b_8(276,100)}{27,790,600}$$

27,790,600

How to Order

Special tabulations

Requests for special tabulations should be directed to the Information Requests Section, Health Statistics Division, Statistics Canada, R.H. Coats Bldg., 18th floor, Ottawa, Ontario, K1A 0T6.

The Canadian *Health Indicators* database (1994) is available at a cost of \$600 (including the diskette database and software). Additional copies and updates are \$250.

Comment commander

Totalisations spéciales

Les demandes pour les totalisations spéciales doivent être adressées à la Section des demandes d'information, Division des statistiques sur la santé, Statistique Canada, Édifice R.H. Coats, 18^e étage, Ottawa, Ontario, K1A 0T6.

La base de données canadienne des *Indicateurs sur la santé* (1994) est disponible au coût de \$600 (y compris la base de données sur disquette et le logiciel). Les exemplaires supplémentaires et les mises à jour sont offerts à \$250.

Telephone number (613) 951-1746 Numéro de téléphone
Facsimile number (613) 951-0792 Numéro du télécopieur

| Catalogue number | ISBN | Price | | | Titre | Reference year |
|---------------------|-----------|-------------|------------|-------------------------|---|--------------------|
| | | Canada | U.S. | Other countries (US \$) | | |
| Numéro de catalogue | | Prix Canada | États-Unis | Autres pays (\$ US) | Titre | Année de référence |
| 82-216 | 1195-4000 | \$ 20 | \$ 24 | \$ 28 | Hospital Morbidity - La morbidité hospitalière | 1991-92 |
| 82-217 | 1195-4019 | \$ 20 | \$ 24 | \$ 28 | Surgical Procedures and Treatments - Interventions chirurgicales et traitements | 1991-92 |
| 82-218 | 1195-406X | \$ 25 | \$ 30 | \$ 35 | Cancer in Canada - Le cancer au Canada | 1990 |
| 82-219 | 1195-4078 | \$ 15 | \$ 18 | \$ 21 | Therapeutic Abortions - Avortements thérapeutiques | 1992 |
| 82-220 | 1195-4086 | \$ 20 | \$ 24 | \$ 28 | Tuberculosis Statistics - La statistique de la tuberculose | 1992 |
| 83-237 | 1195-4167 | \$ 15 | \$ 18 | \$ 21 | Residential Care Facilities - Aged - Établissements de soins spéciaux pour bénéficiaires internes - âgés | 1991-92 |
| 83-238 | 1195-4175 | \$ 15 | \$ 18 | \$ 21 | Residential Care Facilities - Mental - Établissements de soins spéciaux pour bénéficiaires internes - troubles mentaux | 1991-92 |
| 83-239 | 1195-4043 | \$ 20 | \$ 24 | \$ 28 | List of Canadian Hospitals - Liste des hôpitaux canadiens | 1993 |
| 83-240 | 1195-4051 | \$ 20 | \$ 24 | \$ 28 | List of Residential Care Facilities - Liste des établissements de soins pour bénéficiaires internes au Canada | 1993 |
| 83-241 | 1195-4035 | \$ 15 | \$ 18 | \$ 21 | Hospital Statistics: Preliminary Annual Report - La statistique hospitalière: Rapport annuel préliminaire | 1992-93 |
| 83-242 | 1195-4183 | \$ 70 | \$ 84 | \$ 98 | Hospital Annual Statistics - La statistique annuelle des hôpitaux | |
| 83-242 #1 | " | \$ 20 | \$ 24 | \$ 28 | Part/partie 1 - Tables/tableaux 1-4 | 1990-91 |
| 83-242 #2 | " | \$ 20 | \$ 24 | \$ 28 | Beds and Patient Movement - Lits et mouvements des malades | |
| | | | | | Part/partie 2 - Tables/tableaux 5, 9-12 | 1990-91 |
| | | | | | Outpatient Services - Services aux malades externes | |
| 83-242 #3 | " | \$ 20 | \$ 24 | \$ 28 | Part/partie 3 - Tables/tableaux 5-9, 11, 13, 14 | 1990-91 |
| | | | | | Diagnostic and Therapeutic Services - Service diagnostique et thérapeutique | |
| 83-242 #4 | " | \$ 20 | \$ 24 | \$ 28 | Part/partie 4 - Tables/tableaux 17-20 | 1990-91 |
| 83-242 #5 | " | \$ 20 | \$ 24 | \$ 28 | Personnel | |
| | | | | | Part/partie 5 - Tables/tableaux 15, 16, 21-25 | 1990-91 |
| | | | | | Administrative and Support Services and Finance - Service d'administration, de soutien et finance | |
| 83-243 | 1195-4205 | \$ 15 | \$ 18 | \$ 21 | Registered Nurses - Infirmier(ère)s autorisé(e)s | 1993 |
| 83-244 | 1195-4213 | \$ 15 | \$ 18 | \$ 21 | Nursing Education Program - Profil des programmes d'enseignement en sciences infirmières | 1993 |
| 83-245 | 1195-4027 | \$ 15 | \$ 18 | \$ 21 | Mental Health Statistics - La statistique de l'hygiène mentale | 1990-91 |
| 83-246 | 1195-4191 | \$ 50 | \$ 60 | \$ 70 | Hospital Indicators - Indicateurs des hôpitaux | |
| 83-246 #1 | " | \$ 15 | \$ 18 | \$ 21 | Part/partie 1 - Tables/tableaux 1-64 | 1990-91 |
| | | | | | Nursing Units - Unités des soins infirmiers | |

| Catalogue number | ISBN | Canada | Price U.S. | Other countries (US \$) | Title | Reference year |
|---------------------|---------------|--------|-----------------|-------------------------|--|--------------------|
| | | | | | | |
| Numéro de catalogue | | Canada | Prix États-Unis | Autres pays (\$ US) | Titre | Année de référence |
| 83-246 #2 | 1195-4191 | \$ 15 | \$ 18 | \$ 21 | Part/partie 2 - Tables/tableaux 65-94 Diagnostic and Therapeutic - Diagnostique et thérapeutique | 1990-91 |
| 83-246 #3 | " | \$ 15 | \$ 18 | \$ 21 | Part/partie 3 - Tables/tableaux 95-112 Administrative and Supportive - Administration et soutien | 1990-91 |
| 83-246 #4 | " | \$ 15 | \$ 18 | \$ 21 | Part/partie 4 - Tables/tableaux 113-119 Total Expenses - Dépenses totales Causes of Death - Causes de décès | 1990-91 |
| 84-208 | 1195-4094 | \$ 30 | \$ 36 | \$ 42 | Mortality - Summary List of Causes - Mortalité: Liste sommaire des causes | 1992 |
| 84-209 | 1195-4108 | \$ 30 | \$ 36 | \$ 42 | Births - Naissances | 1991 |
| 84-210 | 1195-4124 | \$ 20 | \$ 24 | \$ 28 | Deaths - Décès | 1991 |
| 84-211 | 1195-4132 | \$ 20 | \$ 24 | \$ 28 | Marriages - Mariages | 1991 |
| 84-212 | 1195-4140 | \$ 20 | \$ 24 | \$ 28 | Divorces | 1991 |
| 84-213 | 1195-4159 | \$ 20 | \$ 24 | \$ 28 | | |
| 82-548 | 0-660-54875-5 | \$ 40 | \$ 48 | \$ 56 | Selected Mortality Statistics, Canada - Statistiques choisies sur la mortalité, Canada, | 1921-1990 |
| 82-549 | 0-660-54876-3 | \$ 40 | \$ 48 | \$ 56 | Selected Infant Mortality and Related Statistics, Canada - Statistiques choisies sur la mortalité infantile et statistiques connexes, Canada | 1921-1990 |
| 82-552 | 0-660-54879-8 | \$ 40 | \$ 48 | \$ 56 | Selected Marriage Statistics - Certains renseignements sur les mariages contractés | 1921-1990 |
| 82-553 | 0-660-54880-1 | \$ 40 | \$ 48 | \$ 56 | Selected Birth and Fertility Statistics, Canada - Statistiques choisies sur la natalité et la fécondité, Canada | 1921-1990 |
| 82-562E | 0-660-11938-2 | \$ 40 | \$ 48 | \$ 56 | Canadian Classification of Diagnostic, Therapeutic and Surgical Procedures (1986 edition) | |
| 82-562F | 0-660-93539-2 | \$ 40 | \$ 48 | \$ 56 | Classification canadienne des actes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicaux (édition 1992) | |

To order a publication you may telephone 1-613-951-7277 or use facsimile number 1-613-951-1584. For toll-free calling in Canada only, dial 1-800-267-6677. When ordering by telephone or facsimile, a written confirmation is not required.

Pour obtenir une publication veuillez téléphoner au 1-613-951-7277 ou utiliser le numéro du télécopieur 1-613-951-1584. Pour appeler sans frais, au Canada, composez le 1-800-267-6677. Il n'est pas nécessaire de nous faire parvenir une confirmation pour une commande faite par téléphone ou télécopieur.

Air economy "first-hand"?

adian

Chances are, you spend hours reading several newspapers and a handful of magazines trying to get the whole economic picture - only to spend even more time weeding out fiction from fact! Wouldn't it be a great deal more convenient (and much more effective) to go straight to the source?

Join the thousands of successful Canadian decision-makers who turn to Statistic Canada's *Canadian Economic Observer* for their monthly briefing. Loaded with first-hand information, collectively published nowhere else, CEO is a quick, concise and panoramic overview of the Canadian economy. Its reliability and completeness are without equal.

A single source

Consultations with our many readers - financial analysts, planners, economists and business leaders - have contributed to CEO's present, widely-acclaimed, two-part format. The **Analysis Section** includes thought-provoking commentary on current economic conditions, issues, trends and developments. The **Statistical Summary** contains the complete range of hard numbers on critical economic indicators: markets, prices, trade, demographics, unemployment and more.

More practical, straightforward and user-friendly than ever before, the *Canadian Economic Observer* gives you more than 150 pages of in-depth information in one indispensable source.

Why purchase CEO?

As a subscriber, you'll be directly connected to Statistics Canada's economic analysts - names and phone numbers are listed with articles and features. You'll also receive a copy of CEO's annual **Historical Statistical Supplement** - at no additional cost.

So why wait for others to publish Statistics Canada's data second-hand when you can have it straight from the source? Order your subscription to the *Canadian Economic Observer* today.

The *Canadian Economic Observer* (catalogue no. 10-2300XPB) is \$220 annually in Canada, US\$260 in the United States and US\$310 in other countries. Highlights of the *Canadian Composite Leading Indicator* (catalogue no. 11F0008XFE) are available by fax - the same day of release - for \$70 annually in Canada and US\$70 in the United States.

To order, write to: Statistics Canada, Marketing Division, Sales and Service, 120 Parkdale Avenue, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 or contact the nearest Statistics Canada Reference Centre listed in this publication. If more convenient, fax your order to 1-613-951-1584 or call toll-free 1-800-267-6677 and use your VISA or MasterCard.

R eceivez-vous directement vos informations sur l'économie canadienne?

Il est probable que vous passez des heures à lire plusieurs journaux et un paquet de revues pour essayer d'avoir une vue complète de la situation économique, et ensuite passer encore plus de temps à séparer le réel de ce qui ne l'est pas. Ne serait-il pas plus pratique (et beaucoup plus efficace) de remonter directement à la source?

Joignez-vous aux milliers de décideurs canadiens gagnants qui lisent *L'Observateur économique canadien* pour leur séance de rapport mensuelle. Rempli de renseignements disponibles nulle part ailleurs, L'OEC permet d'avoir une vue générale rapide et concise de l'économie canadienne. Il est inégalé par sa fiabilité et son exhaustivité.

Une seule source

Les consultations que nous avons eues avec nos nombreux lecteurs, des analystes financiers, des planificateurs, des économistes et des chefs d'entreprise, nous ont permis de présenter L'OEC dans son format actuel en deux parties, qui a été bien accueilli. La **section de l'analyse** contient des commentaires qui donnent à réfléchir sur la conjoncture économique, ses problèmes, ses tendances et ses développements. L'**aperçu statistique** contient l'ensemble complet des chiffres réels pour les indicateurs économiques essentiels : les marchés, les prix, le commerce, la démographie, le chômage, et bien d'autres encore.

Plus pratique, plus simple, plus facile à utiliser qu'auparavant, *L'Observateur économique canadien* vous offre plus de 150 pages de renseignements poussés sous une seule couverture.

P ourquoi acheter L'OEC?

En tant qu'abonné à L'OEC, vous êtes directement relié aux analystes économiques de Statistique Canada : des noms et des numéros de téléphone sont cités dans les articles et les rubriques. Vous recevrez également un exemplaire du **Supplément statistique historique annuel à titre gracieux**.

Pourquoi devez-vous donc attendre que d'autres publient les données de Statistique Canada qu'ils ont reprises alors que vous pouvez les obtenir directement à la source? Abonnez-vous à *L'Observateur économique canadien* dès aujourd'hui.

Le prix de l'abonnement annuel à *L'Observateur économique canadien* (n° 10-2300XPB au catalogue) est de 220 \$ au Canada, de 260 \$ US aux États-Unis et de 310 \$ US dans les autres pays. Les faits saillants de l'**Indicateur composite avancé** (n° 11F0008XFF au catalogue) sont offerts par télécopieur - le jour même de leur parution - pour 70 \$ par année au Canada et 70 \$ US aux États-Unis.

Pour commander, écrivez à : Statistique Canada, Division du marketing, Vente et service, 120, av. Parkdale, Ottawa (Ontario) K1A 0T6, ou adressez-vous au Centre de consultation de Statistique Canada le plus proche de chez vous et dont la liste figure dans cette publication. Si vous le préférez, vous pouvez envoyer votre commande par télécopieur au 1-613-951-1584, ou téléphoner sans frais au 1-800-267-6677 et utiliser votre carte VISA ou MasterCard.

*Don't let the changing world
take you by surprise!*



An aging population. Lone-parent families. A diverse labour force. Do you know how today's social changes will affect your future ... your organization ... and your family?

Keep pace with the dramatic shifts in Canada's evolving social fabric with Statistic Canada's best-selling quarterly, *Canadian Social Trends*. With vast and varied reports on major changes in key social issues and trends, this periodical incorporates findings from over 50 national surveys.

Written by some of Canada's leading-edge social analysts, *Canadian Social Trends* combines painstaking research with dynamic prose on topics like ethnic diversity, low-income families, time-crunch stress, violent crime and much more — all in a colourful, easy-to-read, magazine format.

A lasting record of changing times!

Join the thousands of business and policy analysts, social-science professionals, and academics who trust *Canadian Social Trends* to demystify the causes and consequences of change in Canadian society. Don't miss a single issue — subscribe today.

Canadian Social Trends (catalogue number 11-0080XPE) is \$34 annually in Canada, US\$41 in the United States and US\$48 in other countries.



To order, write to Statistics Canada, Marketing Division, Sales and Service, 120 Parkdale Ave., Ottawa, Ontario, K1A 0T6 or contact the nearest Statistics Canada Reference Centre listed in this publication.

If more convenient, fax your order to 1-613-951-1584 or call toll-free 1-800-267-6677 and use your VISA or MasterCard.

Ne soyez pas dépassé par les événements!

Le vieillissement de la population. Les familles monoparentales. La diversification de la population active. Savez-vous comment les changements sociaux d'aujourd'hui vont se répercuter sur votre avenir, votre organisation, votre famille?

Suivez l'évolution spectaculaire de la société canadienne grâce à *Tendances sociales canadiennes*, une publication trimestrielle de Statistique Canada. Avec des articles vastes et variés sur les principaux changements caractérisant les questions et les tendances sociales principales, cette publication intègre les résultats de plus de 50 enquêtes nationales.

Certains des analystes sociaux les plus reconnus du Canada rédigent des articles dans *Tendances sociales canadiennes*. Ils présentent les résultats de recherches minutieuses dans un style attrayant pour des sujets tels que la diversité ethnique, les familles à faible revenu, le stress dû au manque de temps, le crime et bien d'autres encore dans une revue haute en couleur et de lecture aisée.

Un dossier permanent d'une époque en évolution!

Des milliers d'analystes des entreprises et des politiques, de professionnels des sciences sociales et d'universitaires lisent *Tendances sociales canadiennes* pour identifier les causes et les conséquences de l'évolution de la société canadienne. Ne manquez pas un numéro, abonnez-vous dès aujourd'hui.

L'abonnement annuel à *Tendances sociales canadiennes* (n° 11-0080XPF au catalogue) coûte 34 \$ au Canada, 41 \$ US aux États-Unis et 48 \$ US dans les autres pays.

Pour passer votre commande, écrivez à Statistique Canada, Division du marketing, Vente et service, 120, av. Parkdale, Ottawa (Ontario) K1A 0T6, ou adressez-vous au centre de services-conseils de Statistique Canada le plus proche de chez vous et dont la liste figure dans cette publication.

Vous pouvez aussi envoyer votre commande par télecopieur, au 1-613-951-1584, ou téléphoner sans frais au 1-800-267-6677 et donner votre numéro de carte VISA ou MasterCard.

Your Reliable Journal of Health-related Information

In today's world, being informed about Canadians' health and Canadian healthcare is less of an option and more like an obligation. How accurate and up-to-date your information is, however, remains at your discretion ...

Follow the lead of hundreds of professionals in health care, research, insurance and policymaking who look to **Health Reports** for reliable facts and figures. Issued four times a year, this periodical combines Statistics Canada's stringent standards of data accuracy and timeliness with practical features. Each volume contains:

- highlights of newly released data
- news of recent publications and updates
- crisp and incisive articles
- information on specialized tabulations and custom data

Concise text, instructive charts and easy-to-read tables make for a balanced blend of essential data and straightforward analysis. Each issue of **Health Reports** is written by the analysts of the Canadian Centre for Health Information with original contributions from outside specialists. This imparts a particularly candid flavour and results in a stimulating approach to a wide range of topics like:

- women and cardiovascular disease
- health care for seniors
- recent findings on cancer, heart disease and tuberculosis
- mortality by occupation
- health risks and social status

With its broad scope and solid facts, **Health Reports** is quickly gaining recognition as an authority on health developments and concerns. It's an essential resource if you plan, establish, deliver or evaluate programs and projects – if you have a vested interest in health-related issues.


Don't just be informed! Know that your information is both current and sound. Get **Health Reports** for leading-edge information on Canadians' health and Canadian healthcare. Subscribe today.

Health Reports (catalogue number 82-0030XPB) is \$112 annually in Canada, US\$136 in the United States and US\$160 in other countries.

To order write Statistics Canada, Marketing Division, Sales and Service, 120 Parkdale Ave., Ottawa, Ontario, K1A 0T6 or contact the nearest Statistics Canada Reference Centre listed in this publication. If more convenient, fax your order to 1-613-951-1584 or call toll-free 1-800-267-6677 and use your VISA or MasterCard.

La revue fiable de renseignements sur la santé

Dans le monde d'aujourd'hui, le fait d'être informé de la santé des Canadiens et des soins dispensés au pays n'est pas un luxe mais une nécessité. C'est toutefois à vous qu'il revient de juger si les données que vous consultez sont suffisamment justes et actuelles.



Emboitez le pas à des centaines de professionnels de la santé, de chercheurs, d'assureurs et de décideurs qui se tournent vers **Rapports sur la santé** pour obtenir des faits et des chiffres fiables. Publié quatre fois l'an, ce périodique, qui répond aux normes sévères de Statistique Canada en matière d'exactitude et d'actualité des données, vous sera fort utile. Chacun des volumes vous offre des :

- faits saillants des données qui viennent de paraître
- informations sur les publications récentes et les mises à jour
- articles vivants et pénétrants
- renseignements sur les tableaux spécialisés et les données personnalisées

Des textes concis, des graphiques instructifs et des tableaux faciles à consulter donnent un mélange parfait de données essentielles et d'analyses directes. Les numéros de **Rapports sur la santé** sont rédigés par les analystes du Centre canadien d'information sur la santé avec l'apport inédit de spécialistes de l'extérieur. On peut ainsi brosser un tableau particulièrement fidèle de la situation et aborder un vaste éventail de sujets d'un point de vue tout à fait novateur. Parmi ces sujets, il y a :

- la femme et les maladies cardio-vasculaires
- les soins de santé pour les aînés
- les récentes découvertes sur le cancer, les maladies du cœur et la tuberculose
- la mortalité selon les professions
- les risques pour la santé et la catégorie sociale

Avec sa grande portée et ses faits solides, **Rapports sur la santé** a rapidement acquis une réputation de source digne de foi sur les faits nouveaux et les préoccupations du domaine de la santé. Cette publication est un ouvrage essentiel si vous planifiez, établissez, offrez ou évaluez des programmes et des activités, autrement dit si vous êtes intéressé par les questions relatives à la santé.

Ne soyez pas simplement informé. Disposez de renseignements accrus et fiables, soit les renseignements de pointe sur la santé des Canadiens et les soins de santé au pays que vous offre **Rapports sur la santé**. Abonnez-vous dès aujourd'hui.

L'abonnement à **Rapports sur la santé** (n° 82-0030XPB au catalogue) coûte 112 \$ par an au Canada, 136 \$ US aux États-Unis et 160 \$ US dans les autres pays.

Pour commander, écrivez à : Statistique Canada, Division du marketing, Vente et service, 120, av. Parkdale, Ottawa (Ontario), K1A 0T6, ou communiquez avec le Centre de consultation de Statistique Canada de votre région (la liste des centres figure dans la présente publication). Vous pouvez également commander par télécopieur au 1-613-951-1584 ou par téléphone au numéro sans frais 1-800-267-6677 et porter les frais à votre compte VISA ou MasterCard.