22-002F
no 10
1949
12 juil.
c. 1

STATISTICS CANADA STATISTIQUE CANADA
FEB FEV 13 2012
LIBRARY BIBLIOTHÈQUE

Ministère du Commerce
Bureau fédéral de la statistique
Division de l'agriculture
Ottawa, Canada

R.A. No 12, 1949

Publié par ordre du très hon. C.D. Howe,
Ministre du commerce

Statisticien du Dominion: Herbert Marshall
Directeur, Division de l'agriculture: C.V. Parker
Chef, Section des cultures: W.D. Porter

RAPPORT TELEGRAPHIQUE SUR LES CULTURES

Ottawa, 12 juillet 1949 (3 heures) - Le Bureau fédéral de la statistique publie aujourd'hui le huitième d'une série de 13 rapports télégraphiques hebdomadaires sur l'état des cultures dans les trois provinces des Prairies. Ces rapports reposent sur les renseignements communiqués par un nombre chosi de correspondants agricoles des ministères fédéral et provinciaux de l'Agriculture, par des observateurs agricoles particuliers et des producteurs de grains. Les données sur la température comprises dans le présent bulletin sont fournies par la Division de météorologie, Ministère des Transports, Toronto.

SOMMAIRE

D'après les conditions actuelles, une bonne récolte est prévue au Manitoba, mais la sécheresse a endommagé les cultures sur de si grandes étendues en Saskatchewan et en Alberta que l'on y prévoit des rendements inférieurs à la normale.

Bien qu'en général les cultures au Manitoba se développent de façon favorable, il y faudrait de la pluie particulièrement dans les régions du sud-est, du sud central et de Portage-Brandon; Morden déclare une quasi-sécheresse. Le blé, l'avoine et l'orge hâtifs, sont presque entièrement épiés et la végétation est dense dans la plupart des districts. Une forte infestation de pucerons du grain est survenue dans le sud ouest de la province et les cultures tardives d'avoine et d'orge ont été fortement endommagées. Il en est de même du blé tardif. Les mesures chimiques de répression peuvent se révéler efficaces si des insecticides et des vaporisateurs sont obtenus à temps et en quantités suffisantes. La chenille de la betterave est active et la chenille de la vanesse s'attaque aux cultures de tournesol aux environs d'Altona. La vaporisation chimique est efficace dans les deux cas. Les tempêtes de grêle des 29 juin, 7 et 8 juillet, ont causé des dommages variant de légers à considérables dans diverses localités de la province. La récolte de foin est bonne sauf dans la région de Winnipeg et entre les lacs.

Dans le nord central et le nord de la Saskatchewan des pluies générales au cours de la semaine dernière ont amélioré la situation de l'humidité. Ailleurs, cependant, il n'y a eu que des averses légères ça et là, et, comme la température est légèrement supérieure à la normale, la détérioration varie de modérée dans l'est central à rapide dans le sud-ouest. Il faudrait de la pluie immédiatement pour enrayer la détérioration dans l'est central et le sud central; dans le sud-ouest les dommages sont irrémédiables. La plus grande partie des régions souffrant de la sécheresse ont subi des dommages variant de légers à considérables par les sauterelles mais la sécheresse demeure toujours la cause principale de la mauvaise apparence des récoltes.

L'Alberta a passé une autre semaine de temps chaud et sec et il faudrait de la pluie dans toute la province. La situation est généralement pauvre à l'est et au nord de

Prix: $2 la série de 26 rapports

Coutts jusqu'àStettler et vers l'ouest jusqu'à Lacombe. De Calgary à Red-Deer la situation n'est que passable. La perspective des récoltes de foin et de céréales est encore favorable dans le sud-ouest et dans la région de Rivière-la-Paix, mais la perspective du foin dans la plus grande partie de la province est toujours de pauvre à passable.

Manitoba

En général, les cultures se développent de façon satisfaisante au Manitoba, mais il faudrait de la pluie, particulièrement dans les régions du sud-est, du sud central et de Portage-Brandon. Le temps est extrêmement sec dans le district de Morden. La plus grande partie du blé, ainsi que de l'avoine et de l'orge hâtifs, est épiée et la végétation est dense à peu près partout. Une forte infestion de puceron du grain existe dans le sud-ouest du Manitoba, soit à l'ouest de la ligne allant de Virden à Killarney. Les cultures tardives d'avoine et d'orge et certains champs peu denses de blé se révèlent très susceptibles et tout indique que les dommages seront considérables. Les mesures chimiques de répression peuvent se révéler efficaces si des insecticides et des vaporisateurs sont obtenus à temps et en quantités suffisantes. La chenille de la vanesse s'attaque aux cultures de tournesol dans la région d'Altona et la chenille à toile aux cultures de betteraves sucrières. La vaporisation chimique donne cependant de bons résultats dans les deux cas. La fenaison est commencée et la récolte est bonne sauf dans la région de Winnipeg et entre les lacs.

Dans la région de Selkirk, le blé est tout épié; il en est de même de la moitié des cultures de céréales secondaires. Les cultures sont très inégales sauf celles des jachères d'été. La pluie et le temps chaud ont activé la végétation de toutes les cultures, tandis que le foin et les pâturages se sont beaucoup améliorés. Les mêmes conditions, ou à peu près, existent dans le coin sud-est de la province, mais il faudrait de la pluie immédiatement et certains champs de foin sont très pauvres. Dans le sud central, aux environs de Morden, les cultures souffrent de la sécheresse prolongée et la perspective diminue. La chaleur et la sécheresse ont ralenti la végétation et causé un remplissage prématuré. Les cultures rangées se maintiennent mais l'herbe et les légumes sèchent. Les pâturages sont pauvres et des rendements relativement légers sont prévus dans ce district. Plus à l'ouest, à Melita, les cultures se maintiennent bien, mais une grande partie des cultures tardives a été endommagée par le puceron au cours de la semaine dernière.

A Portage-la-Prairie, les cultures sont généralement bonnes; tout le blé et la plus grande partie des cultures d'avoine et d'orge sont épiés. Le temps a été chaud et sec ces derniers jours et il faudrait de la pluie. La fenaison est commencée et la récolte est de légère à satisfaisante. Les conditions sont également très bonnes dans la région du Brandon-Woodnorth bien qu'il y ait besoin d'humidité dans le district de Brandon. Le puceron du grain a causé des dommages considérables aux cultures de céréales secondaires, particulièrement dans le district de Scarth, mais ce n'est pas là un état général.

Dans la section du nord central de la province, aux environs de Teulon, toutes les cultures de céréales épient favorablement. Le foin sauvage est très pauvre mais le foin cultivé est en meilleur état. Dans le nord-ouest de la province, aux environs de Neepawa, les cultures de blé sont excellentes. Certains champs de céréales secondaires sont très bons tandis que d'autres sont peu denses. La fenaison est générale et les rendements de foin d'herbe et de légumineuses sont très bons. Le lin est en fleurs. A Shoal-Lake, les cultures se développent exceptionnellement bien et la température est idéale. Aux environs de Swan-River, un vent chaud et sec a fortement fouetté les cultures de céréales et a fait brunir et faner le bout des feuilles. Il faudrait de la pluie sur les terrains légers. La fenaison est commencée dans la plus grande partie du district et le rendement de luzerne et de trèfle est bon. Les pâturages ont besoin d'humidité.

L'infestation de sauterelles semble enrayée pour cette année et il n'y a eu que de légers dommages dans certaines régions. La précipitation moyenne pour la province depuis le 1er avril a été de 11 p. 100 inférieure à la normale comparativement à 12 p. 100 inférieure à la normale il y a une semaine. La température moyenne au cours de la semaine terminée le 11 juillet est de 1.4 degré supérieure à la normale.

Saskatchewan

Les districts du nord et du centre de la Saskatchewan ont bénéficié de pluies assez générales au cours de la semaine dernière et la perspective des récoltes est meilleure. Ailleurs, cependant, il n'y a eu que des averses légères intermittentes et avec la température un peu au-dessus de la normale, la détérioration est générale, de modérée dans les cultures chaumées des régions de l'est et du centre à rapide dans le sud-ouest. De nouvelles pluies générales sont nécessaires afin de maintenir la perspective actuelle des récoltes. Il est maintenant trop tard pour espérer un relèvement dans le sud-ouest où les cultures de céréales seront très maigres et où le foin est complètement perdu. Alors que les ravages par la sauterelle menace dans une grande partie des districts plus asséchés, la sécheresse est le facteur prodominant des perspectives de faibles récoltes. Le blé est maintenant de 50 p. 100 épié. Les tiges sont très courtes dans les sections où la sécheresse sévit, mais elles sont en moyenne de 18 pouces de hauteur dans la plupart des régions.

La bonne apparence des cultures se maintient dans le sud-est où le blé est de 60 p. 100 épié et la tige atteint 18 à 20 pouces de hauteur. L'orge a bien progressé dans cette région, mais les champs d'avoine, qui commencent à épier, sont plutôt inégaux. Le besoin de pluie est pressant dans la région Regina-Weyburn où les grandes cultures varient considérablement, à cause des averses locales. Une détérioration absolue est déclarée dans la section de Fillmore de cette région, mais il est possible que les rendements égalent ceux de l'année dernière si la pluie survient à point.

Alors que les cultures des jachères d'été croissent bien dans la région d'Indian-Head, la détérioration des cultures chaumées est rapide. Les récoltes sont en général déclarées bonnes à l'est et au nord d'Indian-Head mais elles sont beaucoup plus pauvres à l'ouest de cet endroit jusqu'à Regina. L'apparence des cultures demeure excellente dans la région de Melville, Yorkton et Punnichy.

L'étendue de la sécheresse dans le sud-ouest est approximativement délimitée par Coderre, Tugaske, Simpson et, à l'ouest, par Broderick, Elrose et Eatonia. Un rapport de la station expérimentale du Dominion à Swift-Current déclare que la perspective des récoltes diminue sans cesse à cause de la sécheresse persistante. Environ 60 p. 100 des champs sont irrémédiablement perdus et leur rendement sera inférieur à 6 boisseaux par acre. D'autres champs pourraient encore se relever de façon modérée. L'herbe a peu poussé ou pas du tout dans la région des ranges mais le report de fourrage est bon dans plusieurs parties de la région; il permettra de maintenir les bestiaux. Les ravages par la sauterelle, relativement légers jusqu'à présent dans la région de Swift-Current, augmentent.

Les conditions dans l'ouest-central, au nord des limites de Goose-Lake, sont variables. Des averses intermittentes variant en intensité sont déclarées la semaine dernière. L'état général est satisfaisant et certaines régions locales ont de bonnes récoltes. L'amélioration est cependant assez générale dans les districts du nord. Toutes les cultures progressent de façon satisfaisante à Melfort et d'excellentes perspectives continuent dans les districts du nord-est.

Des dommages locaux par la grêle sont déclarés aux endroits suivants: 4 juillet, Kindersley, Coleville et Winter; 6 juillet, Luseland, Wynyard, Sain-Brieux, Leslie, Elfross,

Landis, Cloan, Phippin, Cudworth, Melville, Meecham, Leipzig, Lake-Lenore, Lanigan, Wilkie, Leroy, Lampart, Mozart, Arcola; 7 juillet, Stoughton, Midale, Kelfield et Biggar.

La précipitation moyenne dans la province depuis le 1er avril est de 19p. 100 au-dessous de la normale, comme la semaine dernière. La température moyenne durant la semaine terminée le 11 juillet est de 0.9 degrés au-dessus de la normale.

Alberta

Le temps s'est maintenu sec sur la plus grande partie de l'Alberta au cours de la semaine dernière. Il n'y a eu que quelques averses ça et là et il faudrait une bonne pluie générale pour assurer une récolte passable. Les cultures dans le sud-ouest de l'Alberta, aux environs de Lethbridge, et dans les régions de Cardston et de Rivière-la-Paix, demeurent bonnes mais il faudrait de la pluie. Les cultures à l'est et au nord d'une ligne allant de Coutts à Stettler et à l'ouest vers Lacombe, sont généralement pauvres, tandis qu'elles ne sont que passables dans la région de Calgary à Red Deer. La Commission d'assurance contre la grêle en Alberta déclare des tempêtes de grêles à Whisky Gap, Claresholm, Lomond, Rolling Hills, Cheadle, Balzac, Beynon, de Olds à Knee Hill Valley, Big Valley, Leduc, Mannville, Andrew et St-Paul. La grêle a ainsi endommagé près de 30,000 acres dans la proportion de 10 à 30 p. 100. Il y a possibilité de reprise pour ces cultures advenant des pluies prochaines.

On déclare que la pénurie de pluie a irrémédiablement endommagé des cultures dans le sud-est de l'Alberta. Dans cette région, 50 p. 100 du blé est épié, et 10 p. 100 de l'avoine et de l'orge. Aux environs de Manyberries la situation est toujours pauvre et il n'y a eu que quelques averses au cours de la semaine dernière. Les cultures de foin et d'herbe ont grandement souffert de la pénurie d'humidité et les récoltes ne sont que passables. Dans certaines sections du sud-est, les bêtes à cornes sont envoyées dans les champs où les cultures ont manqué.

Il y a eu détérioration par suite de la sécheresse de Taber en allant vers l'ouest jusqu'à la frontière de l'Alberta, mais des pluies générales dans cette région entraîneraient de bonnes récoltes. Dans le sud-ouest, les sauterelles deviennent rapidement adultes et on craint des dommages par la migration dans les régions où les cultures sont bonnes. Le carabe pygmée augmente en nombre dans les régions les plus sèches mais on ne prévoit pas de dommages immédiats. Le blé est épié dans la proportion de 20 p. 100 et les épis ne sont que de petites à moyennes; il faudrait de la pluie pour maintenir les perspectives actuelles. Dans le district de Cardston le blé est épié dans la proportion de 50 p. 100 et il a une hauteur moyenne de 24 pouces. Dans cette région, les cultures accusent une très bonne végétation mais il faudrait de la pluie pour aider le remplissage.

Dans l'est central de la province, Hanna déclare que le blé tardif donnera de cinq à dix boisseaux à l'acre. Dans la même région, les cultures semées sur chaume sont courtes, claires et remplies de mauvaises herbes. Les épis sont très petits et à peu près 60 p. 100 des cultures de blé sont épiées.

Les cultures tardives accusent une amélioration sur la semaine dernière dans le centre de la province aux environs de Sedgewick et de Donalda. Les cultures de blé sont très inégales et une partie ne fait que sortir de terre. Dans cette région, les récoltes d'avoine et d'orge seront probablement passables. Dans le district d'Edmonton, le temps est toujours chaud et sec et il n'y a eu que quelques averses locales au cours de la semaine dernière. Les céréales entrent dans leur première phase d'épiage prématurément et le blé épie sur une paille très courte. L'état général des cultures de céréales, des pâturages et du foin, est le pire connu depuis plusieurs années. Les bonnes pluies

de la semaine dernière dans la région de Lacombe ont enrayé la détérioration. Les pâturages et les cultures de foin sont toujours pauvres, ces dernières n'atteignant en moyenne que 30 p. 100 de la normale. Plus au sud de Lacombe des pluies ont aidé les cultures mais des tempêtes de grêle ont été déclarées.

Dans le nord-est de la province, Bonnyville déclare une amélioration des cultures, particulièrement des cultures tardives. Les cultures hâtives sont épiées et tout indique à l'heure actuelle que le rendement sera inférieur à la normale. Dans le nord-ouest de la province, aux environs de la station expérimentale de Beaverlodge, la perspective des cultures est de passable à bonne. La plupart des cultures sont plus courtes que d'habitude et une partie du blé et de l'orge hâtifs est épiée. Dans cette région, les cultures fourragères sont en fleurs et un bon rendement de foin est prévu.

La précipitation moyenne pour la province depuis le 1er avril est de 35 p. 100 inférieure à la normale comparativement à 41 p. 100 inférieurement à la normale la semaine dernière. La température moyenne pour la semaine terminée le 11 juillet est de 1 dégré supérieure à la normale.

- - - ooo - - -

WEEKLY PRECIPITATION AND TEMPERATURE IN THE PRAIRIE PROVINCES, 1949 1/

Crop District and Province	Station	Precipitation: Week ending 8 a.m. July 11	Precipitation: Total since April 1	Precipitation: Normal since April 1	Temperature: Week ending 8 a.m. July 11: Mean	Temperature: Week ending 8 a.m. July 11: Normal
MANITOBA						
1	Pierson	.24	6.39	6.58	64	66
	Melita	.20	6.29	8.42	66	67
	Waskada	.20	7.66	7.42	64	66
2	Boissevain	.38	6.36	6.61	65	66
	Ninette	.22	4.84	7.23	66	66
3	Portage la Prairie	.38	4.81	6.84	70	65
	Graysville	.04	5.47	7.53	72	66
	Morden	Nil	4.30	7.24	68	67
	Altona	Trace	3.24 2/	7.12	69	67
	Morris	Nil	4.15	6.86	70	67
	Emerson	.28	4.56	6.40	67	67
4	Winnipeg	.22	4.68	7.64	69	67
6	Sprague	1.38	7.12	7.56	65	65
	Pinawa	.28	3.74	5.46	68	65
7	Virden	1.16	8.74	6.09	66	63
	Rivers	1.36	7.24	6.87	66	64
8	Brandon	.22	7.20	6.90	67	65
	Cypress River	.26	5.66	6.74	N.R.	66
9	Minnedosa	.56	7.81	6.80	65	64
	Neepawa	.68	5.61	6.80	66	64
10	Russell	.34	5.95	6.51	65	63
	Birtle	1.40	7.06	6.66	64	63
11	Dauphin	.68	8.10	5.70	65	63
12	Gimli	.51	5.02	7.42	69	66
13	Swan River	.40	5.47	6.72	64	63
	The Pas	1.11	6.70	5.05	65	65
MANITOBA AVERAGE		.48	6.04	6.81	66.6	65.2
SASKATCHEWAN						
1A	Estevan	.31	5.13	6.68	66	65
	Carlyle	.82	6.72	7.04	63	63
1B	Broadview	.19	5.28	6.05	64	64
	Moosomin	1.06	9.48	5.99	65	64
2A	Yellow Grass	.50	3.85	6.52	64	65
	Midale	.62	3.92	7.07	65	65
2B	Moose Jaw	.20	2.07	6.58	66	67
	Regina	.17	4.63	6.52	64	64
	Francis	.08	2.68	5.60	60	64
	Qu'Appelle	.18	3.31	7.69	64	65
	Indian Head	.18	4.33	7.51	64	64
3AS	Assiniboia	.38	3.43	5.69	66	65
	Ceylon	.16	2.83	8.09	66	65
3AN	Chaplin	.10	2.59	6.90	66	65
	Gravelbourg	N.R.	1.46 2/	5.96	N.R.	65
	Coderre	.08	3.94	5.77	64	N.R.
	Bishopric	.26	3.66 2/	5.87	66	65
3BS	Ihstow	N.R.	1.83 2/	5.79	N.R.	65
	Shannavon	.18	2.48	5.57	66	63
	Cadillac	N.R.	3.38 2/	7.96	N.R.	64
	Val Marie	.18	2.20	6.19	65	65
	Aneroid	.08	2.18	6.75	67	64

WEEKLY PRECIPITATION AND TEMPERATURE IN THE PRAIRIE PROVINCES[1/], 1949 (continued)

Crop District and Province	Station	Precipitation: Week ending 8 a.m. July 11	Precipitation: Total since April 1	Precipitation: Normal since April 1	Temperature: Week ending 8 a.m. July 11 Mean	Temperature: Week ending 8 a.m. July 11 Normal
SASKATCHEWAN						
3BN	Pennant	Nil	2.98	7.09	67	64
	Swift Current	.07	3.06	6.56	65	64
	Hughton	.24	4.24 2/	6.00	66	63
4A	Maple Creek	.16	3.59 2/	6.34	68	65
	Consul	.53	2.69	5.45	64	62
4B	Roadene	Nil	3.13	6.02	65	63
5A	Leross	.28	6.66	6.65	61	62
	Lipton	.14	2.98	5.80	62	62
	Yorkton	.20	7.15	6.25	65	62
5B	Dafoe	1.41	6.02	5.82	63	62
	Foam Lake	.08	7.56	6.16	65	62
	Lintlaw	.58	9.27	6.26	62	61
	Kamsack	.14	5.51	5.52	64	63
6A	Davidson	.26	3.88	5.37	63	64
	Dilke	.01	3.84 2/	5.86	N.R.	N.R.
	Semans	.22	3.58	4.24	65	62
	Strasbourg	.38	7.20	6.16	63	63
6B	Harris	.50	2.56 2/	5.90	67	64
	Outlook	Nil	5.57	4.18	64	64
	Saskatoon	1.08	5.69	5.53	64	63
	Elbow	.06	4.54	5.48	64	64
	Dundurn	.06	4.84	6.61	66	64
7A	Kindersley	.73	4.83	5.02	65	63
	Rosetown	.54	3.31	6.07	N.R.	62
7B	Macklin	.44	4.38	6.16	N.R.	60
	Scott	.44	5.51	5.41	65	62
	Ruthilda	.48	5.08 2/	6.04	N.R.	N.R.
	Biggar	1.40	6.44	6.06	65	63
	Hudson Bay	.60	8.29	6.14	63	63
8B	Humboldt	.38	6.43	5.17	63	63
	Melfort	.44	5.54	5.68	63	63
9A	North Battleford	.87	6.66	5.91	64	64
	Rabbit Lake	.98	5.73	5.90	62	61
	Prince Albert	1.39	6.68	5.94	64	64
9B	Waseca	.62	4.44	5.90	63	61
	Island Falls	.66	10.30	5.89	62	64
SASKATCHEWAN AVERAGE		.40	4.94	6.11	64.4	63.5
ALBERTA						
1	Taber	.06	5.15	5.43	66	N.R.
	Foremost	.32	4.33	7.53	68	67
	Winnifred	.02	3.94	5.06	N.R.	N.R.
	Medicine Hat	.07	4.29	5.52	70	67
	Manyberries	.80	3.54	5.66	66	67
2	Cowley	.14	4.72	7.22	N.R.	60
	Macleod	.32	6.78	6.20	68	66
	Cardston	.04	5.38	9.56	62	64
	Lethbridge	.21	7.34	6.46	64	65
3	Vauxhall	N.R.	4.46 2/	5.08	N.R.	67
	Brooks	.24	4.56	5.21	66	68
	Empress	.34	4.28	5.92	70	68

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA
1010505915

WEEKLY PRECIPITATION AND TEMPERATURE IN THE PRAIRIE PROVINCES 1/, 1949 (continued)

Crop District and Province	Station	Precipitation: Week ending 8 a.m. July 11	Precipitation: Total since April 1	Precipitation: Normal since April 1	Temperature: Week ending 8 a.m. July 11: Mean	Temperature: Week ending 8 a.m. July 11: Normal
ALBERTA						
4	High River	.04	5.57	7.80	60	60
	Vulcan	.01	5.25	6.68	N.R.	N.R.
5	Drumheller	.46	6.11	6.67	67	67
	Hanna	.46	3.09 2/	7.21	63	65
	Naco	.28	4.42 2/	6.28	62	64
6	Olds	.70	3.78	6.79	62	60
	Calgary	.17	2.74	7.23	62	61
	Three Hills	.20	3.90	6.19	64	60
	Strathmore	.60	2.28 2/	6.51	64	62
	Gleichen	Nil	3.85 2/	5.83	64	62
7	Sedgewick	.68	3.34	5.93	63	59
	Hardisty	.40	2.34 2/	5.97	N.R.	N.R.
	Coronation	.65	3.86	5.32	64	62
	Hughenden	Nil	2.61	5.80	N.R.	65
8	Red Deer	.06	3.43	8.19	61	59
	Lacombe	N.R.	2.32 2/	7.21	N.R.	60
	Wetaskiwin	.14	1.92	6.65	63	61
	Camrose	.22	2.06	6.41	62	62
	Stettler	.20	3.45	7.33	67	59
9	Jasper	.26	3.87	3.42	58	58
	Rocky Mountain House	.61	3.53	7.52	60	59
	Springdale	.38	2.43 2/	8.22	57	59
10	Vegreville	.20	1.70 2/	7.31	N.R.	59
	Vermilion	.50	4.12	6.79	62	60
	Lloydminster	.34	2.94	5.37	64	60
11	Edmonton	.63	2.81	6.78	64	61
12	Whitecourt	.13	2.59	6.72	59	60
	Edson	.40	3.77	6.39	57	59
13	Elk Point	.58	3.16	5.93	62	60
14	Campsie	.14	3.16 2/	6.77	61	60
	Athabaska	.24	3.84 2/	5.98	61	60
	Lac La Biche	.99	5.54	6.32	63	60
15	High Prairie	.78	5.49	5.95	64	60
	Wagner	Trace	4.71	6.15	60	61
16	Beaverlodge	.40	5.03	4.96	58	59
	Grand Prairie	.39	3.58	5.92	59	59
	Fairview	.14	3.34	4.46	59	59
17	Fort St. John	1.15	5.30	5.93	59	61
ALBERTA AVERAGE		.34	4.15	6.35	62.7	61.7

N.R. No report.

1/ Source: Meteorological Service of Canada.

2/ Incomplete: not included in average.

1,325-12.7.49