22-002F
no 10
1950
13 juin
c. 1

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Division de l'agriculture

OTTAWA

STATISTICS CANADA STATISTIQUE CANADA
FEB FEV 13 2012
LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE

Publié par ordre du très hon. C. D. Howe, Ministre du Commerce

R.A. No 9
1950

Série de 25 rapports: $2

RAPPORT TELEGRAPHIQUE SUR LES CULTURES

Ottawa, le 13 juin 1950 à 3 h. de l'après-midi.- Le Bureau fédéral de la statistique publie aujourd'hui le troisième d'une série de 8 rapports télégraphiques sur l'état des cultures à travers le Canada. Le présent rapport comprend en outre le cinquième d'une série de 13 rapports télégraphiques sur l'état des cultures dans les provinces des Prairies. Les renseignements sur lesquels reposent ces rapports sont fournis par un certain nombre de correspondants agricoles spécialement désignés des ministères fédéral et provinciaux de l'Agriculture, par de simples observateurs agricoles et par des entreposeurs de céréales. Les données sur la température contenues dans le présent numéro sont fournies par la Division de la météorologie, ministère des Transports, Toronto.

SOMMAIRE - La plus grande partie des provinces Maritimes ont joui d'une température chaude et de conditions de végétation idéales au cours de la première partie de juin. Il faudrait cependant de la pluie un peu partout pour maintenir les progrès de la végétation. Les semailles sont presque terminées; il y a augmentation des acréages de céréales mais diminution de ceux de pommes de terre. La floraison des pommiers a été bonne et tout laisse prévoir une abondante nouure, sauf dans l'Ile du Prince-Edouard où la floraison a été faible. La récolte de petits fruits promet beaucoup.

Dans le Québec, des pluies fréquentes et une température plus chaude durant les deux dernières semaines ont considérablement amélioré toutes les cultures. Bien qu'un certain nombre de prés cultivés pour la première année se ressentent encore des effets de l'hiver, les perpectives sont bonnes pour les cultures de foin des prairies plus anciennes. Sauf dans quelques endroits de l'Est du Québec, les semailles sont terminées et dans la plupart des régions, les céréales ont levé. Les betteraves à sucre et les pommes de terre hâtives sont en bon état. Les perspectives sont bonnes pour les cultures maraîchères; le rendement des fraises sera cependant inférieur à la normale en raison des dommages causés par l'hiver. Dans presque toutes les régions, les bêtes à cornes sont maintenant dans les pâturages.

Dans presque tous les districts de l'Ontario, la pluie et le temps chaud depuis le 30 mai ont considérablement amélioré la perspective des cultures. Les comtés de Halton, Waterloo, Lambton, Ontario et une partie de celui de Middlesex ont encore besoin de plus d'humidité. Les céréales de printemps semblent en bon état, tandis que les pâturages et les cultures de foin font preuve maintenant d'une meilleure croissance. Le blé d'automne épie sur une paille quelque peu plus courte que d'habitude et laisse prévoir un rendement un peu inférieur à la normale. Les semailles des cultures tardives sont presque toutes terminées et se sont faites dans des conditions généralement favorables. La superficie ensemencée en betteraves à sucre, en fèves de soya et en maïs a été augmentée, tandis qu'on signale que celle des haricots secs et du

tabac a été réduite.

Les semailles de blé sont terminées dans les provinces des Prairies, sauf dans quelques régions dispersées où la pluie excessive a retardé les travaux. Dans ces régions, l'acréage à ensemencer en céréales secondaires est un peu plus considérable, mais si le temps est favorable, toutes les semailles devraient se terminer d'ici la fin de la semaine. Au Manitoba, la végétation a été rapide en général et les cultures, bien que tardives, sont en bon état. Les perspectives en Saskatchewan s'améliorent sensiblement en comparaison de la semaine dernière par suite de bonnes averses dans la plupart des régions. En Alberta les cultures sont généralement passables, mais la situation varie beaucoup dans la province. Les perspectives du sud-ouest restent bonnes, mais dans les autres régions du sud, dans une grande partie du centre et au nord-est, la pluie est très nécessaire. Les averses de la semaine dernière ont amélioré temporairement l'état des cultures dans les régions du nord et de l'extrême est. L'éclosion des sauterelles commence dans la plupart des secteurs de la région relevée en Saskatchewan et une lutte bien organisée est déclanchée. Le ver fil de fer est actif dans les régions du sud, du centre et de l'ouest central de la province.

Les journées modérément chaudes et les nuits fraîches se sont maintenues en Colombie-Britannique durant les deux dernières semaines. Dans la région de la Rivière-la-Paix l'humidité du sol est bonne, mais dans la plupart des régions de la province, la pluie serait profitable. Les semailles de céréales sont pratiquement terminées et la végétation est bien rapide. La coupe de la luzerne commencera bientôt dans l'Okanagan. La saison arrive quelque 10 jours plus tard que d'ordinaire.

Provinces Maritimes - Les semailles sont presque terminées dans la plus grande partie des trois provinces; il y a une légère augmentation des acréages de céréales et une diminution de ceux de pommes de terre. Le temps sec en mai a retardé la germination des petites semences. On prévoit que les bonnes pluies et le temps chaud du début de juin activeront la végétation, sauf dans l'Est du Nouveau-Brunswick où le terrain est encore bien sec.

En Nouvelle-Ecosse, les pâturages sont bons et on prévoit une bonne récolte de foin à moins que le temps ne devienne trop sec. Au Nouveau-Brunswick, le trèfle a été de façon générale endommagé par l'hiver, tandis que les prairies de foin et les pâturages ont besoin de pluie.

La floraison des pommiers a été bonne dans les principales régions productrices et on prévoit que la nouure sera bonne. Les insectes et les maladies ne causent pour ainsi dire aucun dommage. Les petits fruits ont bonne apparence. Dans les vieilles plantations de l'Ile du Prince-Edouard, la floraison des cerises et des bleuets est moyenne, tandis que celle de fraises est abondante. Les nouvelles plantations ne promettent pas beaucoup.

Québec - Les pluies fréquentes et le temps chaud des deux dernières semaines ont fort amélioré les cultures. L'herbe pousse passablement drue dans les vieux prés et pâturages et les perspectives de la récolte de foin sont très brillantes. Un certain nombre de nouvelles prairies souffrent encore des ravages causés par l'hiver et ont même nécessité un nouvel ensemencement partiel en certains endroits, particulièrement dans le bas St-Laurent, dans les Cantons de l'Est et au nord de Montréal. Sauf dans quelques sections des régions de Gaspé, du Bas St-Laurent et de l'Abitibi où les semailles ne font que s'achever, toutes les céréales sont semées et viennent bien dans toute la province. Les betteraves à sucre sont très prometteuses, surtout dans les Cantons de l'Est et au nord de Montréal. Les quatre cinquième environ du maïs et des navets sont semés. Les pommes de terre hâtives germent bien et font prévoir une bonne récolte si la température reste favorable. La récolte de fraises sera inférieure à la normale à cause des graves dommages causés par l'hiver. Les cultures maraîchères

viennent bien et les régions du sud de la province obtiennent d'importants rendements de laitue et de radis. Les bovins sont aux champs et la production de lait augmente constamment.

De fortes pluies samedi dernier ont mis fin dans la région de la Baie des Chaleurs, à quatre semaines de sécheresse et ont fort profité au foin et aux pâturages ainsi qu'aux céréales. La région a terminé ses semailles la semaine dernière. De bonnes pluies sont tombées au cours des deux dernières semaines dans la région du lac Saint-Jean. Les troupeaux laitiers sont aux champs depuis le 27 mai à Saint-Gédéon mais sont encore à l'étable dans d'autres parties de la région. Les semailles sont presque terminées. Prairies et pâturages se remettent de l'hiver rigoureux et les céréales poussent bien.

A Lennoxville, au sud de Montréal, la température a favorisé la végétation bien qu'il y ait un peu de sécheresse. Les prairies ensemencées en 1949 seront maigres mais les autres sont généralement en bon état. Les perspectives de la région de Saint-Jean sont généralement passables. Les haricots, les pommes de terre, les pois et le maïs sont bien avancés. La chaleur de la fin de mai et du début de juin et les fortes pluies de la deuxième semaine de juin ont énormément aidé les cultures; les perspectives du foin, cependant, ne semblent pas trop bonnes. Les gelées profondes de l'hiver dernier ont fort endommagé le trèfle. La région d'Hemmingford, au sud-ouest de Montréal, a terminé ses semailles à la faveur de bonnes conditions et les cultures y poussent bien. Les pâturages sont passables et les fraises promettent. Les framboises sont passables tandis que les pommes ont connu une bonne nouure; cependant, les variétés hâtives sont fortement infestées de tavelure dans certaines pommeraies.

A l'Assomption, à l'est de Montréal, la pluie a amélioré les pâturages mais retardé d'une semaine l'ensemencement du maïs. Les perspectives des betteraves à sucre et des céréales sont prometteuses. Le temps a été idéal pour le tabac jaune mais la plantation du tabac à cigare et à pipe ne fait que commencer.

Les semailles sont terminées dans l'ouest du Québec. Il a fallu réensemencer beaucoup de prairies nouvelles dans la région de Montréal parce que la semence y a mal pris l'an dernier. Les perspectives de l'herbe des prairies anciennes et des céréales sont bonnes. Le lin a percé et sa superficie est plus grande cette année à cause des meilleures perspectives de marché. La superficie des betteraves à sucre est également plus grande.

Ontario - Dans tous les districts de la province, les perspectives des cultures se sont considérablement améliorées à la suite des pluies et de la chaleur depuis la fin de mai. Des pluies abondantes seraient encore bien accueillies dans les comtés de Halton, Waterloo, Lambton, Ontario et dans une partie de celui de Middlesex. Les céréales de printemps semblent en bon état et les pâturages et les cultures de foin font preuve maintenant d'une meilleure croissance. On prévoit que le rendement du blé d'hiver sera quelque peu inférieur à la normale. Les semailles des cultures tardives sont presque terminées et se sont faites dans des conditions généralement favorables. La superficie ensemencée en betteraves à sucre, fèves de soya et maïs a été augmentée, tandis qu'on signale que celle des haricots secs et du tabac a été réduite.

La température chaude et les pluies abondantes de la semaine dernière ont considérablement amélioré les perspectives des cultures dans le sud-ouest de l'Ontario. La récolte des cultures maraîchères hâtives est bien avancée et les tomates et pommes de terre hâtives croissent rapidement. Une bonne partie du maïs et des fèves de soya ont bien levé et le plantage du tabac est presque terminé dans la plupart des districts. Sur l'île Pelée, les fèves de soya ont bien débuté et les perspectives de cette culture

sont très prometteuses. A l'heure actuelle, ont prévoit une récolte de blé hâtive. Dans le comté de Kent, les cultures font des progrès et presque tout le blé d'hiver a épié. Le maïs est levé et les tomates hâtives sont en bon état. Le plantage du tabac est bien avancé. Des rapports en provenance de différents endroits signalent des dégâts causés à un grand nombre de cultures par le ver fil de fer. Les betteraves à sucre ont été endommagées par le ver gris et le maïs, par la larve des racines.

Dans le comté de Middlesex, les cultures sont passablement prometteuses, en général, bien qu'un grand nombre de régions aient besoin de pluies abondantes. Le blé est en train d'épier et le maïs pousse régulièrement sauf dans les régions arides. Certains dégâts causés par la larve de la racine du maïs ont été signalés. Les betteraves à sucre croissent lentement et le foin et les pâturages ne sont que passables. Dans la région de Galt, les cultures sont passablement prometteuses bien qu'on y prévoie une maigre récolte de foin. Ce district a grandement besoin de pluie. Simcoe signale que le blé et le seigle d'automne sont en bon état. Le foin laisse prévoir une bonne récolte et les pâturages se maintiennent en bon état. Les pommes de terre hâtives sont excellentes. Il faudrait plus de pluie.

Les pluies générales de la première semaine de juin et aussi du 10 juin ont amélioré sensiblement les perspectives des cultures dans la région de Barrie. Les cultures de foin et les pâturages sont encore limités, mais la végétation est bonne. L'ensemencement d'un plus grand acréage de maïs est terminé et le plantage de pommes de terre est en bonne voie. Actuellement les perspectives des fruits et des légumes sont satisfaisantes.

On déclare dans le comté de Dundas que les abondantes averses récentes accompagnées d'un temps plus chaud ont provoqué une végétation très rapide de toutes les cultures. Toutes les céréales sont en terre et semblent très prometteuses. Presque tout le maïs est semé et une partie sort de terre et pousse bien. Le foin est inégal. Les pâturages sont excellents et les perspectives d'une bonne récolte sont actuellement très encourageantes. De fréquentes averses locales retardent les semences dans les environs de Kapuskasing. A ce jour, les semailles sont dans la proportion de 60 p. 100 terminées. Les cultures de foin et les pâturages s'améliorent considérablement.

Manitoba - Les semailles ont bien avancé au Manitoba la semaine dernière malgré les averses et les fortes pluies assez générales dans toute la province. Elles sont presque terminées dans la partie occidentale de la province et se termineront cette semaine dans le reste si la température est favorable. La croissance a été rapide et les cultures sont dans un état favorable, exception faite de leur retard.

L'ensemencement du blé est terminé à Morden et il y reste environ 15 p. 100 des céréales secondaires à semer. Le blé germe bien et est déjà haut de quatre pouces dans les champs hâtifs. Le tournesol est tout semé et germe bien. L'herbe, en retard, pousse rapidement maintenant. La région a besoin de pluie pour hâter la germination en terrain desséché. Le correspondant d'Altona signale des semailles en retard à cause de la pluie. Environ 85 p. 100 des semailles sont terminées et on est encore à semer blé, betteraves et tournesol. A Pilot-Mound, tout le blé et 80 p. 100 des céréales secondaires sont en terre. Les conditions d'humidité sont très favorables; le foin et les pâturages progressent rapidement et les perspectives générales sont bonnes. Dans le sud-ouest du Manitoba, à Melita, il est tombé 3.4 pouces de pluie depuis le 7 juin. Les semailles y sont terminées, sauf pour une partie du lin. Le seigle d'automne est dans la première phase de l'épiage.

La région d'East-Selkirk du Manitoba signale que le temps humide gêne encore les semailles. Seulement les trois quarts de la superficie projetée y seront ensemencés et les emblavures sont sensiblement réduites.

La pluie a également retardé la fin des semailles à Portage-la-Prairie. On y est encore à semer du blé. La superficie de l'orge et des pois est plus vaste tandis que les emblavures sont réduites. Les pâturages et le foin sont excellents. A Brandon, il reste à semer environ 20 p. 100 de l'orge et 75 p. 100 du lin. Plus à l'ouest encore, à Woodnorth, les fortes pluies des 8 et 9 juin retarderont les semailles jusqu'au 15. Les semailles ne seront pas terminées avant trois ou quatre jours. Certains cultivateurs se proposent de semer du lin mais ont peine à se procurer de la semence. De fortes pluies dans la région de Virden ont aussi retardé les semailles, qui sont aux quatre cinquièmes achevées. De nombreuses cultures sont fortement infestées de mauvaises herbes qui ne sont pas faciles à détruire à cause de l'humidité excessive.

Dans la partie centrale du nord du Manitoba, à Teulon, les semailles battent encore son plein et sont terminées dans la proportion de 65 p. 100. L'ensemencement de presque tout l'orge et d'un peu de lin se poursuit actuellement. Minnedosa a terminé l'ensemencement du blé et les sept dixièmes des céréales secondaires. Les cultures, le foin et les pâturages font d'excellents progrès. Dans l'ouest central du Manitoba, Shoal-Lake a été trempé d'excellentes pluies la semaine dernière. Les semailles y devraient s'achever cette semaine. Les cultures et les pâturages viennent tous bien.

Swan-River signale que la fin des semailles retarde à cause de la pluie. L'humidité y a été bienvenue cependant. Les cultures hâtives sont déjà de 8 à 10 pouces de haut et sont prêtes pour la vaporisation destinée à détruire les mauvaises herbes. Les pâturages et les jardins sont en bon état et on n'y signale aucun dommage causé par la gelée.

Le Laboratoire d'entomologie fédéral de Brandon signale que les sauterelles commencent à éclore dans la région de Morden-Carmen mais le nombre n'en est pas encore élevé. La précipitation moyenne depuis le 1er avril s'établit à 43 p. 100 au-dessus de la normale contre 11 p. 100 au-dessous de la normale l'an dernier et 37 p. 100 au-dessus de la normale la semaine dernière. La température moyenne de la semaine terminée le 12 juin est de 3.3. degrés en bas de la normale.

Saskatchewan - Des pluies pénétrantes et un temps plus chaud ont sensiblement activé la végétation dans toutes les régions. La pluie a refait les réserves d'humidité de surface et contribuera à ranimer les cultures qui avaient souffert de l'érosion au début du mois. Le blé pousse bien et s'élève, en moyenne, à trois pouces et demie. La moitié des céréales secondaires verdit et s'élève à deux pouces.

Les sauterelles éclosent dans presque toutes les régions observées et des mesures de répression sont mises sur pied. Le ver fil de fer a causé des dommages dans le sud, le centre et l'ouest central et la gelée a retardé les cultures dans des endroits du centre et de l'ouest central de la Saskatchewan. Présentement la situation de l'humidité du sol est bonne, mais il faudra de nouvelles pluies pour activer la végétation et permettre aux cultures de résister aux grandes chaleurs de l'été.

Des pluies généreuses se sont abattues à Manor et Summerberry, dans le sud-est de la Saskatchewan. Il reste certaines semailles à faire dans ces endroits mais, grâce au temps chaud, ces travaux seront tôt terminés. Jusqu'à ce jour, les insectes n'ont encore fait aucun dommage dans la région. A Fillmore, des pluies abondantes, la semaine dernière, suivies de temps chaud, ont activé la végétation et 75 p. 100 des céréales ont germé. Toutes les cultures font des progrès satisfaisants. A Indian-Head, le temps frais a retardé quelque peu la végétation jusqu'au 7 et au 8 juin; il est tombé alors 1.29 pouce de pluie. Cette pluie a aidé les champs qui avaient été endommagés par le vent et il ne reste que quelques champs isolés qui devront être réensemencés. Il reste des étendues assez considérables de céréales secondaires à

semer dans certaines parties de cette région. A Yellow-Grass, les semailles sont terminées et les conditions d'humidité sont idéales depuis la pluie de la semaine dernière. Le blé se dresse à 2 ou 3 pouces et les pâturages sont excellents. Les mauvaises herbes sont modérément abondantes et les sauterelles commencent à éclore.

Divers endroits du sud-ouest signalent de bonnes pluies. Pour peu que ces pluies se généralisent, elles aideront à corriger les indications antérieures relativement au manque de pluie.

Dans l'est central de la province, aux environs de Willowbrook, les semailles sont terminées et le blé a bien perçé. La saison est peut-être de deux semaines en retard, mais la végétation est rapide. Les pâturages sont bons et les cultures n'ont encore souffert d'aucun dommage. Dans le nord-est, à Melfort, il n'a plu que très légèrement depuis le dernier rapport, mais l'humidité de surface a été suffisante pour assurer une germination égale et une végétation satisfaisante. Dans la nuit du 6 juin, la gelée a atteint 5.5 degrés, mais les dommages sont imperceptibles. Il faudra réensemencer certains champs de céréales secondaires. Le temps plus chaud a amélioré la végétation des céréales et des cultures fourragères. Les semailles sont à peu près terminées dans la région de Hafford-Larkside. Les champs tôt semés ont bien germé. Il est tombé près d'un pouce de pluie à Hafford les 4 et 5 juin; la gelée légère de la nuit du 6 n'a apparemment causé aucun dommage.

Dans la région de Scott, dans l'ouest central de la Saskatchewan, les sauterelles éclosent rapidement et uniformément depuis quelques jours. La campagne de répression est lancée. Les céréales sont quelque peu tardives. Il fait chaud depuis trois jours et il faudrait de la pluie pour activer la végétation. Les perspectives du foin sont pauvres et les pâturages ont grandement besoin de pluie.

Le Laboratoire d'entomologie de Saskatoon, signale des dommages marginaux causés aux cultures par les sauterelles des chemins dans certaines régions du centre de la Saskatchewan. On recourt généralement aux leurres et à la vaporisation contre les sauterelles fraîchement écloses dans toute les régions infestées de la province. Le ver fil de fer a causé des dommages de légers à graves au blé en jachère dans la région de Saskatoon. La précipitation moyenne dans la province depuis le 1er avril a été de 12 p. 100 au-dessous de la normale comparativement à 23 p. 100 au-dessous de la normale il y a une semaine et 21 p. 100 au-dessous de la normale à la même époque l'année dernière. La température moyenne durant la semaine terminée le 12 juin a été de 3.4 degrés au-dessous de la normale.

Alberta - Il faudrait de la pluie partout en Alberta pour ramener les cultures à l'état normal. La semaine dernière, la pluie tombée dans les régions du nord et de l'extrême est a amélioré la situation jusqu'à un certain point, mais le temps chaud qui a suivi a augmenté ce besoin d'humidité. D'autres régions, particulièrement à l'est et au sud de Lethbridge, ont un besoin urgent de pluie. Les semailles de céréales fourragères sont presque terminées. Les cultures semblent en bon état, particulièrement dans les régions au nord de Red-Deer où le blé est levé d'environ six pouces et les céréales fourragères, d'environ quatre pouces. Les cultures de foin et les pâturages sont en bon état dans les régions du nord et de l'extrême sud-ouest, mais médiocres dans le reste de la province.

Du sud-est de l'Alberta, aux environs de Manyberries, on signale que les réserves d'humidité se sont grandement améliorées la semaine dernière; la région de Brooks toutefois est encore très aride et poussiéreuse. L'état des pâturages varie entre bon dans l'extrême su-est et se détériorant rapidement dans la région plus au centre qui n'est pas arrosée. Toute la région au sud de Calgary a besoin de pluie sous une zone limitée dans les districts de Cardston et de Pincher-Creek. Aucun

dommage causé par la sécheresse ou l'érosion n'a encore été signalé, mais la région du centre méridional est très aride. Claresholm déclare que certains plants fragiles de jardins ont été endommagés par une petite gelée survenue le 9 juin. Le démariage des betteraves à sucre est au tiers terminé et la culture est très prometteuse. Au sud de Calgary l'état du foin et des pâturages varie entre médiocre et passable; il est très bon aux environs de Cardston et près de Lethbridge, ces cultures sont arrosées. Le rapport en provenance de Cardston indique que les pluies opportunes et la température idéale maintiennent l'excellence des perspectives; le seigle d'automne est en voie d'épier. Toute la région du sud déclare que le blé a levé d'environ quatre à six pouces et les céréales fourragères, de trois à quatre pouces environ. Il y a un besoin urgent de pluies abondantes.

La région de l'est central, aux environs de Hanna, signale que la température est plus chaude, qu'il y a un grand besoin de pluie, que la croissance y est très lente et les pâturages dans un état médiocre. La région de Sedgewick signale une pluie générale d'un pouce; les réserves d'humidité y sont donc excellentes. Le blé a levé de quatre à six pouces, les semailles de céréales fourragères sont terminées dans la proportion de 90 p. 100 et les pâturages sont en bon état. Il y a eu érosion sur les terrains meubles.

La région de l'ouest central déclare un temps plus chaud, des vents légers et l'absence de pluie durant la semaine dernière et en conséquence, l'humidité est pauvre. Les semailles sont presque terminées et la germination est bonne. Le blé atteint presque 6 pouces de hauteur et commence à gerber dans la région de Donalda. Compte tenu de la situation de l'humidité, les céréales secondaires poussent assez bien. Toutefois, la végétation des pâturages et du foin est arrêtée et les jardins sont secs. La région de Lacombe déclare une gelée légère pendant trois soirées consécutives la semaine dernière; cette gelée a causé de légers dégâts aux céréales. Red-Deer déclare que l'érosion est sérieuse dans toute la région. Une pluie abondante serait avantageuse dans toute la région.

Le temps chaud qui a suivi les pluies abondantes des semaines dernières dans la région du nord-est a sensiblement amélioré les perspectives des récoltes, mais il faudrait plus de pluie sans tarder. Les semailles de céréales secondaires et de cultures fourragères sont pratiquement terminées et les champs ainsi ensemencés paraissent bien. Le blé atteint maintenant entre deux et six pouces. Bonnyville déclare que la luzerne pousse rapidement et devrait fournir un bon rendement de graines de semences. A Evansburg, dans la région du nord central, on déclare que les semailles de céréales sont terminées et que le blé semé tôt atteint à peu près cinq pouces, tandis que l'avoine mesure à peu près trois pouces. L'humidité de surface est bonne et l'humidité du sous-sol, passable. Les pluies récentes ont été très avantageuses et ont amélioré particulièrement les pâturages et le foin. L'humidité est bonne et les cultures poussent bien dans la région du nord-ouest, près de Beaverlodge. Cette région déclare aussi que les semailles sont terminées, que le blé atteint à peu près trois pouces et l'avoine et l'orge, à peu près un pouce. On ne déclare pas de gelée ou de grêle.

Le rapport entomologique de Lethbridge annonce que les dégâts causés par le ver fil de fer sont très sérieux dans les environs de Barons, Nobleford, Vulcan et Champion. Depuis le 1er avril la précipitation moyenne de la province s'établit à 45 p. 100 inférieure à la normale, en comparaison de 43 p. 100 inférieure à la normale il y a un an et 44 p. 100 inférieure à la normale la semaine dernière. La température moyenne de la semaine terminée le 12 juin est de 2.3 degrés inférieure à la normale, contre 4.2 degrés au-dessus de la normale durant la semaine correspondante l'an dernier.

Colombie-Britannique - En Colombie-Britannique, la saison est encore d'environ dix jours en retard sur la normale. Au cours des deux dernières semaines le temps a été modérément chaud, les nuits ont été fraîches et il y a eu de légères gelées dans certaines régions. Il faudrait de bonnes pluies un peu partout, sauf dans la région de Rivière-la-Paix où les réserves d'humidité sont suffisantes. Les semailles de céréales sont presque terminées et les cultures accusent une rapide végétation. On commencera bientôt la moisson de la luzerne dans la vallée d'Okanagan. Les plantations de houblon déclarent de bon progrès. A Saanichton, le temps a été sec et chaud. Il faudrait de la pluie pour activer la végétation. Des fraises hâtives sont en vente, tandis que les mûres de Logan ont juste terminé leur dernier stade de floraison. Le temps a aussi été sec à Agassiz. Toutes les cultures sont en retard et la germination de maïs à ensilage n'est pas satisfaisante. Toutefois, les pâturages sont bons et un peu de foin a été coupé. La maladie atteint certaines cultures de fraises, tandis que d'autres accusent un état excellent. Dans la région d'Okanagan nord, les cultures de céréales auraient grandement besoin de pluie. Les rendements de luzerne sont généralement inférieurs cette année. Dans la région de Creston, le temps frais et sec a retardé la végétation des céréales de printemps. Toutefois, la végétation du blé d'hiver est favorable, ainsi que celle des haricots. Il est possible que la fenaison commence plus tôt que d'habitude cette année mais les rendements seront moins considérables. L'irrigation est appliquée aux cultures de petits fruits et à celles de fruits d'arbre. La vaporisation des vergers enraye les dommages par les insectes. Le Laboratoire d'entomologie à Kamloops déclare que les cultures de légumes sont encore d'environ dix jours en retard sur la normale, mais le temps chaud a dernièrement accéléré la végétation. L'herbe des pâturages accuse maintenant une végétation normale. L'humidité de sous-sol semble suffisante mais il faudrait de la pluie. Le ver gris cause toujours des dommages aux cultures d'oignons, tandis que l'altise de la pomme de terre fait de façon générale son apparition.

---oooOOOooo---

Weekly Precipitation and Temperature in the Prairie Provinces, 1950 1/

Crop District and Province	Station	Precipitation: Week ending 8 a.m. June 12/50	Precipitation: Total since April 1	Precipitation: Normal since April 1	Temperature: Week ending 8 a.m. June 12, 1950 Mean	Temperature: Normal
MANITOBA						
1	Pierson	1.70	6.02	4.20	54	59
	Melita	2.12	6.74	4.77	58	60
	Waskada	1.82	5.31	3.74	57	59
2	Boissevain	1.71	7.34	4.28	56	59
	Ninette	1.08	6.59	4.65	55	59
3	Portage la Prairie	1.06	7.44	4.07	58	60
	Graysville	N.R.	6.06 2/	4.40	N.R.	59
	Morden	.32	7.60	4.33	59	60
	Altona	.18	4.80 2/	4.28	55	60
	Morris	N.R.	Nil 2/	4.05	N.R.	60
	Emerson	Trace	4.66	3.71	59	61
4	Winnipeg	.69	7.08	4.63	58	61
6	Sprague	.01	4.89	4.57	60	58
	Pinawa	.18	3.30	3.14	57	59
7	Virden	2.80	8.16	3.46	56	59
	Rivers	1.79	5.93	3.90	55	59
8	Brandon	2.34	6.63	3.99	54	59
	Cypress River	.92	4.28	4.09	55	60
9	Neepawa	1.98	6.19	4.00	54	59
10	Russell	.94	2.96 2/	3.70	55	57
	Birtle	1.88	4.75	3.73	54	57
11	Dauphin	1.79	5.22	3.26	52	58
12	Gimli	.86	6.28	4.77	54	59
13	Swan River	.96	2.30	3.54	53	57
	The Pas	.40	3.32	2.80	52	58
MANITOBA AVERAGE		1.20	5.72	4.00	55.7	59.0
SASKATCHEWAN						
1A	Estevan	1.70	4.58	4.03	56	58
	Carlyle	.96	4.26	4.26	54	57
	Oxbow	1.78	3.86 2/	4.14	55	58
1B	Broadview	1.24	4.09	3.62	51	57
	Kipling	1.14	4.80	3.50	54	58
	Moosomin	1.60	5.80	3.55	54	58
2A	Yellow Grass	1.14	2.96	3.85	54	58
	Midale	1.64	4.36	4.34	54	58
2B	Moose Jaw	1.82	4.00	3.83	55	59
	Regina	1.29	4.07	3.62	54	58
	Qu'Appelle	1.40	4.50	4.49	53	59
	Indian Head	1.28	3.70	4.18	53	58
3AS	Assiniboia	1.90	4.76	3.16	52	60
	Ceylon	1.24	3.51	4.82	51	59
3AN	Chaplin	1.10	2.84	4.22	55	59
	Gravelbourg	1.64	3.90	3.13	53	57
	Coderre	1.52	3.54	3.41	52	58
	Bishopric	1.82	3.34 2/	3.28	54	58
3BS	Shaunavon	1.40	2.50	3.19	52	57
	Cadillac	1.08	2.32	5.04	53	57
	Val Marie	.80	2.42	3.65	53	58
	Aneroid	.22	1.12 2/	3.85	54	57

Weekly Precipitation and Temperature in the Prairie Provinces, 1950 1/ (continued)

Crop District and Province	Station	Precipitation: Week ending 8 a.m. June 12/50	Precipitation: Total since April 1	Precipitation: Normal since April 1	Temperature: Week ending 8 a.m. June 12, 1950 Mean	Temperature: Normal
SASKATCHEWAN						
3BN	Pennant	.08	2.26	4.14	55	58
	Swift Current	.78	2.47	3.80	53	58
	Hughton	Nil	1.87 2/	3.94	55	57
4A	Maple Creek	N.R.	.80 2/	3.70	N.R.	58
	Consul	.52	1.22	3.46	51	57
	Roadene	.02	1.58	3.95	56	57
5A	Leross	.76	3.56	3.62	52	55
	Lipton	.78	3.64	3.21	51	55
	Yorkton	.79	2.38	3.64	53	57
5B	Dafoe	.51	2.64	3.14	53	55
	Foam Lake	.86	2.53	3.50	53	55
	Lintlaw	.82	3.40	3.78	51	55
	Kamsack	.61	2.04	2.83	53	56
6A	Davidson	.50	2.90	3.26	54	58
	Dilke	.92	3.14	3.53	N.R.	N.R.
	Semans	.66	2.10	2.48	54	55
	Strasbourg	1.00	3.96	3.71	54	57
6B	Harris	N.R.	1.82 2/	2.69	N.R.	57
	Outlook	.04	2.69	2.60	57	58
	Saskatoon	.40	2.31	3.03	56	57
	Elbow	.20	3.10	3.19	58	58
	Dundurn	.06	1.80	3.59	57	57
7A	Kindersley	Nil	2.63	2.89	56	54
	Rosetown	Trace	2.85	3.56	55	55
7B	Macklin	.20	1.60	3.93	56	55
	Scott	1.22	2.29	3.11	54	57
	Ruthilda	Nil	1.52 2/	3.40	N.R.	N.R.
	Biggar	.04	2.17	3.32	55	57
8A	Mistatim	.78	4.28	3.35	50	58
	Hudson Bay	.70	3.59	3.30	53	57
8B	Humboldt	.42	1.95	3.00	54	57
	Melfort	.62	2.91	3.33	55	58
9A	North Battleford	1.05	2.36	3.25	55	59
	Rabbit Lake	1.06	2.74	3.09	52	58
	Prince Albert	1.39	4.25	3.34	55	58
9B	Island Falls	.03	2.15	3.22	53	56
	Waseca	1.72	2.53 2/	3.29	52	56
SASKATCHEWAN AVERAGE		.86	3.11	3.55	53.8	57.2
ALBERTA						
1	Taber	.02	.64 2/	3.51	55	58
	Foremost	.32	1.47	5.08	54	63
	Winnifred	Nil	1.00	3.61	N.R.	N.R.
	Medicine Hat	Trace	1.16	3.26	56	60
	Manyberries	N.R.	1.35 2/	3.67	N.R.	60
2	Cowley	.45	3.52	4.45	49	54
	Macleod	.16	2.76	3.65	57	60
	Cardston	1.22	4.20	6.30	50	59
	Lethbridge	.08	2.14	3.96	53	58
	Magrath	.36	1.14 2/	5.05	56	58

Weekly Precipitation and Temperature in the Prairie Provinces, 1950 1/ (continued)

Crop District and Province	Station	Precipitation: Week ending 8 a.m. June 12/50	Precipitation: Total since April 1	Precipitation: Normal since April 1	Temperature: Week ending 8 a.m. June 12, 1950 Mean	Temperature: Normal
ALBERTA						
3	Vauxhall	Nil	1.82 2/	3.17	54	59
	Brooks	Nil	.86	3.29	55	60
	Bindloss	Nil	.48	3.31	52	61
	Empress	Nil	.17	3.46	58	61
4	High River	.12	2.59	4.99	50	55
	Vulcan	N.R.	1.81 2/	3.69	N.R.	N.R.
5	Drumheller	Nil	.67	3.81	55	59
	Hanna	.02	.57 2/	4.16	52	59
	Naco	Nil	1.57	4.08	54	58
	Oyen	Nil	.64 2/	2.55	N.R.	N.R.
6	Olds	.08	1.34	4.31	52	54
	Calgary	.04	1.81	4.26	51	56
	Three Hills	.32	1.34	3.48	52	53
	Strathmore	Nil	.54	3.91	50	54
	Gleichen	Nil	1.43	3.51	54	56
	Hussar	N.R.	.82 2/	3.78	N.R.	N.R.
7	Sedgewick	.92	1.96 2/	3.01	54	56
	Hardisty	N.R.	2.92 2/	2.84	N.R.	N.R.
	Coronation	.07	1.27	3.24	53	56
	Hughenden	.54	1.87	3.44	52	59
8	Red Deer	.21	1.62	4.92	49	54
	Lacombe	N.R.	1.80 2/	3.99	N.R.	56
	Wetaskiwin	.74	2.34	3.58	52	55
	Camrose	.56	1.76	3.80	52	54
	Stettler	.54	1.33	4.66	56	55
9	Jasper	.44	3.62	2.18	52	54
	Rocky Mountain House	.18	1.61	4.43	50	53
	Springdale	.30	2.52	4.52	52	53
10	Vegreville	1.10	1.51	4.19	59	55
	Vermilion	1.32	2.81	3.62	53	55
	Lloydminster	.58	2.14	3.01	56	55
11	Edmonton	.62	2.57	3.65	55	56
12	Edson	.52	2.18 2/	3.36	52	54
	Whitecourt	.35	1.83	3.94	53	55
13	Elk Point	.30	1.32 2/	3.30	56	55
14	Campsie	.42	1.40	3.69	52	55
	Athabaska	Nil	1.86	3.54	55	55
	Lac La Biche	.10	1.73	3.36	57	55
15	High Prairie	.12	3.28	3.17	56	54
	Wagner	.08	3.22	3.52	54	56
16	Beaverlodge	.22	3.62	2.99	57	54
	Rycroft	.20	3.02 2/	2.14	60	54
	Grand Prairie	.51	3.60	3.45	57	56
	Fairview	.63	3.36	2.48	58	55
17	Fort St. John	.09	3.05	3.20	60	56
ALBERTA AVERAGE		.30	2.02	3.70	54.0	56.3

N.R. No report
1/ Source: Meteorological Service of Canada.
2/ Incomplete: not included in average.

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA
1010505924