


**22-002
no. 4
2006
c. 3**

**Field Crop
Reporting Series
No. 4**



All prices exclude sales tax

Catalogue no. 22-002-XPB is published irregularly in a paper version for CDN \$17.00 per issue or CDN \$95.00 for eight issues.

For release June 22, 2006

**Preliminary estimates of principal field crop areas,
Canada, 2006**

Highlights

Prairie farmers have planted considerably more spring wheat and canola than they had anticipated in March, according to data from the annual June farm survey, which also confirmed a record area for dry field peas.

Data from the June survey, Statistics Canada's largest area survey, comprising 29,600 farmers, revealed some important changes from the March Intentions Survey results released three months earlier when many farmers were not sure what they were going to plant.

Two of the most substantial changes were in spring wheat and canola. Farmers reported they had planted 13.3 million acres in canola by June, up from an original estimate of 11.5 million acres. This put the estimate for canola just shy of last year's 13.4 million acres.

For further information, please contact Client Services, Agriculture Division, Statistics Canada at 1-800-465-1991 or by email: agriculture@statcan.ca

**Série de rapports
sur les grandes cultures
N° 4**

Available electronically on the StatCan INTERNET
and the INTRANET (www.statcan.ca)
Disponible en ligne sur le site StatCan INTERNET et
INTRANET (www.statcan.ca) du StatCan

Les prix n'incluent pas les taxes de vente

N° 22-002-XPB au catalogue, est publié irrégulièrement sur version papier au
coût de 17 \$ CAN le numéro ou 95 \$ CAN pour 8 numéros.

Pour diffusion le 22 juin 2006

**Estimations provisoires de la superficie des principales
grandes cultures, Canada, 2006**

Faits saillants

Les agriculteurs des Prairies ont semé beaucoup plus de blé de printemps et de canola que ce qu'ils avaient prévu en mars, selon les données de l'enquête annuelle sur les fermes de juin, qui a aussi confirmé une superficie record pour les pois secs de grande culture.

Selon les données de l'enquête de juin, la plus grande enquête de Statistique Canada sur les superficies menée auprès de 29 600 agriculteurs, il y a eu des changements importants comparativement aux résultats de l'enquête de mars sur les intentions publiés trois mois plus tôt au moment où de nombreux agriculteurs n'étaient pas certains de ce qu'ils allaient semer.

Deux des changements les plus marquants portent sur le blé de printemps et le canola. Les agriculteurs ont signalé qu'ils avaient semé 13,3 millions d'acres de canola avant la fin de juin, plus que l'estimation originale de 11,5 millions d'acres. L'estimation pour le canola est donc très proche des 13,4 millions d'acres de 2005.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Services à la clientèle, Division de l'agriculture, Statistique Canada au 1 800 465-1991 ou par courriel à : agriculture@statcan.ca



Statistics
Canada

Statistique
Canada

Canada

Spring wheat acreage also rose from the estimate set in March. Farmers reported planting 20.0 million acres compared with the March estimate of 19.5 million acres.

These increases appear to be at the expense of the area Prairie farmers previously allotted to summerfallow.

In Ontario and Quebec, the area planted in grain corn remained relatively unchanged from intentions in March, while soybeans decreased slightly.

Across the West, seeding progress can be described as average with some problems reported due to excessively wet conditions, most notably in northeast Saskatchewan.

Generally adequate moisture conditions and the hint of improving prices combined with escalating costs for fuel and fertilizer provide the framework for the 2006 planting season. In response, Prairie farmers planted increased areas of spring wheat, oats and dry field peas compared with 2005.

Oilseeds: Fractionally less canola but slightly more flaxseed

Prairie farmers reported that they have planted fractionally less canola than they did last year, but slightly more flaxseed.

Farmers estimated they have planted 13.3 million acres in canola, down a marginal 0.7% from the level in 2005. The seeded area remained unchanged in both Manitoba and Alberta. In Saskatchewan, it declined just 1.5% to 6.5 million acres. Acreage in all three areas is all well above the respective 10-year average.

The possibility of improved canola prices appears to be the catalyst for continued above-average areas planted to canola. This was the case in spite of large stocks of canola remaining to be marketed and comparatively high input costs for this crop.

Flaxseed area was up for the second year in a row, rising 1.9% to 2.1 million acres, 40,000 acres more than the area reported in 2005. Producers in Manitoba and Saskatchewan reported increases, while Alberta farmers reported planting 10,000 acres less flaxseed.

La superficie de blé de printemps a aussi augmenté comparativement à l'estimation établie en mars. Les agriculteurs ont déclaré avoir semé 20,0 millions d'acres comparativement aux 19,5 millions d'acres estimées en mars.

Ces augmentations semblent s'être produites au détriment de la superficie que les agriculteurs des Prairies avaient réservée antérieurement à la jachère.

En Ontario et au Québec, la superficie semée en maïs-grain est restée relativement la même que les intentions déclarées en mars, tandis que celle en soya a légèrement diminué.

Dans l'Ouest, on peut dire que la progression de l'ensemencement est moyenne car il y a eu quelques problèmes en raison des conditions excessivement humides, surtout dans le nord-est de la Saskatchewan.

La saison d'ensemencement de 2006 se caractérise par de bonnes conditions d'humidité générales et de la possibilité d'une hausse des prix et, concurremment, par l'augmentation rapide des coûts pour les carburants et les engrains. C'est ainsi que les agriculteurs des Prairies ont semé de plus grandes superficies de blé de printemps, d'avoine et de pois secs de grande culture comparativement à 2005.

Graines oléagineuses : légèrement moins de canola, mais un peu plus de lin

Les agriculteurs des Prairies ont déclaré avoir semé un peu moins de canola que l'an dernier, mais un peu plus de lin.

Les agriculteurs ont estimé qu'ils ont semé 13,3 millions d'acres de canola, légèrement moins (0,7 %) que la superficie en 2005. La superficie ensemencée est restée la même au Manitoba et en Alberta. En Saskatchewan, elle a diminué de seulement 1,5 % à 6,5 millions d'acres. La superficie dans les trois régions est bien au-dessus de la moyenne décennale respective.

La possibilité d'une hausse des prix du canola semble expliquer pourquoi les superficies ensemencées pour le canola sont encore au-dessus de la moyenne. Ce fut le cas malgré les vastes stocks de canola qui restent à vendre et les coûts relativement élevés des facteurs de production pour cette culture.

La superficie en lin a augmenté pour la deuxième année consécutive, avec une hausse de 1,9 % à 2,1 millions d'acres, 40 000 acres de plus que la superficie déclarée en 2005. Les producteurs du Manitoba et de la Saskatchewan ont signalé des augmentations, et ceux de l'Alberta ont dit avoir ensemencé 10 000 acres de moins en lin.

Spring wheat area jumped, durum wheat down

Firming prices appear to have convinced wheat growers to shift from durum wheat and summerfallow into spring wheat. Prairie farmers reported planting 20.0 million acres of spring wheat in total, up 2.5 million acres from the 2005 level. The 10-year average is 19.8 million acres.

Farmers in all three Prairie provinces reported planting more spring wheat. Those in Saskatchewan led the charge, planting an additional 1.9 million acres, followed by Manitoba at 411,000 acres extra and Alberta with 237,000 additional acres.

On the other hand, farmers planted 26.4% less durum, for a total of 4.3 million acres. A lessening of export demand was seen as the main reason for the decline.

Durum acreage fell 25.3% in Saskatchewan and 31.0% in Alberta.

Barley area down, oat area up

Prairie farmers planted 9.4 million acres of barley, down 800,000 acres from the 10.2 million acres seeded in 2005. The area seeded to barley has been in steady decline since the recent peak in 2002 of 11.7 million acres. The 10-year average is 11.1 million acres.

Provincially, the picture is mixed. Saskatchewan and Alberta reported declines of 16.7% and 2.2% respectively from 2005. In Manitoba, farmers reported an 11.1% increase after last year's excessive rain returned the crop to its 10-year average of 1.2 million acres.

The area seeded to oats rose considerably on prospects of increased export demand and feed use. Oat area planted on the Prairies rose 21.9% to 4.9 million acres. The 10-year average is 4.5 million acres.

Provincially, Manitoba reported a 38.9% increase to 1.0 million acres. The area in Saskatchewan rose 25.0% to 2.5 million acres, and in Alberta, it rose 7.7% to 1.4 million acres.

Bond de la superficie de blé de printemps, diminution de celle du blé dur

Le raffermissement des prix semble avoir convaincu les producteurs de blé de remplacer le blé dur et la jachère par du blé de printemps. Les agriculteurs des Prairies ont déclaré avoir semé 20,0 millions d'acres pour le blé de printemps au total, une hausse de 2,5 millions d'acres par rapport au niveau de 2005. La moyenne décennale est de 19,8 millions d'acres.

Les agriculteurs dans les trois provinces des Prairies ont déclaré avoir semé plus de blé de printemps. Ceux de la Saskatchewan sont en tête puisqu'ils ont semé 1,9 million d'acres de plus, suivis par ceux du Manitoba avec 411 000 acres de plus et ceux de l'Alberta avec 237 000 acres de plus.

Par ailleurs, les agriculteurs ont semé 26,4 % moins de blé dur, pour un total de 4,3 millions d'acres. C'est la baisse de la demande à l'exportation qui expliquerait principalement cette diminution.

La superficie de blé dur a diminué de 25,3 % en Saskatchewan et de 31,0 % en Alberta.

Diminution de la superficie d'orge, augmentation de celle d'avoine

Les agriculteurs des Prairies ont semé 9,4 millions d'acres en orge, soit 800 000 acres de moins que les 10,2 millions d'acres semés en 2005. La superficie réservée à l'orge diminue constamment depuis le sommet récent de 2002 avec 11,7 millions d'acres. La moyenne décennale est de 11,1 millions d'acres.

À l'échelon provincial, la situation est diversifiée. La Saskatchewan et l'Alberta ont signalé des baisses de 16,7 % et 2,2 % respectivement comparativement à 2005. Au Manitoba, les agriculteurs ont signalé une hausse de 11,1 % après la pluie excessive de 2005, et ont ainsi ramené la culture à sa moyenne décennale de 1,2 million d'acres.

La superficie ensemencée en avoine a beaucoup augmenté étant donné la perspective d'une demande accrue à l'exportation et pour l'alimentation des animaux. La superficie d'avoine ensemencée dans les Prairies a augmenté de 21,9 % à 4,9 millions d'acres. La moyenne décennale est de 4,5 millions d'acres.

À l'échelon provincial, le Manitoba a signalé une augmentation de 38,9 % à 1,0 million d'acres. La superficie en Saskatchewan a augmenté de 25,0 % à 2,5 millions d'acres et, en Alberta, de 7,7 % à 1,4 million d'acres.

Field pea area a record

Field pea area on the Prairies rose to record territory of 3.5 million acres, breaking the previous record of 3.4 million acres set in 2004.

In Saskatchewan, where over three quarters of all field peas are grown, farmers increased their plantings of field peas by 70,000 acres from 2005 to 2.8 million acres.

Manitoba farmers reported a decline of 37.5% to 75,000 acres, while Alberta reported a 18.9% increase to 660,000 acres.

Ontario and Quebec farmers planted a little more grain corn, fewer soybeans

Grain corn acreage in Ontario and Quebec rose just slightly, with the area planted to corn in Ontario was 1.6 million acres, up 2.5% from 2005. In Quebec, corn acreage is down 1.7% to 1.0 million acres.

Ontario farmers have planted 650,000 acres of genetically modified corn, which represented 40% of the provincial planted area, up from 39% in 2005. Quebec farmers planted 514,000 acres of genetically modified corn, 51% of the province's total, an increase of 7% from 2005. In Quebec, it is the second occurrence of a similar increase year to year, with the first increase being 10% between 2003 and 2004.

Overall, soybean farmers in the two provinces reported that they planted less soybean acreage this year. Ontario farmers reported 2.2 million acres, down 7.5% from 2005. Quebec farmers reported 462,100 acres, unchanged from 2005.

Genetically modified soybeans represented 925,000 acres or 43% of total soybean plantings in Ontario, unchanged percentage from 2005. Quebec farmers planted 195,200 acres or 42% of their acreage, into genetically modified soybeans while in 2005 it was 41% of total plantings.

Sommet pour la superficie de pois de grande culture

La superficie de pois de grande culture dans les Prairies est passée à un chiffre record de 3,5 millions d'acres, pour ainsi fracasser le sommet précédent de 3,4 millions d'acres établi en 2004.

En Saskatchewan, où plus des trois quarts des pois de grande culture sont cultivés, les agriculteurs ont augmenté leurs ensemencements de pois de grande culture de 70 000 acres comparativement à 2005 à 2,8 millions d'acres.

Les agriculteurs du Manitoba ont signalé une diminution de 37,5 % à 75 000 acres, et ceux de l'Alberta, une augmentation de 18,9 % à 660 000 acres.

Les agriculteurs de l'Ontario et du Québec ont semé un peu plus de maïs-grain, moins de soya

La superficie de maïs-grain en Ontario et au Québec a augmenté légèrement. En Ontario, la superficie ensemencée en maïs a augmenté à 1,6 million d'acres, soit 2,5 % de plus qu'en 2005. Au Québec, la superficie de maïs a diminué de 1,7 % à 1,0 million d'acres.

Les agriculteurs de l'Ontario ont semé 650 000 acres de maïs génétiquement modifié, ce qui représente 40 % de la superficie ensemencée dans la province, une hausse comparativement à 39 % en 2005. Les agriculteurs du Québec ont semé 514 000 acres de maïs génétiquement modifié, soit 51 % du total de la province, une augmentation de 7 % comparativement à 2005. Au Québec, il s'agit de la deuxième fois qu'il y a une augmentation semblable une année sur l'autre, la première ayant été de 10 % entre 2003 et 2004.

Dans l'ensemble, les cultivateurs de soya dans les deux provinces ont signalé avoir ensemencé une moindre grande superficie en soya cette année. Les agriculteurs de l'Ontario ont déclaré 2,2 millions d'acres, une baisse de 7,5 % comparativement à 2005. Les agriculteurs du Québec ont déclaré 462 100 acres, la même superficie qu'en 2005.

Le soya génétiquement modifié est cultivé sur 925 000 acres ou 43 % du total des ensemencements de soya en Ontario, le même pourcentage qu'en 2005. Les agriculteurs du Québec ont semé 195 200 acres ou 42 % de leur superficie en soya génétiquement modifié, tandis qu'en 2005, il s'agissait de 41 % de tous les ensemencements.

This publication was prepared under the direction of:

- Dave Burroughs, Head, Crop Reporting Unit
- Dave Roeske, Economist, Crop Reporting Unit

Symbols

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- . not available for any reference period.
- .. not available for a specific reference period.
- ... not applicable.
- 0 true zero or a value rounded to zero
- 0^s value rounded to 0 (zero) where there is a meaningful distinction between true zero and the value that was rounded
- P preliminary .
- R revised .
- X suppressed to meet the confidentiality requirements of the Statistics Act.
- E use with caution.
- F too unreliable to be published.

Signes conventionnels

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- . indisponible pour toute période de référence.
- .. indisponibles pour une période de référence précise.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- 0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
- 0^s valeur arrondie à 0 (zéro) où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie
- P préliminaire
- R rectifié.
- X confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique.
- E à utiliser avec prudence.
- F trop peu fiable pour être publié.

Note of appreciation

Canada owes the success of its statistical system to a long-standing partnership between Statistics Canada, the citizens of Canada, its businesses, governments and other institutions. Accurate and timely statistical information could not be produced without their continued co-operation and goodwill.

Published by authority of the Minister responsible for Statistics Canada.

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population, les entreprises et les administrations canadiennes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques précises et actuelles.

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada.

© Minister of Industry, 2006

All rights reserved. The content of this publication may be reproduced, in whole or in part, and by any means, without further permission from Statistics Canada, subject to the following conditions: that it be done solely for the purposes of private study, research, criticism, review or newspaper summary, and/or for non-commercial purposes; and that Statistics Canada be fully acknowledged as follows: Source (or "Adapted from", if appropriate): Statistics Canada, year of publication, name of product, catalogue number, volume and issue numbers, reference period and page(s). Otherwise, no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form, by any means—electronic, mechanical or photocopy—or for any purposes without prior written permission of Licensing Services, Client Services Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

© Ministre de l'Industrie, 2006

Tous droits réservés. Le contenu de la présente publication peut être reproduit en tout ou en partie, et par quelque moyen que ce soit, sans autre permission de Statistique Canada, sous réserve que la reproduction soit effectuée uniquement à des fins d'étude privée, de recherche, de critique, de compte rendu ou en vue d'en préparer un résumé destiné aux journaux et/ou à des fins non commerciales. Statistique Canada doit être cité comme suit : Source (ou « Adapté de », s'il y a lieu) : Statistique Canada, année de publication, nom du produit, numéro au catalogue, volume et numéro, période de référence et page(s). Autrement, il est interdit de reproduire le contenu de la présente publication, ou de l'emmagasiner dans un système d'extraction, ou de le transmettre sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, reproduction électronique, mécanique, photographique, pour quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable des Services d'octroi de licences, Division des services à la clientèle, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6.

Objectives of the survey

The Crops section of Statistics Canada conducts a series of probability surveys aimed at collecting and disseminating data on seeding intentions, seeded and harvested area, yield, production and stocks for the principal field crops in Canada (published in an annual series of eight reports, Catalogue 22-002-XPB, Nos. 1 to 8).

The survey data published in this report No. 4, deals with the 2006 June seeded area.

Concepts and definitions

This report contains preliminary estimates of producers' seeded area for field crops in the coming crop year, 2006-2007.

Crop categories

Definitions of the crop categories referenced in Report No. 4, Field crop reporting series are listed below.

Major grains: wheat, oats, barley, flaxseed, canola, corn for grain and soybeans.

Coarse grains: oats, barley, rye, corn for grain and mixed grains.

Oilseeds: canola, flaxseed and soybeans.

Special crops: buckwheat, dry peas, dry white beans, coloured beans, lentils, mustard seed, sunflower seed, canary seed and chick peas.

Objectifs de l'enquête

La section des cultures de Statistique Canada mène une série d'enquêtes probabilistes visant la collecte et la diffusion des données sur les intentions d'ensemencement, les superficies ensemencées et récoltées, le rendement, la production et les stocks pour les principales grandes cultures au Canada (publiées dans une série de huit rapports, catalogue 22-002-XPB, nos 1 à 8).

Les données d'enquête publiées dans ce rapport, n° 4, traitent des superficies ensemencées au mois de juin 2006.

Concepts et définitions

Ce rapport contient les estimations provisoires sur les superficies des grandes cultures que les producteurs ont ensemencées au début de l'année récolte 2006-2007.

Catégories de cultures

Les catégories de cultures retrouvées dans le rapport n° 4 de la série de rapports sur les grandes cultures sont définies ci-après.

Principales cultures: blé, avoine, orge, lin, canola, maïs-grain et soya.

Céréales secondaires: avoine, orge, seigle, maïs-grain et céréales mélangées.

Graines oléagineuses: canola, lin et soya.

Cultures spéciales: sarrasin, pois secs, haricots blancs secs, haricots de couleur, lentilles, graines de moutarde, graines de tournesol, graines de l'alpiste des Canaries et les pois chiches.

Methodology and data quality

Survey frame and sample selection

The target population for the June seeded area estimates includes all farms in Canada enumerated in the Census of Agriculture except those on Indian reserves and farms from the Northwest Territories, Yukon and Newfoundland. Institutional farms are also excluded from the target population.

Every five years, the Census of Agriculture collects information on agricultural operations across Canada, including institutional farms, community pastures, Indian reserves, etc. The Census of Agriculture provides a list of farms and their crop areas from which a probability sample for the June seeded area is selected.

Probability surveys can use two types of sampling frames, list and area. In the June seeded area survey, only the list frame is used in sample selection. This list frame is stratified into homogenous groups on the basis of Census characteristics (such as farm size and crop area) and sub-provincial geographic boundaries. A sample of approximately 29,600 farms is drawn from the list frame for the June seeded area survey.

Data collection

Data collection for June seeded area was carried out from May 24 to June 4, 2006.

Data collection for field crop surveys is undertaken using Computer assisted telephone interview (CATI).

Edit and imputation

With the introduction of the CATI system, it is now possible to implement edit procedures as the survey is being completed. Computer programmed edit checks in this system trigger messages which inform telephone interviewers respondents of possible data errors, which can then be corrected immediately. The CATI system significantly reduces the need for subsequent telephone follow-up, thereby reducing respondent burden and survey processing time.

Response rate

Usually by the end of the collection period, 85% of the questionnaires have been fully completed. The refusal rate to the survey is approximately 2 to 5%. The remainder of the sample unaccounted for, can be explained by non-contact. Initial sample weights are adjusted (a process called raising factor adjustment) in cases of total and partial non-response; no imputation is performed for missing values.

Méthodologie et qualité des données

Base de sondage et échantillonnage

La population couverte pour l'enquête sur les superficies ensemencées de juin représente toutes les exploitations agricoles du Canada énumérées dans le Recensement de l'agriculture sauf les fermes institutionnelles, les fermes des réserves indiennes et les fermes des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et de Terre-Neuve.

Chaque cinq ans, le Recensement de l'agriculture recueille l'information sur les exploitations agricoles à travers le Canada, incluant les fermes institutionnelles, les pâturages communautaires, les réserves indiennes, etc. Le Recensement de l'agriculture donne une liste des fermes et de leur superficie en culture à partir de laquelle un échantillon probabiliste pour l'enquête sur les superficies ensemencées de juin a été sélectionné.

Les enquêtes probabilistes peuvent utiliser deux types de bases d'échantillonnage: la base de sondage de type liste et la base aréolaire. Dans l'enquête sur les superficies ensemencées de juin, seulement la base de sondage de type liste est utilisée pour la sélection de l'échantillon. La base de sondage de type liste est stratifiée en groupes homogènes sur la base des caractéristiques du recensement (par exemple: la taille de la ferme et la superficie en culture) et sur les frontières géographiques sous provinciales. Un échantillon d'environ 29 600 fermes a été tiré de la base liste pour l'enquête sur les superficies ensemencées de juin.

Collecte des données

La collecte des données pour l'enquête de juin sur les superficies ensemencées a eu lieu du 24 mai au 4 juin 2006.

La collecte des données pour les enquêtes sur les grandes cultures est faite sur le système "Interviews téléphoniques assistés par ordinateur" (ITAO).

Vérification et imputation

Avec l'introduction du système ITAO, il est maintenant possible d'exécuter des procédures de vérification au moment même de l'enquête. Les programmes informatiques de vérification de ce système donnent des messages qui informent les interviewers au téléphone sur la possibilité d'erreurs de données, lesquelles peuvent être corrigées immédiatement. Le système ITAO réduit significativement le besoin d'un suivi téléphonique, diminuant ainsi le fardeau des répondants et la durée du traitement de l'enquête.

Taux de réponse

Habituellement, à la fin de la collecte des données, 85 % des questionnaires ont été complètement remplis. Le taux de refus des enquêtes est approximativement de 2 à 5 %. La différence entre le taux de questionnaires remplis et le taux de refus peut être expliquée par les cas de non contact et de non-réponse. Les facteurs de pondération théorique sont ajustés par un processus appelé ajustement des facteurs de pondération dans les cas de non-réponse partielle ou totale. Aucune imputation n'est effectuée pour les données manquantes.

Sampling and non-sampling errors

The statistics contained in this publication are based on a random sample of agricultural operations and, as such, are subject to sampling and non-sampling errors. The overall quality of the estimates depends on the combined effect of these two types of errors.

Sampling errors arise because estimates are derived from sample data and not the entire population. These errors depend on factors such as sample size, sampling design and the method of estimation. An important feature of probability sampling is that sampling errors can be measured from the sample itself.

Non-sampling errors are errors which are not related to sampling and may occur throughout the survey operation for many reasons. For example, non-response is an important source of non-sampling error. Coverage, differences in the interpretation of questions, incorrect information from respondents, mistakes in recording, coding and processing of data are other examples of non-sampling errors.

Estimation

The survey data collected are weighted in order to produce level indicators which are representative of the population. These level indicators then undergo a validation process, based on subject matter analysis and consultation with provincial statisticians, before a final estimate is published.

Revisions

The June seeded area estimates contained in this publication are preliminary estimates and consequently are subject to revision. Seeded areas will be finalized for the crop year in the November crop report.

The following table contains some statistics which indicate the magnitude and direction of past revisions to the June seeded area. The magnitude is measured by the average percent change between the preliminary and final estimates. The direction of revisions is indicated by counting the number of years that the preliminary estimate is above or below the final revised estimate.

The data indicate, for example, that the preliminary estimates of June seeded area for barley are revised by a magnitude of, on average, 1.7% and usually in a downwards direction.

Erreurs d'échantillonnage et non liées à l'échantillonnage

Les statistiques contenues dans cette publication sont basées sur un échantillon d'exploitations agricoles tiré au hasard et, comme telles, sont sujettes à des erreurs d'échantillonnage et non liées à l'échantillonnage. La qualité globale des estimations dépend ainsi de l'effet combiné de ces deux types d'erreur.

Les erreurs d'échantillonnage augmentent parce que les estimations sont dérivées des données d'un échantillon et non de la population totale. Ces erreurs dépendent de facteurs tels que la taille de l'échantillon, le plan d'échantillonnage et la méthode d'estimation. Une caractéristique importante de l'échantillonnage probabiliste est que les erreurs d'échantillonnage peuvent être mesurées à partir de l'échantillon lui-même.

Les erreurs non liées à l'échantillonnage sont des erreurs qui surviennent au cours de la réalisation de l'enquête pour différentes raisons. Par exemple, la non-réponse est une source importante d'erreur. La couverture, la différence dans l'interprétation des questions, les informations incorrectes fournies par les répondants, les erreurs d'enregistrement, la codification et le traitement des données sont d'autres exemples d'erreurs non liées à l'échantillonnage.

Estimation

Les données recueillies sont pondérées pour produire des indicateurs de niveau représentatifs de la population. Ces indicateurs de niveau sont alors soumis à un processus de validation basé sur une analyse faite par des spécialistes et sur la consultation avec les statisticiens provinciaux avant qu'une estimation finale soit publiée.

Révisions

Les estimations des superficies ensemencées de juin contenues dans cette publication sont des estimations provisoires et par conséquent, sujettes à des révisions. Les estimations finales des superficies ensemencées durant l'année récolte seront publiées dans le rapport de novembre.

Le tableau suivant indique la magnitude et la direction des révisions des estimations de la superficie ensemencée de juin. La magnitude de ces changements est mesurée par le pourcentage moyen de variation entre les estimations provisoires et finales. La direction des révisions est mesurée par le nombre d'années que l'estimation préliminaire est en-dessous ou au-dessus de l'estimation finale révisée.

Les données indiquent, par exemple, que les estimations préliminaires des superficies ensemencées de juin pour l'orge sont révisées, en moyenne, dans une magnitude de 1.7 % et habituellement à la baisse.

Magnitude and direction of past revisions to June seeded area estimates, Canada, 1995 to 2005
Magnitude et direction des révisions des estimations de la superficie ensemencée en juin, Canada, 1995 à 2005

| Crop – Culture | Average % change | Number of years June seeded areas are revised: | | |
|-----------------------------|---------------------|--|--------------------------|---|
| | | Nombre d'années où la superficie ensemencée en juin est révisée: | | |
| | | Upwards À la hausse | Downwards À la baisse | |
| Wheat – Blé | 1.7 | 6 | | 5 |
| Barley – Orge | 1.7 | 3 | | 8 |
| Flaxseed – Lin | 3.5 | 4 | | 5 |
| Canola | 1.7 | 5 | | 6 |
| Corn for grain – Maïs-grain | 1.2 | 8 | | 2 |
| Soybeans – Soya | 1.3 | 6 | | 5 |
| Summerfallow – Jachère | 3.1 | 5 | | 3 |

Data quality

The June seeded area estimates are based on level indicators obtained from a probability survey of farming operations. The potential error introduced by sampling can be estimated from the sample itself by using a statistical measure called the coefficient of variation (c.v.). Over repeated surveys, 95 times out of 100, the relative difference between a sample estimate and what should have been obtained from an enumeration of all farming operations would be less than twice the coefficient of variation. This range of values is referred to as the confidence interval. While published estimates may not exactly equal the level indicators (due to the validation and consultation process), these estimates do remain within the confidence interval of the survey level indicators.

For the June seeded area survey, coefficient of variations at the Canada level range from 1% to 5% for the major crops. Coefficients of variation for specialty crops and small areas of major crops are usually within 5% to 15%.

Qualité des données

Les estimations des superficies ensemencées sont basées sur des indicateurs de niveau obtenus à partir d'une enquête probabiliste sur les exploitations agricoles. L'erreur potentielle introduite par l'échantillonnage peut être calculée à partir de l'échantillon en utilisant une mesure statistique appelée le coefficient de variation (c.v.). Pour un échantillonnage répété, les chances sont de 95 % que la différence relative entre l'estimation de l'échantillon et ce qui aurait été obtenu d'une énumération de toutes les exploitations agricoles, serait moins que le double du coefficient de variation. Cet ensemble de valeur acceptable est appelé intervalle de confiance. Cependant, les estimations publiées peuvent ne pas être les mêmes que les indicateurs de niveau (dû à la validation et au processus de consultation). Ces estimations demeurent, toutefois, à l'intérieur de l'intervalle de confiance de l'indicateur de niveau de l'enquête.

Pour l'enquête de juin sur les superficies ensemencées, les coefficients de variation au niveau canadien vont de 1 % à 5 % pour les cultures principales. Les coefficients de variation pour les cultures spécialisées et les petites régions de cultures principales sont habituellement entre 5 % et 15 %.

For the different types of special crops, the estimates contained in this publication have been assigned a letter to indicate their C.V. (expressed as a percentage). The letter grades represent the following C.V. ranges:

CV rating system for special crops

| CV Range | Symbol | Meaning |
|------------------|--------|---------------------------|
| 0.00% to 4.99% | A | Excellent |
| 5.00% to 9.99% | B | Very good |
| 10.00% to 14.99% | C | Good |
| 15.00% to 24.99% | D | Use with caution |
| 25.00% and more | F | Too unreliable to publish |

Data confidentiality

Data confidentiality is ensured under the Statistics Act, which prohibits the divulging of individual or aggregated data where individuals or businesses might be identified.

Standards of service to the public

Statistics Canada is committed to serving its clients in a prompt, reliable and courteous manner and in the official language of their choice. To this end, the Agency has developed standards of service which its employees observe in serving its clients. To obtain a copy of these service standards, please contact Statistics Canada toll free at 1 800 263-1136.

The paper used in this publication meets the minimum requirements of American National Standard for Information Sciences - Permanence of Paper for Printed Library Materials, ANSI Z39.48 - 1984.



Pour les différentes catégories des cultures spéciales, on a attribué aux estimations contenues dans la présente publication une lettre qui indique leur C.V. (en pourcentage). Les cotes alphabétiques représentent les intervalles de C.V. suivants :

Système de cotation des CV pour les cultures spéciales

| Intervalle du CV | Signe | Signification |
|-------------------|-------|----------------------------------|
| 0,00 % à 4,99 % | A | Excellent |
| 5,00 % à 9,99 % | B | Très bon |
| 10,00 % à 14,99 % | C | Bon |
| 15,00 % à 24,99 % | D | À utiliser avec prudence |
| 25,00 % et plus | F | Trop peu fiable pour être publié |

Confidentialité des données

La confidentialité des données est assujettie à la Loi de la Statistique qui interdit la divulgation de données individuelles et agrégées quand des individus ou des entreprises pourraient être identifiés.

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois, et ce, dans la langue officielle de leur choix. À cet égard, notre organisme s'est doté de normes de service à la clientèle qui doivent être observées par les employés lorsqu'ils offrent des services à la clientèle. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1 800 263-1136.

Le papier utilisé dans la présente publication répond aux exigences minimales de "American National Standard for Information Sciences" - "Permanence of Paper for Printed Library Materials", ANSI Z39.48 - 1984.



Table 1 June preliminary estimates of crop areas, Canada, 2005 and 2006
Tableau 1 Estimations provisoires de juin de la superficie des cultures, Canada 2005 et 2006

| Province and crop Province et culture | Seeded area Superficie ensemencée | | Area as a % of 2005 Superficie en % de 2005 | Seeded area Superficie ensemencée | |
|---|--------------------------------------|-----------------|--|--------------------------------------|-----------------|
| | 2005 | 2006 | | 2005 | 2006 |
| | '000 hectares | | % | '000 acres | |
| Canada | | | | | |
| Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹ | 507.2 | 731.5 | 144.2 | 1,253.4 | 1,807.7 |
| Spring wheat - Blé de printemps | 7,245.6 | 8,265.6 | 114.1 | 17,905.0 | 20,424.4 |
| Durum wheat - Blé dur | 2,341.2 | 1,723.9 | 73.6 | 5,785.0 | 4,260.0 |
| All wheat - Tout blé | 10,094.0 | 10,721.0 | 106.2 | 24,943.4 | 26,492.1 |
| Oats - Avoine | 1,853.3 | 2,203.9 | 118.9 | 4,579.5 | 5,445.9 |
| Barley - Orge | 4,440.0 | 4,090.5 | 92.1 | 10,971.8 | 10,107.9 |
| Fall rye ¹ - Seigle d'automne ¹ | 166.6 | 148.1 | 88.9 | 411.5 | 365.9 |
| Flaxseed ² - Lin ² | 841.8 | 857.9 | 101.9 | 2,080.0 | 2,120.0 |
| Canola | 5,491.3 | 5,419.7 | 98.7 | 13,569.6 | 13,392.4 |
| Corn for grain - Maïs-grain | 1,124.2 | 1,135.2 | 101.0 | 2,778.0 | 2,805.2 |
| Soybeans - Soya | 1,176.4 | 1,209.7 | 102.8 | 2,907.1 | 2,989.1 |
| Mixed grains - Céréales mélangées | 208.8 | 231.6 | 110.9 | 516.3 | 572.2 |
| Dry peas - Pois secs | 1,365.7 | 1,420.0 | 104.0 | 3,375.0 | 3,509.0 |
| Dry white beans - Haricots blancs secs | 76.9 | 66.8 | 86.9 | 190.0 | 165.0 |
| Coloured beans - Haricots de couleur | 120.1 | 102.4 | 85.3 | 297.3 | 252.8 |
| Fodder corn - Maïs fourrager | 219.8 | 240.8 | 109.6 | 543.2 | 595.1 |
| Summerfallow - Jachère | 4,111.0 | 3,765.0 | 91.6 | 10,160.0 | 9,305.0 |
| Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard | | | | | |
| Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹ | 3.2 | 2.8 | 87.5 | 8.0 | 7.0 |
| Spring wheat - Blé de printemps | 11.7 | 12.1 | 103.4 | 29.0 | 30.0 |
| All wheat - Tout blé | 14.9 | 14.9 | 100.0 | 37.0 | 37.0 |
| Oats - Avoine | 3.6 | 4.5 | 125.0 | 9.0 | 11.0 |
| Barley - Orge | 38.4 | 36.4 | 94.8 | 95.0 | 90.0 |
| Soybeans - Soya | 4.0 | 4.9 | 122.5 | 10.0 | 12.0 |
| Mixed grains - Céréales mélangées | 5.7 | 5.7 | 100.0 | 14.0 | 14.0 |
| Nova Scotia - Nouvelle-Écosse | | | | | |
| Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹ | 1.8 | 3.4 | 188.9 | 4.5 | 8.5 |
| Spring wheat - Blé de printemps | 1.2 | 0.8 | 66.7 | 3.0 | 2.0 |
| All wheat - Tout blé | 3.0 | 4.2 | 140.0 | 7.5 | 10.5 |
| Oats - Avoine | 2.0 | 1.6 | 80.0 | 5.0 | 4.0 |
| Barley - Orge | 3.2 | 2.8 | 87.5 | 8.0 | 7.0 |
| Corn for grain - Maïs-grain | 3.0 | 2.8 | 93.3 | 7.5 | 7.0 |
| Fodder Corn - Maïs fourrager | 2.8 | 3.6 | 128.6 | 7.0 | 9.0 |
| New Brunswick - Nouveau-Brunswick | | | | | |
| Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹ | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 1.0 | 1.0 |
| Spring wheat - Blé de printemps | 2.0 | 1.6 | 80.0 | 5.0 | 4.0 |
| All wheat - Tout blé | 2.4 | 2.0 | 83.3 | 6.0 | 5.0 |
| Oats - Avoine | 7.7 | 6.9 | 89.6 | 19.0 | 17.0 |
| Barley - Orge | 15.0 | 13.8 | 92.0 | 37.0 | 34.0 |
| Mixed grains - Céréales mélangées | 1.2 | 0.8 | 66.7 | 3.0 | 2.0 |
| Fodder corn - Maïs fourrager | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 5.0 | 5.0 |

See footnotes at end of table 1. - Voir notes à la fin du tableau 1.

Table 1 June preliminary estimates of crop areas, Canada, 2005 and 2006 (continued)
Tableau 1 Estimations provisoires de juin de la superficie des cultures, Canada 2005 et 2006 (suite)

| Province and crop Province et culture | Seeded area Superficie ensemencée | | Area as a % of 2005 Superficie en % de 2005 | Seeded area Superficie ensemencée | |
|---|--------------------------------------|----------------|--|--------------------------------------|----------------|
| | 2005 | 2006 | | 2005 | 2006 |
| | '000 hectares | % | | '000 acres | |
| Quebec - Québec | | | | | |
| Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹ | 2.0 | 2.5 | 125.0 | 4.9 | 6.2 |
| Spring wheat - Blé de printemps | 53.0 | 56.0 | 105.7 | 131.0 | 138.4 |
| All wheat - Tout blé | 55.0 | 58.5 | 106.4 | 135.9 | 144.6 |
| Oats - Avoine | 120.0 | 125.0 | 104.2 | 296.5 | 308.9 |
| Barley - Orge | 112.0 | 106.0 | 94.6 | 276.8 | 261.9 |
| Fall rye ¹ - Seigle d'automne ¹ | 0.6 | 2.0 | 333.3 | 1.5 | 4.9 |
| Canola | 14.0 | 5.0 | 35.7 | 34.6 | 12.4 |
| Corn for grain - Maïs-grain | 415.0 | 408.0 | 98.3 | 1,025.5 | 1,008.2 |
| Corn for grain GM - Maïs-grain GM | 182.5 | 208.0 | 114.0 | 451.0 | 514.0 |
| Soybeans - Soya | 187.0 | 187.0 | 100.0 | 462.1 | 462.1 |
| Soybeans GM - Soya GM | 77.0 | 79.0 | 102.6 | 190.3 | 195.2 |
| Mixed grains - Céréales mélangées | 24.0 | 28.0 | 116.7 | 59.3 | 69.2 |
| Total beans - Total des haricots | 8.2 | 8.0 | 97.6 | 20.3 | 19.8 |
| Fodder corn - Maïs fourrager | 45.0 | 47.0 | 104.4 | 111.2 | 116.1 |
| Ontario | | | | | |
| Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹ | 335.9 | 435.0 | 129.5 | 830.0 | 1,075.0 |
| Spring wheat - Blé de printemps | 62.7 | 64.7 | 103.2 | 155.0 | 160.0 |
| All wheat - Tout blé | 398.6 | 499.7 | 125.4 | 985.0 | 1,235.0 |
| Oats - Avoine | 50.6 | 46.5 | 91.9 | 125.0 | 115.0 |
| Barley - Orge | 107.2 | 95.1 | 88.7 | 265.0 | 235.0 |
| Fall rye ¹ - Seigle d'automne ¹ | 24.3 | 28.3 | 116.5 | 60.0 | 70.0 |
| Canola | 20.2 | 6.1 | 30.2 | 50.0 | 15.0 |
| Corn for grain - Maïs-grain | 647.5 | 663.7 | 102.5 | 1,600.0 | 1,640.0 |
| Corn for grain GM - Maïs-grain GM | 252.9 | 263.0 | 104.0 | 625.0 | 650.0 |
| Soybeans - Soya | 940.9 | 870.1 | 92.5 | 2,325.0 | 2,150.0 |
| Soybeans GM - Soya GM | 404.7 | 374.3 | 92.5 | 1,000.0 | 925.0 |
| Mixed grains - Céréales mélangées | 64.7 | 64.7 | 100.0 | 160.0 | 160.0 |
| Dry white beans - Haricots blancs secs | 36.4 | 34.4 | 94.5 | 90.0 | 85.0 |
| Coloured beans - Haricots de couleur | 40.5 | 30.4 | 75.1 | 100.0 | 75.0 |
| Fodder corn - Maïs fourrager | 117.4 | 119.4 | 101.7 | 290.0 | 295.0 |
| Manitoba | | | | | |
| Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹ | 40.5 | 127.5 | 314.8 | 100.0 | 315.0 |
| Spring wheat - Blé de printemps | 1,135.0 | 1,301.6 | 114.7 | 2,805.0 | 3,216.0 |
| All wheat - Tout blé | 1,181.6 | 1,429.1 | 120.9 | 2,920.0 | 3,531.0 |
| Oats - Avoine | 291.4 | 404.7 | 138.9 | 720.0 | 1,000.0 |
| Barley - Orge | 364.2 | 404.7 | 111.1 | 900.0 | 1,000.0 |
| Fall rye ¹ - Seigle d'automne ¹ | 22.3 | 32.4 | 145.3 | 55.0 | 80.0 |
| Flaxseed ² - Lin ² | 153.8 | 161.9 | 105.3 | 380.0 | 400.0 |
| Canola | 1,011.7 | 1,011.7 | 100.0 | 2,500.0 | 2,500.0 |
| Corn for grain - Maïs-grain | 56.7 | 60.7 | 107.1 | 140.0 | 150.0 |
| Soybeans - Soya | 44.5 | 147.7 | 331.9 | 110.0 | 365.0 |
| Mixed grains - Céréales mélangées | 4.0 | 10.1 | 252.5 | 10.0 | 25.0 |
| Dry peas - Pois secs | 48.5 | 30.3 | 62.5 | 120.0 | 75.0 |
| Dry white beans - Haricots blancs secs | 40.5 | 32.4 | 80.0 | 100.0 | 80.0 |
| Coloured beans - Haricots de couleur | 46.4 | 40.5 | 87.3 | 115.0 | 100.0 |
| Buckwheat - Sarrasin | 4.0 | 8.1 | 202.5 | 10.0 | 20.0 |
| Sunflower seeds - Graines de tournesol | 80.9 | 70.8 | 87.5 | 200.0 | 175.0 |
| Canary seed - Alpiste des Canaries | 8.1 | 4.0 | 49.4 | 20.0 | 10.0 |
| Fodder corn - Maïs fourrager | 28.3 | 32.4 | 114.5 | 70.0 | 80.0 |
| Summerfallow - Jachère | 647.0 | 129.0 | 19.9 | 1,600.0 | 320.0 |

See footnotes at end of table 1. - Voir notes à la fin du tableau 1.

Table 1 June preliminary estimates of crop areas, Canada, 2005 and 2006 (continued)

Tableau 1 Estimations provisoires de juin de la superficie des cultures, Canada 2005 et 2006 (suite)

| Province and crop Province et culture | Seeded area Superficie ensemencée | | Area as a % of 2005 Superficie en % de 2005 | Seeded area Superficie ensemencée | |
|---|--------------------------------------|----------------|--|--------------------------------------|-----------------|
| | 2005 | 2006 | | 2005 | 2006 |
| | '000 hectares | % | | '000 acres | |
| Saskatchewan | | | | | |
| Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹ | 72.8 | 111.3 | 152.9 | 180.0 | 275.0 |
| Spring wheat - Blé de printemps | 3,638.1 | 4,393.0 | 120.7 | 8,990.0 | 10,855.0 |
| Durum wheat - Blé dur | 1,983.0 | 1,481.1 | 74.7 | 4,900.0 | 3,660.0 |
| All wheat - Tout blé | 5,693.9 | 5,985.4 | 105.1 | 14,070.0 | 14,790.0 |
| Oats - Avoine | 809.4 | 1,011.7 | 125.0 | 2,000.0 | 2,500.0 |
| Barley - Orge | 1,942.5 | 1,618.7 | 83.3 | 4,800.0 | 4,000.0 |
| Fall rye ¹ - Seigle d'automne ¹ | 78.9 | 58.7 | 74.4 | 195.0 | 145.0 |
| Flaxseed ² - Lin ² | 655.6 | 667.7 | 101.8 | 1,620.0 | 1,650.0 |
| Canola | 2,670.9 | 2,630.5 | 98.5 | 6,600.0 | 6,500.0 |
| Mixed grains - Céréales mélangées | 16.2 | 26.3 | 162.3 | 40.0 | 65.0 |
| Dry peas - Pois secs | 1,090.6 | 1,119.0 | 102.6 | 2,695.0 | 2,765.0 |
| Lentils - Lentilles | 874.1 | 586.8 | 67.1 | 2,160.0 | 1,450.0 |
| Mustard seed - Graines de moutarde | 180.1 | 113.4 | 63.0 | 445.0 | 280.0 |
| Canary seed - Alpiste des Canaries | 182.1 | 121.4 | 66.7 | 450.0 | 300.0 |
| Chickpeas - Pois chiches | 66.7 | 125.4 | 188.0 | 165.0 | 310.0 |
| Triticale | 26.3 | 28.3 | 107.6 | 65.0 | 70.0 |
| Summerfallow - Jachère | 2,550.0 | 2,732.0 | 107.1 | 6,300.0 | 6,750.0 |
| Alberta | | | | | |
| Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹ | 50.6 | 48.6 | 96.0 | 125.0 | 120.0 |
| Spring wheat - Blé de printemps | 2,321.7 | 2,417.6 | 104.1 | 5,737.0 | 5,974.0 |
| Durum wheat - Blé dur | 352.1 | 242.8 | 69.0 | 870.0 | 600.0 |
| All wheat - Tout blé | 2,724.4 | 2,709.0 | 99.4 | 6,732.0 | 6,694.0 |
| Oats - Avoine | 526.1 | 566.6 | 107.7 | 1,300.0 | 1,400.0 |
| Barley - Orge | 1,821.1 | 1,780.6 | 97.8 | 4,500.0 | 4,400.0 |
| Fall rye ¹ - Seigle d'automne ¹ | 40.5 | 26.3 | 64.9 | 100.0 | 65.0 |
| Flaxseed ² - Lin ² | 32.4 | 28.3 | 87.3 | 80.0 | 70.0 |
| Canola | 1,740.1 | 1,740.1 | 100.0 | 4,300.0 | 4,300.0 |
| Mixed grains - Céréales mélangées | 89.0 | 91.1 | 102.4 | 220.0 | 225.0 |
| Dry peas - Pois secs | 224.6 | 267.1 | 118.9 | 555.0 | 660.0 |
| Coloured beans - Haricots de couleur | 25.0 | 23.5 | 94.0 | 62.0 | 58.0 |
| Mustard seed - Graines de moutarde | 32.3 | 26.3 | 81.4 | 80.0 | 65.0 |
| Chickpeas - Pois chiches | 12.1 | 18.2 | 150.4 | 30.0 | 45.0 |
| Fodder corn - Maïs fourrager | 18.2 | 24.3 | 133.5 | 45.0 | 60.0 |
| Sugar beets - Betteraves à sucre | 13.8 | 13.8 | 100.0 | 34.0 | 34.0 |
| Triticale | 26.3 | 24.3 | 92.4 | 65.0 | 60.0 |
| Summerfallow - Jachère | 890.0 | 870.0 | 97.8 | 2,200.0 | 2,150.0 |

See footnotes at end of table 1. - Voir notes à la fin du tableau 1.

Table 1 June preliminary estimates of crop areas, Canada, 2005 and 2006 (concluded)
Tableau 1 Estimations provisoires de juin de la superficie des cultures, Canada 2005 et 2006 (fin)

| Province and crop Province et culture | Seeded area Superficie ensemencée | | Area as a % of 2005 Superficie en % de 2005 | Seeded area Superficie ensemencée | |
|---|--------------------------------------|------------------|--|--------------------------------------|------------------|
| | 2005 | 2006 | | 2005 | 2006 |
| | '000 hectares | % | | '000 acres | |
| British Columbia - Colombie-Britannique | | | | | |
| Spring wheat - Blé de printemps | 20.2 | 18.2 | 90.1 | 50.0 | 45.0 |
| Oats - Avoine | 42.5 | 36.4 | 85.6 | 105.0 | 90.0 |
| Barley - Orge | 36.4 | 32.4 | 89.0 | 90.0 | 80.0 |
| Canola | 34.4 | 26.3 | 76.5 | 85.0 | 65.0 |
| Mixed grains - Céréales mélangées | 4.0 | 4.9 | 122.5 | 10.0 | 12.0 |
| Dry peas - Pois secs | 2.0 ¹ | 3.6 ¹ | 182.1 | 5.0 ¹ | 9.0 ¹ |
| Fodder corn - Maïs fourrager | 6.1 | 12.1 | 198.4 | 15.0 | 30.0 |
| Summerfallow - Jachère | 24.0 | 34.0 | 141.7 | 60.0 | 85.0 |
| Western Canada³ - Ouest du Canada³ | | | | | |
| Winter wheat ¹ - Blé d'hiver ¹ | 163.9 | 287.4 | 175.4 | 405.0 | 710.0 |
| Spring wheat - Blé de printemps | 7,115.0 | 8,130.4 | 114.3 | 17,582.0 | 20,090.0 |
| Durum wheat - Blé dur | 2,341.2 | 1,723.9 | 73.6 | 5,785.0 | 4,260.0 |
| All wheat - Tout blé | 9,620.1 | 10,141.7 | 105.4 | 23,772.0 | 25,060.0 |
| Oats - Avoine | 1,669.4 | 2,019.4 | 121.0 | 4,125.0 | 4,990.0 |
| Barley - Orge | 4,164.2 | 3,836.4 | 92.1 | 10,290.0 | 9,480.0 |
| Fall rye ¹ - Seigle d'automne ¹ | 141.7 | 117.8 | 83.1 | 350.0 | 291.0 |
| Flaxseed ² - Lin ² | 841.8 | 857.9 | 101.9 | 2,080.0 | 2,120.0 |
| Canola | 5,457.1 | 5,408.6 | 99.1 | 13,485.0 | 13,365.0 |
| Dry peas - Pois secs | 1,365.7 | 1,420.0 | 104.0 | 3,375.0 | 3,509.0 |
| Summerfallow - Jachère | 4,111.0 | 3,765.0 | 91.6 | 10,160.0 | 9,305.0 |

1. The area remaining in June after winterkill. - La superficie restante en juin, après l'hiver.

2. Excludes solin. - Exclut le solin.

3. Western Canada includes Manitoba, Saskatchewan, Alberta and British Columbia. - L'Ouest canadien inclut le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie-Britannique.

Table 2 June preliminary estimates of spring wheat crop area by type, in Western Canada, 2005 and 2006

Tableau 2 Estimations provisoires de juin de la superficie du blé de printemps par catégorie dans l'Ouest du Canada, 2005 et 2006

| Province and crop Province et culture | Seeded area Superficie ensemencée | | Area as a % of 2005 Superficie en % de 2005 | Seeded area Superficie ensemencée | |
|--|--------------------------------------|----------------|--|--------------------------------------|-----------------|
| | 2005 | 2006 | | 2005 | 2006 |
| | '000 hectares | | % | '000 acres | |
| Manitoba | | | | | |
| Hard Red Spring Wheat - Blé dur roux de printemps | 971.2 | 1,214.1 | 125.0 | 2,400.0 | 3,000.0 |
| Prairie Spring Wheat - Blé de printemps des prairies | 70.8 | 48.6 | 68.6 | 175.0 | 120.0 |
| Soft White Spring Wheat - Blé tendre blanc de printemps | 4.0 | 2.4 | 60.0 | 10.0 | 6.0 |
| Canadian Western Extra-Strong - Blé fort roux de l'Ouest | 8.1 | 6.1 | 75.3 | 20.0 | 15.0 |
| Other - Autres | 80.9 | 30.4 | 37.6 | 200.0 | 75.0 |
| Spring Wheat - Total - Blé de printemps | 1,135.0 | 1,301.6 | 114.7 | 2,805.0 | 3,216.0 |
| Saskatchewan | | | | | |
| Hard Red Spring Wheat - Blé dur roux de printemps | 3,237.5 | 4,046.9 | 125.0 | 8,000.0 | 10,000.0 |
| Prairie Spring Wheat - Blé de printemps des prairies | 230.7 | 206.4 | 89.5 | 570.0 | 510.0 |
| Soft White Spring Wheat - Blé tendre blanc de printemps | 4.0 | 6.1 | 152.5 | 10.0 | 15.0 |
| Canadian Western Extra-Strong - Blé fort roux de l'Ouest | 36.4 | 56.7 | 155.8 | 90.0 | 140.0 |
| Other - Autres | 129.5 | 76.9 | 59.4 | 320.0 | 190.0 |
| Spring Wheat - Total - Blé de printemps | 3,638.1 | 4,393.0 | 120.7 | 8,990.0 | 10,855.0 |
| Alberta | | | | | |
| Hard Red Spring Wheat - Blé dur roux de printemps | 2,003.2 | 2,076.0 | 103.6 | 4,950.0 | 5,130.0 |
| Prairie Spring Wheat - Blé de printemps des prairies | 165.9 | 170.0 | 102.5 | 410.0 | 420.0 |
| Soft White Spring Wheat - Blé tendre blanc de printemps | 15.0 | 13.8 | 92.0 | 37.0 | 34.0 |
| Canadian Western Extra-Strong - Blé fort roux de l'Ouest | 48.6 | 76.9 | 158.2 | 120.0 | 190.0 |
| Other - Autres | 89.0 | 80.9 | 90.9 | 220.0 | 200.0 |
| Spring Wheat - Total - Blé de printemps | 2,321.7 | 2,417.6 | 104.1 | 5,737.0 | 5,974.0 |
| British Columbia - Colombie-Britannique | | | | | |
| Hard Red Spring Wheat - Blé dur roux de printemps | 16.2 | 16.2 | 100.0 | 40.0 | 40.0 |
| Prairie Spring Wheat - Blé de printemps des prairies | 3.2 | 0 | | 8.0 | 0 |
| Soft White Spring Wheat - Blé tendre blanc de printemps | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Canadian Western Extra-Strong - Blé fort roux de l'Ouest | 0 | 1.6 | | 0 | 4.0 |
| Other - Autres | 0.8 | 0.4 | 50.0 | 2.0 | 1.0 |
| Spring Wheat - Total - Blé de printemps | 20.2 | 18.2 | 90.1 | 50.0 | 45.0 |
| Western Canada - l'Ouest du Canada | | | | | |
| Hard Red Spring Wheat - Blé dur roux de printemps | 6,228.1 | 7,353.2 | 118.1 | 15,390.0 | 18,170.0 |
| Prairie Spring Wheat - Blé de printemps des prairies | 470.6 | 425.0 | 90.3 | 1,163.0 | 1,050.0 |
| Soft White Spring Wheat - Blé tendre blanc de printemps | 23.0 | 22.3 | 97.0 | 57.0 | 55.0 |
| Canadian Western Extra-Strong - Blé fort roux de l'Ouest | 93.1 | 141.3 | 151.8 | 230.0 | 349.0 |
| Other - Autres | 300.2 | 188.6 | 62.8 | 742.0 | 466.0 |
| Spring Wheat - Total - Blé de printemps | 7,115.0 | 8,130.4 | 114.3 | 17,582.0 | 20,090.0 |

Table 3 June preliminary estimates of special crop areas by province and type, 2005 and 2006

Tableau 3 Estimations provisoires de juin de la superficie des cultures spéciales par province et catégorie, 2005 et 2006

| Province and crop | Seeded area Superficie ensemencée | C.V. range ⁴ Intervalle du C.V. ⁴ | Seeded area Superficie ensemencée | C.V. range ⁴ Intervalle du C.V. ⁴ | Area as a % of 2005 Superficie en % de 2005 | Seeded area Superficie ensemencée | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|----------------|--|--|
| | 2005 | | 2006 | | | 2005 | | | |
| | '000 hectares | | | | | 2006 | | | |
| Quebec - Québec | | | | | | | | | |
| Dry white beans - Haricots blancs secs | F | F | F | F | ... | F | F | | |
| Coloured beans - Haricots de couleur | 8.2 | D | 8.0 | D | 97.6 | 20.3 | 19.8 | | |
| Black beans - Haricots noirs | F | F | F | F | ... | F | F | | |
| Cranberry beans - Haricots canneberge | 6.3 | D | 2.6 | D | 41.3 | 15.6 | 6.4 | | |
| Dark red kidney - Rognons rouge foncé | 0 ^s | F | F | F | ... | 0 ^s | F | | |
| Fababeans - Féveroles | 0 ^s | F | F | F | ... | 0 ^s | F | | |
| Great Northern - Great Northern | 0 ^s | F | 0 ^s | F | ... | 0 ^s | 0 ^s | | |
| Light red kidney - Rognons rouge pâle | F | F | 0 | ... | ... | F | 0 | | |
| Pinto beans - Haricots Pinto | F | F | 0 | ... | ... | F | 0 | | |
| Small red beans - Petits haricots rouges | F | F | 0 | ... | ... | F | 0 | | |
| Other dry beans - Autres haricots secs | F | F | F | F | ... | F | F | | |
| All beans - Total des haricots | 8.2 | D | 8.0 | D | 97.6 | 20.3 | 19.8 | | |
| Ontario | | | | | | | | | |
| Dry white beans - Haricots blancs secs | 36.4 | B | 34.4 | B | 94.5 | 90.0 | 85.0 | | |
| Coloured beans - Haricots de couleur | 40.5 | C | 30.4 | C | 75.1 | 100.0 | 75.0 | | |
| Black beans - Haricots noirs | F | F | 3.6 | D | ... | F | 9.0 | | |
| Cranberry beans - Haricots canneberge | 10.1 | D | 8.1 | D | 80.0 | 25.0 | 20.0 | | |
| Dark red kidney - Rognons rouge foncé | F | F | 6.1 | D | ... | F | 15.0 | | |
| Fababeans - Féveroles | 0 ^s | F | 0 ^s | F | ... | 0 ^s | 0 ^s | | |
| Great Northern - Great Northern | 0 ^s | F | 0 ^s | F | ... | 0 ^s | 0 ^s | | |
| Light red kidney - Rognons rouge pâle | F | F | F | F | ... | F | F | | |
| Pinto beans - Haricots Pinto | F | F | F | F | ... | F | F | | |
| Small red beans - Petits haricots rouges | F | F | F | F | ... | F | F | | |
| Other dry beans - Autres haricots secs | 14.6 | C | 10.1 | D | 69.4 | 36.0 | 25.0 | | |
| All beans - Total des haricots | 76.9 | B | 64.7 | B | 84.2 | 190.0 | 160.0 | | |
| Manitoba | | | | | | | | | |
| Dry white beans - Haricots blancs secs | 40.5 | D | 32.4 | B | 80.0 | 100.0 | 80.0 | | |
| Coloured beans - Haricots de couleur | 46.4 | D | 40.5 | B | 87.3 | 115.0 | 100.0 | | |
| Black beans - Haricots noirs | 4.0 | D | 6.1 | C | 150.0 | 10.0 | 15.0 | | |
| Cranberry beans - Haricots canneberge | F | F | F | F | ... | F | F | | |
| Dark red kidney - Rognons rouge foncé | F | F | F | F | ... | F | F | | |
| Fababeans - Féveroles | 2.8 | D | 4.0 | D | 142.9 | 7.0 | 10.0 | | |
| Great Northern - Great Northern | F | F | F | F | ... | F | F | | |
| Light red kidney - Rognons rouge pâle | 2.0 | D | F | F | ... | 5.0 | F | | |
| Pinto beans - Haricots Pinto | 24.3 | B | 16.2 | C | 66.7 | 60.0 | 40.0 | | |
| Small red beans - Petits haricots rouges | F | F | 0 ^s | F | ... | F | 0 ^s | | |
| Other dry beans - Autres haricots secs | F | F | F | F | ... | F | F | | |
| All beans - Total des haricots | 86.9 | C | 72.8 | B | 83.9 | 215.0 | 180.0 | | |
| Green dry peas - Pois secs verts | 34.4 | D | X | ... | ... | 25.0 | X | | |
| Yellow dry peas - Pois secs jaunes | 10.1 | B | 20.2 | C | 200.3 | 85.0 | 50.0 | | |
| Other dry peas - Autres pois secs | 4.0 | D | X | ... | ... | 10.0 | X | | |
| All dry peas - Total des pois secs | 48.5 | B | 30.3 | B | 62.5 | 120.0 | 75.0 | | |
| Large green lentils - Grosses lentilles vertes | F | F | F | F | ... | F | F | | |
| Red lentils - Lentilles rouges | 0 ^s | F | 0 ^s | F | ... | 0 ^s | 0 ^s | | |
| Small green lentils - Petites lentilles vertes | F | F | F | F | ... | F | F | | |
| Other lentils - Autres lentilles | 0 ^s | F | 0 ^s | F | ... | 0 ^s | 0 ^s | | |
| All lentils - Total des lentilles | F | F | F | F | ... | F | F | | |

4. For C.V. range table, see data quality p.10 - Pour le tableau des intervalles du C.V. voir la qualité des données p. 10

Table 3 June preliminary estimates of special crop areas by province and type, 2005 and 2006 (continued)
Tableau 3 Estimations provisoires de juin de la superficie des cultures spéciales par province et catégorie, 2005 et 2006 (suite)

| Province and crop | Seeded area Superficie ensemencée | C.V. range ⁴ Intervalle du C.V. ⁴ | Seeded area Superficie ensemencée | C.V. range ⁴ Intervalle du C.V. ⁴ | Area as a % of 2005 Superficie en % de 2005 | Seeded area Superficie ensemencée | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|----------------|--|--|--|
| | Province et culture | | 2005 | | | 2006 | | | | |
| | '000 hectares | | | | | '000 acres | | | | |
| Manitoba (continued - suite) | | | | | | | | | | |
| Brown mustard- Moutarde brune | 0 ^s | F | 0 ^s | F | ... | 0 ^s | 0 ^s | | | |
| Oriental mustard - Moutarde orientale | 0 ^s | F | 0 | ... | ... | 0 ^s | 0 | | | |
| Yellow mustard - Moutarde jaune | F | F | F | F | ... | F | F | | | |
| Other mustard - Autre moutarde | 0 | ... | 0 | ... | ... | 0 | 0 | | | |
| All mustard seed - Total graines de moutarde | F | F | F | F | ... | F | F | | | |
| Hairless Canary - Graines Canaries sans poil | F | F | F | F | ... | F | F | | | |
| Regular Canary - Graines Canaries régulières | F | F | F | F | ... | F | F | | | |
| All Canary seed - Total graines de Canaries | 8.1 | D | 4.0 | D | 49.4 | 20.0 | 10.0 | | | |
| Desi chick peas - Pois chiches Desi | F | F | 0 | ... | ... | F | 0 | | | |
| Kabuli chick peas - Pois chiches Kabuli | 0 | ... | 0 | ... | ... | 0 | 0 | | | |
| Other chick peas - Autres pois chiches | F | F | F | F | ... | F | F | | | |
| All chick peas - Total des pois chiches | F | F | F | F | ... | F | F | | | |
| Saskatchewan | | | | | | | | | | |
| Dry white beans - Haricots blancs secs | 0 ^s | ... | 0 ^s | ... | ... | 0 ^s | 0 ^s | | | |
| Coloured beans - Haricots de couleur | F | F | F | F | ... | F | F | | | |
| Black beans - Haricots noirs | 0 | ... | 0 ^s | F | ... | 0 | 0 ^s | | | |
| Cranberry beans - Haricots canneberge | 0 | ... | 0 | ... | ... | 0 | 0 | | | |
| Dark red kidney - Rognons rouge foncé | 0 | ... | 0 ^s | F | ... | 0 | 0 ^s | | | |
| Fababeans - Féveroles | F | F | F | F | ... | F | F | | | |
| Great Northern - Great Northern | F | F | F | F | ... | F | F | | | |
| Light red kidney - Rognons rouge pâle | 0 | ... | 0 | ... | ... | 0 | 0 | | | |
| Pinto beans - Haricots Pinto | F | F | F | F | ... | F | F | | | |
| Small red beans - Petits haricots rouges | 0 ^s | F | 0 | ... | ... | 0 ^s | 0 | | | |
| Other dry beans - Autres haricots secs | F | F | F | F | ... | F | F | | | |
| All beans - Total des haricots | F | F | F | F | ... | F | F | | | |
| Green dry peas - Pois secs verts | 303.5 | A | 265.1 | A | 87.3 | 750.0 | 655.0 | | | |
| Yellow dry peas - Pois secs jaunes | 760.8 | A | 829.6 | B | 109.0 | 1,880.0 | 2,050.0 | | | |
| Other dry peas - Autres pois secs | 26.3 | D | 24.3 | D | 92.3 | 65.0 | 60.0 | | | |
| All dry peas - Total des pois secs | 1,090.6 | A | 1,119.0 | A | 102.6 | 2,695.0 | 2,765.0 | | | |
| Large green lentils - Grosses lentilles vertes | 534.2 | A | 198.3 | B | 37.1 | 1,320.0 | 490.0 | | | |
| Red lentils - Lentilles rouges | 153.8 | B | 271.1 | B | 176.3 | 380.0 | 670.0 | | | |
| Small green lentils - Petites lentilles vertes | 133.5 | B | 101.2 | B | 75.8 | 330.0 | 250.0 | | | |
| Other lentils - Autres lentilles | 52.6 | B | 16.2 | D | 30.8 | 130.0 | 40.0 | | | |
| All lentils - Total des lentilles | 874.1 | A | 586.8 | A | 67.1 | 2,160.0 | 1,450.0 | | | |
| Brown mustard- Moutarde brune | X | C | 32.4 | C | ... | X | 80.0 | | | |
| Oriental mustard - Moutarde orientale | 48.6 | C | X | ... | ... | 120.0 | X | | | |
| Yellow mustard - Moutarde jaune | 68.8 | B | 56.7 | C | 82.4 | 170.0 | 140.0 | | | |
| Other mustard - Autre moutarde | X | D | X | ... | ... | X | X | | | |
| All mustard seed - Total graines de moutarde | 180.1 | B | 113.4 | B | 63.0 | 445.0 | 280.0 | | | |
| Hairless Canary - Graines Canaries sans poil | 28.3 | C | 22.3 | C | 78.6 | 70.0 | 55.0 | | | |
| Regular Canary - Graines Canaries régulières | 153.8 | B | 99.1 | B | 64.5 | 380.0 | 245.0 | | | |
| All Canary seed - Total graines de Canaries | 182.1 | B | 121.4 | B | 66.7 | 450.0 | 300.0 | | | |

5. For C.V. range table, see data quality p. 10 - Pour le tableau des intervalles du C.V. voir la qualité des données p. 10

Table 3 June preliminary estimates of special crop areas by province and type, 2005 and 2006 (concluded)
Tableau 3 Estimations provisoires de juin de la superficie des cultures spéciales par province et catégorie, 2005 et 2006 (fin)

| Province and crop Province et culture | Seeded area Superficie ensemencée | C.V. range ⁴ Intervalle du C.V. ⁴ | Seeded area Superficie ensemencée | C.V. range ⁴ Intervalle du C.V. ⁴ | Area as a % of 2005 Superficie en % de 2005 | Seeded area Superficie ensemencée | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|----------------|--|--|
| | 2005 | | 2006 | | | 2005 | | | |
| | '000 hectares | | | | | '000 acres | | | |
| Saskatchewan (continued - suite) | | | | | | | | | |
| Desi chick peas - Pois chiches Desi | 12.1 | D | 26.3 | C | 217.4 | 30.0 | 65.0 | | |
| Kabuli chick peas - Pois chiches Kabuli | 44.5 | C | 78.9 | B | 177.3 | 110.0 | 195.0 | | |
| Other chick peas - Autres pois chiches | 10.1 | C | 20.2 | D | 200.3 | 25.0 | 50.0 | | |
| All chick peas - Total des pois chiches | 66.7 | C | 125.4 | B | 188.0 | 165.0 | 310.0 | | |
| Alberta | | | | | | | | | |
| Dry white beans - Haricots blancs secs | 0 ^s | F | 0 ^s | F | ... | 0 ^s | 0 ^s | | |
| Coloured beans - Haricots de couleur | 25.0 | D | 23.5 | C | 94.0 | 62.0 | 58.0 | | |
| Black beans - Haricots noirs | F | F | F | F | ... | F | F | | |
| Cranberry beans - Haricots canneberge | 0 | ... | 0 | ... | ... | 0 | 0 | | |
| Dark red kidney - Rognons rouge foncé | F | F | 0 | ... | ... | F | 0 | | |
| Fababeans - Féveroles | F | F | F | F | ... | F | F | | |
| Great Northern - Great Northern | 4.0 | D | 5.7 | D | 140.0 | 10.0 | 14.0 | | |
| Light red kidney - Rognons rouge pâle | 0 ^s | F | 0 | ... | ... | 0 ^s | 0 | | |
| Pinto beans - Haricots Pinto | 15.4 | D | 10.5 | D | 68.4 | 38.0 | 26.0 | | |
| Small red beans - Petits haricots rouges | F | F | F | F | ... | F | F | | |
| Other dry beans - Autres haricots secs | F | F | F | F | ... | F | F | | |
| All beans - Total des haricots | 25.0 | D | 23.5 | C | 94.0 | 62.0 | 58.0 | | |
| Green dry peas - Pois secs verts | 72.8 | B | 76.9 | B | 105.6 | 180.0 | 190.0 | | |
| Yellow dry peas - Pois secs jaunes | 145.7 | B | 182.1 | B | 125.0 | 360.0 | 450.0 | | |
| Other dry peas - Autres pois secs | 6.1 | D | 8.1 | D | 133.3 | 15.0 | 20.0 | | |
| All dry peas - Total des pois secs | 224.6 | A | 267.1 | A | 118.9 | 555.0 | 660.0 | | |
| Large green lentils - Grosses lentilles vertes | 4.9 | D | F | F | ... | 12.0 | F | | |
| Red lentils - Lentilles rouges | F | F | F | F | ... | F | F | | |
| Small green lentils - Petites lentilles vertes | F | F | F | F | ... | F | F | | |
| Other lentils - Autres lentilles | F | F | F | F | ... | F | F | | |
| All lentils - Total des lentilles | 9.7 | D | F | F | ... | 24.0 | F | | |
| Brown mustard - Moutarde brune | 4.0 | D | F | D | ... | 10.0 | F | | |
| Oriental mustard - Moutarde orientale | 8.1 | D | F | D | ... | 20.0 | F | | |
| Yellow mustard - Moutarde jaune | 20.2 | D | 16.2 | C | 80.0 | 50.0 | 40.0 | | |
| Other mustard - Autre moutarde | 0 ^s | F | 0 | ... | ... | 0 ^s | 0 | | |
| All mustard seed - Total graines de moutarde | 32.3 | D | 26.3 | C | 81.4 | 80.0 | 65.0 | | |
| Hairless Canary - Graines Canaries sans poil | F | F | F | F | ... | F | F | | |
| Regular Canary - Graines Canaries régulières | F | F | F | F | ... | F | F | | |
| All Canary seed - Total graines de Canaries | F | F | F | F | ... | F | F | | |
| Desi chick peas - Pois chiches Desi | F | F | F | F | ... | F | F | | |
| Kabuli chick peas - Pois chiches Kabuli | 8.1 | D | 16.2 | D | 200.0 | 20.0 | 40.0 | | |
| Other chick peas - Autres pois chiches | F | F | F | F | ... | F | F | | |
| All chick peas - Total des pois chiches | 12.1 | D | 18.2 | D | 150.4 | 30.0 | 45.0 | | |
| British Columbia - Colombie-Britannique | | | | | | | | | |
| Green dry peas - Pois secs verts | F | F | F | F | ... | F | F | | |
| Yellow dry peas - Pois secs jaunes | F | F | F | F | ... | F | F | | |
| Other dry peas - Autres pois secs | 0 | ... | 0 | ... | ... | 0 | 0 | | |
| All dry peas - Total des pois secs | 2.0 | E | 3.6 | E | 182.1 | 5.0 | 9.0 | | |

4. For C.V. range table, see data quality p. 10 - Pour le tableau des intervalles du C.V. voir la qualité des données p. 10



BON DE COMMANDE

Statistique Canada

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA

1010415932

C.3

CROSS

POUR COMMANDER:**COURRIER**

Statistique Canada
Division de la diffusion
Gestion de la circulation
120 avenue Parkdale
Ottawa (Ontario)
K1A 0T6 Canada

TELEPHONE

1 800 267-6677
(613) 951-7277

TELECOPIEUR

1 877 287-4369
(613) 951-1584

COURRIEL

order@statcan.ca
Compagnie:

Service:

À l'attention de:

Fonction:

Adresse:

Ville:

Province:

Code postal:

Téléphone: ()

Télécopieur: ()

Courriel:

Signature de la personne autorisée

Vos renseignements personnels sont protégés par la Loi sur la protection des renseignements personnels.**

| Numéro au catalogue | Titre | Édition(s) demandée(s) ou inscrire "A" pour les abonnements | Prix (Les prix n'incluent pas la taxe de vente) | *Frais de port (Pour les envois à l'extérieur du Canada) | Quantité | Total \$ |
|---|--|---|---|--|----------|----------|
| 22-002-XPB | Série de rapports sur les grandes cultures (saisonnier) | | 17 \$ / 95 \$ | | | |
| 22-002-XIB | Série de rapports sur les grandes cultures (Internet, saisonnier) | | GRATUIT | Disponible à: www.statcan.ca | | |
| 22-002-XFB | Service de télécopie pour la Série de rapport sur les grandes cultures (saisonnier) | | 50 \$ / 200 \$ | | | |
| 22-007-XIB | Revue des céréales et des graines oleagineuse (Internet, mensuel) | | GRATUIT | Disponible à: www.statcan.ca | | |
| 22C0001XPB | Bilan sur les principales céréales | | \$200 | | | |
| 22F0005XDB | Données régionales sur les cultures Format (cochez une seule case) <input type="checkbox"/> Excel <input type="checkbox"/> Copie imprimée | | \$225 | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| TPS (7%) | | | | | | |
| TVP en vigueur | | | | | | |
| TVH en vigueur (N.-É., N.-B., T.-N.) | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | | | |
| PF097175 | | | | | | |

*Frais de port: Aucun frais pour les envois au Canada. Pour les envois à destination de:

Etats-Unis, veuillez ajouter 6 \$ pour chaque numéro ou article commandé. Pour les envois à:

destination des autres pays, veuillez ajouter 10 \$ pour chaque numéro ou article commandé.

Fréquence des parutions: publication annuelle = 1; publication trimestrielle = 4; publication mensuelle = 12; publication saisonnière = 8.

Les clients canadiens ajoutent soit la TPS de 7% et la TVP en vigueur, soit la TVH (TPS numéroté R121491807).

Les clients de l'étranger paient en dollars canadiens tirés sur une banque canadienne ou en dollars US tirés sur une banque américaine selon le taux de change quotidien en vigueur.

Statistique Canada utilise la SIF. Les ministères et les organismes du gouvernement fédératif doivent indiquer sur toutes les commandes leur code d'organisme RI _____ et leur code de référence RI _____.

**Statistique Canada utilisera les renseignements qui vous concernent seulement pour effectuer la présente transaction, livrer votre(vos) produit(s), annoncer les mises à jour de ce(s) produit(s) et gérer votre compte. Nous pourrions de temps à autre vous informer au sujet d'autres produit(s) et services de Statistique Canada et mener des études de marché. Si vous ne voulez pas qu'on communique avec vous de nouveau pour les promotions ou des études de marché, cochez la case correspondante et faites-nous parvenir cette page par télécopieur ou par la poste, téléphonez-nous au 1 800 267-6677 ou envoyez un courriel à order@statcan.ca.



Statistique Canada

Statistics Canada

www.statcan.ca

Canada