22-002F
no 9
1967
23 août
c. 3

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

OTTAWA - CANADA

Publication autorisée par le ministre du Commerce

Pour être publié le
23 août 1967, à 3h. de
l'après-midi (H.A.E.)

Série de 20 rapports: $4

SÉRIE DE RAPPORTS SUR LES GRANDES CULTURES - 16

RAPPORT TÉLÉGRAPHIQUE SUR LES CULTURES - CANADA

Le Bureau fédéral de la statistique publie aujourd'hui le cinquième d'une série de 6 rapports télégraphiques sur l'état des cultures à travers le Canada. Le présent rapport comprend en outre le dixième d'une série de 11 rapports télégraphiques sur l'état des cultures dans les provinces des Prairies. Les renseignements sur lesquels reposent ces rapports sont fournis par un certain nombre de correspondants agricoles spécialement désignés des ministères fédéral et provinciaux de l'Agriculture, par des observateurs agricoles particuliers et par des entreposeurs de céréales. Les renseignements météorologiques contenus dans le présent numéro sont fournis par la Division de la météorologie, ministère des Transports.

SOMMAIRE

Provinces Maritimes - L'abondante humidité, accompagnée de chaleur suffisante, a assuré à toutes les grandes cultures une excellente végétation dans l'Ile du Prince-Édouard. En raison de l'humidité, cependant, la fenaison n'a pu être terminée et la qualité du foin en a souffert dans une certaine mesure. Les céréales semées tôt mûrissent rapidement mais la moisson n'est pas encore commencée. Les pommes de terre donnent bien et, dans certains champs hâtifs, elles ont été arrachées. Les crucifères font de bons progrès bien que la récolte de pois semble être inférieure à la normale. Le temps humide, dans toute la Nouvelle-Écosse, a retardé la fenaison mais excellemment favorisé les pâturages. La plupart des cultures sont plus tardives que d'habitude mais leur croissance est excellente. On a récolté un peu de céréales de printemps dans la vallée d'Annapolis; dans d'autres régions, les céréales mûrissent et on signale un peu de verse. Les pommes prennent bonne taille et la récolte a belle apparence. Les pommes de terre se développent bien mais donnent certains signes de brunissure. Dans la plupart des secteurs, le maïs fait de bons progrès. On signale que les pois et les haricots ont trop mûris dans certains cas. Le temps a été chaud et humide dans la majeure partie du Nouveau-Brunswick durant le mois écoulé. Une forte quantité de foin a été perdue et les céréales ont été gravement atteintes. Plusieurs régions signalent de la verse et l'orge souffre de la pourriture de la racine. Les pommes de terre ont belle apparence mais on signale une nouure légère. La brunissure a été maîtrisée. Les rendements de pommes de terre sont légers. Les pommes ont belle apparence avec certains signes de tavelure. Les légumes et le maïs de grande culture progressent favorablement. Les pâturages et le regain sont sensiblement beaux pour le temps de l'année.

Nota: Sans Terre-Neuve, dont les chiffres ne sont pas disponibles.

Rédigé à la Section des cultures, Division de l'agriculture

5502-509.16

Le présent document peut être reproduit en toute liberté pourvu qu'on indique qu'il émane du B.F.S.

Québec Les récoltes des céréales sont commencées au Québec et les rendements sont supérieurs à la normale; on signale, cependant, certains dommages causés par la verse et l'extrême humidité du sol. Le regain des champs de foin est abondant et, en général, les pâturages ont très belle apparence. On compte sur de bonnes récoltes de pommes de terre, de betteraves sucrières, de maïs à grain et d'ensilage, de graine de lin et de fourrages. La récolte de pommes devrait être très bonne. La cueillette des framboises est terminée et les rendements varient de moyens à bons. Le bétail est en bon état et la production de lait est à peu près normale.

Ontario Le moissonnage du blé d'hiver est à peu près terminé en Ontario et les rendements sont d'environ 40 boisseaux l'acre. Celui des céréales de printemps est commencé et promet des rendements légèrement supérieurs à la normale. Le maïs fait de bons progrès dans la plupart des secteurs. Le soja est prometteur; quant aux haricots secs, cependant, les perspectives sont variables. Le fauchage du regain du foin est commencé mais les rendements sont beaucoup inférieurs à ceux de la première récolte. La coupe du tabac est commencée et la récolte est inégale. Le ramassage des tomates de conserve est commencé aussi et les perspectives sont bonnes. On récolte également les pêches et, en général, le rendement est inférieur à la normale.

Provinces des Prairies La mise en andains des céréales est générale dans la majeure partie du Manitoba, de la Saskatchewan et du sud de l'Alberta, où le moissonnage-battage débute. Les perspectives quant au rendement du blé sont meilleures qu'on l'avait prévu plus tôt et les premiers échantillons battus ont bon poids et se classent bien. Le temps chaud et sec accélère la maturation des récoltes dans le centre et le nord de l'Alberta et dans le nord de la Saskatchewan. Pour peu que se maintienne le beau temps, on peut prévoir que les moissons seront terminées plus tôt que d'habitude.

LA ROUILLE DANS LES PROVINCES DES PRAIRIES

La Station de recherches du ministère fédéral de l'Agriculture à Winnipeg signale que les pluies récentes dans les Prairies ont créé des conditions propices au développement de la rouille de sorte que la rouille de la feuille est abondante dans les variétés de blé Selkirk, Pembina et Manitou, dans la vallée de la Rivière-Rouge et dans le nord-ouest du Manitoba. Toutefois, seuls les champs tardifs pourraient être gravement endommagés et il est douteux que la rouille puisse avoir des conséquences importantes pour les rendements du blé en 1967. On n'a relevé que des traces de rouille dans les avoines, qui ne nuiront pas au rendement cette année.

Colombie-Britannique Le temps est chaud et sec depuis quelque semaines dans la plupart des régions de la Colombie-Britannique. Dans les régions basse de la terre ferme, le temps chaud a fait tomber prématurément les têtes des oignons et mûrir les betteraves un mois plus tôt que d'habitude. Les choux et les pommes de terre se développent bien mais les champs sont très secs. La qualité des pommes de terre est bonne et celle des carottes varie de passable à bonne. Les concombres et les tomates sont suffisamment abondants et d'excellente qualité dans les secteurs de l'Okanagan et de Similkameen. Les pois ont souffert de la sécheresse dans tous les secteurs. La laitue et les épinards de même que d'autres cultures de temps frais sont, en conséquence, peu abondants. Toutes les régions souffrent du temps sec mais les champs de légumes irrigués ont exceptionnellement profité cette année. On cueille en ce moment de bonnes récoltes d'abricots, de pêches et de pommes.

PROVINCES MARITIMES

Dans l'Ile du Prince-Édouard, le temps humide a rendu la fenaison difficile. Les pâturages sont en très bon état et on rapporte une croissance excellente de toutes les grandes cultures. Le grain mûrit rapidement, mais la récolte n'a pas encore commencé. Les cultures de pommes de terre vont bien et n'ont presque pas été touchées par la rouille. Quelques cultures hâtives ont été récoltées. La récolte des fraises est terminée et les rendements sont nettement supérieurs à la moyenne. La septoriose de l'avoine ainsi que la verse causeront une diminution du rendement au regard de l'an dernier.

Dans la région du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, on rapporte que la fenaison est presque terminée. La croissance des légumes est clairsemée et la récolte de fraises est bonne. Dans le centre de la Nouvelle-Écosse, environ la moitié du foin a été récolté. L'état des pâturages semble excellent et, présentement, il y a une abondance d'aliments pour animaux. Les autres cultures sont généralement en retard, mais la croissance est excellente. Le grain semé au printemps mûrit, mais la verse a été considérable. Dans la région de Amherst, la fenaison est terminée, le grain mûrit rapidement et devrait être prêt pour le battage d'ici deux semaines. Le maïs progresse bien. À Truro, le temps est humide, sans soleil, et la pluie plus abondante que la normale. Environ le tiers du foin doit encore être moissonné. Le grain mûrit mais la verse est considérable. On s'attend à une récolte moyenne de pommes de terre, bien qu'on aie rapporté un peu de rouille. Les conditions des pâturages sont bonnes et la croissance des cultures de légumes est excellente. Dans la vallée d'Annapolis, environ les trois-quarts de la fenaison sont terminés, le reste étant retardé par le temps humide. Un montant considérable de pertes est survenu. L'état des pâturages est excellent. La récolte des céréales d'hiver est presque terminée et les rendements sont inférieurs à la moyenne. On a entrepris la récolte des céréales de printemps et on rapporte de bons rendements. Le grain a subi un montant considérable de verse. La croissance de maïs d'ensilage a été excellente. Les rendements de pommes de terre sont un peu inférieurs à la moyenne et on ne relève aucune trace de rouille. Les pommes atteignent une bonne grosseur et les perspectives sont bonnes.

Au Nouveau-Brunswick, le temps chaud et humide a causé beaucoup de dégâts à la récolte de foin et environ un tiers de cette culture doit encore être moissonnée. Dans la région de Frédéricton, le grain a été gravement affecté par le mauvais temps et la verse a sévi gravement. L'orge a subi les effets dommageables du piétin fusarier. La récolte de pommes de terre semble prometteuse, mais on rapporte qu'elle sera clairsemée. Il y a quelques traces de rouille. Les cultures de légumes, de maïs des champs et de tabac produiront de grands rendements. La croissance des pâturages est excellente. Dans la région de Perth, des averses fréquentes ont retardé la fenaison. On rapporte que la qualité des cultures est inférieure, en raison principalement de l'excès d'humidité. Le grain mûrit rapidement et on prévoit une bonne récolte; cependant, la verse a été considérable. Les pommes de terre croissent bien et on procédera partout à l'étêtement d'ici une semaine ou dix jours.

QUÉBEC

Au nord de Montréal, la récolte de tabac, commencée durant la première semaine d'août, semble très prometteuse. La cueillette des framboises est terminée depuis le milieu du mois. Les céréales sont en bon état et prêtes pour la moisson. Dans la région de Saint-Jean, la température moyenne du 19 juillet au 22 août a été de 70.5 degrés F. et la précipitation a atteint 2.98 pouces. La brulûres des feuilles qui est apparue durant l'été a été plus sérieuse que d'habitude et a causé des

dégats considérables dans plusieurs cultures maraîchères. A la suite de pluies trop abondantes, le rendement de la récolte de pois, maintenant terminée, a été bien inférieure à la normale. La grêle a causé des dégats dans certains vergers de diverses régions au début du mois.

La région de Lennoxville a connu plusieurs orages et 5.1 pouces de pluie depuis le commencement d'août. On y rapporte une croissance normale des herbages et la fenaison est terminée. Le maïs fourrager mesure déjà de 8 à 10 pieds et on s'attend à un rendement élevé. La moisson des céréales est commencée et le colza semble particulièrement prometteur. On rapporte que la rouille nuit aux pommes de terre. Autour de Pocatière, les pluies abondantes et fréquentes des trois premières semaines d'août, qui ont laissé 4.75 pouces d'eau, ont retardé la fenaison et causé de la verse dans les cultures céréalières. La fenaison est maintenant terminée et le rendement est de 20 p. 100 au-dessus de la normale, mais environ 50 p. 100 de la récolte est de qualité médiocre. Les pâturages et les prés à foin sont en un meilleur état que d'habitude. Le moissonnage de l'orge et du colza est commencé. Le rendement de l'avoine est réduit par la verse. Les pommes de terre, les choux de Siam et le maïs sont très prometteurs.

Les 2.95 pouces de pluie qui sont tombés dans la région de Normandin au cours des 20 derniers jours ont été propices aux céréales mais ont nui à la récolte de foin. Comme les pâturages poussent bien, la production de lait se maintient. La récolte de pommes de terre promet beaucoup dans cette région. La cueillette des bleuets progresse lentement et, selon les rapports, le rendement est bon.

ONTARIO

Dans le comté d'Essex, dans le sud de l'Ontario, la récolte du blé d'hiver est terminée et le moisonnage-battage de l'avoine progresse bien malgré le mûrissement inégal. Les rendements sont à peu près ordinaires. Les cultures de pleine saison poussent bien. La récolte inférieure de pommes de terre hâtives est presque terminée. La cueillette des tomates de conserve est commencée et les perspectives s'annoncent bonnes, bien que le besoin d'humidité se fasse sentir dans certaines régions. La cueillette des pêches bat son plein mais la taille et la quantité sont inférieures à la normale. Le ramassage du tabac burley est commencé. Le blé d'hiver est récolté dans l'île Pelée et on déclare des rendements moyens. Le soja pousse bien et se rempli bien. Le maïs semble en très bon état et les réserves d'humidité sont de passables à bonnes. Dans le comté de Kent, toutes les cultures vont bien sauf dans certaines sections où la grêle les a affectées. Le tabac et le maïs ont été gravement endommagés. Les tomates sont bien prises mais mûrissent tard à cause du temps frais. Il faut aussi du temps plus chaud pour stimuler le mûrissement du maïs et du soja. L'effeuillaison du tabac est très avancée. Bien que la pluie ait beaucoup varié, les réserves d'humidité sont suffisantes en général. Les pâturages sont en excellent état. Les betteraves à sucre sont également en excellent état, sauf à certains endroits isolés où la grêle a passé.

Dans le comté de Middlesex, la récolte du blé d'hiver est terminée et les rendements et la qualité sont inférieurs à la moyenne. Les céréales de printemps tôt semées varient de médiocres à excellentes et certains champs souffrent beaucoup de la verse. Les ravages de la grêle ont marqué certaines régions du nord et du centre du comté. Le regain du foin et des pâturages a été bon. Dans le comté de Norfolk, la récolte du blé d'hiver est terminée et donne en moyenne environ 35 boisseaux l'acre. La récolte des céréales de printemps, du foin, de seconde coupe du tabac, des tomates et des concombres est commencée. Plusieurs champs d'avoine ont beaucoup souffert de la verse et, en conséquence, les nouvelles

semences sont affectées. Le maïs à grain semble excellent mais il lui faudra une pleine saison de croissance pour parvenir à maturité. La seconde coupe de foin est légère mais d'excellente qualité. Le ramassage du tabac est commencé et les rendements et la qualité sont meilleurs que prévus. Dans le comté de Lincoln, la pluie a été suffisante mais la température a été très fraîche, la nuit, la semaine dernière. La récolte des Red Havens se poursuit en quantité et la cueillette de la variété Jubilee commence à peine. La cueillette des tomates de conserve est commencée. Les pucerons et les cicadelles nuisent de façon inusitée dans bon nombre de potagers et de vergers. L'infestation de la tordeuse orientale du pêcher est très légère. On ne signale aucune grave maladie des arbres fruitiers actuellement, sauf la brunissure des poires et des pommes.

Les cultures du comté de Simcoe sont d'environ deux semaines en retard au regard de la normale. La récolte du blé d'hiver est presque terminée et, bien que l'avoine et l'orge soient ou en andains ou coupées, le moissonnage-battage de ces cultures est à peine commencé. Les rendements des céréales de printemps sont tant soit peu réduits par suite d'excès d'humidité en juillet. La fenaison était en général terminée vers le 14 août, mais la première coupe était de très pauvre qualité à cause des mauvaises conditions de récolte. Dans le comté de Bruce, l'andainage et le moissonnage-battage des céréales de printemps progressent en dépit de la verse d'une grande partie de la moisson. Les rendements varient de passables à excellents. Toutes les autres cultures poussent bien.

Dans le comté de Wellington, la récolte des céréales de printemps et la seconde coupe de foin se pratiquent de façon générale. Malgré le temps favorable du 11 au 17 août, l'humidité excessive présente encore des difficultés dans certaines régions. Plusieurs champs de céréales de printemps sont ravagés par la verse mais on espère encore obtenir des rendements supérieurs à la moyenne. Des bons rendements de maïs d'ensilage sont également prévus dans les champs bien drainés. Les nouvelles semences ont belle apparence en général. La récolte de la première coupe de foin est terminée dans le comté de Halton et, bien que les rendements aient été excellents, la qualité était médiocre. Le blé d'hiver donne de 40 à 50 boisseaux l'acre et les céréales de printemps tôt semées donnent également de très bons rendements malgré la verse abondante. La rouille est un problème dans cette région. Le maïs en terres lourdes est médiocre mais en très bon état dans les sols légers. Les pâturages sont en excellent état. Les cerises ont donné une récolte supérieure à la moyenne et les pommes doivent aussi produire plus qu'à l'ordinaire.

Dans le comté de Durham, la récolte du blé d'hiver est en général terminée. Les céréales de printemps sont très versées, ce qui ralentit la récolte. La seconde coupe de foin donne des rendements excellents et la qualité est beaucoup meilleure que celle de la première récolte. La récolte du tabac continue mais cette culture est en retard par rapport à la normale. Dans le comté de Peterborough, la pluie rend toujours les récoltes difficiles. Le moissonnage-battage du blé d'hiver est presque terminé et on signale des rendements moyens de bonne qualité. Les céréales de printemps sont très versées et la récolte est lente et la qualité médiocre. Le maïs et les pâturages sont en excellent état. Dans le comté de Carleton, dans l'est de l'Ontario, la plupart des champs de céréales de printemps sont versés et la récolte est difficile. Le maïs varie et a besoin de temps chaud et sec pour mûrir. La seconde coupe de foin est commencée et, bien que la première récolte ait été bonne en général, la qualité était tant soit peu réduite par le mauvais temps. Les pâturages sont en bon état. Dans le comté de Renfrew, le moissonnage-battage du blé d'automne est commencé et certains rendements atteignent 65 boisseaux l'acre. La récolte des

céréales de printemps est commencée. Le maïs varie de pauvre à excellent et les pâturages sont en très bon état. La récolte de la première coupe de foin se poursuit toujours et la coupe d'une lourde moisson et du regain de luzerne est commencée.

Un rapport de Kapuskasing, dans le nord d'Ontario, indique qu'environ 20 p. 100 du foin est encore debout. L'avoine et l'orge ont gravement souffert de la verse à cause des pluies torrentielles et des vents violents et ces cultures parviennent à maturité. Le foin de seconde récolte dans les champs ensemencés tôt fleurit en ce moment. Les pâturages sont en excellent état. Dans la région de la baie du Tonnerre, la fenaison est terminée et les rendements et la qualité ont été réduits de près de 20 p. 100 par rapport à la moyenne. La récolte des céréales de printemps est commencée et donne des rendements moyens. Les pommes de terre hâtives sont de bonnes qualité et mises sur le marché. Les pâturages sont en assez bon état.

MANITOBA

Le moissonnage a été temporairement retardé par des averses dispersées dans plusieurs régions du Manitoba. Le moissonnage-battage du seigle d'automne est fait et les rendements varient de 9 à 35 boisseaux l'acre. La mise en andains est en cours dans toute la province, sauf dans les régions de Ste-Rose, Swan River et Shoal Lake. Un tiers du battage est terminé à Melita, Deloraine, Souris et Brandon. Ailleurs, il se généralisera d'ici la fin de la semaine. Les culture spéciales progressent de façon satisfaisantes mais les pâturages, malgré les pluies bienfaisantes, n'atteignent pas le niveau normal de production. Sauf dans la vallée de la rivière Rouge, le foin de seconde coupe est court mais de bonne qualité. Les réserves de fourrage sont suffisantes, sauf aux environs de Melita et de Virden.

Bien qu'il soit tombé un demi-pouce de pluie aux alentours d'Altona pendant la semaine, la moisson avance sans interruption; l'andainage se fait dans plusieurs champs de céréales et le moissonnage-battage dans d'autres. Les progrès du tournesol et de la betterave à sucre dépassent les prévisions. Les pois des champs se peuplent bien et les perspectives sont bonnes. La deuxième récolte de luzerne est presque terminée. Au nord-ouest, dans la région de Morden, 15 p. 100 de l'andainage du blé est fait, 60 p. 100 dans le cas de l'orge et 30 p. 100 dans celui de l'avoine. Le moissonnage-battage de ces trois cultures est commencé; le blé donne de 25 à 30 boisseaux l'acre. Le moissonnage-battage du seigle est maintenant terminé. La moisson est un peu plus tardive aux environs de Manitou; le maïs d'ensilage et les jardins potagers ont souffert du gel. Les pâturages sont en bon état.

Les travaux de moissonnage battent leur plein dans la région de Pilot Mound. On signale des rendements très variables, l'orge donnant de 20 à 60 boisseaux l'acre selon la fertilité du sol. Les échantillons de blé et d'orge semblent très bons, mais les récoltes de lin et d'avoine sont assez médiocres. Parmi les autres cultures, on signale que le tournesol est bon, la graine de colza est moyenne ou légèrement inférieure et le maïs d'ensilage varie de passable à bon. Il n'a pas plu dernièrement aux environs de Melita où la moisson du seigle est terminée et celle du blé, de l'avoine, de l'orge et du lin est en cours. Il est encore trop tôt pour établir la moyenne des rendements.

Autour de Selkirk, on récolte le blé et l'orge; les rendements du blé sont évalués à 27 boisseaux l'acre et ceux de l'orge, à environ 30 boisseaux. Voici les estimations des rendements possibles des autres cultures: avoine, 50 boisseaux; graine de lin, 12; graine de colza, 18; et sarrasin, 20. La deuxième récolte de foin progresse maintenant très bien, dans des conditions favorables. Les rapports indiquent une humidité suffisante dans la région de Portage-la-Prairie et les cultures mûrissent rapidement. L'orge, dont la moitié est en andains et le quart est battu, donne entre 30 et 60 boisseaux de bonne qualité l'acre. On prévoit que le blé, dont 5 p. 100 de l'andainage est fait, donnera de 25 à 30 boisseaux l'acre, tandis que la récolte d'avoine sera probablement inférieure à la moyenne ou de 40 à 50 boisseaux.

Dans la région de Virden, la récolte se fait maintenant partout; déjà, 60 p. 100 des céréales sont en andains et 10 p. 100 sont moissonnées-battues. Les pluies tardives ont aidé à remplir la récolte de cette année; le blé devrait donner en moyenne 20 boisseaux l'acre tandis que les rendements du seigle atteindront environ 14 boisseaux. Malgré une amélioration des pâturages dans certaines régions les réserves de foin seront insuffisantes. L'andainage de l'orge et du blé est commencé dans la région d'Interlake, aux environs de Teulon, et le battage d'une partie de l'orge est fait. La récolte de mil est finie. La deuxième récolte de foin est bonne.

Dans la région de Neepawa, le temps a été favorable à la moisson jusqu'au 16 août alors que des averses dispersées ont donné jusqu'à un demi-pouce d'eau. A ce moment, 75 p. 100 du seigle d'automne est en andains et 30 p. 100 est moissonné-battu. Les premières livraisons indiquent un rendement moyen d'environ 25 boisseaux l'acre dont une forte proportion se classe no 2. On a mis en andains 20 p. 100 des autres céréales et on prévoit une récolte variant de moyenne à bonne. À Shoal Lake, en dépit de la pluie du 20 août qu a retardé la moisson, 20 p. 100 de l'andainage est terminé. L'orge donne de 35 à 40 boisseaux l'acre et le seigle d'automne jusqu'à 30 boisseaux. La gelée du 18 août a légèrement endommagé les jardins. Dans cette région, les pâturages sont pauvres et les rendements de foin sont seulement moyens ou inférieurs à la moyenne. Vers l'ouest, aux environs de Russell, la mise en andains devrait se généraliser au cours de la semaine. Le battage d'une partie de l'orge est déjà fait et les rendements moyens sont de 55 boisseaux l'acre. Une grêle légère aux environs d'Inglis a fait très peu de dommages et le gel a nui aux haricots et aux tomates de jardin.

Au nord-ouest du Manitoba, la grêle du 16 août a causé des pertes de 60 p. 100 sur 6,000 acres dans la municipalité d'Ethelbert et jusqu'à 80 p. 100 de pertes sur 14,000 acres dans la municipalité de Dauphin. L'andainage progresse très bien dans cette région et le moissonnage-battage a commencé le 17 août. Voici les estimations de rendement: blé, 50 boisseaux l'acre; orge, 40; avoine, 55; et graine de lin, 8. La récolte du seigle bat son plein aux environs de Swan River et les rendements sont en moyenne de 35 boisseaux l'acre. La mise en andains du blé, de l'avoine et de l'orge est commencée et devrait se généraliser d'ici quatre jours environ. Les pâturages ont bénéficié des pluies récentes et des réserves supplémentaires de fourrage sont disponibles.

La Canadian Hail Underwriters Association signale qu'il y a eu des orages de grêle le 7 août, de Kirkella à Lenore et dans les régions de Brandon et de Binscarth. La région de Carberry a été touchée le 13 août et un orage a eu lieu le 16 août dans les régions d'Ethelbert, de Dauphin et de Plum Coulee.

La station de recherches du ministère de l'Agriculture, à Winnipeg, signale, à la suite d'un relevé récent, une infestation de sauterelles adultes sur une surface de 1,146 milles carrés, au regard des 337 milles carrés légèrement infestés en 1966. Les infestations se limitent surtout aux pâturages et terres à foin dans les régions de sol léger, au centre de la province.

Les précipitations moyennes non pondérées dans la province, depuis le 1er avril, ont été de 14 p. 100 inférieures à la normale, comparativement à 12 p. 100 au-dessous la semaine dernière, 9 p. 100 au-dessous il y a deux semaines et 7 p. 100 au-dessus il y a un an. La température moyenne de la semaine terminée le 21 août a été de 0.4 degrés au-dessus de la normale au regard de 0.3 degré au-dessous une semaine auparavant, 1.4 degré au-dessous deux semaines plus tôt et 3.9 degrés au-dessous durant la semaine terminée le 22 août 1966.

SASKATCHEWAN

La chaleur constante en Saskatchewan a permis aux céréales de mûrir rapidement et la mise en andains se poursuit dans toutes les régions. À l'échelon provincial, quelques 20 p. 100 du blé et 25 p. 100 des céréales secondaires ont été mis en andains. La mise en andains est très avancée dans les régions agricoles 1, 2 et 3, dans le sud de la province, où la coupe est à 30, 40 et 35 p. 100, respectivement, achevée. La mise en andains dans les régions agricoles 4 à 7 est aussi à quelque 15 à 20 p. 100 terminée, tandis que dans le nord la coupe vient à peine de commencer. Le rendement s'annonce très favorable en dépit des précipitations tout à fait inférieures à la normale durant la saison de croissance.

A Willmar, dans le sud-est de la province, la plus grande partie du seigle d'automne est moissonnée-battue et le rendement donne en moyenne 15 boisseaux l'acre environ. On y a battu une partie de l'avoine et un peu de blé, et le rendement est passable en dépit des conditions de croissance. Le blé sur tige est encore vert. Les pâturages sont très secs et le foin est court. La température est inférieur à la normale dans la région de Moosomin depuis une semaine et le 18 août on signalait quelques dommages causés par le gel. La mise en andains est avancée, mais on n'a moissonné-battu que le seigle d'automne et une partie de l'avoine hâtive et de l'orge. Les échantillons jusqu'ici sont de qualité et le rendement s'annonce supérieur aux prévisions dans les cultures des jachères et dans les chaumes.

Près des deux tiers de la mise en andains sont terminés à Fillmore et l'on a achevé une partie du moissonnage-battage des cultures légères tôt semées. Le rendement est meilleur que ce que l'on avait prévu et le blé est de la catégorie n° 2 nord et mieux. Les céréales secondaires, dont le rendement est passable, sont de poids léger. Les pâturages sont médiocres. La Ferme expérimentale d'Indian Head signale que la mise en andains des céréales bat son plein et que le battage est avancé. Le rendement du blé dans les jachères donne jusqu'à 25 boisseaux l'acre et l'échantillon est de qualité, se classant n° 2 nord et pesant de 60 à 62 livres le boisseau. Même si le rendement des chaumes n'atteint que 8 à 12 boisseaux, l'échantillon est bon et bien rempli. La pluie de la semaine dernière aidera les cultures tardives à se remplir mais n'augmentera pas le rendement. Les Pâturages se sont légèrement améliorés mais ne sont pas encore classés bons. Les champs de chaume sont en bon état et généralement libres de mauvaises herbes.

À Big Beaver, dans le sud central de la province, le temps a été chaud et sec et la mise en andains est à 75 p. 100 terminée. Le moissonnage-battage est commencé et le blé donne en moyenne 15 boisseaux l'acre et se classe nos 2 et 3 nord. La récolte de foin dans cette région a été bonne et les pâturages sont encore verts. À Val Marie, dans le sud-ouest de la province, la récolte est avancée et le blé donne 9 boisseaux, l'avoine, 25 boisseaux et l'orge 20 boisseaux l'acre. Le poids du blé le boisseau est de 58 livres environ. Le regain est meilleur que ce que l'on avait prévu.

La Ferme expérimentale de Swift Current signale que la mise en andains du blé s'est généralisée la semaine dernière et qu'elle avance rapidement. Une grande superficie sera tout simplement battue cette année. Le battage progresse dans les sols légers et le rendement est supérieur aux prévisions. L'échantillon est généralement bon. La récolte du seigle d'automne est presque terminée et le rendement est de 5 à 25 boisseaux l'acre. Le bétail est en bon état mais les pâturages sont très secs. La mise en andains est presque achevée à Leader et on y a fait du battage. L'échantillon est bon de même que le rendement dans cette région.

Dans l'est central de la province, à Melville, une partie des cultures hâtives a été mise en andains et moissonnée-battue. Le rendement dans ces champs est d'environ 10 boisseaux pour le blé et de 15 à 20 boisseaux pour les céréales secondaires. La fenaison est terminée mais les terres à pâturages sont médiocres. Les précipitations dans cette région n'ont atteint que 2.25 pouces durant la saison de croissance, au regard de la moyenne à longue échéance de 8.17 pouces. À Togo, la mise en andains s'est généralisée et l'on y a fait du moissonnage-battage.

Cependant, la végétation retarde les opérations dans quelques champs. La dernière gelée n'a causé aucun dommage apparent et la qualité et le rendement devraient être bons. Les pâturages sont très secs, la pluie n'étant pas tombée depuis le 7 août.

À Drake, dans le centre de la province, la mise en andains de la moitié de la superficie plantée en céréales a commencé et quelques céréales secondaires ont été passées à la moissonneuse-batteuse. Le rendement dans ces champs varie entre 10 et 25 boisseaux l'acre. La mouche à scie a quelque peu endommagé certains champs de blé et les grains de blé sont desséchés. Le moissonnage-battage sera général vers la semaine prochaine. Les pâturages sont secs. 50 p. 100 environ de la mise en andains sont terminés à Craik et le moissonnage-battage a commencé. Jusqu'a présent les échantillons indiquent que le boisseau de blé pèsera entre 60 et 63 livres, le rendement l'acre étant de dix à quinze boisseaux et la qualité no 2 du nord. Le seigle d'automne est en bon état, le rendement l'acre atteignant jusqu'à 35 boisseaux. La graine de lin vient également bien, mais les céréales secondaires sont en mauvais état. La récolte a commencé dans la région de Saskatoon, le rendement et la qualité en général dépassant de peu les prévisions. La récolte de colza semble excellente et l'on n'y voit que très peu de dégâts causés par la maladie. La Ferme expérimentale de Scott, dans l'ouest central de la province, indique que les récentes ondées tombées dans certains endroits feront beaucoup de bien à la récolte qui s'annonce bonne. Le seigle d'automne a été presque entièrement passé à la moissonneuse-batteuse et la mise en andains de l'orge et de l'avoine est générale. La mise en andains de la graine de colza a aussi commencé. Les conditions d'humidité sont généralement bonnes mais il y a des indications que des dommages sérieux peuvent être causés par la mouche à scie. Les récoltes sont également bonnes partout à Meota, dans le nord ouest de la province. La mise en andains progresse et devrait être générale vers la fin de la semaine. L'orge hâtive a déjà été passée à la moissonneuse-batteuse et les rendements sont bons. Les jachères sont en train d'être travaillées pour la quatrième fois et sont maintenant en bon état.

La Ferme expérimentale de Melfort signale que le temps chaud et sec hâte la maturation de toutes les récoltes. La mise en andains de l'orge progresse rapidement et la récolte du blé sera générale la semaine prochaine. Les céréales se remplissent bien en dépit de la sécheresse d'été mais les rendements sont de beaucoup inférieurs à ceux de l'an passé, surtout dans les terres déchaumées. Les tiges du colza argentin sont au-dessous de la moyenne mais étonnamment bonnes, compte tenu de la sécheresse. En général, les variétés polonaises ne donneront que de faibles rendements.

La Saskatchewan Municipal Hail Insurance Association signale les orages de grêle suivants: 7 août : dans la région s'étendant de Bromhead à Portal, de Viceroy à Weyburn, de Spring Valley à Fillmore, de Drinkwater à Francis et de Qu'Appelle à Whitewood. Des orages de faible intensité ont aussi eu lieu le 13 août à Minton et Big Beaver; le 14 août à Swift Current, Morse, Traynor et Arelee; le 16 août à Frontier et le 17 août à Vanguard. La Canadian Hail Underwriters Association signale des orages le 7 août dans la région de Chaplin à Moose Jaw, de Drinkwater à Lajord, de Claybank à Truax, de Lang à Handsworth, dans la région de Ceylon, de Torquay à Estevan, dans la région de Wolseley et le 14 août dans la région de Traynor.

La moyenne non pondérée des précipitations dans la province depuis le 1er avril a été 46 p. 100 au-dessous de la normale en comparaison de 47 p. 100 au-dessous une semaine plus tôt, de 49 p. 100 au-dessous il y a deux semaines et de 12 p. 100 au-dessus il y a un an. La température moyenne de la semaine terminée le 21 août a été de 4.4 degrés au-dessus de la normale au regard de 4.1 degrés au-dessus il y a une semaine, de 0.9 degré au-dessous il y a deux semaines et de 5.2 degrés au-dessous de la normale durant la semaine close le 22 août 1966.

ALBERTA

Le temps chaud et sec a fait mûrir les cultures plus rapidement partout en Alberta et le rendement sera probablement supérieur à ce qu'on avait d'abord prévu. Dans le sud, le blé et l'orge ont mûri prématurément, mais on prévoit des rendements moyens ou supérieurs à la moyenne. Une quantité appréciable de seigle, de blé d'hiver et d'orge a été mise en andains dans cette région. Les cultures sont généralement en bon état dans l'ouest central et le centre de la province, ainsi que dans le nord-est, bien que l'andainage y soit peu avancé. Au nord d'Edmonton et dans la région de la Rivière la Paix, on ne prévoit que des récoltes moyennes. Dans la région de Rivière la Paix, près de 20 p. 100 de l'orge a été moissonnée et, dans la plupart des régions, les rendements sont meilleurs que prévus et la qualité est bonne. La récolte de graine de foin est presque terminée et les rendements ne sont que passables.

Dans le sud-est, à Manyberries, les récoltes de seigle, d'orge et de blé ont donné des rendements de 7, 18 et 12 à 15 boisseaux l'acre respectivement. Le poids du boisseau d'orge varie de 44 à 50 livres et celui de blé s'établit à 60 livres. Les pâturages sont très secs, vu que l'humidité en surface n'équivaut qu'à 40 p. 100 de la normale et celle du sous-sol, à 60 p. 100. La perte de blé due à la sécheresse est estimée à 12 p. 100. On déclare que le bétail est en bon état. La moisson se généralise dans le voisinage de Medicine Hat; une partie du travail se fait à l'aide de moissonneuses-batteuses, mais la majorité de la récolte est mise en andains. Le rendement du blé devrait être en moyenne de 15 boisseaux, celui de l'avoine de 20, celui de l'orge de 25 et celui du lin de 10. Le bétail est en bon état mais les pâturages sont secs.

Dans le sud-ouest, dans les environs de Lethbridge, la moisson du blé d'hiver est presque terminée. Certaines céréales printanières sont en andains. La betterave à sucre promet de bons rendements mais on prévoit que ceux de la pomme de terre seront diminués. La mise en marché du maïs frais, qui est de bonne qualité, est commencée. La récolte des fèves bat son plein et la cueillette des concombres est en cours partout. Il n'a pas plu depuis deux semaines. Le nombre de sauterelles continue à augmenter dans le sud de la province et on prend certaines mesures pour les enrayer. Dans le voisinage de Cardston, la moisson et l'abattage du blé d'automne sont en cours partout et le rendement s'établit en moyenne à 30 boisseaux. La qualité de cette moisson s'établit au n° 2, Alberta hiver. L'andainage d'une partie de l'orge hâtive est également en cours. Les pâturages sont secs. Dans le nord, à Claresholm, on a commencé la moisson du blé d'hiver et du seigle et les rendements varient de 20 à 30 boisseaux l'acre. Cette région a reçu bien peu de pluie depuis le printemps, mais on prévoit que les rendements du blé du printemps et des céréales secondaires se rapprocheront de la moyenne. La récolte des céréales printanières aura lieu dans environ une semaine et la qualité devrait être bonne.

Dans le sud central, à Brooks, la récolte est en cours; le blé sur les terres irriguées a été moissonné et battu et son rendement est d'environ 40 boisseaux l'acre. Les pois de semence donnent de 1,200 à 1,500 livres l'acre et sont d'excellente qualité. Le battage de l'orge et la deuxième récolte de luzerne sont en cours. Les rendements et la qualité des céréales varient considérablement sur les terres sèches de la région. Dans les environs de Vulcan, le battage du seigle est terminé, de même que l'andainage de l'avoine et de l'orge. Le moissonnage-battage du blé avance bien. L'orge donne environ 45 boisseaux l'acre et on prévoit que le blé produira une vingtaine de boisseaux l'acre. La récolte de blé sera en cours partout dans 10 jours.

Dans l'ouest central de la province, autour de Calgary, des cultures mûrissent rapidement et une partie de l'orge a été mise en andains. Le battage de toutes les cultures se généralisera la semaine prochaine. Les cultures ont résisté à une longue période de sécheresse et de chaleur mieux que prévu et on s'attend à des rendements à peu près normaux. Le temps chaud et sec dans le voisinage de Olds fait mûrir les cultures rapidement et le battage et l'andainage d'une partie de l'orge et du colza ont été fais; les rendements sont passables. Le blé ne sera pas coupé avant une semaine.

Dans l'est central, à Sedgewick, la récolte avance rapidement. Le seigle a été mise en andains et 20 p. 100 de cette récolte a été battue; le rendement s'établit en moyenne à 30 boisseaux l'acre. Une partie du colza a été mise en andains et une petite partie a été battue. Le blé sera prêt pour l'andainage d'ici un mois. Un peu plus au nord, à Sedgewick l'andainage de l'orge est à peu près général et une bonne partie du colza a également été coupée. Une partie du battage de l'orge semée tôt est fait et, si le temps le permet, la mise en andains de toutes les cultures sera générale d'ici 10 à 15 jours. Les cultures se sont bien peuplées et on prévoit des rendements moyens ou un peu supérieurs à la moyenne. Dans le centre de la province, à Stettler, le temps a été favorable et une partie de l'orge a été récoltée. Les épis des céréales grossissent bien. La pluie des deux dernières semaines a totalisé plus de deux pouces. Dans le nord central, à Edmonton le temps chaud et sec a considérablement aidé les cultures à mûrir. La moisson des champs d'orge semée tôt est en cours et les rendements sont de passables à bons. Il faudrait maintenant que le temps demeure chaud. Dans le voisinage de Stony Plain, les cultures mûrissent très rapidement et environ 25 p. 100 de l'orge a été coupée et 5 p. 100 a été battue. Les rendements de l'orge sont très variables, se situant entre 15 et 65 boisseaux l'acre. Il est évident que les cultures engraissées sont supérieures, même par temps sec. La récolte du colza, de l'avoine et du blé commencera d'ici une semaine.

Dans l'ouest central, dans la région de Red Deer, les cultures se sont bien peuplées et le temps chaud les a fait mûrir rapidement. L'andainage est en cours et le battage est commencé. On prévoit un rendement supérieur à la moyenne. Les pluies récentes amélioreront les pâturages et la deuxième récolte de foin. Au nord de Lacombe, le temps chaud et sec des deux dernières semaines a fait diminuer les réserves d'humidité dans le sol. L'andainage de l'orge est commencé. Le foin et les pâturages sont très secs. À Eckville, la mise en andains a commencé le 18 août et se généralisera cette semaine. Le temps chaud et sec des deux dernières semaines a accéléré la croissance et causé un peu de détérioration. Les rendements du blé sont estimés à 28 boisseaux, ceux de l'avoine à 50, ceux de l'orge à 38, et ceux du colza à 24 boisseaux l'acre. Les jachères sont en bon état.

Dans la région de la Rivière la Paix, le temps sec dans les environs de Beaver Lodge a fait mûrir les cultures prématurément. De fortes quantités d'orge ont été mises en andains mais une partie de la récolte sera effectuée à l'aide de moissonneuses-batteuses. L'orge battue donne de 20 à 25 boisseaux l'acre. L'avoine sèche plutôt que de mûrir et on prévoit des rendements médiocres. Le blé en jachères résiste bien et on prévoit des rendements variant de 15 à 20 boisseaux l'acre. La fétuque a été moissonnée et donne en moyenne 150 livres l'acres. l'andainage du mélilot rouge et du trèfle d'alsike avance bien et promet de bons rendements.

L'Alberta Hail Insurance Board rapporte de la grêle aux endroits suivants: le 12 août, tempête d'ouest en est et dommages modérés à Edson, Rocky Rapids, Tomahawk; du 16 au 17 août, tempête au cours de la nuit à Warburg se déplacant au sud-est en passant par Ponoka, Morningside, Chigwell, Clive, Nevis, Fenn et Big Valley et causant des dommages graves aux cultures mûres et des dommages modérés aux autres.

La Canadian Hail Underwriters Association déclare également les tempêtes suivantes: le 6 août de Cardston à Coaldale et le 8 août dans la région de Two Hills.

La précipitation moyenne non pondérée dans la province depuis le 1er avril a été de 23 p. 100 inférieure à la normale, comparativement à 20 p. 100 inférieure la semaine dernière, 17 p. 100 inférieure la semaine précédente et contrairement à 11 p. 100 supérieure à la normale l'an dernier. La température moyenne de la semaine terminée le 23 août a été de 9.5 degrés supérieure à la normale, comparativement à 5.2 degrés supérieure la semaine dernière et contrairement à 0.4 degré inférieur la semaine précédente et 4.7 degrés inférieure durant la semaine terminée le 22 août 1966.

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Le temps continue d'être chaud et sec autour de Victoria. La cueillette des ronce-framboises et des framboises est terminée et le rendement est supérieur à la normale. On rapporte que la récolte de pommes, de cerises et de légumes sera normale. La récolte de maïs promet et les pommes de terre sont avancées, mais les pâturages souffrent de la sécheresse.

Dans la région d'Agassiz, la cueillette des framboises et la récolte de pois est terminée. Les rendements sont élevés et la qualité est bonne. La récolte de haricot commun est avancée et celle de maïs commence. Les pâturages sont très secs.

À Summerland, le temps chaud continu a accéléré la maturation des fruits. La cueillette des poires Bartlett bat son plein dans la partie centrale de la vallée de l'Okanagan tandis qu'elle est presque terminée dans la parties sud. La cueillette des pêches est presque terminée et celle des prunes d'Italie bat son plein. Le temps sec a cependant réduit le rendement du blé et du foin. Les pâturages sont en mauvais état.

Dans la région de Creston, le moissonnage du blé d'hiver et du triolet est terminé. Les rendements sont moyens et la qualité est supérieure à la normale. La seconde récolte de luzerne est engrangée, et quoique le rendement est moins bon que d'ordinaire, la qualité est supérieure. Les pâturages tarissent à la suite du temps chaud et sec, mais les fruits des vergers irrigués atteignent une bonne grosseur.

Autour de Prince George, la fenaison et l'ensilage sont terminés. La première pluie d'importance depuis la mi-juillet est tombée au cours des deux derniers jours et augmentera les chances d'une seconde récolte de foin.

À Dawson Creek, le temps chaud et sec fait mûrir les cultures rapidement. La récolte de la graine de fétuque est presque terminée et la fenaison est achevée. Les champs d'Alsike de semence mûrissent avant le temps, ce qui fait que les tiges sont courtes et la graine légère. On rapporte que la récolte de miel est faible à cause du temps sec.

À Fort St. John, le moissonnage de la fétuque est presque terminé. Le rendement moyen est d'environ 175 livres l'acre.

Precipitation and Temperature Data, Prairie Provinces(1)

Province and crop district	Station	Precipitation: Week ending 8 a.m. August 21/67	Precipitation: Total since April 1	Precipitation: Normal since April 1	Mean temperature week ending 8 a.m. August 21/67: 1967	Mean temperature: Normal
		inches			degrees F.	
MANITOBA						
1	Boissevain	trace	5.81	11.26	64	63
	Pierson	.19	3.70	10.26	65	64
	Waskada	N.R.	4.80(2)	10.79	N.R.	63
2	Baldur	N.R.	10.27(2)	10.95	64	64
	Pilot Mound	.46	10.31	10.92	64	64
3	Altona	.23	9.57	10.25	66	65
	Deerwood	nil	12.02	10.72	64	66
	Graysville	nil	13.69	9.70	N.R.	65
	Morden	.26	11.15	10.92	67	66
	Morris	.10	8.57	10.13	65	66
	Portage la Prairie	nil	10.21	12.41	66	65
	Roland	.03	10.54	10.35	70	65
4	Stonewall	.15	11.18	11.15	62	65
5	Emerson	N.R.	8.82(2)	10.69	N.R.	65
	Steinbach	trace	9.73	10.52	65	64
	Winnipeg	.44	12.57	10.86	64	65
	Starbuck	.03	9.86	10.55	65	65
6	Seven Sisters Falls	nil	10.44	10.54	64	64
	Great Falls	N.R.	8.74(2)	8.36	N.R.	65
	Sprague	.26	13.45	11.54	65	62
7	Rivers	.22	6.82	11.02	64	64
	Virden	nil	6.43	10.52	64	64
8	Brandon	.15	6.63	11.27	64	63
	Cypress River	.08	9.76	10.82	64	64
9	Gladstone	trace	7.60	10.79	62	64
10	Birtle	.16	6.85	11.11	62	61
	Rossburn	.24	8.19	10.22	63	62
	Russell	.22	7.40	9.12	62	61
11	Dauphin	.39	9.34	10.87	64	63
12	Arborg	.47	10.39	10.38	63	63
	Gimli	.44	10.53	11.10	65	63
	Steep Rock	N.R.	7.64(2)	9.60	N.R.	63
13	Swan River	.07	5.43	10.57	62	63
	The Pas	.11	6.43	9.16	62	61
14	Grass River	N.R.	6.28(2)	10.80	N.R.	63
MANITOBA AVERAGE		.16	9.12	10.58	64.2	63.8
SASKATCHEWAN						
1A	Carlyle	.07	6.30	9.67	64	62
	Estevan	.77	4.40	9.58	68	66
	Oxbow	nil	4.35	8.79	62	62
	Willmar	.22	5.25	10.30	60	N.R.

Precipitation and Temperature Data, Prairie Provinces(1)

Province and crop district	Station	Precipitation: Week ending 8 a.m. August 21/67	Precipitation: Total since April 1	Precipitation: Normal since April 1	Mean temperature week ending 8 a.m. August 21/67: 1967	Mean temperature: Normal
		inches			degrees F.	
SASKATCHEWAN - Continued						
1B	Broadview	.04	5.14	10.65	63	61
	Moosomin	nil	6.64	10.85	68	62
2A	Yellow Grass	1.04	5.40	9.31	68	63
	Weyburn	1.06	5.87	9.10	66	63
	Midale	.82	6.42	9.11	66	64
2B	Moose Jaw	.20	4.30	8.81	69	65
	Regina	.08	2.66	9.13	67	63
	Francis	.27	3.44	8.69	63	62
	Indian Head	.16	2.98	8.99	66	62
3AS	Ormiston	.72	2.39	9.20	71	63
	Cardross	.78	3.51	9.27	66	63
	Ceylon	.74	5.51	9.39	66	62
3AN	Chaplin	.50	6.04	7.92	67	63
	Gravelbourg	.52	3.60	7.70	67	64
3BS	Shaunavon	nil	3.90	8.04	66	62
	Pambrun	.30	3.94	8.54	69	63
	Climax	N.R.	.61(2)	7.32	N.R.	N.R.
	Aneroid	.34	3.62(2)	7.76	70	63
	Instow	nil	2.84(2)	8.10	60	62
3BN	Swift Current	.36	4.52	9.02	68	63
	Pennant	.22	3.38	7.96	67	63
	Hodgeville	.89	3.35	8.44	67	63
	Hughton	.07	2.24(2)	7.27	70	63
4A	Maple Creek	.04	8.00	7.43	72	63
	Consul	nil	4.62	6.86	69	62
4B	Abbey	N.R.	4.31(2)	7.55	N.R.	63
	Leader	.28	5.52	7.00	70	64
5A	Cupar	.04	3.49	8.80	65	63
	Balcarres	N.R.	2.81(2)	9.30	N.R.	N.R.
	Melville	nil	2.27	9.50	65	62
	Yorkton	.23	2.84	9.55	65	62
	Bangor	nil	5.17	9.86	64	62
5B	Wynyard	.13	2.86	8.99	65	61
	Foam Lake	nil	3.50	9.00	61	61
	Kuroki	.06	3.97	9.35	64	59
	Lintlaw	.01	4.11	9.51	62	58
	Kamsack	.06	3.95	8.94	64	63
6A	Davidson	nil	1.71	8.44	62	62
	Strasbourg	.11	2.41	9.15	67	62
	Watrous	.28	2.07	8.10	67	62
6B	Harris	N.R.	3.98(2)	7.15	N.R.	62
	Outlook	nil	2.74	7.21	69	63
	Rosthern	.02	6.66	7.68	68	61
	Saskatoon	.48	6.01	7.57	66	62
	Elbow	.04	1.40	8.69	70	63

Precipitation and Temperature Data, Prairie Provinces(1)

Province and crop district	Station	Precipitation: Week ending 8 a.m. August 21/67	Precipitation: Total since April 1	Precipitation: Normal since April 1	Mean temperature week ending 8 a.m. August 21/67: 1967	Mean temperature: Normal
		inches			degrees F.	
SASKATCHEWAN - Concluded						
6B	Tugaske	.45	2.83	8.79	67	62
	Dundurn	nil	4.45	7.44	67	63
7A	Alsask	N.R.	3.49(2)	6.74	N.R.	62
	Kindersley	.70	4.41	6.95	69	62
	Rosetown	trace	6.69	7.99	69	62
7B	Macklin	nil	6.57	7.91	68	61
	Denzil	.04	8.12	7.82	68	60
	Scott	nil	7.22	8.07	67	60
	Biggar	nil	5.95	7.78	67	62
8A	Hudson Bay	.01	4.96	9.80	62	60
	Prairie River	N.R.	5.65(2)	9.93	N.R.	59
8B	Humboldt	.11	3.60	7.92	67	61
	Melfort	.16	3.87	8.76	64	60
9A	North Battleford	.03	7.90	7.76	67	61
	Victoire	nil	6.15	8.43	65	58
	Prince Albert	nil	5.47	8.79	65	61
	Island Falls	N.R.	4.70(2)	9.34	N.R.	58
9B	Waseca	nil	8.18	8.87	66	59
SASKATCHEWAN AVERAGE		.22	4.61	8.56	66.3	61.9
ALBERTA						
1	Empress	.09	4.28	7.39	71	63
	Foremost	nil	9.52	7.53	73	64
	Manyberries	N.R.	6.87(2)	6.70	N.R.	64
	Medicine Hat	nil	6.58	7.27	73	65
2	Brooks	nil	5.29	7.57	70	62
	Drumheller	nil	3.86	7.75	72	60
	Gleichen	nil	6.71	8.70	74	60
	Hays	nil	8.01	6.76	73	64
	Rainier	nil	7.79	7.59	71	62
	Vauxhall	nil	9.16	6.98	70	62
	Raymond	nil	10.46	7.90	70	62
	Lethbridge	nil	10.71	8.94	70	62
	Trochu Equity	.01	3.55	9.58	70	60
	Vulcan	nil	10.87	9.36	70	62
3	Calgary	nil	6.41	10.70	67	58
	Cardston	nil	11.58	9.91	72	60
	Pincher Creek	nil	12.62	10.70	70	58
	Fort MacLeod	nil	11.28	9.95	73	63
	High River	nil	10.93	10.90	65	57
	Magrath	nil	11.33	9.90	73	63
	Olds	nil	7.59	11.29	67	58

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA
1010523799

Precipitation and Temperature Data, Prairie Provinces(1)

Province and crop district	Station	Precipitation: Week ending 8 a.m. August 21/67	Precipitation: Total since April 1	Precipitation: Normal since April 1	Mean temperature week ending 8 a.m. August 21/67: 1967	Mean temperature: Normal
		inches			degrees F.	
ALBERTA - Concluded						
4	Alliance	.21	7.17	8.46	69	59
	Coronation	.08	4.05	8.45	70	59
	Hughenden	N.R.	6.36(2)	8.48	N.R.	59
	Lloydminster	nil	7.28	8.71	67	61
	Stettler	.88	7.06	9.66	68	59
	Vegreville	nil	7.05	9.20	68	59
	Ranfurly	trace	7.44	9.80	68	59
	Vermilion	nil	7.98	9.14	66	58
5	Edmonton	trace	7.41	11.20	65	59
	Lacombe	.16	6.57	11.28	67	58
	Red Deer	nil	8.01	10.69	67	58
	Rocky Mountain House	nil	8.57	12.60	67	57
	Wetaskiwin	.20	6.43	10.91	68	58
6	Athabasca	N.R.	4.17(2)	10.04	N.R.	57
	Campsie	.14	3.06	11.52	65	57
	Edson	nil	7.04	12.49	67	55
	Elk Point	nil	7.69	9.45	65	57
	Lac la Biche	.01	9.30	9.64	66	58
	Whitecourt	nil	3.53	12.05	66	56
7	Beaverlodge	nil	3.50	8.55	67	57
	Fairview	trace	4.65	8.56	69	57
	Ft. Vermilion	.08	8.08	7.14	65	57
	Grande Prairie	.03	3.58	8.49	68	57
	High Prairie	N.R.	2.73(2)	9.72	N.R.	57
	Peace River	.09	3.32	7.06	67	56
	Rycroft	nil	3.40	8.79	68	57
	Wagner	.01	4.33	8.72	68	56
ALBERTA AVERAGE		.05	7.16	9.25	68.8	59.3

N.R. - No report.
(1) Source: Meteorological Service of Canada.
(2) Incomplete; not included in average.