Agriculture

22-002F
no 9
1968
3 juin
c. 3

Pou é le
5 ju h. de
l'après-midi (H.A.E.)

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

OTTAWA - CANADA

Publication autorisée par le ministre du Commerce

Série de 20 rapports: $4.00

Séries de Rapports sur les Grandes Cultures — N° 7

RAPPORT TÉLÉGRAPHIQUE SUR LES CULTURES — CANADA

Le Bureau fédéral de la statistique publie aujourd'hui le deuxième d'une série de six rapports télégraphiques sur l'état des cultures à travers le Canada. Le présent rapport comprend en outre le quatrième d'une série de onze rapports télégraphiques sur l'état des cultures dans les provinces des Prairies. Les renseignements sur lesquels reposent ces rapports sont fournis par des correspondants agricoles spécialement désignés des ministères fédéral et provinciaux de l'Agriculture, par des observateurs particuliers et par des entreposeurs de céréales. Les renseignements météorologiques proviennent de la Division de la météorologie, ministère des Transports.

SOMMAIRE

Provinces Maritimes. — Les pluies récentes ont amélioré les conditions de la croissance dans toutes les régions des provinces maritimes. Dans l'Île du Prince-Édouard la plupart des cultures ont été semées. La gelée a quelque peu endommagé les fraisiers dans certaines régions et les premières plantations de tabac en ont aussi souffert. Plus d'humidité et une température plus élevée sont nécessaires en Nouvelle-Écosse. Dans la région du Cap Breton une grande partie de l'ensemencement reste à faire alors qu'à Antigonish et Pictou la plupart des céréales ont été semées. Des rapports en provenance d'Amherst et du centre de la Nouvelle-Écosse signalent que l'ensemencement est presque terminé et que la superficie plantée de maïs a considérablement augmenté. La gelée a causé peu de dommage aux fraisiers et aux bleuets. L'ensemencement est terminé dans la vallée de l'Annapolis. La gelée a causé des dommages importants aux cultures de pommes, de fraises et de pommes de terre dans certaines régions mais il a été impossible d'évaluer toute l'étendue des dommages. Le Nouveau-Brunswick signale que toutes les cultures ont été semées tôt, que les travaux agricoles progressent avec deux semaines d'avance et que les arbres fruitiers bourgeonnent sept à dix jours plus tôt que d'habitude. Des gelées récentes ont endommagé les fraises mais les pommes n'en ont pas souffert.

Québec. — En mai, on a enregistré des températures moyennes partout dans le Québec. Quelques gelées tardives n'y ont pas causé des dommages importants. Il a plu occasionnellement et légèrement et dans de nombreuses régions la sécheresse a retardé la croissance. Les semailles progressent dans la région environnant Montréal et ailleurs les travaux des champs ont avancé rapidement. La germination est lente mais la récolte s'annonce bonne. Le manque d'humidité a retardé la croissance du foin et la végétation des pâturages. En ce moment les champs de pommes de terre, de betteraves sucrières, maïs à grain et les cultures maraîchères sont en bonne condition. Au fur et à mesure que croissent les herbes le bétail, qui a bien passé l'hiver, est mis au pâturage. La production laitière est à peu près normale. Bien qu'on puisse s'attendre à une excellente récolte de fruits des diverses variétés il est à noter que les bleuets en particulier viennent très lentement.

Nota: Sans Terre-Neuve, dont les chiffres ne sont pas disponibles.

Division de l'agriculture, Section des cultures.

5502-509

Le présent document peut être reproduit en toute liberté pourvu qu'on indique qu'il émane du B.F.S.

Ontario. — Le temps frais et humide a retardé les travaux agricoles au cours du mois dernier. On estime à environ 10 p. 100 les pertes de blé à la suite des dégâts de l'hiver. Le mauvais temps a retardé la croissance des céréales semées au printemps, du blé, du maïs du foin et des pâturages. Les pommes de terre sont presque toutes plantées et les variétés précoces sont sorties de terre. Le sol est maintenant prêt pour la plantation des haricots secs et l'ensemencement en soya est terminé dans une proportion d'environ 50 p. 100 malgré les retards attribuables au temps humide. Toutes les régions de la province, auraient particulièrement besoin de chaleur et de soleil.

Provinces des Prairies. — Les semailles sont presque terminées, pour toutes les cultures, dans les provinces des Prairies. La germination est bonne dans la plupart des régions et la croissance est bien démarrée. Bien que les pluies récentes aient amélioré les conditions hygrométriques de la surface du sol, les réserves d'humidité sont par contre encore limitées dans un grand nombre d'endroits. Les mauvaises herbes, en particulier la folle avoine, poussent dans les champs ensemencés les premiers et la pulvérisation est maintenant en cours partout. L'état du foin et des pâturages varie mais s'améliore.

Colombie-Britannique. — Grâce à des pluies tombées à point et au temps plus chaud, il y a eu amélioration sensible des pâturages et de la culture du foin en Colombie-Britannique. Toutefois, la température normale et des pluies presque sans précédent du 31 mai au 2 juin, ont causé des pertes lors de la première fenaison. Dans la région de Summerland, les perspectives sont généralement bonnes pour ce qui est de la récolte de fruits, sauf les cerises et les abricots. À Vernon, dans l'Okanagan, le temps humide et frais des deux dernières semaines de mai a atténué la sécheresse et a amélioré l'état hygrométrique du sol. Le mois de mai a été froid et sec à Prince George. À Smithers, dans la région de la rivière Skeena, le temps chaud du début de mai a favorisé la croissance des cultures. Dans la région de Fort St. John, l'ensemencement est terminé dans une proportion d'environ 95 p. 100 mais la germination est inégale dans les endroits ensemencés les derniers en raison de la sécheresse de la couche arable.

MARITIMES

Partout dans les Maritimes, les pluies récentes ont amélioré les conditions de croissance, mais plusieurs régions ont encore besoin de pluie, surtout dans les pâturages et les champs de foin. Dans l'Île du Prince-Édouard, la plupart des cultures ont été semées, et les céréales semées tôt poussent bien. Toutefois, les nouveaux prés et pâturages ont besoin de plus de pluie. Le gel a endommagé les fraisiers et les plantations de tabac à divers degrés, suivant les endroits.

Toutes les régions de la Nouvelle-Écosse ont besoin de plus de pluie et de chaleur pour stimuler la croissance. Dans la région de Cap Breton, il reste encore beaucoup de semailles à faire. Même si le bétail a été envoyés aux pâturages, il y a très peu d'herbe, vu que la pousse a été lente. La plupart des céréales ont été semées dans les régions d'Antigonish et de Pictou. Le bétail trouve suffisamment d'herbe dans les pâturages. Dans la région d'Amherst et dans le centre de la Nouvelle-Écosse, l'ensemencement est presque terminé et on rapporte une augmentation importante des superficies ensemencées de maïs. Les nuits froides ont ralenti la pousse de l'herbe et du foin. Le gel a causé des dommages dans les champs de fraises et de bleuets. La plantation des légumes est presque terminé. Les semailles sont terminées dans la vallée d'Annapolis. Le gel a endommagé les pommes, les fraises et les pommes de terre, mais les dégats ne semblent pas graves.

Au Nouveau-Brunswick, toutes les cultures ont été semées tôt et les travaux des champs sont d'au moins deux semaines en avance sur la normale. La pluie tombée à la fin de mai et au début de juin a fourni à plusieurs cultures l'humidité dont elles avaient besoin. Le repiquage du tabac a commencé le 29 mai, et la plantation des légumes a débuté deux semaines plus tôt que la normale. La pousse est excellente. Les arbres fruitiers ont bourgeonné de 7 à 10 jours plus tôt que la normale, mais le temps frais en a retardé la floraison. Les dommages causés par le gel aux fraisiers a été général et il s'ensuivra une réduction de 15 p. 100 de la récolte. On ne rapporte pas de dommages aux pommes. Selon les premières estimations, les superficies ensemencées de cruciféracées sont accrues.

QUÉBEC

Dans le sud-ouest du Québec, pendant tout le mois de mai, une température moyenne de 50 degrés et des précipitations d'environ 3 pouces ont produit d'excellentes conditions d'ensemencement, de germination et de croissance en général. Malgré certains dégâts causés par l'hiver, les pommiers ont bien passé la saison hivernale et étaient en pleine floraison le 15 mai. La nouure a été bonne mais la tavelure de la pomme commence à être cause d'inquiétude. Par ailleurs, le nombre d'insectes nuisibles aux arbres fruitiers est à peu près normal.

Aux alentours de Normandin, dans la région du lac Saint-Jean, le mois de mai a été légèrement plus chaud que d'habitude et très sec, les précipitations n'ayant été que de 0.4 pouce. Grâce au beau temps, l'ensemencement s'est terminé tôt mais le foin des prés et des pâturages n'a poussé que lentement. Heureusement, les pluies tombées les 1er et 2 juin ont atténué quelque peu la sécheresse. Les bovins sont au pâturage et la production du lait est à peu près normale.

Dans la région de Montréal, les travaux d'ensemencement sont bien avancés et le plantage des pommes de terre est presque terminé. On prévoit une bonne récolte de celles-ci, ainsi que de la betterave sucrière, du maïs à grain et des légumes.

ONTARIO

Dans le comté d'Essex, dans le sud de l'Ontario, les fortes pluies de la fin de mai ont retardé les semailles, mais la presque totalité du maïs et des tomates pour la conserve sont plantés. Une bonne partie du soja n'est pas encore semée mais les pois pour la conserve sont semés et poussait bien. La récolte des laitues est en cours et celles-ci sont de bonne qualité. Les autres légumes hâtifs poussent bien, les pommes de terre en particulier. Le rendement des tomates et des concombres de serre est bon et leur qualité est excellente. Dans le comté de Kent, les fortes pluies de trois à quatre pouces du 20 mai ont endommagé les cultures et ralenti la plantation du soja et des tomates. La croissance du maïs, du tabac et des tomates a été retardée mais les céréales, le foin et les pâtures poussent bien cette année, le maïs à grain a été planté plus tôt que toutes autres années et près de 75 p. 100 du soja est semé. On devrait commencer cette semaine à planter les haricots blancs. La fenaison a commencé cette semaine mais il faudrait plus de chaleur pour stimuler la végétation et la croissance. Les légumes hâtifs sont en général en bon état sauf les choux dans certaines régions. La gelée du début de mai a quelque peu endommagé les tomates et dans certains champs il a fallu replanter de nouveaux plants. On apprend du laboratoire de Chatham du ministère fédéral de l'Agriculture que la saison semble favorable à la mouche des légumineuses qui a déjà causé des dégâts. De même, le ver fil-de-fer a attaqué les tomates.

Dans le comté de Middlesex, les cultures ont souffert du temps frais mais les réserves d'humidité sont suffisantes. Le soja est en grande partie semé. Le foin et les pâtures sont courts à cause de la lenteur de la végétation mais la chaleur leur fera du bien. Le temps pluvieux et froid persistant a retardé les semailles du maïs dans les sols lourds du comté de Norfolk. Les céréales de printemps poussent bien mais ces cultures ont également besoin d'un beau temps chaud. Le foin et les pâtures ont également été retardés. Le seigle d'automne commence à épier mais en ce qui concerne le blé il faudrait de la chaleur pour enrayer la mosaïque du blé très répandue.

La plantation du tabac est presque terminée. Un rapport du comté de Lincoln signale que les arbres fruitiers déjà fleuris ont souffert de la gelée du 5 et 6 mai et que la nouure des fruits est irrégulière. La première floraison des fraises a été à peu près détruite tandis que la nouure de certaines variétés de cerises sucrées est très médiocre. On prévoit actuellement une faible récolte de poire Bartlett mais une récolte passable à bonne pour les pêches et les pommes. L'hiver a endommagé les vignes. L'humidité du sol est normale.

Dans le comté de Simcoe, les céréales de printemps et la majeure partie du maïs sont semés mais le temps exceptionnellement froid a ralenti la végétation. Cependant les céréales de printemps tallent bien. L'hiver a causé de gros dégâts au trèfle et à la luzerne mais les champs nouvellement semés sont beaux. La fenaison doit commencer vers la mi-juin. Il faudrait surtout de la chaleur pour la plupart des cultures. Dans le comté de Bruce, les perspectives de récolte s'annoncent excellentes et les réserves d'humidité sont suffisantes. Maintenant il fait chaud, ce qui devrait accélérer la végétation. Le maïs est planté et la pulvérisation est en cours. On sème actuellement les navets. Dans le comté de Waterloo, les conditions hygrométriques s'améliorent et les perspectives sont bonnes pour toutes les cultures. Toutefois, il faudrait plus de chaleur pour activer la végétation. La fenaison commencera dans une dizaine de jours. Dans le comté de Wellington, les cultures semblent prometteuses mais le temps frais et humide retarde la végétation. Des températures au-dessous de la normale et plus de 3 pouces de pluie au cours de mai ont ralenti la végétation du foin et du maïs. Le maïs a germé très lentement et la plupart des champs sont très jaunis. Les céréales et le blé de printemps sont en avance sur la normale. En ce qui concerne la luzerne les dégâts de l'hiver ont été importants. La pulvérisation contre les mauvaises herbes a été considérablement retardée et, dans nombre de cas, ne se fera peut-être pas.

Dans le comté de York, dans le centre de l'Ontario, la croissance de toutes les cultures est très lente à cause du froid et de la saison tardive. Les champs de maïs semés les premiers ont été ceux qui ont le plus souffert et, dans certains cas, il ont dû être réensemencés. Dans le comté de Durham, des pluies violentes ont encore retardé l'ensemencement du maïs et une grande étendue d'orge a souffert du froid et de la pluie. En ce qui concerne la luzerne les dégâts de l'hiver sont plus graves qu'on ne l'avait crû au début. Le mois de mai a été généralement humide et frais dans le comté de Peterborough mais les réserves d'humidité sont suffisantes. Le maïs est semé en quasi-totalité mais les céréales de printemps souffrent de la trop grande humidité. La pulvérisation contre les mauvaises herbes vient juste de commencer.

Dans le comté de Leeds, les céréales de printemps sont presque toutes semées mais une partie du maïs reste à semer. Les averses récentes ont beaucoup amélioré la végétation du foin et des pâturages mais il faudrait maintenant de la chaleur. Dans le comté de Carleton, le maïs semé le premier et les céréales de printemps sont sortis de terre et les champs sont beaux.

Une petite quantité de maïs reste encore à semer. Grâce aux pluies récentes les conditions hygrométriques sont excellentes. Les perspectives de récolte se sont grandement améliorées dans le comté de Renfrew, grâce à la pluie et à la chaleur. Les champs de luzerne ont été gravement endommagés par l'hiver. Le maïs est bien démarré.

On signale de Kapuskasing, dans le nord de l'Ontario, que le mois de mai a été le plus aride que l'on ait jamais vu depuis 1926. Les céréales semées les premières ont germé de façon normale mais les champs ensemencés après le 17 mai souffrent de la sécheresse et des températures au-dessus de la normale. Le foin et les pâtures sont en retard sur la normale mais maintenant elles poussent bien grâce aux pluies du 1er et du 2 juin. Des bonnes pluies sont tombées la semaine dernière dans la région de Thunder Bay ce qui a amélioré les conditions hygrométriques du sol. Les semailles ont été retardées mais près de 70 p. 100 des céréales de printemps et des pommes de terre sont en terre. Les pâturages et les prairies poussent bien.

MANITOBA

Les semailles sont terminées dans la proportion de 95 p. 100 dans les districts de l'ouest et du sud du Manitoba. Dans le reste de la province, elles sont faites dans une proportion de 50 p. 100 à cause de l'humidité excessive. La superficie réservée au blé et aux céréales secondaires dans les régions où les travaux ont été retardés sera peut-être ensemencée en lin ou en végétaux à maturation croissance rapide. Les districts de Dauphin et de Melita manquent de pluie. Les cultures hâtives poussent bien. La folle avoine, le mil sauvage et les autres mauvaises herbes causent des soucis, et la pulvérisation a commencé. Les pâturages et les cultures fourragères s'améliorent rapidement.

Les cultivateurs ont terminé environ 85 p. 100 de leurs semailles dans la région de Dominion City, Ridgeville et Emerson et les conditions s'annoncent bonnes. Aux environs d'Arnaud et de Carlowrie, toutefois, ils n'ont effectué que 10 p. 100 des semailles et devront peut-être reprendre l'ensemencement d'une bonne partie des champs où la pousse est irrégulière en raison de l'humidité excessive des terrains bas. À Altona, l'ensemencement est pratiquement terminé sauf dans les sols lourds et toutes les semences spéciales ont été semées à l'exception du sarasin, de la moutarde et d'une partie du lin. La plupart des cultures sont sorties et les céréales semées tôt ont atteint une certaine hauteur. Les mauvaises herbes posent de sérieux problèmes mais la pulvérisation va bon train, bien que des pluies intermittentes aient gêné les travaux. Le foin et les pâturages poussent très bien sous l'influence de l'humidité abondante du sol. Les semailles de blé sont presque terminées dans le district de Morden et 75 p. 100 des semailles en général. La chaleur et l'humidité ont favorisé la croissance. Le lin semé tôt pointe uniformément et les pois semés tôt sont maintenant hauts d'environ quatre pouces. Cependant, certaines parties de l'est de la région souffrent d'un excès d'humidité. On a commencé la pulvérisation des mauvaises herbes latifoliées, et quelque 5 p. 100 du travail est achevé. On signale une forte infestation de folle avoine, et bon nombre de champs ensemencés tôt ont été labourés et ensemencés de nouveau. Le millet pousse fortement et il faudrait du beau temps pour la vaporisation.

Les cultivateurs du district de Pilot Mound ont effectué 90 p. 100 des semailles et on prévoit que les semailles seront entièrement terminées d'ici la fin de la semaine. Les conditions hygrométriques du sol sont excellentes et les réserves du sous-sol, bonnes. On commence à apercevoir du vulpin vert, mais la mauvaise herbe la plus répandue est la folle avoine. À Somerset, le temps pluvieux a ralenti les

semailles. Les conditions se sont améliorées à la fin de la semaine dernière et sont restées telles jusqu'à l'orage du 3 juin. On a terminé environ 60 p. 100 des semailles. Il reste encore du lin et de l'orge à semer. Les cultures hâtives poussent très bien et de nombreux cultivateurs pulvérisent pour contrôler la croissance de la folle avoine. À Melita, il n'y a pas eu de pluie la semaine dernière. Les conditions hygrométriques ne sont que médiocres à la surface et certaines cultures tardives pointent de façon inégale. Les réserves d'humidité du sous-sol sont faibles. Les cultures hâtives en sont à leur quatrième feuille, mais elles auront besoin d'humidité d'ici une semaine pour continuer à croître. On pulvérise maintenant partout. L'état des pâturages est médiocre et les perspectives du foin vont de "médiocre" à "mauvais".

Dans le district de Beauséjour, environ 65 p. 100 de la superficie est ensemencée. Les semailles de blé sont terminées dans la proportion de 90 p. 100. Dans les environs de Dugald de Springbank et de Parkbank, toutefois, seulement 35 p. 100 de la terre a été ensemencée à cause des fortes pluies. Cependant, la terre sèche et l'activité reprend. En dépit de l'humidité excessive, les cultures poussent bien. On pulvérise la folle avoine dans certaines régions. Les averses de la semaine dernière ont empêché la plupart des cultivateurs du district de Selkirk de faire les semailles, de sorte que 50 p. 100 seulement de la superficie cultivée a été ensemencée. L'humidité excessive, soit environ un pouce et un pouce et demi au-dessus de la normale, fait que les mauvaises herbes poussent rapidement, surtout la folle avoine. Les pâturages et le foin poussent bien et la plantation de la plupart des légumes est achevée.

À Stonewall, 70 p. 100 des semailles sont terminées; elles sont moins avancées dans le district de Rosser. La pluie, qui est tombée pendant la soirée du 3 juin, a causé un nouveau retard évalué à un jour à un jour et demi. Sur certaines superficies on a remplacé le lin par l'avoine et l'orge. Les pâturages et le foin poussent bien. Environ 80 p. 100 des semailles sont terminées à Portage-la-Prairie. Les bonnes pluies de la semaine dernière ont maintenu l'humidité du sol à un niveau très élevé, et la folle avoine déborde dans plusieurs champs. Par ci, par là des vers fil-de-fer ont fait leur apparence.

De Brandon on signale la fin des semailles. Il ne reste que quelques champs à réensemencer à cause des mauvaises herbes. Les cultures émergent de façon égale et les céréales tôt semées tallent bien malgré le temps plutôt frais. L'abondance de la folle avoine et du vulpin vert des prés a nécessité le traitement chimique de superficies étendues. L'état des pâturages et les prairies est bon, mais il faudra de la pluie prochainement. Dans la région de Virden, il faisait chaud à la fin de la semaine dernière. Les semailles sont presque terminées et les cultures tôt semées apparaissent et passent au stade de la double ou de la triple feuille. La folle avoine cause des soucis et la pulvérisation a été faite en partie. Le seigle d'automne monte en épis et l'état des pâturages et des prairies s'améliore.

À Teulon, dans le région des lacs, les pluies fréquentes de la semaine dernière ont arrêté les semailles. Environ 70 p. 100 de la superficie est ensemencée. La folle avoine est très abondante. Le foin et les pâturages sont en excellent état et les conditions sont en général assez bonnes et les réserves d'humidité, suffisantes. À Arborg, le temps était variable la semaine dernière et il est tombé 1.19 pouces de pluie, d'où impossibilité de poursuivre les travaux des champs avant le 3 juin. Près de 50 p. 100 des semailles sont terminées et environ un tiers des champs commencent à verdir. La végétation est lourde dans les jachères et l'herbe pousse bien dans les pâturages.

Dans le centre ouest de la province, à Neepawa, des averses dispersées ont apporté jusqu'à un pouce d'humidité et ont retardé les travaux agricoles. Toutefois, environ 90 p. 100 des semailles sont faites. La germination est excellente et les réserves d'humidité, suffisantes. Les mauvaises herbes sont abondantes et de plusieurs endroits on signale l'apparition du ver gris dans les cultures qui viennent de sortir de terre. Jusqu'ici il y a eu peu de sauterelles.

Les rapports de la région de Russell indiquent que les semailles sont en partie terminées. Il y a eu des averses dispersées et les réserves d'humidité sont bonnes. La germination est très bonne et la pulvérisation des mauvaises herbes commencera cette semaine. Dans la vallée de la rivière Swan, les pluies ont été générales la semaine dernière et les dernières semailles seront terminées cette semaine. La destruction de la folle avoine au moyen de produits chimiques est générale en ce moment et la pulvérisation des mauvaises herbes latifaliées a commencé. On commence aussi à réensemencer certaines superficies.

Le laboratoire de phytopathologie de la station de recherche de Winnipeg du ministère fédéral de l'Agriculture signale la nielle du blé d'hiver continue à se répandre aux États-Unis, mais que la rouille de la tige est rare. Quelques spores de rouille de la feuille ont été constatées à Indian Head le 29 mai et à Winnipeg le 2 juin, mais il n'est pas possible encore de prédire comment évoluera la rouille dans l'ouest du Canada en 1968.

La précipitation moyenne non pondérée dans la province, depuis le 1er avril a été de 31 p. 100 au-dessus de la normale contre 41 p. 100 au-dessus de la normale une semaine plus tôt, 79 p. 100 au-dessus de la normale deux semaines plus tôt et 60 p. 100 au-dessus de la normale il y a un an. La température moyenne de la semaine terminée le 3 juin 1968 était de 0.3 degré au-dessus de la normale contre 2.7 degrés au-dessous de la normale une semaine auparavant, 8.3 degrés au-dessous de la normale deux semaines plus tôt et 3.6 degrés au-dessus de la normale durant la semaine terminée le 5 juin 1967.

SASKATCHEWAN

Les semailles sont presque terminées en Saskatchewan et les cultures ont eu un excellent départ. La germination se fait bien et le temps plus chaud a stimulé la croissance. Les conditions hygrométriques sont généralement favorables dans la plupart des régions par suite des pluies récentes, mais les réserves dans le sol sont limitées, surtout dans les régions de l'ouest. La pulvérisation des mauvaises herbes est en cours et l'infestation de folle avoine est abondante dans beaucoup de champs ensemencés tôt. On n'a signalé que peu d'insectes.

La Ferme expérimentale d'Indian Head, dans le sud-est de la province, signale que les semailles sont terminées et que la germination de toutes les cultures est excellente. Les cultures semées tôt ont entre cinq et six pouces de taille. Il y a eu peu de pluie au cours de la semaine écoulée et il faudra de l'humidité prochainement pour que la croissance des cultures se maintienne. Les travaux battent leur plein dans les jachères et les mauvaises herbes disparaissent rapidement vu la sécheresse de la couche arable et le temps sec. On commence à vaporiser les mauvaises herbes. On n'a signalé aucun dommage causé par la larve de taupin ni par le ver gris. Le foin et les pâturages croissent très lentement et il faudrait de la pluis immédiatement.

Le bétail est en bon état. À Fillmore, les semailles sont terminées et la plupart des jachères ont été cultivées. Les cultures sortent du sol de façon très éparse et il a fallu faire de nouvelles semailles par ce que la pousse était trop lente et à cause de la croissance excessive de la folle avoine. Le seigle d'automne semble mince et inégal. Les pâturages et le foin cultivé sont dans un état passable, et les jardins donnent bien. Il faudrait une pluie générale et de la chaleur pour hâter la croissance de toutes les cultures.

La germination a été uniforme dans la région de Swift Current, dans le sud-ouest de la province, et les cultures ont eu un bon départ. La pluie, au cours des deux dernières semaines, a grandement varié même à l'intérieur de secteurs restreints. La mauvaise herbe en début de croissance est abondante et la vaporisation devrait se généraliser cette semaine. Le seigle d'automne commence à épier et aura besoin de pluie pour bien se remplir. La récolte de foin sera peu abondante. À Leader, les cultures poussent bien et, dans les champs semés tôt, elles ont jusqu'à six pouces de taille. Les réserves d'humidité sont bonnes. La vaporisation contre les mauvaises herbes est commencée. Les cultures poussent bien aussi à Eastend. Même s'il y a eu des averses dans toute la région, elles ont été éparses et il faudra encore de la pluie pour stimuler la croissance. Les pâturages naturels et les pousses de crételle se dessèchent. On a terminé le premier arrosage dans les projets d'irrigation et les champs de foin irrigués poussent bien.

À Melville, dans la région est centrale de la province, les semailles sont terminées et les conditions hygrométriques sont bonnes; il est tombé près de 2 pouces de pluie jusqu'ici, contre un quart de pouce l'année dernière. Certaines cultures sont gravement infestés de folle avoine. Les cultures fourragères poussent bien et les pâturages sont en bon état. Les cultures sont en excellent état aux environs de Togo. Les tiges de blé sont fournies et la réserve d'humidité de la couche arable est bonne. Il reste encore de l'orge à semer. La vaporisation des mauvaises herbes se poursuit; l'enrayage des mauvaises herbes constituera un problème, vu les lourdes infestations de folle avoine et de vulpin des prés. Le foin et les pâturages croissent de façon excellente. Les semailles sont aussi terminées dans la région de Sturgis. Les labours de jachères et la vaporisation des mauvaises herbes se poursuivent. Toutes les cultures ont excellente mine depuis la pluie récente, mais l'infestation de folle avoine causera des ennuis. Le seigle d'automne donne bien, et le foin et les pâturages sont en bon état. Il est tombé jusqu'ici 2.55 pouces de pluie.

Les cultures sont sorties du sol et poussent bien dans la région de Saskatoon, dans le centre de la province. Les conditions hygrométriques sont bonnes à la suite de la pluie de la semaine dernière; il en est tombé près d'un pouce et demi. Les pâturages naturels s'améliorent. Bien que les sauterelles commencent à éclore, on ne s'attend pas que l'infestation soit grave. Les altises attaquent quelques champs de colza et de moutarde.

À Rosetown, dans la région ouest-centrale de la province, quelque 2.70 pouces de pluie sont tombés la semaine dernière et les cultures semblent être en très bon état. La plupart des champs devront être vaporisés à cause des mauvaises herbes. Les pâturages et les champs de foin se sont grandement améliorés. On a sensiblement augmenté la superficie ensemencée de lin et de durum dans cette région. La plupart des jachères ont été labourées. Bien que les pluies récentes aient été bienfaisantes pour la pousse dans le secteur de Scott, une bonne pluie générale serait très profitable. La plupart des cultures verdissent et la vaporisation contre les mauvaises herbes se généralisera d'ici une semaine. On entreprend maintenant la vaporisation de la folle avoine déjà poussée. La croissance des pâturages naturels est piètre,

mais celle des pâturages cultivés est meilleure. Plus au nord, à Meota, les semailles sont terminées et l'on a commencé à vaporiser les champs ensemencés tôt, afin d'enrayer l'infestation assez abondante de mauvaises herbes. On a labouré les jachères une fois et, dans certains cas, deux fois. Le foin et les pâturages ne sont que passables et il faudrait de la pluie prochainement pour qu'ils s'améliorent. La précipitation est bien inférieure à la normale dans ce secteur, n'étant que d'un pouce comparativement à une moyenne à long terme de 2.28 pouces.

La Ferme expérimentale de Melfort, dans le nord-est de la province, signale que les semailles sont presque achevées et que les conditions hygrométriques sont généralement satisfaisantes. La germination est uniforme et les champs semés tôt font de bons progrès. Toutefois, l'infestation de folle avoine crée des problèmes dans certaines régions, vu qu'on a pas pu en enrayer la croissance avant les semailles. Les pâturages et le foin font de bons progrès.

La précipitation moyenne non pondérée dans la province depuis le 1er avril a été de 12 p. 100 au-dessous de la normale contre 31 p. 100 au-dessous de la normale une semaine plus tôt, 23 p. 100 au-dessous de la normale deux semaines plus tôt et 43 p. 100 au-dessous de la normale il y a un an. La température moyenne durant la semaine terminée le 3 juin a été de 2.1 degrés au-dessus de la normale contre 1.1 degré au-dessus de la normale une semaine auparavant et 6.2 degrés au-dessous de la normale deux semaines plus tôt et 2.2 degrés au-dessus de la normale durant la semaine terminée le 5 juin 1967.

ALBERTA

Par suite de pluies récentes, les cultures se sont généralement amélioré depuis le dernier rapport dans une grande partie de l'Alberta. La quasi-totalité du blé et du lin, environ 75 à 80 p. 100 de l'avoine et de l'orge et 60 à 70 p. 100 de la graine de colza sont semés. On prévoit que les semailles seront terminées au cours de la semaine prochaine. Les cultures sont, dans l'ensemble, en bon état et la germination est égale, sauf dans certaines régions du centre nord de la province. Toutefois, la végétation est lente à cause du temps froid qui persiste. La folle avoine envahit en particulier les champs ensemencés, les premiers.

Dans le centre sud de la province, à Manyberries, le seigle d'automne atteint environ 8 à 10 pouces de hauteur, le seigle de printemps 5 pouces et le blé environ 5 pouces. Le bétail est en bon état. À Medicine Hat, les pluies intermittentes de la semaine dernière ont fait du bien aux cultures dans beaucoup de régions. Les semailles sont presque terminées et près de 75 p. 100 des terres de jachères ont été labourées. La pulvérisation contre les mauvaises herbes est en cours partout. Les cultures hâtives atteignent 4 à 6 pouces de hauteur et le seigle d'automne est épié. Les pâturages poussent bien et le bétail est en bon état. Dans le sud-ouest, à Lethbridge, toutes les céréales sont poussées et la pulvérisation contre les mauvaises herbes bat son plein. Le temps a été généralement frais et il y a eu de la pluie dernièrement dans la plupart des régions. La folle avoine lève bien et la pulvérisation est en cours. Le blé d'hiver pousse rapidement et va mouter. Les pâtures sont en bon état, grâce à l'humidité de ces derniers temps. Les insectes ou la maladie n'ont jusqu'à présent causé aucun dégât dans les cultures. Les réserves d'humidité sont bonnes dans la région de Cardston et le blé d'hiver commence à mouter. Les semailles sont terminées dans une proportion de près de 80 p. 100 terminées et 30 p. 100 des graines oléagineuses sont mises en terre. La hauteur moyenne des céréales de printemps est d'environ 3 pouces. Le foin et les pâtures sont en bon état et on ne signale aucun dommage jusqu'à présent.

Dans le centre sud de la province, aux environs de Brooks, les semailles sont presque terminées sauf en ce qui concerne une partie du lin, de l'avoine et des fourrages verts. Beaucoup de cultivateurs pulvérisent contre les mauvaises herbes. Dans les terres irriguées le blé et l'orge atteignent près de 3 à 4 pouces de hauteur et la luzerne est égale. Il y a eu une bonne pluie générale sur la région la semaine dernière, qui a été très bénéfique aux cultures et aux herbages, mais la chaleur ferait du bien. Les bestiaux sont en bon état et les veaux sont supérieurs à la moyenne. À Vulcan, la pulvérisation contre les mauvaises herbes commencera cette semaine et on craint que la folle avoine n'envahisse les champs cette année si on fait pas le traitement. On signale que les conditions hygrométriques dans la région sont bonnes grâce aux pluies récentes et que le foin et les pâtures poussent bien.

À Hanna, dans le centre est de la province, les conditions se sont amélioré depuis le dernier rapport grâce à l'humidité récente. Toutefois, le foin cultivé a souffert de la trop longue sécheresse. Les céréales atteignent 2 à 3 pouces de hauteur. La pulvérisation contre les mauvaises herbes a été effectuée dans toute la région. L'ensemencement des jachères est terminée. Les pâturages sont en meilleur état depuis quelque temps. La chaleur ferait du bien. Dans le sud-ouest de la partie centrale à Calgary, les semailles sont maintenant terminées. Il a plu récemment sur la région ce qui a fait pousser rapidement les cultures. À Olds, les semailles terminées sont à 95 p. 100 mais la germination est irrégulière faute de pluie. Des averses sont tombées dans la région récemment, mais la sécheresse sévit en général.

À Sedgewick, dans le nord-est de la partie centrale, les semailles sont terminées et les cultures poussent bien. Dans beaucoup de régions, il est tombé 1 à 2 pouces de pluie la semaine dernière. Les vents violents prédominent toujours et épuisent les réserves d'humidité. La folle avoine présente peu de danger mais la pulvérisation de carbyne est commencée.

À Stettler, dans le centre de la province, le blé est semé et les semailles des céréales secondaires sont bien avancées. La germination a été bonne dans les champs de blé semés les premiers mais plutôt inégale dans les terres ensemencées plus tard. Les pluies récentes ont grandement amélioré les conditions. Aux alentours de Red Deer, on a semé la quasi-totalité du blé et environ 80 p. 100 des céréales secondaires. Des averses intermittentes ont augmenté l'humidité à certains endroits mais la sécheresse sévit ailleurs.

Les semailles sont presque terminées dans toutes les régions avoisinantes d'Edmonton. Quelques régions ont bénéficié des pluies récentes mais la sécheresse persiste en maints endroits. L'hiver a causé des dégâts dans un grand nombre de champs de pâture et de foin situés sur des pentes mal abritées ce qui aggrave la pénurie de fourrage. La presque totalité du blé est maintenant germée et sortie de terre. Une partie des céréales secondaires reste encore à semer dans la région. À Lacombe, dans le centre ouest, le sol est extrêmement sec et la germination est médiocre dans les champs de chaumes, les semailles sont presque terminées mais, dans certains cas, les cultivateurs ont arrêté les travaux en attendant la pluie. Les pâturages sont médiocres. À Exkville, 85 p. 100 de l'orge est semée et dans la plupart des cultures semées tôt la germinaison a été irrégulière, à cause de la sécheresse. Il faudrait absolument qu'il pleuve sur la région pour faire pousser les pâturages et les céréales.

Dans la région du nord-est au centre nord, à Bonnyville, les averses intermittentes de la semaine dernière ont amélioré les conditions hygrométriques mais il fau-

drait encore plus de pluie. Le foin pousse bien. Les pâturages commencent à pousser mais ils sont en général en mauvais état.

Dans la région de Peace River, à Beaverlodge, les céréales sont presque toutes semées mais une partie des graines oléagineuses ne sont pas encore mises en terre. Les cultures fourragères et les légumineuses ont été considérablement endommagées par l'hiver. L'état général des cultures de la région est excellent. Toutefois, les réserves d'humidité sont faibles; mais grâce aux averses les conditions hygrométriques en surface du sol sont satisfaisantes. À Peace River, le pouce de pluie de ces derniers temps a humidifié le sol en surface. Le blé est semé, la plupart des cultures atteignent 1 à 3 pouces de hauteur et la germination est égale. Cinquante pour cent environ de l'orge est semée. Les pâturages sont médiocres ou le foin manque.

L'Alberta Hail Insurance Board signale les tempêtes de grêle suivantes: le 29 mai - orages violents à Lomond et à Cavendish orages locaux à Irma, Warspite et Vilan; le 3 juin - orage local à Turner Valley.

La moyenne non pondérée des précipitations dans la province, depuis le 1er avril, a été de 10 p. 100 sous la normale, comparativement à 22 p. 100 sous la normale la semaine précédente et à 18 p. 100 sous la normale deux semaines plus tôt, mais contrairement à 5 p. 100 au-dessus de la normale l'année dernière. La température moyenne de la semaine terminée le 3 juin a été de 0.4 degrés au-dessous de la normale, contre 2.7 degrés au-dessus de la normale la semaine précédente, 4.0 degrés au-dessous de la normale deux semaines plus tôt et 0.5 degré au-dessus de la normale pendant la semaine terminée le 5 juin 1967.

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Les rapports en provenance de Victoria signalent une amélioration marquée des pâturages et fourrages à la suite de pluies et d'un réchauffement survenus au bon moment. Les plantations de pommes de terre sont terminées et l'humidité du sol est idéale pour une pousse rapide. Les surfaces cultivées ont augmenté grâce à la désinfection des terres infestées de nématodes. La récolte des mûres de Logan s'annonce meilleure qu'on l'avait prévu plus tôt. La cueillette des fraises se déroule dans de bonnes conditions.

Dans les régions basses du district de Kamloops, une précipitation exceptionnelle et le temps frais ont fait du bien aux pâturages naturels. Le maïs d'ensilage est bien avancé et les pommes de terre tôt plantées poussent bien. Le bétail qui est en excellente condition, se porte très bien vu l'état idéal des pâturages.

À Agassiz, dans la vallée du Bas-Fraser, la température à la fin de mai a été normale mais les pluies exceptionnellement abondantes ont endommagé la première coupe de foin. Les pâturages sont en excellente condition et le maïs pousse bien. Les semailles de pois pour la conserve sont terminées et la germination est bonne et les premiers semis poussent bien. On prévoit une récolte moyenne de framboises. Les fraises poussent bien et on espère pouvoir commencer la cueillette le 12 juin, soit cinq jours plus tôt que prévu. Les céréales et les pommes de terre promettent une bonne récolte.

On signale de Summerland, dans le sud de l'Okanagan, que la récolte des fruits, à l'exception des cerises sucrées et des abricots, s'annonce bonne. Les pêches sont inférieures à la normale à cause du gel de printemps. Malgré un printemps précoce et chaud, le temps frais d'avril et de mai a ralenti la croissance des fruits qui est maintenant normale pour cette période de l'année. On prévoit que les expéditions de cerises commenceront au cours de la dernière semaine de juin. Les pluies récentes

ont favorisé la pousse des céréales, du foin et des légumes.

À Vernon, dans le nord de l'Okanagan, les averses et le temps frais ont atténué la rigueur de la sécheresse et amélioré l'humidité du sol dans les deux dernières semaines de mai. Les fourrages et les céréales poussent rapidement. Les céréales d'automne épient mais elles sont clairsemées car elles ont souffert de l'hiver. L'ensilage des fourrages a commencé. On espère que la fenaison pourra commencer, dès qu'il fera beau. Le maïs d'ensilage est semé en totalité et pousse rapidement.

On signale de Prince George, dans le centre intérieur, que le mois de mai a été froid et que la sécheresse a retardé la croissance. Les précipitations et le soleil de ces derniers temps ont favorisé la pousse des céréales des herbages et du trèfle. Par suite de la moisissure causée par la neige et des effets destructifs de l'hiver, une bonne partie des champs de fourrage ont dû être ressemés.

À Smithers, dans la vallée de la rivière Skeena, les températures élevées du début de mai ont favorisé la croissance rapide du fourrage. Dans le Bulkley Valley Lowland, les champs nouvellement emblavés ont souffert des inondations. Les céréales de semence ont été semées et commencent à pousser. Le froid de ces derniers temps a toutefois ralenti la croissance de toutes les cultures.

À Dawson Creek, dans la région de la Rivière de la Paix, les semailles sont terminées en ce qui concerne le blé et 75 p. 100 de l'orge et de l'avoine sont semés. On attend pour semer le reste de ces deux dernières céréales de pouvoir détruire la folle avoine. La superficie ensemencée en blé en 1968 est supérieure à celle de 1967. La pousse a été rapide grâce aux averses intermittentes mais il faudrait encore des précipitations pour assurer la croissance.

Dans la région du Fort St. John, les semailles sont terminées à 95 p. 100 dans les champs ensemencés les derniers la germination est lente à cause de la sécheresse de la surface du sol. Le temps frais et sec a retardé la végétation et les vents forts ont, de plus, desséché le sol. On signale de la région de l'aéroport du Fort St. John des averses intermittentes et des précipitations égales à la moitié de la normale. Les fourrages poussent un peu mieux que les céréales.

Precipitation and Temperature Data, Prairie Provinces(1)

Province and crop district	Station	Precipitation: Week ending 8 a.m. June 3, 1968	Precipitation: Total since April 1	Precipitation: Normal since April 1	Mean temperature week ending 8 a.m. June 3: 1968	Mean temperature: Normal
		inches			degrees F.	
MANITOBA						
1	Boissevain	Trace	3.20	3.42	58	56
	Pierson	NIL	1.76	3.22	60	58
	Waskada	Trace	2.77	3.01	61	58
2	Baldur	.10	3.67	3.38	59	58
	Pilot Mound	.17	5.14	3.34	58	57
3	Altona	.23	4.34	3.22	59	60
	Deerwood	.21	6.89(2)	3.35	58	59
	Graysville	.31	5.84	2.99	59	58
	Morden	.38	6.16	3.58	58	59
	Morris	.54	6.35	2.91	57	59
	Portage la Prairie	.23	5.31	3.90	58	59
	Roland	.33	5.01	3.29	64	59
4	Stonewall	.44	4.97	3.31	56	58
5	Emerson	.40	5.64	3.24	57	58
	Steinbach	.61	5.72	3.18	58	58
	Winnipeg	.38	5.20	3.32	58	58
	Starbuck	.34	4.50	3.16	57	59
6	Seven Sisters Falls	1.60	7.20	3.55	55	57
	Great Falls	N.R.	3.20(2)	2.51	N.R.	57
	Sprague	1.11	4.09	3.55	55	56
7	Rivers	.22	2.43	2.95	59	57
	Virden	.68	3.23	2.81	58	58
8	Brandon	.31	3.26	3.27	57	57
	Cypress River	.08	5.21	3.07	58	58
9	Gladstone	.53	3.89	3.18	N.R.	56
10	Birtle	.24	2.09	2.84	58	56
	Rossburn	.47	1.65	2.68	63	56
	Russell	.29	1.04	2.32	57	56
11	Dauphin	.33	1.96	3.18	58	57
12	Arborg	.75	4.60	3.08	55	56
	Gimli	.58	5.15	3.18	56	57
	Steep Rock	.67	3.50	2.88	54	56
13	Swan River	1.56	3.51	2.65	56	57
	The Pas	.74	3.18	2.78	53	54
14	Grass River	N.R.	2.33(2)	3.32	N.R.	57
MANITOBA AVERAGE		.45	4.11	3.13	57.7	57.4

For footnotes, see page IV.

Precipitation and Temperature Data, Prairie Provinces(1)

Province and crop district	Station	Precipitation: Week ending 8 a.m. June 3, 1968	Precipitation: Total since April 1	Precipitation: Normal since April 1	Mean temperature week ending 8 a.m. June 3: 1968	Mean temperature week ending 8 a.m. June 3: Normal
		inches			degrees F.	
SASKATCHEWAN						
1A	Carlyle	.14	2.50	2.54	58	56
	Estevan	.10	2.48	2.77	61	58
	Oxbow	.17	2.98	2.49	60	56
	Willmar	.05	2.09	2.86	N.R.	N.R.
1B	Broadview	.52	2.35	2.77	58	55
	Moosomin	.06	2.59	2.75	58	57
2A	Yellow Grass	.18	1.56	2.59	60	57
	Weyburn	.37	1.91	2.54	62	57
	Midale	NIL	1.80	2.53	54	58
2B	Moose Jaw	.19	1.12	2.76	61	58
	Regina	.56	1.20	2.60	59	57
	Francis	.10	1.22	2.27	55	55
	Indian Head	.16	1.46	2.57	59	56
3AS	Ormiston	.62	.96	2.74	62	57
	Cardross	.82	1.87	2.75	65	57
	Ceylon	.28	1.02	2.80	62	56
3AN	Gravelbourg	N.R.	.57(2)	2.36	N.R.	57
3BS	Shaunavon	.26	1.65	2.48	57	57
	Pambrun	.41	1.30	2.66	59	56
	Climax	.12	2.57	2.31	58	N.R.
	Aneroid	.55	1.26	2.51	59	57
	Instow	.34	1.33	2.34	57	56
3BN	Swift Current	.29	1.38	2.74	59	56
	Pennant	.28	.70	2.44	59	57
	Hughton	1.93	3.03	2.22	59	58
4A	Maple Creek	.19	2.21	2.45	59	59
	Consul	.38	2.34	2.04	58	55
4B	Abbey	N.R.	2.46(2)	2.20	N.R.	57
	Leader	.68	3.07	2.13	59	58
5A	Balcarres	.15	2.29	2.65	N.R.	N.R.
	Lipton	.21	3.59	2.56	59	57
	Melville	.38	3.18	2.56	58	55
	Yorkton	2.40	3.82	2.55	57	55
	Bangor	.41	2.14	2.79	58	56
5B	Wynyard	.66	1.08	2.78	58	56
	Foam Lake	.82	1.73	2.91	58	55
	Kuroki	.83	1.92	2.88	56	55
	Lintlaw	N.R.	.98(2)	2.86	N.R.	54
	Kamsack	.85	1.91	2.33	58	55
6A	Davidson	.91	2.78	2.55	59	56
	Strasbourg	.76	2.06	2.75	59	56
	Watrous	1.31	2.12	2.32	60	56

For footnotes, see page IV.

Precipitation and Temperature Data, Prairie Provinces(1)

Province and crop district	Station	Precipitation: Week ending 8 a.m. June 3, 1968	Precipitation: Total since April 1	Precipitation: Normal since April 1	Mean temperature week ending 8 a.m. June 3: 1968	Mean temperature: Normal
		inches			degrees F.	
SASKATCHEWAN — Concluded						
6B	Harris	3.45	3.87	2.18	58	57
	Outlook	1.41	1.92	1.97	61	58
	Rosthern	2.28	3.18	2.02	58	58
	Saskatoon	1.90	3.34	2.40	58	57
	Elbow	.61	1.29	2.55	58	56
	Tugaske	.64	1.69	2.64	60	56
	Dundurn	1.52	2.44	2.08	60	57
7A	Alsask	.27	1.57	2.47	60	58
	Kindersley	.58	1.91	1.77	58	57
	Rosetown	1.47	2.62	2.24	59	57
7B	Macklin	.18	2.33	2.11	57	56
	Denzil	.28	1.37	2.22	58	56
	Scott	.43	1.51	2.50	55	55
	Biggar	3.02	4.26	2.31	57	57
8A	Hudson Bay	2.80	4.53	2.75	55	54
	Prairie River	1.12	3.37	2.95	53	54
8B	Humboldt	.83	1.31	2.24	58	56
	Melfort	1.07	2.29	2.52	56	56
9A	North Battleford	.79	1.82	2.26	57	56
	Victoire	N.R.	2.17(2)	2.52	N.R.	53
	Prince Albert	3.26	4.38	2.85	57	56
9B	Waseca	1.08	2.27	2.48	56	55
SASKATCHEWAN AVERAGE		.81	2.20	2.50	58.4	56.3
ALBERTA						
1	Empress	3.24	3.70	2.15	55	57
	Foremost	.24	3.16	2.65	56	57
	Manyberries	.23	1.73	2.43	57	57
	Medicine Hat	.07	3.09	2.77	60	58
2	Brooks	1.14	2.99	2.61	56	57
	Drumheller	1.22	2.73	2.29	59	55
	Gleichen	.94	3.00(2)	3.00	56	56
	Hays	.78	3.38	2.34	58	58
	Rainier	1.60	3.33	2.64	57	58
	Vauxhall	1.81	4.34	2.43	56	56
	Raymond	.29	3.71	3.46	56	58
	Lethbridge	.27	3.72	3.62	57	56
	Trochu Equity	.27	1.32	3.00	55	55
	Queenstown	.88	4.15	3.24	56	56

For footnotes, see page IV.

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA
1010523808

Precipitation and Temperature Data, Prairie Provinces(1)

Province and crop district	Station	Precipitation: Week ending 8 a.m. June 3, 1968	Precipitation: Total since April 1	Precipitation: Normal since April 1	Mean temperature week ending 8 a.m. June 3: 1968	Mean temperature: Normal
		inches			degrees F.	
ALBERTA — Concluded						
3	Calgary	1.01	2.63	3.60	52	53
	Cardston	.47	3.76	3.99	53	55
	Pincher Creek	.51	4.80	4.51	54	53
	Fort MacLeod	.35	4.55	3.89	57	57
	High River	.96	5.04	4.14	52	52
	Magrath	.24	2.82	4.09	56	56
	Olds	.02	1.61	3.43	51	53
4	Alliance	.53	1.59	2.10	57	55
	Coronation	.80	1.83	2.12	56	55
	Hughenden	.74	1.77	2.26	58	55
	Lloydminster	1.18	2.61	2.21	58	55
	Stettler	.75	1.56	2.50	54	55
	Vegreville	.35	.92	2.33	56	55
	Ranfurly	.36	1.18	2.62	56	54
	Vermilion	1.11	2.28	2.16	56	54
5	Edmonton	.34	1.30	3.11	53	56
	Lacombe	.12	1.39	3.52	53	54
	Red Deer	.11	1.37	3.13	53	54
	Rocky Mountain House	.54	2.05	3.91	52	52
	Wetaskiwin	.27	1.37	3.20	55	55
6	Athabasca	.85	1.62	2.79	45	53
	Campsie	.44	2.29	2.93	54	53
	Edson	.56	1.98	3.30	50	52
	Elk Point	1.53	3.58	2.35	56	54
	Lac la Biche	1.12	1.96	2.53	54	54
	Whitecourt	.40	2.20	3.21	50	52
7	Beaverlodge	.46	2.67	2.57	50	54
	Fairview	.74	1.93	2.46	50	54
	Ft. Vermilion	.53	1.01	2.00	53	53
	Grande Prairie	.85	3.89	2.44	52	54
	High Prairie	.07	1.95	2.56	55	54
	Peace River	1.04	1.92	1.86	52	54
	Rycroft	.72	3.17	2.34	52	54
	Wagner	.43	2.70	2.52	52	53
ALBERTA AVERAGE		.70	2.57	2.86	54.4	54.8

(1) Meteorological Service of Canada.
(2) Incomplete; not included in average.
N.R. — No report.