22-002F
no 9
1968
28 août
c. 3

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

OTTAWA - CANADA

Publication autorisée par le ministre du Commerce

Série de 20 rapports: $4

Série de rapports sur les grandes cultures - 16

RAPPORT TÉLÉGRAPHIQUE SUR LES CULTURES - CANADA

Le Bureau fédéral de la statistique publie aujourd'hui le cinquième d'une série de 6 rapports télégraphiques sur l'état des cultures à travers le Canada. Le présent rapport comprend en outre le dixième d'une série de 11 rapports télégraphiques sur l'état des cultures dans les provinces des Prairies. Les renseignements sur lesquels reposent ces rapports sont fournis par un certain nombre de correspondants agricoles spécialement désignés des ministères fédéral et provinciaux de l'Agriculture, par des observateurs agricoles particuliers et par des entreposeurs de céréales. Les renseignements météorologiques contenus dans le présent numéro sont fournis par la Division de la météorologie, ministère des Transports.

SOMMAIRE

Provinces Maritimes. — Dans l'ensemble des Maritimes, la plupart des cultures ont souffert à divers degrés d'un manque d'humidité. Toutefois, une pluie récente a fait du bien aux herbages et aux cultures tardives. Dans l'Île du Prince-Édouard, la récolte des pommes de terre semées tôt semble faible et le rendement des bleuets sera considérablement réduit. La plupart des céréales ont mûri, mais on n'en a moissonné que très peu jusqu'ici. En Nouvelle-Écosse, la sécheresse a retardé le regain. Les céréales semées tôt auront un rendement moyen; celui des cultures semées tard sera un peu plus faible. La récolte de bleuets sera nettement réduite par suite de dégâts causés par les dernières gelées. Au nouveau-Brunswick, les herbages et la deuxième coupe des légumineuses sont maigres et la plupart des éleveurs de bétail ont dû se procurer des suppléments de fourrage au cours du mois. Les principales cultures de légumes sont en retard par rapport à la normale, mais, la récolte a commencée le 10 août, dans l'ensemble des cultures et certaines variétés de pommes hâtives étaient en vente le 15 août. Les pommes de terre risquent de souffrir du manque de pluie.

Québec. — Depuis le dernier rapport, les conditions atmosphériques ont varié dans toute la province de Québec et encore plus dans les différentes régions. Il y a également eu de grands écarts dans la précipitation et les conditions hygrométriques. On a enregistré des gelées précoces et de la grêle dans les régions de Richelieu, de Témiscamingue et du Saguenay-Lac Saint-Jean. On signale des insectes nuisibles dans certaines cultures horticoles de la région de Québec et des cantons de l'Est. La fenaison est terminée dans les comtés du sud et le sera bientôt ailleurs. Les rendements varient de médiocre à bon. La moisson des céréales commence et les rendements seront variés. De même, le regain des pâturages et du foin varie de médiocre à satisfaisant. La récolte de pommes de terre qui s'annonçait très bonne va diminuer par suite du temps sec et de la rouille. La récolte de betteraves à

Division de l'agriculture
Section des cultures

5502-509

Le présent document peut être reproduit en toute liberté pourvu qu'on indique qu'il émane du B.F.S.

sucre s'annonce bonne mais le maïs de semence est inégal. On prévoit que le rendement des pommes sera moyen; les légumes d'automne sont prometteurs. Le bétail se porte bien et la production de lait est normale.

Ontario. - La moisson du blé d'hiver est maintenant terminée, mais dans plusieurs comtés, on signale que les grains ont germé. Les céréales de printemps sont très belles et on prévoit des rendements sans précédent. La chaleur de ces derniers temps a fait le plus grand bien au maïs, mais celui-ci reste cependant en moins bonne qualité que la normale. Le soya est généralement beau, bien qu'il ait souffert de l'excès de pluie dans certaines régions. L'arrachage des pommes de terre hâtives est terminé, la récolte a été bonne et on prévoit que la récolte de pommes de terre tardives sera excellente. La qualité du tabac jaune est exceptionnelle et on prévoit des rendements élevés.

Provinces des Prairies. - Le temps pluvieux et froid a retardé la croissance des cultures et la moisson dans les provinces des Prairies au cours des deux dernières semaines. Toutefois, le temps idéal de la fin de semaine a permis la reprise du moissonnage dans la plupart des régions de la Saskatchewan et du sud de l'Alberta. Dans les autres régions, il faudra d'une semaine à dix jours de beau temps pour faire mûrir les cultures et sécher les champs. Le gel a sévi en plusieurs endroits à la mi-août et, même s'il est encore trop tôt pour évaluer l'étendue des dégâts, on croit que ces derniers sont assez élevés dans certaines terres basses, surtout dans le cas des cultures semées tard. Les fortes chutes de pluie des dernières semaines ont en général fait du bien aux pâturages.

LA ROUILLE DANS LES PROVINCES DES PRAIRIES

La Station de recherches du ministère fédéral de l'Agriculture à Winnipeg signale que le blé est trop avancé pour que la rouille puisse causer de dégâts importants. Les cultures commerciales n'ont pas souffert de la rouille de la tige de blé, même si celle-ci est très répandue dans les herbes vulnérables. Dans le sud du Manitoba, on signale des traces de rouille couronnée de l'avoine et, récemment, un peu de rouille de la tige d'avoine; certains champs d'avoine ensemencés tard risquent de subir des dégâts. La rouille de la feuille d'orge est très répandue au Manitoba mais elle n'a probablement pas affecté les rendements.

Colombie-Britannique. - Les cultures sont belles dans la plus grande partie de la province. Toutefois, la pluie et les températures inférieures à la normale ont retardé la maturation de certaines cultures comme le maïs et les tomates. La récolte des pommes de terre demi-hâtives se déroule dans de bonnes conditions et les pommes de terre tardives sont belles. La cueillette des bleuets va bon train et la production est égale à celle de l'année dernière. Dans l'Okanagan, la cueillette des abricots est presque terminée et celle des cerises est chose faite. La cueillette des pêches tardives est commencée; la qualité ainsi que la taille des fruits semblent bonnes. La récolte de poires est abondante, mais la taille des fruits est inférieure à la normale. Dans l'Okanagan, le maïs d'ensilage est légèrement en retard mais les épis viennent bien. Dans la région de la Rivière de la Paix, les froids précoces ont fait diminuer les perspectives de rendement des céréales et l'humidité a retardé la moisson. Dans certaines régions de la province, la récolte des derniers foins a dû être interrompue en raison de l'humidité.

PROVINCES MARITIMES

La sécheresse qui sévissait partout dans la Maritimes a disparu, bien qu'un peu plus de pluie soit nécessaire.

Dans l'Île du Prince-Édouard, la sécheresse a grillé beaucoup de pâturages et on nourrit les vaches à même les réserves. Les pluies des derniers jours, ont fait du bien aux herbages et aux cultures tardives. La récolte de pommes de terre semées tôt sera faible et la récolte de bleuets va nettement baisser. Les céréales sont belles et on prévoit un rendement moyen.

La sécheresse a ralenti la végétation partout en Nouvelle-Écosse. Dans la région d'Annapolis, la sécheresse a particulièrement ralenti le regain. Le tabac et les pommes sont beaux ainsi que les principales cultures de légumes. Dans le comté de Cumberland, la fenaison est presque terminée. La récolte de bleuets sera moins bonne cette année. Dans le centre de la Nouvelle-Écosse, la pluie tombée récemment a fait du bien aux cultures. Le maïs et les céréales mûrissent rapidement et la récolte de certaines céréales semées tôt a commencé. Dans la région de Cape Breton, la sécheresse a sérieusement ralenti toutes les cultures.

Au Nouveau-Brunswick, la plupart des cultures ont souffert à divers degrés du manque d'humidité au cours de la saison. Les rendements de l'orge et du blé sont moyens ou supérieurs à la moyenne, mais ceux de l'avoine sont généralement médiocres. Bien que les principales légumes aient été en retard on trouvait la plupart des légumes sur les marchés le 10 août. La récolte des pommes précoces a commencé le 15 août, mais, il faudrait de la pluie pour que les variétés tardives puissent prendre leur taille normale et mûrir. Les pluies récentes ont fait du bien dans la région de culture des pommes de terre, mais toutes les régions souffrent de la sécheresse, en particulier le comté de Carleton.

QUÉBEC

On signale de l'Assomption que la récolte du tabac sera en grande partie terminée le 7 septembre et on prévoit un rendement moyen. Les récoltes de foin et de céréales sont bonnes et la betterave à sucre, le maïs et les pommes de terre sont prometteurs. La récolte de fraises est également bonne. Dans le district de Lennoxville, le temps d'août a été chaud et ensoleillé. Le maïs vient normalement, mais le regain des prés de foin a été médiocre. Les cultivateurs ont moissonné 25 p. 100 de leurs céréales. On prévoit de bonnes récoltes de colza et de lin. Les pâturages sont satisfaisants mais la rouille attaque les pommes de terre.

A La Pocatière, les rendements de foin ont été bons en dépit du temps sec. La qualité est bonne et la fenaison est presque terminée. Le blé, l'avoine et l'orge semés tôt sont supérieurs à la normale, mais le regain des pâturages et du foin varie de médiocre à moyen. Le maïs fourrager et les navets sont inférieurs à la normale.

Dans le district du Lac Saint-Jean, il est tombé, en août, 3.5 pouces d'eau en treize jours. Ces pluies ont gêné les travaux des champs, mais elles ont fait du bien à toutes les cultures. Le temps a été frais. Les pâturages se sont améliorés et la production de lait a augmenté. Les céréales et les pommes de terre sont prometteuses, mais la cueillette des bleuets se fait lentement et le rendement est très faible. A Caplan, les températures ont été basses et on a enregistré un minimum de 34 °F. La précipitation a également été inférieure à la normale et, le 14 août, une tempête de grêle s'est abattue sur le district. Dans certaines régions, les

pertes ont été presque totales, celles des fruits et légumes atteignant 90 p. 100 et celles des céréales, de 30 p. 100 à 40 p. 100. Les pâturages ont souffert de la sécheresse du mois dernier et la production de lait a baissé. Les cultivateurs ont commencé la moisson des céréales, qui sont plus mûres qu'à la même date l'année dernière.

ONTARIO

Dans le comté d'Essex, dans le sud de l'Ontario, la récolte du blé et de l'avoine est terminée et les rendements ont été bons. Le maïs et le soya poussent bien. La récolte du maïs sucré et des tomates pour la conserve est en cours. La qualité des premières tomates récoltées était médiocre. La cueillette du tabac Burley est en cours. Le rendement des pêches est bon et la cueillette des Red Havens est presque terminée. Les labours d'automne et la préparation des terres pour le blé d'automne sont en cours. Dans le comté de Kent, le temps a été variable et il est tombé des averses locales au cours du mois dernier. Toutefois les récoltes sont belles en général. On note une grande amélioration du maïs et du soya. Les haricots blancs se sont également améliorés mais ils ont été sérieusement atteints par la rouille et le rendement s'en ressentira. La récolte devrait d'ailleurs commencer prochainement. Les tomates ont été retardées par le froid mais la cueillette est actuellement en cours. La cueillette du tabac Burley est également commencée. Il y a beaucoup de pucerons de la feuille sur le maïs mais cela n'est pas inquiètant, cependant les dégâts causés par les vers des racines sont plus importants que les autres années. La seconde génération de nymphes de la pyrale du maïs fait son apparition.

Dans le comté de Norfolk, la moitié du tabac est récolté et les rendements sont bons. La récolte de l'avoine est presque terminée et les rendement sont supérieurs à la moyenne. Les rendements du blé et du seigle sont également supérieurs à la moyenne. La récolte de la seconde coupe de foin est en cours et les provisions seront suffisantes. Le maïs et le soya sont supérieurs à la normale mais les pommes de terre sont en retard et l'arrachage ne fait que commencer. Les pommes s'améliorent. Les réserves d'humidité sont suffisantes et les pâturages sont en excellent état. Dans le comté de Lincoln, les fortes pluies du mois d'août ont fait du bien aux cultures. La cueillette des pêches atteint son point culminant, le rendement est bon et la qualité des fruits est bonne. Les dégâts des insectes dans les cultures fruitières ont été faibles en général. Il y a eu des tétranyques en assez grande quantité vers la mi-août et la pourriture brune s'est manifestée dans les vergers où la pulvérisation n'avait pas été satisfaisante. La rouille de la feuille a été particulièrement grave sur les poires Bartlett. La rouille de la feuille a également été causée par les tétraniques.

Dans le comté de Simcoe, les cinq pouces d'eau de la semaine du 19 août ont causé l'interruption des travaux de la moisson. La moisson est environ à moitié terminée et dans la plupart des cas, les rendements sont légèrement supérieurs à la moyenne bien que ceux de l'orge soient inférieurs à ce que l'on avait prévu. Le maïs aurait besoin de chaleur et de sécheresse. Dans le comté de Bruce, des pluies extrêmement abondantes ont retardé la récolte des céréales pour la nourriture du bétail et de la seconde coupe de foin. Près de 60 p. 100 des céréales secondaires ont été moissonnées et les rendements sont excellents. Les céréales semées tardivement, le maïs et les pâturages poussent bien à présent.

Dans le comté de Waterloo, la récolte des céréales est presque terminée et bien que les rendements aient été élevés, on signale dans certains cas que la densité

du grain est faible. La récolte de la seconde coupe de foin est en cours dans la plus grande partie de la région, le maïs est en retard de deux semaines par rapport à la normale. Dans le comté de Wellington, la récolte des céréales de printemps est à moitié terminée mais elle a été retardée par les pluies. Les rendements ont été légèrement supérieurs à la moyenne et la qualité des céréales est bonne. Le maïs est généralement en retard par rapport à la normale et il faudrait de la chaleur pendant une bonne partie du mois de septembre. Les pâturages et la seconde coupe de foin sont supérieurs à la moyenne, une grande partie de la seconde coupe a déjà été récoltée. Dans le comté de Halton, la moisson des céréales de printemps est faite dans une proportion d'environ 65 p. 100 et on signale des rendements supérieurs à la moyenne. Cependant, les travaux de la moisson ont été retardés en raison des 3 à 4 pouces d'eau de la semaine dernière qui ont fait verser les récoltes. Le maïs, le foin et les pâturages sont beaux. Les cultures de légumes donnent bien en général malgré un démarrage lent.

Dans le comté de Durham, la récolte de céréales de printemps est faite dans une proportion d'environ 85 p. 100 et on signale que les rendements sont très bons, mais le mauvais temps a empêché de terminer la moisson. Le rendement des pommes de terre s'annonce bon et la cueillette du maïs sucré est commencée. La cueillette des pommes Melba est en cours, la qualité des fruits est bonne et le rendement est bon. La récolte de tabac est variable, elle est de passable à bonne. Dans le comté de Peterborough, les dernières pluies ont fait du bien aux cultures. Le rendement de l'avoine et de l'orge a été bon, le maïs est beau dans la plus grande partie du comté mais un peu de chaleur ne lui ferait pas de mal. Les travaux de récolte ont été quelque peu retardés par la pluie.

Dans le comté de Leeds, la récolte des céréales de printemps est en cours partout et les rendements vont de moyen à au-dessus de la moyenne en ce qui concerne celles qui ont été semées les premières. Le maïs mûrit lentement à cause du temps froid pour la saison. La récolte de la seconde coupe de luzerne est en cours. Dans le comté de Carleton, la récolte des céréales de printemps est presque terminée, le rendement est moyen. Les rendements varient selon que les champs ont souffert de la trop grande humidité. Le maïs devient plus beau mais il a souffert à cause du froid et de la pluie. On espère que les rendements seront moyens dans la plupart des cas, aussi bien en ce qui concerne l'ensilage que le grain. Les pâturages et la seconde coupe de foin sont venus rapidement et ont procuré du fourrage en abondance au milieu de l'été. Dans le comté de Renfrew, la moisson des céréales de printemps s'est prolongée à cause de la pluie mais il semble que les rendements soient nettement supérieurs à la moyenne. La moisson du blé d'hiver est terminée, les rendements ont été moyens. Le maïs pousse bien dans les champs bien drainés mais il lui faudrait beaucoup de chaleur pour qu'il puisse mûrir avant les froids.

La fenaison est pratiquement terminée dans le district de Thunder Bay, dans le nord de l'Ontario. Les rendements ont été moyens mais la qualité a été inférieure à la moyenne. Les pâturages sont en excellent état pour cette période de l'année. L'arrachage des pommes de terre hâtives est commencé, le rendement est moyen et la qualité est moyenne. La récolte des céréales de printemps vient seulement de commencer et on prévoit des rendements supérieurs à la moyenne.

MANITOBA

Les fortes averses de la fin de semaine ont retardé la moisson et la fenaison dans la plus grande partie du Manitoba. Les terres basses de la Vallée de la Rivière Rouge et des districts du centre et du sud-ouest qui ne sont pas inondées

sont trop détrempées pour permettre le passage des machines; le fauchage est toutefois en cours dans la plupart des autres régions. Les champs de céréales, de pois, de graines de colza et de moutarde sont prêts à être coupés. Les céréales ont versé dans tous les districts. Dans la région du nord-ouest, le gel a causé des dommages considérables au sarrasin, au maïs, au lin et aux céréales semées tard. On prévoit que les rendements de la plupart des céréales et des cultures spéciales seront excellents. Les pertes de foin sur pied et en meules sont élevées et on s'attend à une pénurie dans plusieurs districts.

A Vita, dans le sud-est du Manitoba, il est tombé 1.2 pouce de pluie au cours de la semaine dernière, ce qui a empêché tout moissonnage. Les céréales coupées se détériorent depuis le 6 août dans les champs. Les fermiers n'ont recueilli jusqu'ici que 10 à 25 p. 100 du foin dont ils auront besoin. Dans la région d'Altona, le fauchage et le moissonnage-battage ont repris au début de la semaine, mais la moisson est au point mort dans les terrains lourds. Dans les régions du nord-ouest, des récoltes coupées sont restées dans les champs depuis trois semaines et se gâtent. Les céréales qui ne sont pas mûres ont versé, tandis que dans un grand nombre de champs les pois, le colza et la moutarde sont trop mûrs; dans certains champs, le tournesol a fleuri depuis longtemps. L'excès d'humidité a gravement endommagé les cultures de sarrasin et de graine de lin. On a perdu beaucoup de foin coupé et en balles laissé dans les champs. Dans la région de Morden, le temps froid et humide a empêché la plus grande partie des cultures de mûrir. On ne pourra couper le blé avant au moins dix jours. De fortes pluies ont inondé et fait verser les cultures dans les régions de Morden et de Winkler. Les pluies continuelles ont empêché la récolte de la seconde coupe de foin.

On signale un très grand nombre de cas de glume noire bactérienne du blé. Les cultures ne pourront mûrir si le temps ne devient pas chaud et sec. Plus à l'Ouest, à Pilot Mound, les céréales mûrissent assez rapidement, mais on n'a fait ni fauchage ni moissonnage jusqu'ici. Si le beau temps se maintient, on entreprendra ces activités cette semaine. L'orge commence à se décolorer et l'avoine et la graine de lin ont commencé à verser. On prévoit que le sol détrempé va sérieusement entraver les travaux de la moisson. A Melita, il est tombé de 2 à 5 pouces de pluie au cours de la dernière semaine, ce qui a empêché le moissonnage. Les récoltes coupées laissées sur le sol commencent à repousser ce qui va compliquer le battage, tandis que la germination entraine la détérioration des graines. Dans la région de Tilston, le gel a causé quelques dommages aux cultures semées tard et au maïs.

Dans la région de Winnipeg, à Beauséjour, l'état des cultures varie de passable à bon; les averses extrêmement violentes ont fait verser certaines récoltes. Les cultures semées tôt sont presque mûres et beaucoup de champs pourraient être fauchés si les conditions atmosphériques le permettaient. On estime en gros que le blé devrait donner 30 boisseaux à l'acre, l'avoine 50 et l'orge 40. Il faudrait encore une semaine sans pluie pour pouvoir faucher partout. Il a été impossible de semer dans les jachères: les terres sont marécageuses et se couvrent de mauvaises herbes. Le gel n'a causé que de légers dommages localisés aux cultures. Plus à l'Ouest, à Stonewall, les pluies persistantes des dernières semaines ont fait verser les cultures semées tard, surtout l'avoine et l'orge; on doit s'attendre à des pertes et à une dégradation de la qualité. L'état marécageux des champs retardera le fauchage d'au moins une semaine. Les pertes de foin sur pied et en meules sont importantes.

Dans le centre-ouest de la province, près de Brandon, les averses et la température fraîche ont empêché les récoltes de mûrir et ont retardé la moisson et la fenaison. Les céréales coupées dans les champs ont souffert des intempéries, mais il n'y a que peu de germination. Il faudrait au plus tôt un temps sec et chaud.

Le gel du 14 août a causé des dommages graves dans certains champs de maïs et de sarrasin, mais n'a guère affecté les céréales, la graine de colza et la moutarde. Les pâturages et la seconde coupe de foin sont en très bon état. Les conditions atmosphériques se sont améliorées au cours des dernières journées et ont permis de faucher les céréales partout.

Plus à l'ouest, à Virden, le temps frais et couvert de la semaine dernière a pratiquement arrêté le fauchage et le moissonnage-battage. On rapporte même que certaines céréales coupées commencent à germer dans les champs. Le 14 août, la température est descendue à 7 ou 8 degrés en-dessous du point de congélation et on signale que certaines céréales endommagées par le froid sont coupées pour donner au bétail; dans la plupart des endroits, le rendement et la qualité seront réduits.

Dans le district d'Interlake, aux alentours de Teulon, les averses de la semaine dernière ont pratiquement arrêté tous les travaux dans les champs; quelques fermiers ont fauché jeudi dernier. Il est toutefois tombé 2 pouces de pluie vendredi soir et l'activité a été à nouveau interrompue. Un grand nombre de cultivateurs qui comptaient sur la récolte de foin naturel et sur la seconde coupe risquent de manquer de foin cette année à cause de l'humidité et de la médiocrité de la première coupe. Les pâturages sont en excellent état.

Dans le centre-ouest du Manitoba, à Neepawa, des pluies fréquentes ont continué à maintenir le niveau hygrométrique du sol au-dessus de la normale. On a fauché 40 p. 100 du seigle d'automne et du blé et de l'orge semés tôt, mais aucun champ n'a été moissonné jusqu'ici. A cause des pluies fréquentes, la qualité du foin n'est pas bonne. Certaines gelées localisées ont affecté la qualité du maïs et du sarrasin. Plus à l'Ouest, à Shoal Lake, le temps pluvieux qui a prévalu la semaine dernière a retardé la maturation et la moisson. Le sarrasin et le maïs ont été atteints par la gelée du 14 août, mais on ne connaît pas encore l'étendue des dommages à ces cultures. La pluie a retardé la fenaison. Il faudrait un temps chaud et sec pour faire mûrir les récoltes et permettre le moissonnage.

Dans le Nord du Manitoba, dans la région de Dauphin, le gel a frappé les récoltes le 14 août; les dommages les plus graves ont eu lieu à Grandview et Roblin. Les fermiers signalent que leurs champs de sarrasin ont gelé dans une proportion de 90 p. 100 alors que la température est descendue de 1 à 14 degrés au-dessous du point de congélation; on a dû couper certaines des céréales tardives pour en faire du vert. Le fauchage vient juste de commencer. L'état des cultures précoces et des pâturages varie de passable à bon. Les jardins ont été gravement touchés par le froid. A Swan River, le gel récent a détruit la plupart du sarrasin de la région, tandis que le colza et la moutarde semés tard ont subi des dommages à différents degrés. A cause de la température fraîche et humide des deux dernières semaines, les céréales restent vertes. On n'a pas encore récolté de seigle d'automne jusqu'ici. Il faudrait au plus tôt un temps ensoleillé et chaud.

La moyenne des précipitations non pondérée dans la province, depuis le 1er avril, a été de 49 p. 100 au-dessus de la normale, comparativement à 40 p. 100 au-dessus il y a une semaine, 26 p. 100 au-dessus il y a deux semaines et à 19 p. 100 au-dessous il y a un an. La température moyenne de la semaine terminée le 26 août a été de 4.3 degrés au-dessous de la normale, à comparer avec 9.3 degrés au-dessous il y a une semaine, 5.3 degrés au-dessous il y a deux semaines et 1.5 degré au-dessus le 28 août 1967.

SASKATCHEWAN

En Saskatchewan, la température idéale de la fin de semaine a séché les champs et les cultivateurs ont pu reprendre le moissonnage, et en même temps elle a fait mûrir les récoltes. Le blé est fauché dans une proportion de 15 p. 100 et on prévoit qu'il avancera rapidement cette semaine. Il n'y a que peu de battage de fait. La récolte du seigle d'automne est terminée dans une proportion de 50 p. 100 et le rendement est d'environ 18 boisseaux à l'acre. Les dommages causés par les tenthrèdes et le froid dans l'Ouest de la province ne pourront être évalués avec précision lorsque la récolte sera plus avancée.

À Moosomin, dans le sud-est de la Saskatchewan, les pluies considérables des dernières semaines ont empêché la plupart des céréales de mûrir et ont retardé le fauchage de la récolte du seigle d'automne et de l'orge précoce. Les intempéries ont causé des dommages considérables à l'orge mise en andain qui commence à germer. Il est impossible d'évaluer pour le moment les dommages causés par le gel dans ce district, mais ces dommages pourraient être élevés dans les champs de blé et dans les champs de céréales secondaires tardives. Les pluies nourries ont donné d'excellents pâturages, mais ont aussi favorisé la croissance des mauvaises herbes dans certaines cultures et dans les jachères. Les averses récentes ont aussi retardé la moisson dans le district de Fillmore. Les récoltes légères mises en andain commencent à germer au sol. Dans certaines cultures de chaumes on assiste à une repousse qui risque de gêner la récolte. On constate des dommages considérables dus aux tenthrèdes. En général, toutefois, les cultures semées tard sont en très bon état. On fauchera partout au milieu de la semaine si le temps sec continue.

La Ferme expérimentale d'Indian Head signale qu'il est tombé 3.55 pouces de pluie au cours des deux dernières semaines, et le moissonnage et les labours sont au point mort dans l'ensemble de la région. Les céréales coupées ont commencé à germer et la situation est particulièrement grave dans le cas de l'orge et des champs où les andains sont maigres et ont été incrustés en terre par les fortes pluies. Le blé sur pied a très bien résisté à la température inclémente; les céréales récoltées devraient être en bon état, mise à part une certaine décoloration. Les gelées localisées ont atteint les cultures semées tard dont le rendement et la qualité seront réduits. La pluie a favorisé la croissance des mauvaises herbes et du blé spontané, ce qui pourra gêner la moisson des champs déjà coupés. Les jachères sont vertes et bien poussées, mais nécessiteront un labourage supplémentaire avant la récolte. Les pâturages ont repris une belle couleur verte. Le bétail est en bon état. Il faudrait du temps chaud et sec au plus tôt pour accélérer la récolte.

Près de Big Beaver, dans le sud-centre de la province, il est tombé quelque 7 pouces de pluie depuis le 10 août. On fauche partout et l'on s'attend à récolter dix boisseaux de blé à l'acre. Les cultures fourragères, de même que les céréales secondaires sont médiocres. Toutefois, les pluies récentes ont fait reverdir les pâturages. La moisson a repris près de Gravelbourg lundi dernier avec un retard de deux semaines. Les échantillons ont révélé que le blé était sec et qu'il se classait dans la catégorie blé n° 2 et n° 3 nord. On constate des dommages dus au gel et une certaine germination. Il est trop tôt pour évaluer les rendements moyens de ce district.

Le moissonnage-battage est commencé à Val Marie dans le sud-ouest de la province et, à en juger par les échantillons, les céréales sont encore en bon état, malgré les fortes pluies reçues. Le blé donne environ 15 boisseaux à l'acre, l'orge 25 et l'avoine 40. Les champs de foin se sont améliorés. À Eastend, quelque 70 p.

100 du blé du printemps a été coupé et le moissonnage-battage a débuté au milieu de la semaine. On prévoit des rendements de 10 à 15 boisseaux à l'acre et, en moyenne, de 25 boisseaux à l'acre dans le cas des champs de blé d'hiver. Les provisions de fourrage semblent suffisantes.

La Ferme expérimentale de Swift Current signale que la pluie a empêché tout travail agricole au cours de la plus grande partie des deux dernières semaines, mais a aidé au remplissage des cultures semées tard. La moisson est en cours partout et 40 p. 100 du blé environ a été coupé; le moissonnage-battage commence. Les champs de blé sur les chaumes donnent de 5 à 12 boisseaux à l'acre, tandis que les jachères devraient donner de 15 à 25 boisseaux à l'acre (qualité passable à bonne). Les pâturages commencent à reverdir. La plupart des cultures ont été coupées dans les environs de Leader et le battage est commencé. D'après les premiers rapports, il semble que le rendement sera meilleur que prévu. D'après les échantillons, les grains sont bien remplis et fermes.

Dans la région centre-est, près de Melville, le gel a causé des dommages aux cultures. On fauche les céréales semées tôt. Les pluies qui durent depuis plusieurs semaines ont empêché de terminer la fenaison. Les pâturages sont en bon état pour le moment. La précipitation jusqu'ici dépasse la moyenne à long terme du district.

A Togo, le fauchage a commencé mais n'est pas encore général, étant donné que les plantes vertes et la pluie ont retardé la maturation. Le gel a détruit certaines cultures on trouve dans le blé des grains ratatinés et noirs. On s'attend à une lourde perte en qualité et en rendement et certains fermiers ont même l'intention de brûler la récolte. Les pâturages sont en bon état, mais une grande partie du foin n'est pas sec. A Sturgis, la température fraîche et humide des deux dernières semaines a retardé la maturation de toutes les cultures. Le seigle d'automne a été coupé. On a coupé une certaine partie de l'orge et on coupera le blé partout d'ici une semaine. Les dégâts causés par le gel varient de légers à graves dans les récoltes semées tard. La fenaison continue toujours, mais la qualité est mauvaise. Les pâturages sont en bon état.

Dans le centre de la province, près de Drake, la moisson a été retardée durant toute la semaine dernière par la pluie et le temps nuageux. Le fauchage a repris à peu près partout cette semaine et on fait le moissonnage-battage du seigle et de l'orge. Un temps sec et chaud permettrait d'accélérer la moisson. Le bétail est en bon état.

Dans le district de Rosetown, dans la partie centre-ouest de la province, la plupart des champs d'avoine et d'orge ont été coupés et une bonne partie du blé sera coupée cette semaine si le temps reste beau. Le moissonnage-battage devrait se faire partout d'ici huit jours. Une tempête de grêle, le 11 août, a causé des dommages considérables et on signale aussi des dégâts dus au gel. Les pluies récentes et les températures fraîches ont retardé le moissonnage près de Scott. Le retour de la chaleur et du soleil vient de permettre de reprendre le fauchage. La repousse de l'avoine et de l'orge est très importante et on signale une repousse tardive dans la plupart des champs de blé. Un faible gel aurait causé des dommages dans certaines régions, mais on ne croit pas que les dégâts aux récoltes soient étendus ou graves. On signale la présence de tenthrèdes dans quelques champs. Les pâturages et les herbages ont repris, grâce à l'amélioration des hygrométriques.

La Ferme expérimentale de Melfort dans le nord-est de la province signale que le temps pluvieux et froid a nui à la moisson. On estime que de 10 à 15 p. 100 de l'orge et du colza polonais on été coupés, tandis que le fauchage du blé, de l'avoine et du lin n'est pas commencé. S'il fait beau toutefois, on pourra faucher partout vers la fin de la semaine. La température est descendue de 2 à 5 degrés au-dessus du point de congélation pendant plusieurs nuits sur l'ensemble du nord-est et les dégâts aux récoltes varient de légers à importants selon les endroits. Il y a une grande quantité de pucerons, mais les dommages aux cultures ne semblent pas importants. Plusieurs cas de dommages dus à la grêle ont été signalés, mais on pense que ces pertes ne seront que légères.

La Saskatchewan Municipal Hail Insurance Association signale que les tempêtes de grêle ont été très fortes en août et ont même détruit certaines cultures. Il y a eu des orages de grêle le 4 août à Swift Current, Chamberlain, Dilke, Lumsden; le 5 août à Oxbow, Bienfait, Benson, Lampman, Halbrite, Weyburn, Milestone, Lang, Colfax, Neville, Glenbain, Gravelbourg, Limerick, Assiniboia, Verwood, Viceroy, Bengough, Ceylon Station, Radville, Hallonquist, Gull Lake, Morse, Calderbank, Central Butte, Eyebrow, Balgonie, Indian Head, Abernethy, Broderick, Hawarden; le 6 août à Weyburn, Griffin, Pense, Rowatt, Avonlea; le 11 août à Gladmar, Lake Alma, Davidson, Imperial, Semans, Mossbank, Ardill, Abbey, Cactus Lake, Kerrobert, Dodsland, Plenty, Herschel, Rosetown, Wiseton, Birsay; le 12 août à Girvin, Holdfast, Govan, Last Mountain, Markinch, Cupar; le 21 août à Estevan, Benson, Torquay, Bromhead, Oungre, Lake Alma, Minton, Verwood, Rockglen, Coronach, Major, Luseland. La Canadian Hail Underwriters' Association signale des tempêtes de grêle le 21 août à Torquay, Estevan et dans la région de Steelman, de même que le 23 août dans la région de Delisle.

La moyenne de la précipitation non pondérée dans la province depuis le 1er avril a été de 2 p. 100 au-dessous de la normale, comparativement à 7 p. 100 au-dessous il y a une semaine, 17 p. 100 au-dessous il y a deux semaines et à 51 p. 100 au-dessous il y a un an. La température moyenne de la semaine terminée le 26 août a été d'un degré au-dessous de la normale, contre 7.8 degrés au-dessous il y a une semaine, 6.5 degrés au-dessous il y a deux semaines et 5.7 degrés au-dessus au cours de la semaine close le 28 août 1967.

ALBERTA

Le temps frais et l'humidité ont retardé la maturation des récoltes dans l'ensemble de l'Alberta. La moisson est bien avancée dans le sud-est de la province et, à Taber, on a terminé la récolte de l'orge. La moisson se généralise dans le centre-sud de la province mais il faudra encore une semaine environ avant que l'on entreprenne partout les travaux dans la plupart des autres régions où les récoltes auraient besoin de chaleur et de temps sec. Le gel a causé de gros dégâts entre le 9 et le 16 août dans certains endroits du centre-sud et de la région de Rivière la Paix. Les cultures tardives ont été gravement atteintes, surtout dans les régions basses, et l'on craint que le rendement des récoltes plus avancées souffrira; cependant, il faut attendre la moisson pour en mieux juger.

Dans le sud-est de la province, à Manyberries, on a terminé de couper le blé dans une proportion d'environ 35 p. 100 et l'orge, dans une proportion de 80 p. 100. On a commencé à moissonner le blé et le rendement moyen est de 23 boisseaux l'acre. Vingt pour cent de la moisson d'orge est terminée et on signale un rendement moyen de quelque 47 boisseaux l'acre. Il est tombé environ 1.83 pouces de pluie dans la région la semaine dernière. Le bétail se porte bien. La moisson est bien avancée

à Medicine Hat et, s'il fait beau temps, elle sera en grande partie terminée d'ici une semaine sauf dans certaines terres irriguées de Cypress Hills. Le rendement s'annonce bon et on prévoit que la récolte de blé sera d'environ 20 boisseaux l'acre. Les pâturages et le bétail sont en bon état.

A Lethbridge, dans le sud-ouest de la province, la moisson a été retardée de sept à dix jours à cause de l'humidité et du temps frais. Le blé d'hiver donne de 40 à 60 boisseaux l'acre. On fauche les céréales de printemps partout au sud de Calgary. Le blé de printemps semé dans les terres sèches fournit 30 à 35 boisseaux dans la région de Bow Island. Partout les prairies naturelles sont belles. Le maïs sucré est lent à mûrir et on commencera la récolte vers le 9 septembre. La récolte des haricots verts et jaunes et des pois est presque terminée. La betterave à sucre aurait besoin de plus de chaleur. A Cardston, on coupe le blé d'automne et on a commencé à faucher à la moissonneuse-batteuse vers le 25 août. On prévoit un bon rendement. Les céréales de printemps mûrissent vite et promettent un bon rendement. Le temps humide a retardé la fenaison dans la région. Les pâturages et le bétail sont en bon état. Il n'y a pas eu de gel jusqu'à présent. Vingt-cinq pour cent des céréales ont été coupées et on a commencé le battage dans la région de Claresholm. L'humidité a causé des dommages à une partie des céréales. On prévoit que le poids sera élevé et le rendement fort satisfaisant si les conditions de température sont bonnes.

A Brooks, dans la région du centre-sud, la récolte bat son plein après un retard de dix jours causé par l'humidité. Des chargements de pois de semence sont livrés par camion aux établissements locaux. Le rendement de la moutarde est en moyenne de quelque 900 livres l'acre, celui du seigle d'automne d'environ 26 boisseaux, celui de l'orge d'environ 40 boisseaux et celui du blé est de 20 à 40 boisseaux l'acre. Les cultures dans les terres irriguées sont belles dans l'ensemble et le fauchage est bien avancé; l'orge fournit environ 60 boisseaux l'acre. La récolte de carottes est bonne dans la région. On fauche l'orge partout dans la région de Vulcan et on a commencé à faucher à la moissonneuse-batteuse. On commence cette semaine à couper le blé de printemps et le colza. Il est tombé un pouce de pluie au cours des deux dernières semaines. Les récoltes se sont mises à mûrir rapidement et les pâturages sont beaux.

Dans la région de l'est central, à Hanna, le gros gel du début d'août a endommagé les céréales et tué les cultures potagères. On a fait un peu de fauchage dans la région. Beaucoup de champs sont infestés de folle avoine. Il est difficile de garder propres les jachères d'été en raison des fortes pluies. Les pâturages de la région sont en bon état.

A Calgary, le retour du temps chaud a accéléré la maturation des céréales la semaine dernière. On fauchera partout d'ici une semaine à dix jours si le temps se maintient au chaud. On prévoit que le rendement des céréales sera supérieur à la moyenne et que la qualité sera très bonne. A Olds, on a commencé à couper de l'orge hâtif. Toutefois, il faudra encore une semaine avant que toutes les récoltes soient fauchées. Les blés sont verts et ont besoin de chaleur pour mûrir. Une seconde pousse commence à sortir en plusieurs endroits.

Dans le centre nord-est, à Vermilion, les récoltes ont été gravement endommagées par le gel qu'il y a eu au milieu du mois. On signale aussi de la rouille et de la moisissure. Il faudrait de la chaleur et du soleil pour faire mûrir les récoltes. On a commencé le fauchage des céréales secondaires. Cependant, il faudra attendre encore environ dix jours avant de pouvoir faucher partout. Les rendements

s'annoncent moyens ou supérieurs à la moyenne selon qu'il fera beau. On ne connaîtra la gravité des dommages causés par le gel qu'au moment de la moisson et du battage.

Dans la région centre et nord-ouest, à Edmonton, la pluie et le froid ont arrêté tous les travaux. Il faudrait immédiatement de la chaleur et un arrêt des pluies pour faire mûrir les cultures tardives et permettre la récolte des cultures hâtives. A Stony Plain, on a commencé le fauchage de l'orge mais le temps frais et humide a généralement retardé la maturation. Il a gelé deux nuits la semaine dernière, et les dommages causés aux plantes potagères varient de légers à graves. Les céréales n'ont été que peu touchées. La repousse de l'orge et de l'avoine est abondante et les champs mûrissent très inégalement.

Les récoltes mûrissent fort lentement dans la région de Red Deer et il faudra une semaine à dix jours avant que l'on puisse faucher partout. On a déjà coupé quelques récoltes hâtives dans la région. Il y a eu beaucoup de repousse et un bon nombre de cultivateurs fauchent les récoltes tardives pour l'ensilage. Il a gelé dans la région au sud et à l'ouest de Red Deer ce qui a causé certains dégâts aux cultures, surtout à celles qui étaient en fleurs. A Lacombe, le temps frais et pluvieux a retardé considérablement la maturation et les risques de pertes à cause du gel sont très grands. La repousse est abondante dans la plupart des champs. On fauchera l'orge partout d'ici le 29 août, et on prévoit un rendement d'environ 28 boisseaux l'acre. On prévoit que le blé donnera en moyenne 18 boisseaux, l'avoine 50 boisseaux et le colza 20 boisseaux. L'humidité et le temps frais ont retardé le fauchage dans la région d'Eckville. Les cultures tardives mûrissent très lentement et il leur faudrait deux à trois semaines de temps chaud et sec. Les jachères d'été sont dans un état satisfaisant. On ramasse la deuxième coupe de foin et les rendements sont en moyenne d'une demi-tonne à une tonne l'acre.

Dans la région de Rivière la Paix, à Beaverlodge, on a presque terminé la récolte de fétuque et les rendements varient de 200 à 600 livres l'acre. Environ 15 p. 100 de l'orge a été coupé. Le blé, l'avoine et le lin sont lents à mûrir en raison de l'humidité et du temps frais. On signale que des récoltes ont été endommagées dans les régions basses. A Berwyn, le gel a causé des dommages variant de légers à graves. Le fauchage de l'orge vient de commencer. La plupart des récoltes sont encore vertes et les grains se remplissent très lentement. On prévoit de bons rendements mais la qualité sera faible. La récolte de foin est à peu près normale mais la qualité est médiocre en raison du temps pluvieux.

L'Alberta Hail Insurance Board signale les tempêtes suivantes: le 11 août, grande tempête commençant à Cremona à 14 h et se déplaçant vers le sud-est en passant par Balzac, Delacourt, Strathmore, le nord de Gleichen et de Cluny jusqu'à Bassano, Countess, Rosemary, Millicent et arrivant à Patricia à 17 h. La tempête se déplaçait sur une largeur de deux à quatre milles, et les régions situées directement sur le passage de la tempête, ont été complètement ruinées. Les vents atteignaient de 40 à 50 milles à l'heure tandis qu'il tombait des grêlons de la grosseur d'une balle de golf. On signale des dégâts importants à quatre milles au nord-est d'Armada et à 8 milles au nord de Rainier. Il y a eu des tempêtes locales à Carstairs le 17 août, à Beaverlodge le 21 août et à Bellis, St. Paul et Rivercourse le 22 août.

La Canadian Hail Underwriters' Association signale une tempête dans la région d'Andrew le 21 août.

La moyenne non pondérée des précipitations dans la province depuis de 1er avril a été de 1 p. 100 supérieure à la normale comparativement à 0.4 p. 100 au-dessus de la normale il y a une semaine, à 1 p. 100 au-dessus de la normale il y a deux semaines, et à 27 p. 100 au-dessous de la normale il y a un an. La température moyenne de la semaine qui se termine le 26 août 1968 a été de 0.3 degré au-dessus de la normale contre 4.2 degrés au-dessous de la normale il y a une semaine, 7.4 degrés au-dessous de la normale il y a deux semaines et 5 degrés au-dessus de la normale la semaine qui se terminait le 28 août 1967.

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Dans le district de Kamloops, le temps humide et anormalement froid pour la saison a retardé les pâturages irrigués et du maïs d'ensilage. La récolte de la seconde coupe de luzerne est terminée. Les pommes de terre et les tomates s'annoncent belles. Le temps est favorable aux pâturages naturels.

A Agassiz, dans la basse vallée de la Fraser, l'humidité qui sévit depuis le 14 août a retardé la moisson et fait verser les céréales. La troisième coupe de foin, qui est abondante, n'a pas pu être fauchée. Le maïs et les haricots sont beaux et l'on prévoit des rendements excellents. Les pâturages sont drus; la cueillette des bleuets est en cours et l'on prévoit un bon rendement.

On signale de Summerland, dans l'Okanagan, que le froid et l'humidité qui persistent ont retardé la maturation de tous les fruits. La cueillette des pêches bat son plein et celle des poires Bartlett est presque terminée. On commencera la cueillette des pommes McIntosh dans dix jours. La semaine prochaine on pense commencer la cueillette du raisin dont la récolte sera bonne.

De Vernon, dans le nord de l'Okanagan, on signale un temps généralement froid et pluvieux. Les pâturages sont excellents et la troisième coupe de foin qui est abondante va bientôt pouvoir être fauchée. Le maïs d'ensilage aurait besoin de chaleur, mais les épis viennent bien. La moisson des céréales est presque terminée. Dans les champs non irrigués, le rendement moyen du blé d'automne est de 40 boisseaux à l'acre et dans les champs irrigués il est de 80 boisseaux à l'acre.

On signale de Prince George, dans la région centrale de l'intérieur, que la maturation des céréales a été retardée par un temps frois et humide. Une partie de l'orge mûrit mais l'avoine et quelques champs de blé restent encore verts. La récolte des principaux fourrages est terminée mais une grande quantité de foin en balles a été laissée dans les champs. On récolte l'ensilage mais le mauvais temps gêne les travaux. Le mauvais temps persiste sur l'ensemble du centre-nord intérieur.

A Smithers, dans la vallée de la Skeena, la fenaison est terminée et le rendement a été supérieur à la moyenne. Il reste toutefois une certaine quantité de foin en balles dans les champs. L'ensilage a été fauché et l'orge pourra bientôt être fauché, mais il faudrait de la chaleur pour le rendre plus dur. Les céréales s'annoncent bonnes mais la moisson n'est pas encore commencée. Les conditions hygrométriques sont bonnes dans la région de Smithers.

On signale de Dawson Creek, dans la région de la Rivière de la Paix, que l'on a fauché de 20 à 25 pour cent de l'orge et que l'on en a fauché une certaine quantité à la moissonneuse-batteuse. Le froid a causé certains dégâts dans les régions basses. La récolte de blé est prometteuse et on devrait commencer le fauchage dans dix jours si le temps le permet. La récolte de la fétuque est terminée, les rendements sont de 300 à 400 livres à l'acre.

Dans la région de Fort St John, les dégâts causés par le froid sont très importants et les pertes pourraient atteindre 50 pour cent. La récolte de la fétuque est presque terminée et on est entrain de faucher ou de passer à la moissonneuse-batteuse de l'orge et un peu de blé d'hiver. Il faudrait un temps chaud et sec pour permettre la maturation et faciliter les travaux de la moisson.

Precipitation and Temperature Data, Prairie Provinces(1)

Province and crop district	Station	Precipitation: Week ending 8 a.m. August 26, 1968	Precipitation: Total since April 1	Precipitation: Normal since April 1	Mean temperature week ending 8 a.m. August 26: 1968	Mean temperature: Normal
		inches			degrees F.	
MANITOBA						
1	Boissevain	2.76	14.36	11.74	56	61
	Pierson	.91	11.71	10.61	58	62
	Waskada	1.70	16.50	11.16	56	62
2	Baldur	3.13	17.73	11.43	55	62
	Pilot Mound	2.18	21.02	11.34	58	62
3	Altona	.87	15.42	10.65	60	63
	Deerwood	4.48	23.84	11.07	57	64
	Graysville	3.49	20.89	10.06	56	63
	Morden	3.59	20.88	11.35	59	64
	Morris	1.86	19.85	10.54	60	64
	Portage la Prairie	2.00	17.97	12.88	59	63
	Roland	1.99	18.23	10.83	59	63
4	Stonewall	2.70	20.11	11.63	57	63
5	Emerson	1.10	20.39	11.11	61	63
	Steinbach	2.00	17.59	11.01	59	62
	Winnipeg	2.05	19.46	11.29	62	63
	Starbuck	2.81	16.97	11.03	60	63
6	Seven Sisters Falls	1.32	20.89	10.90	59	62
	Great Falls	N.R.	11.45(2)	8.69	N.R.	63
	Sprague	3.24	22.49	12.18	60	60
7	Rivers	1.74	13.95	11.35	58	62
	Virden	.65	12.36	10.93	59	62
8	Brandon	.42	13.65	11.66	57	61
	Cypress River	2.08	16.34	11.20	60	62
9	Gladstone	1.22	14.86	11.34	N.R.	62
10	Birtle	.30	11.03	11.52	56	60
	Rossburn	.18	13.41	10.62	57	61
	Russell	.45	8.36	9.46	56	59
11	Dauphin	.20	9.29	11.25	57	61
12	Arborg	.57	15.13	10.89	56	61
	Gimli	1.81	16.77	11.55	53	61
	Steep Rock	N.R.	11.43(2)	10.10	N.R.	61
13	Swan River	.57	12.98	10.97	55	61
	The Pas	.12	10.13	9.53	51	59
14	Grass River	N.R.	8.03(2)	11.30	N.R.	61
MANITOBA AVERAGE		1.70	16.39	11.00	57.6	61.9

See footnotes on page IV.

Precipitation and Temperature Data, Prairie Provinces(1)

Province and crop district	Station	Precipitation: Week ending 8 a.m. August 26, 1968	Precipitation: Total since April 1	Precipitation: Normal since April 1	Mean temperature week ending 8 a.m. August 26: 1968	Mean temperature: Normal
		inches			degrees F.	
SASKATCHEWAN						
1A	Carlyle	.76	9.96	10.11	57	60
	Estevan	2.12	10.68	9.87	60	64
	Oxbow	N.R.	9.61(2)	9.26	N.R.	61
	Willmar	1.30	8.45	10.67	N.R.	N.R.
1B	Broadview	1.68	9.14	11.07	57	59
	Moosomin	.51	9.92	11.23	58	60
2A	Yellow Grass	1.28	11.37	9.59	59	61
	Weyburn	2.79	12.75	9.51	60	61
	Midale	N.R.	7.48(2)	9.55	N.R.	62
2B	Moose Jaw	.14	6.68	9.10	61	63
	Regina	.76	6.30	9.44	60	61
	Francis	.86	9.27	9.05	58	60
	Indian Head	1.12	7.21	9.34	59	60
3AS	Ormiston	.26	4.88	9.57	60	61
	Cardross	.46	7.74	9.56	63	61
	Ceylon	1.94	9.58	9.74	59	60
3AN	Gravelbourg	.15	3.27	8.03	61	62
3BS	Shaunavon	.33	5.16	8.27	62	61
	Pambrun	.38	4.91	8.84	60	61
	Climax	N.R.	3.79(2)	7.54	N.R.	N.R.
	Aneroid	.09	4.47	8.01	59	61
	Instow	N.R.	3.27(2)	8.40	N.R.	60
3BN	Swift Current	.41	5.56	9.29	61	61
	Pennant	1.08	4.44	8.21	58	61
	Hughton	.53	7.96(2)	7.48	60	61
4A	Maple Creek	.46	5.97	7.67	63	62
	Consul	.91	6.34	7.15	58	60
4B	Abbey	.16	5.78	7.80	60	61
	Leader	.45	8.73	7.26	60	62
5A	Balcarres	.76	5.27(2)	9.80	N.R.	N.R.
	Lipton	.66	9.63	9.70	57	61
	Melville	1.05	10.08	9.96	56	60
	Yorkton	.32	9.70	9.90	56	60
	Bangor	1.03	10.64	10.29	56	60
5B	Wynyard	.47	7.24	9.42	59	60
	Foam Lake	.50	7.03	9.43	58	59
	Kuroki	.18	7.89	9.74	56	57
	Lintlaw	N.R.	.98(2)	9.87	N.R.	56
	Kamsack	.72	10.08	9.28	57	61
6A	Davidson	N.R.	7.75(2)	8.69	N.R.	60
	Strasbourg	.24	6.53	9.57	60	60
	Watrous	.80	9.30	8.42	59	60

See footnotes on page IV.

Precipitation and Temperature Data, Prairie Provinces(1)

Province and crop district	Station	Precipitation: Week ending 8 a.m. August 26,1968	Precipitation: Total since April 1	Precipitation: Normal since April 1	Mean temperature week ending 8 a.m. August 26: 1968	Mean temperature week ending 8 a.m. August 26: Normal
		inches			degrees F.	
SASKATCHEWAN — CONCLUDED						
6B	Harris	N.R.	7.81(2)	7.34	N.R.	60
	Outlook	.70	7.47	7.42	62	61
	Rosthern	1.31	11.56	8.03	57	59
	Saskatoon	1.05	11.91	7.86	59	60
	Elbow	.86	5.67	8.97	61	61
	Tugaske	.85	7.98	9.08	60	60
	Dundurn	1.17	13.25	7.71	60	61
7A	Alsask	.50	9.28	6.89	60	60
	Kindersley	.68	7.59	7.24	60	60
	Rosetown	.72	9.15	8.24	60	60
7B	Macklin	.99	10.79	8.21	60	59
	Denzil	.86	12.59	8.09	60	58
	Scott	1.35	9.04	8.33	59	58
	Biggar	1.40	10.35	8.10	60	60
8A	Hudson Bay	.13	11.59	10.14	54	58
	Prairie River	.24	11.54	10.28	55	57
8B	Humboldt	.51	9.88	8.17	58	59
	Melfort	1.03	10.38	9.05	57	58
9A	North Battleford	1.20	8.92	8.01	60	59
	Victoire	.88	10.54	8.78	62	57
	Prince Albert	.72	11.67	9.13	58	59
9B	Waseca	1.49	11.26(2)	9.27	58	57
SASKATCHEWAN AVERAGE		.81	8.67	8.89	59.0	60.0
ALBERTA						
1	Empress	.22	8.32	7.52	60	61
	Foremost	.02	8.31	7.74	61	62
	Manyberries	.04	6.59	6.91	61	63
	Medicine Hat	.35	8.67	7.53	63	63
2	Brooks	Nil	7.14	7.89	61	61
	Drumheller	Nil	7.46(2)	8.03	66	58
	Gleichen	.59	10.21	9.02	59	59
	Hays	.20	6.15	7.05	59	62
	Rainier	.06	7.25	7.96	60	60
	Vauxhall	.53	9.06	7.23	59	60
	Raymond	.25	9.45	8.26	59	60
	Lethbridge	.23	9.82	9.19	60	60
	Trochu Equity	.41	9.31	10.32	58	58
	Queenstown	.78	12.49	9.39	59	59

See footnotes on page IV.

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHEQUE STATISTIQUE CANADA
1010523817

Precipitation and Temperature Data, Prairie Provinces(1)

Province and crop district	Station	Precipitation: Week ending 8 a.m. August 26, 1968	Precipitation: Total since April 1	Precipitation: Normal since April 1	Mean temperature week ending 8 a.m. August 26: 1968	Mean temperature: Normal
		inches			degrees F.	
ALBERTA — Concluded						
3	Calgary	.26	8.38	11.05	58	57
	Cardston	.77	10.42	10.17	57	59
	Pincher Creek	.54	10.71	11.00	57	57
	Fort MacLeod	.72	9.80	10.21	60	61
	High River	.41	14.00	11.31	55	56
	Magrath	.35	8.93	10.22	59	61
	Olds	.02	12.02	11.76	56	56
4	Alliance	.74	10.48	8.89	60	58
	Coronation	.95	8.61	8.81	59	58
	Hughenden	.74	10.54	8.89	59	58
	Lloydminster	.91	10.46	9.09	57	59
	Stettler	.68	9.66	10.04	55	57
	Vegreville	.84	8.56	9.53	58	57
	Ranfurly	1.35	9.42	10.27	58	57
	Vermilion	.51	11.85	9.63	58	56
5	Edmonton	.98	8.50	11.55	56	57
	Lacombe	.70	11.59	11.70	56	57
	Red Deer	.47	12.09	11.08	55	57
	Rocky Mountain House	.33	15.86	13.10	53	55
	Wetaskiwin	.57	8.62	11.30	58	57
6	Athabasca	.45	9.08	10.43	55	56
	Campsie	N.R.	10.08(2)	11.92	N.R.	55
	Edson	.47	12.49	12.96	51	54
	Elk Point	.75	9.21	9.85	58	55
	Lac la Biche	.72	7.38	10.08	60	57
	Whitecourt	2.03	11.22	12.60	56	54
7	Beaverlodge	1.25	9.97	8.85	56	55
	Fairview	.32	8.17	8.84	58	56
	Ft. Vermilion	Nil	4.16	7.36	59	55
	Grande Prairie	1.08	12.24	8.78	57	56
	High Prairie	.47	8.83	10.06	56	55
	Peace River	.31	7.32	7.26	56	55
	Rycroft	.48	9.69	9.07	58	56
	Wagner	.86	12.28	9.11	57	55
ALBERTA AVERAGE		.55	9.68	9.60	58.0	57.7

(1) Source: Meteorological Service of Canada.
(2) Incomplete; not included in average.
N.R. - No report.