22-002F
no 9
1969
11 juin
c. 3

Pou ;UE
11 é le
de 3 h.
. A. E.)

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

OTTAWA - CANADA

Publication autorisée par le ministre de l'Industrie et du Commerce

Série de 20 rapports: $4.00

Séries de Rapports sur les Grandes Cultures — N° 7

RAPPORT TELEGRAPHIQUE SUR LES CULTURES — CANADA

Le Bureau fédéral de la statistique publie aujourd'hui le deuxième d'une série de six rapports télégraphiques sur l'état des cultures à travers le Canada. Le présent rapport comprend en outre le quatrième d'une série de onze rapports télégraphiques sur l'état des cultures dans les provinces des Prairies. Les renseignements sur lesquels reposent ces rapports sont fournis par des correspondants agricoles spécialement désignés des ministère fédéral et provinciaux de l'Agriculture, par des observateurs particuliers et par des entreposeurs de céréales. Les renseignements météorologiques proviennent de la Division de la météorologie, ministère des Transports.

SOMMAIRE

Provinces Maritimes. — Dans l'ensemble, les provinces maritimes connaissent du temps favorable depuis quelques semaines. Dans l'Ile du Prince-Edouard, la pluie et la chaleur aidant, la croissance a été excellente. L'état des pâturages est normal et les nouvelles prairies de foin sont prometteuses. La plantation du tabac est terminée dans une proportion de 35 p. 100 et celle des pommes de terre, dans une proportion de 80 ou 85 p. 100; 90 ou 95 p. 100 des semailles de céréales sont chose faite. La récolte de fraises et de céréales hâtives s'annonce bonne. En Nouvelle-Ecosse, 75 p. 100 de l'ensemencement des cultures est terminé. Des rapports en provenance de la région du comté de Cumberland signalent que les semailles de céréales sont à 75 p. 100 terminées et qu'on a augmenté les superficies de céréales à grains et de céréales d'ensilage. Dans le centre de la Nouvelle-Ecosse, l'ensemencement est en retard de deux semaines par rapport à l'an dernier. Dans l'est de la Nouvelle-Ecosse, le temps froid a sévi jusqu'à ces derniers jours. Suivant des rapports en provenance de la vallée d'Annapolis, il fait beau depuis une semaine et l'ensemencement des céréales et du mais est presque terminé. Au Nouveau-Brunswick, le temps frais de la dernière semaine de mai n'a pas sérieusement entravé la croissance des pâturages et des fourrages. Le dactyle pelotonné est en épis et les cultivateurs qui n'ont pas besoin de pâturages ont commencé à le hacher à l'état vert. Pendant la semaine du 26 mai, on a ensemencé de grandes superficies de graines céréalières, mais on a attendu jusqu'à la semaine du 2 juin pour le faire dans les champs humides. La plantation du tabac est commencée et la gelée n'a pas causé de dégâts. Les fraisiers sont en fleurs dans toute la province. Toutefois, la gelée du 27 mai a quelque peu endommagé les premières fleurs dans la plupart des régions. Les légumes semés tôt poussent bien dans toutes les régions de culture commerciale.

Division de l'agriculture, Section des cultures.

5502-509

Le présent document peut être reproduit en toute liberté pourvu qu'on indique qu'il émane du B.F.S.

Québec. — Le temps pluvieux et froid a retardé les travaux au Québec. Toutefois, même si l'ensemencement est en retard d'une à deux semaines, la plupart des grandes cultures, en particulier celles des pommes de terre, du maïs à grain et des betteraves à sucre, ont été semées dans le sud et le centre de la province. Ailleurs, les travaux progressent rapidement. Les conditions hygrométriques sont généralement normales dans les sols légers, mais les sols lourds, mal drainés, sont encore trop détrempés, et cela retarde les travaux des champs. L'état des champs de foin et des pâturages varie de moyen à excellent et le bétail est au pâturage depuis la fin de mai. La production de sirop d'érable a été plus faible que l'année dernière.

Ontario. — Un printemps froid et précoce ainsi que de fortes pluies tombées au cours des deux dernières semaines d'avril dans la plupart des régions de l'Ontario ont détruit tout espoir de pouvoir semer tôt. En général, les conditions ont été bonnes pour les cultures qui passent l'hiver en terre. Le blé d'hiver, le foin et les pâtures poussent bien après avoir subi peu ou point de dégâts pendant l'hiver. Dans la plupart des comtés, on signale que les vaches laitières n'ont pas été mises en pâturage que pendant les derniers jours de mai. Malgré cette date tardive de mise en pâturage, on signale que les vaches laitières et les bovins de boucherie sont en bon état et donnent du lait. Le gel survenu les 25 et 26 mai dans la plupart des régions où l'on cultive le tabac a obligé les producteurs de tabac, devant être séché à l'air chaud, de replanter une partie de leurs champs. La transplantation du tabac Burley a été retardé à cause de l'humidité du sol.

Province des Prairies. — Les semailles sont maintenant presque terminées dans toutes les provinces des Prairies. En Saskatchewan et au Manitoba le démarrage a été bon, mais dans certains coins de l'Alberta les conditions sont moins favorables et la germination est de qualité variable dans certains districts, en raison du manque d'humidité. Le besoin de pluie se fait vivement sentir en Alberta et, dans une mesure moindre, en Saskatchewan et dans le nord-ouest du Manitoba. Les céréales semées à l'automne en sont à l'épiage ou presque. Les travaux dans les jachères et la pulvérisation d'herbicides sont commencés.

Rouille signalée dans les provinces des Prairies. — La station de recherches du ministère fédéral de l'Agriculture à Winnipeg signale que des traces de rouille de la tige apparaissent sur le blé d'hiver dans le centre-nord du Kansas, mais on n'en a pas observées plus au nord. La rouille de la feuille se manifeste jusqu'au Minnesota, mais le temps froid en a retardé la marche. La rouille n'est pas encore apparue sur les céréales de l'Ouest canadien.

Colombie-Britannique. — Le temps chaud et sec a été général en Colombie-Britannique au cours des deux dernières semaines et a favorisé la croissance. Les pâturages et le foin sont généralement en bon état dans toutes les régions et particulièrement dans celles qui sont irriguées. La cueillette des fraises sur la côte est en cours et la production de laitue est à son plus fort. Les perspectives pour les framboises et pour les pommes de terre primeurs restent favorables et la récolte pourrait commencer à la fin du mois. Dans la vallée de l'Okanagan, l'état des arbres à fruits tendres demeure inégal; il n'y a pas de pêches et l'on prévoit une réduction de la production de cerises, de prunes et de poires à cause des dégâts de l'hiver. Cependant, la situation actuelle semble annoncer une récolte moyenne de pommes. La nouure des jeunes pommiers est bonne, ce qui compense le déclin des vieux pommiers, particulièrement dans les régions du nord de la vallée. La récolte des asperges est presque terminée et les températures plus élevées favorisent la croissance des cultures ayant besoin de chaleur. Dans la région de la Rivière de la Paix, les semailles de céréales sont presque terminées à l'exception de l'orge. Les conditions hygrométriques du sol sont généralement satisfaisantes, mais il faudrait de la pluie pour

assurer le démarrage de la croissance.

PROVINCES MARITIMES

On signale de l'Ile du Prince-Édouard qu'il a fait frais en mai et que la croissance des plantes était en retard. Toutefois, au commencement de juin la situation était redevenue normale; l'herbe pousse vite et les pâturages s'annoncent bons. La plantation des pommes de terre est presque terminée et la plupart des céréales commencent à poindre. La plantation des navets a été restreinte, mais on s'attend que d'ici quelques jours elle soit à peu près terminée. Les pois de conserve sont semés partout et les premières pousses apparaissent déjà. En général, les fraisiers n'ont pas souffert de l'hiver, mais le gel a quelque peu endommagé les variétés hâtives. Le maïs fourrager semé tôt commence seulement à poindre.

En Nouvelle-Écosse les conditions atmosphériques ont été favorables ces deux dernières semaines. On signale dans la région du comté de Cumberland que les semailles des céréales à grains sont terminées dans une proportion de 75 p. 100 et qu'on a augmenté les superficies de céréales à grains et de céréales d'ensilage. La superficie ensemencée de maïs a aussi augmenté. Les producteurs s'attendent à une bonne récolte de fraises et à une récolte moyenne de bleuets. Dans le centre de la Nouvelle-Écosse l'ensemencement retarde de deux semaines par rapport à l'an dernier. Toutefois, le temps est favorable depuis deux semaines. Les semis de maïs sont terminés à 90 p. 100 et la superficie ensemencée est deux fois plus grande que l'an dernier. Les semailles de céréales sont terminées dans une proportion de 70 à 75 p. 100. Les pâturages et le foin d'ensilage accusent un retard à cause du mauvais temps qu'il a fait au printemps, mais la croissance commence à s'accélérer, grâce au temps chaud. Dans l'est de la Nouvelle-Écosse, il a fait froid jusqu'à ces derniers jours. Les céréales sont semées dans une proportion de 50 à 66 p. 100 et les premières commencent à pousser. Depuis deux semaines, la croissance des pâturages et du foin d'ensilage a été bonne. On espère commencer la fenaison à la fin de juin. Les légumes hâtifs ont été plantés. Dans la vallée d'Annapolis il a fait beau toute la semaine. Les semailles de céréales sont terminées à 75 p. 100 et celles du maïs, à 85 p. 100. Le foin d'ensilage et les pâturages progressent bien et on procédera la semaine prochaine à l'ensilage du foin et d'autres cultures. Les producteurs de tabac sont occupés; 60 p. 100 de la plantation est terminée. On s'attend que la laitue fera son apparition sur le marché dans trois semaines. Les tomates et les piments sont transplantés. Dans la région d'Amherst, on signale que les conditions atmosphériques ont été très favorables à la croissance depuis un mois. l'état des champs de foin et des pâturages semble un peu au-dessus de la moyenne pour ce temps-ci. On vient seulement de terminer les semis et le retard est dû au temps extrêmement humide et frais du mois de mai. Dans la région de Truro, les conditions hygrométriques sont satisfaisantes depuis deux semaines et les jours sont maintenant ensoleillés et chauds et les nuits, fraîches. Les semailles de céréales devraient se terminer cette semaine. Les pommes de terre plantées tôt commencent à pousser, mais la plantation de certaines variétés tardives n'est pas encore terminée. Les fraisiers sont en pleine floraison et la récolte s'annonce bonne. L'hiver et le gel ont causé peu de dégâts. Les rapports en provenance de Kentville signalent que les pommiers sont en fleurs et en pollination. Les conditions atmosphériques ont été bonnes et les parasites n'ont pas encore causé trop de difficultés. On a enrayé les pucerons, les mites et les arpenteuses tardives, mais les pique-boutons sont plus nombreux qu'avant et le nombre de pyrales de la pomme qui ont survécu à l'hiver est considérable.

Au Nouveau-Brunswick le temps frais de la dernière semaine de mai n'a pas retardé la végétation. Cette année, les cultivateurs ont conduit leurs bovins aux pâturages collectifs près de quatre jours plus tard que d'habitude et, au 31 mai, presque tous les bovins étaient sortis de l'étable. L'humidité des sols est suffisante pour assurer un rendement de foin moyen ou légèrement supérieur à la moyenne; il faudrait toutefois plus de chaleur pour la croissance. Presque toutes les céréales sont semées et elles poussent de façon satisfaisante dans toute la région. Les plants de tabac sont en assez bon état pour être transplantés; 50 p. 100 de la superficie était plantée au 7 juin. Les pommiers en sont au stade du calice et il y a encore quelques fleurs. La floraison a été retardée cette année dans la vallée de la rivière Saint-Jean. Les fraisiers sont en fleurs partout dans la province et les variétés hâtives portent déjà des fruits verts. Dans la plupart des régions de la province, le gel du 27 mai a endommagé les premières fleurs. Les peuplements dans les champs productifs qui sont clairsemés à cause de la grande sécheresse de 1968 semblent avoir souffert très peu ou pas du tout de l'hiver. Les bleuets sont en fleurs depuis la semaine dernière et les abeilles domestiques ont été placées dans les champs la première semaine de juin, en vue de la pollination. Les transplantations de légumes hâtifs sont déjà faites et les tomates, les concombres, les piments, les courges et autres cultures qui ne supportent pas le gel sont en voie d'être transplantés. Les champs de la région de Maugerville-Sheffield sèchent, de sorte qu'on pourra commencer la plantation et l'ensemencement. Le foin semé dans les champs ayant reçu de fortes doses d'engrais est en excellent état, mais les prairies non engraissées accusent peu de végétation. Le maïs pousse très lentement et les pommes de terre commencent seulement à poindre. Une période critique de manque d'humidité est à prévoir prochainement. Dans la région de Perth, la plantation est terminée à près de 80 p. 100 et les semis se font plus tard qu'en temps normal à cause du froid de la première semaine de juin. Le temps froid a endommagé les fraisiers hâtifs et la récolte s'annonce moins bonne que d'habitude. Les céréales semées tôt émergent de trois à quatre pouces et les herbages et les pâturages sont en bonne croissance. On trouve des pucerons partout et les livrées infestent la région.

QUEBEC

Les producteurs de tabac de la région de l'Assomption ont maintenant planté la moitié du tabac jaune et commencent à repiquer le tabac à cigares. On n'a pas tout à fait fini de semer les herbages et les céréales. A Saint-Jean, en moyenne, la température en mai a été de 2 degrés inférieure à la normale et la précipitation a beaucoup varié d'un endroit à l'autre. De fortes gelées, les 26 et 27 mai, ont endommagé les fleurs des pommiers et des fraisiers. Les pommiers ont atteint leur pleine floraison le 1er juin, soit une dizaine de jours plus tard que la normale. Il a fallu vaporiser cinq ou six fois pour enrayer la tavelure. Les semailles de légumes dans les sols d'humus sont presque terminées, sauf pour ce qui est des cultures tardives et du repiquage du céleri. Dans les sols minéraux, les pluies fréquentes et les basses températures de mai ont retardé d'une façon considérable les semis des pois, des fèves et du maïs et le démarrage des crucifèracées.

En mai, le temps froid et pluvieux à Lennoxville a retardé les semailles des céréales, du maïs fourrager et des légumes. Les plantes ont poussé lentement, mais les pâturages sont bons. Le semis des pommes de terre est terminé et à peu près la moitié des céréales ont été semées. Le 9 juin, le gel a fait descendre la température à 30 degrés. Le bétail est au pâturage depuis la fin de mai. À La Pocatière, grâce au temps beau et frais des deux dernières semaines, les cultivateurs ont presque terminé leurs semailles. Les cultures semées tôt démarrent bien et l'hiver

n'a pas endommagé le foin. Les pâturages poussent bien, mais sont en retard par suite des basses températures et du manque de pluie. Le colza et les navets sont atteints pas les insectes. Les arbres fruitiers ont bien résisté à l'hiver. Il n'est tombé qu'un demi-pouce de pluie depuis une semaine.

À Normandin, dans le district du Lac-Saint-Jean, les températures ont été normales en mai et il est tombé 2.18 pouces de pluie. A la fin de mai, les semailles étaient terminées. La pluie a amélioré les pâturages au début de juin et le bétail s'y trouve depuis le 2 du mois. La production de lait est très bonne. Dans le district de Caplan, en mai, les températures ont été basses et il est tombé 2.65 pouces de pluie, ce qui est inférieur à la normale. Les semailles ont été retardées. Le dernier gel a eu lieu le 28 mai et le temps est froid et pluvieux depuis le début de juin. Les pâturages sont en retard mais ils s'améliorent sensiblement depuis la fin de mai; la production de lait est forte. Dans certaines parties du district, les pommes de terre démarrent bien et on a fini de semer les légumes.

ONTARIO

Dans le comté d'Essex, dans le sud de l'Ontario, les pluies ont retardé les semailles du printemps. Actuellement, 60 p. 100 du maïs sont semés, mais seulement une petite superfice a été ensemencée en soya. Le blé d'hiver est maintenant en épis. Les pois semés tôt sont en fleur et l'on s'attend que la récolte des pois commencera dans environ dix jours. On récolte actuellement le chou-fleur, le chou et la laitue pommée et la qualité de la laitue est excellente. Le repiquage des tomates pour la conserve continue. L'ensilage du foin vert se fait actuellement. Dans l'Ile Pelée, le blé d'automne a bien épié et une bonne récolte est prévue. Des pluies presque incessantes ont retardé les semailles du maïs et du soya; environ 30 p. 100 du maïs et seulement quelque 5 p. 100 du soya ont été semés jusqu'à présent. Il faut du temps chaud et sec pour stimuler la croissance de toutes les cultures. Dans le comté de Kent, le temps pluvieux et frais a retardé jusqu'à trois semaines les semailles et la croissance du maïs, du soya et d'autres cultures printanières qui ont besoin de chaleur et de soleil pour pousser. Certaines terres n'ont pas encore été labourées du tout. Le blé d'hiver est en épi et les pâtures sont en bon état. Le 25 mai, la gelée a détruit un grand nombre de champs de tomates. Le charançon de la luzerne abondent dans la région de Merlin et la tavelure et l'anthracnose apparaissent sur les arbres fruitiers et d'ornement.

Dans le comté de Middlesex, la pluie persistante a retardé les travaux des champs, notamment les semailles de maïs et de soya. Dans le comté de Lincoln, le temps pluvieux a sérieusement retardé les semailles de céréales de printemps et peut-être 20 p. 100 des terres ne seront pas ensemencés. Les pluies excessives font mourir les pêchers et cerisiers sur les terres pauvres. Les arbres fruitiers ont bien fleuri et la nouure semble bonne en général. Quelques fraiseraies ont subi des dégâts pendant l'hiver, mais les plantes qui n'en ont pas souffert présentent une bonne nouure.

Dans le comté de Simcoe, dans l'ouest de l'Ontario, il n'y a eu dernièrement que quelques averses de nuit et il ne reste que quelques champs dépourvus de tuyaux de drainage à ensemencer. On prévoit que la croissance de toutes les cultures printanières sera bonne si le temps chaud se maintient. La fenaison est à la veille de commencer. Dans le comté de Bruce, la campagne agricole a été bien lente à démarrer et il reste environ 10 p. 100 des céréales de printemps et 40 p. 100 du maïs à semer. Le froid et la gelée persistants ont retardé la croissance du foin

et la fenaison commencera dix jours plus tard que d'habitude. L'état des pâtures est médiocre, mais les bovins se développent d'une façon satisfaisante. Dans le comté de Waterloo, des températures au-dessous de la moyenne ont retardé la croissance de toutes les cultures. La plus grande partie du maïs est semée, mais est lente à germer Grâce au temps clair et chaud de la fin de semaine dernière, on a pu commencer à récolter du foin à ensiler dans certaines fermes.

Les semailles des céréales de printemps et la plantation des pommes de terre devrait s'achever cette semaine dans toutes les régions du comté de Wellington. Les conditions hygrométriques sont satisfaisantes et le foin et les pâtures ont ces derniers jours marqué une bonne croissance grâce au temps chaud. Dans le comté de Halton, le temps frais et humide du mois dernier a retardé les semailles ainsi que la croissance de toutes les cultures. Environ 10 p. 100 de la superficie ne seront sans doute pas ensemencés. Les légumes se développent lentement. La fenaison n'a pas encore commencé et la croissance des pâtures est légèrement inférieure à la moyenne. La luzerne a gravement souffert des rigueurs de l'hiver.

Dans le comté de Durham, dans le centre de l'Ontario, il reste encore beaucoup de maïs à semer. Plusieurs cultures printanières montrent un jaunissement assez considérable causé par les précipitations et le froid excessifs. Le seigle d'automne est en train d'épier et les pâtures sont en excellent état. Dans le comté de Peterborough, le mois de mai a été pluvieux et froid et l'on ne fait qu'achever les semailles de céréales de printemps et de maïs. La germination et la croissance des cultures semées tôt sont satisfaisantes. Le blé d'hiver et les fourrages poussent très bien sur les terres élevées, mais ne viennent que moyennement sur les terres basses.

Dans le comté de Leeds, dans l'est de l'Ontario, le temps est maintenant plus favorable à l'agriculture. Les cultivateurs ont repris les travaux des champs et un grand nombre de ceux-ci devront être travaillés de nouveau. Les champs ensemencés tôt marquent une bonne croissance, mais leur superficie est peu importante par rapport à celle qui reste encore à ensemencer. Le foin pousse mieux et l'état des pâturages s'est amélioré. Dans le comté de Carleton, la pluie et le froid persistant ont beaucoup retardé les semailles de céréales de printemps et de maïs. Toutefois, le temps clair des derniers jours a donné lieu à une grande activité et la majeure partie de la superficie a été ensemencée au cours de la semaine dernière. On sème une grande partie du maïs tout près de la date limite et il faudra une période prolongée de temps chaud pour que la maturité soit atteinte avant les gelées. La croissance des pâtures et du foin a été quelque peu retardée, mais elle est maintenant excellente partout sauf dans quelques régions basses qui ont souffert d'un excès de pluie. Dans le comté de Renfrew, on prévoit que les semailles seront terminées le 14 juin, date qui représente un retard de trois semaines à un mois par rapport à la moyenne. Le blé d'automne est en excellent état et le foin semble être normal. Pour ce qui est des semailles de maïs, il y a des grands écarts d'un endroit à l'autre, le maïs étant, dans certains champs, bien sorti de terre tandis que d'autres champs doivent être encore semés.

Dans la région de Thunder Bay, dans le nord de l'Ontario, le temps froid et pluvieux a beaucoup retardé les semailles de printemps, mais les champs ensemencés tôt ont bonne apparence. Il faut maintenant du temps chaud et sec pour la croissance de toutes les cultures. L'ensilage du foin vert est commencé et la fenaison sera en cours partout à partir de la semaine prochaine.

MANITOBA

Partout, au Manitoba, les semailles sont à peu près terminées, sauf dans la région de Saint-Claude. Une partie du sarrasin et du lin sont encore à semer. La germination a été bonne et les céréales hâtives parviennent au stade de quatre feuilles. La gelée a quelque peu endomnagé le lin, le colza et la moutarde, et certaines de ces cultures ont été resemées. Le nord-ouest de la province a besoin de plus d'humidité. Le temps a été frais et les herbages ont poussé lentement. Le seigle commence à épier. La pulvérisation à l'herbicide est en cours. L'altise et le ver gris ont été enrayés au moyen d'insecticides.

Dans le sud-est, à Vita, une somme considérable de travail a été accomplie dans les champs, le long de la rivière Rouge et de la rivière du Roseau où il y a eu inondation ce printemps. On prévoit que les semailles seront presque terminées cette semaine, pourvu que le temps le permette. Les cultures précoces ont été en partie traitées au pulvérisateur. A Altona, les semailles achèvent sauf en ce qui a trait à une partie du lin et aux céréales fourragères. Les semailles ont été en partie retardées par les opérations d'enraiement de la folle avoine et d'autres mauvaises herbes. Un champ tôt ensemencé, ici et là, a été retourné et resemé. Les cultures précoces sont dans l'ensemble en excellent état, mais il y en a d'inégales parmi les cultures tardives. Il y a des vers gris dans les cultures de betteraves, mais la pulvérisation est commencée. Les cultures fourragères sont en excellente condition. Dans la région de Morden, un dixième de pouce de pluie est tombée la semaine dernière. Les cultures émergent bien et les céréales arrivent au stade de la pulvérisation. La folle avoine touffue et très répandue cause toujours des soucis, mais la pulvérisation se généralisera cette semaine. Les dégâts causés par le ver gris sont considérables dans quelques champs de tournesol et parmi d'autres cultures spéciales. Le seigle d'automne commence à épier. Les pommes de terre hâtives sortent de terre et le tournesol et les betteraves seront plantés à partir de cette semaine.

Dans la région de Pilot Mound, les semences sont presque terminées, sauf dans quelques champs détrempés ou trop secs. La superficie qui n'est pas encore ensemencée le sera surtout de lin. La précipitation a été variable, d'un simple vestige à environ un demi pouce. En général, les cultures sont en bon état. La pulvérisation des mauvaises herbes est commencée, mais on en a peu fait dans le cas de la folle avoine. Le foin et les pâtures sont en bon état.

A Stonewall, près de Winnipeg, près de 75 p. 100 des semences sont en terre, le temps ayant été sec la semaine dernière. Il y a du retard en certains endroits à cause du sol détrempé. Il y a eu accroissement de la superficie en jachère dans cette région. Le foin et les pâtures sont en très bon état. La gelée a causé quelque dommage dans les jardins.

La ferme expérimentale de Brandon signale que les semailles achèvent. Les cultures poussent uniformément, sauf dans les sols lourds qui ont été labourés pour extraire la folle avoine, ce qui a asséché la surface. Les céréales, les pâtures et le foin offrent en général de bonnes perspectives. Il n'y a pas eu de pluie pour la peine depuis la dernière semaine d'avril et il faudra qu'il pleuve bientôt pour maintenir les perspectives favorables actuelles. Dans la région de Virden, les semences sont en majeure partie terminée et les champs ensemencés tôt sont au stade des trois feuilles. La germination a été bonne et la croissance semble excellente. La folle avoine envahit certaines régions mais on l'enraie en se servant d'Avadex et de Carbyne. L'altise n'a que très peu manifesté sa présence jusqu'ici.

Le seigle d'automne a épié tôt et le peuplement est assez bon. Il a plu récemment dans le sud de la région mais, dans la région de Virden, la couche arable s'est asséchée considérablement.

À Teulon, dans la région d'Interlake, les semailles sont terminées dans une proportion de 80 p. 100 et les cultures précoces sortent de terre. Le temps frais a retardé la croissance. Les cultures fourragères semblent en très bon état, mais les prairies naturelles poussent lentement. A Arborg, près de 90 p. 100 des semences sont en terre. Toutefois, on prévoit qu'une partie des 10 p. 100 qui restent sera mise en jachères. Les semailles ont été paralysées par l'assèchement médiocre après la pluie du 31 mai, et il y a eu encore un quart de pouce de pluie le 3 juin. Certains cultivateurs ont pulvérisé la folle avoine et il est probable que la pulvérisation se généralisera la semaine prochaine.

À Neepawa, dans le centre ouest du Manitoba, 90 p. 100 des semences sont plantées; le reste sera surtout du lin. Dans les régions où les conditions hygrométriques étaient bonnes, les céréales semées tôt apparaissent à la surface du sol et la germination a été excellente. Les cultivateurs ont entrepris la pulvérisation, mais les mauvaises herbes ne sont pas encore trop drues. Une partie du seigle d'automne est épié. Les pâturages poussent bien dans les régions qui bénéficient de bonnes réserves d'humidité. A Minnedosa, les cultures sont semées dans une proportion de 98 p. 100 et la mise en jachère est commencée. Les réserves hygrométriques du sous-sol sont bonnes et la surface est passablement humide. Les semailles ont été retardées dans une certaine mesure parce que les cultivateurs attendaient d'avoir enrayé la folle avoine. Il y a de l'altise sur le colza. Les pâturages poussent bien.

À Shoal Lake, dans le centre ouest, il y a eu un demi-pouce de pluie vendredi, mais le foin et les cultures spéciales ont encore besoin de pluie. Le seigle d'automne est à la première phase d'épiage. La pulvérisation au Carbyne et celle des mauvaises herbes latifoliées se poursuivent. Les moissons germent également et il y a eu peu de réensemencement.

À Dauphin, dans le nord-ouest, presque tout est semé. Les réserves hygrométriques sont satisfaisantes et la germination a été bonne. La pulvérisation des mauvaises herbes est commencée et se généralisera vers la fin de la semaine. Le seigle d'automne épie sur des tiges moyennes, mais il lui faut plus de chaleur. A Swan River, les semailles sont terminées dans une proportion de 80 p. 100 et on prévoit que le reste des superficies seront ensemencées de colza et de lin. Les conditions sont actuellement excellentes pour la croissance. Les cultures semées tôt se développent bien et la pulvérisation des mauvaises herbes latifoliées est commencée. Il y a de l'altise dans le colza.

La station de recherches du ministère fédéral de l'Agriculture à Winnipeg signale la migration au Manitoba, au cours de la dernière semaine de mai, de la cicadelle-vecteur, de l'organisme pathogène de la jaunisse de l'aster et du virus du nanisme bleu de l'avoine. En même temps dans les régions de Neepawa et Saint-Claude les sauterelles commencaient à éclore en divers endroits.

La précipitation moyenne non pondérée dans la province, depuis le 1er avril, a été de 14 p. 100 au-dessous de la normale, comparativement à 5 p. 100 au-dessous de la normale la semaine dernière, 28 p. 100 au-dessous de la normale il y a deux semaines et 25 p. 100 au-dessus de la normale il y a un an. La température moyenne de la semaine terminée le 9 juin a été de 1.6 degré au-dessous de la normale, contre

2.1 degrés au-dessus de la normale la semaine précédente, 6.4 degrés au-dessous de la normale deux semaines plus tôt et 0.9 degré au-dessus de la normale durant la semaine terminée le 10 juin 1968.

SASKATCHEWAN

Les cultures ont bien démarré dans toute la Saskatchewan: le blé atteint une hauteur moyenne de quatre pouces et le seigle d'automne a commencé à épier. Les vents récents ont asséché le sol en surface, surtout dans le sud-ouest, mais les couches de fond renferment de bonnes réserves d'humidité dans toute la province. Les fourrages et les pâturages ont besoin de pluie. A l'exception des légionnaires gris tout à fait au sud-ouest, les insectes ne posent pas encore de graves problèmes. Les travaux des jachères d'été sont bien avancés dans beaucoup de districts et sont terminés dans 65 p. 100 des cas. L'enrayage chimique des mauvaises herbes est en cours dans bien des régions. Une bonne pluie ferait beaucoup de bien.

Dans le sud-est de la province, à Moosomin, les semailles sont terminées et la germination est bonne, sauf dans les champs ensemencés tard, où les labours destinés à détruire la folle avoine et les mauvaises herbes ont eu tendance à dessécher la couche arable. Beaucoup de cultivateurs souhaiteraient une bonne pluie. On travaille sur les jachères et à certains endroits la pulvérisation contre la folle avoine va bon train. Les cultures sont belles à Yellow Grass, mais de la pluie assurerait une germination rapide des cultures tardives. Les réserves hygrométriques des couches de fond sont suffisantes mais la couche arabe se dessèche rapidement. Les premiers travaux des jachères sont à peu près terminés et on pulvérise certains champs pour détruire les mauvaises herbes, en particulier le sarrasin sauvage et la nielle, qui abondent. La superficie des terres ensemencées en lin a considérablement augmenté dans ce district.

Les semailles sont terminées à Indian Head, dans le sud-est de la province, et la première pousse des cultures est excellente. Toutefois, la terre se dessèche en surface et il faudrait une bonne pluie pour que les cultures progressent de façon satisfaisante. Les cultures semées tôt ont atteint six à sept pouces de hauteur et celles qui ont été semées plus tard ne font que commencer à sortir. Le temps sec a permis aux cultivateurs d'entreprendre les premiers travaux des jachères et ils ont détruit une bonne partie des mauvaises herbes. On ne signale pas de charriage pour le moment dans le district, ni de dégâts causés par le ver gris ou le ver fil de fer. La croissance des fourrages et des pâturages, qui a été bonne jusqu'à présent, est maintenant au ralenti à cause du manque d'humidité. Le bétail est toujours en bon état.

À Big Beaver, dans le centre-sud de la Saskatchewan, l'humidité de surface est insuffisante à cause du manque de pluie et des vents violents du mois de mai, qui ont desséché le sol jusqu'à quatre pouces de profondeur. Les premiers travaux sont terminés sur les jachères et on a détruit une bonne partie des mauvaises herbes. Dans l'ensemble, les cultures de la région ne sont pas gênées par les mauvaises herbes bien qu'à certains endroits on compte commencer la pulvérisation cette semaine. Les pâturages naturels se ressentent du temps sec. Le bétail est en bon état. Dans le district de Gravelbourg, toutes les semailles sont terminées et de la pluie aiderait beaucoup à la croissance. Si le sol manque d'humidité, les plantes auront tendance à enfoncer plus profondément leurs racines pour se soustraire à la chaleur qui sévit normalement en juillet. Les cultures semées tôt ont atteint en moyenne environ quatre à cinq pouces. Dans la plupart des champs ensemencés, il y a peu de mauvaises herbes. Les pâturages sont en bon état pour ce temps-ci de l'année.

À Eastend les semailles sont presque terminées et les cultures et les pâturages ont besoin de pluie. Dix villes à 20,000 acres de terrain dans le district ont subi des dommages plus ou moins graves causés par les légionnaires gris. Les premiers travaux des jachères sont terminés. Les bovins sont en bon état.

La ferme expérimentale de Swift Current rapporte que les cultures semées au printemps poussent bien, mais que le seigle d'automne est un peu sec à cause du temps chaud et de la sécheresse. On pulvérise les champs ensemencés tôt, où la mauvaise herbe abonde. Les premiers travaux des jachères sont à peu près terminés. L'herbe a grandement besoin de pluie dans le district pour ne pas continuer à se détériorer. Le bétail est en bon état. À Leader, de bonnes réserves d'humidité favorisent la croissance. Les cultures semées tôt poussent denses. Le lin est sorti.

Dans le centre-est de la province, à Melville, les semailles sont terminées et les cultures semées tôt sont belles. Les pâturages et les cultures fourragères ont aussi belle allure. Il a fait très froid le 10 juin et on prévoyait du gel dans le district. Il est tombé jusqu'à présent 2.38 pouces de pluie, à comparer à 1.88 pouce à la même date l'année dernière; la moyenne est de 3.08 pouces.

À Togo, les semailles sont terminées et dans la plupart des fermes les travaux des jachères sont bien avancés. On a commencé la pulvérisation des mauvaises herbes qui poussent en abondance, à l'aide de produits chimiques. Le seigle d'automne a atteint une bonne hauteur et il a commencé à épier. Les pâturages et les cultures fourragères sont en bon état, mais elles pourraient tirer profit d'une bonne pluie. Dans les environs d'Endeavour, les semailles des céréales sont terminées. Les cultures semées tôt ont germé uniformément, mais elles poussent lentement à cause du manque d'humidité en surface. Toutefois, dans le cas des céréales secondaires et du colza semés tard, la germination laisse à désirer. La croissance des pâturages et des fourrages a aussi été retardée. On ne fait que commencer à pulvériser les mauvaises herbes et la folle avoine. Il est tombé jusqu'à présent dans le district 1.14 pouce de pluie.

À Drake, dans le centre de la province, les semailles sont terminées, les travaux des jachères et la pulvérisation chimique des mauvaises herbes viennent de commencer. Les céréales semées tôt sont hautes de six pouces. La pluie fine qui est tombée récemment a aidé les céréales, mais les champs de foin et les pâturages ont encore besoin d'humidité. On a semé moins de blé, mais plus de moutarde, de colza et de sarrasin. Le seigle épie et le trèfle sucré pousse bien. On signale la présence de vers gris, mais ils ne semblent pas poser de problème pour l'instant. Les bovins sont en bon état. À Craik, les semailles sont terminées; on a semé un peu plus de céréales secondaires et de blé dur. Une partie du blé a atteint trois pouces et le seigle d'automne épie. Grâce aux récentes averses, les pâturages sont en bon état.

Dans le district de Saskatoon, le temps chaud et l'humidité du sol ont favorisé la croissance rapide des cultures. La pousse est uniforme et mesure en moyenne de quatre à six pouces de hauteur, atteignant jusqu'à dix pouces dans les champs ensemencés tôt. Le seigle d'automne a épié et il devrait grossir. La moutarde et le colza sont beaux en dépit des dommages causés dans certains champs par les pucerons et le gel. À Dundurn, on rapporte que les vers gris à dos rouge font des ravages dans quelques champs d'orge. Le laboratoire d'entomologie rapporte la présente de vers gris à Cutknife, Melfort, Davidson et Regina. Les oeufs de sauterelles commencent à éclore, mais on prévoit que l'infestation ne sera pas trop grave.

À Rosetown, dans le centre-ouest de la province, les cultures sont belles et le blé est maintenant haut de trois à quatre pouces. La plupart des jachères sont noires ou on y fait encore des travaux. Certains cultivateurs pulvérisent les mauvaises herbes. Les pâturages et le foin poussent bien. Il a fait très froid dans la matinée du 10 juin; la température a baissé jusqu'à 35 degrés et on craignait du gel dans la matinée du 11 juin. Une bonne pluie ferait beaucoup de bien.

Dans le nord-ouest de la province, à Meota, les semailles sont terminées et dans l'ensemble les cultures sont belles, mais la folle avoine et les mauvaises herbes sont abondantes et poseront des problèmes. On s'attend que le 15 juin tous les cultivateurs pulvériseront les mauvaises herbes. Il est tombé un pouce de pluie la semaine dernière, et par conséquent les perspectives sont excellentes. Il est tombé depuis le 1er avril 2.89 pouces de pluie. Les pâturages et les foins sont luxuriants et abondants. On pulvérise actuellement les pucerons dans certains champs de colza.

La moyenne non pondérée des précipitations pour la province depuis le 1er avril a été de 18 p. 100 au-dessous de la normale contre 13 p. 100 au-dessous une semaine plus tôt, 9 p. 100 au-dessous deux semaines plus tôt et 20 p. 100 au-dessous l'année précédente. La température moyenne de la semaine terminée le 9 juin était de 4.4 degrés au-dessus de la normale contre 1.5 degré au-dessous de la normale une semaine plus tôt, 1.4 degré au-dessous de la normale deux semaines plus tôt et 0.1 degré au-dessous de la normale la semaine terminée le 10 juin 1968.

ALBERTA

Dans le sud de l'Alberta, on rapporte que la surface est en voie d'assèchement, sauf dans les contreforts, cette semaine. Le seigle d'automne et le blé d'hiver épient ou sont sur le point d'épier et la germination des cultures tard semées est inégale. Selon les rapports en provenance de Red Deer que les couches arables se dessèchent, dans le nord et dans l'est, mais la situation n'est pas encore critique. Dans la région de Rivière la Paix il n'y a pratiquement plus d'humidité de surface et le besoin de pluie se fait vivement sentir. Dans l'ensemble de la province toutes les cultures sont semées, sauf de faibles pourcentages d'orge et de pois verts tardifs. La folle avoine est abondante et il faudrait la maîtriser par la pulvérisation chimique et de nouveaux labours.

Dans le sud-est de l'Alberta, aux environs de Manyberries, il faudrait de la pluie vu que les cultures tardives n'ont pas encore germé. Le temps sec et chaud des quelques derniers jours a brûlé certaines cultures et certains champs des Prairies brunissent. Le seigle d'automne épie et il atteint 18 pouces de hauteur. À Medicine Hat toutes les cultures sont semées et les premiers labours de jachères sont presque achevés. Les cultures hâtives ont de 8 pouces à 1 pied de hauteur et le seigle d'automne épie et fleurit. Le sol est sec et il faudra de la pluie sous peu.

Dans le sud, à Lethbridge, la plupart des cultures sont en bon état et il est tombé d'un pouce à un pouce et demi de pluie cette semaine. Le blé d'hiver a épié tôt et le blé de printemps en est à la quatrième ou à la cinquième feuille. Les semailles de pois et du maïs de conserve sont presque terminées, mais la germination est inégale dans le maïs et les carottes. On rapporte de graves dégâts causés par les mulots dans plusieurs champs de maïs. Des céréales semées tôt ont été détruites par le légionnaire. À l'ouest, à Cardston, les conditions hygrométriques sont bonnes et le seigle d'automne est au stade de l'épiage. La germination des céréales

de printemps est très bonne et le foin et les pâturages sont en bon état. Les semailles de céréales sont terminées et celles des graines oléagineuses sont achevées dans une proportion de 90 p. 100. Le bétail est en bon état.

Dans le centre est de l'Alberta, aux alentours de Calgary, les semailles sont maintenant terminées et la végétation est rapide en raison de la grande chaleur. Il faudrait de la pluie pour assurer la qualité des cultures. Il n'y a pas eu de grosses tempêtes de grêle jusqu'ici. Aux environs de Olds des vents secs et chauds ont épuisé l'humidité des couches arables. Les cultures tiennent bon, toutefois, vu les réserves d'humidité des couches de fond.

À Sedgewick, dans le centre nord-est, huit dixièmes de pouce de pluie ont favorisé la croissance en dépit de la gelée du 9 juin. Le blé de printemps commence à peine à germer et l'infestation de folle avoine varie de faible à abondante. Dans la région avoisinante de Vermilion les semailles sont maintenant terminées dans une proportion de 95 p. 100, et il ne reste plus qu'à semer les fourrages verts. L'humidité est de 100 p. 100 en raison des sept dixièmes de pouce de pluie tombée la semaine dernière. Les grands vents du 9 juin ont causé de l'érosion. Plusieurs rapports signalaient de la gelée au début de la semaine. Les cultures paraissent en très bon état et la pulvérisation sera générale d'ici quelques jours.

Dans le centre de l'Alberta, à Stettler, les semailles de blé sont terminées, mais les couches arables sont généralement très sèches. La germination est bonne dans les cultures semées tôt. Des vents secs ont causé du charriage de sol. La récolte de foin n'est que passable et on n'a pas encore signalé de pulvérisation contre la folle avoine.

À Lacombe, les cultures poussent bien, mais la folle avoine est abondante dans certaines régions. Les semailles sont terminées, mais le foin et les pâturages sont stationnaires en raison du temps sec. Aux environs d'Eckville, les semailles sont presque terminées. L'humidité de surface est passable et celle des couches de fond est bonne; les cultures sont généralement en très bon état, mais la croissance du foin et des pâturages n'est que passable. Les premiers labours de la saison ont été faits dans les jachères.

Dans le voisinage de Colinton les semailles sont pour ainsi dire terminées, et les céréales, les graines oléagineuses, le foin et les pâturages poussent bien en raison de la chaleur et des très bonnes conditions hygrométriques. Les cultivateurs commencent les travaux dans les jachères, et la fenaison devrait commencer vers le 20 juin. Les températures atteignent 85 degrés le jour et 38 degrés la nuit.

Dans la région de Rivière de la Paix, à Beaverlodge, les céréales et les graines oléagineuses hâtives ont bien germé. Les fourrages et les pâturages ont grandement besoin de pluie et on n'a pu achever les semailles à cause de la grande pénurie d'humidité de surface. À Rivière de la Paix les cultures tard semées n'ont pas germé en raison de la sécheresse des couches arables. Les pâturages sont extrêmement secs. On signale la présence d'altises dans la graine de colza.

La précipitation moyenne non pondérée dans la province depuis le 1er avril est de 28 p. 100 au-dessous de la normale, contre 31 p. 100 au-dessous de la normale il y a une semaine, 32 p. 100 au-dessous il y a deux semaines, et 0.3 p. 100 au-dessous il y a un an. La température moyenne de la semaine terminée le 9 juin était de 7.2 degrés au-dessus de la normale, contre 0.3 degré au-dessous il y a une semaine, 2.2 degrés au-dessus il y a deux semaines et 0.4 degré au-dessous durant la semaine terminée le 10 juin 1968.

COLOMBIE-BRITANNIQUE

À Victoria, le temps a été chaud et sec et il n'y a eu qu'un pouce de pluie au cours des 35 derniers jours. La cueillette des fraises a commencé le 26 mai. Les perspectives de récolte sont bonnes et la nouure de tous les arbres fruitiers est abondante sauf celle des pruniers. Il y a abondance de tomates et de concombres cultivés en serre chaude. Les taches causent des pertes considérables aux tomates qui mûrissent. Le rendement des cultures fourragères est bon et les pommes de terre primeurs poussent rapidement. Toutes les cultures ont besoin de pluie. On signale d'Agassiz qu'il y a un manque de pluie et que les températures s'élèvent à environ 4 degrés au-dessus de la moyenne des températures maximums. Le maïs et les pois pour la conserve poussent rapidement. La production de foin semble normale et d'excellente qualité. La cueillette des fraises vient de commencer mais sera probablement de 80 p. 100 inférieure à celle de 1968 à cause des dégâts de l'hiver. L'état des plantations de framboises est normal. Les pâturages sont en bon état et l'on fait de l'irrigation partout dans la région.

À Summerland, la récolte des cerises commencera le 20 juin à cause du temps chaud. Le rendement ne sera que passable par suite des dégâts importants causés par l'hiver dans la région de Kelowna. La récolte de pommes sera faible à cause de la mauvaise qualité de la nouure, particulièrement à Kelowna. Les poiriers se sont bien remis des dégâts causés par l'hiver, mais l'on prévoit une maigre récolte. À Vernon, dans le nord de la vallée de l'Okanagan, le temps chaud et sec stimule la croissance. Le blé d'automne est en épis. La fenaison est à moitié terminée, grâce à des conditions idéales, et le rendement est abondant. Les sols sèches rapidement et les céréales et les pâturages ont besoin de pluie. Les conditions atmosphériques ont été excellentes pour le maïs.

On signale de Creston, dans le sud de Kootenay, que toutes les céréales printanières ont été semées et que les cultures semées tôt ont commencé à pousser. La croissance des pâtures et du foin est excellente par suite de pluies et de froids intermittents. Les fruits à noyau ont subit des dégâts importants causés par l'hiver et la récolte de cerises sera considérablement réduite. Les perspectives d'une récolte moyenne de pommes sont bonnes, mais seulement passables pour les poires.

La station de recherches de Kamloops signale que la pousse du maïs d'ensilage et des pommes de terre primeurs est très avancée par suite du temps très chaud. La fenaison va bon train et les conditions atmosphériques sont excellentes. Les prairies sont en bon état, mais commencent à se dessécher parce qu'il n'est tombé qu'un demi-pouce de pluie depuis le 1er mai.

Dans la vallée du Prince George, de Vanderhoof et de Robson, le temps est chaud et sec depuis quatre semaines. Dans la région de Prince George, une bonne pluie a pour le moment soulagé les cultivateurs de la sécheresse qui les menaçait, mais le manque de pluie placent Vanderhoof et Robson dans une situation très grave. Les céréales n'ont pas bourgeonné et les fourrages commencent à épier. La région a nettement besoin de pluie pour assurer une croissance normale.

A Smithers, dans la vallée de la rivière Skeena, le temps a été frais pendant les deux premières semaines de mai et s'est graduellement réchauffé pendant la dernière partie du mois. Les semailles de printemps et les travaux de fertilisation sont terminés. Quelques petites averses ont fourni assez d'humidité pour assurer la croissance du foin dans la plupart des sols, mais il faut de la pluie avant qu'on ne fasse de nouvelles semailles.

Dans la région de Fort St. John du bloc de Rivière de la Paix, le temps sec et le vent ont empêché de nombreuses cultures de sortir de terre. Les cultures semées tôt en sont rendues au stade feuillu. Les cultures semées tard sortent de terre très lentement à cause des vents asséchants. La chute de neige de la mi-mai a augmenté les réserves d'humidité. De nombreux champs sont laissés en jachère par suite des grandes quantités de chaume dans les champs qui ont gelé en 1968. Certaines variétés recommandées de blé d'hiver sont avariées dans une proportion d'environ 30 p. 100. Le fourrage et les cultures de semence poussent lentement. Il faudra plus d'humidité pour assurer un rendement normal des cultures.

Precipitation and Temperature Data, Prairie Provinces(1)

Province and crop district	Station	Precipitation: Week ending 8 a.m. June 9, 1969	Precipitation: Total since April 1	Precipitation: Normal since April 1	Mean temperature week ending 8 a.m. June 9: 1969	Mean temperature: Normal
		inches			degrees F.	
MANITOBA						
1	Boissevain	1.18	2.92	4.10	59	57
	Pierson	.58	3.18	3.80	59	58
	Waskada	.88	2.30	N.R.	60	N.R.
2	Baldur	.03	1.88	3.98	57	58
	Pilot Mound	.04	2.65	3.94	56	58
3	Altona	.23	3.71	3.76	57	61
	Deerwood	.15	2.35(2)	3.86	54	60
	Graysville	.19	3.06	3.53	55	59
	Morden	.18	2.65	4.12	58	60
	Morris	.13	2.42	3.45	53	60
	Portage la Prairie	.13	3.89	4.65	57	60
	Roland	.16	2.40	3.85	57	60
4	Stonewall	.17	4.35	3.97	55	58
5	Emerson	.26	4.19	3.75	57	60
	Steinbach	.27	3.71	3.75	56	59
	Winnipeg	.22	4.63	3.90	56	59
	Starbuck	.19	4.16	3.70	57	60
6	Seven Sisters Falls	.22	2.89	4.16	55	58
	Great Falls	N.R.	2.27(2)	2.93	N.R.	58
	Sprague	.52	6.34	4.03	52	57
7	Rivers	.10	2.93	3.62	56	58
	Virden	.09	2.60	3.47	58	58
8	Brandon	.04	3.10	3.90	55	58
	Cypress River	.05	3.54	3.70	59	59
9	Gladstone	.14	2.60	3.84	N.R.	58
10	Birtle	.56	3.28	3.55	56	57
	Rossburn	.66	2.79	3.22	57	56
	Russell	.79	2.64	2.86	57	56
11	Dauphin	.13	2.26	3.88	59	58
12	Arborg	.18	3.28	3.68	55	57
	Gimli	.18	4.04	3.79	56	57
	Steep Rock	N.R.	.46(2)	N.R.	N.R.	N.R.
13	Swan River	.15	3.25	3.19	59	57
	The Pas	trace	1.89	3.22	57	55
MANITOBA AVERAGE		.28	3.21	3.72	56.6	58.2

For footnotes, see page IV.

Precipitation and Temperature Data, Prairie Provinces(1)

Province and crop district	Station	Precipitation: Week ending 8 a.m. June 9, 1969	Precipitation: Total since April 1	Precipitation: Normal since April 1	Mean temperature week ending 8 a.m. June 9: 1969	Mean temperature: Normal
		inches			degrees F.	
SASKATCHEWAN						
1A	Carlyle	.38	3.25	3.08	58	57
	Estevan	.79	2.83	3.47	61	58
	Oxbow	.16	2.58	3.03	57	58
	Willmar	.19	2.73	3.46	N.R.	N.R.
1B	Broadview	.06	2.44	3.52	56	55
	Moosomin	nil	3.20	3.44	60	57
2A	Yellow Grass	.18	2.44	3.12	61	58
	Weyburn	.24	2.84	3.08	62	58
	Midale	.47	3.23	3.01	60	59
2B	Moose Jaw	.15	2.36	3.35	64	59
	Regina	.29	2.09	3.18	61	58
	Francis	.07	3.10	2.75	57	56
	Indian Head	.06	1.76	3.15	59	57
3AS	Ormiston	nil	2.58	3.28	62	58
	Cardross	.04	3.13	3.32	64	58
	Ceylon	.07	3.18	3.34	61	57
	Chaplin	.46	1.29	2.63	63	58
3AN	Gravelbourg	N.R.	3.23(2)	2.78	N.R.	58
3BS	Shaunavon	trace	2.94	2.97	66	57
	Pambrun	trace	3.85	3.14	63	57
	Aneroid	nil	3.83	2.91	61	58
	Instow	nil	3.74	2.82	N.R.	57
3BN	Swift Current	.01	3.06	3.30	63	57
	Pennant	nil	2.30	2.88	64	57
	Hughton	.08	2.16	2.58	64	58
4A	Maple Creek	trace	2.49	2.88	66	59
	Consul	nil	1.75	2.44	63	57
4B	Abbey	nil	2.48	2.62	66	57
	Leader	nil	3.17	2.49	65	59
5A	Cupar	.16	1.11	3.02	64	57
	Balcarres	N.R.	1.28(2)	3.22	N.R.	N.R.
	Lipton	.21	1.22	N.R.	58	N.R.
	Melville	.76	2.58	3.26	58	57
	Yorkton	.54	2.22	3.09	59	57
	Bangor	.81	2.88	3.40	58	58
5B	Wynyard	.99	1.89	3.29	61	56
	Foam Lake	1.01	2.76	3.41	60	56
	Kuroki	.88	2.04	3.42	57	55
	Kamsack	.33	1.99	2.88	58	57
6A	Davidson	1.23	2.61	3.06	63	57
	Strasbourg	.41	.97	3.35	62	56
	Watrous	.64	2.06	2.74	62	57

For footnotes, see page IV.

Precipitation and Temperature Data, Prairie Provinces(1)

Province and crop district	Station	Precipitation: Week ending 8 a.m. June 9, 1969	Precipitation: Total since April 1	Precipitation: Normal since April 1	Mean temperature week ending 8 a.m. June 9: 1969	Mean temperature: Normal
		inches			degrees F.	
SASKATCHEWAN — Concluded						
6B	Harris	.20	2.01	2.54	63	57
	Outlook	.23	1.73	2.41	65	58
	Rosthern	.24	2.24	2.32	62	58
	Saskatoon	1.06	3.23	2.78	62	57
	Elbow	.44	1.74	3.07	63	57
	Tugaske	.35	1.63	3.14	62	57
	Dundurn	.52	2.24	2.44	64	57
7A	Alsask	.03	1.67	2.82	64	58
	Kindersley	.03	2.49	2.14	63	57
	Rosetown	.10	3.00	2.66	63	58
7B	Macklin	.15	2.29	2.50	63	56
	Denzil	.28	3.12	2.61	64	58
	Scott	.62	2.59	2.89	61	56
	Biggar	1.07	3.39	2.75	62	57
8A	Hudson Bay	.09	1.01	3.26	58	56
	Prairie River	N.R.	1.00(2)	3.45	N.R.	55
8B	Humboldt	.47	2.05	2.74	61	56
	Melfort	.18	1.42	3.00	60	57
9A	North Battleford	.49	2.17	2.65	62	57
	Victoire	.67	2.11	2.94	61	55
	Prince Albert	.27	2.30	3.23	58	56
9B	Waseca	N.R.	2.19(2)	2.86	N.R.	55
SASKATCHEWAN AVERAGE		.32	2.43	2.97	61.5	57.1
ALBERTA						
1	Empress	nil	1.74	2.64	70	N.R.
	Foremost	.87	2.24	3.19	67	57
	Manyberries	.46	1.26	2.79	68	58
	Medicine Hat	.13	1.56	3.24	68	59
2	Brooks	.26	1.73	3.04	66	58
	Gleichen	.22	.94	3.42	64	56
	Hays	1.02	2.75	2.76	67	58
	Rainier	.51	1.70(2)	3.06	66	58
	Vauxhall	.93	2.41	2.84	65	57
	Raymond	.82	1.64(2)	3.88	64	58
	Lethbridge	1.52	3.45	4.20	65	57
	Trochu Equity	N.R.	.65(2)	3.36	N.R.	56
	Queenstown	.34	1.92	3.70	65	57

For footnotes, see page IV.

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA
1010523826

Precipitation and Temperature Data, Prairie Provinces(1)

Province and crop district	Station	Precipitation: Week ending 8 a.m. June 9, 1969	Precipitation: Total since April 1	Precipitation: Normal since April 1	Mean temperature week ending 8 a.m. June 9: 1969	Mean temperature: Normal
		inches			degrees F.	
ALBERTA — Concluded						
3	Calgary	.40	3.78	4.29	61	54
	Cardston	1.53	3.68	4.68	62	55
	Pincher Creek	1.88	5.14	5.25	61	53
	Fort MacLeod	2.40	3.93	4.58	65	58
	High River	.61	3.44	4.79	60	53
	Magrath	2.35	4.00	4.72	66	57
	Olds	.05	1.36	4.06	61	54
4	Alliance	.54	1.55	2.46	63	56
	Coronation	.14	1.55	2.51	64	55
	Hughenden	.38	2.94	2.59	62	56
	Lloydminster	.58	3.19	2.68	62	56
	Stettler	.18	1.27	3.12	62	56
	Vegreville	.37	2.40	2.82	62	55
	Ranfurly	.33	2.66	3.04	62	55
	Vermilion	.28	2.13	2.57	60	55
5	Edmonton	.14	2.05	3.70	60	56
	Lacombe	.19	1.74	4.12	61	55
	Red Deer	.04	1.21	3.75	61	55
	Rocky Mountain House	.23	2.02	4.55	60	53
	Wetaskiwin	.08	1.58	3.68	62	55
6	Campsie	.81	3.25	3.42	60	54
	Edson	.11	3.17	3.93	60	53
	Elk Point	.37	3.31	2.79	59	54
	Lac la Biche	.30	3.77	3.04	58	56
	Whitecourt	.03	1.62	3.71	59	53
7	Beaverlodge	.03	1.93	2.99	61	55
	Fairview	.05	1.81	2.88	63	55
	Ft. Vermilion	.11	3.46	2.33	61	55
	Grande Prairie	.27	2.14	2.93	62	55
	High Prairie	.13	2.41	2.98	62	55
	Peace River	.06	1.36	2.19	61	55
	Rycroft	N.R.	1.76(2)	2.78	N.R.	55
	Wagner	.16	2.54	2.91	59	53
ALBERTA AVERAGE		.50	2.44	3.37	62.7	55.5

N.R. - No report. (1) Source: Meteorological Service of Canada. (2) Incomplete; not included in average.