CATALOGUE 22-002F

22-002F
no 9
1972
10 mai
c. 3

Statistics Canada
Statistique Canada

Pour publication
le 10 mai 1972, à 3h. de l'après-midi

Série de 20 rapports: $4

Série de Rapports sur les Grandes Cultures — Nº 4

RAPPORT TÉLÉGRAPHIQUE SUR LES CULTURES — CANADA

Statistique Canada publie aujourd'hui le premier d'une série de six rapports télégraphiques sur l'état des cultures à travers le Canada. Le présent rapport comprend en outre le premier d'une série de onze rapports télégraphiques sur l'état des cultures dans les provinces des prairies. Les renseignements sur lesquels reposent ces rapports sont fournis par des correspondants agricoles spécialement désignés des ministères fédéral et provinciaux de l'Agriculture, par de simples observateurs agricoles et par des entreposeurs de céréales. Les données sur la température proviennent de la Division de la météorologie, ministère des Transports.

SOMMAIRE

Provinces Maritimes. — Dans toutes les provinces maritimes le printemps a environ deux semaines de retard. L'importance des dégâts causés par l'hiver n'a pas encore été déterminée, mais on s'attend à ce qu'ils soient considérables. On prévoit que la destruction des bourgeons des petits arbres fruitiers, causée par l'hiver, sera importante. L'hiver semble avoir également causé de grands dommages aux fraises et aux céréales d'hiver. Présentement, sauf dans les régions très sèches, le sol n'est pas encore assez sec pour permettre l'emploi de machines. Au Nouveau-Brunswick, la mauvaise température a empêché le ramassage des émondes dans les vergers et la pulvérisation de dormance. Les producteurs de légumes cultivent en ce moment des légumes dans leurs serres pour ensuite les transplanter dans les champs.

Québec. — Dans toute la province, le printemps a été généralement froid. Le sol étant détrempé, toute culture est ralentie et presque toutes les semailles sont impossibles. Il est encore trop tôt pour évaluer complètement l'importance des dégâts causés par l'hiver aux prairies artificielles et aux pâturages, mais on signale des gelures. Dans la région de Montréal on signale que les fraises ont subi des dommages considérables.

Division de l'agriculture,
Section des cultures

5502-509

Published by Authority of the Minister of Industry, Trade and Commerce
Statistics Canada should be credited when republishing all or any part of this document

Publication autorisée par le ministre de l'Industrie et du Commerce
Reproduction autorisée sous réserve d'indication de la source: Statistique Canada

Ontario. — Le printemps a été froid et humide partout dans la province. Le labourage et les semailles ont été retardés d'au moins deux semaines. Dans certaines régions du sud, de l'ouest et du centre de l'Ontario, les semailles de printemps n'ont été générales qu'à partir de la semaine dernière, et par suite, quelques acres de céréales seulement ont été ensemencés depuis. La plantation des pommes de terre est en cours dans toute la province, et la plus grande partie des pommes de terre, hâtives a été plantée avant le 1er mai. A Bradford et dans les régions maraîchères avoisinantes, on procède à l'ensemencement des légumes de consommation immédiate.

Provinces des Prairies. — On annonce que les semailles sont commencées dans toutes les provinces des Prairies, mais la somme de travail effectué varie considérablement. Au Manitoba, les semailles viennent juste de commencer tandis que dans le sud-ouest de la Saskatchewan et le sud-est de l'Alberta, les travaux des champs sont très avancés et on signale même que dans le sud-est de l'Alberta certaines plantes ont commencé à pousser. Toutefois, si les conditions atmosphériques sont bonnes l'ensemencement sera peut-être général dans une grande partie des Prairies dans quelques jours. A en juger par l'état des travaux d'ensemencement, la quantité d'humidité est suffisante au Manitoba, dans le centre et le nord-est de la Saskatchewan, mais le terrain est plus sec ailleurs en Saskatchewan et davantage en Alberta.

PRÉVISIONS D'INFESTATION PAR LES SAUTERELLES DANS LES PROVINCES DES PRAIRIES — 1972

D'après les rapports en provenance du ministère de l'Agriculture du Canada, les conditions atmosphériques qui ont régné dans les trois provinces des Prairies l'année dernière ont favorisé une éclosion hâtive des sauterelles et ont contribué à faire prolonger la période de ponte. Ainsi, si les conditions atmosphériques sont favorables (un printemps chaud et précoce), il est à prévoir une infestation considérable de sauterelles en 1972.

On prévoit que les régions infestées du Manitoba le seront huit fois plus que l'année dernière, la vallée de la Rivière Rouge devant être le district touché le plus étendu et le plus infesté. En Saskatchewan, la région infestée sera selon les prévisions, trois fois plus étendue que l'année dernière, la principale infestation devant se produire dans le centre sud de la province. En Alberta, également les régions infestées auront plus que triplé par rapport à 1971, les trois principales régions d'infestation moyenne étant Lethbridge, le nord de Gleichen et Drumheller.

Colombie-Britannique. — Au cours des six dernières semaines, la Colombie-Britannique a connu des températures exceptionnellement basses et des précipitations au-dessus de la normale. A maintes reprises on a signalé des basses températures jamais encore enregistrées pour la saison et, en avril, les températures moyennes ont été de plusieurs degrés au-dessous de la normale dans toutes les régions. En raison de l'accumulation inhabituelle de la neige dans les parties les plus élevées et de la lenteur de l'écoulement, on craint de graves inondations dans nombre de vallées et dans les basses plaines de la côte. Il résulte de ces conditions que le degré d'humidité du sol est relativement élevé et qu'à certains endroits la culture printanière a été retardée jusqu'à deux ou trois semaines. Les pâturages sont également en retard tout comme les cultures semées tôt. Dans la vallée de l'Okanagan la floraison des arbres fruitiers est en retard de deux semaines mais l'hiver n'a pas causé trop de dégâts. Certains signes laissent entrevoir une forte récolte de pommes cette année. On a semé certaines cultures céréalières dans le Bloc de la Rivière de la Paix exposé au sud, mais ailleurs les cultures printanières normales sont encore retardées par le mauvais temps.

PROVINCES MARITIMES

Dans la région de Truro, il a été impossible, en raison du temps froid et humide, d'employer les machines agricoles. Les terres se sont asséchées lentement et l'herbe n'a pas encore poussé. On prévoit que les dommages causés aux petits arbres fruitiers par l'hiver seront élevés.

A Kentville, on n'a rien semé car le sol était froid et humide. Il semble que les légumineuses et les céréales aient subi des dégâts au cours de l'hiver.

A Fredericton, les labours du printemps ont été retardés par deux semaines de pluie. Les pommes de terre hâtives viennent tout juste d'être plantées. Les dégâts causés par l'hiver sont énormes et les insectes ont également commencé leurs ravages.

Dans la région de Perth, le printemps a été retardé de deux semaines en raison du temps froid qui a duré jusqu'à maintenant. Les semailles n'ont pas encore commencé, mais avec du beau temps elles pourraient débuter d'ici sept à dix jours. Les herbages n'ont pas encore poussé suffisamment pour pouvoir évaluer l'importance des gelures, mais les dommages causés aux fraises sont déjà visibles.

QUÉBEC

La température moyenne pour le mois d'avril a été de 6 degrés en dessous de la normale, dans la région de Saint-Jean. Le temps froid et humide qui a régné au début de mai, a retardé tous les travaux des champs. L'émondage a été terminé mais, en général, la végétation retarde de 8 jours et la pulvérisation n'est pas encore commencée. Cette année les dégâts faits par des mulôts n'ont pas été graves. Dans la région de Montréal, près de 50 % des plants de fraises ont été endommagés par l'hiver. Il faudra remplacer près de 2 millions de plants. Dans les sols organiques, les carrottes et les oignons n'ont pas encore été semés et on n'a planté que quelques pommes de terre.

Dans la région de Lennoxville, la neige fond lentement. De fortes pluies et le gel persistant ont endommagé les pâturages et ralenti sérieusement la végétation. A cause des sols détrempés, les travaux des champs sont retardés et l'ensemencement n'a pas encore commencé.

Notre correspondant de Normandin, dans la région du Lac Saint-Jean, nous signale que pendant la nuit la température descend généralement au-dessous du point de congélation et que même pendant le jour, la température est très froide. Etant donné le retard de la végétation, il est difficile d'évaluer actuellement les dommages causés aux cultures qui ont hiverné. Certains travaux des champs ont été entrepris cette semaine mais l'ensemencement n'a pas encore commencé. Les réserves fourragères sont maigres et les cultivateurs doivent achèter du foin en supplément. En général la production laitière est moyenne.

ONTARIO

Dans le comté d'Essex, dans le sud de l'Ontario, le temps a été humide et froid au cours du printemps, mais on a ensemencé 60 % des céréales de printemps et quelques acres de maïs. Les pois destinés à la conservation ont été plantés. Le blé d'hiver semble en bonne condition. Les légumes de primeur repiqués et les pommes de terre hâtives ont été endommagés par le froid. Les abricotiers sont maintenant en fleurs

mais la floraison des pêchers semble avoir été endommagée par l'hiver, et la récolte de pêches ne semble pas prometteuse à l'heure actuelle. Le temps froid et humide dans le comté de Kent a retardé d'au moins dix jours les travaux de plantation. La plupart des céréales de printemps ont été semées mais la germination est lente. La condition du blé d'hiver est excellente et on annonce que les dégâts causés par l'hiver sont de l'ordre de 2 %. Quelques acres seulement de maïs ont été ensemencées et on signale qu'un certain nombre de cultivateurs ont remplacé le maïs par le soya. La plantation des pois destinés à la conservation a également été retardée, et seulement quelques tomates ont été plantées. Les pâturages sont en excellente condition mais ont besoin d'un temps sec et chaud sans délai. Le temps humide et froid retarde encore les travaux des champs dans le comté de Middlesex, et environ 5 % seulement des céréales de printemps ont été semées. La préparation du sol destiné à la culture du maïs n'a pas encore été commencée. Dans le comté de Norfolk, le temps froid et humide, qui persiste continue à retarder la croissance de toute culture. Il n'y a pratiquement pas eu de travaux dans les champs, sauf dans quelques rares champs qui ont été labourés pour la culture du tabac. Les champs de blé, de seigle et les prairies ont bien passé l'hiver mais la croissance du printemps a été lente. Les arbres fruitiers accusent un retard de 7 à 10 jours. Si le temps continue à empirer, les semailles de maïs et de céréales de printemps seront réduites.

Dans le comté de Simcoe, dans l'ouest de l'Ontario, les fortes pluies tombées au cours de la semaine dernière ont retardé les travaux des champs et l'ensemencement de printemps n'a pas encore commencé. Les dégâts causés par l'hiver sont faibles et le blé est en bonne condition. La végétation dans les prairies artificielles et les pâturages est limitée en raison du temps particulièrement froid. Dans le comté de Bruce, le temps a été froid et la végétation et l'ensemencement des céréales de printemps sont réduits. On estime avoir perdu jusqu'à 20 % du blé, quoique les dégâts causés par l'hiver aient été variables et aient touché plus particulièrement les champs situés dans les terres basses. Dans le comté de Waterloo, l'ensemencement des céréales de printemps et du maïs a été retardé par le mauvais temps. Le blé a bien passé l'hiver mais la croissance de la végétation des prairies artificielles et des pâturages est de beaucoup inférieure à la moyenne. Il faudrait du temps ensoleillé et chaud sans délai.

Dans le comté de Peterborough, dans le centre de l'Ontario, avril a été particulièrement froid et mai plus humide qu'à l'habitude; en raison de l'humidité la plupart des champs ne peuvent encore être travaillés. Les champs de blé et les prairies artificielles ont bien passé l'hiver mais la croissance de la végétation est lente. Le printemps étant déjà en retard de deux semaines, il faudrait du temps chaud et sec sans délai.

Dans l'est de l'Ontario, on signale que dans le comté de Leeds les semailles sont tardives et que quelques acres seulement de maïs et d'orge ont été ensemencées. Les prairies artificielles ont subi des dégâts cet hiver et la croissance du blé apparait maintenant très limitée. La végétation des pâturages a eu une croissance très lente. Seulement quelques têtes de bétail sont retournées aux pâturages. Dans le comté de Renfrew, les travaux des champs n'ont commencé que dans quelques fermes, et accusent un retard de près de 18 jours. Jusqu'à maintenant la végétation a été très lente à pousser. Les dégâts causés au blé par l'hiver sont variables et peuvent atteindre jusqu'à 90 % selon les différentes régions du comté. Les dégâts causés par l'hiver aux vieilles tiges de luzerne ont été très élevés, mais les nouvelles semailles varient de passables à bonnes et croissent lentement pour le moment.

De notre correspondant à Kapuskasing, dans le nord de l'Ontario, nous apprenons que la neige a été très lente à fondre en raison du temps froid et du manque de pluie. Les travaux des champs sont en retard de presque deux semaines. Dans la région de Thunder Bay il n'y a eu aucun labour encore, bien que les conditions atmosphériques soient maintenant favorables au séchage du sol.

MANITOBA

Dans la plupart des régions du sud de la province, les cultivateurs ont commencé les travaux des champs et certaines superficies dispersées ont déjà été ensemencées. Les réserves d'humidité sont satisfaisantes. Dans le nord-ouest et le district d'Interlake, le temps chaud et sec a permis de faire certains travaux de moissonnage-battage de la récolte de l'an dernier. De nombreux cultivateurs appliquent des produits chimiques pour contrôler la pousse de la folle avoine. Bien que la croissance des pâturages soit lente, le bétail est mis au pâturage dans de nombreux endroits car les réserves alimentaires sont en général maigres.

Certains cultivateurs de la région située entre Dominion City et Emerson ont ensemencé du blé sur les terrains bien drainés, et dans le district de Piney des semailles ont été effectuées sur les terrains sablonneux. Les travaux de printemps devraient être généralisés d'ici la fin de la semaine. Les conditions hygrométriques sont en général bonnes en ce qui concerne les céréales, mais les pâturages et les champs de foin auraient besoin de pluies qui favoriseraient la croissance. Les rapports en provenance d'Altona indiquent que certains cultivateurs ont commencé les travaux d'ensemencement au cours de la dernière semaine d'avril et les travaux se sont poursuivis constamment, ce qui fait que de 10 à 20 % des terres sont maintenant ensemencées. Pendant ce temps, d'autres cultivateurs attendent la pousse de la folle avoine pour commencer les travaux. L'assèchement en surface a été rapide, mais l'humidité sous la surface est bonne. Dans le district de Morden, à la suite de la précipitation légère survenue en fin de semaine dernière les travaux des champs devraient s'étendre à toutes la région d'ici la fin de la semaine. Les cultivateurs ont ensemencé la plupart des cultures d'oignons à ensemencement direct et la plantation des pommes de terre hâtives est en cours. Toutefois, la plupart des travaux des champs se limitent cette semaine à l'épandage d'engrais et à l'ensemencement de céréales sur les terrains les mieux drainés. Les mauvaises herbes commencent à germer, y compris la folle avoine, la moutarde sauvage et l'amarante à racine rouge. Les basses températures ont retardé la croissance des pâturages.

Dans le district de Pilot Mound, la croissance des pâturages ne fait que commencer et certains travaux des champs sont commencés ici et là. La croissance des mauvaises herbes est lente. On prévoit que les travaux des champs s'étendront à toute la région cette semaine. Les rapports indiquent que les cultivateurs sont entrain d'ensemencer plus de cultures fourragères et augmentent leur gros cheptel. Les conditions hygrométriques sont bonnes et on prévoit une utilisation accrue d'engrais et d'herbicides. A Somerset, il reste encore à faire la récolte ce printemps de grands champs de graine de lin de l'année dernière. Les semailles ne font que commencer dans les jachères, mais les chaumes restent très humides. Les semailles devraient s'étendre à toute la région d'ici la fin de semaine. Les pâturages s'améliorent grâce au temps chaud et les réserves alimentaires sont suffisantes. A Melita dans le sud-ouest de la province, les réserves d'humidité sont de passables à bonnes en surface et sous la surface. La croissance des mauvaises herbes est lente et le terrain ne se réchauffe que lentement. Les travaux des champs s'étendent à toute la région et les semailles viennent de commencer. La croissance des pâturages est lente et on signale que les pertes de veaux sont plus élevées que

d'habitude, mais que l'état des vaches est en général bon.

A Beauséjour à l'est de Winnipeg, les travaux des champs sont en cours et les semailles sont commencées. L'état du terrain est bon mais certains cultivateurs attendent la pousse de la folle avoine et d'autres mauvaises herbes pour commencer les semailles. Si le temps est favorable, les travaux d'ensemencement s'étendront à toute la région d'ici la fin de la semaine. Les cultures fourragères progressent lentement. Les rapports en provenance de Selkirk indiquent que le temps chaud et sec a contribué à rendre le terrain en bon état et que certains cultivateurs ont commencé la préparation du terrain. La croissance des mauvaises herbes a également commencé et si les conditions atmosphériques le permettent on procédera à la destruction des mauvaises herbes hâtives. La récolte de certaines cultures de 1971 a été faite, et on signale que les rendements sont bons mais la qualité médiocre. La croissance des pâturages a été lente jusqu'ici, mais ne tardera pas à s'accélérer si le temps se met au chaud. A Stonewall, les semailles sont peu avancées mais si le temps est beau, les travaux commenceront partout d'ici quelques jours. On signale une forte croissance de la folle avoine. On prévoit que les pâturages seront prêts vers la mi-mai. Les réserves de foin sont maigres.

Les rapports en provenance de Brandon indiquent que les semailles sont en cours partout dans le sud-ouest du district et que les travaux des champs sont commencés dans le reste de la région. En surface, les conditions hygrométriques sont bonnes, mais en dessous le sol est toujours gelé. Les précipitations depuis le 1er avril ont été inférieures à la normale, mais une abondante chute de neige est tombée récemment sur la partie septentrionale du district. La croissance du seigle d'automne et des cultures fourragères est bonne et la folle avoine commence à sortir de terre. Les nouvelles cultures dans la région de Brandon comprennent les lentilles et les féveroles. A Virden, les travaux de printemps ne sont pas très avancés en raison du temps frais. Le terrain est encore très humide, ce qui empêche l'exécution dans toute le région des travaux des champs et retarde la croissance des mauvaises herbes. L'état des pâturages est normal pour cette période de l'année.

A Arborg, dans la région septentrionale d'Interlake, le terrain sec non gelé de l'automne dernier a permis peu d'écoulement et l'asséchement du terrain va bon train ce printemps. L'herbe pousse bien. Certains cultivateurs ont pu commencer les travaux des champs le 1er mai et ces travaux s'étendront bientôt à toute la région; les semailles commenceront vraisemblablement la semaine prochaine.

A Minnedosa, dans le centre ouest du Manitoba, les champs sont toujours très humides et les travaux des champs sont très peu avancés. La récolte de certaines cultures de l'automne dernier était en cours la semaine dernière, mais la pluie et une légère chute de neige ont fait interrompre les travaux.

A Shoal Lake, dans le centre ouest de la province, le printemps tardif a obligé à réduire les travaux des champs au minimum jusqu'ici. La croissance des pâturages est lente et les réserves alimentaires s'épuisent au point que dans certains cas le bétail broute sur les chaumes et autour des terrains marécageux. On signale que les activités concernant le bétail sont en expansion dans le district. Les conditions d'humidité à Russell sont satisfaisantes, mais une pluie chaude est nécessaire pour favoriser la croissance des mauvaises herbes, des prairies artificielles et des pâturages. Une importante superficie est actuellement traitée au Trefan et à l'Avadex. Certains champs de blé ont été ensemencée à Foxwarren. Les réserves alimentaires sont satisfaisantes. Dans le district de Swan River, la neige tombée le 5 mai a retardé le début des travaux des champs au moins jusqu'à la mi-mai.

Certains signes d'inondation se manifestent dans la région de Birch River. Le seigle d'automne semble avoir bien passé l'hiver.

La précipitation moyenne non pondérée dans la province depuis le 1er avril a été de 24 % en dessous de la normale, contre 27 % en dessous de la normale une semaine plus tôt, 5 % en dessous de la normale deux semaines plus tôt, ce qui contraste avec le chiffre de 36 % au-dessus de la normale un an plus tôt. La température moyenne pour la semaine se terminant le 8 mai 1972 a été de 2.5 degrés inférieure à la normale, contre 5.7 degrés au-dessus de la normale une semaine plus tôt, et 0.8 degré en dessous de la normale deux semaines plus tôt, ce qui contraste avec la température de 4.4 degrés au-dessus de la normale pour la semaine se terminant le 10 mai 1971.

SASKATCHEWAN

Les travaux de préparation des champs et les semailles ont pu commencer grâce au temps chaud et sec qu'il a fait ces derniers jours. Le temps frais et venteux a retardé les travaux dans le nord et dans l'est, mais on prévoit que les semailles seront partout en train d'ici le 15 mai. L'ensemencement est bien avancé dans l'extrême sud-ouest, mais peu avancé dans les régions du centre. Les conditions hygrométriques sont bonnes dans la région du centre et très bonnes dans le nord-est, tandis que dans les régions du sud-ouest et du centre ouest le terrain est sec. On signale une certaine érosion des sols dans l'extrême sud-ouest et les pâturages ont besoin d'humidité dans cette région.

A Indian Head, le temps frais de la dernière partie d'avril a empêché le terrain de réchauffer et de sécher suffisamment pour permettre les travaux des champs. La préparation des terres et les semailles ne faisaient que commencer quand la pluie et la neige du 5 mai sont venues interrompre tous les travaux. Le sol est maintenant juste assez sec pour permettre la préparation de la terre et les semailles devraient commencer partout d'ici le 12 mai. Les mauvaises herbes commencent à sortir de terre et les prairies artificielles poussent très bien. L'humidité du sol est suffisante pour la germination. Les champs de jachères ont des réserves moyennes d'humidité, mais les terrains de chaume sont secs et contiennent juste assez d'humidité à la surface pour permettre la germination. Les champs de foin sont secs et ont un besoin pressant de pluie pour permettre la production d'une récolte moyenne. L'écoulement n'a pas été considérable dans cette région car une grande partie de l'eau a été absorbée par les terrains secs. On a signalé de l'érosion par le vent dans certaines régions locales peu étendues.

Les rapports en provenance de Swift Current dans le sud-ouest indiquent que les champs ont besoin d'humidité pour permettre une bonne germination. Les conditions d'humidité sous la surface sont passables. Les mauvaises herbes ont très peu poussé jusqu'à présent. Les pâturages sont secs et la croissance de l'herbe a été très lente. Le vêlage est terminé dans une proportion de 80 % et le gros bétail et les veaux sont en bon état.

A Endeavour, dans la partie centrale est, les travaux de printemps ne sont pas encore commencés en raison de l'état détrempé du terrain. Les pâturages ne font que commencer à pousser et le bétail est encore alimenté par les provisions fourragères d'hiver.

A Drake, dans la partie centrale de la province, le temps frais et l'état détrempé du terrain ont retardé les travaux d'ensemencement. Une partie considérable des travaux préparatoires aux semailles a été accomplie et les semailles devraient être en train partout dans la région vers la fin de la semaine si le temps le permet. Certaines terres basses sont inondées. Les conditions d'humidité sont de passables à bonnes dans ce district. Le bétail a hiverné dans de bonnes conditions, mais n'a pas encore été mis au pâturage. Les rapports en provenance de Saskatoon indiquent que malgré la fonte de la neige au début d'avril, le temps est demeuré au frais et la croissance a été lente. Les labours viennent seulement de commencer et les semailles sont très peu avancées jusqu'ici mais devraient s'étendre à toute la région vers la fin de la semaine. Les conditions d'humidité du sol sont juste acceptables dans ce district. La croissance des pâturages artificiels est satisfaisante mais celle des pâturages naturels est médiocre.

A Rosetown, dans la région centrale ouest, les semailles viennent juste de commencer et devraient être entrain partout dans trois ou quatre jours. Le temps a été frais et il n'est pas tombé de pluie jusqu'ici. Les mauvaises herbes ont été lentes à pousser. Les pâturages et les prairies artificielles ont besoin de pluie. A Scott, les travaux des champs sont maintenant en cours et les semailles sont en partie temminées. La précipitation de 0.71 pouce a beaucoup amélioré les conditions hygrométriques du sol et les pâturages et les cultures fourragères poussent bien. Les températures très basses durant la nuit ont maintenu les températures du sol à un bas niveau. On nourrit encore le bétail à cause du manque de pâtures.

A Melfort dans le nord-est, les travaux des champs ont été retardés par le temps frais, toutefois, les travaux devraient s'amorcer pour de bon avant la fin de semaine. L'humidité des jachères est satisfaisante, mais on signale des dégâts considérables dûs à l'érosion. La croissance des plantes annuelles d'hiver et de l'herbe est bonne.

La précipitation moyenne non pondérée dans la province depuis le 1er avril a été de 9 % en dessous de la normale, contre 28 % en dessous de la normale une semaine plus tôt, 19 % en dessous de la normale deux semaines plus tôt et 34 % en dessous de la normale un an plus tôt. La température moyenne pour la semaine se terminant le 8 mai 1972 était de 4.3 degrés inférieure à la normale, contre 4.6 degrés au-dessus de la normale une semaine plus tôt, et 2.3 degrés en dessous de la normale deux semaines plus tôt, ce qui contraste avec les 5.9 degrés au-dessus de la normale enregistrés pour la semaine se terminant le 10 mai 1971.

ALBERTA

Les travaux des champs et les semailles commencent progressivement en Alberta. Dans la partie sud-est, certains cultivateurs ont déjà commencé les semailles et certaines cultures semées tôt sont sorties de terre. Le seigle et le blé d'hiver ont hiverné dans le bonnes conditions. On prévoit que les travaux des champs battront leur plein cette semaine. Les réserves d'humidité sont faibles dans de nombreux secteurs à cause du peu d'ampleur des chutes de neige et du manque d'humidité reçue au printemps jusqu'ici.

Dans le sud-est de la province, à Medicine Hat, les travaux de printemps sont en cours. Certains cultivateurs ont terminé l'ensemencement et les cultures des terrains ensemencés sortent de terre. Les conditions d'humidité sont médiocres et les champs ont besoin de pluie. Le vêlage est pratiquement terminé et de bons

résultats ont été obtenus. Le bétail est en bon état mais l'herbe des pâturages est plutôt courte.

Dans la région de Lethbridge, dans le sud-ouest de la province, les réserves d'humidité dans les terrains secs de chaume sont bonnes et celles dans les jachères sont excellentes. Le seigle d'automne et le blé d'hiver ont hiverné dans de bonnes conditions. L'ensemencement des céréales ne fait que débuter à l'ouest de Taber. On estime que l'ensemencement du colza est terminé dans une proportion d'environ 25 % dans la région. La plantation des pommes de terre hâtives est terminée et l'ensemencement des principales cultures est commencé. L'ensemencement de la betterave à sucre est terminé dans une proportion d'environ 75 % et les cultures semées tôt commencent à pousser. Environ 40 % du maïs à grain et d'ensilage est ensemencé. La croissance des pâturages a été retardée. A Cardston, le temps a été frais et humide et la croissance de l'herbe a été lente. En raison des conditions atmosphériques, les travaux des champs ont été retardés et très peu d'ensemencement a été fait jusqu'ici. On a besoin de temps chaud pour favoriser la croissance et la destruction des mauvaises herbes. Le printemps a également été frais et humide dans la région de Claresholm et la croissance a été lente. Les cultivateurs commenceront l'ensemencement dès qu'ils pourront avoir accès aux champs. Le seigle et le blé d'hiver ont hiverné dans de bonnes conditions. La croissance des pâturages s'est faite lentement.

A Vermilion, dans la région centrale nord-est, les travaux des champs ont démarré lentement. Toutefois, ils devraient battre leur plein au cours de cette semaine. Le terrain est très sec à cause du peu de neige tombée cet hiver et du manque d'humidité reçue au printemps.

Dans la région d'Eckville dans le centre ouest de la province, les travaux des champs ne font que commencer et devraient se généraliser d'ici le 11 mai. Les conditions d'humidité en surface et sous la surface sont idéales et les réserves d'eau sont satisfaisantes. La croissance des pâturages a été lente, mais le bétail est en bon état. On prévoit que les terres ensemencées de colza et de céréales produiront une récolte identique à celle de l'année dernière.

Les conditions d'humidité du sol dans la région de la Rivière de la Paix sont bonnes. La saison est en retard et on n'a pas encore commencé les travaux des champs. Toutefois, ils devraient débuter cette semaine. Le retard de la saison pourrait entraîner une diminution de la superficie ensemencée en blé.

La précipitation moyenne non pondérée dans la province depuis le 1er avril a été de 21 % en dessous de la normale, comparativement à 15 % en dessous de la normale une semaine plus tôt, à 4 % en dessous de la normale deux semaines plus tôt, et à 50 % en dessous de la normale un an plus tôt. La température moyenne pour la semaine se terminant le 8 mai était de 4.2 degrés inférieure à la normale, contre 2.1 degrés au-dessus à la normale une semaine plus tôt, 4.9 degrés au-dessous de la normale deux semaines plus tôt, et 4.5 degrés au-dessus de la normale pour la semaine se terminant le 10 mai 1971.

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Sur l'Ile Vancouver, les basses températures subies durant la dernière semaine de janvier ont endommagé les tiges des mûres de Logan et il est possible que l'on enregistre jusqu'à 30 % de pertes. La culture des fraises a subi de légers dommages à cause du temps frais qui a régné ce printemps et des pluies abondantes de mars,

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA
1010523878

ainsi qu'à cause des températures, inférieures de 4 degrés à la moyenne, enregistrées en avril. Toutes les cultures de fruits sont en retard d'environ trois semaines. Toutefois, les perspectives de récolte des tomates de serre semblent bonnes.

Près d'Agassiz dans la vallée inférieure du Fraser, la température moyenne d'avril a été de 4.1 degrés au-dessous de la moyenne de 80 pour l'année et la quatrième plus basse enregistrée au cours des 50 dernières années. Les précipitations d'avril ont dépassé de beaucoup la moyenne et ont retardé de façon anormale la plantation de toutes les cultures. Présentement on est en train de planter les pois de conserve et quelques cultures céréalières commencent à pousser. Les pâturages et les prairies artificielles sont dans un état presque normal et, dans certains cas, en très bon état. On a constaté des dégâts dûs à l'hiver dans les plants de fraises.

Dans la région de Kamloops, les pâturages sont en bon état mais la sortie des bovins sera retardée, le printemps ayant été extrêmement lent à venir. A présent, presque tout le maïs d'ensilage a été planté. Le foin semble en bon état par suite de l'abondance d'humidité. On finira cette semaine de planter les pommes de terre.

On signale de la région intérieure centrale que dans les environs de Prince-Georges l'hiver a été l'un des plus long qu'on ait connu jusqu'à présent et que les chutes de neige ont été parmi les plus abondantes jamais enregistrées. C'est seulement depuis la dernière semaine que l'herbe commence à verdir. On a épandu environ 50 % des engrais. Jusqu'à présent, on a peu ensemencé à cause des grandes étendues de neige qui demeurent par endroits. Des problèmes risquent de se poser dans les terres basses qui sont actuellement submergées par suite des inondations. Par contre, l'humidité du sol est bonne.

On a commencé à ensemencer certains champs dans la région de Dawson Creek du Bloc de la Rivière de la Paix. Quatre ou cinq jours supplémentaires de temps sec faciliteraient énormément l'ensemencement. La plupart des fourrages ont traversé l'hiver sans subir trop de dégâts. Il en est de même des herbages. Le printemps tardif signifie qu'on sèmera moins de blé; par contre, il se peut qu'on sème plus de colza, de cultures fourragères et d'orge. Dans la région qui entoure Fort St. John on a peu ensemencé, du fait que la neige est demeurée tardivement et que le mois d'avril a été frais. On ne commencera pas les semailles avant au moins une autre semaine. On réduira probablement les superficies de blé mais il se peut qu'on augmente celles d'orge et de colza. Tout indique qu'on continuera à s'intéresser aux herbages à la suite du programme de motivation. Il est difficile d'estimer dès maintenant si l'hiver a causé des dommages aux cultures fourragères.