CATALOGUE 22-002F

22-002F
no 9
1973
18 juil.
c. 3

Statistics Canada
Statistique Canada

Pour publication le 18 juillet 1973
à 3 h. de l'après-midi

Série de 20 rapports: $4

Série de rapports sur les grandes cultures N° — 12

# RAPPORT TÉLÉGRAPHIQUE SUR LES CULTURES — CANADA

Statistique Canada publie aujourd'hui le quatrième rapport télégraphique d'une série de six sur l'état des cultures au Canada. Le présent rapport comprend en outre le huitième rapport d'une série de 11 sur l'état des cultures dans les provinces des Prairies. Les renseignements sur lesquels reposent ces rapports sont fournis par un certain nombre de correspondants agricoles spécialement désignés des ministères fédéral et provinciaux de l'Agriculture, par des observateurs agricoles particuliers et par des entreposeurs de céréales. Les renseignements météorologiques contenus dans le présent numéro sont fournis par le service de l'Environnement atmosphérique, Environnement Canada.

## SOMMAIRE

Provinces Maritimes. — Les fortes pluies continues qui sont tombées dans les Maritimes ont considérablement retardé la récolte de la plupart des cultures. Le foin a mûri très rapidement et perd en qualité il faudra plusieurs jours de beau temps avant qu'on puisse véritablement recommencer le fauchage. Dans l'Île-du-Prince-Édouard, la récolte des pommes de terre semble prometteuse; on ne signale pas de cas de mildiou. En Nouvelle-Écosse, le maïs et les céréales semés tard sont en assez mauvais état. Au Nouveau-Brunswick, on rapporte que la production de fraises a considérablement diminué cette année. Le tabac semble beau, et on prévoit que la récolte de pommes sera assez bonne.

Québec. — La température a été au-dessus de la normale au cours des deux dernière semaines. Bien qu'il y ait eu de nombreuses averses, la quantité d'eau tombée n'a pas été excessive. Sauf quelques rares exceptions, les réserves d'humidité semblent suffisantes, et le temps a généralement été favorable à la croissance de toutes les cultures. Cependant, les foins ont été retardés dans certaines parties de la province à cause du mauvais temps. Dans les comtés du sud, le foin a été engrangé dans une proportion de 75 %; ailleurs, les travaux sont moins avancés. On rapporte que les rendements sont moyens, bons ou très bons, mais que la qualité a diminué. Dans d'autres districts, cependant, les pluies ont favorisées la croissance de la plupart des

Division de l'agriculture
Section des cultures

5-3102-509

Published by Authority of the Minister of Industry, Trade and Commerce
Statistics Canada should be credited when republishing all or any part of this document

Publication autorisée par le ministre de l'Industrie et du Commerce
Reproduction autorisée sous réserve d'indication de la source: Statistique Canada

céréales, et celles-ci semblent en bonne état, particulièrement dans les champs bien drainés. Dans certains districts, on rapporte que la tige de certaines céréales en épis est courte, et que les rendements risquent d'en souffrir. Le maïs a bien poussé, mais son état varie beaucoup selon la qualité du drainage des champs. Dans le district de Montréal, on a commencé l'arrachage des pommes de terre hâtives, et les rendements sont bons. Le tabac semble prometteur, même s'il est un peu moins avancé qu'à l'ordinaire. La cueillette des fraises est presque terminée; les rendements sont bons et la qualité est très satisfaisante. La cueillette des framboises vient de commencer. L'état des pâturages est bon, très bon ou excellent; la production de lait se maintient à un niveau élevé.

Ontario. — Il est tombé peu de pluie au cours des deux dernières semaines dans la partie sud de la province. Le fauchage de la première récolte de foin est presque terminé, et le nombre d'acres prêts à être ensilés est supérieure à la normale. Les champs de foin qui viennent tout juste d'être fauchés n'ont pas repoussé vite à cause du temps chaud et sec. La moisson du blé d'hiver est commencée dans les comtés d'Essex et de Kent et elle s'étendra à tout le sud de l'Ontario d'ici la fin de la semaine prochaine. Le maïs pousse bien et mesure de deux à cinq pieds. Les céréales de printemps ont monté en épi, et on estime que les rendements seront bons. Toutefois, il faudra des pluies dans toute la région pour que la croissance se poursuivre normalement. Dans l'est de l'Ontario, de nombreux champs destinés au maïs n'ont pas été ensemencés. La qualité de la récolte de foin dans cette région est de moyenne à excellente. Dans le nord de l'Ontario, les foins ont été retardés par la pluie dans de nombreuses régions; cependant, les conditions de croissance des cultures sont très bonnes.

Provinces des Prairies. — Dans les provinces des prairies, les conditions de croissance sont bonnes sauf dans d'assez vastes étendues du sud-ouest de l'Alberta, du sud-ouest et du centre-ouest de la Saskatchewan et de l'ouest du Manitoba, régions où les cultures ont besoin de pluie. En effet, la chaleur et les vents ont détérioré les conditions dans cette région. Ailleurs, les cultures poussent bien et les perspectives semblent bonnes. Les céréales montent en épi; les cultures oléagineuses sont en fleurs, et celles qui ont été semées en premier commencent à former des cosses. Les foins sont commencés, et les rendements sont variables.

## RAPPORT SUR LA ROUILLE

D'après les experts de la Station de recherches du ministère fédéral de l'Agriculture, à Winnipeg la situation de la rouille des céréales n'a pas beaucoup évolué au cours de la semaine. On signale des cas de nielle du blé et de l'avoine au Manitoba et dans l'est de la Saskatchewan; la maladie est cependant moins répandue dans les régions de l'Ouest et du Nord. Les dégâts causés par la nielle du blé sont assez légers, et, comme la majorité des cultures montent en épi ou ont déjà épié, les risques de dégâts importants diminuent. Cependant, il est encore possible que la maladie se propage, particulièrement dans les champs semés tard. On signale également des cas sans gravité de rouille couronnée de l'avoine qui pourraient toutefois se développer à temps pour causer des dégâts. On n'a pas encore signalé de cas de rouille de la tige du blé et de l'avoine dans l'Ouest du Canada.

Colombie-Britannique. — Grâce au temps chaud dans l'ensemble de la province, les conditions de croissance sont excellentes. Les conditions d'humidité du sol sont suffisantes; toutefois, la croissance des pâturages a été retardée en raison du mauvais temps qu'il y a eu au printemps. La qualité du foin n'est que moyenne, et les rendements sont légèrement inférieurs à la normale. Le long de la Côte, les tomates

et les concombres de serre arrivent à maturité; l'arrachage des pommes de terre hâtives est commencé, et la récolte semble être dans la bonne moyenne. La production de laitue et de légumes verts bat son plein. La cueillette des fraises est terminée, et celle des framboises, des mûres de Logan et des bleuets est commencée; les rendements sont moyens. Les canneberges semblent toujours en excellent état, et l'on prévoit que les rendements seront bons ou assez bons. Dans la vallée de l'Okanagan, le gros de la cueillette des cerises est terminé et la production d'abricots et de pêches précoces est bonne. Dans l'ensemble, les pommes et les poires mûrissent assez bien, et les rendements, surtout dans le cas des poires, semblent être plus élevés qu'on ne l'avait prévu. Bien que le temps frais ait retardé l'arrivée à maturation des concombres et des tomates de champs, ils sont maintenant prêts. Dans la région de Rivière de la Paix, il semble que, grâce aux fortes pluies de juin, la croissance des céréales et des cultures fourragères soit généralement bonne.

## PROVINCES MARITIMES

Dans l'Île-du-Prince-Édouard, les pluies ont retardé la fenaison, et la proportion de foin engrangé reste faible. Les rendements sont inférieurs ou égaux à la normale. La croissance des pâturages est bonne dans les champs qui ont été fertilisés. Il semble que la récolte de pommes de terre sera bonne, et bien que l'on ne signale pas de cas de mildiou, la pulvérisation se poursuit. La cueillette des fraises a été retardée par la pluie, et on prévoit qu'elle ne se poursuivra pas très longtemps; les rendements atteignent tout juste la moyenne. La cueillette des pois vient à peine de commencer; il semble que la récolte sera bonne. Le repiquage des choux est en cours. Le tabac pousse bien, et il semble que la production sera bonne.

Les fortes pluies qui sont tombées dans toute la Nouvelle-Écosse ont retardé les récoltes. Le foin semble beau; on s'attend toutefois à ce que l'excès d'humidité en diminue la qualité. Les foins sont en cours, mais seulement 25 % des champs ont été fauchés. Les céréales semées tôt semblent en bon état et commencent à monter en épi. Les légumes sont généralement beaux; cependant, dans la région du Cap Breton, la pluie a causé des dégâts dans certains champs de carottes. L'arrachage des pommes de terre hâtives va commencer la semaine prochaine dans la vallée d'Annapolis. Dans certaines régions, les bleuets commencent à mûrir et semblent en bon état. La cueillette des fraises est presque terminée. Dans la région de Amherst, l'excès d'humidité a retardé les travaux agricoles. La récolte des cultures d'ensilage et les foins n'avancent pas très rapidement. Dans la région de Truro, le foin semble beau même si le fauchage a été temporairement arrêté à cause de la pluie et en raison du fait que les champs sont détrempés. Les céréales en sont à la première phase d'épiage. La production de fraise est inférieure à la moyenne, mais il semble que celle des bleuets sera bonne. L'état des pâturages est généralement au-dessus de la moyenne.

Au Nouveau-Brunswick, les pluies continues des deux dernières semaines et l'excès d'humidité qui en a résulté ont rendu le fauchage du foin presque impossible dans certains champs, le foin coupé a même pourri sur place. Le fauchage du maïs d'ensilage est terminé; les rendements ont été excellents. Le tabac pousse bien. La cueillette des fraises devrait être terminée d'ici la fin de la semaine. Il semble toutefois, que la production n'ait pas été très élevée et que la pourriture des fruits cueillis ait posé des problèmes. Les légumes hâtifs (betteraves, choux rutabagas, laitue et petits pois) arrivent au marché en quantités de plus en plus grandes. Les pommes de terre hâtives et les échalottes devraient commencer à arriver cette semaine. La production de pommes devrait être assez bonne; la chute de juillet a été légèrement supérieure à la normale. Dans la région de Perth, le temps chaud et les nombreuses averses ont pratiquement interrompu les foins. Cependant,

s'il fait beau, la moisson pourrait être bonne. Les cultivateurs sont en train de rentrer le foin d'ensilage. Le mauvais temps a retardé la pulvérisation ainsi que le sarclage et le buttage des pommes de terre. De façon générale, l'état des pommes de terre ne semble pas très bon en raison de l'humidité. La pourriture a entrainé de lourdes pertes dans les champs de fraises.

## QUÉBEC

D'après les rapports en provenance du district de l'Assomption, l'état du tabac à cigare et du tabac jaune est très bon. Les cultivateurs ont dû irriguer certains champs de tabac jaune. Les fortes pluies de juin (6.35 pouces) tombées à Sainte-Clothilde ont aggravé les dégâts que le mauvais temps avait causé aux légumes en mai. On prévoit donc que la superficie consacrée aux oignons diminuera de 20 à 50 %. Le mauvais temps a également retardé les travaux d'ensemencement et, le 20 juin, seulement la moitié des carottes avaient été semées. L'arrachage des pommes de terre hâtives a commencé vers le 9 juillet. La production étant faible et la demande élevée, les prix sont demeurés stables. La laitue a été semée tard, et la production est très innégale; la qualité est moyenne, les rendements sont faibles, et les prix, élevés. Le céleri pose des problèmes aux cultivateurs car il a été semé tard.

La semaine dernière, dans le district de Rock Forest, le temps a généralement été favorable, et la fenaison est avancée; dans certaines localités, toutefois, les averses ont interrompu les travaux. De nombreux cultivateurs ont fini leurs foins, et, en général, ils sont engrangés dans une proportion de 70 % dans l'ouest du district et de seulement 15 % dans l'est; la qualité est bonne et les rendements sont excellents. Les céréales poussent normalement; le maïs d'ensilage est très beau dans les champs bien drainés, mais il n'atteint que la normale ailleurs. La cueillette des fraises est presque terminée et, contrairement à ce qu'on avait prévu, les rendements sont bons. La température a été normale et les nuits, fraîches. Les pâturages sont très beaux.

Dans la région de St-Anne de la Pocatière, les nombreuses averses et le temps humide ont retardé la fenaison pendant les deux premières semaines de juillet; seulement 25 ou 30 % du foin a été engrangé. Les céréales et les pommes de terre nouvelles poussent bien, l'état des pâturages est normal.

Les nombreuses pluies qui sont tombées au Lac St-Jean ont retardé le fauchage du foin et en ont diminué la qualité. Toutefois, les rendements sont supérieurs à la normale. On signale la présence de mauvaises herbes dans les champs de plantes fourragères qui ont été semées ce printemps sans plante-abri. Les réserves d'humidité et le temps chaud ont favorisé la croissance de toutes les cultures. L'état des céréales, des betteraves à sucre et du colza semble très prometteur. Les vaches sont en bon état et la production laitière est excellente.

## ONTARIO

Dans le comté d'Essex, dans le sud de l'Ontario, le temps sec a permis aux cultivateurs de moissonner leur blé; les rendements atteignent entre 40 et 45 boisseaux l'acre. Toutefois, les autres cultures ont besoin d'une bonne pluie. Dans les régions où la qualité du drainage est moins bonne, la terre s'est tassée et il s'est formé une croûte, si bien que le maïs et le soya ont eu de la difficulté à sortir. Les pommes de terre et le maïs hâtifs viennent tout juste d'arriver sur les marchés. Dans le comté de Kent, le temps chaud et humide a favorisé la croissance des cultures.

La moisson du blé a commencé le 9 juillet, et l'écimage du maïs, vers le 12 juillet. La cueillette des concombres est en cours. Dans le comté de Middlesex, la moisson du blé n'est commencée que dans les district du sud. L'épandage d'engrais azotés le long des rangs de maïs semé tard se poursuit. Les cultures ont grand besoin de pluie. Dans le compté de Norfolk de temps chaud et généralement sec a favorisé la croissance de la plupart des cultures. La moisson du blé doit commencer bientôt, et l'on s'attend à ce que les rendements soient assez bon. Le maïs a poussé rapidement, mais il s'est desséché dans certaines régions. Le tabac pousse bien; les cultivateurs sont d'ailleurs en train d'irriguer les champs de tabac. Même si l'état des céréales de printemps est égal ou inférieur à la normale, les perspectives semblent meilleures qu'on ne l'avait prévu. Le foin pousse en grande quantité, mais il est en retard.

Dans le comté de Simco, dans l'ouest de l'Ontario, l'état du foin est supérieur à la normale, particulièrement du point de vue de la qualité. La croissance du maïs a été inégale; les céréales de printemps ont épié. Le blé mûrit très rapidement. Les foins sont terminés dans une proportions d'environ 75 % et, bien que les rendements aient été excellents, la pluie en a considérablement diminué la qualité, Les regains poussent bien. L'état du maïs et des céréales de printemps est bon, très bon ou excellent. L'orge commence à mûrir. Les feuilles du blé d'hiver sèchent prématurément et, bien que les rendements devraient être assez bons, la qualité risque d'en souffrir. On a signalé la présence de légionnaires dans les céréales et le maïs. Les pâturages sont en train de sécher et la production de lait en a souffert. On a besoin d'une bonne pluie dans tout le comté.

Dans le comté de Durham, dans le centre de l'Ontario, l'état du maïs s'est amélioré au cours de la semaine, mais la plupart des autres cultures ont besoin de pluie. Certains cultivateurs ont fini leurs foins, mais certains autres sont encore peu avancés. La production de fraises a été généralement bonne. Dans certains champs, les pois qui devaient être cueillis pour être mis en conserve ne pourront pas l'être à cette fin car ils ont mûri trop tard. Dans le comté de Peterborough, les foins sont presque terminés, le temps ayant été favorable au fauchage tout au long de la semaine dernière. Le maïs pousse bien et devra bientôt être écimé. Toutes les cultures ont besoin de pluie.

Dans le comté de Leeds, dans l'est de l'Ontario, le temps a été très beau, et les cultivateurs ont pu faire leurs foins; la qualité est bonne et les rendements sont supérieurs à la moyenne. Le blé d'hiver et les céréales semées tôt commencent à mûrir. Le maïs pousse bien et quelques champs devront déjà être écimés. Les régains et les pâturages ont besoin de pluie. Dans le comté de Carleton, le temps a été idéal pour faire les foins et il a favorisé la croissance de la plupart des cultures. Le maïs pousse bien sauf dans les champs trop humides. Certains champs de céréales de printemps ont commencé à mûrir et les perspectives de rendement semblent bonnes. Environ 10 à 15 % des terres n'ont pas encore été ensemencées à cause des fortes pluies qui sont tombées pendant tout le printemps.

Notre correspondant de Kapuskasing, dans le nord de l'Ontario, nous signale que la température, les précipitations et l'ensoleillement ont été au-dessus de la normale pendant la première moitié de juillet. Toutefois, les vents élevés et la forte pluie du 7 juillet ont couché le foin dans les champs bien fertilisés. À la ferme expérimentale, l'engrangement de la première coupe de foin est presque terminé; les rendements ont été bons. La plupart des cultivateurs viennent tout juste de commencer leurs foins. Les pâturages sont encore en très bon état. Dans le district de Thunder Bay, la fenaison a été interrompue par les pluies. Les céréales de printemps ont épié, et les pâturages sont beaux. Certains champs de pommes de terre n'ont

poussé que dans une proportion de 75 à 80 % en raison de la mauvaise qualité des graines et parce qu'elles ont germé sur pied.

MANITOBA

L'état des cultures est demeuré bon, très bon ou excellent dans tout le Manitoba; toutefois la partie ouest de la province a besoin de pluie. Les céréales hâtives se remplissent bien et les cultures spéciales poussent convenablement. Le colza semé tôt et les fababeans ont commencé à faire des cosses et on récolte les pois de conserverie. On s'attend à une autre invasion de la légionnaire cette année. La fenaison est bien avancée et les rendements sont à peu près moyens.

À Altona, la folle avoine et la moutarde sont encore la principale préoccupation dans de nombreux champs. L'orge semée tôt commence à mûrir et les autres cultures sont presque épiées. Toutes les cultures poussent bien dans la région de Morden et l'avoine semées tôt et l'orge se remplissent bien. Le lin et le colza sont en fleur et la féverole est en cosses. On a pulvérisé afin de mater la larve de la chrysomèle du tournesol et on signale des dégâts causés par les pucerons dans l'orge. On récolte le foin et le rendement s'avère inférieur à la moyenne. La récolte des pois de conserverie a commencé la semaine dernière et celle des autres cultures de conserverie suivra bientôt. La croissance des pâturages a été ralentie la semaine dernière.

Toutes les cultures ont besoin d'humidité dans la région de Melita. La chaleur endommage les cultures tardives et les pacages restent courts.

Environ 50 % de toutes les céréales sont épiées à Selkirk et on s'attend à des rendements supérieurs à la moyenne. Les conditions atmosphériques demeurent favorables au remplissage des cultures grâce aux légères pluies de la semaine dernière. Entre 30 % et 50 % de la fenaison est terminée et les pâturages poussent également bien. À de nombreux endroits on a signalé la présence du papillon de la vaneuse de l'artichaut dans les chardons mais sans qu'il ait attaqué les cultures.

De nombreuses céréales sont épiées et les autres sont à la montaison à Stonewall. La fenaison avec de bons résultats est presque terminée et les fababeans sont en excellent état. Les sauterelles n'ont causé aucun dégât mais les insectes ennuient le bétail.

À Brandon, les céréales poussent bien et le seigle d'automne et l'orge hâtive mûrissent. Les rendements du colza s'annoncent de bons à supérieurs à la moyenne, mais les superficies de tournesol ont considérablement diminué. L'état des pacages est meilleure que la normale et la fenaison est presque terminée. La production des semences fourragères s'annonce bonne pour l'instant.

Dans le nord de la région d'Interlake la majorité des céréales sont épiées. À Arborg, l'application de produits chimiques pour lutter contre la folle avoine a porté fruit et une partie du foin est récoltée avec de bons rendements. Les pacages demeurent bons et le bétail est en bon état.

Des températures dans les 80 accompagnées de vents violents ont entraîné une sécheresse rapide de nombreux champs dans la région de Neepawa. Les cultures mûrissent rapidement et dans de nombreux cas, elles sont courtes mais avec plus d'humidité, on pourrait encore obtenir de bons résultats. Le seigle d'automne commence à mûrir et la fenaison est en cours mais on a un urgent besoin de pluie à Minedosa. Les pâturages sont extrêmement secs et on signale de la rouille blanche dans le colza.

Les cultures de la région de Shoal Lake ont grandement besoin de pluie. À cause de la sécheresse, de nombreux champs ne sont pas encore tallés et le colza est très inégal. On récolte le foin et on signale des rendements très faibles. L'asticot de la tige du blé est très répandu et fait des ravages dans les champs de blé semés tôt.

Les cultures demeurent en bon état dans la région de Dauphin mais il faut de la pluie. La fenaison progresse bien et le seigle d'automne commence à mûrir. Les premiers décomptes d'oeufs de la légionnaire bertha laissent entrevoir une autre importante invasion. À Swan River, la fenaison est généralisée, les cultures demeurent de bonnes à excellentes même si certaines sont en retard. Les oeufs de la légionnaire apparaissent dans la majorité des champs de colza hâtif. Les pacages demeurent en bon état dans cette région.

La précipitation moyenne non pondérée depuis le 1er avril a été de 12 % au-dessus de la normale, comparativement à 19 % au-dessus de la normale la semaine précédente, 20 % au-dessus de deux semaines auparavant, ce qui contraste avec 24 % sous la normale un an auparavant. La température moyenne pour la semaine se terminant le 16 juillet 1973 a été de 3.4° F sous la normale, comparativement à 1.0° sous la normale une semaine auparavant, 3.7° sous la normale deux semaines auparavant et 5.5° sous la normale pour la semaine se terminant le 17 juillet 1972.

## SASKATCHEWAN

Un temps chaud, sec et venteux continue à aggraver la sécheresse dans les régions sud-ouest et centre-ouest. Les cultures tardives au Nord et au Nord-Est s'améliorent rapidement. On s'attend à des résultats supérieurs à la moyenne ailleurs dans la province si les conditions atmosphériques demeurent normales. Il faudrait qu'il pleuve dans les deux tiers sud de la province.

Les cultures devraient être très bonnes à Moosomin, dans le Sud-Est. Les conditions hygrométriques demeurent bonnes mais on aurait besoin d'une bonne pluie dans la région par suite du temps chaud de la semaine dernière. La fenaison bat son plein et on signale des rendements bien supérieurs à la moyenne. Les pacages sont en excellent état. L'andainage du seigle devrait commencer d'ici 10 à 14 jours. À Fillmore, des vents secs et chauds ont sérieusement asséché les cultures et les cultures sur chaume ont grandement besoin de pluie. La majorité des cultures sont épiées et un temps chaud continu permettra une récolte hâtive. Le lin et le colza sont en fleur. La récolte de foin est moyenne mais les pacages sont seulement passables. Dans le district d'Indian Head, toutes les cultures poussent rapidement par suite du récent temps chaud. Il faudrait du temps convenable pour hâter la maturité de nombreux champs. Les céréales semées tôt sont épiées, l'état des autres variant entre le début et la fin de la montaison. En général, toutes les cultures ont atteint une bonne hauteur et les talles sont bien supérieures à la moyenne. L'humidité du sous-sol est excellente et les jachères sont en bon état; il y a toutefois eu des problèmes de lutte contre les mauvaises herbes. La fenaison est presque terminée et on signale des rendements bien au-dessus de la moyenne. Les pacages sont en excellent état.

La sécheresse dure toujours dans la région de Swift Current au sud-ouest de la Saskatchewan où, depuis le 1er mai, la précipitation est inférieure de 73 % à la normale. La sécheresse de même qu'un temps chaud et venteux détruisent rapidement les cultures. Même s'il pleut, maintenant les rendements seront inférieurs à la moyenne. Les pacages sont très secs. On signale très peu de dégâts causés par les insectes. Dans la région de Leader, les cultures continuent à bien pousser. Toutes

sont épiées et dans certains cas, la floraison est terminée. Le lin pousse bien et est en fleur. Les sauterelles endommageront peut-être cette région.

Le blé très fort est épié à environ 40 % dans la région de Melville dans le centre-est de la Saskatchewan. Les céréales secondaires sont épiées à environ 20 % et le rendement s'annonce supérieur à la moyenne. Les pacages et la récolte de foin sont bons et la fenaison est presque terminée. Depuis le 1er mai, il y a eu 9.34 pouces de pluie comparativement à 1.75 pour la même période il y a un an. À Endeavour toutes les cultures ont très bien poussé la semaine dernière. Le blé et les céréales secondaires épient et les oléagineux sont en fleur. On ne signale aucun dégât causé par la grêle ou les insectes dans cette région. La fenaison est très avancée et les pacages et les conditions hygrométriques sont favorables.

A Drake, dans le Centre, il a fait chaud la semaine dernière. Il a plu quelque peu mardi. La hauteur des céréales varie considérablement du fait que des superficies ont été semées tard. Environ la moitié de la fenaison est terminée et les jachères s'améliorent. Les pacages et le bétail sont en bon état. Les conditions hygrométriques sont bonnes dans la région de Saskatoon et les cultures poussent bien. Le blé et les céréales secondaires sont épiés à 75 % et le colza est en fleur ou commence à faire des cosses. Le seigle d'automne est prêt à andainer et on prévoit un rendement de 15 à 20 boisseaux à l'acre. La fenaison est presque terminée. Les entomologistes signalent des chenilles du chardon et des arpenteuses dans le colza mais de légers dégâts. Les méloés endommagent quelque peu les fababeans à Saskatoon et à Outlook. La chrysomèle du tournesol est présente à Swift Current et Outlook. Les sauterelles adultes commencent à envahir les champs dans certains districts du sud-ouest et du centre de la Saskatchewan.

Dans le Centre-Ouest, à Rosetown, les cultures s'annoncent bonnes compte tenu du fait que seulement 3.8 pouces de pluie sont tombés depuis le 1er avril. Les cultures réensemencées au sud de la ville ont atteint environ 3 pouces et s'annoncent bien. Les oléagineux sont en fleur. Quelques agriculteurs ont commencé la fenaison. Les pacages ont bien besoin de pluie après les vents forts de la semaine dernière. On prévoit une récolte moyenne dans ce district. Notre correspondant à Scott ne signale aucune pluie la semaine dernière et un temps venteux et frais persiste. La sécheresse et des vents violents ont endommagé les cultures. Il est urgent qu'il pleuve et qu'il fasse chaud. Les cultures sont épiées à environ 50 % et la fenaison est terminée à 80 %. Les pacages sont en piètre état dans cette région. On ne signale aucune légionnaire bertha.

À Melfort, dans le Nord-Est, les céréales se ressentent encore du printemps pluvieux. Souvent elles sont irrigulières, envahies par les mauvaises herbes et jaunes. La récolte du foin est bonne mais les labours des jachères se font lentement.

La Saskatchewan Municipal Hail Insurance Association signale que le seul orage de grêle depuis le 9 juillet a été faible; il s'est produit à Borden le 13 julllet.

La précipitation moyenne non pondérée dans la province depuis le 1er avril a été de 23 % au-dessus de la normale, comparativement à 31 % au-dessus de la normale il y a une semaine, 36 % au-dessus de la normale il y a deux semaines mais 18 % au-dessous de la normale il y a un an. La température moyenne, durant la semaine terminée le 16 juillet 1973, a été de 0.8 degré (F) au-dessous de la normale, comparativement à 1.3 degré au-dessous de la normale il y a une semaine, 0.7 degré au-dessous de la normale il y a deux semaines et 5.5 degrés au-dessous de la normale durant la semaine terminée le 17 juillet 1972.

ALBERTA

Les perspectives de récolte dans la plus grande partie de la province restent favorables en dépit des changements de temps et d'humidité. Les réserves d'humidité dans le sud-ouest sont en train de disparaître par suite de forts vents et des températures élevées, et le besoin de pluie se fait sentir avec insistance, car certaines récoltes et certains pâturages commencent à se détériorer. Dans l'est de l'Alberta, les récoltes font preuve d'une excellente reprise de la sécheresse prolongée en mai et en juin; dans de nombreux champs semés tôt, les plants commencent à épier, et le colza est en fleur. Les régions centrales ont bénéficié d'excellentes conditions de croissance, et l'on attend des rendements supérieurs à la moyenne. Certaines sections de la région de la Rivière de la Paix ont reçu des chutes de pluie supérieures à la normale, ce qui a causé certains dégâts aux cultures. Toutes les régions de la province signalent que la fenaison est en cours.

Dans le district de Medicine Hat, des températures dans les 80 et 90 degrés la semaine dernière ont causé des dégâts à la plupart des récoltes qui sont en train d'épier et de se remplir, mais de la pluie est nécessaire. L'avoine d'automne est en train d'être moissonnée, et certains champs semblent assez beaux. L'herbe, le bétail et les jachères sont beaux.

Dans le sud-ouest, près de Lethbridge, toutes les cultures en terrain sec se déteriorent rapidement par suite de la chaleur et de la sécheresse. Le blé de printemps et l'orge sont en train de grossir, et l'on signale certains cas de brûlures. Le blé d'hiver est à l'état pâteux bien avancé, cependant que l'avoine d'automne et le colza précoce approchent du stade de la moisson, mais l'on s'attend à des rendements inférieurs à la normale. La demande d'eau pour l'irrigation est forte et la croissance des cultures est bonne. À Cardston, le blé d'automne mûrit très rapidement. Les rendements des céréales de printemps et d'oléagineux seront probablement inférieurs à la normale. Les dégâts causés par les insectes sont actuellement sous contrôle, par suite de l'extrême sécheresse. Les pâturages sont assez secs, et l'on s'attend à ce que les rendements des cultures de foins soient peu importants. À Claresholm, le temps chaud et sec a endommagé les cultures et les pâtures, et même avec de la pluie, des récoltes de ce district seront bien en-dessous de la moyenne. Le blé d'hiver et le seigle sont en train de mûrir, et l'andainage commencera dans une semaine. Toutes les céréales ont épié, et le lin est en fleur.

Près de Vulcan, les cultures se détériorent en raison du manque d'humidité dans le centre sud de la province. Bien qu'il ait plu dans la région cette semaine, la situation est telle que tout espoir d'une récolte raisonnable sur chaume s'affaiblit. Les pâturages sont dans un tel état que si la situation ne s'améliore pas, on devra vendre du bétail. L'andainage du seigle d'automne commencera la semaine prochaine.

Dans le nord-est-central du district, près de Sedgewick, les cultures continuent de bien pousser et 80 % du blé est en épis; la plus grande partie du colza est en fleur. Le rendement des prairies artificielles est bon et, pour l'instant, toutes les cultures s'annoncent très bien. Les grands vents de la semaine dernière dans le district de Vermilion ont aidé les cultures à se rétablir des inondations de la semaine précédente. L'état de toutes les cultures est très bon, sauf dans les terres basses où il y a eu inondation excessive. Certaines cultures autres que celle du blé ont commencé à monter en épis et on considère que leur état est moyen pour cette époque de l'année.

Dans la région de Red Deer, on signale que les cultures se portent très bien. Des averses éparses retardent la fenaison et la chenille arpenteuse commence à se manifester dans les champs de colza. Le temps chaud et sec à Lacombe la semaine dernière a grandement favorisé toutes les cultures et, en général, elles sont en épis. La fenaison se poursuit et les perspectives sont bonnes. Pour l'instant, on a suffisamment d'humidité. Le temps idéal à Eckville la semaine dernière a permis de terminer 25 % de la fenaison et les rendements sont de une à deux tonnes à l'acre. Le colza est en pleine floraison; environ 10 % de l'orge est en épis et l'état des jachères est passable. Les cultures sont moyennes bien qu'un peu en retard pour cette époque de l'année.

Dans la région de Peace River, près de Beaverlodge, les cultures ont besoin d'eau. On ne signale pas encore la présence de la légionnaire bertha. On signale que l'ocelle envahit la tige des plantes dans certains vieux champs de fétuque. La fenaison se poursuit et on connait des températures fraîches. Près de Peace River, le colza est en pleine floraison et il n'y a envahissement des insectes qu'en certains endroits. Les cultures de blé et d'orge sont en épis; en raison des pluies persistantes les champs sont mouillés et 5 % de la culture a été noyé. L'humidité excessive a entravé le travail des abeilles; par conséquent, aucune graine fourragère ne prend racine. La fenaison se poursuit avec du mal et le temps frais incessant aura d'assez lourdes conséquences; avec de la chaleur, on aurait des récoltes sans prédédent.

L'Alberta Hail and Crops Insurance Corporation ne signale qu'une tempête importante, le 10 juillet, qui a causé de gros dégâts dans la région au nord-ouest de Beaverlodge, à La Glace, Wanham et Eaglesham.

La moyenne non pondérée des précipitations dans la province depuis le 1er avril a été de 9 % supérieure à la normale, contre 17 % au-dessus de la normale, il y a une semaine, 25 % au-dessus de la normale, il y a deux semaines, et 1 % au-dessous de la normale il y a un an. La température moyenne au cours de la semaine terminée le 16 juillet 1973 a été de 2.0 degrés F. au-dessous de la normale, contre 3.1 degrés au-dessous de la normale il y a une semaine, 2.6 degrés au-dessous de la normale il y a deux semaines, et 4.7 degrés au-dessous de la normale pour la semaine terminé le 17 juillet 1972.

## COLOMBIE-BRITANNIQUE

À Victoria, dans l'île Vancouver, on signale que les conditions de sécheresse sont extrêmes; seulement deux pouces de pluie sont tombés depuis le 1er mai et le temps chaud s'est maintenu la semaine dernière. Lorsque c'est possible, on continue d'irriguer fortement. On prévoit qu'il n'y aura pas suffisamment de foin. Les perspectives de récolte de pommes sont bonnes et on fait actuellement une récolte moyenne de cerises. On a terminé la cueillette des fraises tandis que la sécheresse a quelque peu réduit les cultures de framboises et de mûres de Logan. La culture des tomates de serre et des concombres a rapporté un bon prix et on ensemence actuellement les cultures d'automne de ces deux légumes.

Près d'Agassiz dans la vallée inférieure de la Fraser, la cueillette des fraises de conserverie s'est terminée le 14 juillet. On prévoit que la semaine du 15 juillet sera la meilleure pour la récolte des framboises; les premières indications portent à croire que la taille et la qualité des fruits seront excellentes et que la pourriture et les inscctes ne causeront que fort peu de problèmes. La saison a été idéale pour la laitue et le chouxfleur; les approvisionnements sont donc suffisants et de bonne qualité. On prévoit que les expéditions de laitue aux Prairies diminueront à

mesure que les légumes locaux apparaîtront. Les haricots, le maïs et les concombres ont profité de la chaleur de la semaine dernière. On prévoit une première récolte de céleri vers le 16 juillet. La culture de l'avoine s'annonce exceptionnellement prometteuse et les perspective des cultures fourragères raisonnablement bonnes. La chenille arpenteuse de luzerne a causé des dommages un peu partout, quoiqu'à échelle réduite, au maïs d'ensilage. La culture des cerises sûres ne sera pas aussi bonne que prévu en raison de son envahissement par la pourriture brune.

Vernon, dans la région du nord, à Okanagan, signale qu'elle connait la saison de croissance la plus sèche de son histoire. Tandis que le blé d'automne et les céréales de printemps mûrissent, on prévoit que les rendements n'atteindent que 75 % de la normale. La première récolte de foin n'a pas été abondante et la deuxième sera très peu abondante et très courte. On constate que le maïs pousse rapidement et que les pâturages sont secs sauf où ils sont irrigués.

Près de Kamloops, dans le sud de la région de Cariboo, on a connu du temps chaud et très sec. À Intérior, la production de foin sera réduite de 30 à 40 % en raison des dégâts causés par l'hiver. Le maïs d'ensilage se décide enfin à pousser mais ne mûrira qu'en retard. La culture de pommes de terre hâtive s'annonce bonne.

La fenaison vient tout juste de commencer dans la région de Prince George dans le centre intérieur depuis le début du temps chaud et sec. À la suite d'un printemps frais et mouillé et d'un été hâtif, on prévoit que les rendements seront inférieurs à la normale.

Dans la région de Smithers, dans la région de Skeena River, le temps s'est considérablement amélioré; les conditions de fenaison sont donc idéales. Par conséquent, on procède partout à l'ensilage et à la fenaison; les cultures de première, deuxième et troisième années sont les meilleures. On a légèrement réduit les effets de la basse température en étendant davantage d'engrais. Le prix du foin est déjà supérieur à la normale. On signale que certaines pousses de légumineuses ont été décimées par la légionnaire et que la luzerne a souffert des dégâts causés par l'hiver.

Les conditions atmosphériques demeurent favorables à la croissance des cultures dans la plupart des régions autour de Dawson Creek dans la région de la Rivière la Paix. La chaleur nécessaire à la pousse ininterrompue des céréales et des fourrages s'est maintenue. Toutefois, l'humidité est limitée dans certaines régions. On signale qu'on récolte actuellement les cultures fourragères. La croissance des céréales varie beaucoup et on signale que le blé semé tôt et l'orge montent en épis. Si ces conditions favorables persistent, on prévoit des rendements au-dessus de la moyenne de ces deux cultures. Une partie du colza est en fleur. Les cultures de semences fourragères progressent bien. Dans certaines régions on signale la présence de l'ocelle de la tige dans des champs de fétuque et on constate qu'il y a un peu plus d'éclatement des bourgeons cette année.

À Fort St John, les cultures poussent bien, bien que l'on ait besoin de chaleur pour hâter la maturation. Les conditions hygrométriques du sol sont considérées comme suffisantes. On signale que la fenaison est déjà avancée et on prévoit de très bons rendements. On ne signale qu'un minimum d'envahissement ou de maladies causées par les insectes.

Precipitation and Temperature Data, Prairie Provinces(1)

| Province and crop district | Station | Precipitation: Week ending 8 a.m. July 16, 1973 | Precipitation: Total since April 1 | Precipitation: Normal since April 1 | Mean temperature week ending 8 a.m. July 16: 1973 | Mean temperature week ending 8 a.m. July 16: Normal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | inches | | | degrees F. | |
| MANITOBA | | | | | | |
| 1 | Boissevain | .05 | 9.55 | 8.10 | 64 | 68 |
| | Pierson | .05 | 9.49 | 7.61 | 67 | 68 |
| 2 | Baldur | .05 | 9.29 | 8.14 | 66 | 69 |
| | Pilot Mound | .06 | 8.33 | 7.90 | 65 | 68 |
| 3 | Altona | .38 | 10.54 | 7.28 | 66 | 70 |
| | Deerwood | .18 | 7.05 | 7.84 | 64 | 71 |
| | Graysville | .50 | 8.46 | 7.37 | 67 | 69 |
| | Morden | .05 | 7.56 | 7.91 | 67 | 71 |
| | Morris | .38 | 8.96 | 7.41 | 66 | 71 |
| | Portage la Prairie | .03 | 8.76 | 9.12 | 66 | 71 |
| | Roland | .35 | 7.76 | 7.70 | 65 | 70 |
| 4 | Stonewall | .06 | 8.18 | 8.16 | 64 | 69 |
| 5 | Emerson | .16 | 8.99 | 7.54 | 67 | 69 |
| | Steinbach | .30 | 7.21 | 7.74 | 62 | 69 |
| | Winnipeg | .39 | 11.18 | 7.76 | 65 | 69 |
| | Starbuck | .05 | 11.21 | 7.71 | 65 | 69 |
| 6 | Pinawa | .03 | 12.00 | 4.73 | 65 | 69 |
| | Great Falls | .21 | 6.33(2) | 5.94 | 66 | 69 |
| | Sprague | 1.53 | 7.60 | 8.16 | 64 | 66 |
| 7 | Virden | trace | 6.30 | 7.65 | 66 | 69 |
| 8 | Brandon | .02 | 7.27 | 8.20 | 66 | 68 |
| | Cypress River | .08 | 11.14 | 7.92 | 66 | 69 |
| 9 | Gladstone | .20 | 6.29 | 8.21 | N.R. | 68 |
| 10 | Birtle | .24 | 6.47 | 7.98 | 60 | 66 |
| | Rossburn | .17 | 7.05 | 7.42 | 64 | 66 |
| | Russell | .25 | 7.13 | 6.63 | 65 | 66 |
| 11 | Dauphin | .37 | 8.33 | 8.11 | 66 | 68 |
| 12 | Arborg | .30 | 9.16 | 7.78 | 63 | 67 |
| | Gimli | .07 | 10.16 | 7.85 | 65 | 69 |
| 13 | Swan River | .31 | 8.88 | 7.34 | 66 | 66 |
| | Pasquia | .29 | 8.52 | N.R. | 62 | N.R. |
| | The Pas | .49 | 8.50 | 6.35 | 64 | 66 |
| | Thompson | 1.40 | 6.45 | 7.71 | 60 | 60 |
| 14 | Grass River | N.R. | 7.58(2) | 8.18 | N.R. | 67 |
| MANITOBA AVERAGE | | .27 | 8.56 | 7.62 | 64.8 | 68.2 |

For footnotes, see page IV.

Precipitation and Temperature Data, Prairie Provinces(1)

| Province and crop district | Station | Precipitation: Week ending 8 a.m. July 16, 1973 | Precipitation: Total since April 1 | Precipitation: Normal since April 1 | Mean temperature week ending 8 a.m. July 16: 1973 | Mean temperature: Normal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | inches | | | degrees F. | |
| SASKATCHEWAN | | | | | | |
| 1A | Carlyle | .10 | 7.51 | 7.05 | 65 | 67 |
| | Estevan | nil | 5.69 | 7.32 | 69 | 69 |
| | Oxbow | nil | 7.12 | 6.81 | 63 | 66 |
| | Wilmar | nil | 5.85 | 7.68 | N.R. | 66 |
| 1B | Broadview | .03 | 8.25 | 7.89 | 65 | 66 |
| | Moosomin | trace | 9.36 | 7.96 | 65 | 68 |
| 2A | Yellow Grass | nil | 7.31 | 7.01 | 68 | 67 |
| | Weyburn | nil | 5.72 | 6.93 | 65 | 66 |
| | Midale | nil | 4.92 | 6.83 | 66 | 68 |
| | Amulet | nil | 8.18 | 7.26 | 69 | 69 |
| 2B | Moose Jaw | trace | 7.53 | 6.63 | 70 | 68 |
| | Regina | trace | 7.66 | 6.92 | 68 | 66 |
| | Francis | N.R. | 5.65(2) | 6.49 | N.R. | 66 |
| | Indian Head | .02 | 12.96 | 6.73 | 66 | 66 |
| 3AS | Ormiston | N.R. | 7.10(2) | 7.31 | N.R. | 68 |
| | Cardross | nil | 7.05 | 7.16 | 68 | 68 |
| | Rock Glen | nil | 8.87 | 7.21 | 68 | 66 |
| 3AN | Gravelbourg | N.R. | 6.20(2) | 6.02 | N.R. | 68 |
| | Coderre | trace | 9.89 | 6.94 | 66 | 67 |
| | Chaplin | trace | 7.34 | 5.47 | 68 | 67 |
| 3BS | Shaunavon | nil | 5.82 | 6.26 | 72 | 67 |
| | Aneroid | nil | 5.53 | 5.93 | 67 | 67 |
| | Instow | nil | 3.38 | 6.47 | 67 | 67 |
| 3BN | Swift Current | trace | 4.77 | 6.85 | 68 | 68 |
| | Pennant | nil | 3.21 | 6.46 | 68 | 68 |
| | Hodgeville | N.R. | 4.16(2) | 6.66 | N.R. | 67 |
| | Hughton | .14 | 4.03(2) | 5.67 | 68 | 68 |
| 4A | Maple Creek | nil | 4.82 | 5.87 | 74 | 69 |
| | Consul | nil | 3.07 | 4.91 | 65 | 66 |
| 4B | Abbey | N.R. | 3.16(2) | 5.94 | N.R. | 68 |
| | Leader | .09 | 7.02 | 5.54 | 65 | 69 |
| 5A | Cupar | nil | 9.41 | 6.65 | 65 | 68 |
| | Balcarres | N.R. | 8.62(2) | 6.88 | N.R. | 66 |
| | Lipton | trace | 11.34 | 6.13 | 65 | 66 |
| | Yorkton | .15 | 10.39 | 6.88 | 66 | 66 |
| | Bangor | N.R. | 10.69(2) | 7.57 | N.R. | 66 |
| 5B | Wynyard | .20 | 12.58 | 6.62 | 65 | 65 |
| | Foam Lake | .27 | 11.76 | 6.73 | 61 | 66 |
| | Kuroki | .55 | 13.62 | 7.04 | 62 | 65 |
| | Kamsack, Cote | .69 | 10.77 | 6.44 | 63 | 66 |
| 6A | Davidson | .10 | 8.08 | 6.75 | 63 | 66 |
| | Strasbourg | .02 | 9.15 | 9.24 | 68 | 66 |
| | Watrous | .09 | 10.77(2) | 6.24 | 65 | 67 |

For footnotes, see page IV.

Precipitation and Temperature Data, Prairie Provinces(1)

| Province and crop district | Station | Precipitation: Week ending 8 a.m. July 16, 1973 | Precipitation: Total since April 1 | Precipitation: Normal since April 1 | Mean temperature week ending 8 a.m. July 16: 1973 | Mean temperature week ending 8 a.m. July 16: Normal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | inches | | | degrees F. | |
| SASKATCHEWAN — concluded | | | | | | |
| 6A | Liberty | .02 | 7.51 | 6.75 | 67 | N.R. |
| 6B | Harris | .28 | 7.39(2) | 5.68 | 67 | 68 |
| | Outlook | .16 | 7.30 | 5.54 | 66 | 69 |
| | Saskatoon | .06 | 8.24 | 5.38 | 66 | 68 |
| | Elbow | nil | 3.74 | 6.56 | 68 | 67 |
| | Tugaske | .07 | 7.85 | 7.00 | 68 | 67 |
| | Dundurn | .21 | 6.60 | 5.65 | 64 | 68 |
| 7A | Kindersley | .35 | 6.66 | 4.85 | 67 | 67 |
| | Rosetown | .10 | 6.07 | 5.87 | 68 | 67 |
| 7B | Macklin | nil | 7.82 | 5.49 | 64 | 66 |
| | Denzil | N.R. | 7.12(2) | 5.62 | N.R. | 66 |
| | Scott | nil | 4.96 | 5.80 | 60 | 65 |
| | Biggar | .03 | 5.99 | 5.76 | 66 | 67 |
| 8A | Hudson Bay | .34 | 8.28 | 6.94 | 63 | 65 |
| | Prairie River | .43 | 14.15 | 7.34 | 62 | 65 |
| 8B | Humboldt | .38 | 11.86 | 5.97 | 64 | 65 |
| | Melfort | .35 | 12.74 | 6.44 | 62 | 66 |
| 9A | North Battleford | trace | 5.76 | 5.57 | 66 | 67 |
| | Victoire | N.R. | 10.36(2) | 6.17 | N.R. | 63 |
| | Prince Albert | .23 | 11.47 | 6.08 | 62 | 66 |
| 9B | Meadow Lake | .83 | 12.63 | 6.46 | 64 | 62 |
| | Waseca | N.R. | 8.36(2) | 6.30 | N.R. | 64 |
| SASKATCHEWAN AVERAGE | | .11 | 7.99 | 6.50 | 65.9 | 66.7 |
| ALBERTA | | | | | | |
| 1 | Empress | .20 | 4.74 | 5.49 | 66 | 68 |
| | Foremost | nil | 4.07 | 6.03 | 68 | 68 |
| | Manyberries | nil | 3.85 | 5.74 | 69 | 69 |
| | Medicine Hat | trace | 6.69 | 5.65 | 70 | 70 |
| 2 | Brooks | .05 | 7.18 | 5.50 | 67 | 68 |
| | Gleichen | .04 | 5.15 | 6.86 | 65 | 66 |
| | Vauxhall | nil | 4.67 | 5.41 | 68 | 67 |
| | Raymond | nil | 2.99(2) | 6.63 | 66 | 67 |
| | Lethbridge | nil | 4.20 | 7.15 | 69 | 67 |
| | Trochu | .02 | 6.85(2) | 6.57 | N.R. | 65 |
| | Queenstown | nil | 6.41 | 7.29 | 66 | 66 |

For footnotes, see page IV.

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA
1010523904



Precipitation and Temperature Data, Prairie Provinces(1)

| Province and crop district | Station | Precipitation: Week ending 8 a.m. July 16, 1973 | Precipitation: Total since April 1 | Precipitation: Normal since April 1 | Mean temperature week ending 8 a.m. July 16: 1973 | Mean temperature: Normal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | inches | | | degrees F. | |
| ALBERTA — concluded | | | | | | |
| 3 | Calgary | .03 | 6.38 | 8.03 | 64 | 64 |
| | Cardston | nil | 4.41 | 8.29 | 67 | 65 |
| | Pincher Creek | nil | 4.97 | 8.86 | 67 | 64 |
| | Fort MacLeod | nil | 4.58 | 8.16 | 67 | 68 |
| | Claresholm | nil | 3.72(2) | N.R. | 67 | N.R. |
| | High River | nil | 6.13 | 8.92 | 63 | 62 |
| | Olds | nil | 8.19 | 8.40 | 61 | 62 |
| 4 | Alliance | .12 | 10.28 | 5.99 | 64 | 65 |
| | Coronation | .24 | 10.82 | 5.59 | 64 | 64 |
| | Hughenden | .02 | 10.22 | 6.00 | 64 | 65 |
| | Lloydminster | .04 | 7.95 | 5.84 | 64 | 65 |
| | Stettler | .50 | 11.07 | 6.81 | 62 | 64 |
| | Vegreville | .06 | 8.23 | 6.23 | 61 | 64 |
| | Kanfurly | .11 | 10.12 | 6.65 | 62 | 64 |
| | Vermilion | .02 | 10.18 | 5.82 | 63 | 63 |
| 5 | Edmonton | .35 | 10.78 | 7.83 | 61 | 64 |
| | Lacombe | .19 | 9.75 | 8.46 | 60 | 63 |
| | Red Deer | nil | 7.99 | 9.51 | 60 | 63 |
| | Rocky Mountain House | .10 | 8.03 | 9.26 | 61 | 61 |
| | Wetaskiwin | .01 | 13.18 | 7.84 | 63 | 64 |
| 6 | Campsie | .01 | 10.18 | 7.84 | 61 | 61 |
| | Yellowknife | .20 | 1.69 | 2.54 | 64 | 61 |
| | Edson | trace | 6.17 | 8.64 | 58 | 59 |
| | Elk Point | .20 | 6.31 | 6.68 | 63 | 63 |
| | Whitecourt | .23 | 11.44 | 7.92 | 60 | 61 |
| 7 | Beaverlodge | .10 | 3.00 | 5.94 | 58 | 61 |
| | Chipewyan | 2.22 | 6.32 | 4.14 | 63 | 63 |
| | Ft. Vermilion | N.R. | .71(2) | 4.85 | N.R. | 62 |
| | Grande Prairie | .16 | 3.98 | 6.01 | 60 | 61 |
| | High Prairie | N.R. | 8.13(2) | 6.73 | N.R. | 61 |
| | Peace River | .39 | 7.82 | 4.89 | 59 | 61 |
| | Slave Lake | .21 | 11.29 | 5.93 | 60 | 62 |
| ALBERTA AVERAGE | | .14 | 7.33 | 6.74 | 62.1 | 64.1 |

(1) Source: Atmospheric Environment Service.
(2) Incomplete; not included in average.
N.R. No report.