

Tuberculosis statistics


Morbidity and mortality


1973

La statistique de la tuberculose

Morbidité et mortalité

1973





STATISTICS CANADA — STATISTIQUE CANADA
Health Division — Division de la santé
Epidemiology Section — Section de l'épidémiologie

TUBERCULOSIS STATISTICS

Morbidity and Mortality

LA STATISTIQUE DE LA TUBERCULOSE

Morbidité et mortalité

1973

Formerly Catalogue 83-206

Auparavant n° 83-206 au catalogue

Published by Authority of
The Minister of Industry, Trade and Commerce

Publication autorisée par
le ministre de l'Industrie et du Commerce

March - 1975 - Mars
4-2304-536

Price—Prix: \$2.10

Statistics Canada should be credited when republishing all or any part of this document
Reproduction autorisée sous réserve d'indication de la source: Statistique Canada

Information Canada
Ottawa




TABLE OF CONTENTS

	Page
Explanatory Comments and Notes	7
Definitions	10
Estimated Population for Canada and the Provinces, by Age Group and Sex, June 1, 1973	12
Estimated Population for Canada, by Age Group and Sex, December 31, 1973	13
Summary Statistics, 1973	16
 Table	
Notifications of New Active and Reactivated Cases of Tuberculosis, 1973	
1 A. Comparison—New Active and Reactivated Cases by Province, 1973	20
1 B. Comparison—New Active and Reactivated Cases by Age Group, 1973	20
1 C. Comparison—New Active and Reactivated Cases by Diagnosis, 1973	21
1 D. Comparison—New Active and Reactivated Cases by Origin, 1973	21
2 A. Summary Statistics—New Active Cases by Sex and Province, 1973	22
2 B. Summary Statistics—New Active Cases by Sex and Age Group, 1973	22
2 C. Summary Statistics—New Active Cases by Sex and Diagnosis, 1973	23
2 D. Summary Statistics—New Active Cases by Sex and Origin, 1973	23
3. New Active Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Province, 1973	24
4. New Active Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Age Group, 1973	28
5. New Active Cases and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Province, 1973	32
6. New Active Cases and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Diagnosis, 1973	34
7. New Active Cases and Rate per 100,000 Population by Diagnosis, Sex and Province, 1973	36
8. New Active Pulmonary Cases and Percentage Distribution by Previous History and Province, Age, Origin and Sex, 1973	38
9. New Active Cases and Percentage Distribution by Origin, Sex and Province, 1973	40
10. New Active Cases and Percentage Distribution by Origin and Age Group, 1973	41
11. New Active Cases and Percentage Distribution by Diagnosis and Origin, 1973	41
12. New Active Cases, Bacillary Status by Province, 1973	42
13. New Active Cases, Bacillary Status, by Diagnosis and by Origin, 1973	43
14. New Active Cases and Percentage Distribution by Origin and Method of Determination of Bacillary Status, by Province, 1973	44
15. New Active Cases and Percentage Distribution by Diagnosis and Method of Determination of Bacillary Status, by Province, 1973	46
16. New Active Cases by Number Testing Positive Bacillary, Diagnosis and Province, 1973	48
17. New Active Cases by Number Testing Positive Bacillary, Origin and Province, 1973	49
 Reactivated Cases	
18 A. Summary Statistics—Reactivated Cases by Sex and Province, 1973	52
18 B. Summary Statistics—Reactivated Cases by Sex and Age Group, 1973	52
18 C. Summary Statistics—Reactivated Cases by Sex and Diagnosis, 1973	53
18 D. Summary Statistics—Reactivated Cases by Sex and Origin, 1973	53

TABLE DES MATIÈRES

	Page
Commentaires et notes	7
Définitions	10
Population estimée, selon le Canada et les provinces, le groupe d'âge et le sexe, 1er juin 1973	12
Population estimée, selon le Canada et les provinces, le groupe d'âge et le sexe, 31 décembre 1973	13
Sommaire des statistiques, 1973	16
 Tableau	
Déclarations de nouveaux cas actifs et réactivés de tuberculose, 1973	
1 A. Comparaison—Nouveaux cas actifs et réactivés suivant la province, 1973	20
1 B. Comparaison—Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le groupe d'âge, 1973	20
1 C. Comparaison—Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic, 1973	21
1 D. Comparaison—Nouveaux cas actifs et réactivés suivant l'origine, 1973	21
2 A. Sommaire des statistiques—Nouveaux cas actifs suivant le sexe et la province, 1973	22
2 B. Sommaire des statistiques—Nouveaux cas actifs suivant le sexe et le groupe d'âge, 1973	22
2 C. Sommaire des statistiques—Nouveaux cas actifs suivant le sexe et le diagnostic, 1973	23
2 D. Sommaire des statistiques—Nouveaux cas actifs suivant le sexe et l'origine, 1973	23
3. Nouveaux cas actifs suivant le diagnostic détaillé, le sexe et la province, 1973	24
4. Nouveaux cas actifs suivant le diagnostic détaillé, le sexe et le groupe d'âge, 1973	28
5. Nouveaux cas actifs et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et la province, 1973	32
6. Nouveaux cas actifs et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et le diagnostic, 1973	34
7. Nouveaux cas actifs et taux pour 100,000 habitants suivant le diagnostic, le sexe et la province, 1973	36
8. Nouveaux cas actifs pulmonaires et répartition procentuelle suivant les antécédents et la province, l'âge, l'origine et le sexe, 1973	38
9. Nouveaux cas actifs et répartition procentuelle suivant l'origine, le sexe et la province, 1973	40
10. Nouveaux cas actifs et répartition procentuelle suivant l'origine et le groupe d'âge, 1973	41
11. Nouveaux cas actifs et répartition procentuelle suivant le diagnostic et l'origine, 1973	41
12. Nouveaux cas actifs, état bacillaire par province, 1973	42
13. Nouveaux cas actifs, état bacillaire, par le diagnostic et par l'origine, 1973	43
14. Nouveaux cas actifs et répartition procentuelle suivant l'origine et la méthode de détermination d'état bacillaire, selon la province, 1973	44
15. Nouveaux cas actifs et répartition procentuelle suivant le diagnostic et la méthode de détermination, selon la province, 1973	46
16. Nouveaux cas actifs suivant le nombre à bacilles positifs, le diagnostic et la province, 1973	48
17. Nouveaux cas actifs suivant le nombre à bacilles positifs, l'origine et la province, 1973	49
 Cas réactivés	
18 A. Sommaire des statistiques—Cas réactivés suivant le sexe et la province, 1973	52
18 B. Sommaire des statistiques—Cas réactivés suivant le sexe et le groupe d'âge, 1973	52
18 C. Sommaire des statistiques—Cas réactivés suivant le sexe et le diagnostic, 1973	53
18 D. Sommaire des statistiques—Cas réactivés suivant le sexe et l'origine, 1973	53

TABLE OF CONTENTS – Continued

Table	Page
Reactivated Cases – Concluded	
19. Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Province, 1973	54
20. Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Diagnosis, 1973	58
21. Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Province, 1973	60
22. Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Diagnosis, Sex and Province, 1973	62
23. Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin, Sex and Province, 1973	64
24. Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Age Group, 1973	65
25. Reactivated Cases and Percentage Distribution by Diagnosis and Origin, 1973	65
26. Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary, Diagnosis and Province, 1973	66
27. Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary, Origin and Province, 1973	67
28. Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Method of Determination of Bacillary Status, by Province, 1973	68
29. Reactivated Cases and Percentage Distribution by Diagnosis and Method of Determination of Bacillary Status, by Province, 1973	70
30. Reactivated Cases by Length of Inactive Interval and Province, 1973	72
31. Notifications of Reactivated Cases by Origin, Sex and Province, 1973	72
 Patients under Treatment for Tuberculosis, December 31, 1973	
32. All Patients under Treatment for Tuberculosis and Rate per 100,000 Population, by Patient Status and Province, December 31, 1973	74
33 A. Summary Statistics – All Patients under Treatment for Tuberculosis by Sex and Province, December 31, 1973	74
33 B. Summary Statistics – All Patients under Treatment for Tuberculosis by Sex and Age Group, December 31, 1973	75
33 C. Summary Statistics – All Patients under Treatment for Tuberculosis by Sex and Diagnosis, December 31, 1973	75
33 D. Summary Statistics – All Patients under Treatment for Tuberculosis by Sex and Origin, December 31, 1973	75
34. All Patients under Treatment for Tuberculosis and Rate per 100,000 Population by Patient Status, Sex and Province, December 31, 1973	76
35. All Patients under Treatment for Tuberculosis and Rate per 100,000 Population by Patient Status, Sex and Age Group, December 31, 1973	76
36. All Patients under Treatment for Tuberculosis and Rate per 100,000 Population by Patient Status, Sex and Diagnosis, December 31, 1973	77
37. All Patients under Treatment for Tuberculosis and Percentage Distribution by Patient Status, Sex and Origin, December 31, 1973	77
38. All Patients under Treatment for Tuberculosis by Detailed Diagnosis, Sex and Province, December 31, 1973	78
39. Inpatients under Treatment for Tuberculosis by Detailed Diagnosis, Sex and Province, December 31, 1973	82
40. Outpatients under Drug Treatment for Tuberculosis by Detailed Diagnosis, Sex and Province, December 31, 1973	86
41. All Patients under Treatment for Tuberculosis and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Province, December 31, 1973	90

TABLE DES MATIÈRES – suite

Tableau	Page
Cas réactivés – fin	
19. Cas réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe et la province, 1973	54
20. Cas réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et le diagnostic, 1973	58
21. Cas réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et la province, 1973	60
22. Cas réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le diagnostic, le sexe et la province, 1973	62
23. Cas réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine, le sexe et la province, 1973	64
24. Cas réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine et le groupe d'âge, 1973	65
25. Cas réactivés et répartition procentuelle suivant le diagnostic et l'origine, 1973	65
26. Cas réactivés suivant le nombre de bacillaire positif, le diagnostic et la province, 1973	66
27. Cas réactivés suivant le nombre de bacillaire positif, l'origine et la province, 1973	67
28. Cas réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine et la méthode de détermination d'état bacillaire, selon la province, 1973	68
29. Cas réactivés et répartition procentuelle suivant le diagnostic et la méthode de détermination, selon la province, 1973	70
30. Cas réactivés suivant l'intervalle inactif et la province, 1973	72
31. Déclarations des cas réactivés suivant l'origine, le sexe et la province, 1973	72
 Patients recevant un traitement pour la tuberculose, 31 décembre, 1973	
32. Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose et taux pour 100,000 habitants suivant l'état du patient et la province, 31 décembre, 1973	74
33 A. Sommaire des statistiques – Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose suivant le sexe et la province, 31 décembre, 1973	74
33 B. Sommaire des statistiques – Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose suivant le sexe et le groupe d'âge, 31 décembre, 1973	75
33 C. Sommaire des statistiques – Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose suivant le sexe et le diagnostic, 31 décembre, 1973	75
33 D. Sommaire des statistiques – Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose suivant le sexe et l'origine, 31 décembre, 1973	75
34. Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose et taux pour 100,000 habitants suivant l'état du patient, le sexe et la province, 31 décembre, 1973	76
35. Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose et taux pour 100,000 habitants suivant l'état du patient, le sexe et le groupe d'âge, 31 décembre, 1973	76
36. Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose et taux pour 100,000 habitants suivant l'état du patient, le sexe et le diagnostic, 31 décembre, 1973	77
37. Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose et répartition procentuelle suivant l'état du patient, le sexe et l'origine, 31 décembre, 1973	77
38. Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose suivant le diagnostic détaillé, le sexe et la province, 31 décembre, 1973	78
39. Patients hospitalisés recevant un traitement pour la tuberculose suivant le diagnostic détaillé, le sexe et la province, 31 décembre, 1973	82
40. Patients hors de l'hôpital traités par médication pour la tuberculose suivant le diagnostic détaillé, le sexe et la province, 31 décembre, 1973	86
41. Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et la province, 31 décembre, 1973	90

TABLE OF CONTENTS — Concluded

Table		Page
Patients under Treatment for Tuberculosis, December 31, 1973 — Concluded		
42.	Inpatients under Treatment for Tuberculosis and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Province, December 31, 1973	92
43.	Outpatients under Drug Treatment for Tuberculosis and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Province, December 31, 1973	94
44.	All Patients under Treatment for Tuberculosis and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Diagnosis, December 31, 1973	96
45.	Inpatients under Treatment for Tuberculosis and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Diagnosis, December 31, 1973	98
46.	Outpatients under Treatment for Tuberculosis and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Diagnosis, December 31, 1973	100
47.	Reason for Outpatient Drug Treatment and Percentage Distribution by Sex and Province, December 31, 1973	102
48.	Reason for Outpatient Drug Treatment and Percentage Distribution by Sex and Age Group, December 31, 1973	102
49.	Reason for Outpatient Drug Treatment and Percentage Distribution by Sex and Diagnosis, December 31, 1973	103
50.	Reason for Outpatient Drug Treatment and Percentage Distribution by Sex and Origin, December 31, 1973	103
51.	All Patients under Treatment for Tuberculosis and Percentage Distribution by Origin, Sex and Age Group, December 31, 1973	104
52.	All Patients under Treatment for Tuberculosis and Percentage Distribution by Origin, Sex and Diagnosis, December 31, 1973	105
Deaths from Tuberculosis		
53.	Deaths from All Forms of Tuberculosis and Rate per 100,000 Population by Year and Province, 1940-1973	108
54.	Deaths from Respiratory Tuberculosis and Rate per 100,000 Population by Year and Province, 1940-1973	109
55.	Deaths from All Forms of Tuberculosis by Age at Death and Age Specific Death Rate per 100,000 Population, 1940-1973	110
Anti-tuberculosis Activities		
56 A.	Persons Receiving Preventive Outpatient Drug Treatment and Percentage Distribution by Reason for Treatment and Province, December 31, 1973	114
56 B.	Persons Receiving Preventive Outpatient Drug Treatment and Percentage Distribution by Reason for Treatment and Age Group, December 31, 1973	114
56 C.	Persons Receiving Preventive Outpatient Drug Treatment and Percentage Distribution by Reason for Treatment and Origin, December 31, 1973	114
57.	Persons Receiving BCG Vaccinations by Province, 1973	116
Tuberculosis in Immigrants		
58 A.	New Active and Reactivated Cases of Tuberculosis reported in 1973 in Immigrants by Place of Birth and Province of Residence	118
58 B.	New Active and Reactivated Cases of Tuberculosis reported in 1973 in Immigrants by Place of Birth and Year of Immigration	118

TABLE DES MATIÈRES — fin

Tableau		Page
Patients recevant un traitement pour la tuberculose, 31 décembre, 1973 — fin		
42.	Patients hospitalisés recevant un traitement pour la tuberculose et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et la province, 31 décembre, 1973	92
43.	Patients hors de l'hôpital traités par médication pour la tuberculose et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et la province, 31 décembre, 1973	94
44.	Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et le diagnostic, 31 décembre, 1973	96
45.	Patients hospitalisés recevant un traitement pour la tuberculose et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et le diagnostic, 31 décembre, 1973	98
46.	Patients hors de l'hôpital traités par médication pour la tuberculose et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et le diagnostic, 31 décembre, 1973	100
47.	Raison du traitement par médication hors de l'hôpital et répartition procentuelle suivant le sexe et la province, 31 décembre, 1973	102
48.	Raison du traitement par médication hors de l'hôpital et répartition procentuelle suivant le sexe et le groupe d'âge, 31 décembre, 1973	102
49.	Raison du traitement par médication hors de l'hôpital et répartition procentuelle suivant le sexe et le diagnostic, 31 décembre, 1973	103
50.	Raison du traitement par médication hors de l'hôpital et répartition procentuelle suivant le sexe et l'origine, 31 décembre, 1973	103
51.	Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose et répartition procentuelle suivant l'origine, le sexe et le groupe d'âge, 31 décembre, 1973	104
52.	Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose et répartition procentuelle suivant l'origine, le sexe et le diagnostic, 31 décembre, 1973	105
Décès dus à la tuberculose		
53.	Décès dus à toutes formes de la tuberculose et taux pour 100,000 habitants suivant l'année et la province, 1940-1973	108
54.	Décès dus à la tuberculose de l'appareil respiratoire et taux pour 100,000 habitants suivant l'année et la province, 1940-1973	109
55.	Décès dus à toutes formes de la tuberculose suivant l'âge au décès et taux de mortalité pour 100,000 habitants spécifiés par l'âge, 1940-1973	110
Activités pour combattre la tuberculose		
56 A.	Personnes recevant un traitement préventif par médication hors de l'hôpital et répartition procentuelle suivant la raison du traitement et la province, 31 décembre, 1973	114
56 B.	Personnes recevant un traitement préventif par médication hors de l'hôpital et répartition procentuelle suivant la raison du traitement et le groupe d'âge, 31 décembre, 1973	114
56 C.	Personnes recevant un traitement préventif par médication hors de l'hôpital et répartition procentuelle suivant la raison du traitement et l'origine, 31 décembre, 1973	114
57.	Personnes recevant des vaccinations par le B.C.G. suivant la province, 1973	116
Tuberculose chez les immigrants		
58 A.	Nouveaux cas actifs et réactivés de tuberculose rapportés en 1973 chez les immigrants suivant le lieu de naissance et la province de résidence	118
58 B.	Nouveaux cas actifs et réactivés de tuberculose rapportés en 1973 chez les immigrants suivant le lieu de naissance et l'année d'immigration	118

SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- ... figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- p preliminary figures.
- r revised figures.

SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- p nombres provisoires.
- r nombres rectifiés.

EXPLANATORY COMMENTS AND NOTES

This is the thirty-seventh annual report on tuberculosis morbidity in Canada. The data are derived from records of provincial tuberculosis case registries and the tuberculosis clinics, sanatoria and units, which made up the systems of tuberculosis control in the various provinces and territories of Canada. This report was prepared in the Epidemiology Section of the Health Division.¹

The change in content and method of presentation introduced in the 1966 issue of Volume I is continued in this issue. Prior to 1966 the reports concentrated largely on describing and analysing the numbers and characteristics of patients hospitalized in tuberculosis institutions. Such analyses did at one time usefully and adequately portray the tuberculosis treatment measures being carried out. First admissions to the institutions also supported the system of notification of new active cases as an indicator of the new cases of tuberculosis discovered in the population. Readmissions to the institutions provided a measure of the proportion of re-activations of tuberculosis in persons previously having been treated for the disease. A census of the in-patients at year end was then the best available indicator of prevalence, a count of numbers of persons having active tuberculosis at a point of time.

Over the years, however, changes in methods of treating tuberculosis have made institutional statistics, by themselves, obsolete as indicators of the treatment measures and the prevalence of tuberculosis in Canada. The discovery and development of new drugs have radically changed the course of treatment of tuberculosis, so that the larger proportion of persons infected with active tuberculosis are now being treated on an outpatient basis. The changing conditions, having thus eroded the completeness of the institutional statistics as indicators of the tuberculosis problem and treatment resources used, made it necessary to put a revised system of reporting into effect, and to change the contents and emphasis of this report.

During 1966 reports were received for the first time on persons receiving drug therapy on an outpatient basis. The reporting forms provide for notification of the commencement and cessation of the drug therapy for tuberculous outpatients. The statistics for outpatients, considered together

COMMENTAIRES ET NOTES

Le présent rapport est le trente-septième rapport annuel sur la morbidité de la tuberculose au Canada. Les données reposent sur les dossiers des registres provinciaux de tuberculose et des cliniques de tuberculose, sanatoriums et quartiers pour tuberculose, qui composent le réseau de contrôle de la tuberculose dans les différentes provinces et territoires du Canada. La Section de l'épidémiologie, Division de la santé, a rédigé le présent rapport¹.

Ce rapport reprend le format et la méthode de présenter les statistiques introduits en 1966. Avant 1966 les rapports consistaient, en grande partie, à décrire et à analyser les nombres et caractéristiques des malades admis aux institutions pour tuberculeux. De telles analyses suffisaient à décrire, de façon adéquate, les mesures de traitement courantes. Les nombres des premières admissions aux institutions appuyaient la technique de l'emploi des déclarations de nouveaux cas comme indice des nouveaux cas de tuberculose découverts dans la population. Les réadmissions aux établissements pour tuberculeux donnaient une mesure de la proportion de cas réactivés de tuberculose chez les malades ayant déjà subi un traitement pour la maladie. Le recensement des malades à l'hôpital, à la fin de l'année, était aussi le meilleur indice de la fréquence, le nombre de personnes souffrant de tuberculose active à un moment donné.

Au cours des années, cependant, les changements apportés à la façon de traiter les tuberculeux ont fait des statistiques basées sur les institutions, par elles-mêmes, des indices désuets des mesures de traitement et de la fréquence de la tuberculose au Canada. La découverte et le développement de nouveaux produits pharmaceutiques ont changé de façon radicale le cours du traitement de la tuberculose, de sorte qu'une plus grande proportion de personnes atteintes de tuberculose active subissent des traitements par médication hors de l'hôpital. L'évolution des mesures de traitements ayant ainsi enlevé aux statistiques institutionnelles leur efficacité en tant qu'indice du problème que pose la tuberculose et des ressources mises à sa disposition, ont rendu inévitable la révision des méthodes de dépistage, et par conséquent ont changé l'orientation de ce rapport.

Pour la première fois en 1966 les cas de personnes recevant des traitements par médication hors de l'hôpital ont été notés. Les formules prévoient la déclaration du début et de la fin d'une période de traitement par médication hors de l'hôpital. Les statistiques sur les malades externes associées aux

¹ Another report, which deals with the personnel services, facilities, and finances of tuberculosis institutions is prepared by the Hospitals Section of the Health Division.

¹ Un autre rapport qui traite du personnel, des services, installations, et finances des hôpitaux pour tuberculeux est préparé par la Section des hôpitaux, Division de la santé.

with the data on inpatients in tuberculosis institutions, now provide a comprehensive view of the treatment services being provided to patients. Inpatient and outpatient records together provide an improved measure of prevalence of tuberculosis, although the data is still somewhat deficient in that it excludes a number of persons who have active tuberculosis but are not receiving treatment. From incomplete information, it is estimated that at any given period in time, about 100 to 200 persons are at home with active tuberculosis and receiving no treatment. The reasons for not receiving treatment include "drug intolerance", "no treatment due to poor renal function", "organisms resistant to drugs patient can take", and "refuses drugs". In addition to information dealing with outpatients on drugs, the 1966 report provided for the first time, information giving numbers and characteristics of those persons receiving preventive or prophylactic outpatient drug treatment.

Future years will see a further expansion of the usefulness of the information as the store of data on individual patients accumulates and record linkage procedures are instituted.

The tables in this report are divided into five main sections dealing with: notifications of new active and reactivated cases of tuberculosis; persons under treatment; deaths; anti-tuberculosis activities; and tuberculosis in immigrants.

Section 1. Notifications of Cases – Tables 1-31

This section contains information on notifications of cases of tuberculosis to Statistics Canada by provincial case registries. These tables describe the numbers and characteristics of the persons who get tuberculosis during the year: persons whose names are first entered on the case register as new active cases of tuberculosis and persons whose disease has been declared inactive but is active once more (reactivated cases). Active is defined according to the definitions contained in the Manual on Diagnostic Standards of the National Tuberculosis Association. "Incidence" is usually considered to be measured by the number of new active cases recorded in a year.

In 1973, there were 4,130 cases of tuberculosis reported by case registries of which 3,563 were new active cases and 567 were reactivated cases. The new active case rate per 100,000 population was 16.1. Rates were higher for males than for females; higher for older persons than for younger persons; higher for the Northwest Territories and Newfoundland than for other areas of Canada; and many times higher for Indians and Eskimos than for other Canadians.

statistiques sur les malades internes dans les institutions pour tuberculeux fournissent une vue d'ensemble des traitements donnés aux malades. Les dossiers des malades internes et externes, ensemble, mesurent mieux la fréquence de la tuberculose, bien que compte n'est pas tenu des personnes qui pourraient souffrir de tuberculose active sans en être soignées. Des renseignements incomplets nous laisseraient supposer qu'à un moment donné, environ 100 à 200 personnes sont à la maison et souffrent de tuberculose active sans recevoir de traitement. Les raisons pour lesquelles ces dernières ne reçoivent aucun traitement sont "intolérance médicamenteuse", "aucun traitement dû à une fonction rénale pauvre", "le malade a des organismes qui résistent au médicament" et "le malade refuse d'être traité". En plus des données sur les malades recevant des médicaments hors de l'hôpital le rapport de 1966 comprenait des informations sur les nombres et caractéristiques des personnes recevant des soins préventifs ou prophylactiques hors de l'hôpital.

Les prochaines années verront une plus grande expansion dans l'emploi de l'information alors que la banque de données sur les malades individuels s'accroîtra et les méthodes de *Record linkage* seront appliquées.

Les tableaux de ce rapport se divisent en cinq parties principales: les déclarations de nouveaux cas actifs et réactivés; les personnes recevant un traitement; la mortalité; les mesures préventives contre la tuberculose; et la tuberculose chez les immigrants.

Section 1. Déclarations de cas – Tableaux 1-31

Cette section contient des informations sur les cas de tuberculose rapportés à Statistique Canada par les registres provinciaux. Ces tableaux décrivent les nombres et caractéristiques des personnes atteintes de tuberculose durant l'année; les personnes qui pour la première fois sont inscrites au registre des malades comme nouveaux cas actifs de tuberculose et les personnes chez qui la maladie ayant été déclarée inactive, est réactivée par la suite; active étant définie selon le Manuel des normes de diagnostic de l'Association nationale de la tuberculose. Le nombre de nouveaux cas actifs déclarés dans une année est habituellement considéré comme la mesure de l'incidence de la maladie.

En 1973, il y avait 4,130 cas de tuberculose déclarés par les registres de tuberculose, parmi lesquels 3,563 étaient des nouveaux cas actifs et 567 étaient des cas réactivés. Le taux de nouveaux cas actifs pour 100,000 habitants était 16.1. Les taux étaient plus élevés chez les hommes que chez les femmes; plus élevés chez les personnes âgées que chez les plus jeunes; plus élevés dans les Territoires du Nord-Ouest et Terre-Neuve, que dans les autres régions du Canada et considérablement plus élevés chez les indiens et les esquimaux que chez les autres canadiens.

**Section 2. Persons under Treatment – Tables
32-52**

The second section of the report deals with persons under treatment for tuberculosis. The number of persons receiving inpatient and outpatient treatment provides a measure of prevalence although, as mentioned above, the data is somewhat deficient in that complete information is not yet available on persons who have active TB and are receiving no treatment. Of particular interest in this second section are the tables showing the extent to which treatment has shifted from inpatient treatment to outpatient treatment. The shift has been smaller for the Indian and Eskimo population with a greater proportion of these patients receiving their treatment as inpatients. This smaller shift and the higher incidence figures for Indians and Eskimos are reflected in the figures which show that Indians and Eskimos comprised 14.2% and 2.2% respectively, of all inpatients but were only 1.4% and 0.1%, respectively, of the total population (1971).

**Section 2. Personnes recevant un traitement – Ta-
bleaux 32-52**

La deuxième partie de ce rapport décrit les personnes recevant un traitement antituberculeux. Le nombre de personnes soignées à l'hôpital et hors de l'hôpital donne une mesure de fréquence quoique, tel que soumissionné, les données sont quelque peu déficientes en ce sens que des renseignements complets ne sont pas encore disponibles pour les personnes atteintes de tuberculose active et ne recevant aucun traitement. D'intérêt particulier dans cette seconde partie sont les tableaux montrant à quel point le traitement des malades externes prédomine sur celui des malades internes. Cette évolution est moins marquée chez les esquimaux et les indiens, ceux-ci recevant une plus grande proportion de leur traitement comme malades internes. Cette plus lente évolution ainsi que l'incidence de la maladie plus élevée chez les indiens et les esquimaux sont démontrées par les chiffres indiquant que les indiens et les esquimaux comptent 14.2 % et 2.2 %, respectivement, des malades à l'hôpital, et seulement 1.4% et 0.1 %, respectivement, de la population totale (1971).

Section 3. Deaths – Tables 53-55

Tables 53-55 illustrate the decrease in the mortality associated with tuberculosis. The rates show that mortality has decreased progressively over the years in all age groups.

Section 3. Mortalité – Tableaux 53-55

Les tableaux 53-55 illustrent la diminution de la mortalité associée à la tuberculose. Les taux indiquent que la mortalité a diminué progressivement durant les années dans tous les groupes d'âge.

**Section 4. Anti-tuberculosis Activities – Tables
56-57**

A total of 16,222 persons were reported to be receiving chemoprophylaxis (drugs taken for preventive purposes) on an outpatient basis. These are persons who do not have active tuberculosis and are in addition to those reported as being under outpatient drug therapy for active tuberculosis. Reasons for preventive outpatient drug treatment are classified into 10 different categories in the Tables 56 A, 56 B and 56 C.

Vaccination, with BCG vaccine, of persons in high risk situations is another important preventive measure and is reported on in Table 57.

**Section 4. Mesures antituberculeuses – Tableaux
56-57**

Un nombre total de 16,222 personnes ont été rapportées recevant des soins chimioprophylactiques (médicaments administrés pour fins préventives) hors de l'hôpital. Celles-ci sont des personnes non atteintes de tuberculose active et sont en plus de celles rapportées comme suivant un traitement thérapeutique hors de l'hôpital. Les raisons pour recevoir un traitement préventif par médication hors de l'hôpital sont classifiées en dix catégories différentes dans les tableaux 56 A, 56 B et 56 C.

La vaccination par le B.C.G. de personnes susceptibles de contamination est une autre importante mesure préventive et est décrite au tableau 57.

**Section 5. Tuberculosis in Immigrants – Table
58**

In 1973, there were 1,063 immigrants reported among the 4,130 notifications of new active and reactivated tuberculosis. Details as to year of immigration, place of birth and province of residence are provided. Further analyses of these data for 1970, 1971, and 1972 are available on request.

**Section 5. Tuberculose chez les immigrants – Tableau
58**

En 1973, parmi les 4,130 déclarations de nouveaux cas actifs et réactivés il y en a eu 1,063 rapportés chez les immigrants. On donne des détails sur l'année d'immigration, le lieu de naissance et la province de résidence. Une analyse plus détaillée de ces données est disponible pour 1970, 1971 et 1972 sur demande.

DEFINITIONS

Tuberculosis Institution — A tuberculosis sanatorium or a tuberculosis unit.

Tuberculosis Sanatorium — A tuberculosis hospital that is either physically distinct, or, being a part of a larger institution, has separate personnel and separate financial accounts.

Tuberculosis Unit — A tuberculosis section of a larger institution, without separate personnel or without separate financial accounts.

Case Registry — The central organization within a province which receives, records, accumulates information on and follows up all reported cases of tuberculosis, and maintains a register of the tuberculosis population.

Notification — The receipt of a report in Statistics Canada of a new active or reactivated case of tuberculosis.

New active — A term which describes a case of tuberculosis, new active, which was never before reported as active, even though it may have been active at some much earlier time.

Re-activated — A term which describes a case previously recorded as active but with a subsequent known period of inactivity and now active once more.

Incidence — When used in this report this term refers to the number of new active cases reported to Statistics Canada during the year.

Prevalence — When used in this report this term refers to the number of persons receiving treatment for tuberculosis as at December 31st of the year in question. This term includes inpatients and outpatients. It should also include persons with active tuberculosis, at home, and not under treatment; incomplete information indicates that there are 100 to 200 such cases.

Inpatient — Refers to a tuberculous patient duly admitted to and being treated in a tuberculosis institution, and to whom a bed has been allocated.

Outpatient (on Drugs) — Refers to a patient being treated for tuberculosis, not as an inpatient, but on an ambulatory out-of-institution basis. Such a person will reside in his own home while undergoing drug treatment. An out-patient may be admitted to a hospital for treatment of some other condition and continue to be treated for tuberculosis simultaneously, but his status is determined by the primary reason for admission to inpatient care. He would not be considered to be an inpatient unless he were admitted principally

DÉFINITIONS

Établissement anti-tuberculeux — Sanatorium ou quartier pour tuberculose.

Sanatorium pour tuberculose — Hôpital pour tuberculeux, distinct ou partie d'un grand hôpital et disposant d'un personnel et d'une administration financière propres.

Quartier pour tuberculose — Partie d'un grand hôpital réservée aux tuberculeux et ne disposant pas d'un personnel ni d'une administration financière propres.

Registre Central de la tuberculose — Lieu centralisé à l'intérieur d'une province qui reçoit, enregistre, accumule des renseignements et exerce un contrôle sur les cas rapportés de tuberculose et qui maintient un registre de la population des tuberculeux.

Déclaration — La réception d'un rapport à Statistique Canada d'un nouveau cas actif ou réactivé de tuberculose.

Nouveau actif — Cas d'une personne qui a contracté la tuberculose active et dont le dossier n'indique aucune activité antérieure.

Réactivé — Cas d'une personne qui a contracté la tuberculose active et dont le dossier révèle une activité antérieure.

Incidence — Tel qu'employé dans ce rapport ce terme signifie le nombre de nouveaux cas actifs rapportés durant l'année à Statistique Canada.

Fréquence — Tel qu'employé dans ce rapport ce terme signifie le nombre de personnes recevant un traitement pour la tuberculose au 31 décembre de l'année en cours. Le mot comprend les patients à l'hôpital et les patients hors de l'hôpital. Il doit aussi inclure les personnes souffrant de tuberculose active, à la maison et ne suivant aucun traitement; les données incomplètes indiquent qu'il y aurait environ 100 à 200 cas pareils.

Patient à l'hôpital — Signifie un malade tuberculeux admis et suivant un traitement pour la tuberculose dans un établissement pour tuberculeux et qui occupe un lit dans cet établissement.

Patient hors de l'hôpital (traité par médication) — Signifie un malade qui reçoit un traitement pour la tuberculose, non pas comme patient admis à l'hôpital, mais en se rapportant à la clinique externe au service intéressé. Un patient hors de l'hôpital peut être admis à l'hôpital et y recevoir un traitement pour une autre maladie et simultanément être traité pour la tuberculose, mais son statut est déterminé en raison de la cause principale pour laquelle il a été admis à l'hôpital. Il ne sera pas considéré comme patient à l'hôpital sauf s'il est admis principalement pour la tuberculose.

for treatment of a tuberculous condition. Similarly, outpatients who are admitted for tests are still considered to be outpatients provided that the period of their continuous stay in an institution is less than 30 days.

Diagnostic Classification — The classification used is based on the Eighth Revision International Classification of Diseases, Adapted.

Death — The statistics of deaths as included in this report refer to only those cases in which the certifying physician has indicated one of the forms of tuberculosis as being the underlying cause of death. Tuberculous persons dying from other underlying causes are excluded. Statistics are obtained from the Vital Statistics Section of Statistics Canada.

Population Figures — The rates used in this publication are based on population figures taken from the "Census of Canada" and from the "Population Estimates" of the Census Division of Statistics Canada.

BCG Vaccine — Bacille Calmette Guérin is a preparation for the prophylactic (preventive) inoculation against tuberculosis.

Tuberculin Test — The tuberculin test, as commonly applied, consists in the injection of tuberculin under or into the skin. The injection has no effect (negative reaction) in non-tuberculous subjects but causes inflammation (positive reaction) at the site of the injection in persons infected with tubercle bacilli. A positive tuberculin test is evidence of either a past or present invasion of body tissues by the mycobacteria but it does not necessarily indicate the presence of active tuberculous disease at the time of the test.

Preventive (Prophylactic) Drug Therapy — The administration of anti-tuberculosis drugs to persons in susceptible categories as a preventive measure against their developing active tuberculosis.

palement pour un traitement contre la tuberculose. De même, les patients hors de l'hôpital admis pour des "tests" seront toujours considérés comme externes pourvu que la durée de leur séjour continu à l'hôpital soit inférieure à 30 jours.

Classification des diagnostics — La classification des diagnostics est basée sur la "Classification internationale des maladies, adaptée, huitième révision".

Mortalité — Les statistiques de la mortalité due à la tuberculose telles qu'incluses dans ce rapport se réfèrent seulement aux cas où le médecin certifiant a indiqué une forme quelconque de tuberculose comme cause majeure du décès. Les personnes souffrant de tuberculose et mourant d'autres causes sont exclues. Ces statistiques sont fournies par la Section de l'état civil de Statistique Canada.

Chiffres de la Population — Les taux employés dans ce rapport sont basés sur les chiffres tirés du "Recensement du Canada" et des "Estimations de la population" de la Division du recensement de Statistique Canada.

Vaccin B.C.G. — Bacille Calmette Guérin est une préparation pour injection (préventive) prophylactique contre la tuberculose.

Test tuberculinique — Le test tuberculinique tel qu'administré communément, consiste à injecter la tuberculine sous ou dans la peau. L'injection ne donne aucune réaction (réaction négative) chez le sujet non tuberculeux mais cause une inflammation (réaction positive) au site de l'injection chez le sujet atteint de bacille tuberculeux. Un test à réaction positive indique une infection passée ou présente des tissus du corps par les mycobactéries mais n'indique pas nécessairement un état de tuberculose active au moment où le test a été administré.

Traitemen préventif (prophylactique) par médication — L'administration de produits pharmaceutiques anti-tuberculeux aux personnes suspectes comme mesure préventive anti-tuberculeuse.





Estimated Population for Canada and the Provinces, by Age Group and Sex, June 1, 1973
Population estimée, selon le Canada et les provinces, le groupe d'âge et le sexe, 1er juin 1973

Province	Total	Age - Âge									
		0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
thousands - milliers											
CANADA.....	T.	22,094.7	1,769.8	4,415.9	4,181.2	3,197.4	2,525.3	2,380.7	1,790.2	1,140.7	693.5
	M.	11,044.2	906.9	2,258.5	2,115.0	1,610.8	1,287.6	1,178.5	878.1	531.6	277.2
	F.	11,050.5	862.9	2,157.4	2,066.2	1,586.6	1,237.7	1,202.2	912.1	609.1	416.3
Newfoundland - Terre-Neuve	T.	540.8	61.3	132.6	112.7	68.7	49.9	45.6	36.6	20.7	12.7
	M.	275.3	31.4	67.7	56.7	34.6	26.0	23.8	19.3	10.2	5.6
	F.	265.5	29.9	64.9	56.0	34.1	23.9	21.8	17.3	10.5	7.1
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard.	T.	114.9	9.9	24.7	22.5	13.6	11.0	10.5	9.9	7.1	5.7
	M.	57.6	5.1	12.6	11.3	6.9	5.7	5.2	5.0	3.5	2.3
	F.	57.3	4.8	12.1	11.2	6.7	5.3	5.3	4.9	3.6	3.4
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	T.	804.8	68.3	165.6	155.8	106.5	81.9	81.2	70.6	44.6	30.3
	M.	403.5	35.0	84.7	79.8	54.0	41.4	39.9	35.2	21.4	12.1
	F.	401.3	33.3	80.9	76.0	52.5	40.5	41.3	35.4	23.2	18.2
New Brunswick - Nouveau-Brunswick....	T.	651.9	57.9	139.9	134.9	83.5	63.2	63.3	52.5	34.1	22.6
	M.	327.4	29.7	71.7	68.6	42.8	31.7	31.1	26.3	16.1	9.4
	F.	324.5	28.2	68.2	66.3	40.7	31.5	32.2	26.2	18.0	13.2
Québec	T.	6,081.4	440.1	1,232.5	1,214.0	924.3	710.4	645.7	474.8	291.8	147.8
	M.	3,018.1	225.8	629.9	612.6	462.0	355.3	315.9	228.0	130.6	58.0
	F.	3,063.3	214.3	602.6	601.4	462.3	355.1	329.8	246.8	161.2	89.8
Ontario	T.	7,938.9	634.1	1,535.4	1,438.9	1,171.2	943.9	896.2	643.3	419.0	256.9
	M.	3,954.0	325.0	786.7	726.1	589.8	482.7	444.6	315.5	189.9	93.7
	F.	3,984.9	309.1	748.7	712.8	581.4	461.2	451.6	327.8	229.1	163.2
Manitoba	T.	997.8	84.6	193.3	185.8	133.3	103.2	107.7	90.4	59.6	39.9
	M.	498.1	43.2	98.6	94.0	67.6	52.3	52.5	44.4	28.5	17.0
	F.	499.7	41.4	94.7	91.8	65.7	50.9	55.2	46.0	31.1	22.9
Saskatchewan	T.	908.1	73.5	186.2	171.8	100.0	91.8	99.9	86.8	57.1	41.0
	M.	460.2	37.5	95.0	88.0	50.5	46.7	50.1	43.9	29.1	19.4
	F.	447.9	36.0	91.2	83.8	49.5	45.1	49.8	42.9	28.0	21.6
Alberta	T.	1,683.6	150.0	356.7	318.5	243.4	195.6	171.1	122.8	77.5	48.0
	M.	854.6	77.0	182.1	161.3	122.5	101.8	86.5	61.7	39.3	22.4
	F.	829.0	73.0	174.6	157.2	120.9	93.8	84.6	61.1	38.2	25.6
British Columbia - Colombie-Britannique.	T.	2,315.0	182.0	434.0	416.6	342.8	268.0	255.1	199.9	128.2	88.4
	M.	1,165.0	93.0	221.7	211.7	174.8	140.4	126.5	97.3	62.4	37.2
	F.	1,150.0	89.0	212.3	204.9	168.0	127.6	128.6	102.6	65.8	51.2
Yukon	T.	19.7	2.3	4.6	3.1	3.9	2.4	1.8	1.1	0.4	0.1
	M.	10.6	1.2	2.4	1.5	2.1	1.4	1.0	0.7	0.3	--
	F.	9.1	1.1	2.2	1.6	1.8	1.0	0.8	0.4	0.1	0.1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest.	T.	37.8	5.8	10.4	6.6	6.2	4.0	2.6	1.5	0.6	0.1
	M.	19.8	3.0	5.4	3.4	3.2	2.2	1.4	0.8	0.3	0.1
	F.	18.0	2.8	5.0	3.2	3.0	1.8	1.2	0.7	0.3	--





Estimated Population for Canada, by Age Group and Sex, December 31, 1973
Population estimée, selon le Canada et les provinces, le groupe d'âge et le sexe, 31 décembre 1973

Province	Total	Age - Âge									
		0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
thousands - milliers											
CANADA	T.	22,306.8	1,786.8	4,458.3	4,221.3	3,228.1	2,549.6	2,403.5	1,807.4	1,151.6	700.2
	M.	11,150.2	915.5	2,280.2	2,135.3	1,626.3	1,300.0	1,189.8	886.5	536.7	279.9
	F.	11,156.6	871.3	2,178.1	2,086.0	1,601.8	1,249.6	1,213.7	920.9	614.9	420.3
Newfoundland - Terre-Neuve	T.	540.0	61.3	132.4	112.5	68.5	49.9	45.5	36.5	20.7	12.7
	M.	274.9	31.4	67.7	56.6	34.5	26.0	23.7	19.2	10.2	5.6
	F.	265.1	29.9	64.7	55.9	34.0	23.9	21.8	17.3	10.5	7.1
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	T.	116.0	10.0	24.9	22.7	13.8	11.2	10.6	10.0	7.1	5.7
	M.	58.2	5.2	12.7	11.4	7.0	5.8	5.2	5.1	3.5	2.3
	F.	57.8	4.8	12.2	11.3	6.8	5.4	5.4	4.9	3.6	3.4
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	T.	810.0	68.7	166.7	156.8	107.1	82.5	81.8	71.1	44.8	30.5
	M.	406.1	35.2	85.3	80.3	54.3	41.7	40.2	35.4	21.5	12.2
	F.	403.9	33.5	81.4	76.5	52.8	40.8	41.6	35.7	23.3	18.3
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	T.	658.0	58.5	141.2	136.1	84.3	63.8	63.9	52.9	34.5	22.8
	M.	330.5	30.0	72.4	69.2	43.2	32.0	31.4	26.5	16.3	9.5
	F.	327.5	28.5	68.8	66.9	41.1	31.8	32.5	26.4	18.2	13.3
Québec	T.	6,111.9	442.4	1,238.9	1,220.2	928.7	713.9	649.0	477.1	293.3	148.4
	M.	3,033.1	226.9	633.0	615.6	464.2	357.1	317.7	229.1	131.3	58.2
	F.	3,078.8	215.5	605.9	604.6	464.5	356.8	331.3	248.0	162.0	90.2
Ontario	T.	8,030.9	641.5	1,553.2	1,455.6	1,184.5	954.8	906.9	650.8	423.8	259.8
	M.	3,999.7	328.7	795.7	734.4	596.5	488.4	449.9	319.3	192.0	94.8
	F.	4,031.2	312.8	757.5	721.2	588.0	466.4	457.0	331.5	231.8	165.0
Manitoba	T.	1,005.0	85.2	194.9	187.3	134.3	103.8	108.3	91.0	60.0	40.2
	M.	501.7	43.5	99.5	94.8	68.1	52.5	52.8	44.7	28.7	17.1
	F.	503.3	41.7	95.4	92.5	66.2	51.3	55.5	46.3	31.3	23.1
Saskatchewan	T.	906.0	73.3	186.0	171.6	99.8	91.4	99.5	86.6	56.9	40.9
	M.	459.1	37.4	95.0	88.0	50.4	48.4	49.8	43.7	29.0	19.4
	F.	446.9	35.9	91.0	83.6	49.4	45.0	49.7	42.9	27.9	21.5
Alberta	T.	1,702.0	151.6	360.8	322.2	246.1	197.5	172.8	124.2	78.3	48.5
	M.	863.9	77.8	184.3	163.3	123.9	102.7	87.2	62.4	39.7	22.6
	F.	838.1	73.8	176.5	158.9	122.2	94.8	85.6	61.8	38.6	25.9
British Columbia - Colombie-Britannique	T.	2,369.0	186.2	444.1	426.5	350.8	274.3	260.8	204.6	131.2	90.5
	M.	1,192.2	95.2	226.7	216.6	178.9	143.7	129.5	99.6	63.9	38.1
	F.	1,176.8	91.0	217.4	209.9	171.9	130.6	131.3	105.0	67.3	52.4
Yukon	T.	20.0	2.3	4.7	3.1	4.0	2.5	1.8	1.1	0.4	0.1
	M.	10.8	1.2	2.5	1.5	2.1	1.5	1.0	0.7	0.3	--
	F.	9.2	1.1	2.2	1.6	1.9	1.0	0.8	0.4	0.1	0.1
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	T.	38.0	5.8	10.5	6.7	6.2	4.0	2.6	1.5	0.6	0.1
	M.	20.0	3.0	5.4	3.6	3.2	2.2	1.4	0.8	0.3	0.1
	F.	18.0	2.8	5.1	3.1	3.0	1.8	1.2	0.7	0.3	--

Tuberculosis — Tuberculose



Tuberculosis — Tuberculose



Summary Statistics, 1973
Sommaire des statistiques, 1973

Province, age group and origin Province, groupe d'âge et origine	Notifications by case register Déclarations par registre central		Patients under treatment for tuberculosis, December 31 Patients sous traitement pour la tuberculose, 31 décembre			Persons receiving preventive out-patient drug treatment, December 31 Personnes recevant des traitements préventifs par médication hors de l'hôpital, 31 décembre
	New active cases ¹ Nouveaux cas actifs ¹	Reactivated cases Cas réactivés	Total	In-patients Hospitatisés	Out-patients on drug treatment Traités par médication hors de l'hôpital	
	Number — Nombre					
Province						
CANADA	3,563	567	8,543	1,434	7,109	16,222
Newfoundland — Terre-Neuve	166	18	425	43	382	88
Prince Edward Island — Île-du-Prince-Édouard	9	4	30	12	18	47
Nova Scotia — Nouvelle-Écosse	100	12	362	78	284	330
New Brunswick — Nouveau-Brunswick	72	6	287	36	251	243
Québec	1,121	189	2,156	541	1,615	2,955
Ontario	1,000	171	2,516	378	2,138	7,614
Manitoba	219	35	488	56	432	1,167
Saskatchewan	171	26	338	49	289	234
Alberta	269	35	743	117	626	1,257
British Columbia — Colombie-Britannique	394	59	1,013	101	912	993
Yukon	3	1	17	4	13	93
Northwest Territories — Territoires du Nord-Ouest	39	11	168	19	149	1,201
Age group — Groupe d'âge						
TOTAL	3,563	567	8,543	1,434	7,109	16,222
0-14	350	3	710	86	624	3,063
15-24	460	17	895	90	805	3,592
25-44	1,033	148	2,551	330	2,221	4,329
45-64	1,027	261	2,781	519	2,262	3,918
65 and over — et plus	693	138	1,606	409	1,197	1,320
Origin — Origine						
TOTAL	3,563	567	8,543	1,434	7,109	16,222
Indian — Indiens	468	83	1,092	203	889	1,343
Eskimo — Esquimaux	49	14	170	32	138	1,043
Other — Autres	3,046	470	7,281	1,199	6,082	13,836

See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau.


Summary Statistics, 1973 – Concluded

Sommaire des statistiques, 1973 – fin

Province, age group and origin Province, groupe d'âge et origine	Notifications by case register Déclarations par registre central		Patients under treatment for tuberculosis, December 31 Patients sous traitement pour la tuberculose, 31 décembre			Persons receiving preventive out-patient drug treatment, December 31 Personnes recevant des traitements préventifs par médication hors de l'hôpital, 31 décembre	
	New active cases ¹ Nouveaux cas actifs ¹	Reactivated cases Cas réactivés	Total	In-patients Hospitatisés	Out-patients on drug treatment Traités par médication hors de l'hôpital		
Rate per 100,000 population – Taux pour 100,000 habitants							
Province							
CANADA	16.1	2.6	38.3	6.4	31.9	72.7	
Newfoundland – Terre-Neuve	30.7	3.3	78.7	8.0	70.7	16.3	
Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard	7.8	3.5	25.9	10.3	15.5	40.5	
Nova Scotia – Nouvelle-Écosse	12.4	1.5	44.7	9.6	35.1	40.7	
New Brunswick – Nouveau-Brunswick ..	11.0	0.9	43.6	5.5	38.1	36.9	
Québec	18.4	3.1	35.3	8.9	26.4	48.3	
Ontario	12.6	2.2	31.3	4.7	26.6	94.8	
Manitoba	21.9	3.5	48.6	5.6	43.0	116.1	
Saskatchewan	18.8	2.9	37.3	5.4	31.9	25.8	
Alberta	16.0	2.1	43.7	6.9	36.8	73.9	
British Columbia – Colombie-Britannique	17.0	2.5	42.8	4.3	38.5	41.9	
Yukon	15.2	5.1	85.0	20.0	65.0	465.0	
Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest	103.2	29.1	442.1	50.0	392.1	3,160.5	
Age group – Groupe d'âge							
TOTAL	16.1	2.6	38.3	6.4	31.9	72.7	
0-14	5.6	--	11.4	1.4	10.0	49.0	
15-24	11.0	0.4	21.2	2.1	19.1	85.1	
25-44	18.1	2.6	44.2	5.7	38.4	74.9	
45-64	24.6	6.3	66.0	12.3	53.7	93.0	
65 and over – et plus	37.8	7.5	86.7	22.1	64.6	71.3	
Percentage distribution ² – Répartition procentuelle ²							
Origin – Origine							
TOTAL	100	100	100	100	100	100	
Indian – Indiens	13	15	13	14	12	8	
Eskimo – Esquimaux	1	2	2	2	2	7	
Other – Autres	86	83	85	84	86	85	

¹ Eight new active cases in Ontario were reported for persons whose residence is outside Canada; 5 of these cases are not included in the tables of this report as they did not receive treatment in Canada. — Huit nouveaux cas actifs ont été déclarés en Ontario sur des personnes qui demeurent hors du Canada; 5 de ces cas ne sont pas inclus dans les tableaux de ce rapport, car ils n'ont pas reçu de traitement au Canada.

² Percentage distribution of population, 1971: Indian, 1.4%; Eskimo, 0.1%; other, 98.5%. — Répartition procentuelle de la population en 1971: Indiens, 1.4%; Esquimaux, 0.1%; autres, 98.5%.



**NOTIFICATION OF
NEW ACTIVE AND REACTIVATED CASES OF TUBERCULOSIS**

**DÉCLARATIONS DE NOUVEAUX CAS ACTIFS ET
RÉACTIVÉS DE TUBERCULOSE**

TABLE 1 A. Comparison – New Active and Reactivated Cases by Province, 1973

TABLEAU 1A. Comparaison – Nouveaux cas actifs et réactivés suivant la province, 1973

Activity – Activité	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Number – Nombre													
TOTAL	4,130	184	13	112	78	1,310	1,171	254	197	304	453	4	50
New active cases – Nouveaux cas actifs	3,563	166	9	100	72	1,121	1,000	219	171	269	394	3	39
Reactivated cases – Cas réactivés	567	18	4	12	6	189	171	35	26	35	59	1	11
Rate per 100,000 population – Taux pour 100,000 habitants													
TOTAL	18.7	34.0	11.3	13.9	12.0	21.5	14.8	25.5	21.7	18.1	19.6	20.3	132.3
New active cases – Nouveaux cas actifs	16.1	30.7	7.8	12.4	11.0	18.4	12.6	21.9	18.8	16.0	17.0	15.2	103.2
Reactivated cases – Cas réactivés	2.6	3.3	3.5	1.5	0.9	3.1	2.2	3.5	2.9	2.1	2.5	5.1	29.1
Percentage distribution – Répartition procentuelle													
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
New active cases – Nouveaux cas actifs	86	90	69	89	92	86	85	86	87	88	87	75	78
Reactivated cases – Cas réactivés	14	10	31	11	8	14	15	14	13	12	13	25	22

TABLE 1 B. Comparison – New Active and Reactivated Cases by Age Group, 1973

TABLEAU 1B. Comparaison – Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le groupe d'âge, 1973

Activity – Activité	Total	0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75 and over — et plus
Number – Nombre										
TOTAL	4,130	130	223	477	620	561	678	610	494	337
New active cases – Nouveaux cas actifs	3,563	130	220	460	563	470	542	485	398	295
Reactivated cases – Cas réactivés	567	—	3	17	57	91	136	125	96	42
Percentage distribution – Répartition procentuelle										
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
New active cases – Nouveaux cas actifs	86	100	99	96	91	84	80	80	81	88
Reactivated cases – Cas réactivés	14	—	1	4	9	16	20	20	19	12

TABLE 1 C. Comparison – New Active and Reactivated Cases by Diagnosis, 1973
TABLEAU 1 C. Comparaison – Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic, 1973

Activity – Activité	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire					Non-respiratory Non respiratoire
		Minimal pulmonary Pulmonaire, minime	Moderately advanced pulmonary Pulmonaire, assez avancée	Far advanced pulmonary Pulmonaire, très avancée	Primary Primaire	Other respiratory Autres respiratoires ¹	
Number – Nombre							
TOTAL	4,130	924	1,230	542	273	462	699
New active cases – Nouveaux cas actifs	3,563	828	1,000	439	273	421	602
Reactivated cases – Cas réactivés	567	96	230	103	–	41	97
Percentage distribution – Répartition procentuelle							
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100
New active cases – Nouveaux cas actifs	86	90	81	81	100	91	86
Reactivated cases – Cas réactivés	14	10	19	19	–	9	14

¹ Includes cases with pulmonary stage unspecified. — Y compris les cas avec le stade pulmonaire non précisé.

TABLE 1 D. Comparison – New Active and Reactivated Cases by Origin, 1973
TABLEAU 1 D. Comparaison – Nouveaux cas actifs et réactivés suivant l'origine, 1973

Activity – Activité	Total			Indian – Indiens			Eskimo – Esquimaux			Other – Autres		
	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F
Number – Nombre												
TOTAL	4,130	2,474	1,656	551	284	267	63	34	29	3,516	2,156	1,360
New active cases – Nouveaux cas actifs	3,563	2,141	1,422	468	251	217	49	25	24	3,046	1,865	1,181
Reactivated cases – Cas réactivés	567	333	234	83	33	50	14	9	5	470	291	179
Percentage distribution – Répartition procentuelle												
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
New active cases – Nouveaux cas actifs	86	87	86	85	88	81	78	74	83	87	87	87
Reactivated cases – Cas réactivés	14	13	14	15	12	19	22	26	17	13	13	13

TABLE 2 A. Summary Statistics – New Active Cases by Sex and Province, 1973

TABLEAU 2 A. Sommaire des statistiques – Nouveaux cas actifs suivant le sexe et la province, 1973

Sex – Sexe	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Number – Nombre													
TOTAL	3,563	166	9	100	72	1,121	1,000	219	171	269	394	3	39
Male – Masculin	2,141	105	4	58	47	712	593	118	90	146	247	1	20
Female – Féminin	1,422	61	5	42	25	409	407	101	81	123	147	2	19
Rate per 100,000 population – Taux pour 100,000 habitants													
TOTAL	16.1	30.7	7.8	12.4	11.0	18.4	12.6	21.9	18.8	16.0	17.0	15.2	103.2
Male – Masculin	19.4	38.1	6.9	14.4	14.4	23.6	15.0	23.7	19.6	17.1	21.2	9.4	101.0
Female – Féminin	12.9	23.0	8.7	10.5	7.7	13.4	10.2	20.2	18.1	14.8	12.8	22.0	105.6

TABLE 2 B. Summary Statistics – New Active Cases by Sex and Age group, 1973

TABLEAU 2 B. Sommaire des statistiques – Nouveaux cas actifs suivant le sexe et le groupe d'âge, 1973

Sex – Sexe	Total	0 - 4	5 - 14	15 - 24	25 - 34	35 - 44	45 - 54	55 - 64	65 - 74	75 and over — et plus
Number – Nombre										
TOTAL	3,563	130	220	460	563	470	542	485	398	295
Male – Masculin	2,141	74	126	216	291	269	365	342	273	185
Female – Féminin	1,422	56	94	244	272	201	177	143	125	110
Rate per 100,000 population – Taux pour 100,000 habitants										
TOTAL	16.1	7.3	5.0	11.0	17.6	18.6	22.8	27.1	34.9	42.5
Male – Masculin	19.4	8.2	5.6	10.2	18.1	20.9	31.0	38.9	51.4	66.7
Female – Féminin	12.9	6.5	4.4	11.8	17.1	16.2	14.7	15.7	20.5	26.4

TABLE 2 C. Summary Statistics – New Active Cases by Sex and Diagnosis, 1973

TABLEAU 2 C. Sommaire des statistiques – Nouveaux cas actifs suivant le sexe et le diagnostic, 1973

Sex – Sexe	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire					Non-respiratory — Non respiratoire
		Minimal pulmonary — Pulmonaire, minime	Moderately advanced pulmonary — Pulmonaire, assez avancée	Far advanced pulmonary — Pulmonaire, très avancée	Primary — Primaire	Other respiratory — Autres respiratoires ¹	
Number — Nombre							
TOTAL	3,563	828	1,000	439	273	421	602
Male – Masculin.....	2,141	474	651	316	160	263	277
Female – Féminin	1,422	354	349	123	113	158	325
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants							
TOTAL	16.1	3.7	4.5	2.0	1.2	1.9	2.7
Male – Masculin.....	19.4	4.3	5.9	2.9	1.4	2.4	2.5
Female – Féminin	12.9	3.2	3.2	1.1	1.0	1.4	2.9

¹ Includes cases with pulmonary stage unspecified. — Y compris les cas avec le stade pulmonaire non précisé.

TABLE 2 D. Summary Statistics – New Active Cases by Sex and Origin, 1973

TABLEAU 2 D. Sommaire des statistiques – Nouveaux cas actifs suivant le sexe et l'origine, 1973

Sex – Sexe	Total	Indian — Indiens	Eskimo — Esquimaux	Other — Autres
		Number — Nombre		
TOTAL	3,563	468	49	3,046
Male – Masculin.....	2,141	251	25	1,865
Female – Féminin	1,422	217	24	1,181
Percentage distribution — Répartition procentuelle				
TOTAL	100.0	13.1	1.4	85.5
Male – Masculin.....	100.0	11.7	1.2	87.1
Female – Féminin	100.0	15.3	1.7	83.0
Percentage distribution of 1971 population ¹ Répartition procentuelle de la population de 1971 ¹				
TOTAL	100.0	1.4	0.1	98.5
Male – Masculin.....	100.0	1.4	0.1	98.5
Female – Féminin	100.0	1.4	0.1	98.5

¹ Latest census year for which origin data was obtained. — La plus récente année de recensement pour laquelle ont été réunies des données selon l'origine.

TABLE 3. New Active Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Province, 1973

No.	I.C.D.A. No. N° de la C.I.M.A.	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I. P.-É.	N.S. N.-É.
				number — nombre		
1		TOTAL	T. M. F.	3,563 2,141 1,422	166 105 61	9 4 5
2						100 58 42
3						
4	010-012.9	Tuberculosis of respiratory system — Tuberculose de l'appareil respiratoire	T. M. F.	2,961 1,864 1,097	133 87 46	8 3 5
5						86 49 37
6						
7	010	Silicotuberculosis — Silicotuberculose	T. M. F.	7 7 —	— — —	2 2 —
8						
9						
10	011	Pulmonary — Pulmonaire	T. M. F.	2,495 1,580 915	115 72 43	6 3 3
11						67 38 29
12						
13	011.0	Minimal — Minime	T. M. F.	828 474 354	39 19 20	2 1 1
14						12 4 8
15						
16	011.1	Moderately advanced — Assez avancée	T. M. F.	1,000 651 349	48 31 17	3 1 2
17						29 23 6
18						
19	011.2	Far advanced — Très avancée	T. M. F.	439 316 123	23 18 5	1 1 —
20						26 11 15
21						
22	011.3	Stage unspecified — Stade non précis	T. M. F.	167 101 66	— — —	— — —
23						
24						
25	011.4	Miliary — Miliaire	T. M. F.	55 32 23	5 4 1	— — —
26						
27						
28	011.9	NOS — S.A.I.	T. M. F.	6 6 —	— — —	— — —
29						
30						
31	012	Other respiratory tuberculosis — Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire	T. M. F.	459 277 182	18 15 3	2 — 2
32						17 9 8
33						
34	012.0	Primary — Primaire	T. M. F.	273 160 113	10 8 2	— — 4
35						10 6 4
36						
37	012.1	Pleurisy specified as tuberculous — Pleurésie spécifiée comme tuberculeuse	T. M. F.	181 115 66	8 7 1	1 — 1
38						7 3 4
39						
40	012.2	Pleurisy with effusion without mention of cause — Pleurésie exsudative sans mention d'étiologie	T. M. F.	— — —	— — —	— — —
41						
42						
43	012.3	Tuberculous laryngitis — Laryngite tuberculeuse	T. M. F.	— — —	— — —	— — —
44						
45						
46	012.9	Other — Autres	T. M. F.	5 2 3	— — —	1 — 1
47						
48						
49	013-018.9	Non-respiratory — Non respiratoire	T. M. F.	602 277 325	33 18 15	1 1 —
50						14 9 5
51						
52	013	Meninges and central nervous system — Méninges et système nerveux central	T. M. F.	23 13 10	— — —	— — —
53						
54						
55	013.0	Meningitis — Méningite	T. M. F.	22 13 9	— — —	— — —
56						
57						
58	013.9	Other — Autres	T. M. F.	1 — 1	— — —	— — —
59						
60						

TABLEAU 3. Nouveaux cas actifs suivant le diagnostic détaillé, le sexe et la province, 1973

N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	N°
number — nombre									
72	1,121	1,000	219	171	269	394	3	39	1
47	712	593	118	90	146	247	1	20	2
25	409	407	101	81	123	147	2	19	3
57	1,014	772	185	144	211	316	—	35	4
39	658	497	105	78	120	210	—	18	5
18	356	275	80	66	91	106	—	17	6
—	—	3	—	—	—	2	—	—	7
—	—	3	—	—	—	2	—	—	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
54	928	652	132	97	152	260	—	32	10
36	603	424	74	50	87	177	—	16	11
18	325	228	58	47	65	83	—	16	12
21	211	298	1	49	57	116	—	22	13
14	114	177	—	26	32	77	—	10	14
7	97	121	1	23	25	39	—	12	15
5	497	238	—	29	62	81	—	8	16
4	326	159	—	13	36	54	—	4	17
1	171	79	—	16	26	27	—	4	18
4	200	84	1	14	26	60	—	—	19
4	148	65	1	8	15	45	—	—	20
—	52	19	—	6	11	15	—	—	21
24	—	18	124	—	—	—	—	1	22
14	—	15	71	—	—	—	—	1	23
10	—	3	53	—	—	—	—	—	24
—	18	10	6	5	7	3	—	1	25
—	13	4	2	3	4	1	—	1	26
—	5	6	4	2	3	2	—	—	27
—	2	4	—	—	—	—	—	—	28
—	2	4	—	—	—	—	—	—	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
3	86	117	53	47	59	54	—	3	31
3	55	70	31	28	33	31	—	2	32
—	31	47	22	19	26	23	—	1	33
3	30	62	41	40	42	32	—	3	34
3	21	35	21	23	25	16	—	2	35
—	9	27	20	17	17	16	—	1	36
—	55	53	12	6	17	22	—	—	37
—	33	34	10	5	8	15	—	—	38
—	22	19	2	1	9	7	—	—	39
—	—	—	—	—	—	—	—	1	40
—	—	—	—	—	—	—	—	1	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	45
—	1	2	—	1	—	—	—	—	46
—	1	1	—	1	—	—	—	—	47
—	—	1	—	—	—	—	—	—	48
15	107	228	34	27	58	78	3	4	49
8	54	96	13	12	26	37	1	2	50
7	53	132	21	15	32	41	2	2	51
2	4	8	—	1	3	5	—	—	52
2	4	3	—	1	2	1	—	—	53
—	—	5	—	—	1	4	—	—	54
2	4	8	—	1	3	4	—	—	55
2	4	3	—	1	2	1	—	—	56
—	—	5	—	—	—	3	—	—	57
—	—	—	—	—	—	1	—	—	58
—	—	—	—	—	—	1	—	—	59
—	—	—	—	—	—	1	—	—	60

TABLE 3. New Active Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Province, 1973 — Concluded

No.	I.C.D.A. No. Nº de la C.I.M.A.	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.-É.	N.S. N.-É.
				number — nombre		
Non-respiratory — Concluded — Non respiratoire — fin:						
1	014	Intestines, peritoneum and mesenteric glands — Intestins, péritoine et ganglions mésentériques.	T. M. F.	31 14 17	1 1 —	— — 1
2						—
3						1
4	015	Bones and joints, active — Osseuse et articulaire, active	T. M. F.	79 42 37	8 4 4	1 1 —
5						5 3 2
6						
7	015.0	Vertebral column — Colonne vertébrale	T. M. F.	21 13 8	3 2 1	1 1 —
8						3 2 1
9						
10	015.1	Hip — Hanche	T. M. F.	6 4 2	1 1 —	— — —
11						
12						
13	015.2	Knee — Genou	T. M. F.	4 2 2	2 1 1	— — —
14						
15						
16	015.8	Other specified bones and joints — Autres os ou articulations	T. M. F.	16 8 8	1 — 1	— — 1
17						
18						
19	015.9	Unspecified — Sans précision	T. M. F.	32 15 17	1 — 1	— — —
20						
21						
22	016	Genito-urinary system — Appareil génito-urinaire	T. M. F.	251 120 131	20 12 8	5 4 1
23						
24						
25	016.0	Kidney — Rein	T. M. F.	95 55 40	14 10 4	— — 3 2 1
26						
27						
28	016.1	Other urinary organs — Autres organes urinaires	T. M. F.	17 6 11	— — —	— — —
29						
30						
31	016.2	Genital organs (male and female) — Organes génitaux (de l'homme et de la femme).	T. M. F.	40 18 22	5 1 4	— — 1 1
32						
33						
34	016.9	Unspecified — Sans précision	T. M. F.	99 41 58	1 1 —	— — 1 1
35						
36						
37	017	Other organs — Autres organes	T. M. F.	217 87 130	4 1 3	— — 3 2 1
38						
39						
40	017.0	Skin and subcutaneous cellular tissue — Peau et tissu cellulaire	T. M. F.	5 1 4	1 — 1	— — —
41						
42						
43	017.1	Peripheral lymphatic glands — Ganglions lymphatiques périphériques	T. M. F.	189 70 119	3 1 2	— — 2 1 1
44						
45						
46	017.2	Eye — Oeil	T. M. F.	7 4 3	— — —	— — —
47						
48						
49	017.3	Ear — Oreille	T. M. F.	2 1 1	— — —	— — 1
50						
51						
52	017.9	Other — Autres	T. M. F.	14 11 3	— — —	— — —
53						
54						
55	018	Disseminated — Disséminée	T. M. F.	1 1 —	— — —	— — —
56						
57						
58	018.0	Acute miliary tuberculosis specified as non-pulmonary — Tuberculose T. miliaire aiguë spécifiée comme non pulmonaire.	T. M. F.	— — —	— — —	— — —
59						
60						
61	018.1	Acute miliary tuberculosis unspecified — Tuberculose miliaire aiguë sans précision.	T. M. F.	1 1 —	— — —	— — —
62						
63						
64	018.9	Other forms of disseminated tuberculosis — Autres formes de tubercu- lose à foyers multiples.	T. M. F.	— — —	— — —	— — —
65						
66						

TABLEAU 3. Nouveaux cas actifs suivant le diagnostic détaillé, le sexe et la province, 1973 — fin

N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
				number - nombre				Nº
1	8 5 3	8 4 4	2 - 2	- -	4 2 2	5 2 3	- -	1 1
4 3 1	16 9 7	23 12 11	4 1 3	5 2 3	7 5 2	6 2 4	- -	2 3 4 5 6
2 2	5 2 3	- -	- -	2 1 1	2 2	3 1 2	- -	7 8 9
-	-	-	-	- 1	-	1 1	- -	10 11 12
-	-	-	-	- 1	-	- 1	- -	13 14 15
-	-	-	-	- 1	1 1	- -	- -	16 17 18
2 1 1	2 1 1	2 2	1 - 1	1 1 -	4 2 2	2 1 1	- -	19 20 21
-	6 3 3	21 10 11	2 1 1	1 - 1	-	- -	- -	22 23 24
7 2 5	58 28 30	97 43 54	12 6 6	6 3 3	22 9 13	19 10 9	2 1 1	3 2 2
1 1 -	35 18 17	15 9 6	9 5 4	4 3 1	8 4 4	3 1 2	- 1 1	25 26 27
2 - 2	6 3 3	5 1 4	- - -	- -	2 - 2	1 1	- -	28 29 30
-	12 5 7	3 2 1	2 - 2	1 - 1	7 3 4	9 6 3	- -	31 32 33
4 1 3	5 2 3	74 31 43	1 1 -	1 - 1	5 2 3	6 2 4	- -	34 35 36
1 1	21 8 13	92 34 58	16 6 10	14 5 9	22 8 14	43 22 21	1 - 1	37 38 39
-	-	3 2	- -	- -	-	1 - 1	- -	40 41 42
1 1	16 4 12	85 31 54	13 4 9	11 3 8	20 7 13	37 18 19	1 - 1	43 44 45
-	-	- 4 2 2	- - -	2 1 1	-	1 1	- -	46 47 48
-	-	1 1	- -	- -	-	- -	- -	49 50 51
-	-	4 4	- -	3 2 1	2 1 1	2 1 1	- -	52 53 54
-	-	- 1	- -	- -	-	- -	- -	55 56 57
-	-	- 1	- -	- -	-	- -	- -	58 59 60
-	-	- 1	- -	- -	-	- -	- -	61 62 63
-	-	- 1	- -	- -	-	- -	- -	64 65 66

TABLE 4. New Active Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Age Group, 1973

No.	I.C.D.A. No. Nº de la C.I.M.A.	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe	All ages — Tous ages	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	number — nombre	
1		TOTAL	T.	3,563	130	130	90	159	301	
2			M.	2,141	74	76	50	71	145	
3			F.	1,422	56	54	40	88	156	
4	010-012.9	Tuberculosis of respiratory system — Tuberculose de l'appareil respiratoire	T.	2,961	115	119	79	147	253	
5			M.	1,864	66	70	46	67	129	
6			F.	1,097	49	49	33	80	124	
7	010	Silicotuberculosis — Silicotuberculose	T.	7	—	—	—	—	—	
8			M.	7	—	—	—	—	—	
9			F.	—	—	—	—	—	—	
10	011	Pulmonary — Pulmonaire	T.	2,495	10	17	26	116	210	
11			M.	1,580	7	8	10	48	105	
12			F.	915	3	9	16	68	105	
13	011.0	Minimal — Minime	T.	828	7	9	14	38	82	
14			M.	474	4	6	3	15	43	
15			F.	354	3	3	11	23	39	
16	011.1	Moderately advanced — Assez avancée	T.	1,000	2	3	8	45	80	
17			M.	651	2	1	5	20	39	
18			F.	349	—	2	3	25	41	
19	011.2	Far advanced — Très avancée	T.	439	—	—	—	18	26	
20			M.	316	—	—	—	5	9	
21			F.	123	—	—	—	13	17	
22	011.3	Stage unspecified — Stade non précisé	T.	167	—	—	4	12	18	
23			M.	101	—	—	2	5	12	
24			F.	66	—	—	2	7	6	
25	011.4	Miliary — Miliaire	T.	55	1	5	—	2	4	
26			M.	32	1	1	—	2	2	
27			F.	23	—	4	—	—	2	
28	011.9	NOS — S.A.I.	T.	6	—	—	—	1	—	
29			M.	6	—	—	—	1	—	
30			F.	—	—	—	—	—	—	
31	012	Other respiratory tuberculosis — Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire.	T.	459	105	102	53	31	43	
32			M.	277	59	62	36	19	24	
33			F.	182	46	40	17	12	19	
34	012.0	Primary — Primaire	T.	273	103	98	48	11	8	
35			M.	160	58	58	32	6	3	
36			F.	113	45	40	16	5	5	
37	012.1	Pleurisy specified as tuberculous — Pleurésie spécifiée comme tuberculeuse.	T.	181	2	4	5	20	35	
38			M.	115	1	4	4	13	21	
39			F.	66	1	—	1	7	14	
40	012.2	Pleurisy with effusion without mention of cause — Pleurésie exsudative sans mention d'étiologie	T.	—	—	—	—	—	—	
41			M.	—	—	—	—	—	—	
42			F.	—	—	—	—	—	—	
43	012.3	Tuberculous laryngitis — Laryngite tuberculeuse	T.	—	—	—	—	—	—	
44			M.	—	—	—	—	—	—	
45			F.	—	—	—	—	—	—	
46	012.9	Other — Autres	T.	5	—	—	—	—	—	
47			M.	2	—	—	—	—	—	
48			F.	3	—	—	—	—	—	
49	013-018.9	Non-respiratory — Non respiratoire	T.	602	15	11	11	12	48	
50			M.	277	8	6	4	4	16	
51			F.	325	7	5	7	8	32	
52	013	Meninges and central nervous system — Méninges et système nerveux central.	T.	23	3	—	1	1	1	
53			M.	13	2	—	—	1	1	
54			F.	10	1	—	1	—	—	
55	013.0	Meningitis — Méningite	T.	22	3	—	1	1	1	
56			M.	13	2	—	—	1	1	
57			F.	9	1	—	1	—	—	
58	013.9	Other — Autres	T.	1	—	—	—	—	—	
59			M.	—	—	—	—	—	—	
60			F.	1	—	—	—	—	—	

TABLEAU 4. Nouveaux cas actifs suivant le diagnostic détaillé, le sexe et le groupe d'âge, 1973

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 and over — et plus	N°
number — nombre											
295	268	244	226	273	269	223	262	208	190	295	1
138	153	137	132	173	192	160	182	137	136	185	2
157	115	107	94	100	77	63	80	71	54	110	3
229	202	181	183	223	222	182	224	176	159	267	4
112	121	111	111	146	167	141	183	120	124	170	5
117	81	70	72	77	53	41	61	56	35	97	6
—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	3	7
—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	3	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
206	187	166	162	211	211	177	215	173	151	257	10
98	111	103	100	139	158	137	158	118	119	161	11
108	76	63	62	72	53	40	57	55	32	96	12
97	63	61	49	68	66	45	73	54	39	63	13
44	34	34	29	42	41	34	49	31	23	42	14
53	29	27	20	26	25	11	24	23	18	21	15
71	76	69	66	91	94	77	78	67	71	102	16
34	44	39	63	71	56	57	47	65	64	17	17
37	32	25	27	28	23	21	21	20	6	38	18
26	34	27	33	36	32	40	57	37	25	48	19
14	25	19	27	25	31	36	46	29	20	30	20
12	9	8	6	11	1	4	11	8	5	18	21
9	9	9	10	12	16	10	6	12	11	29	22
6	4	6	3	6	13	8	5	8	8	15	23
3	5	3	7	6	3	2	1	4	3	14	24
3	4	—	4	3	3	4	1	3	5	13	25
—	3	—	2	2	2	2	1	3	3	8	26
—	3	—	2	1	1	2	—	—	—	5	27
—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	2	28
—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	2	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30
23	15	15	21	12	10	5	8	3	6	7	31
14	10	11	7	7	8	4	4	2	3	6	32
9	5	10	10	5	2	1	4	1	3	1	33
3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	34
2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	35
1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	36
20	15	12	20	12	10	4	8	3	5	6	37
12	10	7	11	7	8	3	4	2	3	5	38
8	5	5	9	5	2	1	4	1	2	1	39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45
—	—	2	—	—	—	1	—	—	1	1	46
—	—	2	—	—	—	1	—	—	1	1	47
—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	48
66	66	63	43	50	47	41	38	32	31	28	49
26	32	21	27	25	19	19	19	17	12	15	50
26	34	37	22	23	22	22	19	19	15	13	51
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	52
2	3	1	2	1	2	2	—	—	1	—	53
1	2	1	1	1	1	—	—	—	2	—	54
2	3	1	1	1	2	—	—	—	3	—	55
1	2	1	1	1	1	—	—	—	1	—	56
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	57
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	58
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	59
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	60

TABLE 4. New Active Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Age Group, 1973 – Concluded

TABLEAU 4. Nouveaux cas actifs suivant le diagnostic détaillé, le sexe et le groupe d'âge, 1973 — fin

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 and over — et plus	N°
number — nombre											
2 1 1	7 3 4	5 1 4	1 — 1	3 3 2	3 2 1	— — —	— — —	1 1 1	2 1 1	2 1 1	3 2 1
3 2 1	1 1 —	3 1 2	3 3 2	6 3 3	8 5 3	7 4 3	9 7 2	7 4 3	7 3 4	5 3 2	4 5 6
— — —	1 1 —	— — —	— — —	3 2 1	2 2 —	5 3 2	2 2 —	1 1 —	3 1 —	1 1 2	7 8 9
1 1	— —	— —	— —	— —	— —	2 1 —	1 1 —	1 1 —	— — —	— — —	10 11 12
— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	13 14 15
— — —	— — —	— — —	— — —	1 1 —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	16 17 18
2 1 1	— — —	1 1 —	1 1 —	1 1 —	4 2 2	— — —	4 3 1	3 2 1	3 2 1	3 2 1	19 20 21
33 13 20	22 12 10	30 12 18	30 18 12	31 18 13	24 11 13	20 10 10	8 4 4	11 6 5	10 2 8	15 8 7	22 23 24
11 5 6	6 4 2	12 7 5	14 11 3	12 9 3	10 4 6	4 3 1	2 2 —	8 5 3	3 — 3	4 3 1	25 26 27
3 1 2	2 1 1	1 1 —	3 1 2	3 1 2	— — —	1 — 1	— — —	— — —	— — —	1 — 1	28 29 30
5 3 2	6 3 3	5 2 3	2 1 1	4 1 3	8 4 4	5 2 3	2 2 —	— — —	— — —	2 — —	31 32 33
14 4 10	8 4 4	12 2 6	11 5 6	12 7 5	6 3 3	10 5 5	4 2 2	2 1 1	4 2 2	10 5 5	34 35 36
25 8 17	33 14 19	24 11 13	7 2 5	9 3 6	10 5 5	14 5 9	17 6 11	12 6 6	9 5 4	5 2 3	37 38 39
— — —	2 — 2	— — —	— — —	— — —	— — —	2 1 1	— — —	— — —	— — —	— — —	40 41 42
24 8 16	29 12 17	20 8 12	7 2 5	7 2 5	8 3 5	10 3 7	14 4 10	9 4 5	9 4 5	5 2 3	43 44 45
— — —	— — —	2 — —	1 — —	1 — —	— — —	1 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	46 47 48
1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	49 50 51
— — —	2 — —	2 — —	2 — —	— — —	1 — —	2 — —	1 — —	3 2 1	3 2 1	— — —	52 53 54
1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	55 56 57
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	58 59 60
1 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	61 62 63
— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	64 65 66

TABLE 5. New Active Cases and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Province, 1973

TABLEAU 5. Nouveaux cas actifs et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et la province, 1973

Age group Groupe d'âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number — Nombre													
Both sexes — Deux sexes													
All ages — Tous âges.....	3,563	166	9	100	72	1,121	1,000	219	171	269	394	3	39
0- 4	130	8	—	2	3	16	36	9	17	26	10	1	2
5- 14	220	10	—	6	4	40	47	37	30	22	22	—	2
15- 24	460	26	—	13	10	133	109	43	30	44	43	1	8
25- 34	563	26	1	12	11	170	182	27	10	44	70	1	9
35- 44	470	20	1	10	8	159	141	19	17	30	57	—	8
45- 54	542	31	1	15	11	215	138	25	12	31	60	—	3
55- 64	485	24	4	15	8	173	145	12	21	27	53	—	3
65- 74	398	11	1	18	7	130	110	22	21	24	51	—	3
75 and over — et plus	295	10	1	9	10	85	92	25	13	21	28	—	1
Male — Masculin													
All ages — Tous âges	2,141	105	4	58	47	712	593	118	90	146	247	1	20
0- 4	74	5	—	1	3	13	20	6	5	15	5	—	1
5- 14	126	7	—	4	2	21	30	18	20	9	13	—	2
15- 24	216	16	—	3	7	59	50	23	15	20	16	1	6
25- 34	291	15	—	5	4	96	85	14	6	26	37	—	3
35- 44	269	14	—	6	3	103	77	8	9	15	33	—	1
45- 54	365	18	—	11	7	154	89	15	6	21	42	—	2
55- 64	342	17	2	13	7	123	106	8	9	14	40	—	3
65- 74	273	7	1	9	6	91	81	13	14	14	36	—	1
75 and over — et plus	185	6	1	6	8	52	55	13	6	12	25	—	1
Female — Féminin													
All ages — Tous âges	1,422	61	5	42	25	409	407	101	81	123	147	2	19
0- 4	56	3	—	1	—	3	16	3	12	11	5	1	1
5- 14	94	3	—	2	2	19	17	19	10	13	9	—	—
15- 24	244	10	—	10	3	74	59	20	15	24	27	—	2
25- 34	272	11	1	7	7	74	97	13	4	18	33	1	6
35- 44	201	6	1	4	5	56	64	11	8	15	24	—	7
45- 54	177	13	1	4	4	61	49	10	6	10	18	—	1
55- 64	143	7	2	2	1	50	39	4	12	13	13	—	—
65- 74	125	4	—	9	1	39	29	9	7	10	15	—	2
75 and over — et plus	110	4	—	3	2	33	37	12	7	9	3	—	—

TABLE 5. New Active Cases and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Province, 1973 — Concluded

TABLEAU 5. Nouveaux cas actifs et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et la province, 1973 — fin

Age group Groupe d'âge	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants													
Both sexes — Deux sexes													
All ages — Tous âges	16.1	30.7	7.8	12.4	11.0	18.4	12.6	21.9	18.8	16.0	17.0	15.2	103.2
0- 4.....	7.3	13.1	—	2.9	5.2	3.6	5.7	10.6	23.1	17.3	5.5	43.5	34.5
5-14.....	5.0	7.5	—	3.6	2.9	3.2	3.1	19.1	16.1	6.2	5.1	—	19.2
15-24.....	11.0	23.1	—	8.3	7.4	11.0	7.6	23.1	17.5	13.8	10.3	32.3	121.2
25-34.....	17.6	37.8	7.4	11.3	13.2	18.4	15.5	20.3	10.0	18.1	20.4	25.6	145.2
35-44.....	18.6	40.1	9.1	12.2	12.7	22.4	14.9	18.4	18.5	15.3	21.3	—	200.0
45-54.....	22.8	68.0	9.5	18.5	17.4	33.3	15.4	23.2	12.0	18.1	23.5	—	115.4
55-64.....	27.1	65.6	40.4	21.2	15.2	36.4	22.5	13.3	24.2	22.0	26.5	—	200.0
65-74.....	34.9	53.1	14.1	40.4	20.5	44.6	26.3	36.9	36.8	31.0	39.8	—	500.0
75 and over — et plus	42.5	78.7	17.5	29.7	44.2	57.5	35.8	62.7	31.7	43.8	31.7	—	1,000.0
Male — Masculin													
All ages — Tous âges	19.4	38.1	6.9	14.4	14.4	23.6	15.0	23.7	19.6	17.1	21.2	9.4	101.0
0- 4.....	8.2	15.9	—	2.9	10.1	5.8	6.2	13.9	13.3	19.5	5.4	—	33.3
5-14.....	5.6	10.3	—	4.7	2.8	3.3	3.8	18.3	21.1	4.9	5.9	—	37.0
15-24.....	10.2	28.2	—	3.8	10.2	9.6	6.9	24.5	17.0	12.4	7.6	66.7	176.5
25-34.....	18.1	43.4	—	9.3	9.3	20.8	14.4	20.7	11.9	21.2	21.2	—	93.8
35-44.....	20.9	53.8	—	14.5	9.5	29.0	16.0	15.3	19.3	14.7	23.5	—	45.5
45-54.....	31.0	75.6	—	27.6	22.5	48.7	20.0	28.6	12.0	24.3	33.2	—	142.9
55-64.....	38.9	88.1	40.0	36.9	26.6	53.9	33.6	18.0	20.5	22.7	41.1	—	375.0
65-74.....	51.4	68.6	28.6	42.1	37.3	69.7	42.7	45.6	48.1	35.6	57.7	—	333.3
75 and over — et plus	66.7	107.1	43.5	49.6	85.1	89.7	58.7	76.5	30.9	53.6	67.2	—	1,000.0
Female — Féminin													
All ages — Tous âges	12.9	23.0	8.7	10.5	7.7	13.4	10.2	20.2	18.1	14.8	12.8	22.0	105.6
0- 4.....	6.5	10.0	—	3.0	—	1.4	5.2	7.2	33.3	15.1	5.6	90.9	35.7
5-14.....	4.4	4.6	—	2.5	2.9	3.2	2.3	20.1	11.0	7.4	4.2	—	—
15-24.....	11.8	17.9	—	13.2	4.5	12.3	8.3	21.8	17.9	15.3	13.2	—	62.5
25-34.....	17.1	32.3	14.9	13.3	17.2	16.0	16.7	19.8	8.1	14.9	19.6	55.6	200.0
35-44.....	16.2	25.1	18.9	9.9	15.9	15.8	13.9	21.6	17.7	16.0	18.8	—	388.9
45-54.....	14.7	59.6	18.9	9.7	12.4	18.5	10.9	18.1	12.0	11.8	14.0	—	83.3
55-64.....	15.7	40.5	40.8	5.6	3.8	20.3	11.9	8.7	28.0	21.3	12.7	—	—
65-74.....	20.5	38.1	—	38.8	5.6	24.2	12.7	28.9	25.0	26.2	22.8	—	666.7
75 and over — et plus	26.4	56.3	—	16.5	15.2	36.7	22.7	52.4	32.4	35.2	5.9	—	—

TABLE 6. New Active Cases and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Diagnosis, 1973
TABLEAU 6. Nouveaux cas actifs et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et le diagnostic, 1973

Age group Groupe d'âge	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire					Non-respiratory — Non respiratoire
		Minimal pulmonary — Pulmonaire, minime	Moderately advanced pulmonary — Pulmonaire, assez avancée	Far advanced pulmonary — Pulmonaire, très avancée	Primary Primaire	Other respiratory ¹ — Autres respiratoires ¹	
		Number — Nombre					
Both sexes — Deux sexes							
All ages — Tous âges	3,563	828	1,000	439	273	421	602
0-4	130	7	2	—	103	3	15
5-14	220	23	11	—	146	18	22
15-24	460	120	125	44	19	92	60
25-34	563	160	147	60	3	61	132
35-44	470	110	135	60	2	57	106
45-54	542	134	185	68	—	58	97
55-64	485	118	155	97	—	36	79
65-74	398	93	138	62	—	42	63
75 and over — et plus	295	63	102	48	—	54	28
Male — Masculin							
All ages — Tous âges	2,141	474	651	316	160	263	277
0-4	74	4	2	—	58	2	8
5-14	126	9	6	—	90	11	10
15-24	216	58	59	14	9	56	20
25-34	291	78	78	39	2	36	58
35-44	269	63	83	46	1	29	47
45-54	365	83	134	56	—	40	52
55-64	342	83	113	82	—	26	38
65-74	273	54	112	49	—	29	29
75 and over — et plus	185	42	64	30	—	34	15
Female — Féminin							
All ages — Tous âges	1,422	354	349	123	113	158	325
0-4	56	3	—	—	45	1	7
5-14	94	14	5	—	56	7	12
15-24	244	62	66	30	10	36	40
25-34	272	82	69	21	1	25	74
35-44	201	47	52	14	1	28	59
45-54	177	51	51	12	—	18	45
55-64	143	35	42	15	—	10	41
65-74	125	39	26	13	—	13	34
75 and over — et plus	110	21	38	18	—	20	13

See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE 6. New Active Cases and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Diagnosis, 1973 — Concluded
TABLEAU 6. Nouveaux cas actifs et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et le diagnostic, 1973 — fin

Age group Groupe d'âge	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire					Non-respiratory — Non respiratoire		
		Minimal pulmonary Pulmonaire, minime	Moderately advanced pulmonary Pulmonaire, assez avancée	Far advanced pulmonary Pulmonaire, très avancée	Primary Primaire	Other respiratory ¹ Autres respiratoires ¹			
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants									
Both sexes — Deux sexes									
All ages — Tous âges	16.1	3.7	4.5	2.0	1.2	1.9	2.7		
0- 4	7.3	0.4	0.1	—	5.8	0.2	0.8		
5-14	5.0	0.5	0.2	—	3.3	0.4	0.5		
15-24	11.0	2.9	3.0	1.1	0.5	2.2	1.4		
25-34	17.6	5.0	4.6	1.9	0.1	1.9	4.1		
35-44	18.6	4.4	5.3	2.4	0.1	2.3	4.2		
45-54	22.8	5.6	7.8	2.9	—	2.4	4.1		
55-64	27.1	6.6	8.7	5.4	—	2.0	4.4		
65-74	34.9	8.2	12.1	5.4	—	3.7	5.5		
75 and over — et plus	42.5	9.1	14.7	6.9	—	7.8	4.0		
Male — Masculin									
All ages — Tous âges	19.4	4.3	5.9	2.9	1.4	2.4	2.5		
0- 4	8.2	0.4	0.2	—	6.4	0.2	0.9		
5-14	5.6	0.4	0.3	—	4.0	0.5	0.4		
15-24	10.2	2.7	2.8	0.7	0.4	2.6	0.9		
25-34	18.1	4.8	4.8	2.4	0.1	2.2	3.6		
35-44	20.9	4.9	6.4	3.6	0.1	2.3	3.7		
45-54	31.0	7.0	11.4	4.8	—	3.4	4.4		
55-64	38.9	9.5	12.9	9.3	—	3.0	4.3		
65-74	51.4	10.2	21.1	9.2	—	5.5	5.5		
75 and over — et plus	66.7	15.2	23.1	10.8	—	12.3	5.4		
Female — Féminin									
All ages — Tous âges	12.9	3.2	3.2	1.1	1.0	1.4	2.9		
0- 4	6.5	0.3	—	—	5.2	0.1	0.8		
5-14	4.4	0.6	0.2	—	2.6	0.3	0.6		
15-24	11.8	3.0	3.2	1.5	0.5	1.7	1.9		
25-34	17.1	5.2	4.3	1.3	0.1	1.6	4.7		
35-44	16.2	3.8	4.2	1.1	0.1	2.3	4.8		
45-54	14.7	4.2	4.2	1.0	—	1.5	3.7		
55-64	15.7	3.8	4.6	1.6	—	1.1	4.5		
65-74	20.5	6.4	4.3	2.1	—	2.1	5.6		
75 and over — et plus	26.4	5.0	9.1	4.3	—	4.8	3.1		

¹ Includes cases with pulmonary stage unspecified. — Y compris les cas avec le stade pulmonaire non précisé.

TABLE 7. New Active Cases and Rate per 100,000 Population by Diagnosis, Sex and Province, 1973

TABLEAU 7. Nouveaux cas actifs et taux pour 100,000 habitants suivant le diagnostic, le sexe et la province, 1973

Diagnosis Diagnostic	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number — Nombre													
Both sexes — Deux sexes													
TOTAL.....	3,563	166	9	100	72	1,121	1,000	219	171	269	394	3	38
Respiratory — Respiratoire	2,961	133	8	86	57	1,014	772	185	144	211	316	—	35
Minimal pulmonary — Pulmonaire, minime.....	828	39	2	12	21	211	298	1	49	57	116	—	22
Moderately advanced pulmonary — Pulmonaire, assez avancée	1,000	48	3	29	5	497	238	—	29	62	81	—	8
Far advanced pulmonary — Pulmo- naire, très avancée	439	23	1	26	4	200	84	1	14	26	60	—	—
Primary — Primaire	273	10	—	10	3	30	62	41	40	42	32	—	3
Other ¹ — Autres ¹	421	13	2	9	24	76	90	142	12	24	27	—	2
Non-respiratory — Non respiratoire....	602	33	1	14	15	107	228	34	27	58	78	3	4
Male — Masculin													
TOTAL.....	2,141	103	4	58	47	712	593	118	90	146	247	1	20
Respiratory — Respiratoire	1,864	87	3	49	39	658	497	105	78	120	210	—	18
Minimal pulmonary — Pulmonaire, minime.....	474	19	1	4	14	114	177	—	26	32	77	—	10
Moderately advanced pulmonary — Pulmonaire, assez avancée	651	31	1	23	4	326	159	—	13	36	54	—	4
Far advanced pulmonary — Pulmo- naire, très avancée	316	18	1	11	4	148	65	1	8	15	45	—	—
Primary — Primaire	160	8	—	6	3	21	35	21	23	25	16	—	2
Other ¹ — Autres ¹	263	11	—	5	14	49	61	83	8	12	18	—	2
Non-respiratory — Non respiratoire....	277	18	1	9	8	54	96	13	12	26	37	1	2
Female — Féminin													
TOTAL.....	1,422	61	5	42	25	409	407	101	81	123	147	2	19
Respiratory — Respiratoire	1,097	46	5	37	18	356	275	80	66	91	106	—	17
Minimal pulmonary — Pulmonaire, minime.....	354	20	1	8	7	97	121	1	23	25	39	—	12
Moderately advanced pulmonary — Pulmonaire, assez avancée	349	17	2	6	1	171	79	—	16	26	27	—	4
Far advanced pulmonary — Pulmo- naire, très avancée	123	5	—	15	—	52	19	—	6	11	15	—	—
Primary — Primaire	113	2	—	4	—	9	27	20	17	17	16	—	1
Other ¹ — Autres ¹	158	2	2	4	10	27	29	59	4	12	9	—	—
Non-respiratory — Non respiratoire....	325	15	—	5	7	53	132	21	15	32	41	2	2

See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE 7. New Active Cases and Rate per 100,000 Population by Diagnosis, Sex and Province, 1973 – Concluded
TABLEAU 7. Nouveaux cas actifs et taux pour 100,000 habitants suivant le diagnostic, le sexe et la province, 1973 – fin

Diagnosis Diagnostic	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Rate per 100,000 population – Taux pour 100,000 habitants													
Both sexes – Deux sexes													
TOTAL	16.1	30.7	7.8	12.4	11.0	18.4	12.6	21.9	18.8	16.0	17.0	15.2	103.2
Respiratory – Respiratoire	13.4	24.6	7.0	10.7	8.7	16.7	9.7	18.5	15.9	12.5	13.7	—	92.6
Minimal pulmonary – Pulmonaire, minime.....	3.7	7.2	1.7	1.5	3.2	3.5	3.8	0.1	5.4	3.4	5.0	—	58.2
Moderately advanced pulmonary – Pulmonaire, assez avancée	4.5	8.9	2.6	3.6	0.8	8.2	3.0	—	3.2	3.7	3.5	—	21.2
Far advanced pulmonary – Pulmonaire, très avancée	2.0	4.3	0.9	3.2	0.6	3.3	1.1	0.1	1.5	1.5	2.6	—	—
Primary – Primaire	1.2	1.8	—	1.2	0.5	0.5	0.8	4.1	4.4	2.5	1.4	—	7.9
Other ¹ – Autres ¹	1.9	2.4	1.7	1.1	3.7	1.2	1.1	14.2	1.3	1.4	1.2	—	5.3
Non-respiratory – Non respiratoire....	2.7	6.1	0.9	1.7	2.3	1.8	2.9	3.4	3.0	3.4	3.4	15.2	10.6
Male – Masculin													
TOTAL	19.4	38.1	6.9	14.4	14.4	23.6	15.0	23.7	19.6	17.1	21.2	9.4	101.0
Respiratory – Respiratoire	16.9	31.6	5.2	12.1	11.9	21.8	12.6	21.1	16.9	14.0	18.0	—	90.9
Minimal pulmonary – Pulmonaire, minime.....	4.3	6.9	1.7	1.0	4.3	3.8	4.5	—	5.6	3.7	6.6	—	50.5
Moderately advanced pulmonary – Pulmonaire, assez avancée	5.9	11.3	1.7	5.7	1.2	10.8	4.0	—	2.8	4.2	4.6	—	20.2
Far advanced pulmonary – Pulmonaire, très avancée	2.9	6.5	1.7	2.7	1.2	4.9	1.6	0.2	1.7	1.8	3.9	—	—
Primary – Primaire	1.4	2.9	—	1.5	0.9	0.7	0.9	4.2	5.0	2.9	1.4	—	10.1
Other ¹ – Autres ¹	2.4	4.0	—	1.2	4.3	1.6	1.5	16.7	1.7	1.4	1.5	—	10.1
Non-respiratory – Non respiratoire....	2.5	6.5	1.7	2.2	2.4	1.8	2.4	2.6	2.6	3.0	3.2	9.4	10.1
Female – Féminin													
TOTAL	12.9	23.0	8.7	10.5	7.7	13.4	10.2	20.2	18.1	14.8	12.8	22.0	105.6
Respiratory – Respiratoire	9.9	17.3	8.7	9.2	5.5	11.6	6.9	16.0	14.7	11.0	9.2	—	94.4
Minimal pulmonary – Pulmonaire, minime.....	3.2	7.5	1.7	2.0	2.2	3.2	3.0	0.2	5.1	3.0	3.4	—	66.7
Moderately advanced pulmonary – Pulmonaire, assez avancée	3.2	6.4	3.5	1.5	0.3	5.6	2.0	—	3.6	3.1	2.3	—	22.2
Far advanced pulmonary – Pulmonaire, très avancée	1.1	1.9	—	3.7	—	1.7	0.5	—	1.3	1.3	1.3	—	—
Primary – Primaire	1.0	0.8	—	1.0	—	0.3	0.7	4.0	3.8	2.1	1.4	—	5.6
Other ¹ – Autres ¹	1.4	0.8	3.5	1.0	3.1	0.9	0.7	11.8	0.9	1.4	0.8	—	—
Non-respiratory – Non respiratoire....	2.9	5.6	—	1.2	2.2	1.7	3.3	4.2	3.3	3.9	3.6	22.0	11.1

¹ Includes cases with pulmonary stage unspecified. — Y compris les cas avec le stade pulmonaire non précisé.

**TABLE 8. New Active Pulmonary Cases and Percentage Distribution by Previous History and Province,
Age, Origin and Sex, 1973**

**TABLEAU 8. Nouveaux cas actifs pulmonaires et répartition procentuelle suivant les antécédents et la province,
l'âge, l'origine et le sexe, 1973**

Previous history Antécédent	Province												
	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
TOTAL¹	2,267	110	6	67	30	908	620	2	92	145	257	—	30
X-rays not taken or available — Aucune radiographie prise ou disponible	1,559	52	2	42	27	771	434	1	4	85	131	—	10
X-rays available — Radiographies disponibles	708	58	4	25	3	137	186	1	88	60	126	—	20
X-rays normal — Radiographies normales	371	22	2	11	1	52	139	—	46	23	62	—	13
X-ray abnormality attributed to presumed tuberculosis inactive — Radiographie anormale due à la tuberculose présumée inactive	189	24	1	8	1	17	47	—	37	29	23	—	2
Other X-ray lung abnormality — Autre radiographie anormale du poumon	148	12	1	6	1	68	—	1	5	8	41	—	5
Age — Âge													
	Total	0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75 and over — et plus			
TOTAL¹	2,267	9	34	289	367	305	387	370	293	213			
X-rays not taken or available — Aucune radiographie prise ou disponible	1,559	7	27	181	248	212	278	250	194	162			
X-rays available — Radiographies disponibles	708	2	7	108	119	93	109	120	99	51			
X-rays normal — Radiographies normales	371	2	5	81	81	55	53	51	33	10			
X-ray abnormality attributed to presumed tuberculosis inactive — Radiographie anormale due à la tuberculose présumée inactive	189	—	1	8	17	22	33	39	41	28			
Other X-ray lung abnormality — Autre radiographie anormale du poumon	148	—	1	19	21	16	23	30	25	13			
Origin — Origine													
	Total			Indian — Indiens			Eskimo — Esquimaux			Other — Autres			
	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	
TOTAL¹	2,267	1,441	826	188	99	89	43	22	21	2,036	1,320	716	
X-rays not taken or available — Aucune radiographie prise ou disponible	1,559	1,001	558	101	55	46	24	11	13	1,434	935	499	
X-rays available — Radiographies disponibles	708	440	268	87	44	43	19	11	8	602	385	217	
X-rays normal — Radiographies normales	371	229	142	47	22	25	9	4	5	315	203	112	
X-ray abnormality attributed to presumed tuberculosis inactive — Radiographie anormale due à la tuberculose présumée inactive	189	122	67	25	14	11	4	3	1	160	105	55	
Other X-ray lung abnormality — Autre radiographie anormale du poumon	148	89	59	15	8	7	6	4	2	127	77	50	

¹ Minimal, moderately advanced and far advanced cases only. — Les cas qui ont la tuberculose minime, assez avancée et très avancée seulement.

**TABLE 8. New Active Pulmonary Cases and Percentage Distribution by Previous History and Province,
Age, Origin and Sex, 1973 – Concluded**

**TABLEAU 8. Nouveaux cas actifs pulmonaires et répartition procentuelle suivant les antécédents et la province,
l'âge, l'origine et le sexe, 1973 – fin**

Previous history Antécédent	Province												
	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	100
X-rays not taken or available – Aucune radiographie prise ou disponible.....	69	47	33	63	90	85	70	50	4	59	51	—	33
X-rays available – Radiographies disponibles.....	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	100
X-rays normal – Radiographies normales	52	38	50	44	34	38	75	—	52	38	49	—	65
X-ray abnormality attributed to presumed tuberculosis inactive – Radiographie anormale due à la tuberculose présumée inactive	27	41	25	32	33	12	25	—	42	49	18	—	10
Other X-ray lung abnormality – Autre radiographie anormale du poumon	21	21	25	24	33	50	—	100	6	13	33	—	26
Age – Âge													
	Total	0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75 and over — et plus			
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	100
X-rays not taken or available – Aucune radiographie prise ou disponible.....	69	78	79	63	68	70	72	68	66	66	76	—	76
X-rays available – Radiographies disponibles.....	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	100
X-rays normal – Radiographies normales	52	100	72	75	68	59	49	43	33	33	20	—	20
X-ray abnormality attributed to presumed tuberculosis inactive – Radiographie anormale due à la tuberculose présumée inactive	27	—	14	7	14	24	30	32	42	42	55	—	55
Other X-ray lung abnormality – Autre radiographie anormale du poumon	21	—	14	18	18	17	21	25	25	25	25	—	25
Origin – Origine													
	Total			Indian – Indiens			Eskimo – Esquimaux			Other – Autres			
	T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F	
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—
X-rays not taken or available – Aucune radiographie prise ou disponible.....	69	69	68	54	56	52	56	50	62	70	71	70	—
X-rays available – Radiographies disponibles.....	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—
X-rays normal – Radiographies normales	52	52	53	54	50	58	47	36	63	52	53	52	—
X-ray abnormality attributed to presumed tuberculosis inactive – Radiographie anormale due à la tuberculose présumée inactive	27	28	25	29	32	26	21	28	12	27	27	25	—
Other X-ray lung abnormality – Autre radiographie anormale du poumon	21	20	22	17	18	18	32	36	25	21	20	23	—

TABLE 9. New Active Cases and Percentage distribution by Origin, Sex and Province, 1973
TABLEAU 9. Nouveaux cas actifs et répartition procentuelle suivant l'origine, le sexe et la province, 1973

Origin -- Origine	Canada	Nfld. -- T.-N.	P.E.I. -- I. P.-É.	N.S. -- N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. -- Alb.	B.C. -- C.-B.	Yukon	N.W.T. -- T. N.-O.
Both sexes — Deux sexes													
TOTAL	3,563	166	9	100	72	1,121	1,000	219	171	269	394	3	39
Indian — Indiens	468	2	—	1	4	30	94	97	66	115	45	2	12
Eskimo — Esquimaux	49	3	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	18
Other — Autres	3,046	161	9	99	68	1,063	906	122	105	154	349	1	9
Percentage of total number of cases — Pourcentage du nombre total de cas:													
Indian — Indiens	13.1	1.2	—	1.0	5.6	2.7	9.4	44.3	38.6	42.8	11.4	66.7	30.8
Eskimo — Esquimaux	1.4	1.8	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	46.2
Percentage of total population ¹ — Pourcentage de la population totale ¹ :													
Indian — Indiens	1.4	0.2	0.3	0.6	0.6	0.5	0.8	4.4	4.4	2.7	2.4	14.0	20.6
Eskimo — Esquimaux	0.1	0.2	—	--	--	0.1	--	--	--	--	--	0.1	32.7
Male — Masculin													
TOTAL	2,141	105	4	58	47	712	593	118	90	146	247	1	20
Indian — Indiens	251	1	—	1	4	18	59	50	36	56	21	—	5
Eskimo — Esquimaux	25	2	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	9
Other — Autres	1,865	102	4	57	43	680	534	68	54	90	226	1	6
Percentage of total number of cases — Pourcentage du nombre total de cas:													
Indian — Indiens	11.7	1.0	—	1.7	8.5	2.5	9.9	42.4	40.0	38.4	8.5	—	25.0
Eskimo — Esquimaux	1.2	1.9	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	45.0
Percentage of total population ¹ — Pourcentage de la population totale ¹ :													
Indian — Indiens	1.4	0.2	0.3	0.6	0.6	0.5	0.8	4.4	4.4	2.7	2.4	12.7	19.9
Eskimo — Esquimaux	0.1	0.2	—	--	--	0.1	--	--	--	--	--	0.1	31.5
Female — Féminin													
TOTAL	1,422	61	5	42	25	409	407	101	81	123	147	2	19
Indian — Indiens	217	1	—	—	—	12	35	47	30	59	24	2	7
Eskimo — Esquimaux	24	1	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	9
Other — Autres	1,181	59	5	42	25	383	372	54	51	64	123	—	3
Percentage of total number of cases — Pourcentage du nombre total de cas:													
Indian — Indiens	15.3	1.6	—	—	—	2.9	8.6	46.5	37.0	48.0	16.3	100.0	36.8
Eskimo — Esquimaux	1.7	1.6	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	47.4
Percentage of total population ¹ — Pourcentage de la population totale ¹ :													
Indian — Indiens	1.4	0.2	0.3	0.6	0.6	0.5	0.8	4.3	4.4	2.8	2.4	15.5	21.5
Eskimo — Esquimaux	0.1	0.2	—	--	--	0.1	--	--	--	--	--	—	34.1

¹ Indian and Eskimo populations as percentage of the total population taken from 1971 Census. — Populations des indiens et des esquimaux exprimées, comme pourcentage de la population totale, d'après le recensement de 1971.

TABLE 10. New Active Cases and Percentage distribution by Origin and Age Group, 1973

TABLEAU 10. Nouveaux cas actifs et répartition procentuelle suivant l'origine et le groupe d'âge, 1973

Origin -- Origine	All ages — Tous âges	0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75 and over — et plus
TOTAL	3,563	130	220	460	563	470	542	485	398	295
Indian — Indiens	468	61	93	84	74	58	27	31	24	16
Eskimo — Esquimaux	49	—	8	10	14	10	3	3	1	—
Other — Autres	3,046	69	119	366	475	402	512	451	373	279
Percentage distribution of cases — Répartition procentuelle des cas:										
Indian — Indiens	100.0	13.0	19.9	18.0	15.8	12.4	5.8	6.6	5.1	3.4
Eskimo — Esquimaux	100.0	—	16.3	20.4	28.6	20.4	6.1	6.1	2.1	—
Other — Autres	100.0	2.3	3.9	12.0	15.6	13.2	16.8	14.8	12.2	9.2
Percentage distribution of population ¹ — Répartition procentuelle de la population ¹ :										
Indian — Indiens	100.0	15.6	29.2	19.3	12.1	8.7	6.0	4.5	3.0	1.6
Eskimo — Esquimaux	100.0	17.9	30.0	17.8	12.5	10.1	6.0	3.5	1.7	0.5
Other — Autres	100.0	8.3	21.1	18.5	13.4	11.8	10.7	8.1	5.0	3.1

¹ Percentage distribution of Indian and Eskimo populations by age group based on 1971 Census. — Répartition procentuelle des populations d'Indiens et d'esquimaux, suivant le groupe d'âge, d'après le recensement de 1971.

TABLE 11. New Active Cases and Percentage Distribution by Diagnosis and Origin, 1973

TABLEAU 11. Nouveaux cas actifs et répartition procentuelle suivant le diagnostic et l'origine, 1973

Diagnosis — Diagnostic	Total	Indian — Indiens	Eskimo — Esquimaux	Others — Autres
		Number — Nombre		
TOTAL	3,563	468	49	3,046
Respiratory — Respiratoire	2,961	396	46	2,519
Minimal pulmonary — Pulmonaire, minime	828	77	26	725
Moderately advanced pulmonary — Pulmonaire, assez avancée	1,000	82	15	903
Far advanced pulmonary — Pulmonaire, très avancée	439	29	2	408
Primary — Primaire	273	125	2	146
Other ¹ — Autres ¹	421	83	1	337
Non-respiratory — Non respiratoire	602	72	3	527
Percentage distribution — Répartition procentuelle				
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
Respiratory — Respiratoire	83.1	84.6	93.9	82.7
Minimal pulmonary — Pulmonaire, minime	23.2	16.5	53.1	23.8
Moderately advanced pulmonary — Pulmonaire, assez avancée	28.1	17.5	30.6	29.6
Far advanced pulmonary — Pulmonaire, très avancée	12.3	6.2	4.1	13.4
Primary — Primaire	7.7	26.7	4.1	4.8
Other ¹ — Autres ¹	11.8	17.7	2.0	11.1
Non-respiratory — Non respiratoire	16.9	15.4	6.1	17.3

¹ Includes cases with pulmonary stage unspecified. — Y compris les cas avec le stade pulmonaire non précisé.

TABLE 12. New Active Cases, Bacillary Status by Province, 1973
TABLEAU 12. Nouveaux cas actifs, état bacillaire par province, 1973

Bacillary status — État bacillaire	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Number of new active cases notified — Nombre de nouveaux cas actifs déclarés	3,563	166	9	100	72	1,121	1,000	219	171	269	394	3	39
Bacillary status determinations reported — Déterminations de l'état bacillaire rapportées	2,900	157	9	80	67	810	785	216	151	251	335	3	36
Positive on microscopy ¹ — Positif par microscope ¹	1,542	72	3	28	43	490	500	90	63	83	158	1	11
Positive on culture only ² — Positif par culture seulement ²	374	37	4	3	8	90	8	56	24	55	71	1	17
Positive on culture ³ — Positif par culture ³	375	—	1	37	1	25	195	14	23	25	49	1	4
Negative ⁴ — Négatif ⁴	609	48	1	12	15	205	82	56	41	88	57	—	4
No determination reported — Pas de détermination rapportée	663	9	—	20	5	311	215	3	20	18	59	—	3
Percentage distribution — Répartition procentuelle													
Number of new active cases notified — Nombre de nouveaux cas actifs déclarés	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Bacillary status determinations reported — Déterminations de l'état bacillaire rapportées	81	95	100	80	93	72	78	99	88	93	85	100	92
Positive on microscopy ¹ — Positif par microscope ¹	43	44	33	28	60	44	50	41	37	31	40	34	28
Positive on culture only ² — Positif par culture seulement ²	10	22	45	3	11	8	1	26	14	20	18	33	44
Positive on culture ³ — Positif par culture ³	11	—	11	37	1	2	19	6	13	9	12	33	10
Negative ⁴ — Négatif ⁴	17	29	11	12	21	18	8	26	24	33	15	—	10
No determination reported — Pas de détermination rapportée	19	5	—	20	7	28	22	1	12	7	15	—	8
Percentage distribution — Répartition procentuelle													
Bacillary status determinations reported — Déterminations de l'état bacillaire rapportées	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Positive on microscopy ¹ — Positif par microscope ¹	53	46	33	35	65	61	64	42	42	33	47	34	31
Positive on culture only ² — Positif par culture seulement ²	13	23	45	4	12	11	1	26	16	22	21	33	47
Positive on culture ³ — Positif par culture ³	13	—	11	46	1	3	25	6	15	10	15	33	11
Negative ⁴ — Négatif ⁴	21	31	11	15	22	25	10	26	27	35	17	—	11

¹ Culture positive, negative or not done. — Culture positive, négative ou non réalisée.

² Negative microscopy. — Microscopie négative.

³ Microscopy not done. — Microscopie non réalisée.

⁴ Microscopy negative; culture not done. — Microscopie négative; culture non réalisée.

Microscopy negative; culture negative. — Microscopie négative; culture négative.

Microscopy not done; culture negative. — Microscopie non réalisée; culture négative.

TABLE 13. New Active Cases, Bacillary Status, by Diagnosis and by Origin, 1973
TABLEAU 13. Nouveaux cas actifs, état bacillaire, par le diagnostic et par l'origine, 1973

Bacillary status Etat bacillaire	Diagnosis — Diagnostic							Origin — Origine		
	Total	Respiratory — Respiratoire					Non respiratory — Non respiratoire	Indian Indiens	Eskimo Esquimaux	Other Autres
		Minimal pulmonary — Pulmonaire, minime	Mod. advanced pulmonary — Pulmonaire, assez avancée	Far advanced pulmonary — Pulmonaire, très avancée	Primary — Primaire	Other ¹ — Autres ¹				
Number of new active cases notified — Nombre de nouveaux cas actifs déclarés.....	3,563	828	1,000	439	273	421	602	468	49	3,046
Bacillary status determinations reported — Déterminations de l'état bacillaire rapportées.....	2,900	674	859	393	180	334	460	420	48	2,432
Positive on microscopy ² — Positif par microscopie ³	1,542	276	545	346	29	150	196	169	27	1,346
Positive on culture only ³ — Positif par culture seulement ³	374	127	96	14	24	58	55	69	10	295
Positive on culture ⁴ — Positif par culture ⁴	375	103	59	15	27	35	136	53	2	320
Negative ⁵ — Négatif ⁵	609	168	159	18	100	91	73	129	9	471
No determination reported — Pas de détermination rapportée.....	663	154	141	46	93	87	142	48	1	614
Percentage distribution — Répartition procentuelle										
Number of new active cases notified — Nombre de nouveaux cas actifs déclarés.....	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Bacillary status determinations reported — Déterminations de l'état bacillaire rapportées.....	81	81	86	90	66	79	76	90	98	80
Positive on microscopy ² — Positif par microscopie ³	43	34	54	79	10	36	32	36	55	44
Positive on culture only ³ — Positif par culture seulement ³	10	15	10	3	9	14	9	15	21	10
Positive on culture ⁴ — Positif par culture ⁴	11	12	6	4	10	8	23	11	4	11
Negative ⁵ — Négatif ⁵	17	20	16	4	37	21	12	28	18	15
No determination reported — Pas de détermination rapportée.....	19	19	14	10	34	21	24	10	2	20
Percentage distribution — Répartition procentuelle										
Bacillary status determinations reported — Déterminations de l'état bacillaire rapportées.....	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Positive on microscopy ² — Positif par microscopie ³	53	41	63	88	16	45	43	40	56	55
Positive on culture only ³ — Positif par culture seulement ³	13	19	11	3	13	17	12	16	21	12
Positive on culture ⁴ — Positif par culture ⁴	13	15	7	4	15	11	29	13	4	13
Negative ⁵ — Négatif ⁵	21	25	19	5	56	27	16	31	19	20

¹ Includes cases with pulmonary stage unspecified. — Y compris les cas avec le stade pulmonaire non précisé.

² Culture positive, negative or not done. — Culture positive, négative ou non réalisée.

³ Negative microscopy. — Microscopie négative.

⁴ Microscopy not done. — Microscopie non réalisée.

⁵ Microscopy negative; culture not done. — Microscopie négative; culture non réalisée.

Microscopy negative; culture negative. — Microscopie négative; culture négative.

Microscopy not done; culture negative. — Microscopie non réalisée; culture négative.

**TABLE 14. New Active Cases and Percentage Distribution by Origin and Method of Determination of Bacillary Status,
by Province, 1973**

No.	Origin and method	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.
Number of cases — Nombre de cas							
1	Number of new active cases reported	3,563	166	9	100	72	1,121
	Determination:						
2	By microscopy and culture	2,292	155	7	33	64	637
3	By microscopy only	179	2	1	3	2	145
4	By culture only	429	—	1	44	1	28
5	No determination reported	663	9	—	20	5	311
6	Indian	468	2	—	1	4	30
	Determination:						
7	By microscopy and culture	331	2	—	—	4	14
8	By microscopy only	17	—	—	—	—	4
9	By culture only	72	—	—	1	—	—
10	No determination reported	48	—	—	—	—	12
11	Eskimo	49	3	—	—	—	28
	Determination:						
12	By microscopy and culture	43	3	—	—	—	24
13	By microscopy only	3	—	—	—	—	3
14	By culture only	2	—	—	—	—	—
15	No determination reported	1	—	—	—	—	1
16	Other	3,046	161	9	99	68	1,063
	Determination:						
17	By microscopy and culture	1,918	150	7	33	60	599
18	By microscopy only	159	2	1	3	2	138
19	By culture only	355	—	1	43	1	28
20	No determination reported	614	9	—	20	5	298
Percentage distribution — Répartition procentuelle							
21	Number of new active cases reported	100	100	100	100	100	100
	Determination:						
22	By microscopy and culture	64	93	78	33	89	57
23	By microscopy only	5	1	11	3	3	13
24	By culture only	12	—	11	44	1	2
25	No determination reported	19	6	—	20	7	28
26	Indian	100	100	—	100	100	100
	Determination:						
27	By microscopy and culture	71	100	—	—	100	47
28	By microscopy only	4	—	—	—	—	13
29	By culture only	15	—	—	100	—	—
30	No determination reported	10	—	—	—	—	40
31	Eskimo	100	100	—	—	—	100
	Determination:						
32	By microscopy and culture	88	100	—	—	—	86
33	By microscopy only	6	—	—	—	—	11
34	By culture only	4	—	—	—	—	—
35	No determination reported	2	—	—	—	—	3
36	Other	100	100	100	100	100	100
	Determination:						
37	By microscopy and culture	63	93	78	33	88	56
38	By microscopy only	5	1	11	3	3	13
39	By culture only	12	—	11	44	2	3
40	No determination reported	20	6	—	20	7	28

TABLEAU 14. Nouveaux cas actifs et répartition procentuelle suivant l'origine et la méthode de détermination d'état bacillaire, selon la province, 1973

Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	Origine et méthode	N°
Number of cases — Nombre de cas								
1,000	219	171	269	394	3	39	Nombre total des nouveaux cas actifs rapportés	1
586	191	104	211	270	2	32	Détermination:	
2	5	5	14	—	—	—	Par la microscopie et la culture	2
197	20	42	26	65	1	4	Par la microscopie seulement	3
215	3	20	18	59	—	3	Par la culture seulement	4
94	97	66	115	45	2	12	Pas de détermination rapportée	5
65	84	30	93	27	2	10	Indiens	6
—	3	2	8	—	—	—	Détermination:	
16	10	28	6	11	—	—	Par la microscopie et la culture	7
13	—	6	8	7	—	2	Par la microscopie seulement	8
—	—	—	—	—	—	—	Par la culture seulement	9
—	—	—	—	—	—	—	Pas de détermination rapportée	10
—	—	—	—	—	—	18	Esquimaux	11
—	—	—	—	—	—	16	Détermination:	
—	—	—	—	—	—	—	Par la microscopie et la culture	12
—	—	—	—	—	—	—	Par la microscopie seulement	13
—	—	—	—	—	—	2	Par la culture seulement	14
—	—	—	—	—	—	—	Pas de détermination rapportée	15
906	122	105	154	349	1	9	Autres	16
521	107	74	118	243	—	6	Détermination:	
2	2	3	6	—	—	—	Par la microscopie et la culture	17
181	10	14	20	54	1	2	Par la microscopie seulement	18
202	3	14	10	52	—	1	Par la culture seulement	19
Percentage distribution — Répartition procentuelle								
100	100	100	100	100	100	100	Nombre total des nouveaux cas actifs rapportés	21
59	87	61	78	69	67	82	Détermination:	
--	2	3	5	—	—	—	Par la microscopie et la culture	22
20	9	24	10	16	33	10	Par la microscopie seulement	23
21	2	12	7	15	—	8	Par la culture seulement	24
100	100	100	100	100	100	100	Pas de détermination rapportée	25
69	87	46	81	60	100	83	Indiens	26
—	3	3	7	—	—	—	Détermination:	
17	10	42	5	24	—	—	Par la microscopie et la culture	27
14	—	9	7	16	—	17	Par la microscopie seulement	28
—	—	—	—	—	—	—	Par la culture seulement	29
—	—	—	—	—	—	—	Pas de détermination rapportée	30
100	100	100	100	100	100	100	Esquimaux	31
—	—	—	—	—	—	89	Détermination:	
—	—	—	—	—	—	—	Par la microscopie et la culture	32
—	—	—	—	—	—	—	Par la microscopie seulement	33
—	—	—	—	—	—	11	Par la culture seulement	34
—	—	—	—	—	—	—	Pas de détermination rapportée	35
100	100	100	100	100	100	100	Autres	36
58	88	71	77	70	—	67	Détermination:	
--	2	3	4	—	—	—	Par la microscopie et la culture	37
20	8	13	13	15	100	22	Par la microscopie seulement	38
22	2	13	6	15	—	11	Par la culture seulement	39
							Pas de détermination rapportée	40

**TABLE 15. New Active Cases and Percentage Distribution by Diagnosis and Method of Determination of Bacillary Status,
by Province, 1973**

No.	Diagnosis and method	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number of cases — Nombre de cas														
1	Number of new active cases reported.....	3,563	166	9	100	72	1,121	1,000	219	171	269	394	3	39
	Determination:													
2	By microscopy and culture	2,292	155	7	33	64	637	586	191	104	211	270	2	32
3	By microscopy only	179	2	1	3	2	145	2	5	5	14	—	—	—
4	By culture only	429	—	1	44	1	28	197	20	42	26	65	1	4
5	No determination reported	663	9	—	20	5	311	215	3	20	18	59	—	3
6	Pulmonary, minimal	828	39	2	12	21	211	298	1	49	57	116	—	22
	Determination:													
7	By microscopy and culture	523	37	2	1	21	106	160	1	40	48	86	—	21
8	By microscopy only	39	—	—	—	—	35	1	—	1	2	—	—	—
9	By culture only	112	—	—	10	—	4	64	—	5	1	27	—	1
10	No determination reported	154	2	—	1	—	66	73	—	3	6	3	—	—
11	Pulmonary, moderately advanced	1,000	48	3	29	5	497	238	—	29	62	81	—	8
	Determination:													
12	By microscopy and culture	719	48	3	13	5	302	184	—	27	56	73	—	8
13	By microscopy only	78	—	—	—	—	77	—	—	—	1	—	—	—
14	By culture only	62	—	—	15	—	10	28	—	—	4	5	—	—
15	No determination reported	141	—	—	1	—	108	26	—	2	1	3	—	—
16	Pulmonary, far advanced	439	23	1	26	4	200	84	1	14	26	60	—	—
	Determination:													
17	By microscopy and culture	367	23	1	12	4	148	82	1	14	26	56	—	—
18	By microscopy only	11	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—
19	By culture only	15	—	—	10	—	2	—	—	—	—	3	—	—
20	No determination reported	46	—	—	4	—	39	2	—	—	—	1	—	—
21	Primary	273	10	—	10	3	30	62	41	40	42	32	—	3
	Determination:													
22	By microscopy and culture	117	6	—	2	—	15	22	32	3	30	7	—	—
23	By microscopy only	11	—	—	1	—	5	—	1	—	4	—	—	—
24	By culture only	52	—	—	—	—	—	10	8	32	—	2	—	—
25	No determination reported	93	4	—	7	3	10	30	—	5	8	23	—	3
26	Other respiratory ¹	421	13	2	9	24	76	90	142	12	24	27	—	2
	Determination:													
27	By microscopy and culture	270	12	—	2	21	24	40	132	8	19	11	—	1
28	By microscopy only	19	—	1	—	1	11	1	3	1	1	—	—	—
29	By culture only	45	—	1	3	1	4	16	5	—	3	11	—	1
30	No determination reported	87	1	—	4	1	37	33	2	3	1	5	—	—
31	Non respiratory	602	33	1	14	15	107	228	34	27	58	78	3	4
	Determination:													
32	By microscopy and culture	296	29	1	3	13	42	98	25	12	32	37	2	2
33	By microscopy only	21	2	—	2	1	6	—	1	3	6	—	—	—
34	By culture only	143	—	—	6	—	8	79	7	5	18	17	1	2
35	No determination reported	142	2	—	3	1	51	51	1	7	2	24	—	—

¹ Includes cases with pulmonary stage unspecified.

TABLEAU 15. Nouveaux cas actifs et répartition procentuelle suivant le diagnostic et la méthode de détermination, selon la province, 1973

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Diagnostic et méthode	N°
Percentage distribution — Répartition procentuelle														
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Nombre total des nouveaux cas actifs rapportés	1
													Détermination:	
64	93	78	33	89	57	59	87	61	78	69	67	82	Par la microscopie et la culture	2
5	1	11	3	3	13	--	2	3	5	--	--	--	Par la microscopie seulement	3
12	—	11	44	1	2	20	9	24	10	16	33	10	Par la culture seulement	4
19	6	—	20	7	28	21	2	12	7	15	—	8	Pas de détermination rapportée	5
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	100	Pulmonaire, minime	6
													Détermination:	
63	95	100	8	100	50	54	100	82	84	74	—	95	Par la microscopie et la culture	7
5	—	—	—	—	17	--	—	2	3	—	—	—	Par la microscopie seulement	8
13	—	—	84	—	2	21	—	10	2	23	—	5	Par la culture seulement	9
19	5	—	8	—	31	25	—	6	11	3	—	—	Pas de détermination rapportée	10
100	100	100	100	100	100	100	—	100	100	100	—	100	Pulmonaire, assez avancée	11
													Détermination:	
72	100	100	45	100	61	77	—	93	90	90	—	100	Par la microscopie et la culture	12
8	—	—	—	—	15	—	—	—	2	—	—	—	Par la microscopie seulement	13
6	—	—	52	—	2	12	—	—	6	6	—	—	Par la culture seulement	14
14	—	—	3	—	22	11	—	7	2	4	—	—	Pas de détermination rapportée	15
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	Pulmonaire, très avancée	16
													Détermination:	
84	100	100	46	100	74	98	100	100	100	93	—	—	Par la microscopie et la culture	17
3	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	Par la microscopie seulement	18
3	—	—	39	—	1	—	—	—	—	5	—	—	Par la culture seulement	19
10	—	—	15	—	20	2	—	—	—	2	—	—	Pas de détermination rapportée	20
100	100	—	100	100	100	100	100	100	100	100	—	100	Primaire	21
													Détermination:	
43	60	—	20	—	50	36	78	8	71	22	—	—	Par la microscopie et la culture	22
4	—	—	10	—	17	—	2	—	10	—	—	—	Par la microscopie seulement	23
19	—	—	—	—	—	16	20	80	—	6	—	—	Par la culture seulement	24
34	40	—	70	100	33	48	—	12	19	72	—	100	Pas de détermination rapportée	25
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—	100	Autres respiratoires ¹	26
													Détermination:	
64	92	—	22	88	32	44	93	67	79	41	—	50	Par la microscopie et la culture	27
4	—	50	—	4	14	1	2	8	4	—	—	—	Par la microscopie seulement	28
11	—	50	33	4	5	18	4	—	13	41	—	50	Par la culture seulement	29
21	8	—	45	4	49	37	1	25	4	18	—	—	Pas de détermination rapportée	30
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Non respiratoire	31
													Détermination:	
49	88	100	22	86	39	43	73	44	55	47	67	50	Par la microscopie et la culture	32
3	6	—	14	7	6	—	3	11	10	—	—	—	Par la microscopie seulement	33
24	—	—	42	—	7	35	21	19	31	22	33	50	Par la culture seulement	34
24	6	—	22	7	48	22	3	26	4	31	—	—	Pas de détermination rapportée	35

¹ Y compris les cas avec le stade pulmonaire non précisé.

TABLE 16. New Active Cases by Number Testing Positive Bacillary, Diagnosis and Province, 1973
TABLEAU 16. Nouveaux cas actifs suivant le nombre à bacilles positifs, le diagnostic et la province, 1973

Diagnosis — Diagnostic	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Number of cases notified — Nombre de cas déclarés	3,563	166	9	100	72	1,121	1,000	219	171	269	394	3	39
Number reported positive bacillary — Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	2,291	109	8	68	52	605	703	160	110	163	278	3	32
Bacillary as percentage of cases notified — Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	64.3	65.7	88.9	68.0	72.2	54.0	70.3	73.1	64.3	60.6	70.6	100.0	82.1
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants:													
Cases notified — Cas déclarés	16.1	30.7	7.8	12.4	11.0	18.4	12.6	21.9	18.8	16.0	17.0	15.2	103.2
Bacillary cases — Cas bacillaires	10.4	20.2	7.0	8.4	8.0	9.9	8.9	16.0	12.1	9.7	12.0	15.2	84.7
Pulmonary — Pulmonaire:													
Minimal, number of cases notified — Minimum, nombre de cas déclarés	828	39	2	12	21	211	298	1	49	57	116	—	22
Number reported positive bacillary — Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	506	16	2	9	14	95	195	1	35	27	93	—	19
Bacillary as percentage of cases notified — Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	61.1	41.0	100.0	75.0	66.7	45.0	65.4	100.0	71.4	47.4	80.2	—	86.4
Moderately advanced, number of cases notified — Assez avancée, nombre de cas déclarés	-												
1,000	48	3	29	5	497	238	—	29	62	81	—	—	8
Number reported positive bacillary — Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	700	34	3	27	5	286	193	—	24	48	73	—	7
Bacillary as percentage of cases notified — Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	70.0	70.8	100.0	93.1	100.0	57.5	81.1	—	82.8	77.4	90.1	—	87.5
Far advanced, number of cases notified — Très avancée, nombre de cas déclarés	439	23	1	26	4	200	84	1	14	26	60	—	—
Number reported positive bacillary — Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	375	21	1	21	4	147	81	1	14	26	59	—	—
Bacillary as percentage of cases notified — Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	85.4	91.3	100.0	80.8	100.0	73.5	96.4	100.0	100.0	100.0	98.3	—	—
Primary, number of cases notified — Primaire, nombre de cas déclarés	273	10	—	10	3	30	62	41	40	42	32	—	3
Number reported positive bacillary — Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	80	3	—	2	—	10	24	15	16	7	3	—	—
Bacillary as percentage of cases notified — Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	29.3	30.0	—	20.0	—	33.3	38.7	36.6	40.0	16.7	9.4	—	—
Other respiratory, ¹ number of cases notified — Autres respiratoires ¹ , nombre de cas déclarés	421	13	2	9	24	76	90	142	12	24	27	—	2
Number reported positive bacillary — Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	243	10	1	3	21	22	43	115	5	11	10	—	2
Bacillary as percentage of cases notified — Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	57.7	76.9	50.0	33.3	87.5	28.9	47.8	81.0	41.7	45.8	37.0	—	100.0
Non-respiratory, number of cases notified — Non respiratoire, nombre de cas déclarés	602	33	1	14	15	107	228	34	27	58	78	3	4
Number reported positive bacillary — Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	387	25	1	6	8	45	167	28	16	44	40	3	4
Bacillary as percentage of cases notified — Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	64.3	75.8	100.0	42.9	53.3	42.1	73.2	82.4	59.3	75.9	51.3	100.0	100.0


¹ Includes cases with pulmonary stage unspecified. — Y compris les cas avec le stade pulmonaire non précisé.

Note: Determination of bacillary status was reported for 2,900 of the 3,563 cases notified. Of these, 2,291 cases showed positive results and 609 cases showed negative results. See Tables 12 and 13. — Note: La détermination de l'état bacillaire était rapportée pour 2,900 des 3,563 cas déclarés. De ces 2,900 cas, 2,291 cas montrent des résultats positifs et 609 montrent des résultats négatifs. Voir les tableaux 12 et 13.

TABLE 17. New Active Cases by Number Testing Positive Bacillary, Origin and Province, 1973
TABLEAU 17. Nouveaux cas actifs suivant le nombre à bacilles positifs, l'origine et la province, 1973

Origin — Origine	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number of cases notified — Nombre de cas déclarés	3,563	166	9	100	72	1,121	1,000	219	171	269	394	3	39
Number reported positive bacillary — Nombre de cas bacillaire positifs rapportés	2,291	109	8	68	52	605	703	160	110	163	278	3	32
Bacillary as percentage of cases notified — Cas bacillaire par pourcentage de cas déclarés	64.3	65.7	88.9	68.0	72.2	54.0	70.3	73.1	64.3	60.6	70.6	100.0	82.1
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants:													
Cases notified — Cas déclarés	16.1	30.7	7.8	12.4	11.0	18.4	12.6	21.9	18.8	16.0	17.0	15.2	103.2
Bacillary cases — Cas bacillaire	10.4	20.2	7.0	8.4	8.0	9.9	8.9	16.0	12.1	9.7	12.0	15.2	84.7
Indian, number of cases notified — Indiens, nombre de cas déclarés	468	2	—	1	4	30	94	97	66	115	45	2	12
Number reported positive bacillary — Nombre de cas bacillaire positifs rapportés	291	—	—	1	3	9	72	62	39	63	32	2	8
Bacillary as percentage of cases notified — Cas bacillaire par pourcentage de cas déclarés	62.2	—	—	100.0	75.0	30.0	76.6	63.9	59.1	54.8	71.1	100.0	66.7
Eskimo, number of cases notified — Esquimaux, nombre de cas déclarés	49	3	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	18
Number reported positive bacillary — Nombre de cas bacillaire positifs rapportés	39	2	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	16
Bacillary as percentage of cases notified — Cas bacillaire par pourcentage de cas déclarés	79.6	66.7	—	—	—	75.0	—	—	—	—	—	—	88.9
Other, number of cases notified — Autres, nombre de cas déclarés	3,046	161	9	99	68	1,063	906	122	105	154	349	1	9
Number reported positive bacillary — Nombre de cas bacillaire positifs rapportés	1,961	107	8	67	49	575	631	98	71	100	246	1	8
Bacillary as percentage of cases notified — Cas bacillaire par pourcentage de cas déclarés	64.4	66.5	88.9	67.7	72.1	54.1	69.6	80.3	67.6	64.9	70.5	100.0	88.9

Note: Determination of bacillary status was reported for 2,900 of the 3,563 cases notified. Of these 2,900 cases, 2,291 cases showed positive results and 609 cases showed negative results. See Tables 12 and 13. — Note: L'état bacillaire a été déterminé dans 2,900 des 3,563 cas déclarés. De ces 2,900 cas, 2,291 montrent des résultats positifs et 609 des résultats négatifs. Voir tableaux 12 et 13.



REACTIVATED CASES

CAS REACTIVES

TABLE 18 A. Summary Statistics—Reactivated Cases by Sex and Province, 1973
 TABLEAU 18 A. Sommaire des statistiques — Cas réactivés suivant le sexe et la province, 1973

Sex — Sexe	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Number — Nombre													
TOTAL	567	18	4	12	6	189	171	35	26	35	59	1	11
Male — Masculin	333	9	3	8	4	120	97	18	15	19	31	1	8
Female — Féminin	234	9	1	4	2	69	74	17	11	16	28	—	3
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants													
TOTAL	2.6	3.3	3.5	1.5	0.9	3.1	2.2	3.5	2.9	2.1	2.5	5.1	29.1
Male — Masculin	3.0	3.3	5.2	2.0	1.2	4.0	2.5	3.6	3.3	2.2	2.7	9.4	40.4
Female — Féminin	2.1	3.4	1.7	1.0	0.6	2.3	1.9	3.4	2.5	1.9	2.4	—	16.7

TABLE 18 B. Summary Statistics—Reactivated Cases by Sex and Age Group, 1973
 TABLEAU 18 B. Sommaire des statistiques — Cas réactivés suivant le sexe et le groupe d'âge, 1973

Sex — Sexe	Total	0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	'75 and over — et plus
Number — Nombre										
TOTAL	567	—	3	17	57	91	136	125	96	42
Male — Masculin	333	—	—	6	30	40	83	84	59	31
Female — Féminin	234	—	3	11	27	51	53	41	37	11
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants										
TOTAL	2.6	—	0.1	0.4	1.8	3.6	5.7	7.0	8.4	6.1
Male — Masculin	3.0	—	—	0.3	1.9	3.1	7.0	9.6	11.1	11.2
Female — Féminin	2.1	—	0.1	0.5	1.7	4.1	4.4	4.5	6.1	2.6

TABLE 18 C. Summary Statistics — Reactivated Cases by Sex and Diagnosis, 1973
TABLEAU 18 C. Sommaire des statistiques — Cas réactivés suivant le sexe et le diagnostic, 1973

Sex — Sexe	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire				Non-respiratory — Non respiratoire
		Minimal pulmonary — Pulmonaire, minime	Moderately advanced pulmonary — Pulmonaire, assez avancée	Far advanced pulmonary — Pulmonaire, très avancée	Other respiratory ¹ — Autres respiratoires ¹	
		Number — Nombre				
TOTAL	567	96	230	103	41	97
Male — Masculin	333	48	142	72	26	45
Female — Féminin	234	48	88	31	15	52
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants						
TOTAL	2.6	0.4	1.0	0.5	0.2	0.4
Male — Masculin	3.0	0.4	1.3	0.7	0.2	0.4
Female — Féminin	2.1	0.4	0.8	0.3	0.1	0.5

¹ Includes cases with pulmonary stage unspecified. — Y compris les cas avec le stade pulmonaire non précisé.

TABLE 18 D. Summary Statistics — Reactivated Cases by Sex and Origin, 1973
TABLEAU 18 D. Sommaire des statistiques — Cas réactivés suivant le sexe et l'origine, 1973

Sex — Sexe	Total	Indian — Indiens	Eskimo — Esquimaux	Other — Autres
		Number — Nombre		
TOTAL	567	83	14	470
Male — Masculin	333	33	9	291
Female — Féminin	234	50	5	179
Percentage distribution — Répartition procentuelle				
TOTAL	100.0	14.6	2.5	82.9
Male — Masculin	100.0	9.9	2.7	87.4
Female — Féminin	100.0	21.4	2.1	76.5
Percentage distribution of 1971 population ¹ Répartition procentuelle de la population de 1971 ¹				
TOTAL	100.0	1.4	0.1	98.5
Male — Masculin	100.0	1.4	0.1	98.5
Female — Féminin	100.0	1.4	0.1	98.5

¹ Latest census year for which origin data was obtained. — La plus récente année de recensement pour laquelle ont été réunies les données selon l'origine.

TABLE 19. Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Province, 1973

No.	I.C.D.A. No. N° de la C.I.M.A.	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.
				T.-N.	I. P.-É.	N.-É.
					number — nombre	
1		TOTAL	T. M. F.	567 333 234	18 9 9	4 3 1
2						12 8 4
3						
4	010-012.9	Tuberculosis of respiratory system — Tuberculose de l'appareil respiratoire	T. M. F.	470 288 182	13 7 6	4 3 1
5						9 7 2
6						
7	010	Silicotuberculosis — Silicotuberculose	T. M. F.	3 3 —	— — —	— — —
8						
9						
10	011	Pulmonary — Pulmonaire	T. M. F.	462 280 182	13 7 6	4 3 1
11						9 7 2
12						
13	011.0	Minimal — Minime	T. M. F.	96 48 48	1 1 —	2 2 —
14						
15						
16	011.1	Moderately advanced — Assez avancée	T. M. F.	230 142 88	7 3 4	2 1 1
17						5 4 1
18						
19	011.2	Far advanced — Très avancée	T. M. F.	103 72 31	5 3 2	— — —
20						4 3 1
21						
22	011.3	Stage unspecified — Stade non précisé	T. M. F.	29 15 14	— — —	— — —
23						
24						
25	011.4	Miliary — Miliaire	T. M. F.	4 3 1	— — —	— — —
26						
27						
28	011.9	NOS — S.A.I.	T. M. F.	— — —	— — —	— — —
29						
30						
31	012	Other respiratory tuberculosis — Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire	T. M. F.	5 5 —	— — —	— — —
32						
33						
34	012.0	Primary — Primaire	T. M. F.	— — —	— — —	— — —
35						
36						
37	012.1	Pleurisy specified as tuberculous — Pleurésie spécifiée comme tuberculeuse	T. M. F.	5 5 —	— — —	— — —
38						
39						
40	012.2	Pleurisy with effusion without mention of cause — Pleurésie exsudative sans mention d'étiologie	T. M. F.	— — —	— — —	— — —
41						
42						
43	012.3	Tuberculous laryngitis — Laryngite tuberculeuse	T. M. F.	— — —	— — —	— — —
44						
45						
46	012.9	Other — Autres	T. M. F.	— — —	— — —	— — —
47						
48						
49	013-018.9	Non-respiratory — Non respiratoire	T. M. F.	97 45 52	5 2 3	— — —
50						3 1 2
51						
52	013	Meninges and central nervous system — Méninges et système nerveux central	T. M. F.	— — —	— — —	— — —
53						
54						
55	013.0	Meningitis — Méningite	T. M. F.	— — —	— — —	— — —
56						
57						
58	013.9	Other — Autres	T. M. F.	— — —	— — —	— — —
59						
60						

TABLEAU 19. Cas réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe et la province, 1973

N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	N°
number — nombre									
6 4 2	189 120 69	171 97 74	35 18 17	26 15 11	35 19 16	59 31 28	1 1	11 8 3	1 2 3
4 2 2	186 119 67	123 74 49	24 12 12	17 11 6	30 17 13	48 27 21	1 1	11 8 3	4 5 6
— — —	— — —	2 2 —	— — —	— — —	— — —	1 1	— — —	— — —	7 8 9
4 2 2	185 118 67	120 71 49	23 11 12	17 11 6	28 15 13	47 26 21	1 1	11 8 3	10 11 12
2 1 1	20 5 15	32 19 13	— — —	4 3 1	12 6 6	17 6 11	— — —	6 5 1	13 14 15
— — —	116 79 37	56 29 27	— — —	8 6 2	12 5 7	18 11 7	1 1	5 3 2	16 17 18
— — —	48 33 15	26 19 7	— — —	5 2 3	4 4 —	11 8 3	— — —	— — —	19 20 21
2 1 1	— — —	4 3 1	23 11 12	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	22 23 24
— — —	1 1 —	2 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 1	— — —	25 26 27
— — —	28 29 30								
— — —	1 1 —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	2 2	— —	— —	31 32 33
— — —	34 35 36								
— — —	1 1 —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	2 2	— —	— —	37 38 39
— — —	40 41 42								
— — —	43 44 45								
— — —	46 47 48								
2 2	3 1 2	48 23 25	11 6 5	9 4 5	5 2 3	11 4 7	— — —	— — —	49 50 51
— — — — — —	52 53 54								
— — — — — —	55 56 57								
— — — — — —	58 59 60								

TABLE 19. Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Province, 1973 - Concluded

No.	I.C.D.A. No. Nº de la C.I.M.A.	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.
				number - nombre		
		Non-respiratory - Concluded - Non respiratoire - fin:				
1	014	Intestines, peritoneum and mesenteric glands - Intestins, péritoine et ganglions mésentériques.	T. M. F.	2 2 -	-	-
2					-	-
3					-	-
4	015	Bones and joints, active - Osseuse et articulaire, active	T. M. F.	25 16 9	1 - 1	1 - 1
5					-	-
6					-	-
7	015.0	Vertebral column - Colonne vertébrale	T. M. F.	3 1 2	- - -	1 - 1
8					-	-
9					-	-
10	015.1	Hip - Hanche	T. M. F.	3 2 1	1 - 1	- - -
11					-	-
12					-	-
13	015.2	Knee - Genou	T. M. F.	1 1 -	- - -	- - -
14					-	-
15					-	-
16	015.8	Other specified bones and joints - Autres os ou articulations	T. M. F.	6 5 1	- - -	- - -
17					-	-
18					-	-
19	015.9	Unspecified - Sans précision	T. M. F.	12 7 5	- - -	- - -
20					-	-
21					-	-
22	016	Genito-urinary system - Appareil génito-urinaire	T. M. F.	33 18 15	2 2 -	1 - -
23					-	-
24					-	-
25	016.0	Kidney - Rein	T. M. F.	10 5 5	2 2 -	- - -
26					-	-
27					-	-
28	016.1	Other urinary organs - Autres organes urinaires	T. M. F.	4 3 1	- - -	- - -
29					-	-
30					-	-
31	016.2	Genital organs (male and female) - Organes génitaux (de l'homme et de la femme).	T. M. F.	6 1 5	- - -	- - -
32					-	-
33					-	-
34	016.9	Unspecified - Sans précision	T. M. F.	13 9 4	- - -	1 1 -
35					-	-
36					-	-
37	017	Other organs - Autres organes	T. M. F.	37 9 28	2 - 2	1 - 1
38					-	-
39					-	-
40	017.0	Skin and subcutaneous cellular tissue - Peau et tissu cellulaire	T. M. F.	3 - 3	1 - 1	- - -
41					-	-
42					-	-
43	017.1	Peripheral lymphatic glands - Ganglions lymphatiques périphériques	T. M. F.	30 8 22	- - -	1 - 1
44					-	-
45					-	-
46	017.2	Eye - Oeil	T. M. F.	1 - 1	- - -	- - -
47					-	-
48					-	-
49	017.3	Ear - Oreille	T. M. F.	- - -	- - -	- - -
50					-	-
51					-	-
52	017.9	Other - Autres	T. M. F.	3 1 2	1 - 1	- - -
53					-	-
54					-	-
55	018	Disseminated - Disséminée	T. M. F.	- - -	- - -	- - -
56					-	-
57					-	-
58	018.0	Acute miliary tuberculosis specified as non-pulmonary - Tuberculose T. miliaire aiguë spécifiée comme non pulmonaire.	T. M. F.	- - -	- - -	- - -
59					-	-
60					-	-
61	018.1	Acute miliary tuberculosis unspecified - Tuberculose miliaire aiguë, T. sans précision.	T. M. F.	- - -	- - -	- - -
62					-	-
63					-	-
64	018.9	Other forms of disseminated tuberculosis - Autres formes de tuberculose T. à foyers multiples.	T. M. F.	- - -	- - -	- - -
65					-	-
66					-	-

TABLEAU 19. Cas réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe et la province, 1973 - fin

N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.	No
number — nombre									
-	-	-	-	1 1	-	-	1 1	-	1 2 3
1 1	2 1 1	13 9 4	-	1 1 2	4 2 1	1 1	1 1	-	4 5 6
-	-	-	-	-	1 1	-	-	-	7 8 9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 11 12
-	-	-	-	-	-	1 1	-	-	13 14 15
-	-	-	-	1 1	-	-	-	-	16 17 18
-	-	-	-	-	3 2 1	-	1 1	-	19 20 21
1 1	11 7 4	-	-	-	-	-	-	-	22 23 24
-	-	16 9 7	6 4 2	1 1	3 1 2	-	3 3	-	25 26 27
-	-	-	4 3 1	1 1	1 1	2 2	-	-	28 29 30
-	-	3 2 1	-	-	-	1 1	-	-	31 32 33
-	-	2 - 2	2 1 1	-	-	1 1	1 1	-	34 35 36
1 1	11 7 4	-	-	-	-	-	-	-	37 38 39
-	1	19 5 14	3 3	4 2 2	1 1	6 2 4	-	-	40 41 42
-	-	2 - 2	-	-	-	-	-	-	43 44 45
-	1	16 5 11	3 3	4 2 2	1 1	4 1 3	-	-	46 47 48
-	-	1 - 1	-	-	-	-	-	-	49 50 51
-	-	-	-	-	-	-	2 1	-	52 53 54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 56 57
-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 59 60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 62 63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 65 66

TABLE 20. Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Diagnosis, 1973
TABLEAU 20. Cas réactivés et taux pour 100.000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et le diagnostic, 1973

Age group Groupe d'âge	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire				Non-respiratory Non respiratoire
		Minimal pulmonary Pulmonaire, minime	Moderately advanced pulmonary Pulmonaire, assez avancée	Far advanced pulmonary Pulmonaire, très avancée	Other respiratory ¹ Autres respiratoires ¹	
		Number — Nombre				
Both sexes — Deux sexes						
All ages — Tous âges	567	96	230	103	41	97
0- 4.....	—	—	—	—	—	—
5-14.....	3	3	—	—	—	—
15-24.....	17	6	5	1	4	1
25-34.....	57	17	14	5	4	17
35-44.....	91	16	38	17	4	16
45-54.....	136	17	57	29	7	26
55-64.....	125	20	51	22	10	22
65-74.....	96	11	45	21	8	11
75 and over — et plus	42	6	20	8	4	4
Male — Masculin						
All ages — Tous âges	333	48	142	72	26	45
0- 4.....	—	—	—	—	—	—
5-14.....	—	—	—	—	—	—
15-24.....	6	3	2	—	1	—
25-34.....	30	11	9	1	2	7
35-44.....	40	6	18	10	1	5
45-54.....	83	8	32	25	5	13
55-64.....	84	11	35	17	8	13
65-74.....	59	4	32	11	7	5
75 and over — et plus	31	5	14	8	2	2
Female — Féminin						
All ages — Tous âges	234	48	88	31	15	52
0- 4.....	—	—	—	—	—	—
5-14.....	3	3	—	—	—	—
15-24.....	11	3	3	1	3	1
25-34.....	27	6	5	4	2	10
35-44.....	51	10	20	7	3	11
45-54.....	53	9	25	4	2	13
55-64.....	41	9	16	5	2	9
65-74.....	37	7	13	10	1	6
75 and over — et plus	11	1	6	—	2	2

See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE 20. Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Diagnosis, 1973 — Concluded
TABLEAU 20. Cas réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et le diagnostic, 1973 — fin

Age group Groupe d'âge	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire				Non-respiratory — Non respiratoire
		Minimal pulmonary Pulmonaire, minime	Moderately advanced pulmonary Pulmonaire, assez avancée	Far advanced pulmonary Pulmonaire, très avancée	Other respiratory ¹ Autres respiratoires ¹	
		Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants				
Both sexes — Deux sexes						
All ages — Tous âges	2.6	0.4	1.0	0.5	0.2	0.4
0- 4	—	—	—	—	—	—
5-14	0.1	0.1	—	—	—	—
15-24	0.4	0.1	0.1	--	0.1	--
25-34	1.8	0.5	0.4	0.2	0.1	0.5
35-44	3.6	0.6	1.5	0.7	0.2	0.6
45-54	5.7	0.7	2.4	1.2	0.3	1.1
55-64	7.0	1.1	2.8	1.2	0.6	1.2
65-74	8.4	1.0	3.9	1.8	0.7	1.0
75 and over — et plus.....	6.1	0.9	2.9	1.2	0.6	0.6
Male — Masculin						
All ages — Tous âges	3.0	0.4	1.3	0.7	0.2	0.4
0- 4	—	—	—	—	—	—
5-14	—	—	—	—	—	—
15-24	0.3	0.1	0.1	—	--	—
25-34	1.9	0.7	0.6	0.1	0.1	0.4
35-44	3.1	0.5	1.4	0.8	0.1	0.4
45-54	7.0	0.7	2.7	2.1	0.4	1.1
55-64	9.6	1.3	4.0	1.9	0.9	1.5
65-74	11.1	0.8	6.0	2.1	1.3	0.9
75 and over — et plus.....	11.2	1.8	5.1	2.9	0.7	0.7
Female — Féminin						
All ages — Tous âges	2.1	0.4	0.8	0.3	0.1	0.5
0- 4	—	—	—	—	—	—
5-14	0.1	0.1	—	—	—	—
15-24	0.5	0.1	0.1	--	0.1	--
25-34	1.7	0.4	0.3	0.3	0.1	0.6
35-44	4.1	0.8	1.6	0.6	0.2	0.9
45-54	4.4	0.7	2.1	0.3	0.2	1.1
55-64	4.5	1.0	1.8	0.5	0.2	1.0
65-74	6.1	1.1	2.1	1.6	0.2	1.0
75 and over — et plus	2.6	0.2	1.4	—	0.5	0.5

¹ Includes cases with pulmonary, stage unspecified. — Y compris les cas avec le stade pulmonaire non précisé.

TABLE 21. Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Province, 1973
 TABLEAU 21. Cas réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et la province, 1973

Age group Groupe d'âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number — Nombre													
Both sexes — Deux sexes													
All ages — Tous âges.....	567	18	4	12	6	189	171	35	26	35	59	1	11
0- 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5- 14	3	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—
15- 24	17	—	—	—	—	1	8	4	2	1	—	—	1
25- 34	57	1	1	1	—	10	20	4	4	4	8	—	4
35- 44	91	5	1	2	1	29	30	4	2	7	8	1	1
45- 54	136	5	—	1	1	53	34	9	4	8	18	—	3
55- 64	125	6	—	2	4	50	33	7	4	4	14	—	1
65- 74	96	1	2	3	—	36	28	6	8	5	7	—	—
75 and over — et plus	42	—	—	3	—	9	18	1	2	4	4	—	1
Male — Masculin													
All ages — Tous âges	333	9	3	8	4	120	97	18	15	19	31	1	8
0- 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5- 14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15- 24	6	—	—	—	—	1	1	1	1	1	—	—	1
25- 34	30	—	1	1	—	5	10	1	2	3	4	—	3
35- 44	40	2	1	—	1	15	14	—	2	1	2	1	1
45- 54	83	3	—	1	1	30	26	5	1	5	10	—	1
55- 64	84	4	—	1	2	40	19	6	2	2	7	—	1
65- 74	59	—	1	2	—	22	15	5	6	3	5	—	—
75 and over — et plus	31	—	—	3	—	7	12	—	1	4	3	—	1
Female — Féminin													
All ages — Tous âges	234	9	1	4	2	69	74	17	11	16	28	—	3
0- 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5- 14	3	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—
15- 24	11	—	—	—	—	—	7	3	1	—	—	—	—
25- 34	27	1	—	—	—	5	10	3	2	1	4	—	1
35- 44	51	3	—	2	—	14	16	4	—	6	6	—	—
45- 54	53	2	—	—	—	23	8	4	3	3	8	—	2
55- 64	41	2	—	1	2	10	14	1	2	2	7	—	—
65- 74	37	1	1	1	—	14	13	1	2	2	2	—	—
75 and over — et plus	11	—	—	—	—	2	6	1	1	—	1	—	—

TABLE 21. Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Province, 1973 — Concluded
TABLEAU 21. Cas réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et la province, 1973 — fin

Age group Groupe d'âge	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T.-N.-O.
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants													
Both sexes — Deux sexes													
All ages — Tous âges	2.6	3.3	3.5	1.5	0.9	3.1	2.2	3.5	2.9	2.1	2.5	5.1	29.1
0- 4.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5-14.....	0.1	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.6	—	—	—
15-24.....	0.4	—	—	—	—	0.1	0.6	2.2	1.2	0.3	—	—	15.2
25-34.....	1.8	1.5	7.4	0.9	—	1.1	1.7	3.0	4.0	1.6	2.3	—	64.5
35-44.....	3.6	10.0	9.1	2.4	1.6	4.1	3.2	3.9	2.2	3.6	3.0	41.7	25.0
45-54.....	5.7	11.0	—	1.2	1.6	8.2	3.8	8.4	4.0	4.7	7.1	—	115.4
55- 64.....	7.0	16.4	—	2.8	7.6	10.5	5.1	7.7	4.6	3.3	7.0	—	66.7
65- 74.....	8.4	4.8	28.2	6.7	—	12.3	6.7	10.1	14.0	6.5	5.5	—	—
75 and over — et plus	6.1	—	—	9.9	—	6.1	7.0	2.5	4.9	8.3	4.5	—	1,000.0
Male — Masculin													
All ages — Tous âges.....	3.0	3.3	5.2	2.0	1.2	4.0	2.5	3.6	3.3	2.2	2.7	9.4	40.4
0- 4.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5-14.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15-24.....	0.3	—	—	—	—	0.2	0.1	1.1	1.1	0.6	—	—	29.4
25- 34.....	1.9	—	14.5	1.9	—	1.1	1.7	1.5	4.0	2.4	2.3	—	93.8
35- 44.....	3.1	7.7	17.5	—	3.2	4.2	2.9	—	4.3	1.0	1.4	71.4	45.5
45- 54.....	7.0	12.6	—	2.5	3.2	9.5	5.8	9.5	2.0	5.8	7.9	—	71.4
55- 64.....	9.6	20.7	—	2.8	7.6	17.5	6.0	13.5	4.6	3.2	7.2	—	125.0
65- 74.....	11.1	—	28.6	9.3	—	16.8	7.9	17.5	20.6	7.6	8.0	—	—
75 and over — et plus	11.2	—	—	24.8	—	12.1	12.8	—	5.2	17.9	8.1	—	1,000.0
Female — Féminin													
All ages — Tous âges	2.1	3.4	1.7	1.0	0.6	2.3	1.9	3.4	2.5	1.9	2.4	—	16.7
0- 4.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5-14.....	0.1	—	—	—	—	0.2	—	—	—	1.1	—	—	—
15-24.....	0.5	—	—	—	—	—	1.0	3.3	1.2	—	—	—	—
25- 34.....	1.7	2.9	—	—	—	1.1	1.7	4.6	4.0	0.8	2.4	—	33.3
35- 44.....	4.1	12.6	—	4.9	—	3.9	3.5	7.8	—	6.4	4.7	—	—
45- 54.....	4.4	9.2	—	—	—	7.0	1.8	7.2	6.0	3.5	6.2	—	166.7
55- 64.....	4.5	11.6	—	2.8	7.6	4.1	4.3	2.2	4.7	3.3	6.8	—	—
65- 74.....	6.1	9.5	27.8	4.3	—	8.7	5.7	3.2	7.1	5.2	3.0	—	—
75 and over — et plus	2.6	—	—	—	—	2.2	3.7	4.4	4.6	—	2.0	—	—

TABLE 22. Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Diagnosis, Sex and Province, 1973
TABLEAU 22. Cas réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le diagnostic, le sexe et la province, 1973

Diagnosis Diagnostic	Total	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Number — Nombre													
Both sexes — Deux sexes													
TOTAL	567	18	4	12	6	189	171	35	26	35	59	1	11
Respiratory — Respiratoire	470	13	4	9	4	186	123	24	17	30	48	1	11
Minimal pulmonary — Pulmonaire, minime.....	96	1	2	—	2	20	32	—	4	12	17	—	6
Moderately advanced pulmonary — Pulmonaire, assez avancée	230	7	2	5	—	116	56	—	8	12	18	1	5
Far advanced pulmonary — Pulmonaire, très avancée	103	5	—	4	—	48	26	—	5	4	11	—	—
Other ¹ — Autres ¹	41	—	—	—	2	2	9	24	—	2	2	—	—
Non-respiratory — Non respiratoire....	97	5	—	3	2	3	48	11	9	5	11	—	—
Male — Masculin													
TOTAL	333	9	3	8	4	120	97	18	15	19	31	1	8
Respiratory — Respiratoire	288	7	3	7	2	119	74	12	11	17	27	1	8
Minimal pulmonary — Pulmonaire, minime.....	48	1	2	—	1	5	19	—	3	6	6	—	5
Moderately advanced pulmonary — Pulmonaire, assez avancée	142	3	1	4	—	79	29	—	6	5	11	1	3
Far advanced pulmonary — Pulmonaire, très avancée	72	3	—	3	—	33	19	—	2	4	8	—	—
Other ¹ — Autres ¹	26	—	—	—	1	2	7	12	—	2	2	—	—
Non-respiratory — Non respiratoire....	45	2	—	1	2	1	23	6	4	2	4	—	—
Female — Féminin													
TOTAL	234	9	1	4	2	69	74	17	11	16	28	—	3
Respiratory — Respiratoire	182	6	1	2	2	67	49	12	6	13	21	—	3
Minimal pulmonary — Pulmonaire, minime.....	48	—	—	—	1	15	13	—	1	6	11	—	1
Moderately advanced pulmonary — Pulmonaire, assez avancée	88	4	1	1	—	37	27	—	2	7	7	—	2
Far advanced pulmonary — Pulmonaire, très avancée	31	2	—	1	—	15	7	—	3	—	3	—	—
Other ¹ — Autres ¹	15	—	—	—	1	—	2	12	—	—	—	—	—
Non-respiratory — Non respiratoire....	52	3	—	2	—	2	25	5	5	3	7	—	—

See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE 22. Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Diagnosis, Sex and Province, 1973 — Concluded
TABLEAU 22. Cas réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le diagnostic, le sexe et la province, 1973 — fin

Diagnosis — Diagnostic	Total	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants													
Both sexes — Deux sexes													
TOTAL.....	2.6	3.3	3.5	1.5	0.9	3.1	2.2	3.5	2.9	2.1	2.5	5.1	29.1
Respiratory — Respiratoire	2.1	2.4	3.5	1.1	0.6	3.1	1.5	2.4	1.9	1.8	2.1	5.1	29.1
Minimal pulmonary — Pulmonaire, minime	0.4	0.2	1.7	—	0.3	0.3	0.4	—	0.4	0.7	0.7	—	15.9
Moderately advanced pulmonary — Pulmonaire, assez avancée.....	1.0	1.3	1.7	0.6	—	1.9	0.7	—	0.9	0.7	0.8	5.1	13.2
Far advanced pulmonary — Pulmo- naire très avancée	0.5	0.9	—	0.5	—	0.8	0.3	—	0.6	0.2	0.5	—	—
Other ¹ — Autres ¹	0.2	—	—	—	0.3	--	0.1	2.4	—	0.1	0.1	—	—
Non-respiratory — Non respiratoire....	0.4	0.9	—	0.4	0.3	--	0.6	1.1	1.0	0.3	0.5	—	—
Male — Masculin													
TOTAL.....	3.0	3.3	5.2	2.0	1.2	4.0	2.5	3.6	3.3	2.2	2.7	9.4	40.4
Respiratory — Respiratoire	2.6	2.5	5.2	1.7	0.6	3.9	1.9	2.4	2.4	2.0	2.3	9.4	40.4
Minimal pulmonary — Pulmonaire, minime	0.4	0.4	3.5	—	0.3	0.2	0.5	—	0.7	0.7	0.5	—	25.2
Moderately advanced pulmonary — Pulmonaire, assez avancée.....	1.3	1.1	1.7	1.0	—	2.6	0.7	—	1.3	0.6	0.9	9.4	15.2
Far advanced pulmonary — Pulmo- naire, très avancée	0.7	1.1	—	0.7	—	1.1	0.5	—	0.4	0.5	0.7	—	—
Other ¹ — Autres ¹	0.2	—	—	—	0.3	0.1	0.2	2.4	—	0.2	0.2	—	—
Non-respiratory — Non respiratoire....	0.4	0.7	—	0.2	0.6	--	0.6	1.2	0.9	0.2	0.3	—	—
Female — Féminin													
TOTAL	2.1	3.4	1.7	1.0	0.6	2.3	1.9	3.4	2.5	1.9	2.4	—	16.7
Respiratory — Respiratoire	1.6	2.3	1.7	0.5	0.6	2.2	1.2	2.4	1.3	1.6	1.8	—	16.7
Minimal pulmonary — Pulmonaire, minime	0.4	—	—	—	0.3	0.5	0.3	—	0.2	0.7	1.0	—	5.6
Moderately advanced pulmonary — Pulmonaire, assez avancée.....	0.8	1.5	1.7	0.2	—	1.2	0.7	—	0.4	0.8	0.6	—	11.1
Far advanced pulmonary — Pulmo- naire, très avancée	0.3	0.8	—	0.2	—	0.5	0.2	—	0.7	—	0.3	—	—
Other ¹ — Autres ¹	0.1	—	—	—	0.3	—	0.1	2.4	—	—	—	—	—
Non-respiratory — Non respiratoire....	0.5	1.1	—	0.5	—	0.1	0.6	1.0	1.1	0.4	0.6	—	—

¹ Includes cases with pulmonary, stage unspecified. — Y compris les cas avec le stade pulmonaire non précis.

TABLE 23. Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin, Sex and Province, 1973
TABLEAU 23. Cas réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine, le sexe et la province, 1973

Origin — Origine	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Both sexes — Deux sexes													
TOTAL	567	18	4	12	6	189	171	35	26	35	59	1	11
Indian — Indiens	83	1	—	2	—	4	15	17	8	17	16	1	2
Eskimo — Esquimaux	14	2	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	7
Other — Autres	470	15	4	10	6	180	156	18	18	18	43	—	2
Percentage of total number of cases — Pourcentage du nombre total de cas:													
Indian — Indiens	14.6	5.6	—	16.7	—	2.1	8.8	48.6	30.8	48.6	27.1	100.0	18.2
Eskimo — Esquimaux	2.5	11.1	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	—	63.6
Percentage of total population ¹ — Pourcentage de la population totale ¹ :													
Indian — Indiens	1.4	0.2	0.3	0.6	0.6	0.5	0.8	4.4	4.4	2.7	2.4	14.0	20.6
Eskimo — Esquimaux	0.1	0.2	—	--	--	0.1	--	--	--	--	--	0.1	32.7
Male — Masculin													
TOTAL	333	9	3	8	4	120	97	18	15	19	31	1	8
Indian — Indiens	33	—	—	1	—	2	6	8	3	7	4	1	1
Eskimo — Esquimaux	9	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6
Other — Autres	291	7	3	7	4	117	91	10	12	12	27	—	1
Percentage of total number of cases — Pourcentage du nombre total de cas:													
Indian — Indiens	9.9	—	—	12.5	—	1.7	6.2	44.4	20.0	36.8	12.9	100.0	12.5
Eskimo — Esquimaux	2.7	22.2	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	75.0
Percentage of total population ¹ — Pourcentage de la population totale ¹ :													
Indian — Indiens	1.4	0.2	0.3	0.6	0.6	0.5	0.8	4.4	4.4	2.7	2.4	12.7	19.9
Eskimo — Esquimaux	0.1	0.2	—	--	--	0.1	--	--	--	--	--	0.1	31.5
Female — Féminin													
TOTAL	234	9	1	4	2	69	74	17	11	16	28	—	3
Indian — Indiens	50	1	—	1	—	2	9	9	5	10	12	—	1
Eskimo — Esquimaux	5	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	1
Other — Autres	179	8	1	3	2	63	65	8	6	6	16	—	1
Percentage of total number of cases — Pourcentage du nombre total de cas:													
Indian — Indiens	21.4	11.1	—	25.0	—	2.9	12.2	52.9	45.5	62.5	42.9	—	33.3
Eskimo — Esquimaux	2.1	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	33.3
Percentage of total population ¹ — Pourcentage de la population totale ¹ :													
Indian — Indiens	1.4	0.2	0.3	0.6	0.6	0.5	0.8	4.3	4.4	2.8	2.4	15.5	21.5
Eskimo — Esquimaux	0.1	0.2	—	--	--	0.1	--	--	--	--	--	—	34.1

¹ Indian and Eskimo populations as percentage of the total population taken from 1971 Census. — Populations des Indiens et des esquimaux exprimées, comme pourcentage de la population totale, d'après le recensement de 1971.

TABLE 24. Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Age Group, 1973
TABLEAU 24. Cas réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine et le groupe d'âge, 1973

Origin — Origine	All ages — Tous âges	0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75 and over — et plus
TOTAL	567	—	3	17	57	91	136	125	96	42
Indian — Indiens	83	—	1	9	20	20	15	9	4	5
Eskimo — Esquimaux	14	—	1	1	4	4	3	1	—	—
Other — Autres	470	—	1	7	33	67	118	115	92	37
Percentage distribution of cases — Répartition procentuelle des cas:										
Indian — Indiens	100.0	—	1.2	10.8	24.1	24.1	18.1	10.8	4.8	6.1
Eskimo — Esquimaux	100.0	—	7.1	7.1	28.6	28.6	21.5	7.1	—	—
Other — Autres	100.0	—	0.2	1.5	7.0	14.2	25.1	24.5	19.6	7.9
Percentage distribution of population ¹ — Répartition procentuelle de la population ¹ :										
Indian — Indiens	100.0	15.6	29.2	19.3	12.1	8.7	6.0	4.5	3.0	1.6
Eskimo — Esquimaux	100.0	17.9	30.0	17.8	12.5	10.1	6.0	3.5	1.7	0.5
Other — Autres	100.0	8.3	21.1	18.5	13.4	11.8	10.7	8.1	5.0	3.1

¹ Percentage distribution of Indian and Eskimo populations by age group based on 1971 Census. — Répartition procentuelle des populations d'indiens et d'esquimaux, suivant le groupe d'âge, d'après le recensement de 1971.

TABLE 25. Reactivated Cases and Percentage Distribution by Diagnosis and Origin, 1973
TABLEAU 25. Cas réactivés et répartition procentuelle suivant le diagnostic et l'origine, 1973

Diagnosis — Diagnostic	Total	Indian — Indiens	Eskimo — Esquimaux	Others — Autres
Number — Nombre				
TOTAL	567	83	14	470
Respiratory — Respiratoire	470	73	14	383
Minimal pulmonary — Pulmonaire, minime	96	14	9	73
Moderately advanced pulmonary — Pulmonaire, assez avancée	230	31	4	195
Far advanced pulmonary — Pulmonaire, très avancée	103	12	1	90
Other ¹ — Autres ¹	41	16	—	25
Non-respiratory — Non respiratoire	97	10	—	87
Percentage distribution — Répartition procentuelle				
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0
Respiratory — Respiratoire	82.9	88.0	100.0	81.5
Minimal pulmonary — Pulmonary, minime	16.9	16.9	64.3	15.5
Moderately advanced pulmonary — Pulmonaire, assez avancée	40.6	37.3	28.6	41.5
Far advanced pulmonary — Pulmonaire, très avancée	18.2	14.5	7.1	19.2
Other ¹ — Autres ¹	7.2	19.3	—	5.3
Non-respiratory — Non respiratoire	17.1	12.0	—	18.5

¹ Includes cases with pulmonary stage unspecified. — Y compris les cas avec le stade pulmonaire non précisée.

TABLE 26. Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary, Diagnosis and Province, 1973
TABLEAU 26. Cas réactivés suivant le nombre de bacillaire positif, le diagnostic et la province, 1973

Diagnosis - Diagnostic	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés	567	18	4	12	6	189	171	35	26	35	59	1	11
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	336	10	3	10	4	60	126	30	19	20	43	1	10
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	59.3	55.6	75.0	83.3	66.7	31.7	73.7	85.7	73.1	57.1	72.9	100.0	90.9
Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants:													
Cases notified - Cas déclarés	2.6	3.3	3.5	1.5	0.9	3.1	2.2	3.5	2.9	2.1	2.5	5.1	29.1
Bacillary cases - Cas bacillaires	1.5	1.8	2.6	1.2	0.6	1.0	1.6	3.0	2.1	1.2	1.9	5.1	26.5
Pulmonary - Pulmonaire:													
Minimal, number of cases notified - Minimal, nombre de cas déclarés	96	1	2	-	2	20	32	-	4	12	17	-	6
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	58	-	1	-	1	6	24	-	3	6	12	-	5
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	60.4	-	50.0	-	50.0	30.0	75.0	-	75.0	50.0	70.6	-	83.3
Moderately advanced, number of cases notified - Assez avancée, nombre de cas déclarés	230	7	2	5	-	116	56	-	8	12	18	1	5
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	128	3	2	5	-	40	45	-	6	7	14	1	5
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	55.7	42.9	100.0	100.0	-	34.5	80.4	-	75.0	58.3	77.8	100.0	100.0
Fair advanced, number of cases notified - Très avancée, nombre de cas déclarés	103	5	-	4	-	48	26	-	5	4	11	-	-
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	59	3	-	4	-	13	22	-	5	3	9	-	-
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	57.3	60.0	-	100.0	-	27.1	84.6	-	100.0	75.0	81.8	-	-
Other respiratory, ¹ number of cases notified - Autres respiratoires ¹ , nombre de cas déclarés	41	-	-	-	2	2	9	24	-	2	2	-	-
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	36	-	-	-	2	-	6	24	-	2	2	-	-
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	87.8	-	-	-	100.0	-	66.7	100.0	-	100.0	100.0	-	-
Non-respiratory, number of cases notified - Non respiratoire, nombre de cas déclarés	97	5	-	3	2	3	48	11	9	5	11	-	-
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	55	4	-	1	1	1	29	6	5	2	6	-	-
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	56.7	80.0	-	33.3	50.0	33.3	60.4	54.5	55.6	40.0	54.5	-	-

¹ Includes cases with pulmonary stage unspecified. — Y compris les cas avec le stade pulmonaire non précisé.

TABLE 27. Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary, Origin and Province, 1973
TABLEAU 27. Cas réactivés suivant le nombre de bacillaire positif, l'origine et la province, 1973

Origin — Origine	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. W.-O.
Number of cases notified — Nombre de cas déclarés	567	18	4	12	6	189	171	35	26	35	59	1	11
Number reported positive bacillary — Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	336	10	3	10	4	60	126	30	19	20	43	1	10
Bacillary as percentage of cases notified — Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	59.3	55.6	75.0	83.3	66.7	31.7	73.7	85.7	73.1	57.1	72.9	100.0	90.9
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants:													
Cases notified — Cas déclarés	2.6	3.3	3.5	1.5	0.9	3.1	2.2	3.5	2.9	2.1	2.5	5.1	29.1
Bacillary cases — Cas bacillaires	1.5	1.8	2.6	1.2	0.6	1.0	1.6	3.0	2.1	1.2	1.9	5.1	26.5
Indian, number of cases notified — Indiens, nombre de cas déclarés	83	1	—	2	—	4	15	17	8	17	16	1	2
Number reported positive bacillary — Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	63	—	—	1	—	1	13	16	7	10	12	1	2
Bacillary as percentage of cases notified — Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	75.9	—	—	50.0	—	25.0	86.7	94.1	87.5	58.8	75.0	100.0	100.0
Eskimo, number of cases notified — Esquimaux, nombre de cas déclarés	14	2	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	7
Number reported positive bacillary — Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	11	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	6
Bacillary as percentage of cases notified — Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	78.6	50.0	—	—	—	80.0	—	—	—	—	—	—	85.7
Other, number of cases notified — Autres, nombre de cas déclarés	470	15	4	10	6	180	156	18	18	18	43	—	2
Number reported positive bacillary — Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	262	9	3	9	4	55	113	14	12	10	31	—	2
Bacillary as percentage of cases notified — Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	55.7	60.0	75.0	90.0	66.7	30.6	72.4	77.8	66.7	55.6	72.1	—	100.0

**TABLE 28. Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Method of Determination of Bacillary Status,
by Province, 1973**

No.	Origin and method	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.
Number of cases — Nombre de cas							
1	Number of reactivated cases reported	567	18	4	12	6	189
	Determination:						
2	By microscopy and culture	328	17	4	7	5	66
3	By microscopy only	42	—	—	—	—	37
4	By culture only	63	—	—	4	—	3
5	No determination reported	134	1	—	1	1	83
6	Indian	83	1	—	2	—	4
	Determination:						
7	By microscopy and culture	71	1	—	—	—	2
8	By microscopy only	2	—	—	—	—	1
9	By culture only	4	—	—	1	—	—
10	No determination reported	6	—	—	1	—	1
11	Eskimo	14	2	—	—	—	5
	Determination:						
12	By microscopy and culture.....	13	2	—	—	—	4
13	By microscopy only	1	—	—	—	—	1
14	By culture only	—	—	—	—	—	—
15	No determination reported	—	—	—	—	—	—
16	Other	470	15	4	10	6	180
	Determination:						
17	By microscopy and culture	244	14	4	7	5	60
18	By microscopy only	39	—	—	—	—	35
19	By culture only	59	—	—	3	—	3
20	No determination reported	128	1	—	—	1	82
Percentage distribution — Répartition procentuelle							
21	Number of reactivated cases reported	100	100	100	100	100	100
	Determination:						
22	By microscopy and culture	58	94	100	59	83	35
23	By microscopy only	7	—	—	—	—	19
24	By culture only	11	—	—	33	—	2
25	No determination reported	24	6	—	8	17	44
26	Indian	100	100	—	100	—	100
	Determination:						
27	By microscopy and culture.....	86	100	—	—	—	50
28	By microscopy only	2	—	—	—	—	25
29	By culture only	5	—	—	50	—	—
30	No determination reported	7	—	—	50	—	25
31	Eskimo	100	100	—	—	—	100
	Determination:						
32	By microscopy and culture.....	93	100	—	—	—	80
33	By microscopy only	7	—	—	—	—	20
34	By culture only	—	—	—	—	—	—
35	No determination reported	—	—	—	—	—	—
36	Other	100	100	100	100	100	100
	Determination:						
37	By microscopy and culture.....	52	93	100	70	83	33
38	By microscopy only	8	—	—	—	—	19
39	By culture only	13	—	—	30	—	2
40	No determination reported	27	7	—	—	17	46

**TABLEAU 28. Cas réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine et la méthode de détermination d'état bacillaire,
selon la province, 1973**

Ont.	Man.	Sask.	Alta. - Alb.	B.C. - C.-B.	Yukon	N.W.T. - T. N.-O.	Origine et méthode	N°
Number of cases — Nombre de cas								
171	35	26	35	59	1	11	Nombre total des cas réactivés rapportés.....	1
97	32	20	25	43	1	11	Détermination:	
2	—	1	2	—	—	—	Par la microscopie et la culture	2
37	3	2	4	10	—	—	Par la microscopie seulement	3
35	—	3	4	6	—	—	Par la culture seulement	4
15	17	8	17	16	1	2	Pas de détermination rapportée	5
14	17	6	14	14	1	2	Indiens	6
1	—	—	—	—	—	—	Détermination:	
—	—	1	2	—	—	—	Par la microscopie et la culture	7
—	—	1	1	2	—	—	Par la microscopie seulement	8
—	—	—	—	—	—	—	Par la culture seulement	9
—	—	—	—	—	—	—	Pas de détermination rapportée	10
—	—	—	—	—	—	7	Esquimaux	11
—	—	—	—	—	—	—	Détermination:	
—	—	—	—	—	—	7	Par la microscopie et la culture	12
—	—	—	—	—	—	—	Par la microscopie seulement	13
—	—	—	—	—	—	—	Par la culture seulement	14
—	—	—	—	—	—	—	Pas de détermination rapportée	15
156	18	18	18	43	—	2	Autres	16
83	15	14	11	29	—	2	Détermination:	
1	—	1	2	—	—	—	Par la microscopie et la culture	17
37	3	1	2	10	—	—	Par la microscopie seulement	18
35	—	2	3	4	—	—	Par la culture seulement	19
							Pas de détermination rapportée	20
Percentage distribution — Répartition procentuelle								
100	100	100	100	100	100	100	Nombre total des cas réactivés rapportés	21
57	91	77	72	73	100	100	Détermination:	
1	—	4	6	—	—	—	Par la microscopie et la culture	22
22	9	8	11	17	—	—	Par la microscopie seulement	23
20	—	11	11	10	—	—	Par la culture seulement	24
100	100	100	100	100	100	100	Pas de détermination rapportée	25
93	100	74	82	88	100	100	Indiens	26
7	—	—	—	—	—	—	Détermination:	
—	—	13	12	—	—	—	Par la microscopie et la culture	27
—	—	13	6	12	—	—	Par la microscopie seulement	28
—	—	—	—	—	—	—	Par la culture seulement	29
—	—	—	—	—	—	—	Pas de détermination rapportée	30
—	—	—	—	—	—	100	Esquimaux	31
—	—	—	—	—	—	100	Détermination:	
—	—	—	—	—	—	100	Par la microscopie et la culture	32
—	—	—	—	—	—	—	Par la microscopie seulement	33
—	—	—	—	—	—	—	Par la culture seulement	34
—	—	—	—	—	—	—	Pas de détermination rapportée	35
100	100	100	100	100	—	100	Autres	36
53	83	77	61	68	—	100	Détermination:	
1	—	6	11	—	—	100	Par la microscopie et la culture	37
24	17	6	11	23	—	—	Par la microscopie seulement	38
22	—	11	17	9	—	—	Par la culture seulement	39
							Pas de détermination rapportée	40

TABLE 29. Reactivated Cases and Percentage Distribution by Diagnosis and Method of Determination of Bacillary Status,
by Province 1973

No.	Diagnosis and method	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Number of cases — Nombre de cas														
1	Number of reactivated cases reported	567	18	4	12	6	189	171	35	26	35	59	1	11
	Determination:													
2	By microscopy and culture	328	17	4	7	5	66	97	32	20	25	43	1	11
3	By microscopy only	42	—	—	—	—	37	2	—	1	2	—	—	—
4	By culture only	63	—	—	4	—	3	37	3	2	4	10	—	—
5	No determination reported.....	134	1	—	1	1	83	35	—	3	4	6	—	—
6	Pulmonary, minimal	96	1	2	—	2	20	32	—	4	12	17	—	6
	Determination:													
7	By microscopy and culture	56	1	2	—	2	5	17	—	4	8	11	—	6
8	By microscopy only	4	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—
9	By culture only	15	—	—	—	—	1	8	—	—	—	1	5	—
10	No determination reported.....	21	—	—	—	—	11	7	—	—	2	1	—	—
11	Pulmonary, moderately advanced	230	7	2	5	—	116	56	—	8	12	18	1	5
	Determination:													
12	By microscopy and culture	128	7	2	4	—	43	35	—	7	9	15	1	5
13	By microscopy only	30	—	—	—	—	29	—	—	—	1	—	—	—
14	By culture only	20	—	—	1	—	2	12	—	1	1	3	—	—
15	No determination reported.....	52	—	—	—	—	42	9	—	—	1	—	—	—
16	Pulmonary, far advanced	103	5	—	4	—	48	26	—	5	4	11	—	—
	Determination:													
17	By microscopy and culture	64	5	—	3	—	17	21	—	5	4	9	—	—
18	By microscopy only	5	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—
19	By culture only	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—
20	No determination reported.....	32	—	—	—	—	27	3	—	—	—	—	2	—
21	Other respiratory ¹	41	—	—	—	2	2	9	24	—	2	2	—	—
	Determination:													
22	By microscopy and culture	31	—	—	—	2	—	4	23	—	—	2	—	—
23	By microscopy only	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	By culture only	6	—	—	—	—	—	3	1	—	2	—	—	—
25	No determination reported.....	4	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—
26	Non-respiratory	97	5	—	3	2	3	48	11	9	5	11	—	—
	Determination:													
27	By microscopy and culture	49	4	—	—	1	1	20	9	4	4	6	—	—
28	By microscopy only	3	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—
29	By culture only	20	—	—	2	—	—	13	2	1	—	2	—	—
30	No determination reported.....	25	1	—	1	1	1	14	—	3	1	3	—	—

¹ Includes cases with pulmonary stage unspecified.

TABLEAU 29. Cas réactivés et répartition procentuelle suivant le diagnostic et la méthode de détermination, selon la province, 1973

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Diagnostic et méthode	N°	
Percentage distribution — Répartition procentuelle															
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Nombre total des cas réactivés rapportés	1
58	94	100	59	83	35	57	91	77	72	73	100	100	100	Détermination:	
7	—	—	—	—	19	1	—	4	6	—	—	—	—	Par la microscopie et la culture	2
11	—	—	33	—	2	22	9	8	11	17	—	—	—	Par la microscopie seulement	3
24	6	—	8	17	44	20	—	11	11	10	—	—	—	Par la culture seulement	4
														Pas de détermination rapportée.....	5
100	100	100	—	100	100	100	—	100	100	100	—	100	100	Pulmonaire, minime.....	6
58	100	100	—	100	25	53	—	100	67	65	—	100	100	Détermination:	
4	—	—	—	—	15	—	—	—	8	—	—	—	—	Par la microscopie et la culture.....	7
16	—	—	—	—	5	25	—	—	8	29	—	—	—	Par la microscopie seulement.....	8
22	—	—	—	—	55	22	—	—	17	6	—	—	—	Par la culture seulement	9
														Pas de détermination rapportée.....	10
100	100	100	100	—	100	100	—	100	100	100	100	100	100	Pulmonaire, assez avancée.....	11
56	100	100	80	—	37	63	—	88	76	83	100	100	100	Détermination:	
13	—	—	—	—	25	—	—	—	8	—	—	—	—	Par la microscopie et la culture.....	12
9	—	—	20	—	2	21	—	12	8	17	—	—	—	Par la microscopie seulement.....	13
22	—	—	—	—	36	16	—	—	8	—	—	—	—	Par la culture seulement	14
														Pas de détermination rapportée.....	15
100	100	—	100	—	100	100	—	100	100	100	—	—	—	Pulmonaire, très avancée.....	16
62	100	—	75	—	36	81	—	100	100	82	—	—	—	Détermination:	
5	—	—	—	—	8	4	—	—	—	—	—	—	—	Par la microscopie et la culture.....	17
2	—	—	25	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	Par la microscopie seulement.....	18
31	—	—	—	—	56	11	—	—	—	18	—	—	—	Par la culture seulement	19
														Pas de détermination rapportée.....	20
100	—	—	—	100	100	100	100	—	100	100	—	—	—	Autres respiratoires ¹	21
75	—	—	—	100	—	45	96	—	—	100	—	—	—	Détermination:	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Par la microscopie et la culture.....	22
15	—	—	—	—	—	33	4	—	100	—	—	—	—	Par la microscopie seulement.....	23
10	—	—	—	—	100	22	—	—	—	—	—	—	—	Par la culture seulement	24
														Pas de détermination rapportée.....	25
100	100	—	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—	Non respiratoire	26
50	80	—	—	50	34	42	82	45	80	55	—	—	—	Détermination:	
3	—	—	—	—	33	2	—	11	—	—	—	—	—	Par la microscopie et la culture.....	27
21	—	—	67	—	—	27	18	11	—	18	—	—	—	Par la microscopie seulement.....	28
26	20	—	33	50	33	29	—	33	20	27	—	—	—	Par la culture seulement	29
														Pas de détermination rapportée	30

¹ Y compris les cas avec le stade pulmonaire non précisé.

TABLE 30. Reactivated Cases by Length of Inactive Interval and Province, 1973

TABLEAU 30. Cas réactivés suivant l'intervalle inactif et la province, 1973

Length of inactive interval Durée de l'intervalle inactif	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
TOTAL.....	567	18	4	12	6	189	171	35	26	35	59	1	11
Under 6 months — Moins de 6 mois	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
6- 12 months — mois	11	—	—	—	—	—	4	1	—	2	4	—	—
1- 2 years — ans	41	1	—	1	—	12	17	5	—	4	1	—	—
2- 3 " "	50	—	—	—	1	25	13	2	3	3	3	—	—
3- 4 " "	38	—	—	—	—	19	8	4	1	3	3	—	—
4- 5 " "	34	2	1	—	—	11	7	2	3	2	5	—	1
5- 6 " "	25	—	—	—	—	15	6	—	1	1	2	—	—
6- 7 " "	26	2	—	—	—	16	3	—	1	—	3	—	1
7- 8 " "	20	1	1	—	—	9	5	2	—	1	1	—	—
8-20 " "	169	8	—	6	3	63	35	9	7	13	17	1	7
20 years and over — ans et plus.....	136	4	2	4	2	19	59	9	9	6	20	—	2
Not stated — Non précisée	16	—	—	1	—	—	14	—	1	—	—	—	—

TABLE 31. Notifications of Reactivated Cases by Origin, Sex and Province, 1973

TABLEAU 31. Déclarations des cas réactivés suivant l'origine, le sexe et la province, 1973

Origin and sex Origine et sexe	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	
TOTAL..... T.	567	18	4	12	6	189	171	35	26	35	59	1	11	
M.	333	9	3	8	4	120	97	18	15	19	31	1	8	
F.	234	9	1	4	2	69	74	17	11	16	28	—	3	
Indian — Indiens	T.	83	1	—	2	—	4	15	17	8	17	16	1	2
M.	33	—	—	1	—	2	6	8	3	7	4	1	1	
F.	50	1	—	1	—	2	9	9	5	10	12	—	1	
Eskimo — Esquimaux	T.	14	2	—	—	—	5	—	—	—	—	—	7	
M.	9	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6	
F.	5	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	1	
Other — Autres	T.	470	15	4	10	6	180	156	18	18	43	—	2	
M.	291	7	3	7	4	117	91	10	12	12	27	—	1	
F.	179	8	1	3	2	63	65	8	6	6	16	—	1	

**ALL PATIENTS UNDER TREATMENT
FOR TUBERCULOSIS**

**TOUS LES PATIENTS RECEVANT UN
TRAITEMENT POUR LA TUBERCULOSE**

TABLE 32. All Patients under Treatment for Tuberculosis and Rate per 100,000 Population by Patient Status and Province, December 31, 1973

TABLEAU 32. Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose et taux pour 100,000 habitants suivant l'état du patient et la province, 31 décembre, 1973

Patient status État du patient	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number — Nombre													
All tuberculous patients under treatment — Tous les patients tuberculeux recevant un traitement	8,543	425	30	362	287	2,156	2,516	488	338	743	1,013	17	168
Inpatients — Hospitalisés	1,434	43	12	78	36	541	378	56	49	117	101	4	19
Outpatients on drugs — Traités par médication hors de l'hôpital	7,109	382	18	284	251	1,615	2,138	432	289	626	912	13	149
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants													
All tuberculous patients under treatment — Tous les patients tuberculeux recevant un traitement	38.3	78.7	25.9	44.7	43.6	35.3	31.3	48.6	37.3	43.7	42.8	85.0	442.1
Inpatients — Hospitalisés	6.4	8.0	10.3	9.6	5.5	8.9	4.7	5.6	5.4	6.9	4.3	20.0	50.0
Outpatients on drugs — Traités par médication hors de l'hôpital	31.9	70.7	15.5	35.1	38.1	26.4	26.6	43.0	31.9	36.8	38.5	65.0	392.1

TABLE 33 A. Summary Statistics — All Patients under Treatment for Tuberculosis by Sex and Province, December 31, 1973

TABLEAU 33 A. Sommaire des statistiques — Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose suivant le sexe et la province, 31 décembre, 1973

Sex — Sexe	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number — Nombre													
TOTAL	8,543	425	30	362	287	2,156	2,516	488	338	743	1,013	17	168
Male — Masculin	5,079	266	17	228	174	1,303	1,496	261	177	431	626	10	90
Female — Féminin	3,464	159	13	134	113	853	1,020	227	161	312	387	7	78
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants													
TOTAL	38.3	78.7	25.9	44.7	43.6	35.3	31.3	48.6	37.3	43.7	42.8	85.0	442.1
Male — Masculin	45.6	96.8	29.2	56.1	52.6	43.0	37.4	52.0	38.6	49.9	52.5	92.6	450.0
Female — Féminin	31.0	60.0	22.5	33.2	34.5	27.7	25.3	45.1	36.0	37.2	32.9	76.1	433.3

TABLE 33 B. Summary Statistics – All Patients under Treatment for Tuberculosis by Sex and Age Group, December 31, 1973

TABLEAU 33 B. Sommaire des statistiques – Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose suivant le sexe et le groupe d'âge, 31 décembre, 1973

Sex – Sexe	Total	0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75 and over — et plus
Number – Nombre										
TOTAL	8,543	204	506	895	1,282	1,269	1,452	1,329	935	671
Male – Masculin	5,079	112	268	429	635	728	924	911	646	426
Female – Féminin	3,464	92	238	466	647	541	528	418	289	245
Rate per 100,000 population – Taux pour 100,000 habitants										
TOTAL	38.3	11.4	11.3	21.2	39.7	49.8	60.4	73.5	81.2	95.8
Male – Masculin	45.6	12.2	11.8	20.1	39.0	56.0	77.7	102.8	120.4	152.2
Female – Féminin	31.0	10.6	10.9	22.3	40.4	43.3	43.5	45.4	47.0	58.3

TABLE 33 C. Summary Statistics – All Patients under Treatment for Tuberculosis by Sex and Diagnosis, December 31, 1973

TABLEAU 33 C. Sommaire des statistiques – Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose suivant le sexe et le diagnostic, 31 décembre, 1973

Sex – Sexe	Total	Tuberculosis of respiratory system — Tuberculose de l'appareil respiratoire					Non-respiratory — Non respiratoire
		Minimal pulmonary — Pulmonaire, minime	Moderately advanced pulmonary — Pulmonaire, assez avancée	Far advanced pulmonary — Pulmonaire, très avancée	Primary — Primaire	Other respiratory ¹ — Autres respiratoires ¹	
		Number – Nombre					
TOTAL	8,543	2,016	2,498	1,214	582	849	1,384
Male – Masculin	5,079	1,114	1,604	883	311	540	627
Female – Féminin	3,464	902	894	331	271	309	757
Rate per 100,000 population – Taux pour 100,000 habitants							
TOTAL	38.3	9.0	11.2	5.4	2.6	3.8	6.2
Male – Masculin	45.6	10.0	14.4	7.9	2.8	4.8	5.6
Female – Féminin	31.0	8.1	8.0	3.0	2.4	2.8	6.8

¹ Includes cases with pulmonary stage unspecified. — Y compris les cas avec le stade pulmonaire non précisé.

TABLE 33 D. Summary Statistics – All Patients under Treatment for Tuberculosis by Sex and Origin,¹ December 31, 1973

TABLEAU 33 D. Sommaire des statistiques – Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose suivant le sexe et l'origine¹, 31 décembre, 1973

Sex – Sexe	Total	Indian — Indiens	Eskimo — Esquimaux	Other — Autres
		Number – Nombre		
TOTAL	8,543	1,092	170	7,281
Male – Masculin	5,079	583	84	4,412
Female – Féminin	3,464	509	86	2,869
Percentage distribution – Répartition procentuelle				
TOTAL	100	13	2	85
Male – Masculin	100	11	2	87
Female – Féminin	100	15	2	83

¹ For distribution of population by origin and sex, see Table 2D page 21. — Pour la répartition de la population suivant l'origine et le sexe, voir tableau 2D, page 21.

TABLE 34. All Patients under Treatment for Tuberculosis and Rate per 100,000 Population by Patient Status, Sex and Province, December 31, 1973

TABLEAU 34. Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose et taux pour 100,000 habitants suivant l'état du patient, le sexe et la province, 31 décembre, 1973

Patient status and sex — État du patient et sexe	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	
Number — Nombre														
All tuberculous patients under treatment — Tous les patients tuberculeux recevant un traitement.	T. M. F.	8,543 5,079 3,464	425 266 159	30 17 13	362 228 134	287 174 113	2,156 1,303 833	2,516 1,496 1,020	488 261 227	338 177 161	743 431 312	1,013 626 387	17 10 7	168 90 78
Inpatients — Hospitalisés	T. M. F.	1,434 985 449	43 30 13	12 7 5	78 47 31	36 22 14	541 376 165	378 279 99	56 32 24	49 27 22	117 75 42	101 79 22	4 2 2	19 9 10
Outpatients on drugs — Traités par médication hors de l'hôpital.	T. M. F.	7,109 4,094 3,015	382 236 146	18 10 8	284 181 103	251 152 99	1,615 927 688	2,138 1,217 921	432 229 203	289 150 139	626 356 270	912 547 365	13 8 5	149 81 68
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants														
All tuberculous patients under treatment — Tous les patients tuberculeux recevant un traitement.	T. M. F.	38.3 45.6 31.0	78.7 96.8 60.0	25.9 29.2 22.5	44.7 56.1 33.2	43.6 52.6 34.5	35.3 43.0 27.7	31.3 37.4 25.3	48.6 52.0 45.1	37.3 38.6 36.0	43.7 49.9 37.2	42.8 52.5 32.9	85.0 92.6 76.1	442.1 450.0 433.3
Inpatients — Hospitalisés	T. M. F.	6.4 8.8 4.0	8.0 10.9 4.9	10.3 12.0 8.7	9.6 11.6 7.7	5.5 6.7 4.3	8.9 12.4 5.4	4.7 7.0 2.5	5.6 6.4 4.8	5.4 5.9 4.9	6.9 8.7 5.0	4.3 6.6 1.9	20.0 45.0 21.7	50.0 55.6 55.6
Outpatients on drugs — Traités par médication hors de l'hôpital.	T. M. F.	31.9 36.7 27.0	70.7 85.8 55.1	15.5 17.2 13.8	35.1 44.6 25.5	38.1 46.0 30.2	26.4 30.6 22.3	26.6 30.4 22.8	43.0 45.6 40.3	31.9 32.7 31.1	36.8 41.2 32.2	38.5 45.9 31.0	65.0 74.1 54.3	392.1 405.0 377.8

TABLE 35. All Patients under Treatment for Tuberculosis and Rate per 100,000 Population by Patient Status, Sex and Age Group, December 31, 1973

TABLEAU 35. Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose et taux pour 100,000 habitants suivant l'état du patient, le sexe et le groupe d'âge, 31 décembre, 1973

Patient status and sex — État du patient et sexe	Total	0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75 and over — et plus	
Number — Nombre											
All tuberculous patients under treatment — Tous les patients tuberculeux recevant un traitement.	T. M. F.	8,543 5,079 3,464	204 112 92	506 268 238	895 429 466	1,282 635 647	1,269 728 541	1,452 924 528	1,329 911 418	935 646 289	671 426 245
Inpatients — Hospitalisés	T. M. F.	1,434 985 449	38 23 15	48 24 24	90 52 38	151 89 62	179 121 58	259 199 60	260 196 64	235 162 73	174 119 56
Outpatients on drugs — Traités par médication hors de l'hôpital.	T. M. F.	7,109 4,094 3,015	166 89 77	458 244 214	805 377 428	1,131 546 585	1,090 607 483	1,193 725 468	1,069 725 354	700 484 216	497 307 190
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants											
All tuberculous patients under treatment — Tous les patients tuberculeux recevant un traitement.	T. M. F.	38.3 45.6 31.0	11.4 12.2 10.6	11.3 11.8 10.9	21.2 20.1 22.3	39.7 39.0 40.4	49.8 56.0 43.3	60.4 77.7 43.5	73.5 102.8 45.4	81.2 120.4 47.0	95.8 152.2 58.3
Inpatients — Hospitalisés	T. M. F.	6.4 8.8 4.0	2.1 2.5 1.7	1.1 1.1 1.1	2.1 2.4 1.8	4.7 5.5 3.9	7.0 9.3 4.6	10.8 16.7 4.9	14.4 22.1 6.9	20.4 30.2 11.9	24.9 42.5 13.1
Outpatients on drugs — Traités par médication hors de l'hôpital.	T. M. F.	31.9 36.7 27.0	9.3 9.7 8.8	10.3 10.7 9.8	19.1 17.7 20.5	35.0 33.6 36.5	42.8 46.7 38.7	49.6 60.9 38.6	59.1 80.7 38.4	60.8 90.2 35.1	71.0 109.7 45.2

TABLE 36. All Patients under Treatment for Tuberculosis and Rate per 100,000 Population by Patient Status, Sex and Diagnosis, December 31, 1973

TABLEAU 36. Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose et taux pour 100,000 habitants suivant l'état du patient, le sexe et le diagnostic, 31 décembre, 1973

Patient status and sex État du patient et sexe	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire					Non-respiratory — Non respiratoire
		Minimal pulmonary — Pulmonaire, minime	Moderately advanced pulmonary — Pulmonaire, assez avancée	Far advanced pulmonary — Pulmonaire, très avancée	Primary — Primaire	Other respiratory ¹ — Autres respiratoires ¹	
Number — Nombre							
All tuberculous patients under treatment — Tous les patients tuberculeux recevant un traitement.	8,543	2,016	2,498	1,214	582	849	1,384
M.	5,079	1,114	1,604	883	311	540	627
F.	3,464	902	894	331	271	309	757
Inpatients — Hospitalisés	1,434	253	512	385	73	143	68
M.	985	152	368	290	43	102	30
F.	449	101	144	95	30	41	38
Outpatients on drugs — Traités par médication hors de l'hôpital.	7,109	1,763	1,986	829	509	706	1,316
M.	4,094	962	1,236	593	268	438	597
F.	3,015	801	750	236	241	268	719
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants							
All tuberculous patients under treatment — Tous les patients tuberculeux recevant un traitement.	38.3	9.0	11.2	5.4	2.6	3.8	6.2
M.	45.6	10.0	14.4	7.9	2.8	4.8	5.6
F.	31.0	8.1	8.0	3.0	2.4	2.6	6.8
Inpatients — Hospitalisés	6.4	1.1	2.3	1.7	0.3	0.6	0.3
M.	8.8	1.4	3.3	2.6	0.4	0.9	0.3
F.	4.0	0.9	1.3	0.9	0.3	0.4	0.3
Outpatients on drugs — Traités par médication hors de l'hôpital.	31.9	7.9	8.9	3.7	2.3	3.2	5.9
M.	36.7	8.6	11.1	5.3	2.4	3.9	5.4
F.	27.0	7.2	6.7	2.1	2.2	2.4	6.4

¹ Includes cases with pulmonary stage unspecified. — Y compris les cas avec le stade pulmonaire non précisé.

TABLE 37. All Patients under Treatment for Tuberculosis and Percentage Distribution by Patient Status, Sex and Origin,¹ December 31, 1973

TABLEAU 37. Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose et répartition procentuelle suivant l'état du patient, le sexe et l'origine¹, 31 décembre, 1973

Patient status and sex État du patient et sexe	Total	Indian — Indiens		Eskimo — Esquimaux		Other — Autres
		Number — Nombre	Percentage distribution — Répartition procentuelle	Number — Nombre	Percentage distribution — Répartition procentuelle	
Number — Nombre						
All tuberculous patients under treatment — Tous les patients tuberculeux recevant un traitement.	8,543	1,092	100	170	100	7,281
M.	5,079	583	100	84	100	4,412
F.	3,464	509	100	86	100	2,869
Inpatients — Hospitalisés	1,434	203	14	32	22	1,199
M.	985	116	12	15	13	854
F.	449	87	19	17	20	345
Outpatients on drugs — Traités par médication hors de l'hôpital	7,109	889	12	138	100	6,082
M.	4,094	467	11	69	50	3,558
F.	3,015	422	13	69	50	2,524
Percentage distribution — Répartition procentuelle						
All tuberculous patients under treatment — Tous les patients tuberculeux recevant un traitement.	100	100	100	100	100	100
M.	100	100	100	100	100	100
F.	100	100	100	100	100	100
Inpatients — Hospitalisés	17	19	14	19	14	16
M.	19	20	15	18	14	19
F.	13	17	12	20	14	12
Outpatients on drugs — Traités par médication hors de l'hôpital	83	81	12	81	60	84
M.	81	80	11	82	55	81
F.	87	83	13	80	55	88

¹ For distribution of population by origin and sex, see Table 2D, page 21. — Pour la répartition de la population suivant l'origine et le sexe, voir tableau 2D, page 21.

TABLE 38. All Patients under Treatment for Tuberculosis, by Detailed Diagnosis, Sex and Province,
December 31, 1973

No.	I.C.D.A. No. Nº de la C.I.M.A.	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	
				number	— nombre —		
1		TOTAL	T. M. F.	8,543 5,079 3,464	425 266 159	30 17 13	362 228 134
2							
3							
4	010-012.9	Tuberculosis of respiratory system — Tuberculose de l'appareil respiratoire	T. M. F.	7,159 4,452 2,707	319 205 114	27 15 12	307 201 106
5							
6							
7	010	Silicotuberculosis — Silicotuberculose	T. M. F.	51 49 2	— — —	— — —	4 4 —
8							
9							
10	011	Pulmonary — Pulmonaire	T. M. F.	6,182 3,879 2,303	264 172 92	24 14 10	267 182 85
11							
12							
13	011.0	Minimal — Minime	T. M. F.	2,016 1,114 902	81 44 37	4 3 1	83 50 33
14							
15							
16	011.1	Moderately advanced — Assez avancée	T. M. F.	2,498 1,604 894	105 68 37	14 8 6	96 75 21
17							
18							
19	011.2	Far advanced — Très avancée	T. M. F.	1,214 883 331	73 56 17	5 2 3	84 55 29
20							
21							
22	011.3	Stage unspecified — Stade non précisé	T. M. F.	271 163 108	1 1 —	1 1 —	— — —
23							
24							
25	011.4	Miliary — Miliaire	T. M. F.	79 45 34	4 3 1	— — —	3 1 2
26							
27							
28	011.9	NOS — S.A.I.	T. M. F.	104 70 34	— — —	— — —	1 1 —
29							
30							
31	012	Other respiratory tuberculosis — Autres tuberculoses de l'appareil res- piratoire	T. M. F.	926 524 402	55 33 22	3 1 2	36 15 21
32							
33							
34	012.0	Primary — Primaire	T. M. F.	582 311 271	39 22 17	— — —	25 11 14
35							
36							
37	012.1	Pleurisy specified as tuberculous — Pleurésie spécifiée comme tuber- culeuse	T. M. F.	326 206 120	15 11 4	2 1 1	10 3 7
38							
39							
40	012.2	Pleurisy with effusion without mention of cause — Pleurésie exsudati- ve sans mention d'étiologie	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —
41							
42							
43	012.3	Tuberculous laryngitis — Laryngite tuberculeuse	T. M. F.	2 1 1	— — —	— — —	— — —
44							
45							
46	012.9	Other — Autres	T. M. F.	16 6 10	1 — 1	1 — 1	1 1 —
47							
48							
49	013-018.9	Non-respiratory — Non respiratoire	T. M. F.	1,384 627 757	106 61 45	3 2 1	55 27 28
50							
51							
52	013	Meninges and central nervous system — Méninges et système nerveux central	T. M. F.	31 22 9	4 3 1	— — —	4 4 —
53							
54							
55	013.0	Meningitis — Méningite	T. M. F.	30 21 9	4 3 1	— — —	4 4 —
56							
57							
58	013.9	Other — Autres	T. M. F.	1 1 —	— — —	— — —	— — —
59							
60							

TABLEAU 38. Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose suivant le diagnostic détaillé, le sexe et la province, 31 décembre, 1973

**TABLE 38. All Patients under Treatment for Tuberculosis by Detailed Diagnosis, Sex and Province,
December 31, 1973 – Concluded**

No.	I.C.D.A. No. Nº de la C.I.M.A.	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.
				number — nombre	—	—
Non-respiratory – Concluded – Non respiratoire – fin:						
1	014	Intestines, peritoneum and mesenteric glands – Intestins, pétroine et ganglions mésentériques.	T. 56 M. 20 F. 36	1 1 —	1 — 1	3 3
2						
3						
4	015	Bones and joints, active – Osseuse et articulaire, active	T. 182 M. 99 F. 83	22 13 9	2 2 —	12 6 6
5						
6						
7	015.0	Vertebral column – Colonne vertébrale	T. 57 M. 35 F. 22	8 6 2	2 2 —	5 4 1
8						
9						
10	015.1	Hip – Hanche	T. 28 M. 14 F. 14	7 5 2	— — —	4 — 4
11						
12						
13	015.2	Knee – Genou	T. 14 M. 6 F. 8	2 1 1	— — —	— — —
14						
15						
16	015.8	Other specified bones and joints – Autres os ou articulations	T. 53 M. 30 F. 23	2 1 1	— — —	1 — 1
17						
18						
19	015.9	Unspecified – Sans précision	T. 30 M. 14 F. 16	3 — 3	— — —	2 2 —
20						
21						
22	016	Genito-urinary system – Appareil génito-urinaire	T. 627 M. 309 F. 318	70 42 28	— — —	20 13 7
23						
24						
25	016.0	Kidney – Rein	T. 347 M. 185 F. 162	50 37 13	— — —	10 7 3
26						
27						
28	016.1	Other urinary organs – Autres organes urinaires	T. 16 M. 9 F. 7	— — —	— — —	1 — 1
29						
30						
31	016.2	Genital organs (male and female) – Organes génitaux (de l'homme et de la femme).	T. 142 M. 45 F. 97	16 2 14	— — —	2 1 1
32						
33						
34	016.9	Unspecified – Sans précision	T. 122 M. 70 F. 52	4 3 1	— — —	7 5 2
35						
36						
37	017	Other organs – Autres organes	T. 482 M. 175 F. 307	9 2 7	— — —	16 4 12
38						
39						
40	017.0	Skin and subcutaneous cellular tissue – Peau et tissu cellulaire	T. 19 M. 6 F. 13	2 — 2	— — —	2 — 2
41						
42						
43	017.1	Peripheral lymphatic glands – Ganglions lymphatiques périphériques	T. 417 M. 151 F. 266	6 2 4	— — —	12 4 8
44						
45						
46	017.2	Eye – Oeil	T. 11 M. 4 F. 7	— — —	— — —	1 — 1
47						
48						
49	017.3	Ear – Oreille	T. 1 M. — F. 1	— — —	— — —	— — —
50						
51						
52	017.9	Other – Autres	T. 34 M. 14 F. 20	1 — 1	— — —	1 — 1
53						
54						
55	018	Disseminated – Disséminée	T. 6 M. 2 F. 4	— — —	— — —	— — —
56						
57						
58	018.0	Acute miliary tuberculosis specified as non-pulmonary – Tuberculose T. miliaire aiguë spécifiée comme non pulmonaire.	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —
59						
60						
61	018.1	Acute miliary tuberculosis unspecified – Tuberculose miliaire aiguë, T. sans précision.	T. 2 M. — F. 2	— — —	— — —	— — —
62						
63						
64	018.9	Other forms of disseminated tuberculosis – Autres formes de tubercu-T. lose à foyers multiples.	T. 4 M. 2 F. 2	— — —	— — —	— — —
65						
66						

TABLEAU 38. Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose suivant le diagnostic détaillé, le sexe et la province, 31 décembre, 1973 – fin

**TABLE 39. Inpatients under Treatment for Tuberculosis, by Detailed Diagnosis, Sex and Province,
December 31, 1973**

No.	I.C.D.A. No. Nº de la C.I.M.A.	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	
				T.-N.	I. P.-É.	N.-É.	
1		TOTAL	T. M. F.	1,434 985 449	43 30 13	12 7 5	78 47 31
2							
3							
4	010-012.9	Tuberculosis of respiratory system – Tuberculose de l'appareil respiratoire	T. M. F.	1,366 955 411	35 26 9	10 5 5	73 45 28
5							
6							
7	010	Silicotuberculosis – Silicotuberculose	T. M. F.	12 12 -	— — —	— — —	1 1 —
8							
9							
10	011	Pulmonary – Pulmonaire	T. M. F.	1,250 879 371	30 22 8	10 5 5	68 44 24
11							
12							
13	011.0	Minimal – Minime	T. M. F.	253 152 101	4 3 1	— — —	9 4 5
14							
15							
16	011.1	Moderately advanced – Assez avancée	T. M. F.	512 368 144	13 9 4	4 2 2	25 22 3
17							
18							
19	011.2	Far advanced – Très avancée	T. M. F.	385 290 95	10 8 2	5 2 3	34 18 16
20							
21							
22	011.3	Stage unspecified – Stade non précisé	T. M. F.	48 30 18	1 1 —	1 1 —	— — —
23							
24							
25	011.4	Miliary – Miliaire	T. M. F.	17 10 7	2 1 1	— — —	— — —
26							
27							
28	011.9	NOS – S.A.I.	T. M. F.	35 29 6	— — —	— — —	— — —
29							
30							
31	012	Other respiratory tuberculosis – Autres tuberculoses de l'appareil res- piratoire	T. M. F.	104 64 40	5 4 1	— — —	4 — 4
32							
33							
34	012.0	Primary – Primaire	T. M. F.	73 43 30	4 3 1	— — —	4 — 4
35							
36							
37	012.1	Pleurisy specified as tuberculous – Pleurésie spécifiée comme tuber- culouse	T. M. F.	30 21 9	1 1 —	— — —	— — —
38							
39							
40	012.2	Pleurisy with effusion without mention of cause – Pleurésie exsudati- ve sans mention d'étiologie	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —
41							
42							
43	012.3	Tuberculous laryngitis – Laryngite tuberculeuse	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —
44							
45							
46	012.9	Other – Autres	T. M. F.	1 — 1	— — —	— — —	— — —
47							
48							
49	013-018.9	Non-respiratory – Non respiratoire	T. M. F.	68 30 38	8 4 4	2 2 —	5 2 3
50							
51							
52	013	Meninges and central nervous system – Méninges et système nerveux cen- tral	T. M. F.	2 2 —	— — —	— — —	1 1 —
53							
54							
55	013.0	Meningitis – Méningite	T. M. F.	2 2 —	— — —	— — —	1 1 —
56							
57							
58	013.9	Other – Autres	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —
59							
60							

TABLEAU 39. Patients hospitalisés recevant un traitement pour la tuberculose suivant le diagnostic détaillé, le sexe et la province, 31 décembre, 1973

TABLE 39. Inpatients under Treatment for Tuberculosis by Detailed Diagnosis, Sex and Province,
December 31, 1973 - Concluded

No.	I.C.D.A. No. Nº de la C.I.M.A.	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.
number — nombre						
1	014	Non-respiratory — Concluded — Non respiratoire — fin:				
2		Intestines, peritoneum and mesenteric glands — Intestins, péritoine et gan-	T. M. F.	2	—	—
3		glions mésentériques.		—	—	—
4	015	Bones and joints, active — Osseuse et articulaire, active	T. M. F.	27 15 12	5 4 1	2 2 —
5						1
6						3
7	015.0	Vertebral column — Colonne vertébrale	T. M. F.	17 12 5	3 3 —	2 2 —
8						1
9						—
10	015.1	Hip — Hanche	T. M. F.	4 1 3	1 1 —	— — 3
11						—
12						3
13	015.2	Knee — Genou	T. M. F.	2 — 2	— — —	— — —
14						—
15						—
16	015.8	Other specified bones and joints — Autres os ou articulations	T. M. F.	2 1 1	— — —	— — —
17						—
18						—
19	015.9	Unspecified — Sans précision	T. M. F.	2 1 1	1 — 1	— — —
20						—
21						—
22	016	Genito-urinary system — Appareil génito-urinaire	T. M. F.	20 7 13	2 — 2	— — —
23						—
24						—
25	016.0	Kidney — Rein	T. M. F.	13 3 10	2 — 2	— — —
26						—
27						—
28	016.1	Other urinary organs — Autres organes urinaires	T. M. F.	— — —	— — —	— — —
29						—
30						—
31	016.2	Genital organs (male and female) — Organes génitaux (de l'homme et de la femme).	T. M. F.	2 1 1	— — —	— — —
32						—
33						—
34	016.9	Unspecified — Sans précision	T. M. F.	5 3 2	— — —	— — —
35						—
36						—
37	017	Other organs — Autres organes	T. M. F.	17 6 11	1 — 1	— — —
38						—
39						—
40	017.0	Skin and subcutaneous cellular tissue — Peau et tissu cellulaire	T. M. F.	1 — 1	— — —	— — —
41						—
42						—
43	017.1	Peripheral lymphatic glands — Ganglions lymphatiques périphériques ..	T. M. F.	12 3 9	1 — 1	— — —
44						—
45						—
46	017.2	Eye — Oeil	T. M. F.	2 1 1	— — —	— — —
47						—
48						—
49	017.3	Ear — Oreille	T. M. F.	— — —	— — —	— — —
50						—
51						—
52	017.9	Other — Autres	T. M. F.	2 2 —	— — —	— — —
53						—
54						—
55	018	Disseminated — Disséminée	T. M. F.	— — —	— — —	— — —
56						—
57						—
58	018.0	Acute miliary tuberculosis specified as non-pulmonary — Tuberculose T. miliaire aiguë spécifiée comme non pulmonaire.	T. M. F.	— — —	— — —	— — —
59						—
60						—
61	018.1	Acute miliary tuberculosis unspecified — Tuberculose miliaire aiguë, T. sans précision.	T. M. F.	— — —	— — —	— — —
62						—
63						—
64	018.9	Other forms of disseminated tuberculosis — Autres formes de tubercu- T. lose à foyers multiples.	T. M. F.	— — —	— — —	— — —
65						—
66						—

TABLEAU 39. Patients hospitalisés recevant un traitement pour la tuberculose suivant le diagnostic détaillé, le sexe et la province, 31 décembre, 1973 - fin

**TABLE 40. Outpatients under Drug Treatment for Tuberculosis, by Detailed Diagnosis, Sex and Province,
December 31, 1973**

No.	I.C.D.A. No. Nº de la C.I.M.A.	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	
				T.-N	I.P.-É.	N.-É.	
				number — nombre			
1		TOTAL	T. M. F.	7,109 4,094 3,015	382 236 146	18 10 8	284 181 103
2							
3							
4	010-012.9	Tuberculosis of respiratory system — Tuberculose de l'appareil respiratoire	T. M. F.	5,793 3,497 2,296	284 179 103	17 10 7	234 156 78
5							
6							
7	010	Silicotuberculosis — Silicotuberculose	T. M. F.	39 37 2	— — —	— — —	3 3 —
8							
9							
10	011	Pulmonary — Pulmonaire	T. M. F.	4,932 3,000 1,932	234 150 84	14 9 5	199 138 61
11							
12							
13	011.0	Minimal — Minime	T. M. F.	1,763 962 801	77 41 36	4 3 1	74 46 28
14							
15							
16	011.1	Moderately advanced — Assez avancée	T. M. F.	1,986 1,236 750	92 59 33	10 6 4	71 53 18
17							
18							
19	011.2	Far advanced — Très avancée	T. M. F.	829 593 236	63 48 15	— — —	50 37 13
20							
21							
22	011.3	Stage unspecified — Stade non précisé	T. M. F.	223 133 90	— — —	— — —	— — —
23							
24							
25	011.4	Miliary — Miliaire	T. M. F.	62 35 27	2 2 —	— — —	3 1 2
26							
27							
28	011.9	NOS — S.A.I.	T. M. F.	69 41 28	— — —	— — —	1 1 —
29							
30							
31	012	Other respiratory tuberculosis — Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire.	T. M. F.	822 460 362	50 29 21	3 1 2	32 15 17
32							
33							
34	012.0	Primary — Primaire	T. M. F.	509 268 241	35 19 16	— — —	21 11 10
35							
36							
37	012.1	Pleurisy specified as tuberculous — Pleurésie spécifiée comme tuberculeuse.	T. M. F.	296 185 111	14 10 4	2 1 1	10 3 7
38							
39							
40	012.2	Pleurisy with effusion without mention of cause — Pleurésie exsudative sans mention d'étiologie.	T. M. F.	— — —	— — —	— — —	— — —
41							
42							
43	012.3	Tuberculous laryngitis — Laryngite tuberculeuse	T. M. F.	2 1 1	— — —	— — —	— — —
44							
45							
46	012.9	Other — Autres	T. M. F.	15 6 9	1 — 1	1 — 1	1 — —
47							
48							
49	013-018.9	Non-respiratory — Non respiratoire	T. M. F.	1,316 597 719	98 57 41	1 — 1	50 25 25
50							
51							
52	013	Meninges and central nervous system — Méninges et système nerveux central.	T. M. F.	29 20 9	4 3 1	— — —	3 3 —
53							
54							
55	013.0	Meningitis — Méningite	T. M. F.	28 19 9	4 3 1	— — —	3 3 —
56							
57							
58	013.9	Other — Autres	T. M. F.	1 1 —	— — —	— — —	— — —
59							
60							

TABLEAU 40. Patients hors de l'hôpital traités par médication pour la tuberculose suivant le diagnostic détaillé, le sexe et la province, 31 décembre, 1973

**TABLE 40. Outpatients under Drug Treatment for Tuberculosis by Detailed Diagnosis, Sex and Province,
December 31, 1973 — Concluded**

No.	I.C.D.A. No. Nº de la C.I.M.A.	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I. P.-É.	N.S. N.-É.
number — nombre						
		Non-respiratory — Concluded — Non respiratoire — fin:				
1	014	Intestines, peritoneum and mesenteric glands — Intestins, péritoine et ganglions mésentériques.	T. 54 M. 20 F. 34	1 1 —	1 — 1	3 — 3
2						
3						
4	015	Bones and joints, active — Osseuse et articulaire, active	T. 155 M. 84 F. 71	17 9 8	— — —	8 5 3
5						
6						
7	015.0	Vertebral column — Colonne vertébrale	T. 40 M. 23 F. 17	5 3 2	— — —	4 3 1
8						
9						
10	015.1	Hip — Hanche	T. 24 M. 13 F. 11	6 4 2	— — —	1 — 1
11						
12						
13	015.2	Knee — Genou	T. 12 M. 6 F. 6	2 1 1	— — —	— — —
14						
15						
16	015.8	Other specified bones and joints — Autres os ou articulations	T. 51 M. 29 F. 22	2 1 1	— — —	1 — 1
17						
18						
19	015.9	Unspecified — Sans précision	T. 28 M. 13 F. 15	2 — 2	— — —	2 2 —
20						
21						
22	016	Genito-urinary system — Appareil génito-urinaire	T. 607 M. 302 F. 305	68 42 26	— — —	20 13 7
23						
24						
25	016.0	Kidney — Rein	T. 334 M. 182 F. 152	48 37 11	— — —	10 7 3
26						
27						
28	016.1	Other urinary organs — Autres organes urinaires	T. 16 M. 9 F. 7	— — —	— — —	1 — 1
29						
30						
31	016.2	Genital organs (male and female) — Organes génitaux (de l'homme et de la femme).	T. 140 M. 44 F. 96	16 2 14	— — —	2 1 1
32						
33						
34	016.9	Unspecified — Sans précision	T. 117 M. 67 F. 50	4 3 1	— — —	7 5 2
35						
36						
37	017	Other organs — Autres organes	T. 465 M. 169 F. 296	8 2 6	— — —	16 4 12
38						
39						
40	017.0	Skin and subcutaneous cellular tissue — Peau et tissu cellulaire	T. 18 M. 6 F. 12	2 — 2	— — —	2 — 2
41						
42						
43	017.1	Peripheral lymphatic glands — Ganglions lymphatiques périphériques	T. 405 M. 148 F. 257	5 2 3	— — —	12 4 8
44						
45						
46	017.2	Eye — Oeil	T. 9 M. 3 F. 6	— — —	— — —	1 — 1
47						
48						
49	017.3	Ear — Oreille	T. 1 M. — F. 1	— — —	— — —	— — —
50						
51						
52	017.9	Other — Autres	T. 32 M. 12 F. 20	1 — 1	— — —	— — 1
53						
54						
55	018	Disseminated — Disséminée	T. 6 M. 2 F. 4	— — —	— — —	— — —
56						
57						
58	018.0	Acute miliary tuberculosis specified as non-pulmonary — Tuberculose miliaire aiguë spécifiée comme non pulmonaire.	T. — M. — F. —	— — —	— — —	— — —
59						
60						
61	018.1	Acute miliary tuberculosis unspecified — Tuberculose miliaire aiguë, sans précision.	T. 2 M. — F. 2	— — —	— — —	— — —
62						
63						
64	018.9	Other forms of disseminated tuberculosis — Autres formes de tuberculose à foyers multiples.	T. 4 M. 2 F. 2	— — —	— — —	— — —
65						
66						

TABLEAU 40. Patients hors de l'hôpital traités par médication pour la tuberculose suivant le diagnostic détaillé, le sexe et la province, 31 décembre, 1973 - fin

**TABLE 41. All Patients under Treatment for Tuberculosis and Rate per 100,000 Population by Age Group,
Sex and Province, December 31, 1973**

**TABLEAU 41. Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose et taux pour 100,000 habitants suivant
le groupe d'âge, le sexe et la province, 31 décembre, 1973**

Age group and sex Groupe d'âge et sexe	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.	
Number — Nombre														
All ages — Tous âges	T.	8,543	425	30	362	287	2,156	2,516	488	338	743	1,013	17	168
	M.	5,079	266	17	228	174	1,303	1,496	261	177	431	626	10	90
	F.	3,464	159	13	134	113	853	1,020	227	161	312	387	7	78
0- 4	T.	204	16	—	7	9	17	44	14	26	47	21	1	2
	M.	112	8	—	3	5	12	26	11	8	28	10	—	1
	F.	92	8	—	4	4	5	18	3	18	19	11	1	1
5- 14	T.	506	36	—	22	18	67	80	72	51	90	49	—	21
	M.	268	23	—	10	13	32	47	33	28	43	27	—	12
	F.	238	13	—	12	5	35	33	39	23	47	22	—	9
15- 24	T.	895	66	1	30	29	194	224	76	54	89	103	2	27
	M.	429	37	—	10	18	84	110	36	25	45	47	2	15
	F.	466	29	1	20	11	110	114	40	29	44	56	—	12
25- 34	T.	1,282	47	2	41	32	337	436	62	30	98	163	5	29
	M.	635	27	—	23	13	162	199	30	14	60	96	2	9
	F.	647	20	2	18	19	175	237	32	16	38	67	3	20
35- 44	T.	1,269	62	2	43	37	341	387	52	37	102	169	1	36
	M.	728	42	1	27	17	195	237	18	22	53	96	1	19
	F.	541	20	1	16	20	146	150	34	15	49	73	—	17
45- 54	T.	1,452	89	8	53	44	439	429	67	34	94	172	1	22
	M.	924	57	3	38	23	286	268	41	18	59	116	—	15
	F.	528	32	5	15	21	153	161	26	16	35	56	1	7
55- 64	T.	1,329	60	7	75	46	401	400	56	35	78	152	3	16
	M.	911	41	6	55	34	288	268	37	18	53	98	3	10
	F.	418	19	1	20	12	113	132	19	17	25	54	—	6
65- 74	T.	935	29	3	54	39	238	276	43	46	76	119	2	10
	M.	646	20	1	35	27	166	193	27	34	48	87	2	6
	F.	289	9	2	19	12	72	83	16	12	28	32	—	4
75 and over — et plus	T.	671	20	7	37	33	122	240	46	25	69	65	2	5
	M.	426	11	6	27	24	78	148	28	10	42	49	—	3
	F.	245	9	1	10	9	44	92	18	15	27	16	2	2

**TABLE 41. All Patients under Treatment for Tuberculosis and Rate per 100,000 Population by Age Group,
Sex and Province, December 31, 1973 – Concluded**

**TABLEAU 41. Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose et taux pour 100,000 habitants suivant
le groupe d'âge, le sexe et la province, 31 décembre, 1973 – fin**

Age group and sex Groupe d'âge et sexe	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	
Rate per 100,000 population – Taux pour 100,000 habitants														
All ages – Tous âges	T.	38.3	78.7	25.9	44.7	43.6	35.3	31.3	48.6	37.3	43.7	42.8	85.0	442.1
	M.	45.6	96.8	29.2	56.1	52.6	43.0	37.4	52.0	38.6	49.9	52.5	92.6	450.0
	F.	31.0	60.0	22.5	33.2	34.5	27.7	25.3	45.1	36.0	37.2	32.9	76.1	433.3
0-4	T.	11.4	26.1	—	10.2	15.4	3.8	6.9	16.4	35.5	31.0	11.3	43.5	34.5
	M.	12.2	25.5	—	8.5	16.7	5.3	7.9	25.3	21.4	36.0	10.5	—	33.3
	F.	10.6	26.8	—	11.9	14.0	2.3	5.8	7.2	50.1	25.7	12.1	90.9	35.7
5-14	T.	11.3	27.2	—	13.2	12.7	5.4	5.2	36.9	27.4	24.9	11.0	—	200.0
	M.	11.8	34.0	—	11.7	18.0	5.1	5.9	33.2	29.5	23.3	11.9	—	222.2
	F.	10.9	20.1	—	14.7	7.3	5.8	4.4	40.9	25.3	26.6	10.1	—	176.5
15-24	T.	21.2	58.7	4.4	19.1	21.3	15.9	15.4	40.6	31.5	27.6	24.2	64.5	403.0
	M.	20.1	65.4	—	12.5	26.0	13.6	15.0	38.0	28.4	27.6	21.7	133.3	416.7
	F.	22.3	51.9	8.8	26.1	16.4	18.2	15.8	43.2	34.7	27.7	26.7	—	387.1
25-34	T.	39.7	68.6	14.5	38.3	38.0	36.3	36.8	46.2	30.1	39.8	46.5	125.0	467.7
	M.	39.0	78.3	—	42.4	30.1	34.9	33.4	44.1	27.8	48.4	53.7	95.2	281.2
	F.	40.4	58.8	29.4	34.1	46.2	37.7	40.3	48.3	32.4	31.1	39.0	157.9	666.7
35-44	T.	49.8	124.2	17.9	52.1	58.0	47.8	40.5	50.1	40.5	51.6	61.6	40.0	900.0
	M.	56.0	161.5	17.2	64.7	53.1	54.6	48.5	34.3	47.4	51.6	66.8	66.7	863.6
	F.	43.3	83.7	18.5	39.2	62.9	40.9	32.2	66.3	33.3	51.7	55.9	—	944.4
45-54	T.	60.4	195.6	75.5	64.8	68.9	67.6	47.3	61.9	34.2	54.4	66.0	55.6	846.2
	M.	77.7	240.5	57.7	94.5	73.2	90.0	59.6	77.7	36.1	67.7	89.6	—	1,071.4
	F.	43.5	146.8	92.6	36.1	64.6	46.2	35.2	46.8	32.2	40.9	42.7	125.0	583.3
55-64	T.	73.5	164.4	70.0	105.5	87.0	84.0	61.5	61.5	40.4	62.8	74.3	272.7	1,066.7
	M.	102.8	213.5	117.6	155.4	128.3	125.7	83.9	82.8	41.2	84.9	98.4	428.6	1,250.0
	F.	45.4	109.8	20.4	56.0	45.5	45.6	39.8	41.0	39.6	40.5	51.4	—	857.1
65-74	T.	81.2	140.1	42.3	120.5	113.0	81.1	65.1	71.7	80.8	97.1	90.7	500.0	1,666.7
	M.	120.4	196.1	28.6	162.8	165.6	126.4	100.5	94.1	117.2	120.9	136.2	666.7	2,000.0
	F.	47.0	85.7	55.6	81.5	65.9	44.4	35.8	51.1	43.0	72.5	47.5	—	1,333.3
75 and over – et plus	T.	95.8	157.5	122.8	121.3	144.7	82.2	92.4	114.4	61.1	142.3	71.8	2,000.0	5,000.0
	M.	152.2	196.4	260.9	221.3	252.6	134.0	156.1	163.7	51.5	185.8	128.6	—	3,000.0
	F.	58.3	126.8	29.4	54.6	67.7	48.8	55.8	77.9	69.8	104.2	30.5	2,000.0	--

**TABLE 42. Inpatients under Treatment for Tuberculosis and Rate per 100,000 Population by Age Group,
Sex and Province, December 31, 1973**

**TABLEAU 42. Patients hospitalisés recevant un traitement pour la tuberculose et taux pour 100,000 habitants suivant
le groupe d'âge, le sexe et la province, 31 décembre, 1973**

Age group and sex Groupe d'âge et sexe	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number — Nombre													
All ages — Tous âges.....													
T.	1,434	43	12	78	36	541	378	56	49	117	101	4	19
M.	985	30	7	47	22	376	279	32	27	75	79	2	9
F.	449	13	5	31	14	165	99	24	22	42	22	2	10
0-4.....													
T.	38	2	—	—	—	3	10	—	11	9	2	1	—
M.	23	2	—	—	—	3	7	—	4	6	1	—	—
F.	15	—	—	—	—	—	3	—	7	3	1	1	—
5-14.....													
T.	48	3	—	3	—	6	2	5	15	8	2	—	4
M.	24	—	—	—	—	4	2	4	7	3	2	—	2
F.	24	3	—	3	—	2	—	1	8	5	—	—	2
15-24.....													
T.	90	1	—	7	2	33	19	9	2	12	3	—	2
M.	52	1	—	2	2	17	12	6	1	8	2	—	1
F.	38	—	—	5	—	16	7	3	1	4	1	—	1
25-34.....													
T.	151	6	1	6	6	67	32	5	2	6	18	1	1
M.	89	4	—	1	2	40	21	2	1	4	14	—	—
F.	62	2	1	5	4	27	11	3	1	2	4	1	1
35-44.....													
T.	179	4	1	2	5	84	42	3	3	15	15	1	4
M.	121	3	1	2	2	55	33	1	3	10	9	1	1
F.	58	1	—	—	3	29	9	2	—	5	6	—	3
45-54.....													
T.	259	11	4	15	6	107	66	14	1	15	17	—	3
M.	199	10	1	11	4	82	53	8	1	10	17	—	2
F.	60	1	3	4	2	25	13	6	—	5	—	—	1
55-64.....													
T.	260	8	2	18	4	115	70	5	1	16	18	1	2
M.	196	5	2	14	3	88	54	3	1	10	13	1	2
F.	64	3	—	4	1	27	16	2	—	6	5	—	—
65-74.....													
T.	235	2	1	16	7	81	74	9	10	17	16	—	2
M.	162	2	—	9	5	55	55	5	7	11	12	—	1
F.	73	—	1	7	2	26	19	4	3	6	4	—	1
75 and over — et plus.....													
T.	174	6	3	11	6	45	63	6	4	19	10	—	1
M.	119	3	3	8	4	32	42	3	2	13	9	—	—
F.	55	3	—	3	2	13	21	3	2	6	1	—	1

**TABLE 42. Inpatients under Treatment for Tuberculosis and Rate per 100,000 Population by Age Group,
Sex and Province, December 31, 1973 — Concluded**

**TABLEAU 42. Patients hospitalisés recevant un traitement pour la tuberculose et taux pour 100,000 habitants suivant
le groupe d'âge, le sexe et la province, 31 décembre, 1973.— fin**

Age group and sex Groupe d'âge et sexe	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants													
All ages — Tous âges													
T.	6.4	8.0	10.3	9.6	5.5	8.9	4.7	5.6	5.4	6.9	4.3	20.0	50.0
M.	8.8	10.9	12.0	11.6	6.7	12.4	7.0	6.4	5.9	8.7	6.6	18.5	45.0
F.	4.0	4.9	8.7	7.7	4.3	5.4	2.5	4.8	4.9	5.0	1.9	21.7	55.6
0-4													
T.	2.1	3.3	—	—	—	0.7	1.6	—	15.0	5.9	1.1	43.5	—
M.	2.5	6.4	—	—	—	1.3	2.1	—	10.7	7.7	1.1	—	—
F.	1.7	—	—	—	—	—	1.0	—	19.5	4.1	1.1	90.9	—
5-14													
T.	1.1	2.3	—	1.8	—	0.5	0.1	2.6	8.1	2.2	0.5	—	38.1
M.	1.1	—	—	—	—	0.6	0.3	4.0	7.4	1.6	0.9	—	37.0
F.	1.1	4.6	—	3.7	—	0.3	—	1.0	8.8	2.8	—	—	39.2
15-24													
T.	2.1	0.9	—	4.5	1.5	2.7	1.3	4.8	1.2	3.7	0.7	—	29.9
M.	2.4	1.8	—	2.5	2.9	2.8	1.6	6.3	1.1	4.9	0.9	—	27.8
F.	1.8	—	—	6.5	—	2.6	1.0	3.2	1.2	2.5	0.5	—	32.3
25-34													
T.	4.7	8.8	7.2	5.6	7.1	7.2	2.7	3.7	2.0	2.4	5.1	25.0	16.1
M.	5.5	11.6	—	1.8	4.6	8.6	3.5	2.9	2.0	3.2	7.8	—	—
F.	3.9	5.9	14.7	9.5	9.7	5.8	1.9	4.5	2.0	1.6	2.3	52.6	33.3
35-44													
T.	7.0	8.0	8.9	2.4	7.8	11.8	4.4	2.9	3.3	7.6	5.5	40.0	100.0
M.	9.3	11.5	17.2	4.8	6.2	15.4	6.8	1.9	6.5	9.7	6.3	66.7	45.5
F.	4.6	4.2	—	—	9.4	8.1	1.9	3.9	—	5.3	4.6	—	166.7
45-54													
T.	10.8	24.2	37.7	18.3	9.4	16.5	7.3	12.9	1.0	8.7	6.5	—	115.4
M.	16.7	42.2	19.2	27.4	12.7	25.8	11.8	15.1	2.0	11.5	13.1	—	142.9
F.	4.9	4.6	55.6	9.6	6.2	7.5	2.8	10.8	—	5.8	—	—	83.3
55-64													
T.	14.4	21.9	20.0	25.3	7.6	24.1	10.8	5.5	1.2	12.9	8.8	90.9	133.3
M.	22.1	26.0	39.2	39.5	11.3	38.4	16.9	6.7	2.3	16.0	13.1	142.9	250.0
F.	6.9	17.3	—	11.2	3.8	10.9	4.8	4.3	—	9.7	4.8	—	—
65-74													
T.	20.4	9.7	14.1	35.7	20.3	27.6	17.5	15.0	17.6	21.7	12.2	—	333.3
M.	30.2	19.6	—	41.9	30.7	41.9	28.6	17.4	24.1	27.7	18.8	—	333.3
F.	11.9	—	27.8	30.0	11.0	16.0	8.2	12.8	10.8	15.5	5.9	—	333.3
75 and over — et plus													
T.	24.9	47.2	52.6	36.1	26.3	30.3	24.2	14.9	9.8	39.2	11.0	—	1,000.0
M.	42.5	53.6	130.4	65.6	42.1	55.0	44.3	17.5	10.3	57.5	23.6	—	—
F.	13.1	42.3	—	16.4	15.0	14.4	12.7	13.0	9.3	23.2	1.9	—	..

**TABLE 43. Outpatients under Drug Treatment for Tuberculosis and Rate per 100,000 Population by Age Group,
Sex and Province, December 31, 1973**

**TABLEAU 43. Patients hors de l'hôpital traités par médication pour la tuberculose et taux pour 100,000 habitants suivant
le groupe d'âge, le sexe et la province, 31 décembre, 1973**

Age group and sex Groupe d'âge et sexe	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Number — Nombre													
All ages — Tous âges													
T. 7,109	382	18	284	251	1,615	2,138	432	289	626	912	13	149	
M. 4,094	236	10	181	152	927	1,217	229	150	356	547	8	81	
F. 3,015	146	8	103	99	688	921	203	139	270	365	5	68	
0 - 4													
T. 166	14	—	7	9	14	34	14	15	38	19	—	2	
M. 89	6	—	3	5	9	19	11	4	22	9	—	1	
F. 77	8	—	4	4	5	15	3	11	16	10	—	1	
5 - 14													
T. 458	33	—	19	18	61	78	67	36	82	47	—	17	
M. 244	23	—	10	13	28	45	29	21	40	25	—	10	
F. 214	10	—	9	5	33	33	38	15	42	22	—	7	
15 - 24													
T. 805	65	1	23	27	161	205	67	52	77	100	2	25	
M. 377	36	—	8	16	67	98	30	24	37	45	2	14	
F. 428	29	1	15	11	94	107	37	28	40	55	—	11	
25 - 34													
T. 1,131	41	1	35	26	270	404	57	28	92	145	4	28	
M. 546	23	—	22	11	122	178	28	13	56	82	2	9	
F. 585	18	1	13	15	148	226	29	15	36	63	2	19	
35 - 44													
T. 1,090	58	1	41	32	257	345	49	34	87	154	—	32	
M. 607	39	—	25	15	140	204	17	19	43	87	—	18	
F. 483	19	1	16	17	117	141	32	15	44	67	—	14	
45 - 54													
T. 1,193	78	4	38	38	332	363	53	33	79	155	1	19	
M. 725	47	2	27	19	204	215	33	17	49	99	—	13	
F. 468	31	2	11	19	128	148	20	16	30	56	1	6	
55 - 64													
T. 1,069	52	5	57	42	286	330	51	34	62	134	2	14	
M. 715	36	4	41	31	200	214	34	17	43	85	2	8	
F. 354	16	1	16	11	86	116	17	17	19	49	—	6	
65 - 74													
T. 700	27	2	38	32	157	202	34	36	59	103	2	8	
M. 484	18	1	26	22	111	138	22	27	37	75	2	5	
F. 216	9	1	12	10	46	64	12	9	22	28	—	3	
75 and over — et plus													
T. 497	14	4	26	27	77	177	40	21	50	55	2	4	
M. 307	8	3	19	20	46	106	25	8	29	40	—	3	
F. 190	6	1	7	7	31	71	15	13	21	15	2	1	

**TABLE 43. Outpatients under Drug Treatment for Tuberculosis and Rate per 100,000 Population by Age Group,
Sex and Province, December 31, 1973 — Concluded**

**TABLEAU 43. Patients hors de l'hôpital traités par médication pour la tuberculose et taux pour 100,000 habitants suivant
le groupe d'âge, le sexe et la province, 31 décembre, 1973 — fin**

Age group and sex Groupe d'âge et sexe	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants													
All ages — Tous âges													
T.	31.9	70.7	15.5	35.1	38.1	26.4	26.6	43.0	31.9	36.8	38.5	65.0	392.1
M.	36.7	85.8	17.2	44.6	46.0	30.6	30.4	45.6	32.7	41.2	45.9	74.1	405.0
F.	27.0	55.1	13.8	25.5	30.2	22.3	22.8	40.3	31.1	32.2	31.0	54.3	377.8
0- 4													
T.	9.3	22.8	—	10.2	15.4	3.2	5.3	16.4	20.5	25.1	10.2	—	34.5
M.	9.7	19.1	—	8.5	16.7	4.0	5.8	25.3	10.7	28.3	9.5	—	33.3
F.	8.8	26.8	—	11.9	14.0	2.3	4.8	7.2	30.6	21.7	11.0	—	35.7
5- 14													
T.	10.3	24.9	—	11.4	12.7	4.9	5.0	34.4	19.4	22.7	10.6	—	161.9
M.	10.7	34.0	—	11.7	18.0	4.4	5.7	29.1	22.1	21.7	11.0	—	185.2
F.	9.8	15.4	—	11.1	7.3	5.4	4.4	39.8	16.5	23.8	10.1	—	137.3
15- 24													
T.	19.1	57.8	4.4	14.7	19.8	13.2	14.1	35.8	30.3	23.9	23.4	64.5	373.1
M.	17.7	63.6	—	10.0	23.1	10.9	13.3	31.6	27.3	22.7	20.8	133.3	388.9
F.	20.5	51.9	8.8	19.6	16.4	15.5	14.8	40.0	33.5	25.2	26.2	—	354.8
25- 34													
T.	35.0	59.9	7.2	32.7	30.8	29.1	34.1	42.4	28.1	37.4	41.3	100.0	451.6
M.	33.6	66.7	—	40.5	25.5	26.3	29.8	41.1	25.8	45.2	45.8	95.2	281.3
F.	36.5	52.9	14.7	24.6	36.5	31.9	38.4	43.8	30.4	29.5	36.6	105.3	633.3
35- 44..													
T.	42.8	116.2	8.9	49.7	50.2	36.0	36.1	47.2	37.2	44.1	56.1	—	800.0
M.	46.7	150.0	—	60.0	46.9	39.2	41.8	32.4	40.9	41.9	60.5	—	818.2
F.	38.7	79.5	18.5	39.2	53.4	32.8	30.2	62.4	33.3	46.4	51.3	—	777.8
45- 54													
T.	49.6	171.4	37.7	46.5	59.5	51.2	40.0	48.9	33.2	45.7	59.4	55.6	730.8
M.	60.9	198.3	38.5	67.2	60.5	64.2	47.8	62.5	34.1	56.2	76.4	—	928.6
F.	38.6	142.2	37.0	26.4	58.5	38.6	32.4	36.0	32.2	35.0	42.7	125.0	500.0
55- 64													
T.	59.1	142.5	50.0	80.2	79.4	59.9	50.7	56.0	39.3	49.9	65.5	181.8	933.3
M.	80.7	187.5	78.4	115.8	117.0	87.3	67.0	76.1	38.9	68.9	85.3	285.7	1,000.0
F.	38.4	92.5	20.4	44.8	41.7	34.7	35.0	36.7	39.6	30.7	46.7	—	857.1
65- 74													
T.	60.8	130.4	28.2	84.8	92.8	53.5	47.7	56.7	63.3	75.4	78.5	500.0	1,333.3
M.	90.2	176.5	28.6	120.9	135.0	84.5	71.9	76.7	93.1	93.2	117.4	666.7	1,666.7
F.	35.1	85.7	27.8	51.5	54.9	28.4	27.6	38.3	32.3	57.0	41.6	—	1,000.0
75 and over — et plus													
T.	71.0	110.2	70.1	85.2	118.4	51.9	68.1	100.0	51.3	103.1	60.8	2,000.0	4,000.0
M.	109.7	142.9	130.4	155.7	210.5	79.0	111.8	146.2	41.2	128.3	105.0	—	3,000.0
F.	45.2	84.5	29.4	38.3	52.6	34.4	43.0	64.9	60.5	81.1	28.6	2,000.0	—

**TABLE 44. All Patients under Treatment for Tuberculosis and Rate per 100,000 Population by Age Group,
Sex and Diagnosis, December 31, 1973**

**TABLEAU 44. Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose et taux pour 100,000 habitants suivant
le groupe d'âge, le sexe et le diagnostic, 31 décembre, 1973**

Age group Groupe d'âge	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire					Non- respiratory — Non respiratoire
		Minimal pulmonary Pulmonaire, minime	Moderately advanced pulmonary Pulmonaire, assez avancée	Far advanced pulmonary Pulmonaire, très avancée	Primary Primaire	Other respiratory ¹ Autres respiratoires ¹	
		Number — Nombre					
Both sexes — Deux sexes							
All ages — Tous âges.....	8,543	2,016	2,498	1,214	582	849	1,384
0- 4	204	4	3	2	174	6	15
5-14	506	36	20	5	342	45	58
15-24	895	284	226	78	49	138	120
25-34	1,282	393	362	116	8	132	271
35-44	1,269	305	371	192	3	115	283
45-54	1,452	342	466	261	3	128	252
55-64	1,329	303	447	272	1	112	194
65-74	935	196	350	168	1	95	125
75 and over — et plus	671	153	253	120	1	78	66
Male — Masculin							
All ages — Tous âges	5,079	1,114	1,604	883	311	540	627
0- 4	112	2	1	1	95	5	8
5-14	268	17	11	2	181	27	30
15-24	429	137	111	33	26	77	45
25-34	635	190	188	69	4	75	109
35-44	728	168	226	148	1	59	126
45-54	924	196	318	194	3	89	124
55-64	911	193	326	209	—	86	97
65-74	646	116	264	135	—	70	61
75 and over — et plus	426	95	159	92	1	52	27
Female — Féminin							
All ages — Tous âges	3,464	902	894	331	271	309	757
0- 4	92	2	2	1	79	1	7
5-14	238	19	9	3	161	18	28
15-24	466	147	115	45	23	61	75
25-34	647	203	174	47	4	57	162
35-44	541	137	145	44	2	56	157
45-54	528	146	148	67	—	39	128
55-64	418	110	121	63	1	26	97
65-74	289	80	86	33	1	25	64
75 and over — et plus	245	58	94	28	—	26	39

See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

TABLE 44. All Patients under Treatment for Tuberculosis and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Diagnosis, December 31, 1973 — Concluded

TABLEAU 44. Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et le diagnostic, 31 décembre, 1973 — fin

Age group Groupe d'âge	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire					Non-respiratory — Non respiratoire
		Minimal pulmonary — Pulmonaire, minime	Moderately advanced pulmonary — Pulmonaire, assez avancée	Far advanced pulmonary — Pulmonaire, très avancée	Primary — Primaire	Other respiratory ¹ — Autres respiratoires ¹	
		Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants					
Both sexes — Deux sexes							
All ages — Tous âges	38.3	9.0	11.2	5.4	2.6	3.8	6.2
0- 4	11.4	0.2	0.2	0.1	9.7	0.3	0.8
5-14	11.3	0.8	0.4	0.1	7.7	1.0	1.3
15-24	21.2	6.7	5.4	1.8	1.2	3.3	2.8
25-34	39.7	12.2	11.2	3.6	0.2	4.1	8.4
35-44	49.8	12.0	14.6	7.5	0.1	4.5	11.1
45-54	60.4	14.2	19.4	10.9	0.1	5.3	10.5
55-64	73.5	16.8	24.7	15.0	0.1	6.2	10.7
65-74	81.2	17.0	30.4	14.6	0.1	8.2	10.9
75 and over — et plus	95.8	21.9	36.1	17.1	0.1	11.1	9.4
Male — Masculin							
All ages — Tous âges	45.6	10.0	14.4	7.9	2.8	4.8	5.6
0- 4	12.2	0.2	0.1	0.1	10.4	0.5	0.8
5-14	11.8	0.7	0.5	0.1	7.9	1.2	1.3
15-24	20.1	6.4	5.2	1.5	1.2	3.6	2.1
25-34	39.0	11.7	11.6	4.2	0.2	4.6	6.7
35-44	56.0	12.9	17.4	11.4	0.1	4.5	9.7
45-54	77.7	16.5	26.7	16.3	0.3	7.5	10.4
55-64	102.8	21.8	36.8	23.6	—	9.7	10.9
65-74	120.4	21.6	49.2	25.2	—	13.0	11.4
75 and over — et plus	152.2	33.9	56.8	32.9	0.4	18.6	9.6
Female — Féminin							
All ages — Tous âges	31.0	8.1	8.0	3.0	2.4	2.8	6.8
0- 4	10.6	0.2	0.2	0.1	9.1	0.1	0.8
5-14	10.9	0.9	0.4	0.1	7.4	0.8	1.3
15-24	22.3	7.0	5.5	2.2	1.1	2.9	3.6
25-34	40.4	12.7	10.9	2.9	0.2	3.6	10.1
35-44	43.3	11.0	11.6	3.5	0.2	4.5	12.6
45-54	43.5	12.0	12.2	5.5	—	3.2	10.5
55-64	45.4	11.9	13.1	6.8	0.1	2.8	10.5
65-74	47.0	13.0	14.0	5.4	0.2	4.1	10.4
75 and over — et plus	58.3	13.8	22.4	6.7	—	6.2	9.3

¹ Includes cases with pulmonary stage unspecified. — Y compris les cas avec le stade pulmonaire non précisé.

**TABLE 45. Inpatients under Treatment for Tuberculosis and Rate per 100,000 Population by Age Group,
Sex and Diagnosis, December 31, 1973**

**TABLEAU 45. Patients hospitalisés recevant un traitement pour la tuberculose et taux pour 100,000 habitants suivant
le groupe d'âge, le sexe et le diagnostic, 31 décembre, 1973**

Age group Groupe d'âge	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire					Non-respiratory — Non respiratoire
		Minimal pulmonary — Pulmonaire, minime	Moderately advanced pulmonary — Pulmonaire, assez avancée	Far advanced pulmonary — Pulmonaire, très avancée	Primary — Primaire	Other respiratory ¹ — Autres respiratoires ¹	
		Number — Nombre					
Both sexes — Deux sexes							
All ages — Tous âges.....	1,434	253	512	385	73	143	68
0- 4	38	2	1	—	32	1	2
5-14	48	5	3	—	35	2	3
15-24	90	12	36	20	2	16	4
25-34	151	32	54	43	—	13	9
35-44	179	34	74	51	1	12	7
45-54	259	51	85	85	1	25	12
55-64	260	42	97	78	1	27	15
65-74	235	39	94	62	1	28	11
75 and over — et plus	174	36	68	46	—	19	5
Male — Masculin							
All ages — Tous âges.....	985	152	368	290	43	102	30
0- 4	23	2	1	—	20	—	—
5-14	24	—	1	—	20	1	2
15-24	52	6	22	8	2	11	3
25-34	89	20	30	26	—	9	4
35-44	121	21	48	42	—	6	4
45-54	199	36	67	69	1	20	6
55-64	196	26	74	65	—	23	8
65-74	162	21	79	42	—	18	2
75 and over — et plus	119	20	46	38	—	14	1
Female — Féminin							
All ages — Tous âges.....	449	101	144	95	30	41	38
0- 4	15	—	—	—	12	1	2
5-14	24	5	2	—	15	1	1
15-24	38	6	14	12	—	5	1
25-34	62	12	24	17	—	4	5
35-44	58	13	26	9	1	6	3
45-54	60	15	18	16	—	5	6
55-64	64	16	23	13	1	4	7
65-74	73	18	15	20	1	10	9
75 and over — et plus	55	16	22	8	—	5	4

See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

**TABLE 45. Inpatients under Treatment for Tuberculosis and Rate per 100,000 Population by Age Group,
Sex and Diagnosis, December 31, 1973 — Concluded**

**TABLEAU 45. Patients hospitalisés recevant un traitement pour la tuberculose et taux pour 100,000 habitants suivant
le groupe d'âge, le sexe et le diagnostic, 31 décembre, 1973 — fin**

Age group Groupe d'âge	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire					Non-respiratory — Non respiratoire		
		Minimal pulmonary — Pulmonaire, minime	Moderately advanced pulmonary — Pulmonaire, assez avancée	Far advanced pulmonary — Pulmonaire, très avancée	Primary Primaire	Other respiratory ¹ — Autres respiratoires ¹			
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants									
Both sexes — Deux sexes									
All ages — Tous âges	6.4	1.1	2.3	1.7	0.3	0.6	0.3		
0- 4	2.1	0.1	0.1	—	1.8	0.1	0.1		
5-14	1.1	0.1	0.1	—	0.8	--	0.1		
15-24	2.1	0.3	0.9	0.5	--	0.4	0.1		
25-34	4.7	1.0	1.7	1.3	--	0.4	0.3		
35-44	7.0	1.3	2.9	2.0	--	0.5	0.3		
45-54	10.8	2.1	3.5	3.5	--	1.0	0.5		
55-64	14.4	2.3	5.4	4.3	0.1	1.5	0.8		
65-74	20.4	3.4	8.2	5.4	0.1	2.4	1.0		
75 and over — et plus	24.9	5.1	9.7	6.6	—	2.7	0.7		
Male — Masculin									
All ages — Tous âges	8.8	1.4	3.3	2.6	0.4	0.9	0.3		
0- 4	2.5	0.2	0.1	—	2.2	—	—		
5-14	1.1	—	--	—	0.9	--	0.1		
15-24	2.4	0.3	1.0	0.4	0.1	0.5	0.1		
25-34	5.5	1.2	1.8	1.6	—	0.6	0.2		
35-44	9.3	1.6	3.7	3.2	—	0.5	0.3		
45-54	16.7	3.0	5.6	5.8	0.1	1.7	0.5		
55-64	22.1	2.9	8.3	7.3	—	2.6	0.9		
65-74	30.2	3.9	14.7	7.8	—	3.4	0.4		
75 and over — et plus	42.5	7.1	16.4	13.6	—	5.0	0.4		
Female — Féminin									
All ages — Tous âges	4.0	0.9	1.3	0.9	0.3	0.4	0.3		
0- 4	1.7	—	—	—	1.4	0.1	0.2		
5-14	1.1	0.2	0.1	—	0.7	--	--		
15-24	1.8	0.3	0.7	0.6	—	0.2	--		
25-34	3.9	0.7	1.5	1.1	—	0.2	0.3		
35-44	4.6	1.0	2.1	0.7	0.1	0.5	0.2		
45-54	4.9	1.2	1.5	1.3	—	0.4	0.5		
55-64	6.9	1.7	2.5	1.4	0.1	0.4	0.8		
65-74	11.9	2.9	2.4	3.2	0.1	1.6	1.5		
75 and over — et plus	13.1	3.8	5.2	1.9	—	1.2	1.0		

¹ Includes cases with pulmonary stage unspecified. — Y compris les cas avec le stade pulmonaire non précis.

**TABLE 46. Outpatients under Treatment for Tuberculosis and Rate per 100,000 Population by Age Group.
Sex and Diagnosis, December 31, 1973**

**TABLEAU 46. Patients hors de l'hôpital traités par médication pour la tuberculose et taux pour 100,000 habitants suivant
le groupe d'âge, le sexe et le diagnostic, 31 décembre, 1973**

Age group Groupe d'âge	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire					Non-respiratory Non respiratoire
		Minimal pulmonary Pulmonaire, minime	Moderately advanced pulmonary Pulmonaire, assez avancée	Far advanced pulmonary Pulmonaire, très avancée	Primary Primaire	Other respiratory ¹ Autres respiratoires ¹	
		Number — Nombre					
Both sexes — Deux sexes							
All ages — Tous âges.....	7,109	1,763	1,986	829	509	706	1,316
0 - 4	166	2	2	2	142	5	13
5 - 14	458	31	17	5	307	43	55
15 - 24	805	272	190	58	47	122	116
25 - 34	1,131	361	308	73	8	119	262
35 - 44	1,090	271	297	141	2	103	276
45 - 54	1,193	291	381	176	2	103	240
55 - 64	1,069	261	350	194	—	85	179
65 - 74	700	157	256	106	—	67	114
75 and over — et plus	497	117	185	74	1	59	61
Male — Masculin							
All ages — Tous âges.....	4,094	962	1,236	593	268	438	597
0 - 4	89	—	—	1	75	5	8
5 - 14	244	17	10	2	161	26	28
15 - 24	377	131	89	25	24	66	42
25 - 34	546	170	158	43	4	66	105
35 - 44	607	147	178	106	1	53	122
45 - 54	725	160	251	125	2	69	118
55 - 64	715	167	252	144	—	63	89
65 - 74	484	95	185	93	—	52	59
75 and over — et plus	307	75	113	54	1	38	26
Female — Féminin							
All ages — Tous Ages	3,015	801	750	236	241	268	719
0 - 4	77	2	2	1	67	—	5
5 - 14	214	14	7	3	146	17	27
15 - 24	428	141	101	33	23	56	74
25 - 34	585	191	150	30	4	53	157
35 - 44	483	124	119	35	1	50	154
45 - 54	468	131	130	51	—	34	122
55 - 64	354	94	98	50	—	22	90
65 - 74	216	62	71	13	—	15	55
75 and over — et plus	190	42	72	20	—	21	35

See footnote(s) at end of table. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau.

**TABLE 46. Outpatients under Treatment for Tuberculosis and Rate per 100,000 Population by Age Group,
Sex and Diagnosis, December 31, 1973 — Concluded**

**TABLEAU 46. Patients hors de l'hôpital traités par médication pour la tuberculose et taux pour 100,000 habitants suivant
le groupe d'âge, le sexe et le diagnostic, 31 décembre, 1973 — fin**

Age group — Groupe d'âge	Total	Tuberculosis of respiratory system — Tuberculose de l'appareil respiratoire					Non-respiratory — Non respiratoire
		Minimal pulmonary — Pulmonaire, minime	Moderately advanced pulmonary — Pulmonaire, assez avancée	Far advanced pulmonary — Pulmonaire, très avancée	Primary — Primaire	Other respiratory ¹ — Autres respiratoires ¹	
		Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants					
Both sexes — Deux sexes							
All ages — Tous âges	31.9	7.9	8.9	3.7	2.3	3.2	5.9
0- 4	9.3	0.1	0.1	0.1	7.9	0.3	0.7
5-14	10.3	0.7	0.4	0.1	6.9	1.0	1.2
15-24	19.1	6.4	4.5	1.4	1.1	2.9	2.7
25-34	35.0	11.2	9.5	2.3	0.2	3.7	8.1
35-44	42.8	10.6	11.6	5.5	0.1	4.0	10.8
45-54	49.6	12.1	15.9	7.3	0.1	4.3	10.0
55-64	59.1	14.4	19.4	10.7	—	4.7	9.9
65-74	60.8	13.6	22.2	9.2	—	5.8	9.9
75 and over — et plus	71.0	16.7	26.4	10.6	0.1	8.4	8.7
Male — Masculin							
All ages — Tous âges	36.7	8.6	11.1	5.3	2.4	3.9	5.4
0- 4	9.7	—	—	0.1	8.2	0.5	0.9
5-14	10.7	0.7	0.4	0.1	7.1	1.1	1.2
15-24	17.7	6.1	4.2	1.2	1.1	3.1	2.0
25-34	33.6	10.5	9.7	2.6	0.2	4.1	6.5
35-44	46.7	11.3	13.7	8.2	0.1	4.1	9.4
45-54	60.9	13.4	21.1	10.5	0.2	5.8	9.9
55-64	80.7	18.8	28.4	16.2	—	7.1	10.0
65-74	90.2	17.7	34.5	17.3	—	9.7	11.0
75 and over — et plus	109.7	26.8	40.4	19.3	0.4	13.6	9.3
Female — Féminin							
All ages — Tous âges	27.0	7.2	6.7	2.1	2.2	2.4	6.4
0- 4	8.8	0.2	0.2	0.1	7.7	—	0.6
5-14	9.8	0.6	0.3	0.1	6.7	0.8	1.2
15-24	20.5	6.8	4.8	1.6	1.1	2.7	3.5
25-34	36.5	11.9	9.4	1.9	0.2	3.3	9.8
35-44	38.7	9.9	9.5	2.8	0.1	4.0	12.3
45-54	38.6	10.8	10.7	4.2	—	2.8	10.1
55-64	38.4	10.2	10.6	5.4	—	2.4	9.8
65-74	35.1	10.1	11.5	2.1	—	2.4	8.9
75 and over — et plus	45.2	10.0	17.1	4.8	—	5.0	8.3

¹ Includes cases with pulmonary stage unspecified — Y compris les cas avec le stade pulmonaire non précisé.

TABLE 47. Reason for Outpatient Drug Treatment and Percentage Distribution by Sex and Province,
December 31, 1973

TABLEAU 47. Raison du traitement par médication hors de l'hôpital et répartition procentuelle suivant le sexe et la province, 31 décembre, 1973

Reason for treatment and sex Raison du traitement et sexe	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	
Number — Nombre														
All persons under treatment — Toutes personnes recevant un traitement.	T. M. F.	7,109 4,094 3,015	382 236 146	18 10 8	284 181 103	251 152 99	1,615 927 688	2,138 1,217 921	432 229 203	289 150 139	626 356 270	912 547 365	13 8 5	149 81 68
Continuation of treatment received as in-patient — Continuation du traitement reçu lors du séjour à l'hôpital.	T. M. F.	4,247 2,582 1,665	299 192 107	16 9 7	210 145 65	234 140 94	633 374 259	1,262 778 484	310 179 131	195 102 93	483 281 202	450 299 151	13 8 5	142 75 67
Start of outpatient treatment — Commencement du traitement hors de l'hôpital.	T. M. F.	2,862 1,512 1,350	83 44 39	2 1 1	74 36 38	17 12 5	982 553 429	876 439 437	122 50 72	94 48 46	143 75 68	462 248 214	— — —	7 6 1
Percentage distribution — Répartition procentuelle														
All persons under treatment — Toutes personnes recevant un traitement.	T. M. F.	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	
Continuation of treatment received as in-patient — Continuation du traitement reçu lors du séjour à l'hôpital.	T. M. F.	60 63 55	78 81 73	89 90 88	74 80 63	93 92 95	39 40 38	59 64 53	72 78 65	67 68 67	77 79 75	49 55 41	100 100 100	95 93 99
Start of outpatient treatment — Commencement du traitement hors de l'hôpital.	T. M. F.	40 37 45	22 19 27	11 10 12	26 20 37	7 8 5	61 60 62	41 36 47	28 32 35	33 32 33	23 21 25	51 45 59	— — —	5 7 1

TABLE 48. Reason for Outpatient Drug Treatment and Percentage Distribution by Sex and Age Group,
December 31, 1973

TABLEAU 48. Raison du traitement par médication hors de l'hôpital et répartition procentuelle suivant le sexe et le groupe d'âge, 31 décembre, 1973

Reason for treatment and sex Raison du traitement et sexe	All ages — Tous âges	0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75 and over — et plus	
Number — Nombre											
All persons under treatment — Toutes personnes recevant un traitement.	T. M. F.	7,109 4,094 3,015	166 89 77	458 244 214	805 377 428	1,131 546 585	1,090 607 483	1,193 725 468	1,069 715 354	700 484 216	497 307 190
Continuation of treatment received as in-patient — Continuation du traitement reçu lors du séjour à l'hôpital.	T. M. F.	4,247 2,582 1,665	116 59 57	286 152 134	498 237 261	588 307 281	637 390 247	698 460 238	650 454 196	440 314 126	334 209 125
Start of outpatient treatment — Commencement du traitement hors de l'hôpital.	T. M. F.	2,862 1,512 1,350	50 30 20	172 92 80	307 140 167	543 239 304	453 217 236	495 265 230	419 261 158	260 170 90	163 98 65
Percentage distribution — Répartition procentuelle											
All persons under treatment — Toutes personnes recevant un traitement.	T. M. F.	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	
Continuation of treatment received as in-patient — Continuation du traitement reçu lors du séjour à l'hôpital.	T. M. F.	60 63 55	70 66 74	62 62 63	62 63 61	52 56 48	58 64 51	59 63 51	61 63 55	63 65 58	67 68 66
Start of outpatient treatment — Commencement du traitement hors de l'hôpital.	T. M. F.	40 37 45	30 34 26	38 38 37	38 37 39	48 44 52	42 36 49	41 37 49	39 37 45	37 35 42	33 32 34

TABLE 49. Reason for Outpatient Drug Treatment and Percentage Distribution by Sex and Diagnosis, December 31, 1973

TABLEAU 49. Raison du traitement par médication hors de l'hôpital et répartition procentuelle suivant le sexe et le diagnostic, 31 décembre, 1973

Reason for treatment and sex — Raison du traitement et sexe	Total	Tuberculosis of respiratory system — Tuberculose de l'appareil respiratoire					Non-respiratory — Non respiratoire	
		Minimal pulmonary — Pulmonaire, minime	Moderately advanced pulmonary — Pulmonaire, assez avancée	Far advanced pulmonary — Pulmonaire, très avancée	Primary — Primaire	Other respiratory ¹ — Autres respiratoires ¹		
		Number — Nombre						
All persons under treatment — Toutes personnes recevant un traitement.	T. M. F.	7,109 4,094 3,015	1,763 962 801	1,986 1,236 750	829 593 236	509 268 241	706 438 268	1,316 597 719
Continuation of treatment received as inpatient — Continuation du traitement reçu lors du séjour à l'hôpital.	T. M. F.	4,247 2,582 1,665	966 541 425	1,356 861 495	671 476 195	327 166 161	431 271 160	496 267 229
Start of outpatient treatment — Commencement du traitement hors de l'hôpital.	T. M. F.	2,862 1,512 1,350	797 421 376	630 375 255	158 117 41	182 102 80	275 167 108	820 330 490
Percentage distribution — Répartition procentuelle								
All persons under treatment — Toutes personnes recevant un traitement.	T. M. F.	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100
Continuation of treatment received as inpatient — Continuation du traitement reçu lors du séjour à l'hôpital.	T. M. F.	60 63 55	55 56 53	68 70 66	81 80 83	64 62 67	61 62 60	36 45 32
Start of outpatient treatment — Commencement du traitement hors de l'hôpital.	T. M. F.	40 37 45	45 44 47	32 30 34	19 20 17	36 38 33	39 38 40	62 55 68

¹ Includes cases with pulmonary stage unspecified. — Y compris les cas avec le stade pulmonaire non précisé.

TABLE 50. Reason for Outpatient Drug Treatment and Percentage Distribution by Sex and Origin, December 31, 1972

TABLEAU 50. Raison du traitement par médication hors de l'hôpital et répartition procentuelle suivant le sexe et l'origine, 31 décembre, 1972

Reason for treatment and sex — Raison du traitement et sexe	Total	Indian Indiens	Eskimo Esquimaux	Other Autres	Number — Nombre	
					Percentage distribution — Répartition procentuelle	
All persons under treatment — Toutes personnes recevant un traitement.... T.	7,109	889	138	6,082		
M.	4,094	467	69	3,558		
F.	3,015	422	69	2,524		
Continuation of treatment received as inpatient — Continuation du traitement reçu lors du séjour à l'hôpital.	T. M. F.	4,247 2,582 1,665	726 383 343	112 60 52	3,409 2,139 1,270	
Start of outpatient treatment — Commencement du traitement hors de l'hôpital.	T. M. F.	2,862 1,512 1,350	163 84 79	26 9 17	2,673 1,419 1,254	
All persons under treatment — Toutes personnes recevant un traitement.... T.	100	100	100	100	100	
M.	100	100	100	100	100	
F.	100	100	100	100	100	
Continuation of treatment received as inpatient — Continuation du traitement reçu lors du séjour à l'hôpital.	T. M. F.	60 63 55	82 82 81	81 87 75	56 60 50	
Start of outpatient treatment — Commencement du traitement hors de l'hôpital.	T. M. F.	40 37 45	18 18 19	19 13 25	44 40 50	

**TABLE 51. All Patients under Treatment for Tuberculosis and Percentage Distribution by Origin, Sex and Age Group,
December 31, 1973**

**TABLEAU 51. Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose et répartition procentuelle suivant l'origine,
le sexe et le groupe d'âge, 31 décembre, 1973**

Origin ¹ Origine ¹	All ages Tous âges	0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75 and over et plus
Number — Nombre										
Both sexes — Deux sexes										
TOTAL	8,543	204	506	895	1,282	1,269	1,452	1,329	935	671
Indian — Indiens	1,092	95	193	177	158	169	122	72	62	44
Eskimo — Esquimaux	170	2	16	34	35	34	24	18	6	1
Other — Autres	7,281	107	297	684	1,089	1,066	1,306	1,239	867	626
Male — Masculin										
TOTAL	5,079	112	268	429	635	728	924	911	646	426
Indian — Indiens	583	55	99	83	78	86	74	42	43	23
Eskimo — Esquimaux	84	1	3	19	12	19	15	10	4	1
Other — Autres	4,412	56	166	327	545	623	835	859	599	402
Female — Féminin										
TOTAL	3,464	92	238	466	647	541	528	418	289	245
Indian — Indiens	509	40	94	94	80	83	48	30	19	21
Eskimo — Esquimaux	86	1	13	15	23	15	9	8	2	—
Other — Autres	2,869	51	131	357	544	443	471	380	268	224
Percentage distribution — Répartition procentuelle										
Both sexes — Deux sexes										
TOTAL	100	2	6	10	15	15	17	16	11	8
Indian — Indiens	100	9	18	16	14	15	11	7	6	4
Eskimo — Esquimaux	100	1	9	20	21	20	14	11	3	1
Other — Autres	100	1	4	9	15	15	18	17	12	9
Male — Masculin										
TOTAL	100	2	5	9	13	14	18	18	13	8
Indian — Indiens	100	10	17	14	13	15	13	7	7	4
Eskimo — Esquimaux	100	1	3	23	14	23	18	12	5	1
Other — Autres	100	1	4	7	12	14	19	20	14	9
Female — Féminin										
TOTAL	100	3	7	13	19	16	15	12	8	7
Indian — Indiens	100	8	18	18	16	16	10	6	4	4
Eskimo — Esquimaux	100	1	15	18	27	18	10	9	2	—
Other — Autres	100	2	5	13	19	15	16	13	9	8

¹ For distribution of population, by origin and sex, see Table 2D, page 21. — Pour la répartition de la population suivant l'origine et le sexe; voir tableau 2D, page 21.

**TABLE 52. All Patients under Treatment for Tuberculosis and Percentage Distribution by Origin,
Sex and Diagnosis, December 31, 1973**

**TABLEAU 52. Tous les patients recevant un traitement pour la tuberculose et répartition procentuelle suivant l'origine,
le sexe et le diagnostic, 31 décembre, 1973**

Origin – Origine	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire				Non-respiratory – Non respiratoire	
	Total	Pulmonary tuberculosis — Tuberculose pulmonaire	Primary — Primaire	Other respiratory ¹ — Autres respiratoires ¹		
Number – Nombre						
Both sexes – Deux sexes						
TOTAL	8,543	5,728	582	849	1,384	
Indian – Indiens	1,092	557	239	161	135	
Eskimo – Esquimaux	170	145	6	7	12	
Other – Autres	7,281	5,026	337	681	1,237	
Male – Masculin						
TOTAL	5,079	3,601	311	540	627	
Indian – Indiens	583	301	126	87	69	
Eskimo – Esquimaux	84	71	3	4	6	
Other – Autres	4,412	3,229	182	449	552	
Female – Féminin						
TOTAL	3,464	2,127	271	309	757	
Indian – Indiens	509	256	113	74	66	
Eskimo – Esquimaux	86	74	3	3	6	
Other – Autres	2,869	1,797	155	232	685	
Percentage distribution – Répartition procentuelle						
Both sexes – Deux sexes						
TOTAL	100	67	7	10	16	
Indian – Indiens	100	51	22	15	12	
Eskimo – Esquimaux	100	85	4	4	7	
Other – Autres	100	69	5	9	17	
Male – Masculin						
TOTAL	100	71	6	11	12	
Indian – Indiens	100	52	21	15	12	
Eskimo – Esquimaux	100	84	4	5	7	
Other – Autres	100	73	4	10	13	
Female – Féminin						
TOTAL	100	61	8	9	22	
Indian – Indiens	100	50	22	15	13	
Eskimo – Esquimaux	100	87	3	3	7	
Other – Autres	100	63	5	8	24	

¹ Includes cases with pulmonary stage unspecified. – Y compris les cas avec le stade pulmonaire non précisé.



DEATHS FROM TUBERCULOSIS

DECÈS DUS À LA TUBERCULOSE

TABLE 53. Deaths from All Forms of Tuberculosis and Rate per 100,000 Population by Year and Province, 1940 - 1973¹
TABLEAU 53. Décès dus à toutes formes de la tuberculose et taux pour 100,000 habitants suivant l'année et la Province, 1940 - 1973¹

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — I. P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Number — Nombre													
1940	5,845	...	56	415	295	2,503	1,011	369	241	321	578	4	52
1941	6,157	...	70	429	314	2,685	1,100	328	284	329	533	11	74
1942	6,061	...	43	379	330	2,719	1,093	336	251	271	558	18	63
1943	6,263	...	42	417	225	2,842	1,101	384	250	294	613	14	81
1944	5,853	...	58	357	238	2,624	1,068	348	223	291	517	27	102
1945	5,694	...	42	338	266	2,555	1,015	315	227	263	525	21	127
1946	5,941	...	55	382	277	2,628	1,054	324	223	302	576	19	101
1947	5,577	...	63	309	261	2,436	1,042	308	231	263	536	18	110
1948	4,887	...	37	247	230	2,216	825	288	229	259	442	13	101
1949	4,382	...	285	22	184	195	1,897	686	224	185	211	406	16
1950	3,679	247	29	176	159	1,571	585	179	153	171	313	15	81
1951	3,481	256	17	126	134	1,553	579	158	156	146	292	9	55
1952	2,538	175	24	94	100	1,108	398	115	104	125	214	5	76
1953	1,861	111	13	72	69	844	311	89	87	68	146	5	46
1954	1,593	105	10	76	51	714	307	71	42	63	123	2	29
1955	1,403	82	6	48	43	608	242	72	57	81	143	3	18
1956	1,256	82	4	44	45	572	221	61	46	43	110	—	28
1957	1,183	82	11	45	32	513	221	70	31	68	86	1	23
1958	1,027	64	5	36	35	504	186	42	23	44	70	—	18
1959	959	54	4	28	44	485	166	41	27	44	54	1	11
1960	823	41	3	33	20	389	157	39	34	34	63	1	9
1961	769	34	6	28	32	366	137	39	25	32	59	1	10
1962	785	47	3	28	25	362	164	34	30	30	48	—	14
1963	756	27	2	28	21	368	153	39	19	37	48	—	9
1964	670	27	2	29	16	301	146	34	22	32	56	—	5
1965	697	15	4	26	14	334	148	35	27	31	53	—	10
1966	669	30	3	20	14	340	132	28	10	33	55	—	4
1967	658	16	—	33	24	309	144	33	21	33	39	—	6
1968	630	15	1	27	13	315	129	31	25	24	48	—	2
1969	526	10	1	23	13	283	96	24	19	20	30	—	7
1970	527	14	1	23	11	273	102	24	20	13	43	—	3
1971	447	18	—	17	9	222	85	19	10	24	41	—	4
1972	453	10	1	9	7	240	84	23	19	14	40	—	6
1973	408	14	1	7	6	208	86	21	13	21	26	—	5
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants													
1940	51.4	..	58.9	72.9	65.3	76.4	27.0	50.7	26.8	40.6	71.8	80.0	433.3
1941	53.5	..	73.7	74.2	68.6	80.6	29.0	44.9	31.7	41.3	65.2	220.0	616.7
1942	52.0	..	47.8	64.1	71.1	80.2	28.1	46.4	29.6	34.9	64.1	360.0	525.0
1943	53.1	..	46.2	68.8	48.6	82.2	28.1	53.1	29.8	37.5	68.1	280.0	675.0
1944	49.0	..	63.7	58.4	51.6	75.0	26.9	47.9	26.7	36.0	55.5	540.0	850.0
1945	47.2	..	45.7	54.6	57.0	71.8	25.4	43.3	27.3	32.5	55.3	420.0	1,058.3
1946	48.3	..	58.5	62.8	57.9	72.4	25.8	44.6	26.8	37.6	57.4	237.5	631.3
1947	44.4	..	67.0	50.2	53.5	65.7	25.0	41.7	27.6	31.9	51.3	225.0	687.5
1948	38.1	..	39.8	39.5	46.2	58.5	19.3	38.6	27.3	30.3	40.9	162.5	631.3
1949	32.6	82.6	23.4	29.3	38.4	48.9	15.7	29.6	22.2	23.8	36.5	200.0	443.8
1950	26.8	70.4	30.2	27.6	31.1	39.6	13.1	23.3	18.4	18.7	27.5	187.5	506.3
1951	24.8	70.8	17.3	19.6	26.0	38.3	12.6	20.3	18.6	15.5	25.1	100.0	343.8
1952	17.6	46.8	24.0	14.4	19.0	26.5	8.3	14.4	12.3	12.8	17.8	55.6	475.0
1953	12.5	29.0	12.9	10.9	12.9	19.8	6.3	11.0	10.1	6.7	11.7	55.6	287.5
1954	10.4	26.6	9.9	11.3	9.4	16.3	6.0	8.6	4.8	6.0	9.5	20.0	170.6
1955	8.9	20.2	6.0	7.0	7.9	13.5	4.6	8.6	6.5	7.4	10.7	27.3	100.0
1956	7.8	19.8	4.0	6.3	8.1	12.4	4.1	7.2	5.2	3.8	7.9	—	145.1
1957	7.1	19.2	11.1	6.4	5.7	10.8	3.9	8.1	3.5	5.9	5.8	8.3	121.1
1958	6.0	14.6	5.0	5.1	6.1	10.3	3.2	4.8	2.6	3.7	4.5	—	90.0
1959	5.5	12.0	3.9	3.9	7.5	9.7	2.8	4.6	3.0	3.5	3.4	7.7	52.4
1960	4.6	8.9	2.9	4.6	3.3	7.6	2.6	4.3	3.7	2.7	3.9	7.1	40.9
1961	4.2	7.4	5.7	3.8	5.4	7.0	2.2	4.2	2.7	2.4	3.6	6.8	43.5
1962	4.2	10.0	2.8	3.8	4.1	6.7	2.6	3.6	3.2	2.2	2.9	—	58.3
1963	4.0	5.6	1.9	3.7	3.4	6.7	2.5	4.1	2.0	2.6	2.8	—	37.5
1964	3.5	5.5	1.9	3.8	2.6	5.4	2.2	3.5	2.3	2.2	3.2	—	20.0
1965	3.6	3.0	3.7	3.4	2.2	5.9	2.2	3.6	2.8	2.1	3.0	—	40.0
1966	3.3	6.0	2.8	2.6	2.3	5.8	1.9	2.9	1.0	2.2	2.9	—	13.8
1967	3.2	3.2	—	4.4	3.9	5.3	2.0	3.4	2.2	2.2	2.0	—	20.7
1968	3.0	3.0	0.9	3.6	2.1	5.3	1.8	3.2	2.6	1.6	2.4	—	6.5
1969	2.5	1.9	0.9	3.0	2.1	4.7	1.3	2.5	2.0	1.3	1.5	—	21.9
1970	2.5	2.7	0.9	3.0	1.8	4.5	1.3	2.4	2.1	0.8	2.0	—	9.1
1971	2.1	3.1	—	2.2	1.4	3.7	1.1	1.9	1.1	1.5	1.9	—	11.5
1972	2.1	1.9	0.9	1.1	1.1	4.0	1.1	2.3	2.1	0.8	1.8	—	16.7
1973	1.8	2.6	0.9	0.9	0.9	3.4	1.1	2.1	1.4	1.2	1.1	—	13.2

See footnote(s) at end of Table 55. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 55.

TABLE 54. Deaths from Respiratory Tuberculosis and Rate per 100,000 Population by Year and Province, 1940-1973¹

TABLEAU 54. Décès dus à la tuberculose de l'appareil respiratoire et taux pour 100,000 habitants suivant l'année et la province, 1940-1973¹

Year — Année	Canada	Nfld. — T.-N.	P.E.I. — Î.P.-É.	N.S. — N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Number — Nombre													
1940.....	4,685	...	45	336	249	1,974	846	277	194	232	490	2	40
1941.....	5,067	...	61	366	259	2,177	968	246	231	254	440	9	56
1942.....	5,010	...	35	315	258	2,217	955	268	205	214	480	16	47
1943.....	5,157	...	35	328	169	2,318	966	301	202	224	537	13	64
1944.....	4,805	...	52	305	196	2,118	922	269	171	229	443	23	77
1945.....	4,672	...	37	279	213	2,100	874	245	180	200	437	18	89
1946.....	4,912	...	43	308	211	2,183	909	262	177	233	492	14	80
1947.....	4,719	...	56	259	201	2,052	933	264	179	215	457	14	89
1948.....	4,112	...	31	209	187	1,861	724	234	189	200	381	11	85
1949.....	3,658	222	20	149	163	1,564	615	181	154	156	362	10	62
1950.....	3,080	189	25	141	131	1,315	536	144	114	135	271	12	67
1951.....	2,902	197	14	106	105	1,283	534	116	123	119	254	4	47
1952.....	2,069	134	19	69	82	895	369	92	74	91	192	5	47
1953.....	1,496	78	10	61	54	692	267	70	58	51	121	2	32
1954.....	1,319	85	6	64	44	576	279	56	30	45	114	1	19
1955.....	1,223	70	5	40	38	521	226	62	46	64	133	3	15
1956.....	1,079	63	4	41	38	486	203	48	37	36	100	—	23
1957.....	1,035	64	11	41	28	448	203	61	22	60	77	—	20
1958.....	883	48	4	33	33	433	170	35	21	35	61	—	10
1959.....	834	44	3	24	36	423	152	35	22	37	48	1	9
1960.....	725	31	3	31	16	342	145	34	28	27	60	1	7
1961.....	678	29	6	23	28	321	128	34	23	27	49	—	9
1962.....	692	38	3	24	21	323	148	29	28	24	43	—	11
1963.....	674	27	2	25	17	342	140	30	13	30	42	6	5
1964.....	598	22	2	28	14	269	135	27	19	26	51	—	5
1965.....	629	11	3	24	10	310	141	27	22	26	47	—	8
1966.....	599	28	2	18	14	305	119	26	9	29	47	—	4
1967.....	611	15	—	31	24	297	129	26	18	31	35	—	5
1968.....	564	12	1	25	12	284	119	25	23	18	43	—	2
1969.....	470	7	1	20	12	257	88	22	16	14	27	—	6
1970.....	475	12	1	18	11	247	94	21	18	12	38	—	3
1971.....	302	11	—	13	5	173	38	10	3	19	27	—	3
1972.....	292	5	1	6	4	182	38	15	7	11	19	—	4
1973.....	371	13	1	7	6	189	81	18	10	17	25	—	4
Rate per 100,000 population — Taux pour 100,000 habitants													
1940.....	41.2	..	47.4	59.1	55.1	60.2	22.6	38.0	21.6	29.4	60.9	40.0	333.3
1941.....	44.0	..	64.2	63.3	56.6	65.3	25.6	33.7	25.8	31.9	53.8	180.0	466.7
1942.....	43.0	..	38.9	53.3	55.6	65.4	24.6	37.0	24.2	27.6	55.2	320.0	391.7
1943.....	43.7	..	38.5	54.1	36.5	67.1	24.7	41.6	24.1	28.5	59.7	260.0	533.3
1944.....	40.2	..	57.1	49.9	42.5	60.5	23.3	37.0	20.5	28.3	47.5	460.0	641.7
1945.....	38.7	..	40.2	45.1	45.6	59.0	21.9	33.7	21.6	24.8	46.0	380.0	741.7
1946.....	40.0	..	45.7	50.7	44.1	60.2	22.2	36.0	21.2	29.0	49.1	175.0	500.0
1947.....	37.6	..	59.6	42.1	41.2	55.3	22.3	35.7	21.4	26.1	43.8	175.0	556.3
1948.....	32.1	..	33.3	33.4	37.6	49.1	16.9	31.4	22.6	23.4	35.2	137.5	531.3
1949.....	27.2	64.3	21.3	23.7	32.1	40.3	14.0	23.9	18.5	17.6	32.5	125.0	387.5
1950.....	22.5	53.8	26.0	22.1	25.6	33.1	12.0	18.8	13.7	14.3	23.8	150.0	418.8
1951.....	20.7	54.5	14.2	16.5	20.4	31.6	11.6	14.9	14.8	12.7	21.8	44.4	293.8
1952.....	14.3	35.8	19.0	10.6	15.6	21.4	7.7	11.5	8.8	9.4	15.9	55.6	293.8
1953.....	10.1	20.4	9.9	9.2	10.1	16.2	5.4	8.7	6.7	5.0	9.7	22.2	200.0
1954.....	8.6	21.5	5.9	9.5	8.1	13.1	5.5	6.8	3.4	4.3	8.8	10.0	111.8
1955.....	7.8	17.2	5.0	5.9	6.9	11.5	4.3	7.4	5.2	5.9	9.9	27.3	83.3
1956.....	6.7	15.2	4.0	5.9	6.8	10.5	3.8	5.6	4.2	3.2	7.1	—	121.1
1957.....	6.2	15.0	11.1	5.8	5.0	9.4	3.6	7.1	2.5	5.2	5.2	—	105.3
1958.....	5.2	11.0	4.0	4.6	5.7	8.9	2.9	4.0	2.4	2.9	4.0	—	50.0
1959.....	4.8	9.8	2.9	3.4	6.1	8.5	2.6	4.0	2.4	3.0	3.1	7.7	42.9
1960.....	4.1	6.8	2.9	4.3	2.7	6.7	2.4	3.8	3.1	2.1	3.7	7.1	31.8
1961.....	3.7	6.3	5.7	3.1	4.7	6.1	2.1	3.7	2.5	2.0	3.0	6.8	39.1
1962.....	3.7	8.1	2.8	3.2	3.5	6.0	2.3	3.1	3.0	1.8	2.6	—	45.8
1963.....	3.6	5.6	1.9	3.3	2.8	6.3	2.2	3.2	1.4	2.1	2.5	—	25.0
1964.....	3.1	4.5	1.9	3.7	2.3	4.8	2.0	2.8	2.0	1.8	2.9	—	20.0
1965.....	3.2	2.2	2.8	3.2	1.6	5.5	2.1	2.8	2.3	1.8	2.6	—	32.0
1966.....	3.0	5.2	1.8	2.4	2.3	5.2	1.7	2.7	0.9	2.0	2.4	—	13.8
1967.....	3.0	3.0	—	4.1	3.9	5.1	1.8	2.7	1.9	2.1	1.8	—	17.2
1968.....	2.7	2.4	0.9	3.3	1.9	4.8	1.6	2.6	2.4	1.2	2.1	—	6.5
1969.....	2.2	1.4	0.9	2.6	1.9	4.3	1.2	2.2	1.7	0.9	1.3	—	18.8
1970.....	2.2	2.3	0.9	2.4	1.8	4.1	1.2	2.1	1.9	0.8	1.8	—	9.0
1971.....	1.4	2.1	—	1.6	0.8	2.9	0.5	1.0	0.3	1.2	1.2	—	8.6
1972.....	1.3	0.9	0.9	0.8	0.6	3.0	0.5	1.5	0.8	0.7	0.8	—	11.1
1973.....	1.7	2.4	0.9	0.9	0.9	3.1	1.0	1.8	1.1	1.0	1.1	—	10.6

See footnote(s) at end of Table 55. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 55.

**TABLE 55. Deaths from All Forms of Tuberculosis by Age at Death and Age Specific Death Rate per 100,000 Population,
1940-1973¹**

**TABLEAU 55. Décès dus à toutes formes de la tuberculose suivant l'âge au décès et taux de mortalité pour 100,000 habitants
spécifiés par l'âge, 1940-1973¹**

Year — Année	Total ²	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
Number — Nombre										
1940	5,789	350	206	227	535	723	678	493	471	347
1941	6,072	383	180	246	525	714	736	552	477	434
1942	5,980	369	157	209	515	751	734	571	442	401
1943	6,168	361	184	217	580	781	686	567	485	454
1944	5,724	411	181	202	497	713	659	463	409	345
1945	5,546	325	159	189	484	713	605	535	442	353
1946	5,821	417	191	193	474	752	649	513	401	367
1947	5,449	336	171	157	466	668	617	468	407	332
1948	4,773	292	152	163	345	510	460	402	371	341
1949 ³	4,295	281	140	122	296	403	406	337	354	279
1950 ⁴	3,679	278	133	91	223	303	313	275	292	250
1951	3,481	255	102	82	193	258	314	280	257	255
1952	2,538	220	84	49	116	168	186	197	162	169
1953	1,861	165	49	35	51	92	121	142	123	125
1954	1,593	112	33	18	38	64	94	102	120	129
1955	1,403	68	20	12	26	58	100	95	108	94
1956	1,256	65	20	7	18	49	59	73	84	91
1957	1,183	51	14	5	18	31	69	64	74	82
1958	1,027	67	10	9	15	18	49	56	68	77
1959	959	36	6	9	14	24	35	46	72	54
1960	823	28	4	2	12	17	16	39	63	47
1961	769	24	6	7	8	13	17	30	47	46
1962	785	23	7	3	9	7	16	30	36	46
1963	756	17	5	4	6	5	13	21	37	41
1964	670	7	5	1	4	6	11	24	28	40
1965	697	13	4	3	4	8	10	15	29	38
1966	669	11	2	3	1	8	12	12	34	36
1967	658	9	2	1	1	1	7	13	26	43
1968	630	5	3	—	7	2	6	16	23	30
1969	526	3	2	1	4	4	5	10	15	22
1970	527	8	3	1	1	—	5	8	12	23
1971	447	2	1	—	—	3	5	8	8	25
1972	453	3	1	—	3	2	2	4	10	15
1973	408	1	1	2	2	2	2	3	13	13
Number — Nombre										
	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 and over — et plus	Not stated — Non compris
Number — Nombre										
1940	331	316	313	275	221	162	88	37	16	—
1941	383	308	316	281	230	156	91	42	16	2
1942	341	336	324	271	229	159	96	39	34	2
1943	320	367	324	271	250	152	95	62	11	1
1944	352	327	320	277	218	174	109	46	18	3
1945	308	293	297	279	230	182	92	37	20	3
1946	357	301	340	291	247	166	98	42	21	1
1947	329	285	314	307	236	186	105	43	22	—
1948	286	279	266	262	281	180	112	38	32	1
1949 ³	255	253	252	277	241	195	125	55	23	1
1950 ⁴	245	222	225	237	221	183	116	52	19	1
1951	220	196	221	238	233	178	120	53	25	1
1952	160	188	166	175	177	167	83	52	17	2
1953	122	124	126	147	163	123	94	38	21	—
1954	110	110	121	148	129	113	80	55	15	2
1955	100	98	111	115	120	116	84	47	31	—
1956	100	103	98	108	102	120	90	46	23	—
1957	103	90	111	85	103	106	94	54	28	1
1958	80	80	84	93	116	98	56	39	12	—
1959	64	84	91	76	90	88	92	50	28	—
1960	64	63	76	75	80	78	76	60	23	—
1961	52	65	68	54	83	85	69	67	28	—
1962	43	66	83	85	94	78	78	45	36	—
1963	54	72	69	81	88	90	79	42	32	—
1964	47	56	62	72	71	83	67	49	37	—
1965	43	61	79	84	81	65	73	60	27	—
1966	52	58	59	73	88	76	60	53	30	—
1967	41	45	64	92	71	79	64	54	45	—
1968	43	44	53	76	79	88	68	50	37	—
1969	32	42	47	63	74	54	67	55	26	—
1970	37	42	51	69	51	76	62	43	35	—
1971	16	50	56	50	51	55	52	45	20	—
1972	28	38	56	46	61	69	51	37	27	—
1973	23	33	41	47	52	48	54	40	30	1

See footnote(s) at end of Table 55. — Voir renvoi(s) à la fin du tableau 55.

TABLE 55. Deaths from All Forms of Tuberculosis by Age at Death and Age Specific Death Rate per 100,000 population,
1940-1973¹ - Concluded

TABLEAU 55. Décès dus à toutes formes de tuberculose suivant l'âge au décès et taux de mortalité pour 100,000 habitants
spécifiés par l'âge, 1940-1973¹ - fin

Year - Année	Total ²	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44
	Rate per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants									
	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 and over et plus	
1940	50.9	34.4	19.6	20.6	47.4	71.7	70.8	59.6	63.6	51.7
1941	52.8	36.5	17.2	22.4	46.9	69.3	76.2	65.5	62.9	64.2
1942	51.4	33.9	15.2	19.1	46.5	70.9	75.2	66.2	57.3	58.4
1943	52.4	31.8	18.0	20.0	52.9	72.1	70.2	64.1	61.9	65.0
1944	48.0	34.9	17.4	18.9	45.5	65.1	67.3	51.0	51.5	48.5
1945	46.0	26.3	15.2	18.0	44.6	65.1	61.3	57.9	54.5	48.8
1946	47.4	32.4	17.7	18.4	44.1	68.9	63.9	54.3	47.7	49.8
1947	43.5	24.7	15.3	14.9	43.6	61.0	59.6	48.7	47.3	44.0
1948	37.3	20.2	13.0	15.3	32.6	46.7	43.8	41.3	42.1	44.1
1949 ³	32.0	18.0	11.1	11.0	27.3	36.1	37.1	33.3	37.9	34.3
1950 ⁴	26.8	17.0	10.1	8.1	20.7	27.3	28.1	26.7	30.3	29.7
1951	24.8	14.8	7.3	7.3	18.2	23.7	27.8	26.9	25.7	29.4
1952	17.6	12.4	5.7	4.1	10.8	15.3	16.1	18.3	15.8	18.7
1953	12.5	9.0	3.1	2.8	4.7	8.3	10.3	12.8	11.7	13.4
1954	10.4	5.9	2.0	1.4	3.4	5.7	7.9	8.9	11.2	13.3
1955	8.9	3.5	1.2	0.9	2.3	5.2	8.4	8.0	9.9	9.4
1956	7.8	3.3	1.1	0.5	1.5	4.3	4.9	6.0	7.5	8.9
1957	7.1	2.5	0.8	0.3	1.5	2.7	5.7	5.1	6.4	7.8
1958	6.0	3.1	0.5	0.6	1.2	1.5	4.0	4.4	5.7	7.2
1959	5.5	1.6	0.3	0.5	1.1	2.0	2.9	3.6	5.9	5.0
1960	4.6	1.3	0.2	0.1	0.9	1.4	1.3	3.1	5.1	4.3
1961	4.2	1.1	0.3	0.4	0.6	1.1	1.4	2.4	3.7	4.1
1962	4.2	1.0	0.3	0.2	0.6	0.6	1.3	2.4	2.8	4.0
1963	4.0	0.7	0.2	0.2	0.4	0.4	1.1	1.7	2.9	3.5
1964	3.5	0.3	0.2	0.1	0.2	0.5	0.9	1.9	2.2	3.3
1965	3.5	0.6	0.2	0.1	0.2	0.6	0.8	1.2	2.3	3.1
1966	3.3	0.5	0.1	0.1	0.1	0.5	1.0	1.0	2.6	2.9
1967	3.2	0.4	0.1	^s	0.1	0.1	0.5	1.0	2.0	3.4
1968	3.0	0.2	0.1	^s	0.4	0.1	0.4	1.3	1.8	2.3
1969	2.5	0.2	0.1	^s	0.2	0.2	0.3	0.8	1.2	1.7
1970	2.5	0.4	0.1	^s	^s	^s	0.3	0.6	0.9	1.8
1971	2.1	0.1	^s	^s	^s	0.2	0.3	0.6	0.6	2.0
1972	2.1	0.2	^s	^s	0.1	0.1	0.1	0.3	0.8	1.2
1973	1.8	0.1	^s	^s	0.1	0.1	0.1	0.2	1.0	1.0
	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85 and over et plus	
	Rates per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants									
1940	52.2	53.9	62.8	70.2	75.0	76.6	66.1	52.9	46.4	
1941	60.4	52.1	62.4	69.1	74.8	71.9	67.1	58.8	44.8	
1942	53.5	56.3	62.5	64.8	72.3	71.2	69.0	53.4	92.8	
1943	50.1	61.1	61.2	63.1	76.7	66.3	66.3	83.0	29.1	
1944	54.8	54.2	59.4	62.9	64.9	73.8	74.0	60.3	46.4	
1945	47.5	48.6	54.6	62.2	66.9	75.3	61.2	47.7	50.8	
1946	53.9	50.0	62.0	63.7	70.0	66.9	63.6	52.4	48.5	
1947	48.8	46.8	56.8	65.8	64.6	72.1	65.1	50.4	46.3	
1948	41.8	45.0	47.7	54.9	74.1	66.5	66.2	42.7	65.6	
1949 ³	35.7	39.3	44.2	56.0	60.0	67.4	69.8	58.8	44.4	
1950 ⁴	33.6	33.9	39.4	47.3	53.0	60.6	63.0	54.2	35.9	
1951	29.5	29.6	38.7	47.0	53.7	56.5	63.7	54.8	47.6	
1952	20.7	27.7	28.4	34.3	40.2	51.0	42.0	51.7	31.4	
1953	15.3	17.9	21.1	28.6	36.6	36.3	45.5	36.3	37.5	
1954	13.3	15.5	19.9	28.5	28.6	32.2	37.2	50.3	25.7	
1955	11.7	13.6	17.9	22.0	28.2	32.1	37.9	41.6	50.6	
1956	11.4	14.0	15.6	20.6	22.0	32.4	39.6	39.3	35.7	
1957	11.3	11.9	17.3	15.9	22.1	28.0	39.5	44.5	42.2	
1958	8.5	10.2	12.8	17.1	24.8	25.5	22.6	30.8	17.4	
1959	6.6	10.4	13.5	13.6	19.0	22.4	35.7	37.6	38.8	
1960	6.4	7.5	11.0	13.2	16.7	19.6	28.5	43.2	30.5	
1961	5.1	7.5	9.6	9.3	17.0	21.1	25.2	45.6	34.6	
1962	4.2	7.4	11.4	14.3	19.0	19.3	27.7	29.2	42.4	
1963	5.2	7.9	9.2	13.3	17.5	22.2	27.5	26.0	35.5	
1964	4.5	6.0	8.1	11.5	13.9	20.2	23.9	29.2	38.8	
1965	4.0	6.3	10.0	13.1	15.6	15.6	24.7	34.6	27.3	
1966	4.8	5.9	7.2	11.0	16.6	17.8	20.0	29.9	29.1	
1967	3.7	4.5	7.6	13.5	13.1	18.2	20.8	29.8	42.1	
1968	3.7	4.3	6.1	10.8	14.2	20.1	21.6	27.0	33.2	
1969	2.7	4.1	5.2	8.7	13.0	12.2	20.8	29.1	22.6	
1970	3.0	4.0	5.5	9.3	8.7	17.0	18.8	22.1	29.4	
1971	1.3	4.8	5.9	6.4	8.2	16.0	22.0	14.6	-	
1972	2.2	3.5	5.8	5.7	9.6	14.7	15.4	17.9	19.0	
1973	1.9	2.9	4.2	5.7	7.9	9.9	16.1	19.0	20.4	

¹ Supplied by Vital Statistics Section. - Renseignements fournis par la Section de l'état civil.

² Not stated ages included in total but not distributed by age. - Les âges non spécifiés sont compris dans le total mais non répartis suivant l'âge.

³ From 1949 includes Newfoundland. - De 1949 inclus Terre-Neuve.

⁴ From 1950 includes Newfoundland, Yukon, Northwest Territories. - De 1950 inclus Terre-Neuve, Yukon, Territoires du Nord-Ouest.

⁵ Less than 0.1 per 100,000 population. - Moins de 0.1 pour 100,000 habitants.



ANTI-TUBERCULOSIS ACTIVITIES

ACTIVITÉS POUR COMBATTRE LA TUBERCULOSE

TABLE 56A. Persons Receiving Preventive Outpatient Drug Treatment and Percentage Distribution by Reason for Treatment and Province, December 31, 1973

No.	Reason for preventive treatment	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Number — Nombre														
1	TOTAL	16,222	88	47	330	243	2,955	7,614	1,167	234	1,257	993	93	1,201
2	Inactive TB	2,262	15	8	21	66	494	862	84	27	372	184	10	119
3	Presumed TB inactive	876	27	—	2	27	160	519	2	21	48	63	—	7
4	Contact-converter	933	6	—	80	12	78	401	62	50	74	145	—	25
5	Contact-tuberculin positive	2,962	17	17	28	46	677	1,040	359	51	306	254	4	163
6	Other converter	1,453	1	—	55	7	67	1,035	33	18	78	102	2	55
7	Other tuberculin positive	5,711	6	8	18	13	702	3,445	594	43	299	104	60	419
8	Undiagnosed pulmonary lesion	160	2	—	5	3	133	1	—	4	5	6	—	1
9	Corticosteroid therapy	291	9	4	59	1	66	67	3	12	22	45	—	3
10	Silicosis	68	—	—	—	—	11	40	—	—	1	14	—	2
11	Other	1,506	5	10	62	68	567	204	30	8	52	76	17	407

TABLE 56B. Persons Receiving Preventive Outpatient Drug Treatment and Percentage Distribution by Reason for Treatment and Age Group, December 31, 1973

No.	Reason for preventive treatment	All ages — Tous âges	0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75 and over — et plus
Number — Nombre											
1	TOTAL	16,222	343	2,720	3,592	2,276	2,053	2,202	1,716	920	400
2	Inactive TB	2,262	6	57	118	215	369	545	538	291	123
3	Presumed TB inactive	876	—	20	58	103	128	193	202	123	49
4	Contact-converter	933	30	218	265	179	106	63	44	23	5
5	Contact-tuberculin positive	2,962	146	718	598	453	401	333	196	83	34
6	Other converter	1,453	19	273	493	316	159	112	44	18	19
7	Other tuberculin positive	5,711	66	1,255	1,806	736	618	613	366	174	77
8	Undiagnosed pulmonary lesion	160	—	12	19	21	30	27	31	12	8
9	Corticosteroid therapy	291	1	—	5	24	16	76	88	69	12
10	Silicosis	68	—	—	—	2	5	18	14	23	6
11	Other	1,506	75	167	230	227	221	222	193	104	67

TABLE 56C. Persons Receiving Preventive Outpatient Drug Treatment and Percentage Distribution by Reason for Treatment and Origin, December 31, 1973

No.	Reason for preventive treatment	Total	Indian — Indiens	Eskimo — Esquimaux	Other — Autres
Number — Nombre					
1	TOTAL	16,222	1,343	1,043	13,836
2	Inactive TB	2,262	253	69	1,940
3	Presumed TB inactive	876	56	17	803
4	Contact-converter	933	79	22	832
5	Contact-tuberculin positive	2,962	368	151	2,443
6	Other converter	1,453	71	65	1,317
7	Other tuberculin positive	5,711	364	407	4,940
8	Undiagnosed pulmonary lesion	160	5	3	152
9	Corticosteroid therapy	291	6	2	283
10	Silicosis	68	1	1	66
11	Other	1,506	140	306	1,060

TABLEAU 56 A. Personnes recevant un traitement préventif par médication hors de l'hôpital et répartition procentuelle suivant la raison du traitement et la province, 31 décembre, 1973

Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T. N.-O.	Raison du traitement préventif	N°
Percentage distribution — Répartition procentuelle														
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TOTAL	1
14	17	17	6	27	17	11	7	12	30	18	11	10	Tuberculose inactive	2
5	31	—	1	11	5	7	--	9	4	6	—	1	Tuberculose présumée inactive	3
6	7	—	24	5	3	5	5	21	6	15	—	2	Contact-virage du négatif au positif	4
19	19	36	8	19	23	14	31	22	24	26	4	14	Contact-tuberculine positive	5
9	1	—	17	3	2	14	3	8	6	10	2	4	Autre virage du négatif au positif	6
35	7	17	5	6	24	45	51	18	24	10	65	35	Autre tuberculine positive	7
1	2	—	2	1	5	--	—	2	--	1	—	--	Lésion pulmonaire non diagnostiquée	8
2	10	9	18	--	2	1	--	5	2	5	—	--	Thérapie corticostéroïde	9
--	—	—	—	--	--	--	—	--	--	1	—	--	Silicose	10
9	6	21	19	28	19	3	3	3	4	8	18	34	Autres	11

TABLEAU 56 B. Personnes recevant un traitement préventif par médication hors de l'hôpital et répartition procentuelle suivant la raison du traitement et le groupe d'âge, 31 décembre, 1973

All ages Tous âges	0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75 and over et plus	Raison du traitement préventif	N°
Percentage distribution — Répartition procentuelle											
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TOTAL	1
14	2	2	3	9	18	25	31	32	31	Tuberculose inactive	2
5	—	1	2	5	6	9	12	13	12	Tuberculose présumée inactive	3
6	9	8	7	8	5	3	3	3	1	Contact-virage du négatif au positif	4
19	43	26	17	20	20	15	11	9	9	Contact-tuberculine positive	5
9	5	10	14	14	8	5	3	2	5	Autre virage du négatif au positif	6
35	19	46	50	32	30	28	21	19	19	Autre tuberculine positive	7
1	—	1	1	1	1	1	2	1	2	Lésion pulmonaire non diagnostiquée	8
2	--	—	--	1	1	3	5	7	3	Thérapie corticostéroïde	9
--	—	—	—	--	--	1	1	3	1	Silicose	10
9	22	6	6	10	11	10	11	11	17	Autres	11

TABLEAU 56 C. Personnes recevant un traitement préventif par médication hors de l'hôpital et répartition procentuelle suivant la raison du traitement et l'origine, 31 décembre, 1973

Total	Indian Indiens	Eskimo Esquimaux	Other Autres	Raison du traitement préventif	N°
Percentage distribution — Répartition procentuelle					
100	100	100	100	TOTAL	1
14	19	7	14	Tuberculose inactive	2
5	4	2	6	Tuberculose présumée inactive	3
6	6	2	6	Contact-virage du négatif au positif	4
18	27	15	18	Contact-tuberculine positive	5
9	5	6	9	Autre virage du négatif au positif	6
35	27	39	36	Autre tuberculine positive	7
1	--	--	1	Lésion pulmonaire non diagnostiquée	8
2	1	--	2	Thérapie corticostéroïde	9
1	--	--	--	-- Silicose	10
9	11	29	8	Autres	11

TABLE 57. Persons receiving BCG Vaccinations by Province, 1973
TABLEAU 57. Personnes recevant des vaccinations par le B.C.G. suivant la province, 1973

Persons — Personnes	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î. P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.
Number of vaccinations — Nombre de vaccinations						
TOTAL	138,683	3,832	75	282	345	121,285¹
Nurses — Infirmières	2,939	..	75	279	75	..
Graduate — Diplômées	364	..	—	262	51	..
Student — Étudiantes	1,889	..	59	—	24	..
Other nursing personnel — Autres personnels soignants	686	..	16	17	—	..
Other hospital personnel — Autres personnels hospitaliers	571	..	—	—	—	..
Medical students — Étudiants en médecine	479	..	—	—	—	..
Indians and Eskimos — Indiens et Esquimaux	5,396	..	—	—	1	..
Newborn — Nouveau-nés	864	..	—	—	1	..
Adults and children — Adultes et enfants	2,019	..	—	—	—	..
All other persons — Toutes autres personnes	6,040	3,832	—	3	269	..
Newborn, contacts — Nouveau-nés exposés à la contamination	292	261	—	—	—	..
Adults and children, contacts — Adultes et enfants exposés à la contamination	121	..	—	—	—	..
Newborn, not contacts — Nouveau-nés non exposés à la contamination	235	..	—	—	—	..
Adults and children, not contacts — Adultes et enfants non exposés à la contamination	1,821	..	—	3	269	..
Unspecified — Sans précision	3,571	3,571	—	—	—	..
Ont.	Man.	Sask.	Alta. — Alb.	B.C. — C.-B.	Yukon	N.W.T. — T. N.-O.
Number of vaccinations — Nombre de vaccinations						
TOTAL	1,406¹	3,799	1,934	2,465	2,693	197¹
Nurses — Infirmières	..	871	93	1,217	329	..
Graduate — Diplômées	..	24	3	21	3	..
Student — Étudiantes	..	787	23	670	326	..
Other nursing personnel — Autres personnels soignants	..	60	67	526	—	..
Other hospital personnel — Autres personnels hospitaliers	..	321	120	118	12	..
Medical students — Étudiants en médecine	..	26	5	3	445	..
Indians and Eskimos — Indiens et Esquimaux	..	2,513	174	880	1,828	..
Newborn — Nouveau-nés	158	227	478	..
Adults and children — Adultes et enfants	16	653	1,350	..
All other persons — Toutes autres personnes	..	68	1,542	247	79	..
Newborn, contacts — Nouveau-nés exposés à la contamination	..	5	5	21	—	..
Adults and children, contacts — Adultes et enfants exposés à la contamination	..	18	75	22	6	..
Newborn, not contacts — Nouveau-nés non exposés à la contamination	..	3	199	30	3	..
Adults and children, not contacts — Adultes et enfants non exposés à la contamination	..	42	1,263	174	70	..
Unspecified — Sans précision	..	—	—	—	—	..

¹ Item distribution is not available. — Répartition en détail n'est pas disponible.

TUBERCULOSIS IN IMMIGRANTS

TUBERCULOSE CHEZ LES IMMIGRANTS

TABLE 58A. New Active and Reactivated Cases of Tuberculosis reported in 1973 in Immigrants¹ by Place of Birth and Province of Residence

No.	Place of birth Lieu de naissance	Total	New active cases Nouveaux cas actifs	Reactivated cases Cas réactivés	Province of residence Province de résidence	
					Nfld. T.-N.	P.E.I. I.P.-É.
1	Total	1,063	927	136	1	1
2	Europe	632	539	93	—	—
3	Africa — Afrique	26	25	1	—	—
4	Asia — Asie	288	260	28	1	1
5	Oceania and Antarctica — Océanie et Antarctique	6	6	—	—	—
6	South America — Amérique du Sud	23	20	3	—	—
7	Central America and Antilles — Amérique Centrale et Antilles	34	34	—	—	—
	North America — Amérique du Nord:					
8	U.S.A. — É.-U.	36	25	11	—	—
9	Unknown — Inconnu	18	18	—	—	—

¹ Additional breakdown on immigrants available on request to Statistics Canada, Epidemiology Section.

TABLE 58B. New Active and Reactivated Cases of Tuberculosis reported in 1973 in Immigrants¹ by Place of Birth and Year of Immigration

No.	Place of birth Lieu de naissance	Total	Year of immigration — Année d'immigration					
			1871-1900	1901-1905	1906-1910	1911-1915	1916-1920	1921-1925
1	Total	1,063	6	12	29	46	23	35
2	Europe	632	5	7	22	36	16	30
3	Africa — Afrique	26	—	1	—	—	—	—
4	Asia — Asie	288	—	1	1	7	4	2
5	Oceania and Antarctica — Océanie et Antarctique	6	—	—	1	—	—	—
6	South America — Amérique du Sud	23	—	—	—	—	—	—
7	Central America and Antilles — Amérique Centrale et Antilles	34	—	—	—	—	—	—
	North America — Amérique du Nord:							
8	U.S.A. — É.-U.	36	1	3	5	3	3	3
9	Unknown — Inconnu	18	—	—	—	—	—	—

¹ See footnote Table 58A.

TABLEAU 58A. Nouveaux cas actifs et réactivés de tuberculose rapportés en 1973 chez les immigrants¹ suivant le lieu de naissance et la province de résidence

N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Province of residence Province de résidence		Yukon	N.W.T. T. N.-O.	N°
						Alta. Alb.	B.C. C.-B.			
2	—	113	589	45	40	80	192	—	—	1
1	—	66	380	26	23	47	89	—	—	2
1	—	11	11	—	1	—	2	—	—	3
—	—	16	149	16	9	17	79	—	—	4
—	—	—	1	—	—	—	5	—	—	5
—	—	3	18	1	—	—	1	—	—	6
—	—	9	20	2	—	2	1	—	—	7
—	—	6	10	—	6	6	8	—	—	8
—	—	2	—	—	1	8	7	—	—	9

¹On peut obtenir des répartitions supplémentaires concernant les immigrants en s'adressant à la section de l'épidémiologie, Statistique Canada.

TABLEAU 58B. Nouveaux cas actifs et réactivés de tuberculose rapportés en 1973 chez les immigrants¹ suivant le lieu de naissance et l'année d'immigration

1926- 1930	1931- 1935	1936- 1940	1941- 1945	1946- 1950	1951- 1955	1956- 1960	1961- 1965	1966- 1970	Year of immigration Année d'immigration				Unknown Inconnue	N°
									1971	1972	1973	—		
74	8	7	4	46	87	91	64	237	53	123	61	57	1	
69	6	6	3	43	74	73	40	104	16	30	21	31	2	
—	—	—	—	—	—	—	3	12	1	6	2	1	3	
2	—	—	—	1	10	14	20	105	25	62	31	3	4	
—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	1	—	5	
—	—	—	—	—	1	1	—	2	4	14	1	—	6	
—	—	1	—	—	1	3	—	12	4	9	4	—	7	
3	2	—	1	2	1	—	—	—	2	2	1	4	8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	9	

¹ Voir renvoi, tableau 58A.

DATE DUE
DATE DE RETOUR

MAY
MAI 31 1979



LOWE-MARTIN No. 1137

QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section des finances,
Statistique Canada, ou à Information Canada, Ottawa

STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL

Catalogue

- 84-001 La statistique de l'état civil – T., Bil.
- 84-201 La statistique de l'état civil – A., provisoire, Bil.
- 84-203 Causes de décès, par provinces selon le sexe et le Canada selon le sexe et l'âge, A., Bil.
- 84-204 La statistique de l'état civil, Vol. I, naissances, A., Bil.
- 84-205 La statistique de l'état civil, Vol. II, mariages et divorces, A., Bil.
- 84-206 La statistique de l'état civil, Vol. III, décès, A., Bil.

Rapports analytiques:

Tables de survie:

- 84-527 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1965-1967, HS., Bil.
- 84-532 Tables de mortalité, Canada et provinces, 1970-1972, HS., Bil.

Autres publications:

- 84-520 Mortalité générale due au cancer, 1950-1963, HS., Bil.
- 84-522 Mortalité accidentelle, 1950-1964, HS., Bil.
- 84-523 Nuptialité, 1950-1964, HS., Bil.
- 84-524 Mortalité infantile, 1950-1964, HS., Bil.
- 84-528 Mortalité due au suicide, 1950-1968, HS., Bil.
- 84-529 Cardiovasculaire-rénale mortalité, 1950-1968, HS., Bil.
- 84-530 Taux de suicide du Canada, par localité et par centre urbain, 1970-1972, HS., Bil.

STATISTIQUES DES HÔPITAUX

- 83-001 Indicateurs des hôpitaux – T., Bil.
- 83-201 Hôpitaux canadiens et des installations connexes – A., Bil.
- 83-210 La statistique des hôpitaux, Vol. I, Lits d'hôpital – A., Bil.
- 83-211 La statistique des hôpitaux, Vol. II, Services hospitaliers – A., Bil.
- 83-212 La statistique des hôpitaux, Vol. III, Personnel hospitalier – A., Bil.
- 83-213 La statistique des hôpitaux, Vol. IV, Bilans hospitaliers – A., Bil.
- 83-214 La statistique des hôpitaux, Vol. V, Revenus hospitaliers – A., Bil.
- 83-215 La statistique des hôpitaux, Vol. VI, Dépenses hospitalières – A., Bil.
- 83-216 La statistique des hôpitaux, Vol. VII, Indicateurs hospitaliers – A., Bil.
- 83-217 La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire) – A., Bil.
- 83-205 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. III, Installations, services et finances des établissements – A., Bil.
- 83-207 La statistique de la tuberculose, Installations, services et finances des établissements – A., Bil.

STATISTIQUES DE LA MAIN-D'OEUVRE

- 83-219 Traitements annuels des infirmiers d'hygiène, A., Bil.
- 83-220 Personnel sanitaire – Infirmières autorisées – A., Bil.
- 83-401 Traitements annuels du personnel infirmier des hôpitaux, Bienn., Bil.

STATISTIQUES DE L'HYGIÈNE MENTALE

- 83-204 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. I, Admissions et radiations des institutions – A., Bil.
- 83-208 La statistique de l'hygiène mentale, Vol. II, Les malades inscrits dans les établissements – A., Bil.
- 83-505 *Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963*, HS., Angl.
- 83-506 Probabilité d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique du Canada, HS., Bil.
 - La statistique de l'hygiène mentale, mouvement des malades, Préliminaire – A., Bil. (gratuit)

STATISTIQUES DE LA SANTÉ PUBLIQUE

- 82-201 Les maladies à déclaration obligatoire – A., Bil.
- 82-206 La morbidité hospitalière – A., Bil.
- 82-207 Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada, 1969, A., Bil.
 - Nouveaux sièges primaires de tumeurs malignes au Canada selon la région de recensement 1969-70 (Supplément à 82-207), A., Bil.
- 82-208 Interventions chirurgicales et traitements, A., Bil.
- 82-209 La morbidité hospitalière, Liste canadienne de diagnostiques, A., Bil.
 - Maladies à déclaration obligatoire, (1924-1968), résumé chronologique, Bil., (gratuit)
- 82-211 Avortements thérapeutiques, A., Bil.
- 82-212 La statistique de la tuberculose, Morbidité et mortalité – A., Bil.
- 82-522 *Infectious Hepatitis, 1961*, HS., Angl.

RAPPORTS TECHNIQUES SUR LA DIVISION DE LA SANTÉ

1. *Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963* – Angl., (gratuit)
2. *Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963* – Angl., (gratuit)
3. *Canadian Joint Life Tables, 1960-1962* – Angl., (gratuit)

M. – Mensuel T. – Trimestriel A. – Annuel Bienn. – Biennale HS. – Hors série F. – Français Angl. – Anglais Bil. – Bilingue

Outre les publications ci-dessus énumérées, Statistique Canada publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris des rapports détaillés sur les recensements de 1966 et 1971. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes à Statistique Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Services Section,
Statistics Canada or Information Canada, Ottawa

VITAL STATISTICS

Catalogue

- 84-001 Vital Statistics, Q., Bil.
- 84-201 Vital Statistics - Preliminary, A., Bil.
- 84-203 Causes of Death, Provinces by Sex and Canada by Sex and Age, A., Bil.
- 84-204 Vital Statistics, Vol. I, Births, A., Bil.
- 84-205 Vital Statistics, Vol. II, Marriages, Divorces, A., Bil.
- 84-206 Vital Statistics, Vol. III, Deaths, A., Bil.

STATISTICS CANADA LIBRARY
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA



1010485779

Analytical Reports:

Life Tables:

- 84-527 Life Tables, Canada and Provinces, 1965-1967, O., Bil.
- 84-532 Life Tables, Canada and Provinces, 1970-1972, O., Bil.

Other:

- 84-520 General Cancer Mortality, 1950-1963, O., Bil.
- 84-522 Accident Mortality, 1950-1964, O., Bil.
- 84-523 Nuptiality, 1950-1964, O., Bil.
- 84-524 Infant Mortality, 1950-1964, O., Bil.
- 84-528 Suicide Mortality, 1950-1968, O., Bil.
- 84-529 Cardiovascular-Renal Mortality, 1950-1968, O., Bil.
- 84-530 Canadian Suicide Ratios by Local Areas and by Urban Centres, 1970-1972, O., Bil.

HOSPITAL STATISTICS

- 83-001 Hospital Indicators, Q., Bil.
- 83-201 Canadian Hospitals and Related Facilities, A., Bil.
- 83-210 Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A., Bil.
- 83-211 Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A., Bil.
- 83-212 Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A., Bil.
- 83-213 Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A., Bil.
- 83-214 Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A., Bil.
- 83-215 Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A., Bil.
- 83-216 Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A., Bil.
- 83-217 Hospital Statistics (Preliminary Report), A., Bil.
- 83-205 Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.
- 83-207 Tuberculosis Statistics, Institutional Facilities, Services and Finances, A., Bil.

HEALTH MANPOWER STATISTICS

- 83-219 Annual Salaries of Public Health Nurses, A., Bil.
- 83-220 Health Manpower - Registered Nurses, A., Bil.
- 83-401 Annual Salaries of Hospital Nursing Personnel, Bien., Bil.

MENTAL HEALTH STATISTICS

- 83-204 Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations, A., Bil.
- 83-208 Mental Health Statistics, Vol. II, Patients on Books of Institutions, A., Bil.
- 83-505 Trends in Hospital Care and Patient Characteristics, 1955-1963, O., E.
- 83-506 Expectation of Admission to a Canadian Psychiatric Institution, O., Bil.
 - Mental Health Statistics, Patient Movement, Preliminary, A., Bil., (Free)

PUBLIC HEALTH STATISTICS

- 82-201 Notifiable Diseases, A., Bil.
- 82-206 Hospital Morbidity, A., Bil.
- 82-207 New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada, 1969, A., Bil.
 - New Primary Sites of Malignant Neoplasms in Canada by Census District 1969-70 (Supplement to 82-207), A., Bil.
- 82-208 Surgical Procedures and Treatments, A., Bil.
- 82-209 Hospital Morbidity, Canadian Diagnostic List, A., Bil.
 - Notifiable Diseases, (1924-1968), Historical Supplement, Bil., (Free)
- 82-211 Therapeutic Abortions, A., Bil.
- 82-212 Tuberculosis Statistics, Morbidity and Mortality, A., Bil.
- 82-522 Infectious Hepatitis, 1961, O., E.

HEALTH DIVISION TECHNICAL REPORTS

1. Canadian Abridged Life Tables, 1961-1963, E., (Free)
2. Provincial Abridged Life Tables, 1961-1963, E., (Free)
3. Canadian Joint Life Tables, 1960-1962, E., (Free)

M. - Monthly Q. - Quarterly A. - Annual Bien. - Biennial O. - Occasional E. - English F. - French Bil. - Bilingual

In addition to the selected publications listed above, Statistics Canada publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1966 and 1971 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from Statistics Canada, Ottawa (Canada), K1A 0T6.