

**Statistics Canada**

**Health Division  
Vital Statistics and Disease  
Registries Section**

**TUBERCULOSIS  
STATISTICS**

**Supplementary Report**

**1983**


**Statistique Canada**

**Division de la santé  
Section de la statistique de l'état  
civil et des registres de maladies**

**LA STATISTIQUE  
DE LA TUBERCULOSE**

**Rapport supplémentaire**

**1983**



**Prepared by:**

**Vital Statistics and  
Disease Registries Section,**

**Health Division,  
Statistics Canada**

**October 1983**

**Préparé par:**

**Section de la statistique de  
l'état civil et des registres  
de maladies,  
Division de la santé,  
Statistique Canada**

**Octobre 1983**

## SYMBOLS

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

.. figures not available.

... figures not appropriate or not applicable.

- nil or zero.

-- amount too small to be expressed.

p preliminary figures.

r revised figures.

x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

## SIGNES CONVENTIONNELS

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

.. nombres indisponibles.

... n'ayant pas lieu de figurer.


- néant ou zéro.

-- nombres infimes.

p nombres provisoires.

r nombres rectifiés.

x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.



**TABLE OF CONTENTS**

	Page
<b>Morbidity and Mortality</b>	
Estimated Population for Canada and the Provinces, by Age Group and Sex, June 1, 1983	6
Summary Statistics, 1983	7
Table	
Notification of New Active and Reactivated Cases of Tuberculosis, 1983	.
1. Comparison - New Active and Reactivated Cases, Canada and Provinces, 1983	8
2. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Age Group, 1983	8
3. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Diagnosis, 1983	9
4. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Origin, 1983	9
5. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis and Sex, Canada and Provinces, 1983	10
6. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Age Group, 1983	16
7. New Active and Reactivated Cases and Rate Per 100,000 Population by Age Group and Sex, Canada and Provinces, 1983	22
8. New Active and Reactivated Cases and Rate Per 100,000 Population by Age Group, Sex and Diagnosis, 1983	24
9. New Active and Reactivated Cases and Rate Per 100,000 Population by Diagnosis and Sex, Canada and Provinces, 1983	26
10. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Sex, Canada and Provinces, 1983	28
11. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Age Group, 1983	29
12. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Diagnosis and Origin, 1983	29
13. New Active and Reactivated Cases, Bacillary Status, Canada and Provinces, 1983	30
14. New Active and Reactivated Cases, Bacillary Status, by Diagnosis and by Origin, 1983	31

**TABLE DES MATIÈRES**

	Page
<b>Morbidité et mortalité</b>	
Population estimative du Canada et des Provinces, selon le groupe d'âge et le sexe, 1er juin 1983	6
Sommaire des statistiques, 1983	7
Tableau	
Déclarations de nouveaux cas actifs et réactivés de tuberculose, 1983	
1. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés, Canada et provinces, 1983	8
2. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le groupe d'âge, 1983	8
3. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic, 1983	9
4. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant l'origine, 1983	9
5. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé et le sexe, Canada et provinces, 1983	10
6. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe et le groupe d'âge, 1983	16
7. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge et le sexe, Canada et provinces, 1983	22
8. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et le diagnostic, 1983	24
9. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le diagnostic et le sexe, Canada et provinces, 1983	26
10. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine et le sexe, Canada et provinces, 1983	28
11. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine et le groupe d'âge, 1983	29
12. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant le diagnostic et l'origine, 1983	29
13. Nouveaux cas actifs et réactivés, état bacillaire, Canada et provinces, 1983	30
14. Nouveaux cas actifs et réactivés, état bacillaire, par le diagnostic et par l'origine, 1983	31

**TABLE OF CONTENTS - Concluded**

<b>Table</b>	<b>Page</b>
<b>Notification of New Active and Reactivated Cases of Tuberculosis, 1983 - Concluded</b>	
15. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Method of Determination of Bacillary Status, Canada and Provinces, 1983	32
16. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Diagnosis and Method of Determination of Bacillary Status, Canada and Provinces, 1983	34
17. New Active and Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary and Diagnosis, Canada and Provinces, 1983	36
18. New Active and Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary and Origin, Canada and Provinces, 1983	37
 <b>Reactivated Cases</b>	
19. Reactivated Cases by Length of Inactive Interval, Canada and Provinces, 1983	38
20. Notifications of Reactivated Cases by Origin and Sex, Canada and Provinces, 1983	38

**TABLE DES MATIÈRES - fin**

<b>Tableau</b>	<b>Page</b>
<b>Déclarations de nouveaux cas actifs et réactivés de tuberculose, 1983 - fin</b>	
15. Nouveaux cas actifs et réactivés, et répartition procentuelle suivant l'origine et la méthode de détermination d'état bacillaire, Canada et provinces, 1983	32
16. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant le diagnostic et la méthode de détermination d'état bacillaire, Canada et provinces, 1983	34
17. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le nombre de bacilles positifs et le diagnostic, Canada et provinces, 1983	36
18. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le nombre de bacilles positifs et l'origine, Canada et provinces, 1983	37
 <b>Cas réactivés</b>	
19. Cas réactivés suivant l'intervalle inactif, Canada et provinces, 1983	38
20. Déclarations de cas réactivés suivant l'origine et le sexe, Canada et provinces, 1983	38

**Statistical Tables**

**Tableaux statistiques**

## Estimated Population for Canada and the Provinces, by Age Group and Sex, June 1, 1983

Population estimative du Canada et des provinces, selon le groupe d'âge et le sexe, 1er juin 1983

Province	Total									75 years and over	
		0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74		
										75 ans et plus	
CANADA											
	T.	24,888.8	1,816.6	3,639.7	4,537.5	4,355.4	3,278.8	2,507.1	2,258.0	1,539.3	957.2
	M.	12,323.6	831.4	1,867.4	2,302.4	2,171.5	1,650.0	1,260.4	1,080.1	696.3	363.9
	F.	12,566.2	885.2	1,772.3	2,235.1	2,183.9	1,628.9	1,246.7	1,177.9	843.0	593.2
Newfoundland - Terre-Neuve											
	T.	577.9	49.0	113.6	115.7	96.1	58.6	46.9	41.4	30.2.	16.4
	M.	290.3	25.1	58.5	58.1	47.5	34.8	24.1	21.0	14.5	6.9
	F.	287.6	24.0	55.1	57.7	48.7	33.8	22.8	20.4	15.6	9.6
Prince Edward Island - île-du- Prince-Édouard											
	T.	124.0	9.7	20.8	22.7	19.0	14.7	11.0	10.6	9.0	6.5
	M.	61.5	4.9	10.8	11.4	9.5	7.5	5.6	5.0	4.2	2.6
	F.	62.5	4.8	10.0	11.3	9.6	7.3	5.4	5.5	4.7	3.8
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse											
	T.	859.3	60.3	133.8	160.8	142.0	108.2	80.5	76.5	59.8	37.3
	M.	424.5	30.6	68.6	82.1	70.3	54.2	40.2	36.3	27.7	14.5
	F.	434.8	29.7	65.1	78.8	71.7	54.0	40.3	40.2	32.1	23.0
New Brunswick - Nouveau- Brunswick											
	T.	706.7	52.4	117.8	134.0	118.7	87.2	62.9	50.1	45.2	28
	M.	350.7	27.1	60.4	68.2	58.8	44.3	31.2	28.7	21.1	11
	F.	356.0	25.3	57.5	65.8	50.0	43.0	31.7	31.3	24.0	17.4
Québec											
	T.	6,521.6	474.0	905.8	1,199.8	1,173.6	899.2	577.5	587.3	384.6	219.7
	M.	3,208.0	244.0	465.0	607.5	584.8	448.6	333.3	276.7	168.3	79.9
	F.	3,313.6	230.0	440.8	592.4	588.8	450.6	344.1	310.6	216.3	140.0
Ontario											
	T.	8,815.9	603.5	1,266.9	1,573.8	1,480.4	1,183.5	938.7	853.6	557.9	357.4
	M.	4,335.7	308.7	650.1	797.3	726.1	592.0	472.6	408.7	251.4	128.6
	F.	4,480.2	294.8	616.7	776.4	754.3	591.5	465.9	445.0	306.6	228.7
Manitoba											
	T.	1,047.2	79.6	159.6	187.3	171.3	124.5	98.4	99.5	76.1	50.9
	M.	516.1	40.9	81.8	94.8	85.2	62.3	48.9	47.2	35.0	20.1
	F.	531.0	38.7	77.8	92.5	86.1	62.0	49.5	52.3	41.2	30.8
Saskatchewan											
	T.	992.7	83.8	158.5	180.5	158.9	105.8	91.1	91.8	72.9	49.4
	M.	497.1	43.1	81.0	91.5	80.7	53.7	46.0	45.0	34.6	21.5
	F.	495.6	40.7	77.5	88.9	78.2	52.1	45.1	46.8	38.3	27.9
Alberta											
	T.	2,350.0	197.2	357.3	468.7	479.1	296.8	210.8	166.4	105.4	68.5
	M.	1,199.8	101.4	183.1	241.0	251.4	153.4	109.4	81.9	49.0	29.0
	F.	1,150.3	95.8	174.2	227.6	227.6	143.4	101.4	84.5	56.4	39.4
British Columbia - Colombie- Britannique											
	T.	2,823.9	198.9	392.0	479.5	501.7	381.5	284.1	267.7	196.9	121.7
	M.	1,402.8	101.5	201.0	243.0	249.8	194.3	146.1	127.8	89.8	49.4
	F.	1,421.1	97.5	190.9	236.5	251.9	187.2	138.0	139.9	107.1	72.2
Yukon											
	T.	22.3	2.3	3.6	4.1	4.9	3.4	1.9	1.2	0.5	0.2
	M.	11.7	1.2	1.8	2.1	2.4	1.8	1.0	0.7	0.3	0.1
	F.	10.6	1.1	1.8	2.0	2.5	1.5	0.8	0.5	0.2	-
Northwest Territories - Terri- toires du Nord-Ouest											
	T.	48.4	5.8	10.1	10.6	9.6	5.7	3.4	1.9	0.9	0
	M.	25.4	3.0	5.2	5.5	5.0	3.1	1.9	1.1	0.4	0.2
	F.	22.9	2.8	5.0	5.1	4.6	2.5	1.5	0.9	0.4	0.2

Source: Census Division, Statistics Canada.

Source: Division du recensement, Statistique Canada.

## Summary Statistics, 1983

## Sommaire des statistiques, 1983

## Notification by case register - Déclaration par registre central

Province, age group and origin	New active cases		Reactivated cases	
	Nouveaux cas actifs		Cas réactivés	
	Number	Rate per 100,000 population	Number	Rate per 100,000 population
	Nombre	Taux pour 100.000 habitants	Nombre	Taux pour 100.000 habitants

## Province

CANADA	2,075	8.3	281	1.1
Newfoundland - Terre-Neuve	59	10.2	4	0.7
Prince Edward Island - Île-du-Prince-Édouard	3	2.4	1	0.8
Nova Scotia - Nouvelle-Écosse	25	2.9	10	1.2
New Brunswick - Nouveau-Brunswick	49	6.9	9	1.3
Québec	551	8.4	67	1.0
Ontario	589	6.7	73	0.8
Manitoba	195	18.6	13	1.2
Saskatchewan	102	10.3	16	1.6
Alberta	171	7.3	18	0.8
British Columbia - Colombie-Britannique	309	10.9	54	1.9
Yukon	5	22.4	1	4.5
Northwest Territories - Territoires du Nord-Ouest	17	35.1	15	31.0

## Age group - Groupe d'âge

TOTAL	2,075	8.3	281	1.1
0-14 years - ans	178	3.3	5	0.1
15-24 " "	237	5.2	7	0.2
25-44 " "	573	7.5	49	0.6
45-64 " "	577	12.1	103	2.2
65 years and over - ans et plus	510	20.4	117	4.7

percentage  
distribution(1)percentage  
distribution(1)répartition  
procentuelle(1)répartition  
procentuelle(1)

## Origin - Origine

TOTAL	2,075	100.0	281	100.0
Indians - Indiens	356	17.1	63	22.4
Inuit	39	1.9	9	3.2
Other - Autres	1,680	81.0	209	74.4

(1)Percentage distribution of population, 1981; Indians 1.9%; Inuit 0.1%; Other 98.0%.  
(1)Répartition procentuelle de la population en 1981; Indiens 1.9%; Inuit 0.1%; Autres 98.0%.

TABLE 1. Comparison - New Active and Reactivated Cases, Canada and Provinces, 1983

TABLEAU 1. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés, Canada et provinces, 1983

Activity Activité	Canada T.-N.	Nfld. I.-P.-É.	P.E.I. N.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-É.	Qué. Québec	Ont. Ontario	Man. Manitoba	Sask. Saskatchewan	Alta. Alberta	B.C. Colombie-Britannique	Yukon T.N.-O.	N.W.T. T.N.-O.
	number - nombre												
Total	2,356	63	4	35	58	618	662	208	118	189	363	6	32
New active cases - Nouveaux cas actifs	2,075	59	3	25	49	551	589	195	102	171	309	5	17
Reactivated cases - Cas réactivés	281	4	1	10	9	67	73	13	16	18	54	1	15
	rate per 100,000 population - taux pour 100,000 habitants												
Total	9.5	10.9	3.2	4.1	8.2	9.5	7.5	18.9	11.9	8.0	12.8	26.9	66.1
New active cases - Nouveaux cas actifs	8.3	10.2	2.4	2.9	6.9	8.4	6.7	18.6	10.3	7.3	10.8	22.4	35.1
Reactivated cases - Cas réactivés	1.1	0.7	0.8	1.2	1.3	1.0	0.8	1.2	1.6	0.8	1.9	4.5	31.0
	percentage distribution - répartition procentuelle												
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
New active cases - Nouveaux cas actifs	88.1	93.7	75.0	71.4	84.5	89.2	89.0	93.8	86.4	90.5	85.1	83.3	5
Reactivated cases - Cas réactivés	11.9	6.3	25.0	28.6	15.5	10.8	11.0	6.2	13.6	9.5	14.9	16.7	46.9

TABLE 2. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Age Group, 1983

TABLEAU 2. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le groupe d'âge, 1983

Activity Activité	Total	0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75 years and over 75 ans et plus
	number - nombre									
Total	2,356	63	114	244	348	274	315	365	310	317
New active cases - Nouveaux cas actifs	2,075	59	109	237	327	246	269	308	243	267
Reactivated cases - Cas réactivés	281	-	5	7	21	28	46	57	67	50
	percentage distribution - répartition procentuelle									
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
New active cases - Nouveaux cas actifs	88.1	100.0	95.6	97.1	94.0	89.8	85.4	84.4	78.4	84.2
Reactivated cases - Cas réactivés	11.9	-	4.4	2.9	6.0	10.2	14.6	15.6	21.6	15.8

TABLE 3. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Diagnosis, 1983

TABLEAU 3. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic, 1983

Activity Activité	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire						Non-respiratory Non respiratoire	
		Pulmonary Pulmo-naire	Miliary Militaire	Primary Primaire	Pleurisy (tuberculous) Pleurésie (tuber-culeuse)	Tuberculosis laryngitis Laryngite tuberculeuse	Other respiratory Autres respiratoires		
		Pulmonary Pulmo-naire	Miliary Militaire	Primary Primaire	Pleurisy (tuberculous) Pleurésie (tuber-culeuse)	Tuberculosis laryngitis Laryngite tuberculeuse	Other respiratory Autres respiratoires		
number - nombre									
Total	2,356	1,617	51	143	105	-	5	435	
New active cases - Nouveaux cas actifs	2,075	1,388	48	143	100	-	5	391	
Reactivated cases - Cas réactivés	281	229	3	-	5	-	-	44	
percentage distribution - répartition procentuelle									
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	
New active cases - Nouveaux cas actifs	88.1	85.8	94.1	100.0	95.2	-	100.0	89.9	
Reactivated cases - Cas réactivés	11.9	14.2	5.9	-	4.8	-	-	10.1	

TABLE 4. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Origin, 1983

TABLEAU 4. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant l'origine, 1983

Activity Activité	Total	Total			Indians - Indiens			Inuit			Other - Autres		
		T	M	F	T	M	F	T	M	F	T	M	F
		number - nombre											
Total	2,356	1,335	1,021	419	218	201	48	22	26	1,888	1,085	784	
New active cases - Nouveaux cas actifs	2,075	1,164	911	356	182	174	39	17	22	1,680	965	715	
Reactivated cases - Cas réactivés	281	171	110	63	36	27	9	5	4	209	130	78	
percentage distribution - répartition procentuelle													
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
New active cases - Nouveaux cas actifs	88.1	87.2	89.2	85.0	83.5	86.6	81.2	77.3	84.6	88.9	88.1	90.0	
Reactivated cases - Cas réactivés	11.9	12.8	10.8	15.0	16.5	13.4	18.8	22.7	15.4	11.1	11.9	10.0	

TABLE 5. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis and Sex, Canada and Provinces, 1983

ICD-9 No. No. de la CIM-9	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.
				T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.
number - nombre						
1	TOTAL		T.	2,356	83	4
2			M.	1,335	39	4
3			F.	1,021	24	-
4	010-012.8, 018	Tuberculosis of respiratory system - Tuberculose de l'appareil respiratoire	T.	1,921	52	4
5			M.	1,148	33	4
6			F.	773	19	-
7	011.4	Silicotuberculosis - Silicotubercu- lose	T.	-	-	-
8			M.	-	-	-
9			F.	-	-	-
10	011.0-011.3, 011.5-011.9	Pulmonary - Pulmonaire	T.	1,617	39	4
11			M.	997	25	4
12			F.	620	14	-
13	018.0, 018.8-018.9	Miliary - Miliaire	T.	51	2	-
14			M.	29	1	-
15			F.	22	1	-
16	010.012	Other respiratory tuberculosis - Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire	T.	253	11	-
17			M.	122	7	-
18			F.	131	4	-
19	010-010.9	Primary - Primaire	T.	143	11	-
20			M.	64	7	-
21			F.	79	4	-
22	012.0	Pleurisy specified as tuberculous - Pleurésie spécifiée comme tubercu- leuse	T.	105	-	-
23			M.	55	-	-
24			F.	50	-	-
25	012.1	Tuberculosis of intrathoracic lymph nodes - Tuberculose des ganglions lymphatiques endothoraciques	T.	3	-	-
26			M.	1	-	-
27			F.	2	-	-
28	012.2	Isolated tracheal or bronchial tuber- culosis - Tuberculose trachéale ou bronchique isolée	T.	-	-	-
29			M.	-	-	-
30			F.	-	-	-
31	012.3	Tuberculous laryngitis - Laryngite tuberculeuse	T.	-	-	-
32			M.	-	-	-
33			F.	-	-	-
34	012.8	Other - Autres	T.	2	-	-
35			M.	2	-	-
36			F.	-	-	-
37	013-017.8	Non-respiratory - Non respiratoire	T.	435	11	-
38			M.	187	6	-
39			F.	248	5	-
40	013	Meninges and central nervous system - Tuberculose du système nerveux central	T.	18	-	-
41			M.	7	-	-
42			F.	11	-	-
43	013.0	Meningitis - Méningite	T.	16	-	-
44			M.	6	-	-
45			F.	10	-	-

TABLEAU 5. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé et le sexe, Canada et provinces, 1983

N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T.	T.N.-D.	No
<b>number = nombre</b>										
58	618	662	208	118	189	363	6	32	1	
29	370	362	113	54	90	231	4	17	2	
29	248	300	95	64	99	132	2	15	3	
50	549	487	175	97	151	293	5	26	4	
25	336	295	99	50	70	198	4	14	5	
25	213	192	76	47	81	95	1	12	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
44	499	427	118	65	119	242	5	24	10	
23	309	263	73	33	56	173	4	14	11	
21	190	164	45	32	63	69	1	10	12	
-	13	16	4	4	3	6	-	2	13	
-	9	10	1	1	2	5	-	-	14	
-	4	6	3	3	1	1	-	2	15	
5	37	44	53	28	29	45	-	-	16	
2	18	22	25	16	12	20	-	-	17	
4	19	22	28	12	17	25	-	-	18	
3	25	10	34	23	14	23	-	-	19	
1	10	5	14	13	4	10	-	-	20	
2	15	5	20	10	10	13	-	-	21	
3	12	32	18	5	15	20	-	-	22	
1	8	15	11	3	8	9	-	-	23	
2	4	17	7	2	7	11	-	-	24	
-	-	1	1	-	-	1	-	-	25	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	26	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	27	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	34	
-	-	1	-	-	-	1	-	-	35	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	
8	69	175	33	21	38	70	1	6	37	
4	34	67	14	4	20	33	-	3	38	
4	35	108	19	17	18	37	1	3	39	
-	4	7	1	2	1	2	-	1	40	
-	2	3	-	-	1	1	-	-	41	
-	2	4	1	2	-	1	-	1	42	
-	4	6	1	2	1	2	-	-	43	
-	2	2	-	-	1	1	-	-	44	
-	2	4	1	2	-	1	-	-	45	

TABLE 5. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis and Sex, Canada and Provinces, 1983 - Continued

ICD-9 No. No de la CIM-9 No.	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe		Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.		
				T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.		
number - nombre								
	Non-respiratory - Continued - Non respiratoire - suite							
1 2 3	013.1 Tuberculoma of meninges - Tuberculome méninx	T. M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -		
4 5 6	013.8 Other - Autres	T. M. F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -		
7 8 9	013.9 Unspecified - Sans précision	T. M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -		
10 11 12	014 Intestines, peritoneum and mesenteric glands - Intestins, péritoine et ganglions mésentériques	T. M. F.	17 11 6	1 1 -	- - -	- - -		
13 14 15	015 Tuberculosis of bones and joints - Tuberculose des os et des articulations	T. M. F.	54 29 25	1 1 -	- - -	- - -		
16 17 18	015.0 Vertebral column - Colonne vertébrale	T. M. F.	20 12 8	- - -	- - -	- - -		
19 20 21	015.1 Hip - Hanche	T. M. F.	9 3 6	- - -	- - -	- - -		
22 23 24	015.2 Knee - Genou	T. M. F.	4 3 1	- - -	- - -	- - -		
25 26 27	015.7 Other bone - Autres tuberculoses os- seuses	T. M. F.	11 4 7	- - -	- - -	- - -		
28 29 30	015.8 Other joint - Autres tuberculoses articulaires	T. M. F.	8 5 3	1 1 -	- - -	- - -		
31 32 33	015.9 Unspecified - Sans précision	T. M. F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -		
34 35 36	016 Genitourinary system - Appareil génito-urinaire	T. M. F.	118 60 58	6 3 3	- - +	3 2 1		
37 38 39	016.0 Kidney - Rein	T. M. F.	65 36 29	3 2 1	- + -	1 1 -		
40 41 42	016.1 Other urinary organs - Autres organes urinaires	T. M. F.	13 7 6	1 - 1	- + -	- - -		

TABLEAU 5. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé et le sexe, Canada et provinces, 1983 - suite

TABLE 5. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis and Sex, Canada and Provinces, 1983 - Concluded

ICD-9 No. No. de la CIM-9 No.	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe		Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.
number - nombre						
Non-respiratory - Concluded - Non respiratoire - fin						
1 2 3	016.2 Epididymis - Epididyme	T. M. F.	12 12 -	1 1 -	- - -	1 1 -
4 5 6	016.3 Other male genital organs - Autres organes génitaux de l'homme	T. M. F.	3 3 -	- - -	- - -	- - -
7 8 9	016.4 Female genital organs - Organes génitaux de la femme	T. M. F.	20 - 20	1 - 1	- - -	1 - 1
10 11 12	016.9 Unspecified - Sans précision	T. M. F.	5 2 3	- - -	- - +	- - -
13 14 15	017 Other organs - Autres organes	T. M. F.	227 79 148	3 1 2	- - -	- - -
16 17 18	017.0 Skin and subcutaneous cellular tissue - Peau et tissu cellulaire sous-cutané	T. M. F.	15 8 7	1 1 -	- - -	- - +
19 20 21	017.1 Erythema nodosum with hypersensitivity reaction in tuberculosis - Erythème noueux avec réaction d'hypersensibilité à la tuberculose	T. M. F.	4 - 4	- - -	- - -	- - -
22 23 24	017.2 Peripheral lymph nodes - Ganglions lymphatiques périphériques	T. M. F.	189 62 127	2 - 2	- + -	- - -
25 26 27	017.3 Eye - Oeil	T. M. F.	6 2 4	- - -	- - -	- - -
28 29 30	017.4 Ear - Oreille	T. M. F.	1 1 -	- - -	- - +	- - -
31 32 33	017.5 Thyroid gland - Corps thyroïde	T. M. F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -
34 35 36	017.6 Adrenal glands - Glandes surrénales	T. M. F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -
37 38 39	017.7 Spleen - Rate	T. M. F.	- - -	- + +	- - -	- - -
40 41 42	017.8 Other - Autres	T. M. F.	11 5 6	- - -	- - -	- - -

TABLEAU 5. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé et le sexe. Canada et provinces, 1983 - fin

N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	No
<b>number - nombre</b>									
-	1	4	4	-	-	1	-	-	1
-	1	4	4	-	-	1	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	3	-	-	-	-	-	-	4
-	-	3	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	4	8	3	1	-	1	-	1	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	4	8	3	1	-	1	-	1	9
-	1	-	-	1	-	3	-	-	10
-	1	-	-	-	-	1	-	-	11
-	-	-	-	1	-	2	-	-	12
3	30	101	17	13	17	42	-	1	13
2	14	29	4	2	8	15	-	-	14
1	16	72	13	11	9	23	-	1	15
-	1	8	-	1	-	3	-	-	16
-	1	4	-	-	-	1	-	-	17
-	-	4	-	1	-	2	-	-	18
-	-	-	2	2	-	-	-	-	19
-	-	-	-	2	-	-	-	-	20
-	-	-	2	2	-	-	-	-	21
2	23	89	14	9	15	34	-	1	22
1	10	23	4	2	6	16	-	-	23
1	13	66	10	7	9	18	-	1	24
-	4	-	1	-	-	1	-	-	25
-	2	-	-	-	-	-	-	-	26
-	2	-	1	-	-	1	-	-	27
-	1	-	-	-	-	-	-	-	28
-	1	-	-	-	-	-	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
-	-	-	1	-	-	-	-	-	31
-	-	-	1	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	1	-	-	-	-	-	34
-	-	-	1	-	-	-	-	-	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
-	1	3	-	1	2	4	-	-	40
-	-	1	-	-	2	2	-	-	41
1	2	-	-	1	-	2	-	-	42

TABLE 6. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Age Group, 1983

ICD-9 No. No de la CIM-9	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe		All ages Tous âges						
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	
1	TOTAL		T.	2,356	69	60	54	74	170
2			M.	1,335	36	29	18	35	83
3			F.	1,021	33	31	36	39	87
4	010-012.8, 018	Tuberculosis of respiratory system - Tuberculose de l'appareil respiratoire	T.	1,921	59	55	52	66	132
5			M.	1,148	30	26	18	33	68
6			F.	773	29	29	34	33	64
7	011.4	Silicotuberculosis + Silicotubercu- lose	T.	-	-	-	-	-	-
8			M.	-	-	-	-	-	-
9			F.	-	-	-	-	-	-
10	011.0-011.3, 011.5-011.9	Pulmonary - Pulmonaire	T.	1,617	8	8	14	47	114
11			M.	997	4	4	3	24	58
12			F.	620	4	4	11	23	56
13	018.0, 018.8-018.9	Miliary - Miliaire	T.	51	4	1	-	2	3
14			M.	29	3	1	-	1	2
15			F.	22	1	-	-	1	1
16	010.012	Other respiratory tuberculosis - Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire	T.	253	47	46	38	17	15
17			M.	122	23	21	15	8	8
18			F.	131	24	25	23	9	7
19	010-010.9	Primary - Primaire	T.	143	47	46	35	9	3
20			M.	64	23	21	14	3	2
21			F.	79	24	25	21	6	1
22	012.0	Pleurisy specified as tuberculous - Pleurésie spécifiée comme tuberculeuse	T.	105	-	-	3	8	12
23			M.	55	-	-	1	5	6
24			F.	50	-	-	2	3	6
25	012.1	Tuberculosis of intrathoracic lymph nodes - Tuberculose des ganglions lymphatiques endothoraciques	T.	3	-	-	-	-	-
26			M.	1	-	-	-	-	-
27			F.	2	-	-	-	-	-
28	012.2	Isolated tracheal or bronchial tuberculosis - Tuberculose trachéale ou bronchique isolée	T.	-	-	-	-	-	-
29			M.	-	-	-	-	-	-
30			F.	-	-	-	-	-	-
31	012.3	Tuberculous laryngitis - Laryngite tuberculeuse	T.	-	-	-	-	-	-
32			M.	-	-	-	-	-	-
33			F.	-	-	-	-	-	-
34	012.8	Other - Autres	T.	2	-	-	-	-	-
35			M.	2	-	-	-	-	-
36			F.	-	-	-	-	-	-
37	013-017.8	Non-respiratory - Non respiratoire	T.	435	10	5	2	8	38
38			M.	187	6	3	-	2	15
39			F.	248	4	2	2	6	23
40	013	Meninges and central nervous system - Tuberculose du système nerveux central	T.	18	2	-	-	1	1
41			M.	7	2	-	-	-	-
42			F.	11	-	-	-	1	1
43	013.0	Meningitis - Méningite	T.	16	2	-	-	1	1
44			M.	6	2	-	-	-	-
45			F.	10	-	-	-	1	1

TABLEAU 6. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe et le groupe d'âge, 1983

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 years and over
number - nombre										No
185	163	158	116	146	169	187	178	164	146	317
95	88	90	59	98	108	127	110	100	88	171
90	75	68	57	48	61	60	68	64	58	146
151	103	117	89	115	126	149	145	146	131	285
78	63	70	50	84	91	101	98	94	83	161
73	40	47	39	31	35	48	47	52	48	124
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
135	92	101	77	109	117	143	133	135	128	256
71	55	64	47	79	86	96	90	87	82	147
64	37	37	30	30	31	47	43	48	46	109
2	1	3	4	2	3	1	4	5	1	15
2	1	-	2	2	2	1	3	2	-	14
-	3	2	-	-	-	-	1	3	1	8
14	10	13	8	4	6	5	8	6	2	14
5	7	6	1	3	3	4	5	5	1	7
9	3	7	7	1	3	1	3	1	1	7
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	20
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
12	9	12	7	3	6	5	7	6	2	13
5	6	5	-	2	3	4	5	5	1	7
7	3	7	7	1	3	1	2	1	1	6
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	25
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	27
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	34
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
34	60	41	27	31	43	38	33	18	15	32
17	25	20	9	14	17	25	12	6	5	10
17	35	21	18	17	26	12	21	12	10	22
2	2	2	2	1	1	-	2	-	1	1
1	2	1	-	-	-	-	1	-	-	40
1	-	1	2	1	1	-	1	-	1	41
2	2	2	2	1	1	-	-	-	1	42
1	-	1	2	1	1	-	-	-	1	43
2	2	2	1	2	1	-	-	-	1	44
1	-	1	2	1	1	-	-	-	1	45

TABLE 6. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Age Group, 1983 - Continued

ICD-9 No. No. de la CIM-9	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe		All ages Tous âges					
				0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
No.			number - nombre					
Non-respiratory - Continued ~ Non respiratoire - suite								
1 2 3	013.1	Tuberculosis of meninges - Tuberculome méninx	T. M. F.	- - +	- - -	- - -	- - -	- - -
4 5 6	013.8	Other - Autres	T. M. F.	2 1 1	- - +	- - -	- - -	- - -
7 8 9	013.9	Unspecified - Sans précision	T. M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
10 11 12	014	Intestines, peritoneum and mesenteric glands - Intestins, péritoine et ganglions mésentériques	T. M. F.	17 11 6	- - -	- - -	- - -	1 - 1
13 14 15	015	Tuberculosis of bones and joints - Tuberculose des os et des articulations	T. M. F.	54 29 25	1 - 1	- - -	2 1 1	5 4 1
16 17 18	015.0	Vertebral column - Colonne vertébrale	T. M. F.	20 12 8	- - -	- - -	1 - 1	4 3 1
19 20 21	015.1	Hip - Hanche	T. M. F.	9 3 6	- - -	- - -	- - -	- - -
22 23 24	015.2	Knee - Genou	T. M. F.	4 3 1	- - -	- - -	- - -	- - -
25 26 27	015.7	Other bone - Autres tuberculoses os- seuses	T. M. F.	11 4 7	- - -	- - -	1 1 -	- - -
28 29 30	015.8	Other joint - Autres tuberculoses articulaires	T. M. F.	8 5 3	1 - 1	- - -	- - -	- - -
31 32 33	015.9	Unspecified - Sans précision	T. M. F.	2 2 -	- - -	- - -	- - -	1 - -
34 35 36	016	Genitourinary system - Appareil génito-urinaire	T. M. F.	118 60 58	1 1 -	- - -	1 - 1	6 2 4
37 38 39	016.0	Kidney - Rein	T. M. F.	65 36 29	- - -	- - -	- - -	1 - -
40 41 42	016.1	Other urinary organs - Autres organes urinaires	T. M. F.	13 7 6	- - -	- - -	- - -	2 1 1

TABLEAU 6. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe et le groupe d'âge, 1983 - suite

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 years and over
										75 ans et plus
number - nombre										No
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	3 1 2	4 4 -	-	2 1 1	-	2 1 1	-	2 1 1	2 2 -	10 11 12
3 2 1	9 6 3 3	4 3 1 1	1	2 1 1	3 2 1	5 4 1	3 2 1	4 1 3	3 1 2	9 14 15
2 1 1	1 1 -	2 2 -	-	1 1	1 1	3 2 1	1 1	1 1	3 1 2	- 16 17 18
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	2 2	1 1	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	3 3	-	1	-	1	1	-	1	-	3
-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	25
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27
-	1 1	1 1	-	1	-	1	-	2 1 1	-	28 29 30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
7 3 4	9 6 3	10 4 6	6 3 3	11 6 5	22 12 10	16 13 3	12 5 7	6 2 4	3 1 2	8 2 6
3 2 1	5 3 2	8 4 4	5 2 3	4 3 1	16 7 9	9 7 2	5 2 3	4 2 2	2 1 1	3 2 1
-	-	-	-	2	3	1	1	2	-	2
-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	41
-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	42

TABLE 6. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Age Group, 1983 - Concluded

ICD-9 No. No de la CIM-9	Diagnosis and sex Diagnostic et sexe	All ages Tous âges					
			0-4	5-9	10-14	15-19	20-24
No.		number - nombre					
Non-respiratory - Concluded - Non respiratoire - fin							
1	016.2	Epididymis - Epididyme	T. M. F.	12 12 -	- - -	- - -	- - -
2							
3							
4	016.3	Other male genital organs - Autres organes génitaux de l'homme	T. M. F.	3 3 -	- - -	- - -	- - -
5							
6							
7	016.4	Female genital organs - Organes génitaux de la femme	T. M. F.	20 - 20	- - -	- - -	- - 3
8							
9							
10	016.9	Unspecified - Sans précision	T. M. F.	5 2 3	1 1 -	- - -	1 - -
11							
12							
13	017	Other organs - Autres organes	T. M. F.	228 80 148	6 3 3	5 3 2	2 1 2
14							
15							
16	017.0	Skin and subcutaneous cellular tissue - Peau et tissu cellulaire sous-cutané	T. M. F.	15 8 7	- - -	1 - 1	- - 1
17							
18							
19	017.1	Erythema nodosum with hypersensitivity reaction in tuberculosis - Erythème noueux avec réaction d'hypersensi- bilité à la tuberculose	T. M. F.	4 - 4	- - -	1 - 1	- - 2
20							
21							
22	017.2	Peripheral lymph nodes - Ganglions lymphatiques périphériques	T. M. F.	189 62 127	6 3 3	3 2 1	1 1 3
23							
24							
25	017.3	Eye - Oeil	T. M. F.	6 2 4	- - -	- - +	- - 1
26							
27							
28	017.4	Ear - Oreille	T. M. F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -
29							
30							
31	017.5	Thyroid Gland - Corps thyroïde	T. M. F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -
32							
33							
34	017.6	Adrenal Glands - Glandes surrénales	T. M. F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -
35							
36							
37	017.7	Spleen - Rate	T. M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -
38							
39							
40	017.8	Other - Autres	T. M. F.	11 5 6	- - -	1 1 -	- - -
41							
42							

TABLEAU 6. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe et le groupe d'âge, 1983 - fin

25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75 years and over	No
number - nombre											
1	2	-	1	2	2	2	2	-	-	-	1
1	2	-	1	2	2	2	2	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3
-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4
-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
3	1	2	-	2	1	1	4	-	1	2	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
3	1	2	-	2	1	1	4	-	1	2	9
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	10
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	11
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	12
22	37	21	18	15	17	15	16	6	6	13	13
11	10	8	5	6	3	8	4	1	1	6	14
11	27	13	13	9	14	7	12	4	5	7	15
2	1	-	-	2	-	1	3	-	1	3	16
1	1	-	-	2	-	1	2	-	1	2	17
1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	21
20	33	18	15	10	14	12	13	5	4	10	22
10	9	7	4	2	1	7	2	1	1	4	23
10	24	11	11	8	13	5	11	4	3	6	24
-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	25
-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	26
-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	27
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	28
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	31
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	32
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	34
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
-	2	3	2	1	1	1	-	-	-	-	40
-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	41
-	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	42

TABLE 7. New Active and Reactivated Cases and Rate Per 100,000 Population by Age Group and Sex, Canada and Provinces, 1983  
 TABLEAU 7. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100.000 habitants suivant le groupe d'âge et le sexe, Canada et provinces, 1983

Age group Groupe d'âge	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.								
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.						Alb.	C.-B.										
number - nombre																					
Both sexes - Les deux sexes																					
All ages - Tous âges	2,356	63	4	35	58	618	662	208	118	189	363	6	32								
0- 4 years - ans	69	3	-	-	5	23	12	5	7	6	8	-	-								
5-14 "	114	6	-	-	5	16	9	35	16	9	18	-	-								
15-24 "	244	5	-	1	4	46	66	38	19	32	30	1	2								
25-34 "	348	7	1	1	4	82	102	29	20	45	52	1	4								
35-44 "	274	5	-	2	4	65	86	21	7	23	50	3	8								
45-54 "	315	9	1	7	8	84	84	18	13	26	60	1	4								
55-64 "	365	11	1	11	7	111	108	24	11	10	65	-	6								
65-74 "	310	12	-	8	10	92	92	20	11	16	45	-	4								
75 years and over - ans et plus	317	5	1	5	11	99	103	18	14	22	35	-	4								
Male - Masculin																					
All ages - Tous âges	1,335	39	4	22	28	370	362	113	54	90	231	4	17								
0- 4 years - ans	36	1	-	-	3	10	8	1	6	3	4	-	-								
5-14 "	47	4	-	-	3	6	4	14	5	3	8	-	-								
15-24 "	118	2	-	1	3	25	30	18	7	14	16	1	1								
25-34 "	183	3	1	1	1	43	50	18	9	23	31	1	2								
35-44 "	149	2	-	1	2	36	44	11	2	12	34	1	4								
45-54 "	206	8	1	5	6	58	53	11	7	13	40	1	3								
55-64 "	237	7	1	7	4	70	71	17	9	5	43	-	3								
65-74 "	188	9	-	4	5	60	47	13	4	8	34	-	4								
75 years and over - ans et plus	171	3	1	3	2	62	55	10	5	9	21	-	-								
Female - Féminin																					
All ages - Tous âges	1,021	24	-	13	29	248	300	95	64	99	132	2	15								
0- 4 years - ans	33	2	-	-	2	13	4	4	1	3	4	-	-								
5-14 "	67	2	-	-	2	10	5	21	11	6	10	-	-								
15-24 "	126	3	-	-	1	21	36	20	12	18	14	-	1								
25-34 "	165	4	-	-	3	39	52	11	11	22	21	-	2								
35-44 "	125	3	-	1	2	29	42	10	5	11	16	2	4								
45-54 "	109	1	-	2	2	26	31	7	6	13	20	-	1								
55-64 "	128	4	-	4	3	41	37	7	2	5	22	-	3								
65-74 "	122	3	-	4	5	32	45	7	7	8	11	-	-								
75 years and over - ans et plus	146	2	-	2	9	37	48	8	9	13	14	-	4								

TABLE 7. New Active and Reactivated Cases and Rate Per 100,000 Population by Age Group and Sex, Canada and Provinces, 1983 - Concluded

TABLEAU 7. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge et le sexe, Canada et provinces, 1983 - fin

Age group Groupe d'âge	Canada T.-N. Î.-P.-É. N.-É.	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	
		T.-N.	Î.-P.-É.	N.-É.						Alb.	C.-B.			
rate per 100,000 population - taux pour 100,000 habitants														
Both sexes - Les deux sexes														
All ages - Tous âges		9.5	10.9	3.2	4.1	8.2	9.5	7.5	19.9	11.9	8.0	12.9	26.9	66.1
0- 4 years - ans		3.8	6.1	-	-	9.5	4.9	2.0	6.3	8.4	3.0	4.0	-	-
5-14 "	"	3.1	5.3	-	-	4.2	1.8	0.7	21.9	10.1	2.5	4.6	-	-
15-24 "	"	5.4	4.3	-	0.6	3.0	3.8	4.2	20.3	10.5	6.8	6.3	24.4	18.9
25-34 "	"	8.0	7.3	5.3	0.7	3.4	7.0	6.8	16.9	12.6	9.4	10.4	20.4	41.7
35-44 "	"	8.4	7.3	-	1.8	4.6	7.2	7.3	16.9	6.6	7.7	13.1	88.2	140.4
45-54 "	"	12.6	19.2	9.1	8.7	12.7	12.4	8.9	18.3	14.3	12.3	21.1	52.6	117.6
55-64 "	"	16.2	26.6	9.4	14.4	11.6	18.9	12.7	24.1	12.0	6.0	24.3	-	315.8
65-74 "	"	20.1	39.7	-	13.4	22.1	23.9	16.5	26.3	15.1	15.2	22.9	-	444.4
75 years and over - ans et plus		33.1	30.5	15.4	13.4	38.6	45.1	28.8	35.4	28.3	32.1	28.8	-	1,000.0
Male - Masculin														
All ages - Tous âges		10.8	13.4	6.5	5.2	8.3	11.5	8.3	21.9	10.9	7.5	16.5	34.2	66.9
0- 4 years - ans		3.9	4.0	-	-	11.1	4.1	2.6	2.4	13.9	3.0	3.9	-	-
5-14 "	"	2.5	6.8	-	-	5.0	1.3	0.6	17.1	6.2	1.6	4.0	-	-
15-24 "	"	5.1	3.4	-	1.2	4.4	4.1	3.8	19.0	7.7	5.8	6.6	47.6	18.2
25-34 "	"	8.4	6.3	10.5	1.4	1.7	7.4	6.9	21.1	11.2	9.1	12.4	41.7	40.0
35-44 "	"	9.0	5.7	-	1.8	4.5	8.0	7.4	17.7	3.7	7.8	17.5	55.6	129.0
45-54 "	"	16.3	33.2	17.9	12.4	19.2	17.4	11.2	22.5	15.2	11.9	27.4	100.0	157.9
55-64 "	"	21.9	33.3	20.0	19.3	13.9	25.3	17.4	36.0	20.0	6.1	33.6	-	272.7
65-74 "	"	27.0	62.1	-	14.4	23.7	35.7	18.7	37.1	11.6	16.3	37.9	-	1,000.0
75 years and over - ans et plus		47.0	43.5	38.5	20.7	18.0	77.6	42.8	49.8	23.3	31.0	42.5	-	-
Female - Féminin														
All ages - Tous âges		8.1	8.3	-	3.0	8.1	7.5	6.7	17.9	12.9	8.6	9.3	18.9	65.5
0- 4 years - ans		3.7	8.3	-	-	7.9	5.7	1.4	10.3	2.5	3.1	4.1	-	-
5-14 "	"	3.8	3.6	-	-	3.5	2.3	0.8	27.0	14.2	3.4	5.2	-	-
15-24 "	"	5.6	5.2	-	-	1.5	3.5	4.6	21.6	13.5	7.9	5.9	-	19.6
25-34 "	"	7.6	8.2	-	-	5.0	6.6	6.9	12.8	14.1	9.7	8.3	-	43.5
35-44 "	"	7.7	8.9	-	1.9	4.7	6.4	7.1	16.1	9.6	7.7	8.5	133.3	180.0
45-54 "	"	8.7	4.4	-	5.0	6.3	7.6	6.7	14.1	13.3	12.8	14.5	-	66.7
55-64 "	"	10.9	19.6	-	10.0	9.6	13.2	8.3	13.4	4.3	5.9	15.7	-	333.3
65-74 "	"	14.5	19.2	-	12.5	20.8	14.8	14.7	17.0	18.3	14.2	10.3	-	-
75 years and over - ans et plus		24.6	20.8	-	8.7	51.7	26.4	21.0	26.5	32.3	33.0	19.4	-	2,000.0

TABLE 8. New Active and Reactivated Cases and Rate Per 100,000 Population by Age Group, Sex and Diagnosis, 1983

TABLEAU 8. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et le diagnostic, 1983

Age group Groupe d'âge	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire						Non-respiratory Non respiratoire		
		Pulmonary Pulmo- naire	Miliary	Primary	Pleurisy (tuber- culous)	Tuber- culous laryngitis	Other respiratory			
		Miliaire	Primaire	Pleurésie (tuber- culeuse)	Laryngite tuber- culeuse	Autres respiratoires				
number - nombre										
Both sexes - Deux sexes										
All ages - Tous âges	2,356	1,617	51	143	105	-	5	435		
0- 4 years - ans	69	8	4	47	-	-	-	10		
5-14 "	114	22	1	81	3	-	-	7		
15-24 "	244	161	5	12	20	-	-	46		
25-34 "	348	227	3	3	21	-	-	94		
35-44 "	274	178	7	-	19	-	2	68		
45-54 "	315	226	5	-	9	-	1	74		
55-64 "	365	276	5	-	12	-	1	71		
65-74 "	310	263	6	-	8	-	-	33		
75 years and over - ans et plus	317	256	15	-	13	-	1	32		
Male - Masculin										
All ages - Tous âges	1,335	997	29	64	55	-	3	187		
0- 4 years - ans	36	4	3	23	-	-	-	6		
5-14 "	47	7	1	35	1	-	-	3		
15-24 "	118	82	3	5	11	-	-	17		
25-34 "	183	126	3	1	11	-	-	42		
35-44 "	149	111	2	-	5	-	2	29		
45-54 "	206	165	4	-	5	-	1	31		
55-64 "	237	186	4	-	9	-	-	38		
65-74 "	188	169	2	-	6	-	-	11		
75 years and over - ans et plus	171	147	7	-	7	-	-	10		
Female - Féminin										
All ages - Tous âges	1,021	620	22	79	50	-	2	248		
0- 4 years - ans	33	4	1	24	-	-	-	4		
5-14 "	67	15	-	46	2	-	-	4		
15-24 "	126	79	2	7	9	-	-	29		
25-34 "	165	101	-	2	10	-	-	52		
35-44 "	125	67	5	-	14	-	-	39		
45-54 "	109	61	1	-	4	-	-	43		
55-64 "	128	90	1	-	3	-	1	33		
65-74 "	122	94	4	-	2	-	-	22		
75 years and over - ans et plus	146	109	8	-	6	-	1	22		

TABLE 8. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Age Group, Sex and Diagnosis, 1983 - Concluded

TABLEAU 8. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et le diagnostic, 1983 - fin

Age group Groupe d'âge	Total	Tuberculosis of respiratory system Tuberculose de l'appareil respiratoire						Non-respiratory Non respiratoire		
		Pulmonary Pulmo- naire	Miliary	Primary	Pleurisy (tuber- culous)	Tuber- culous laryngitis	Other respiratory			
		Miliaire	Primaire	Pleurésie (tuber- culeuse)	Laryngite tuber- culeuse	Autres respira- toires				
rate per 100,000 population - taux pour 100,000 habitants										
Both sexes - Les deux sexes										
All ages - Tous âges	9.5	6.5	0.2	0.6	0.4	-	--	1.7		
0- 4 years - ans	3.8	0.4	0.2	2.6	-	-	-	0.5		
5-14 "	3.1	0.6	--	2.2	0.1	-	-	0.2		
15-24 "	5.4	3.5	0.1	0.3	0.4	-	-	1.0		
25-34 "	8.0	5.2	0.1	0.1	0.5	-	-	2.2		
35-44 "	8.4	5.4	0.2	-	0.6	-	0.1	2.1		
45-54 "	12.6	9.0	0.2	-	0.4	-	--	3.0		
55-64 "	16.2	12.2	0.2	-	0.5	-	--	3.1		
65-74 "	20.1	17.1	0.4	-	0.5	-	-	2.1		
75 years and over - ans et plus	33.1	26.7	1.6	-	1.4	-	0.1	3.3		
Male - Masculin										
All ages - Tous âges	10.8	8.1	0.2	0.5	0.4	-	--	1.5		
0- 4 years - ans	3.9	0.4	0.3	2.5	-	-	-	0.6		
5-14 "	2.5	0.4	--	1.9	--	-	-	0.2		
15-24 "	5.1	3.6	0.1	0.2	0.5	-	-	0.7		
25-34 "	8.4	5.8	0.1	--	0.5	-	-	1.9		
35-44 "	9.0	6.7	0.1	-	0.3	-	0.1	1.8		
45-54 "	16.3	13.1	0.3	-	0.4	-	--	2.5		
55-64 "	21.9	17.2	0.4	-	0.8	-	-	3.5		
65-74 "	27.0	24.3	0.3	-	0.9	-	-	1.6		
75 years and over - ans et plus	47.0	40.4	1.9	-	1.9	-	-	2.7		
Female - Féminin										
All ages - Tous âges	8.1	4.9	0.2	0.6	0.4	-	--	2.0		
0- 4 years - ans	3.7	0.5	0.1	2.7	-	-	-	0.5		
5-14 "	3.8	0.8	-	2.6	0.1	-	-	0.2		
15-24 "	5.6	3.5	--	0.3	0.4	-	-	1.3		
25-34 "	7.6	4.6	-	--	0.5	-	-	2.4		
35-44 "	7.7	4.1	0.3	-	0.9	-	-	2.4		
45-54 "	8.7	4.9	--	-	0.3	-	-	3.4		
55-64 "	10.9	7.6	--	-	0.3	-	--	2.8		
65-74 "	14.5	11.2	0.5	-	0.2	-	-	2.6		
75 years and over - ans et plus	24.6	18.4	1.3	-	1.0	-	0.2	3.7		

TABLE 9. New Active and Reactivated Cases and Rate Per 100,000 Population by Diagnosis and Sex, Canada and Provinces, 1983  
 TABLEAU 9. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le diagnostic et le sexe, Canada et provinces, 1983

Diagnosis Diagnostic	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. Qué.	Ont. Man.	Man. Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
number - nombre											
Both sexes - Les deux sexes											
Total	2,356	63	4	35	58	618	662	208	118	189	363
Respiratory - Respiratoire	1,921	52	4	32	50	549	487	175	97	151	293
Pulmonary - Pulmonaire	1,617	39	4	31	44	499	427	118	65	119	242
Miliary - Miliaire	51	2	-	1	-	13	16	4	4	3	5
Primary - Primaire	143	11	-	-	3	25	10	34	23	14	23
Pleurisy (tuberculous) - Pleuré-sie (tuberculeuse)	105	-	-	-	3	12	32	18	5	15	20
Tuberculosis laryngitis - Laryngite tuberculeuse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	5	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-
Non-respiratory - Non respiratoire	435	11	-	3	8	69	175	33	21	38	70
Male - Masculin											
Total	1,335	39	4	22	29	370	362	113	54	90	231
Respiratory - Respiratoire	1,148	33	4	20	25	336	295	99	50	70	198
Pulmonary - Pulmonaire	997	25	4	20	23	309	263	73	33	56	173
Miliary - Miliaire	29	1	-	-	-	9	10	1	1	2	5
Primary - Primaire	64	7	-	-	1	10	5	14	13	4	10
Pleurisy (tuberculous) - Pleuré-sie (tuberculeuse)	55	-	-	-	1	8	15	11	3	8	9
Tuberculosis laryngitis - Laryngite tuberculeuse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	3	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
Non-respiratory - Non respiratoire	187	6	-	2	4	34	67	14	4	20	33
Female - Féminin											
Total	1,021	24	-	13	29	248	300	95	64	99	132
Respiratory - Respiratoire	773	19	-	12	25	213	192	76	47	81	95
Pulmonary - Pulmonaire	620	14	-	11	21	190	164	45	32	63	69
Miliary - Miliaire	22	1	-	1	-	4	6	3	3	1	1
Primary - Primaire	79	4	-	-	2	15	5	20	10	10	13
Pleurisy (tuberculous) - Pleuré-sie (tuberculeuse)	50	-	-	-	2	4	17	7	2	7	11
Tuberculosis laryngitis - Laryngite tuberculeuse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Non-respiratory - Non respiratoire	248	5	-	1	4	35	108	19	17	18	37

TABLE 9. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Diagnosis and Sex, Canada and Provinces, 1983 - Concluded

TABLEAU 9. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le diagnostic et le sexe, Canada et provinces, 1983 - fin

Diagnosis Diagnostic	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B. T.-N.	Qué. Î.-P.-É.	Ont. N.-É.	Man. Sask.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.							
	Canada T.-N.	I.-P.-É. N.-É.	Alb.						C.-B.										
rate per 100,000 population - taux pour 100,000 habitants																			
Both sexes - Les deux sexes																			
Total	9.5	10.9	3.2	4.1	8.2	9.5	7.5	19.9	11.9	8.0	12.9	26.9	66.1						
Respiratory - Respiratoire	7.7	9.0	3.2	3.7	7.1	8.4	5.5	16.7	9.8	6.4	10.4	22.4	53.7						
Pulmonary - Pulmonaire	6.5	6.7	3.2	3.6	6.2	7.7	4.8	11.3	6.5	5.1	8.6	22.4	49.6						
Miliary - Militaire	0.2	0.3	-	0.1	-	0.2	0.2	0.4	0.4	0.1	0.2	-	4.1						
Primary - Primaire	0.6	1.9	-	-	0.4	0.4	0.1	3.2	2.3	0.6	0.8	-	-						
Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse)	0.4	-	-	-	0.4	0.2	0.4	1.7	0.5	0.6	0.7	-	-						
Tuberculosis laryngitis - Laryngite tuberculeuse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Other - Autres	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Non-respiratory - Non respiratoire	1.7	1.9	-	0.3	1.1	1.1	2.0	3.2	2.1	1.6	2.5	4.5	12.4						
Male - Masculin																			
Total	10.8	13.4	6.5	5.2	8.3	11.5	8.3	21.9	10.9	7.5	16.5	34.2	66.9						
Respiratory - Respiratoire	9.3	11.4	6.5	4.7	7.1	10.5	6.8	19.2	10.1	5.8	14.1	34.2	55.1						
Pulmonary - Pulmonaire	8.1	8.6	6.5	4.7	6.6	9.6	6.1	14.1	6.6	4.7	12.3	34.2	55.1						
Miliary - Militaire	0.2	0.3	-	-	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	-	-						
Primary - Primaire	0.5	2.4	-	-	0.3	0.3	0.1	2.7	2.6	0.3	0.7	-	-						
Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse)	0.4	-	-	-	0.3	0.2	0.3	2.1	0.6	0.7	0.6	-	-						
Tuberculosis laryngitis - Laryngite tuberculeuse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Other - Autres	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	--	-	-						
Non-respiratory - Non respiratoire	1.5	2.1	-	0.5	1.1	1.1	1.5	2.7	0.8	1.7	2.4	-	11.8						
Female - Féminin																			
Total	8.1	8.3	-	3.0	8.1	7.5	6.7	17.9	12.9	8.6	9.3	18.9	65.5						
Respiratory - Respiratoire	6.2	6.6	-	2.8	7.0	6.4	4.3	14.3	9.5	7.0	6.7	9.4	52.4						
Pulmonary - Pulmonaire	4.9	4.9	-	2.5	5.9	5.7	3.7	8.5	6.5	5.5	4.9	9.4	43.7						
Miliary - Militaire	0.2	0.3	-	0.2	-	0.1	0.1	0.6	0.6	--	--	-	8.7						
Primary - Primaire	0.6	1.4	-	-	0.6	0.5	0.1	3.8	2.0	0.9	0.9	-	-						
Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse)	0.4	-	-	-	0.6	0.1	0.4	1.3	0.4	0.6	0.8	-	-						
Tuberculosis laryngitis - Laryngite tuberculeuse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Other - Autres	--	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	--	-	-						
Non-respiratory - Non respiratoire	2.0	1.7	-	0.2	1.1	1.1	2.4	3.6	3.4	1.6	2.6	9.4	13.1						

TABLE 10. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Sex, Canada and Provinces, 1983

TABLEAU 10. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine et le sexe, Canada et provinces, 1983

Origin Origine	Canada T.-N.	Nfld. P.E.I. N.S. T.-N. I.-P.-É. N.-É			N.B. Qué. Ont. Man. Sask. - - - - -	Alta. B.C. Alb. C.-B.	Yukon T.N.-O.	N.W.T. - - - -
		Both sexes - Deux sexes						
<b>Total</b>								
Indians - Indiens	2,356	63	4	35	58	518	662	208
Inuit	419	6	-	1	2	36	25	105
Other - Autres	1,889	54	4	34	56	552	637	103
Percentage of total number of cases - Pourcentage du nombre total de cas:								
Indians - Indiens	17.8	9.5	-	2.9	3.4	5.8	3.8	50.5
Inuit	2.0	4.8	-	-	-	4.9	-	66.9
Percentage of total population(1) - Pourcentage de la population totale(1):								
Indians - Indiens	1.9	0.4	0.5	0.9	0.8	0.7	1.2	6.3
Inuit	0.1	0.3	-	-	-	-	-	5.9
Total	1,335	39	4	22	29	370	362	113
Indians - Indiens	218	2	-	-	1	17	15	52
Inuit	22	2	-	-	-	11	-	36
Other - Autres	1,095	35	4	22	28	342	347	61
Percentage of total number of cases - Pourcentage du nombre total de cas:								
Indians - Indiens	16.3	5.1	-	-	3.4	4.6	4.1	46.0
Inuit	1.6	5.1	-	-	-	3.0	-	66.7
Percentage of total population(1) - Pourcentage de la population totale(1):								
Indians - Indiens	1.9	0.5	0.5	0.8	0.8	0.7	1.2	6.3
Inuit	0.1	0.3	-	-	-	0.1	-	5.8
Total	1,021	24	-	13	29	248	300	95
Indians - Indiens	201	4	-	1	1	19	10	53
Inuit	26	1	-	-	-	19	-	43
Other - Autres	794	19	-	12	28	210	290	42
Percentage of total number of cases - Pourcentage du nombre total de cas:								
Indians - Indiens	19.7	16.7	-	7.7	3.4	7.7	3.3	55.8
Inuit	2.5	4.2	-	-	-	7.7	-	67.2
Percentage of total population(1) - Pourcentage de la population totale(1):								
Indians - Indiens	1.9	0.4	0.5	0.9	0.8	0.7	1.2	6.3
Inuit	0.1	0.3	-	-	-	-	-	5.1

(1) Indian and Inuit populations as percentage of the total population taken from 1981 Census.

(1) Populations des Indiens et des Inuit exprimées, comme pourcentage de la population totale, d'après le recensement de 1981.

TABLE 11. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Age Group, 1983

TABLEAU 11. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine et le groupe d'âge, 1983

Origin Origine	All âges Tous âges								75 years and over 75 ans et plus	
		0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
Total	2,356	69	114	244	348	274	315	365	310	317
Indians - Indiens	419	24	67	75	71	50	54	31	26	21
Inuit	48	8	6	6	3	5	10	7	2	1
Other - Autres	1,889	37	41	163	274	219	251	327	282	295
<b>Percentage distribution of cases - Répartition procentuelle des cas:</b>										
Indians - Indiens	100.0	5.8	16.0	17.9	16.9	11.9	12.9	7.4	6.2	5.0
Inuit	100.0	16.7	12.5	12.5	6.2	10.4	20.8	14.6	4.2	2.1
Other - Autres	100.0	2.0	2.2	8.6	14.5	11.6	13.3	17.3	14.9	15.6
<b>Percentage distribution of population (1) - Répartition procentuelle de la population (1):</b>										
Indians - Indiens	100.0	12.7	26.1	22.7	15.7	9.4	6.1	3.8	2.3	1.2
Inuit	100.0	14.6	28.3	22.5	13.6	8.6	6.3	3.5	1.9	0.7
Other - Autres	100.0	7.2	14.3	18.1	17.5	13.3	10.2	9.2	6.3	3.9

(1) Percentage distribution of Indian and Inuit populations by age group based on 1981 Census.

(1) Répartition procentuelle des populations d'Indiens et d'Inuit, suivant le groupe d'âge, d'après le recensement de 1981.

TABLE 12. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Diagnosis and Origin, 1983

TABLEAU 12. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant le diagnostic et l'origine, 1983

Diagnosis Diagnostic	Total	Indians Indiens		Other Autres
		number - nombre	percentage distribution - répartition procentuelle	
Total	2,356	418	100.0	1,889
Respiratory - Respiratoire	1,921	363	81.5	1,514
Pulmonary - Pulmonaire	1,617	245	68.6	1,336
Miliary - Militaire	51	11	2.2	39
Primary - Primaire	143	78	6.1	58
Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse)	105	29	-	76
Tuberculous laryngitis - Laryngite tuberculeuse	-	-	-	-
Other - Autres	5	-	-	5
Non-respiratory - Non respiratoire	435	56	13.4	375
<b>percentage distribution - répartition procentuelle</b>				
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Respiratory - Respiratoire	81.5	86.6	81.7	80.1
Pulmonary - Pulmonaire	68.6	58.5	75.0	70.7
Miliary - Militaire	2.2	2.6	2.1	2.0
Primary - Primaire	6.1	18.6	14.6	3.1
Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse)	4.4	6.9	-	4.0
Tuberculous laryngitis - Laryngite tuberculeuse	-	-	-	-
Other - Autres	0.2	-	-	0.3
Non-respiratory - Non respiratoire	13.4	8.3	-	19.8

TABLE 13. New Active and Reactivated Cases, Bacillary Status, Canada and Provinces, 1983

TABLEAU 13. Nouveaux cas actifs et réactivés, état bacillaire, Canada et provinces, 1983

Bacillary status Etat bacillaire	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué. Québec	Ont. Ontario	Man. Manitoba	Sask. Saskatchewan	Alta. Alberta	B.C. Colombie-Britannique	Yukon	N.W.T. Territoires du Nord-Ouest
<b>Number of cases notified - Nombre de cas déclarés</b>													
Microscopy positive; culture positive - Microscopie positive; culture positive	2,356	63	4	35	58	618	662	208	118	189	363	6	32
Microscopy positive; culture negative - Microscopie positive; culture négative	1,145	28	4	20	36	365	346	53	45	88	145	2	13
Microscopy positive; culture not done - Microscopie positive; culture non réalisée	64	5	-	3	1	5	22	6	2	5	12	-	3
Microscopy negative; culture positive - Microscopie négative; culture positive	38	2	-	-	1	7	10	7	4	3	1	-	3
Microscopy negative; culture negative - Microscopie négative; culture négative	448	13	-	4	6	43	152	67	14	51	92	1	5
Microscopy negative; culture not done - Microscopie négative; culture non réalisée	380	11	-	5	13	152	49	33	19	31	57	3	7
Microscopy not done; culture positive - Microscopie non réalisée; culture positive	38	1	-	-	-	2	26	2	5	2	-	-	-
Microscopy not done; culture negative - Microscopie non réalisée; culture négative	56	-	-	-	1	1	6	20	5	-	23	-	-
Microscopy not done; culture not done - Microscopie non réalisée; culture non réalisée	24	-	-	-	-	-	1	15	2	-	6	-	-
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés	163	3	-	3	-	43	50	5	22	9	27	-	1
<b>percentage distribution - répartition procentuelle</b>													
Microscopy positive; culture positive - Microscopie positive; culture positive	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Microscopy positive; culture negative - Microscopie positive; culture négative	48.6	44.4	100.0	57.1	62.1	59.1	52.3	25.5	38.1	46.6	39.9	33.3	40.6
Microscopy positive; culture not done - Microscopie positive; culture non réalisée	2.7	7.9	-	8.6	1.7	0.8	3.3	2.9	1.7	2.6	3.3	-	9.4
Microscopy negative; culture positive - Microscopie négative; culture positive	1.6	3.2	-	-	1.7	1.1	1.5	3.4	3.4	1.6	0.3	-	9.4
Microscopy negative; culture negative - Microscopie négative; culture négative	19.0	20.6	-	11.4	10.4	6.9	23.0	32.2	11.9	27.0	25.3	16.7	15.6
Microscopy negative; culture not done - Microscopie négative; culture non réalisée	16.1	17.5	-	14.3	22.4	24.6	7.4	15.9	16.1	16.4	15.7	50.0	21.9
Microscopy not done; culture positive - Microscopie non réalisée; culture positive	1.6	1.6	-	-	-	0.3	3.9	0.9	4.2	1.0	-	-	-
Microscopy not done; culture negative - Microscopie non réalisée; culture négative	2.4	-	-	-	1.7	0.2	0.9	9.6	4.2	-	6.3	-	-
Microscopy not done; culture not done - Microscopie non réalisée; culture non réalisée	1.0	-	-	-	-	-	0.1	7.2	1.7	-	1.7	-	-
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés	7.0	4.8	-	8.6	-	7.0	7.6	2.4	18.7	4.8	7.4	-	3.1

TABLE 14. New Active and Reactivated Cases, Bacillary Status, by Diagnosis and by Origin, 1983

TABLEAU 14. Nouveaux cas actifs et réactivés, état bacillaire, par le diagnostic et par l'origine, 1983

Bacillary status Etat bacillaire	Diagnosis - Diagnostic							Origin - Origine			
	Total	Respiratory - Respiratoire						Non-respiratory Non respiratoire	Indians Indiens	Inuit Inuit	Other Autres
		Pulmonary Pulmo- naire	Miliary Militaire	Primary Primaire	Pleurisy (tuber- culous) Pleurésie (tuber- culeuse)	Tuber- culous laryn- gitis Laryngite tuber- culeuse	Other respiratory Autres respiratoires				
number - nombre											
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés	2,356	1,617	51	143	105	-	5	435	419	48	1,889
Microscopy positive; culture positive - Microscopie positive; culture positive	1,145	909	31	11	17	-	3	174	167	16	962
Microscopy positive; culture negative - Microscopie positive; culture négative	64	41	1	-	3	-	-	19	5	3	56
Microscopy positive; culture not done - Microscopie positive; culture non réalisée	38	23	2	-	-	-	-	13	7	1	30
Microscopy negative; culture positive - Microscopie négative; culture positive	448	294	6	22	32	-	2	92	104	2	342
Microscopy negative; culture negative - Microscopie négative; culture négative	380	229	8	52	38	-	-	53	62	9	309
Microscopy negative; culture not done - Microscopie négative; culture non réalisée	38	25	-	2	3	-	-	8	6	-	32
Microscopy not done; culture positive - Microscopie non réalisée; culture positive	56	18	1	9	-	-	-	28	24	-	32
Microscopy not done; culture negative - Microscopie non réalisée; culture négative	24	-	-	12	2	-	-	10	11	-	13
Microscopy not done; culture not done - Microscopie non réalisée; culture non réalisée	163	78	2	35	10	-	-	38	33	17	113
percentage distribution - répartition procentuelle											
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Microscopy positive; culture positive - Microscopie positive; culture positive	48.6	56.2	60.8	7.7	16.2	-	60.0	40.0	39.9	33.3	50.9
Microscopy positive; culture negative - Microscopie positive; culture négative	2.7	2.5	1.9	-	2.9	-	-	4.4	1.2	6.2	3.0
Microscopy positive; culture not done - Microscopie positive; culture non réalisée	1.6	1.4	3.9	-	-	-	-	3.0	1.7	2.1	1.6
Microscopy negative; culture positive - Microscopie négative; culture positive	19.0	18.2	11.8	15.4	30.5	-	40.0	21.1	24.8	4.2	18.1
Microscopy negative; culture negative - Microscopie négative; culture négative	15.1	14.2	15.7	36.3	36.2	-	-	12.2	14.8	18.8	16.3
Microscopy negative; culture not done - Microscopie négative; culture non réalisée	1.6	1.6	-	1.4	2.8	-	-	1.8	1.4	-	1.7
Microscopy not done; culture positive - Microscopie non réalisée; culture positive	2.4	1.1	2.0	6.3	-	-	-	6.4	5.7	-	1.7
Microscopy not done; culture negative - Microscopie non réalisée; culture négative	1.0	-	-	8.4	1.9	-	-	2.3	2.6	-	0.7
Microscopy not done; culture not done - Microscopie non réalisée; culture non réalisée	7.0	4.8	3.9	24.5	9.5	-	-	8.8	7.9	35.4	6.0

TABLE 15. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Method of Determination of Bacillary Status, Canada and Provinces  
1983

Origin and method No.	Canada number - nombre	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-E.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.
1 Number of cases reported	2,356	63	4	35	58	618
Determination:						
2 By microscopy and culture	2,037	57	4	32	56	565
3 By microscopy only	76	3	-	-	1	9
4 By culture only	80	-	-	-	1	1
5 No determination reported	163	3	-	3	-	43
6 Indians	419	6	-	1	2	36
Determination:						
7 By microscopy and culture	338	6	-	1	2	31
8 By microscopy only	13	-	-	-	1	1
9 By culture only	35	-	-	-	-	-
10 No determination reported	33	-	-	-	-	4
11 Inuit	48	3	-	-	-	30
Determination:						
12 By microscopy and culture	30	3	-	-	-	14
13 By microscopy only	1	-	-	-	-	-
14 By culture only	-	-	-	-	-	-
15 No determination reported	17	-	-	-	-	16
16 Other	1,888	54	4	34	56	552
Determination:						
17 By microscopy and culture	1,669	48	4	31	54	52
18 By microscopy only	52	3	-	-	1	8
19 By culture only	45	-	-	-	1	1
20 No determination reported	113	3	-	3	-	23
	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	N.W.T.
				Alb.	C.-B.	T.N.-O.
21 Number of cases reported	662	208	116	189	363	6
Determination:						
22 By microscopy and culture	569	159	80	175	306	6
23 By microscopy only	36	9	9	5	1	3
24 By culture only	7	35	7	-	28	-
25 No determination reported	50	5	22	9	27	1
26 Indians	25	105	79	73	74	4
Determination:						
27 By microscopy and culture	22	77	52	68	63	4
28 By microscopy only	1	3	4	2	-	2
29 By culture only	1	24	5	-	5	-
30 No determination reported	1	1	18	3	6	-
31 Inuit	-	-	-	-	-	15
Determination:						
32 By microscopy and culture	-	-	-	-	-	13
33 By microscopy only	-	-	-	-	-	1
34 By culture only	-	-	-	-	-	-
35 No determination reported	-	-	-	-	-	1
36 Other	637	103	39	116	288	2
Determination:						
37 By microscopy and culture	547	82	28	107	243	2
38 By microscopy only	35	6	5	3	1	-
39 By culture only	6	11	2	-	24	-
40 No determination reported	49	4	4	6	21	-

TABLEAU 15. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine et la méthode de détermination d'état bactillaire, Canada et provinces, 1983

Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Origine et méthode	No
	T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.				
<b>percentage distribution - répartition procentuelle</b>							
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	<b>Nombre de cas rapportés</b>	1
86.5 3.2 3.4 6.9	90.4 4.8 - 4.8	100.0 - - -	91.4 - - 8.6	96.6 1.7 1.7 -	91.4 1.5 0.2 6.9	Détermination: Par la microscopie et la culture Par la microscopie seulement Par la culture seulement Pas de détermination rapportée	2 3 4 5
100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0	<b>Indiens</b>	6
80.7 3.1 8.3 7.9	100.0 - - -	-	100.0 - - -	100.0 - - -	86.1 2.8 - 11.1	Détermination: Par la microscopie et la culture Par la microscopie seulement Par la culture seulement Pas de détermination rapportée	7 8 9 10
100.0	100.0	-	-	-	100.0	<b>Inuit</b>	11
62.5 2.1 - 35.4	100.0 - - -	-	-	-	46.7 - - 53.3	Détermination: Par la microscopie et la culture Par la microscopie seulement Par la culture seulement Pas de détermination rapportée	12 13 14 15
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	<b>Autres</b>	16
8.3 3.3 2.4 6.0	88.9 5.5 - 5.6	100.0 - - -	91.2 - - 8.8	96.4 1.8 1.8 -	94.2 1.4 0.2 4.2	Détermination: Par la microscopie et la culture Par la microscopie seulement Par la culture seulement Pas de détermination rapportée	17 18 19 20
 <b>Ont.</b> <b>Mnb.</b> <b>Sask.</b> <b>Altb.</b> <b>B.C.</b> <b>Yukon</b> <b>N.W.T.</b>							
 <b>Altb.</b> <b>C.-B.</b> <b>T.N.-D.</b>							
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	<b>Nombre de cas rapportés</b>	21
86.0 5.4 1.1 7.5	76.5 4.3 16.8 2.4	67.8 7.6 5.9 18.7	92.6 2.6 - 4.8	84.3 0.3 8.0 7.4	100.0 - - -	Détermination: Par la microscopie et la culture Par la microscopie seulement Par la culture seulement Pas de détermination rapportée	22 23 24 25
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	<b>Indiens</b>	26
88.0 4.0 4.0 4.0	73.3 2.8 22.8 1.0	65.8 5.1 8.3 22.8	93.2 2.7 - 4.1	85.1 0.3 6.8 8.1	100.0 - - -	Détermination: Par la microscopie et la culture Par la microscopie seulement Par la culture seulement Pas de détermination rapportée	27 28 29 30
-	-	-	-	-	100.0	<b>Inuit</b>	31
-	-	-	-	-	86.7 6.6 - 6.7	Détermination: Par la microscopie et la culture Par la microscopie seulement Par la culture seulement Pas de détermination rapportée	32 33 34 35
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	<b>Autres</b>	36
85.9 5.5 0.9 7.7	79.6 5.8 10.7 3.9	71.8 12.8 5.1 10.3	92.2 2.6 - 5.2	84.1 0.3 8.3 7.3	100.0 - - -	Détermination: Par la microscopie et la culture Par la microscopie seulement Par la culture seulement Pas de détermination rapportée	37 38 39 40

TABLE 15. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Diagnosis and Method of Determination of Bacillary Status, Canada and Provinces, 1953

Diagnosis and method No.	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
	number - nombre												
1 Number of cases notified Determination:	2,356	53	4	35	58	618	662	208	118	188	363	6	32
2 By microscopy and culture	2,037	57	4	32	56	565	569	159	80	175	306	6	28
3 By microscopy only	76	3	-	-	1	9	36	9	9	5	31	-	3
4 By culture only	80	-	-	-	1	1	7	35	7	-	29	-	-
5 No determination reported	163	3	-	3	-	43	50	5	22	9	27	-	1
6 Respiratory Determination:	1,821	52	4	32	50	549	487	175	97	151	283	5	26
7 By microscopy and culture	1,699	47	4	30	49	500	428	141	67	139	266	5	23
8 By microscopy only	55	2	-	-	1	8	25	4	7	4	1	-	3
9 By culture only	42	-	-	-	-	1	3	25	3	10	-	-	-
10 No determination reported	125	3	-	2	-	40	31	5	20	8	16	-	-
11 Pulmonary Determination:	1,617	38	4	31	44	499	427	118	65	119	242	5	24
12 By microscopy and culture	1,473	36	4	29	43	458	378	105	54	110	229	5	22
13 By microscopy only	48	2	-	-	1	5	24	3	6	4	1	-	2
14 By culture only	18	-	-	-	-	1	3	8	-	6	-	-	-
15 No determination reported	78	1	-	2	-	35	22	2	5	5	6	-	-
16 Miliary Determination:	51	2	-	1	-	13	16	4	4	3	6	-	2
17 By microscopy and culture	46	2	-	-	1	-	12	16	3	3	5	-	1
18 By microscopy only	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
19 By culture only	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
20 No determination reported	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
21 Primary Determination:	143	11	-	-	3	25	10	34	23	14	23	-	-
22 By microscopy and culture	85	9	-	-	3	19	6	16	6	12	14	-	-
23 By microscopy only	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
24 By culture only	21	-	-	-	-	-	-	16	2	3	-	-	-
25 No determination reported	35	2	-	-	-	5	4	2	14	2	6	-	-
26 Pleurisy (tuberculous) Determination:	105	-	-	-	3	12	32	18	5	15	20	-	-
27 By microscopy and culture	90	-	-	-	3	11	26	16	4	14	16	-	-
28 By microscopy only	3	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
29 By culture only	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
30 No determination reported	10	-	-	-	-	-	5	-	1	1	3	-	-
31 Tuberculous laryngitis Determination:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 By microscopy and culture	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 By microscopy only	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34 By culture only	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 No determination reported	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36 Other respiratory Determination:	5	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-
37 By microscopy and culture	5	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-
38 By microscopy only	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39 By culture only	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 No determination reported	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Non-respiratory Determination:	435	11	-	3	8	68	175	33	21	38	70	1	6
42 By microscopy and culture	338	10	-	2	7	65	141	18	13	36	40	1	5
43 By microscopy only	21	1	-	-	-	1	11	5	2	1	-	-	-
44 By culture only	38	-	-	-	1	1	4	10	4	-	19	-	-
45 No determination reported	38	-	-	1	-	3	19	-	2	1	11	-	1



TABLE 17. New Active and Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary and Diagnosis, Canada and Provinces, 1983

TABLEAU 17. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le nombre de bacilles positifs et le diagnostic, Canada et provinces, 1983

Diagnosis Diagnostic	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Aib.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés	2,356	63	4	35	58	618	662	208	118	189	363	6	32
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rap- portés	1,751	48	4	27	45	421	536	153	70	147	273	3	24
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacil- laires par pourcentage de cas déclarés	74.3	76.2	100.0	77.1	77.6	68.1	81.0	73.5	59.3	77.8	75.2	50.0	75.0
rate per 100,000 population - taux pour 100,000 habitants													
Cases notified - Cas déclarés	9.5	10.9	3.2	4.1	8.2	9.5	7.5	19.9	11.9	8.0	12.9	26.9	66.1
Bacillary cases - Cas bacil- laires	7.0	8.3	3.2	3.1	6.4	6.5	6.1	14.6	7.1	6.3	9.7	13.5	49.6
Respiratory, number of cases notified - Respiratoire, nombre de cas déclarés	1,821	52	4	32	50	549	487	175	97	151	293	5	26
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rap- portés	1,425	37	4	25	38	361	400	134	58	117	228	3	20
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacil- laires par pourcentage de cas déclarés	74.2	71.2	100.0	78.1	76.0	65.8	82.1	76.6	59.8	77.5	77.8	60.0	76.9
Pulmonary, number of cases notified - Pulmonaire, nom- bre de cas déclarés	1,617	38	4	31	44	489	427	118	65	119	242	5	24
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rap- portés	1,285	32	4	24	36	344	360	108	50	100	206	3	18
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacil- laires par pourcentage de cas déclarés	79.5	82.1	100.0	77.4	81.8	68.9	84.3	91.5	76.9	84.0	85.1	60.0	75.0
Miliary, number of cases notified - Militaire, nom- bre de cas déclarés	51	2	-	1	-	13	16	4	4	3	6	-	2
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rap- portés	41	2	-	1	-	10	14	2	4	3	3	-	2
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacil- laires par pourcentage de cas déclarés	80.4	100.0	-	100.0	-	76.9	87.5	50.0	100.0	100.0	50.0	-	100.0
Primary, number of cases notified - Primaire, nom- bre de cas déclarés	143	11	-	-	3	25	10	34	23	14	23	-	-
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rap- portés	42	3	-	-	-	1	5	15	3	7	8	-	-
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacil- laires par pourcentage de cas déclarés	29.4	27.3	-	-	-	4.0	50.0	44.1	13.0	50.0	34.8	-	-
Pleurisy (tuberculous), num- ber of cases notified - Pleurésie (tuberculeuse), nombre de cas déclarés	105	-	-	-	3	12	32	18	5	15	20	-	-
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rap- portés	52	-	-	-	2	6	19	8	1	7	9	-	-
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacil- laires par pourcentage de cas déclarés	49.5	-	-	-	66.7	50.0	59.4	44.4	20.0	46.7	45.0	-	-

TABLE 17. New Active and Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary and Diagnosis, Canada and Provinces, 1983 - Concluded

TABLEAU 17. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le nombre de bacilles positifs et le diagnostic, Canada et provinces, 1983 - fin

Diagnosis Diagnostic	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.B.	Qué. Qué.	Ont. Ont.	Man. Man.	Sask. Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Tuberculous laryngitis, number of cases notified - Laryngite tuberculeuse, nombre de cas déclarés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rapportés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaire par pourcentage de cas déclarés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other respiratory, number of cases notified - Autres respiratoires, nombre de cas déclarés	5	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rapportés	5	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaire par pourcentage de cas déclarés	100.0	-	-	-	-	-	100.0	100.0	-	-	100.0	-	-
Non-respiratory, number of cases notified - Non respiratoire, nombre de cas déclarés	435	11	-	3	8	69	175	33	21	38	70	1	6
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rapportés	326	11	-	2	7	60	136	19	12	30	45	-	4
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaire par pourcentage de cas déclarés	74.9	100.0	-	65.7	87.5	86.9	77.7	57.6	57.1	78.9	64.3	-	66.7

TABLE 18. New Active and Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary and Origin, Canada and Provinces, 1983

TABLEAU 18. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le nombre de bacilles positifs et l'origine, Canada et provinces, 1983

Origin Origine	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.B.	Qué. Qué.	Ont. Ont.	Man. Man.	Sask. Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés	2,356	63	4	35	58	618	662	208	118	188	363	6	32
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rapportés	1,751	48	4	27	45	421	535	153	70	147	273	3	24
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaire par pourcentage de cas déclarés	74.3	76.2	100.0	77.1	77.6	68.1	81.0	73.5	59.3	77.8	75.2	50.0	75.0
rate per 100,000 population - taux pour 100,000 habitants													
Cases notified - Cas déclarés	9.5	10.9	3.2	4.1	8.2	9.5	7.5	19.8	11.9	8.0	12.9	26.9	66.1
Bacillary cases - Cas bacillaire	7.0	8.3	3.2	3.1	6.4	6.5	6.1	14.6	7.1	6.3	9.7	13.5	49.6
Indians, number of cases notified - Indiens, nombre de cas déclarés	418	6	-	1	2	36	25	105	78	73	74	4	14
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rapportés	307	3	-	1	2	20	21	75	43	63	65	2	12
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaire par pourcentage de cas déclarés	73.3	50.0	-	100.0	100.0	55.5	84.0	71.4	54.4	86.3	87.8	50.0	85.7

TABLE 18. New Active and Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary and Origin, Canada and Provinces, 1983 - Concluded  
 TABLEAU 18. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le nombre de bacilles positifs et l'origine, Canada et provinces, 1983 - fin

Origin Origine	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué. Québec	Ont. Ontario	Man. Manitoba	Sask. Saskatchewan	Alta. Alberta	B.C. Colombie-Britannique	Yukon	N.W.T. Territoires du Nord-Ouest
Inuit, number of cases notified - Inuit, nombre de cas déclarés	48	3	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	15
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rapportés	22	3	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	9
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaire par pourcentage de cas déclarés	45.8	100.0	-	-	-	33.3	-	-	-	-	-	-	60.0
Other, number of cases notified - Autres, nombre de cas déclarés	1,889	54	4	34	56	552	637	103	39	116	288	2	3
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaire positifs rapportés	1,422	42	4	26	43	391	515	78	27	84	208	1	3
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaire par pourcentage de cas déclarés	75.3	77.8	100.0	76.5	76.8	70.8	80.8	75.7	69.2	72.4	72.0	50.0	100.0

TABLE 19. Reactivated Cases by Length of Inactive Interval, Canada and Provinces, 1983

TABLEAU 19. Cas réactivés suivant l'intervalle inactif, Canada et provinces, 1983

Length of inactive interval Durée de l'intervalle inactif	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué. Québec	Ont. Ontario	Man. Manitoba	Sask. Saskatchewan	Alta. Alberta	B.C. Colombie-Britannique	Yukon	N.W.T. Territoires du Nord-Ouest
Total	281	4	1	10	9	67	73	13	16	18	54	1	15
0-1 year - an	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-2 years - ans	6	-	-	1	-	-	-	1	-	-	4	-	-
2-3 "	12	-	-	-	-	7	1	-	2	1	-	-	-
3-4 "	10	-	-	-	1	2	1	1	1	1	-	-	-
4-5 "	11	-	-	-	1	4	3	-	1	1	2	-	1
5-6 "	9	-	-	-	-	3	2	-	-	1	1	-	-
6-7 "	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1
7-8 "	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
8-20 "	75	1	1	1	1	32	17	2	4	5	3	-	-
20 years and over - ans et plus	142	3	-	8	5	15	46	9	6	9	31	1	9
Not stated - Non précisée	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABLE 20. Notifications of Reactivated Cases by Origin and Sex, Canada and Provinces, 1983

TABLEAU 20. Déclarations de cas réactivés suivant l'origine et le sexe, Canada et provinces, 1983

Origin and sex Origine et sexe	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué. Québec	Ont. Ontario	Man. Manitoba	Sask. Saskatchewan	Alta. Alberta	B.C. Colombie-Britannique	Yukon	N.W.T. Territoires du Nord-Ouest
		Alb. T.-N.-O.	C.-B. C.-B.							Alb. T.-N.-O.	C.-B. C.-B.		
Total	T. M. F.	281 171 110	4 1 3	1 6 4	10 6 3	67 44 23	73 44 28	13 9 4	16 8 8	18 7 11	54 36 18	1 1 7	15 8 7
Indians - Indiens	T. M. F.	63 36 27	- -	1 1 1	2 3 1	4 3 1	4 3 1	7 4 3	16 8 8	12 6 6	10 7 3	- - 3	5 3 3
Inuit	T. M. F.	9 5 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	9 5 4
Other - Autres	T. M. F.	209 130 79	4 1 3	1 1 3	9 6 2	63 41 22	69 41 28	6 5 1	- - -	6 1 5	44 29 15	- - -	- - -