

TUBERCULOSIS STATISTICS

SUPPLEMENTARY REPORT

1988



### **SYMBOLS**

The following standard symbols are used in Statistics Canada publications:

- ... figures not available.
- ... figures not appropriate or not applicable.
- nil or zero.
- amount too small to be expressed.
- p preliminary figures.
- r revised figures.
- x confidential to meet secrecy requirements of the Statistics Act.

These tables and explanatory text were prepared under the direction of:

- o David F. Bray, Director, Canadian Centre for Health Information.
- o Anna Brancker, Acting Chief, Health Status Section.

### **SIGNES CONVENTIONNELS**

Les signes conventionnels suivants sont employés uniformément dans les publications de Statistique Canada:

- .. nombres indisponibles.
- ... n'ayant pas lieu de figurer.
- néant ou zéro.
- nombres infimes.
- p nombres provisoires.
- r nombres rectifiées.
- x confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique relatives au secret.

Ces tableaux et texte explicatif ont été rédigés sous la direction de:

- o David F. Bray, directeur, Centre canadien d'information sur la santé
- o Anna Brancker, chef intérimaire, Section de l'état de santé.



**TABLE OF CONTENTS****Morbidity and Mortality****Page****Tables****Notification of New Active and Reactivated Cases of Tuberculosis 1988**

1.	<b>Comparison - New Active and Reactivated Cases, Canada and Provinces, 1988</b>	6
2.	<b>Comparison - New Active and Reactivated Cases by Age Group, 1988</b>	6
3.	<b>Comparison - New Active and Reactivated Cases by Diagnosis, 1988</b>	7
4.	<b>Comparison - New Active and Reactivated Cases by Origin, 1988</b>	7
5.	<b>New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis and Sex, Canada and Provinces, 1988</b>	8
6.	<b>New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Age Group, 1988</b>	14
7.	<b>New Active and Reactivated Cases and Rate Per 100,000 Population by Age Group and Sex, Canada and Provinces, 1988</b>	20
8.	<b>New Active and Reactivated Cases and Rate Per 100,000 Population by Age Group, Sex and Diagnosis, 1988</b>	22
9.	<b>New Active and Reactivated Cases and Rate Per 100,000 Population by Diagnosis and Sex, Canada and Provinces, 1988</b>	24

**TABLE DES MATIÈRES****Morbidité et mortalité****Page****Tableau****Déclarations de nouveaux cas actifs et réactivés, Canada et provinces, 1988**

1.	<b>Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés, Canada et provinces, 1988</b>	6
2.	<b>Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le groupe d'âge 1988</b>	6
3.	<b>Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic, 1988</b>	7
4.	<b>Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant l'origine, 1988</b>	7
5.	<b>Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe, Canada et province, 1988</b>	8
6.	<b>Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe, et le groupe d'âge, 1988</b>	14
7.	<b>Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,00 habitants suivant le groupe d'âge et le sexe Canada et provinces, 1988</b>	20
8.	<b>Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,00 habitants suivant le groupe d'âge et le sexe et le diagnostic, 1988</b>	22
9.	<b>Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,00 habitants suivant le diagnostic et le sexe, Canada et provinces 1988</b>	24

**TABLE OF CONTENTS - Concluded****Page**

10. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Sex, Canada and Provinces, 1988 26
11. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Age Group, 1988 27
12. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Diagnosis and Origin, 1988 27
13. New Active and Reactivated Cases, Bacillary Status, Canada and Provinces, 1988 28
14. New Active and Reactivated Cases, Bacillary Status, by Diagnosis and by Origin, 1988 30
15. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Method of Determination of Bacillary Status, Canada and Provinces, 1988 32
16. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Diagnosis and Method of Determination of Bacillary Status, Canada and Provinces, 1988 34
17. New Active and Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary and Diagnosis, Canada and Provinces, 1988 38
18. New Active and Reactivated Cases by Number Testing Postive Bacillary and Origin, Canada and Provinces, 1988 39
19. Reactivated Cases by Length of Inactivated Interval, Canada and Provinces, 1988 40
20. Notification of Reactivated Cases by Origin and Sex, Canada and Provinces, 1988 40

Post-censal Population Estimates for Canada and the Provinces, by Age Group and Sex, June 1, 1988

**TABLE DE MATIERES - fin****Page**

10. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine et le sexe, Canada et provinces, 1988 26
11. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine et le groupe d'âge, 1988 27
12. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant le diagnostic et l'origine, 1988 27
13. Nouveaux cas actifs et réactivés état bacillaire, Canada et provinces, 1988 28
14. Nouveaux cas actifs et réactivés état bacillaire, par le diagnostic et par l'origine, 1988 30
15. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine et la méthode de détermination d'état bacillaire, Canada et provinces, 1988 32
16. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant le diagnostic et la méthode de détermination d'état bacillaire, Canada et provinces, 1988 34
17. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le nombre de bacillaires et diagnostic, Canada et provinces, 1988 38
18. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le nombre de bacillaires et l'origine, Canada et provinces, 1988 39
19. Cas réactivés suivant l'intervalle inactif, Canada et provinces, 1988 40
20. Déclaration de cas réactivés suivant l'origine et le sexe Canada et provinces, 1988 40

Estimation postcensitaire de la population de Canada et des provinces, selon le groupe d'âge et le sexe, 1er juin 1988

**Statistical Tables**

**Tableaux statistiques**

6

**TABLE 1. Comparison - New Active and Reactivated Cases, Canada and Provinces, 1988**  
**TABLEAU 1. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés, Canada et provinces, 1988**

Activity Activité	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué. Qué.	Ont. Ontario	Man. Manitoba	Sask. Saskatchewan	Alta. Alberta	B.C. Colombie-Britannique	Yukon	N.W.T. Territoires du Nord-Ouest
Total	number 1,962 <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
New active cases - Nouveaux cas actifs	1,786	56	4	24	15	422	560	102	134	160	271	4	34
Reactivated cases - Cas réactivés	176	9	-	2	3	16	75	9	15	16	29	-	2
Total	rate per 100,000 population - taux pour 100,000 habitants	7.6	11.4	3..	2.9	2.5	6.6	6.7	10.2	14.7	7.3	10.1	15.8
New active cases - Nouveaux cas actifs	6.9	9.9	3.1	2.7	2.1	6.4	5.9	9.4	13.2	6.7	9.1	15.8	65.0
Reactivated cases - Cas réactivés	0.7	1.6	-	0.2	0.4	0.2	0.8	0.8	1.5	0.7	1.0	-	3.8
Total	percentage distribution - répartition procentuelle	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
New active cases - Nouveaux cas actifs	91.0	86.2	100.0	92.3	99.9	96.3	88.2	91.9	89.9	90.9	90.3	100.0	94.4
Reactivated cases - Cas réactivés	9.0	13.8	-	7.7	0.1	3.7	11.8	8.1	10.1	9.1	9.7	-	5.6

<sup>1</sup> In this table and all other tables in this report, the 15 cases from Quebec which were diagnosed in 1987 but reported with 1988 data are included with the current (1988) data. - Dans ce tableau et tout autres tableaux dans ce rapport, les 15 cas qui ont été diagnostiqués en 1987 et rapportés en 1988, sont inclus avec les données courantes de 1988.

**TABLE 2. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Age Group, 1988**  
**TABLEAU 2. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le groupe d'âge, 1988**

Activity Activité	Total	0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75 years and over - 75 ans et plus
Total	number 1,962	-	-	-	-	-	-	-	-	-
New active cases - Nouveaux cas actifs	1,786	45	54	230	385	243	199	264	275	267
Reactivated cases - Cas réactivés	176	-	-	8	22	27	20	26	38	35
Total	percentage distribution - répartition procentuelle	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
New active cases - Nouveaux cas actifs	91.0	100.0	100.0	96.5	94.3	88.9	89.9	90.2	86.2	86.9
Reactivated cases - Cas réactivés	9.0	-	-	3.5	5.7	11.1	10.1	9.8	13.8	13.1

TABLE 3. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Diagnosis, 1988  
 TABLEAU 3. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic, 1988

Activity	Activité	Total	Tuberculosis of respiratory system						Non-respiratory				
			Tuberculose de l'appareil respiratoire						Other respiratory	Non respi- ratoire			
			Pulmonary	Miliary	Primary	Pleurisy (tuber- culous)	Tuber- culous laryn- gitis						
number - nombre													
Total		1,962	1,266		37	100	87	2	19	451			
New active cases -													
Nouveaux cas actifs		1,786	1,144		33	100	83	1	16	409			
Reactivated cases -													
Cas réactivés		176	122		4	-	4	1	3	42			
percentage distribution - répartition procentuelle													
Total		100.0	100.0		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			
New active cases -													
Nouveaux cas actifs		91.0	90.4		89.2	100.0	95.4	50.0	88.2	90.7			
Reactivated cases -													
Cas réactivés		9.0	9.6		10.8	-	4.6	50.0	11.8	9.3			

TABLE 4. Comparison - New Active and Reactivated Cases by Origin, 1988  
 TABLEAU 4. Comparaison - Nouveaux cas actifs et réactivés suivant l'origine, 1988

Activity	Activité	Total	Indians - Indiens			Inuit			Others - Autres				
			T	M	F	T	M	F	T	M	F		
			number - nombre										
Total		1,962	1,131	831	311	172	139	26	13	13	1,625	946	679
New active cases -													
Nouveaux cas actifs		1,786	1,020	766	281	152	129	24	11	13	1,481	857	624
Reactivated cases -													
Cas réactivés		176	111	65	30	20	10	2	2	-	144	89	55
percentage distribution - répartition procentuelle													
Total		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
New active cases -													
Nouveaux cas actifs		91.0	90.2	92.2	90.4	88.4	92.8	92.3	84.6	100.0	91.1	90.6	91.9
Reactivated cases -													
Cas réactivés		9.0	9.8	7.8	9.6	11.6	7.2	7.7	15.4	-	8.9	9.4	8.1

TABLE 5. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis and Sex, Canada and Provinces, 1988

ICD No.	Diagnosis and sex	Canada	number - nombre				
			Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-É.	Qué. Q.-C.
TOTAL							
		T.	1,962	65	4	26	18
		M.	1,131	43	2	13	10
		F.	831	22	2	13	8
010 - 012.8 018	Tuberculosis of respiratory system	T.	1,511	58	4	16	15
		M.	928	40	2	11	9
		F.	583	18	2	5	6
011.4	Silicotuberculosis	T.	1	-	-	-	-
		M.	-	-	-	-	-
		F.	1	-	-	-	-
011.0 - 011.3 011.5 - 011.9	Pulmonary	T.	1,266	43	3	16	13
		M.	792	30	1	11	8
		F.	474	13	2	5	5
018.0 018.8 - 018.9	Miliary	T.	37	2	-	-	7
		M.	21	2	-	-	4
		F.	16	-	-	-	3
010, 012	Other respiratory tuberculosis	T.	208	13	1	-	2
		M.	115	8	1	-	1
		F.	93	5	-	-	8
010 - 010.9	Primary	T.	100	8	1	-	1
		M.	42	3	1	-	-
		F.	58	5	-	-	1
012.0	Pleurisy specified as tuberculous	T.	87	4	-	-	2
		M.	62	4	-	-	1
		F.	25	-	-	-	5
012.1	Tuberculosis of intrathoracic lymph nodes	T.	8	-	-	-	2
		M.	5	-	-	-	2
		F.	3	-	-	-	2
012.2	Isolated tracheal or bronchial tuberculosis	T.	2	-	-	-	-
		M.	1	-	-	-	1
		F.	1	-	-	-	1
012.3	Tuberculous laryngitis	T.	2	1	-	-	1
		M.	1	1	-	-	-
		F.	1	-	-	-	1
012.8	Other	T.	9	-	-	-	1
		M.	4	-	-	-	3
		F.	5	-	-	-	3
013 - 017.8	Non-respiratory	T.	451	7	-	10	3
		M.	203	3	-	2	1
		F.	248	4	-	8	2
013	Meninges and central nervous system	T.	19	-	-	-	2
		M.	9	-	-	-	1
		F.	10	-	-	-	4
013.0	Meningitis	T.	18	-	-	-	2
		M.	8	-	-	-	1
		F.	10	-	-	-	4

TABLEAU 5. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé et le sexe, Canada et provinces, 1988

Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	Diagnostic et sexe	N° de la CIM
		Alb.	C.B.		T.N.O		
<b>number - nombre</b>							
111	149	176	300	4	36	T. TOTAL	
64	75	96	165	3	17	M.	
47	74	80	135	1	19	F.	
91	126	123	233	4	30	T. Tuberculose de l'appareil respiratoire	010 - 012.8,
56	67	70	141	3	16	M.	018
35	59	53	92	1	14	F.	
-	-	-	-	1	-	T. Silicotuberculose	011.4
-	-	-	-	-	-	M.	
-	-	-	-	1	-	F.	
70	78	93	188	3	22	T. Pulmonaire	011.0 - 011.3
43	46	54	116	2	12	M.	011.5 - 011.9
27	32	39	72	1	10	F.	
7	1	5	6	-	1	T. Miliaire	018.0
2	1	3	5	-	-	M.	018.8 - 018.9
5	-	2	1	-	1	F.	
14	47	25	39	1	7	T. Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire	010. 012
11	20	13	20	1	4	M.	
3	27	12	19	-	3	F.	
3	41	17	18	1	4	T. Primaire	010 - 010.9
1	16	7	9	1	1	M.	
2	25	10	9	-	3	F.	
10	6	5	21	-	3	T. Pleurésie spécifiée comme tuberculeuse	012.0
10	4	4	11	-	3	M.	
-	2	1	10	-	-	F.	
1	-	1	-	-	-	T. Tuberculose des ganglions lymphatiques endothoraciques	012.1
1	-	1	-	-	-	M.	
1	-	-	-	-	-	F.	
-	-	-	-	-	-	T. Tuberculose trachéale ou bronchique isolée	012.2
-	-	-	-	-	-	M.	
-	-	-	-	-	-	F.	
-	-	-	-	-	-	T. Laryngite tuberculeuse	012.3
-	-	-	-	-	-	M.	
-	-	-	-	-	-	F.	
-	-	2	-	-	-	T. Autres	012.8
-	-	1	-	-	-	M.	
-	-	1	-	-	-	F.	
20	23	53	67	-	6	T. Non respiratoire	013 - 017.8
8	8	26	24	-	1	M.	
12	15	27	43	-	5	F.	
1	1	6	2	-	1	T. Tuberculose du système nerveux central	013
1	-	5	-	-	-	M.	
-	1	1	2	-	1	F.	
1	1	5	2	-	1	T. Méningite	013.0
1	-	4	-	-	-	M.	
-	1	1	2	-	1	F.	

TABLE 5. New Active and Reactivated Cases by detailed Diagnosis and Sex, Canada and Provinces, 1988 -  
Continued

ICD No.	Diagnosis and sex	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
			T.-N.	I.-P.-É	N.-É.			
number - nombre								
013.1	Tuberculoma of meninges	T. M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
013.8	Other	T. M. F.	1 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
013.9	Unspecified	T. M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
014	Intestines, peritoneum and mesenteric glands	T. M. F.	27 17 10	- - -	1 - 1	- - -	4 1 3	10 7 3
015	Tuberculosis of bones and joints	T. M. F.	47 25 22	1 1 -	2 1 1	- - -	13 10 3	20 8 12
015.0	Vertebral column	T. M. F.	14 5 9	- - -	1 - 1	- - -	2 2 -	6 1 5
015.1	Hip	T. M. F.	9 7 2	- - -	1 1 -	- - -	5 5 -	1 - 1
015.2	Knee	T. M. F.	5 4 1	- - -	- - -	- - -	2 2 -	3 2 1
015.7	Other bone	T. M. F.	10 7 3	1 1 -	- - -	- - -	3 1 2	5 4 1
015.8	Other joint	T. M. F.	6 1 5	- - -	- - -	- - -	1 - 1	4 - 3
015.9	Unspecified	T. M. F.	3 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
016	Genitourinary system	T. M. F.	113 58 55	4 2 2	5 1 4	3 1 2	33 17 16	30 19 11
016.0	Kidney	T. M. F.	63 32 31	3 1 2	2 1 1	1 - 1	28 15 13	19 10 9
016.1	Other urinary organs	T. M. F.	4 1 3	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	2 - 1

11

TABLEAU 5. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé et le sexe, Canada et provinces, 1988 - suite

12  
 TABLE 5. New Active and Reactivated Cases by detailed Diagnosis and Sex, Canada and Provinces, 1988 -  
 Concluded

ICD No.	Diagnosis and sex	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.
			T.-N.	I.-P.-É	N.-É.			
number - nombre								
016.2	Epididymis	T. M. F.	5 5 -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 4 -
016.3	Other male genital organs	T. M. F.	9 9 -	1 1 -	- - -	- - -	2 2 -	3 3 -
016.4	Female genital organs	T. M. F.	10 - 10	- - -	2 - 2	- - -	2 - 2	- - -
016.9	Unspecified	T. M. F.	22 11 11	- - -	- - -	2 1 1	- - -	2 1 1
017	Other organs	T. M. F.	245 94 151	2 - 2	2 - 2	- - -	39 22 17	105 43 62
017.0	Skin and subcutaneous cellular tissue	T. M. F.	5 2 3	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	2 2 -
017.1	Erythema nodosum with hypersensitivity reaction in tuberculosis	T. M. F.	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
017.2	Peripheral lymph nodes	T. M. F.	221 83 138	2 - 2	1 - 1	- - -	36 20 16	94 36 58
017.3	Eye	T. M. F.	5 1 4	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
017.4	Ear	T. M. F.	2 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -
017.5	Thyroid gland	T. M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
017.6	Adrenal glands	T. M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
017.7	Spleen	T. M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
017.8	Other	T. M. F.	10 7 3	- - -	- - -	- - -	2 2 -	6 3 3

TABLEAU 5. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé et le sexe, Canada et provinces, 1988 - fin

TABLE 6. New Active and Reactivated Cases by Diagnosis, Sex and Age Group, 1988

ICD No.	Diagnosis and sex	All ages Tous âges	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39		
			number - nombre									
	TOTAL		T.	1,962	45	24	30	75	155	203	182	125
			M.	1,131	19	7	15	40	89	109	99	74
			F.	831	26	17	15	35	66	94	83	51
010 - 012.8 018	Tuberculosis of respiratory system		T.	1,511	39	20	26	61	124	142	123	89
			M.	928	19	6	12	32	73	81	70	61
			F.	583	20	14	14	29	51	61	53	28
011.4	Silicotuberculosis		T.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
			M.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
011.0 - 011.3 011.5 - 011.9	Pulmonary		T.	1,266	3	5	8	41	97	119	110	72
			M.	792	2	1	4	23	56	69	59	49
			F.	474	1	4	4	18	41	50	51	23
018.0 018.8 - 018.9	Miliary		T.	37	-	-	1	-	3	4	3	3
			M.	21	-	-	1	-	1	1	3	3
			F.	16	-	-	-	-	2	3	-	-
010, 012	Other respiratory tuberculosis		T.	208	36	15	17	20	24	19	10	14
			M.	115	17	5	7	9	16	11	8	9
			F.	93	19	10	10	11	8	8	2	5
010 - 010.9	Primary		T.	100	36	15	15	14	9	6	-	2
			M.	42	17	5	5	5	5	2	-	1
			F.	58	19	10	10	9	4	4	-	1
012.0	Pleurisy specified as tuberculous		T.	87	-	-	2	6	13	9	9	11
			M.	62	-	-	2	4	9	7	7	8
			F.	25	-	-	-	2	4	2	2	3
012.1	Tuberculosis of intrathoracic lymph nodes		T.	8	-	-	-	-	1	3	1	-
			M.	5	-	-	-	-	1	1	1	-
			F.	3	-	-	-	-	-	2	-	-
012.2	Isolated tracheal or bronchial tuberculosis		T.	2	-	-	-	-	-	1	-	-
			M.	1	-	-	-	-	-	1	-	-
			F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
012.3	Tuberculous laryngitis		T.	2	-	-	-	-	-	-	-	-
			M.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
			F.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
012.8	Other		T.	9	-	-	-	-	1	-	-	1
			M.	4	-	-	-	-	1	-	-	-
			F.	5	-	-	-	-	-	-	-	1
013 - 017.8	Non-respiratory		T.	451	6	4	4	14	31	61	59	36
			M.	203	-	1	3	8	16	28	29	13
			F.	248	6	3	1	6	15	33	30	23
013	Meninges and central nervous system		T.	19	2	-	1	-	-	2	-	3
			M.	9	-	-	1	-	-	1	-	1
			F.	10	2	-	-	-	-	1	-	2
013.0	Meningitis		T.	18	2	-	-	-	-	2	-	3
			M.	8	-	-	-	-	-	1	-	1
			F.	10	2	-	-	-	-	1	-	2

TABLEAU 6. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe et le groupe d'âge, 1988

40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+		Diagnostic et sexe	N° de la CIM
<b>number - nombre</b>										
118	95	104	129	135	130	145	267	T.	<b>TOTAL</b>	
72	52	67	82	93	79	81	153	M.		
46	43	37	47	42	51	64	114	F.		
86	70	70	101	104	105	119	232	T.	Tuberculose de l'appareil respiratoire	010 - 012.8,
57	43	52	73	71	69	73	136	M.		018
29	27	18	28	33	36	46	96	F.		
-	-	1	-	-	-	-	-	T.	Silicotuberculose	011.4
-	-	-	-	-	-	-	-	M.		
-	-	1	-	-	-	-	-	F.		
77	60	65	95	98	94	107	215	T.	Pulmonaire	011.0 - 011.3
52	37	50	69	66	64	65	126	M.		011.5 - 011.9
25	23	15	26	32	30	42	89	F.		
2	2	1	3	1	6	3	5	T.	Miliaire	018.0
1	1	-	2	1	3	1	3	M.		018.8 - 018.9
1	1	1	1	-	3	2	2	F.		
7	8	4	3	5	5	9	12	T.	Autres tuberculoses de l'appareil respiratoire	010. 012
4	5	2	2	4	2	7	7	M.		
3	3	2	1	1	3	2	5	F.		
-	-	2	-	-	-	-	1	T.	Primaire	010 - 010.9
-	-	1	-	-	-	-	1	M.		
-	-	1	-	-	-	-	-	F.		
6	6	2	1	4	2	8	8	T.	Pleurésie spécifiée comme tuberculeuse	012.0
4	4	1	1	4	-	6	5	M.		
2	2	1	-	-	2	2	3	F.		
-	1	-	1	-	-	-	1	T.	Tuberculose des ganglions lymphatiques	012.1
-	1	-	-	-	-	-	1	M.	lymphatiques	
-	-	-	1	-	-	-	-	F.	endothoraciques	
1	-	-	-	-	-	-	-	T.	Tuberculose trachéale ou bronchique isolée	012.2
-	-	-	-	-	-	-	-	M.		
1	-	-	-	-	-	-	-	F.		
-	-	-	-	-	2	-	-	T.	Laryngite tuberculeuse	012.3
-	-	-	-	-	1	-	-	M.		
-	-	-	-	-	1	-	-	F.		
-	1	-	1	1	1	1	2	T.	Autres	012.8
-	-	-	1	-	1	1	-	M.		
-	1	-	-	1	-	-	2	F.		
32	25	34	28	31	25	26	35	T.	Non respiratoire	013 - 017.8
15	9	15	9	22	10	8	17	M.		
17	16	19	19	9	15	18	18	F.		
2	-	2	-	1	-	4	2	T.	Tuberculose du système nerveux central	013
1	-	1	-	-	-	2	2	M.		
1	-	1	-	1	-	2	-	F.		
2	-	2	-	1	-	4	2	T.	Méningite	013.0
1	-	1	-	1	-	2	-	M.		
1	-	1	-	-	-	-	-	F.		

TABLE 6. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Age Group, 1988 - Continued

ICD No.	Diagnosis and sex	All ages Tous âges	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39
			number - nombre							
<b>Non-respiratory - Continued</b>										
013.1	Tuberculoma of meninges	T. M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
013.8	Other	T. M. F.	1 1 -	- - -	- 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	
013.9	Unspecified	T. M. F.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
014	Intestines, peritoneum and mesenteric glands	T. M. F.	27 17 10	- - -	- - -	1 1 -	- - -	4 1 3	4 4 -	2 - 2
015	Tuberculosis of bones and joints	T. M. F.	47 25 22	1 - 1	2 1 -	2 2 -	1 1 -	6 4 2	7 4 3	1 - 1
015.0	Vertebral column	T. M. F.	14 5 9	- - -	- - -	1 1 -	- - -	2 1 1	1 1 -	1 - 1
015.1	Hip	T. M. F.	9 7 2	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -	1 1 1	- - -	- - -
015.2	Knee	T. M. F.	5 4 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 -	2 2 -	- - -
015.7	Other bone	T. M. F.	10 7 3	- - -	1 1 -	1 1 -	- - -	1 1 1	1 - -	- - -
015.8	Other joint	T. M. F.	6 1 5	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 -	1 - 1	- - -
015.9	Unspecified	T. M. F.	3 1 2	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 1	- - -
016	Genitourinary system	T. M. F.	113 58 55	- - -	1 - 1	1 1 -	1 1 -	3 1 2	13 8 5	5 3 2
016.0	Kidney	T. M. F.	63 32 31	- - -	1 - 1	- - -	1 1 -	1 1 -	7 5 2	1 - -
016.1	Other urinary organs	T. M. F.	4 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -

TABLEAU 6. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe et le groupe d'âge,  
1988 - suite

40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+	Diagnostic et sexe	N° de la CIM
<b>number - nombre</b>									
<b>Non respiratoire - suite</b>									
-	-	-	-	-	-	-	-	T. Tuberculome méningé	013.1
-	-	-	-	-	-	-	-	M.	
-	-	-	-	-	-	-	-	F.	
-	-	-	-	-	-	-	-	T. Autres	013.8
-	-	-	-	-	-	-	-	M.	
-	-	-	-	-	-	-	-	F.	
-	-	-	-	-	-	-	-	T. Sans précision	013.9
-	-	-	-	-	-	-	-	M.	
-	-	-	-	-	-	-	-	F.	
1	2	1	3	5	1	2	1	T. Intestins, péritoine et ganglions mésentériques	014
1	1	1	3	4	-	-	1	M.	
-	1	-	-	1	1	2	-	F.	
1	3	3	2	3	5	2	7	T. Tuberculose des os et des articulations	015
-	1	1	1	3	3	1	3	M.	
1	2	2	1	-	2	1	4	F.	
-	1	2	2	1	1	-	2	T. Colonne vertébrale	015.0
-	-	1	1	-	-	-	-	M.	
-	1	2	1	-	1	-	2	F.	
-	-	-	-	2	1	1	2	T. Manche	15.1
-	-	-	-	2	1	1	2	M.	
-	-	-	-	-	-	-	-	F.	
-	-	-	-	-	2	-	-	T. Genou	015.2
-	-	-	-	-	1	-	-	M.	
-	-	-	-	-	1	-	-	F.	
-	2	1	-	-	1	1	1	T. Autres tuberculoses osseuses	015.7
-	1	1	-	-	1	-	1	M.	
-	1	-	-	-	-	1	-	F.	
1	-	-	-	-	-	-	2	T. Autres tuberculoses articulaires	015.8
-	-	-	-	-	-	-	-	M.	
1	-	-	-	-	-	-	2	F.	
-	-	-	-	-	-	-	-	T. Sans précision	015.9
-	-	-	-	-	-	-	-	M.	
-	-	-	-	-	-	-	-	F.	
8	6	12	13	13	14	9	14	T. Appareil génito-urinaire	016
5	3	7	4	11	5	2	7	M.	
3	3	5	9	2	9	7	7	F.	
6	3	8	8	8	8	2	9	T. Rein	016.0
3	1	4	2	6	3	-	5	M.	
3	2	4	6	2	5	2	4	F.	
-	-	-	-	1	-	-	2	T. Autres organes urinaires	016.1
-	-	-	-	1	-	-	-	M.	
-	-	-	-	-	-	-	2	F.	

TABLE 6. New Active and Reactivated Cases by Detailed Diagnosis, Sex and Age Group, 1988 - Concluded

TABLEAU 6. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic détaillé, le sexe et le groupe d'âge,  
1988 - fin

40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75+		Diagnostic et sexe	N° de la CIM
<b>number - nombre</b>										
<b>Non respiratoire - fin</b>										
1	.	.	.	1	.	.	.	T.	Epididyme	016.2
1	.	.	.	1	.	.	.	M.		
.	.	.	.	.	.	.	.	F.		
1	1	.	1	2	2	1	1	T.	Autres organes	016.3
1	1	.	1	2	2	1	1	M.	génitaux de l'homme	
.	.	.	.	.	.	.	.	F.		
.	1	1	1	-	1	1	-	T.	Organes génitaux de	016.4
.	.	-	-	-	-	-	-	M.	la femme	
.	1	1	1	-	1	1	-	F.		
.	1	3	3	1	3	5	2	T.	Sans précision	016.9
.	1	3	1	1	-	1	1	M.		
.	.	-	2	-	3	4	1	F.		
20	14	16	10	9	5	9	11	T.	Autres organes	017
8	4	5	1	4	2	3	4	M.		
12	10	11	9	5	3	6	7	F.		
.	1	1	-	-	-	1	-	T.	Peau et tissu	017.0
.	.	-	-	-	-	-	-	M.	cellulaire sous-cutané	
.	1	1	-	-	-	1	-	F.		
.	.	-	-	-	-	-	-	T.	Erythème noueux avec	017.1
.	.	-	-	-	-	-	-	M.	réaction d'hypersensi-	
.	.	-	-	-	-	-	-	F.	bilité à la tuberculose	
18	12	15	10	6	4	6	8	T.	Ganglions	017.2
7	4	5	1	2	1	1	3	M.	lymphatiques	
11	8	10	9	4	3	5	5	F.	péripheriques	
1	1	-	-	-	-	-	-	T.	Oeil	
.	.	-	-	-	-	-	-	M.		
1	1	-	-	-	-	-	-	F.		
.	.	-	-	-	-	-	-	T.	Oreille	017.4
.	.	-	-	-	-	-	-	M.		
.	.	-	-	-	-	-	-	F.		
.	.	-	-	-	-	-	-	T.	Corps thyroïde	017.5
.	.	-	-	-	-	-	-	M.		
.	.	-	-	-	-	-	-	F.		
.	.	-	-	-	-	-	-	T.	Glandes surrénales	017.6
.	.	-	-	-	-	-	-	M.		
.	.	-	-	-	-	-	-	F.		
.	.	-	-	-	-	-	-	T.	Rate	017.7
.	.	-	-	-	-	-	-	M.		
.	.	-	-	-	-	-	-	F.		
1	-	-	-	3	1	2	3	T.	Autres	017.8
1	-	-	-	2	1	2	1	M.		
.	-	-	-	1	-	-	2	F.		

TABLE 7. New Active and Reactivated Cases and Rate Per 100,000 Population by Age Group and Sex, Canada and Provinces, 1988

TABLEAU 7. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge et le sexe, Canada et provinces, 1988

Age group Groupe d'âge	Canada T.N.	Nfld. P.E.I. N.S. I.P.É. N.É.						N.B. Qué. Ont. Man. Sask. T.N.O.			Alta. B.C. Alb. C.B.			Yukon T.N.O.	N.W.T.	
		Nfld.	P.E.I.	N.S.	I.P.É.	N.É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.			
number - nombre																
Both sexes - Les deux sexes																
All ages - Tous âges	1,962	65	4	26	18	438	635	111	149	176	300	4	36			
0-4 years - ans	45	1	-	1	-	1	2	2	20	8	9	-	1			
5-14 "	54	2	-	-	-	7	9	5	11	6	10	-	4			
15-24 "	230	6	-	-	2	32	80	15	30	18	30	-	17			
25-34 "	385	6	1	3	2	82	149	15	21	38	60	-	8			
35-44 "	243	5	-	2	2	48	93	15	9	27	40	2	-			
45-54 "	199	6	-	3	1	52	58	17	14	17	30	-	1			
55-64 "	264	17	1	4	3	76	86	9	13	22	30	2	1			
65-74 "	275	13	1	6	4	79	69	12	18	19	51	-	3			
75 yrs and over - 75 ans et plus	267	9	1	7	4	61	89	21	13	21	40	-	1			
Male - Masculin																
All ages - Tous âges	1,131	43	2	13	10	269	374	64	75	96	165	3	17			
0-4 years - ans	19	1	-	-	-	-	1	-	9	3	5	-	-			
5-14 "	22	1	-	-	-	4	3	1	5	4	4	-	-			
15-24 "	129	3	-	-	2	20	49	8	15	7	16	-	9			
25-34 "	208	2	-	2	-	47	81	13	9	18	30	-	6			
35-44 "	146	4	-	1	1	30	59	9	6	12	22	2	-			
45-54 "	119	4	-	1	1	35	33	11	6	11	17	-	-			
55-64 "	175	11	-	1	2	53	58	6	9	16	18	1	-			
65-74 "	160	10	1	4	2	42	41	5	11	13	29	-	2			
75 yrs and over - 75 ans et plus	153	7	1	4	2	38	49	11	5	12	24	-	-			
Female - Féminin																
All ages - Tous âges	831	22	2	13	8	169	261	47	74	80	135	1	19			
0-4 years - ans	26	-	-	1	-	1	1	2	11	5	4	-	1			
5-14 "	32	1	-	-	-	3	6	4	6	2	6	-	4			
15-24 "	101	3	-	-	-	12	31	7	15	11	14	-	8			
25-34 "	177	4	1	1	2	35	68	2	12	20	30	-	2			
35-44 "	97	1	-	1	1	18	34	6	3	15	18	-	-			
45-54 "	80	2	-	2	-	17	25	6	8	6	13	-	1			
55-64 "	89	6	1	3	1	23	28	3	4	6	12	1	1			
65-74 "	115	3	-	2	2	37	28	7	7	6	22	-	1			
75 yrs and over - 75 ans et plus	114	2	-	3	2	23	40	10	8	9	16	-	1			

TABLE 7. New Active and Reactivated Cases and Rate Per 100,000 Population by Age Group and Sex, Canada and Provinces, 1988

TABLEAU 7. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge et le sexe, Canada et provinces, 1988

Age group Groupe d'âge	Canada	Nfld. P.E.I. N.S. T.N. I.P.É. N.É.						Alta. B.C. Yukon Alb. C.B.			N.W.T. T.N.O.			
		N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.								
rate per 100,000 population - taux pour 100,000 habitants														
Both sexes - Les deux sexes														
All ages - Tous âges		7.6	11.4	3.1	2.9	2.5	6.6	6.7	10.2	14.7	7.3	10.1	15.8	68.8
0-4 years - ans	2.4	2.4	-	1.7	-	0.2	0.3	2.4	23.5	3.9	4.3	-	15.2	
5-14 "	1.5	2.0	-	-	-	0.8	0.7	3.2	6.9	1.7	2.5	-	38.8	
15-24 "	5.7	5.6	-	-	1.7	3.2	5.5	8.8	19.1	4.7	7.0	-	166.7	
25-34 "	8.2	6.3	4.7	1.9	1.6	6.7	8.9	8.0	12.2	7.9	11.6	-	77.7	
35-44 "	6.3	6.0	-	1.6	1.9	4.6	6.6	10.1	7.1	7.6	8.7	44.4	-	
45-54 "	7.5	11.9	-	3.5	1.5	7.3	5.9	16.9	15.6	7.6	9.7	-	25.6	
55-64 "	11.2	41.4	9.6	5.4	5.1	12.2	9.6	9.4	14.8	12.2	10.7	133.3	45.5	
65-74 "	15.8	39.8	10.8	9.3	8.1	18.4	10.7	14.8	23.5	15.2	22.1	-	300.0	
75 yrs and over - 75 ans et plus	23.6	46.4	14.1	16.1	11.9	23.1	21.2	35.8	23.0	25.8	27.0	-	166.7	
Male - Masculin														
All ages - Tous âges	8.9	15.2	3.1	3.0	2.8	8.3	8.1	12.0	14.8	8.0	11.2	22.7	62.6	
0-4 years - ans	2.0	4.8	-	-	-	-	0.3	-	20.7	2.9	4.7	-	-	
5-14 "	1.2	2.0	-	-	-	-	0.9	0.5	1.2	6.1	2.2	2.0	-	
15-24 "	6.3	5.5	-	-	3.3	3.9	6.6	9.2	18.7	3.6	7.4	-	170.1	
25-34 "	8.9	4.3	-	2.6	-	7.7	9.7	13.8	10.3	7.4	11.8	-	115.2	
35-44 "	7.5	9.6	-	1.6	1.9	5.8	8.4	12.1	9.3	6.7	9.5	83.9	-	
45-54 "	9.0	15.5	-	2.3	3.0	9.9	6.7	21.9	13.3	9.7	10.8	-	-	
55-64 "	15.3	53.1	-	2.8	7.0	17.8	13.3	13.0	20.6	17.7	12.9	112.5	-	
65-74 "	20.5	63.6	23.8	13.9	9.0	22.5	14.3	13.7	30.9	22.8	27.9	-	383.9	
75 yrs and over - 75 ans et plus	36.1	87.4	35.5	24.1	15.5	40.7	32.2	48.9	21.0	36.9	40.8	-	-	
Female - Féminin														
All ages - Tous âges	6.3	7.7	3.1	2.9	2.2	5.0	5.4	8.6	14.6	6.7	9.0	8.3	76.0	
0-4 years - ans	2.9	-	-	3.4	-	0.5	0.3	5.0	26.6	5.0	3.9	-	30.0	
5-14 "	1.8	2.1	-	-	-	0.7	1.0	5.2	7.6	1.1	3.1	-	80.8	
15-24 "	5.1	5.6	-	-	-	2.5	4.3	8.3	19.4	5.9	6.7	-	160.1	
25-34 "	7.5	8.3	9.5	1.3	3.2	5.7	8.0	2.1	14.0	8.4	11.5	-	39.6	
35-44 "	5.0	2.4	-	1.6	1.9	3.4	4.8	8.1	4.8	8.6	7.8	-	-	
45-54 "	6.0	8.0	-	4.6	-	4.7	5.0	11.9	17.9	5.5	8.5	-	56.8	
55-64 "	7.4	29.3	19.1	7.7	3.3	7.0	6.1	6.1	9.0	6.7	8.5	159.0	104.0	
65-74 "	11.9	17.6	-	5.6	7.4	15.2	7.9	15.6	17.0	8.9	17.4	-	223.7	
75 yrs and over - 75 ans et plus	16.2	17.5	-	11.2	9.7	13.5	15.0	27.8	24.5	18.7	18.0	-	354.6	

TABLE 8. New Active and Reactivated Cases and Rate Per 100,000 Population by Age Group, Sex and Diagnosis, 1988

TABLEAU 8. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe et le diagnostic, 1988

Age group Groupe d'âge	Total	Tuberculosis of respiratory system								Non-respiratory Non-respiratoire							
		Tuberculose de l'appareil respiratoire						Other respiratory Autres respiratoires									
		Pulmonary	Miliary	Primary	Pleurisy (tuberculous)	Tuberculosis	Other respiratory Autres respiratoires										
		Pulmonaire		Miliaire		Primaire		Pleuresie (tuberculeuse)	Laryngite tuberculeuse	Autres respiratoires							
number - nombre																	
Both sexes - Les deux sexes																	
All ages - Tous âges	1,962	1,266	37	100	87	2	19			451							
0-4 years - ans	45	3	-	36	-	-	-			6							
5-14 "	54	13	1	30	2	-	-			8							
15-24 "	230	138	3	23	19	-	2			45							
25-34 "	385	229	7	6	18	-	5			120							
35-44 "	243	149	5	2	17	-	2			68							
45-54 "	199	125	3	2	8	-	2			59							
55-64 "	264	193	4	-	5	-	3			59							
65-74 "	275	201	9	-	10	2	2			51							
75 yrs and over - 75 ans et plus	267	215	5	1	8	-	3			35							
Male - Masculin																	
All ages - Tous âges	1,131	792	21	42	62	1	10			203							
0-4 years - ans	19	2	-	17	-	-	-			-							
5-14 "	22	5	1	10	2	-	-			4							
15-24 "	129	79	1	10	13	-	2			24							
25-34 "	208	128	4	2	14	-	3			57							
35-44 "	146	101	4	1	12	-	-			28							
45-54 "	119	87	1	1	5	-	1			24							
55-64 "	175	135	3	-	5	-	1			31							
65-74 "	160	129	4	-	6	1	2			18							
75 yrs and over - 75 ans et plus	153	126	3	1	5	-	1			17							
Female - Féminin																	
All ages - Tous âges	831	474	16	58	25	1	9			248							
0-4 years - ans	26	1	-	19	-	-	-			6							
5-14 "	32	8	-	20	-	-	-			4							
15-24 "	101	59	2	13	6	-	-			21							
25-34 "	177	101	3	4	4	-	2			63							
35-44 "	97	48	1	1	5	-	2			40							
45-54 "	80	38	2	1	3	-	1			35							
55-64 "	89	58	1	-	-	-	2			28							
65-74 "	115	72	5	-	4	1	-			33							
75 yrs and over - 75 ans et plus	114	89	2	-	3	-	2			18							

TABLE 8. New Active and Reactivated Cases and Rate Per 100,000 Population by Age Group, Sex and Diagnosis,  
1988

TABLEAU 8. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le groupe d'âge, le sexe  
et le diagnostic, 1988

Age group Groupe d'âge	Total	Tuberculosis of respiratory system							Non-respiratory Non-respiratoire		
		Pulmonary	Miliary	Primary	Pleurisy (tuber- culous)	Tuber- culoses laryn- gitis	Other respi- ratory				
		Pulmonaire	Milieaire	Primaire	Pleuresie (tuber- culeuse)	Laryn- gite tuber- culeuse	Autres respi- ratoires				
rate per 100,000 population - taux pour 100,000 habitants											
Both sexes - Les deux sexes											
All ages - Tous âges	7.6	4.9	0.1	0.4	0.3	-	0.1	1.7			
0-4 years - ans	2.4	0.2	-	2.0	-	-	-	0.3			
5-14 "	1.5	0.3	--	0.8	0.1	-	-	0.2			
15-24 "	5.7	3.4	0.1	0.6	0.5	-	0.1	1.1			
25-34 "	8.2	4.9	0.2	0.1	0.4	-	0.1	2.6			
35-44 "	6.3	3.8	0.1	0.1	0.4	-	0.1	1.8			
45-54 "	7.5	4.7	0.1	0.1	0.3	-	0.1	2.2			
55-64 "	11.2	8.2	0.2	-	0.2	-	0.1	2.5			
65-74 "	15.8	11.5	0.5	-	0.6	0.1	0.1	2.9			
75 yrs and over - 75 ans et plus	23.6	19.0	0.4	0.1	0.7	-	0.3	3.1			
Male - Masculin											
All ages - Tous âges	8.9	6.2	0.2	0.3	0.5	-	0.1	1.6			
0-4 years - ans	2.0	0.2	-	1.8	-	-	-	-			
5-14 "	1.2	0.3	0.1	0.5	0.1	-	-	0.2			
15-24 "	6.3	3.9	0.1	0.5	0.6	-	0.1	1.2			
25-34 "	8.9	5.5	0.2	0.1	0.6	-	0.1	2.5			
35-44 "	7.5	5.2	0.2	0.1	0.6	-	-	1.4			
45-54 "	9.0	6.6	0.1	0.1	0.4	-	0.1	1.8			
55-64 "	15.3	11.8	0.3	-	0.4	-	0.1	2.7			
65-74 "	20.5	16.5	0.5	-	0.8	0.1	0.3	2.3			
75 yrs and over - 75 ans et plus	36.1	29.7	0.7	0.2	1.2	-	0.2	4.0			
Female - Féminin											
All ages - Tous âges	6.3	3.6	0.1	0.4	0.2	-	0.1	1.9			
0-4 years - ans	2.9	0.1	-	2.1	-	-	-	0.7			
5-14 "	1.8	0.5	-	1.1	-	-	-	0.2			
15-24 "	5.1	3.0	0.1	0.7	0.3	-	-	1.1			
25-34 "	7.5	4.3	0.1	0.2	0.2	-	0.1	2.7			
35-44 "	5.0	2.5	0.1	0.1	0.3	-	0.1	2.1			
45-54 "	6.0	2.9	0.2	0.1	0.2	-	0.1	2.6			
55-64 "	7.4	4.8	0.1	-	-	-	0.2	2.3			
65-74 "	11.9	7.5	0.5	-	0.4	0.1	-	3.4			
75 yrs and over - 75 ans et plus	16.2	12.6	0.3	-	0.4	-	0.3	2.6			

24

**TABLE 9. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Diagnosis and Sex, Canada and Provinces, 1988**

**TABLEAU 9. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le diagnostic et le sexe, Canada et provinces, 1988**

Diagnosis Diagnostic	Canada T.-N.	Nfld. I.P.É.	P.E.I. N.B.	N.S. N.É.	N.B. Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	
number - nombre													
Both sexes - Les deux sexes													
Total	1,962	65	4	26	18	438	635	111	149	176	300	4	36
Respiratory - Respiratoire	1,511	58	4	16	15	347	464	91	126	123	233	4	30
Pulmonary - Pulmonaire	1,266	43	3	16	13	317	420	70	78	93	188	3	22
Miliary - Miliaire	37	2	-	-	-	7	8	7	1	5	6	-	1
Primary - Primaire	100	8	1	-	-	1	6	3	41	17	18	1	4
Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse)	87	4	-	-	2	18	18	10	6	5	21	-	3
Tuberculosis laryngitis - Laryngite tuberculeuse	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	19	-	-	-	-	3	12	1	-	3	-	-	-
Non-respiratory - Non respiratoire	451	7	-	10	3	91	171	20	23	53	67	-	6
Male - Masculin													
Total	1,131	43	2	13	10	269	374	64	75	96	165	3	17
Respiratory - Respiratoire	928	40	2	11	9	218	295	56	67	70	141	3	16
Pulmonary - Pulmonaire	792	30	1	11	8	199	270	43	46	54	116	2	12
Miliary - Miliaire	21	2	-	-	-	4	4	2	1	3	5	-	-
Primary - Primaire	42	3	1	-	-	-	3	1	16	7	9	1	1
Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse)	62	4	-	-	1	13	12	10	4	4	11	-	3
Tuberculosis laryngitis - Laryngite tuberculeuse	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	10	-	-	-	-	2	6	-	-	2	-	-	-
Non-respiratory - Non respiratoire	203	3	-	2	1	51	79	8	8	26	24	-	1
Female - Féminin													
Total	831	22	2	13	8	169	261	47	74	80	135	1	19
Respiratory - Respiratoire	583	18	2	5	6	129	169	35	59	53	92	1	14
Pulmonary - Pulmonaire	474	13	2	5	5	118	150	27	32	39	72	1	10
Miliary - Miliaire	16	-	-	-	3	4	5	-	2	1	-	-	1
Primary - Primaire	58	5	-	-	-	1	3	2	25	10	9	-	3
Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse)	25	-	-	-	1	5	6	-	2	1	10	-	-
Tuberculosis laryngitis - Laryngite tuberculeuse	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	9	-	-	-	-	1	6	1	-	1	-	-	-
Non-respiratory - Non respiratoire	248	4	-	8	2	40	92	12	15	27	43	-	5

25

**TABLE 9. New Active and Reactivated Cases and Rate per 100,000 Population by Diagnosis and Sex, Canada and Provinces, 1988**

**TABLEAU 9. Nouveaux cas actifs et réactivés et taux pour 100,000 habitants suivant le diagnostic et le sexe, Canada et provinces, 1988**

Diagnosis Diagnostic	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. Î.P.É.	N.S. N.É.	N.B. -	Qué. -	Ont. -	Man. -	Sask. -	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
rate - taux													
Both sexes - Les deux sexes													
Total	7.6	11.4	3.1	2.9	2.5	6.6	6.7	10.2	14.7	7.3	10.1	15.8	68.8
Respiratory - Respiratoire	5.8	10.2	3.1	1.8	2.1	5.2	4.9	8.4	12.4	5.1	7.8	15.8	57.4
Pulmonary - Pulmonaire	4.9	7.6	2.3	1.8	1.8	4.8	4.5	6.5	7.7	3.9	6.3	11.9	42.1
Miliary - Miliaire	0.1	0.4	-	-	-	0.1	0.1	0.7	0.1	0.2	0.2	-	1.9
Primary - Primaire	0.4	1.4	0.8	-	-	--	0.1	0.3	4.0	0.7	0.6	4.0	7.6
Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse)	0.3	0.7	-	-	0.3	0.3	0.2	0.9	0.6	0.2	0.7	-	5.7
Tuberculosis laryngitis - Laryngite tuberculeuse	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	-	0.1	-	-	-
Non-respiratory - Non respiratoire	1.7	1.2	-	1.1	0.4	1.4	1.8	1.8	2.3	2.2	2.2	-	11.5
Male - Masculin													
Total	8.9	15.2	3.1	3.0	2.8	8.3	8.1	12.0	14.8	8.0	11.2	22.7	62.6
Respiratory - Respiratoire	7.3	14.1	3.1	2.5	2.6	6.7	6.4	10.5	13.3	5.8	9.6	22.7	59.0
Pulmonary - Pulmonaire	6.2	10.6	1.6	2.5	2.3	6.1	5.8	8.0	9.1	4.5	7.9	15.1	44.2
Miliary - Miliaire	0.2	0.7	-	-	-	0.1	0.1	0.4	0.2	0.3	0.3	-	-
Primary - Primaire	0.3	1.1	1.6	-	-	-	0.1	0.2	3.2	0.6	0.6	7.6	3.7
Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse)	0.5	1.4	-	-	0.3	0.4	0.3	1.9	0.8	0.3	0.8	-	11.1
Tuberculosis laryngitis - Laryngite tuberculeuse	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	-	-	0.2	-	-	-
Non-respiratory - Non respiratoire	1.6	1.1	-	0.5	0.3	1.6	1.7	1.5	1.6	2.2	1.6	-	3.7
Female - Féminin													
Total	6.3	7.7	3.1	2.9	2.2	5.0	5.4	8.6	14.6	6.7	9.0	8.3	76.0
Respiratory - Respiratoire	4.4	6.3	3.1	1.1	1.7	3.8	3.5	6.4	11.6	4.5	6.1	8.3	56.0
Pulmonary - Pulmonaire	3.6	4.6	3.1	1.1	1.4	3.5	3.1	4.9	6.3	3.3	4.8	8.3	40.0
Miliary - Miliaire	0.1	-	-	-	-	0.1	0.1	0.9	-	0.2	0.1	-	4.0
Primary - Primaire	0.4	1.8	-	-	-	-	0.1	0.4	4.9	0.8	0.6	-	12.0
Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse)	0.2	-	-	-	0.3	0.2	0.1	-	0.4	0.1	0.7	-	-
Tuberculosis laryngitis - Laryngite tuberculeuse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	0.1	-	-	-	-	-	0.1	0.2	-	0.1	-	-	-
Non-respiratory - Non respiratoire	1.9	1.4	-	1.8	0.6	1.2	1.9	2.2	3.0	2.3	2.9	-	20.0

TABLE 10. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Sex, Canada and Provinces, 1988  
 TABLEAU 10. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine et le sexe, Canada et provinces, 1988

Origin Origine	Canada	Mfld.	P.E.I.	N.S.	N.B. T.-N.	Qué. I.P.-É.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
		T.-N.	I.P.-É.	N.E.						Alb.	C.B.		
Both sexes - Les deux sexes													
Total	1,962	65	4	26	18	438	635	111	149	176	300	4	36
Indians - Indiens	311	7	-	1	-	6	7	41	99	58	69	3	20
Inuit	26	4	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	15
Other - Autres	1,625	54	4	25	18	425	628	70	50	118	231	1	1
Percentage of total number of cases - Pourcentage du nombre total de cas:													
Indians - Indiens	15.9	10.8	-	3.9	-	1.4	1.1	36.9	66.4	33.0	23.0	75.0	55.6
Inuit	1.3	6.2	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	-	41.7
Other - Autres	82.8	83.1	100.0	96.2	100.0	97.0	98.9	63.1	33.6	67.1	77.0	25.0	2.8
Male - Masculin													
Total	1,131	43	2	13	10	269	374	64	75	96	165	3	17
Indians - Indiens	172	2	-	1	-	4	6	24	51	30	41	2	11
Inuit	13	2	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	6
Other - Autres	946	39	2	12	10	260	368	40	24	66	124	1	-
Percentage of total number of cases - Pourcentage du nombre total de cas:													
Indians - Indiens	15.2	4.7	-	7.7	-	1.5	1.6	37.5	68.0	31.3	24.9	66.7	64.7
Inuit	1.2	4.7	-	-	-	1.9	-	-	-	-	-	-	35.3
Other - Autres	83.6	90.7	100.0	92.3	100.0	96.7	98.4	62.5	32.0	68.8	75.2	33.3	-
Female - Féminin													
Total	831	22	2	13	8	169	261	47	74	80	135	1	19
Indians - Indiens	139	5	-	-	-	2	1	17	48	28	28	1	9
Inuit	13	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	9
Other - Autres	679	15	2	13	8	165	260	30	26	52	107	-	1
Percentage of total number of cases - Pourcentage du nombre total de cas:													
Indians - Indiens	16.7	22.7	-	-	-	1.2	0.4	36.2	64.9	35.0	20.7	100.0	47.4
Inuit	1.6	9.1	-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	47.4
Other - Autres	81.7	68.2	100.0	100.0	100.0	97.6	99.6	63.8	35.1	65.0	79.3	-	5.3

TABLE 11. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Age Group, 1988  
 TABLEAU 11. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine et le groupe d'âge, 1988

Origin	All ages									75 years and over
		0-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	
Origine	Tous âges									75 ans et plus
Total	1,962	45	54	230	385	243	199	264	275	267
Indians - Indiens	311	34	25	73	54	32	33	22	26	12
Inuit	26	-	6	8	4	-	3	2	3	-
Other - Autres	1,625	11	23	149	327	211	163	240	246	255
Percentage distribution of cases - Répartition procentuelle des cas:										
Indians - Indiens	15.9	75.6	46.3	31.7	14.0	13.2	16.6	8.3	9.5	4.5
Inuit	1.3	-	11.1	3.5	1.0	-	1.5	0.8	1.1	-
Other - Autres	82.8	24.4	42.6	64.8	84.9	86.8	81.9	90.9	89.5	95.5

TABLE 12. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Diagnosis and Origin, 1988  
 TABLEAU 12. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant le diagnostic et l'origine, 1988

Diagnostic	Total	Indians		Other
		Indiens	Inuit	
number - nombre				
Total	1,962	311	26	1,625
Respiratory - Respiratoire	1,511	272	24	1,215
Pulmonary - Pulmonaire	1,266	177	16	1,073
Miliary - Miliaire	37	11	1	25
Primary - Primaire	100	66	6	28
Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse)	87	18	1	68
Tuberculous laryngitis - Laryngite tuberculeuse	2	-	-	2
Other - Autres	19	-	-	19
Non-respiratory - Non respiratoire	451	39	2	410
percentage distribution - répartition procentuelle				
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Respiratory - Respiratoire	77.0	87.5	92.3	74.8
Pulmonary - Pulmonaire	64.5	56.9	61.5	66.0
Miliary - Miliaire	1.9	3.5	3.9	1.5
Primary - Primaire	5.1	21.2	23.1	1.7
Pleurisy (tuberculous) - Pleurésie (tuberculeuse)	4.4	5.8	3.9	4.2
Tuberculous laryngitis - Laryngite tuberculeuse	0.1	-	-	0.1
Other - Autres	1.0	-	-	1.2
Non-respiratory - Non respiratoire	23.0	12.5	7.7	25.2

TABLE 13. New Active and Reactivated Cases, Bacillary Status, Canada and Provinces, 1988  
 TABLEAU 13. Nouveaux cas actifs et réactivés, état bacillaire, Canada et provinces, 1988

Bacillary status État bacillaire	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. i.-P.-É	N.S. N.-É.	N.B. -	Qué. -	Ont. -	Man. -	Sask. -	Alta. -	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
number - nombre													
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés	1,962	65	4	26	18	438	635	111	149	176	300	4	36
Microscopy positive; culture positive - Microscopie positive; culture positive	1,056	18	1	11	13	386	312	46	62	74	118	2	13
Microscopy positive; culture negative - Microscopie positive; culture négative	46	15	-	1	-	-	17	3	1	3	6	-	-
Microscopy positive; culture not done - Microscopie positive; culture non réalisée	29	3	2	-	1	-	10	3	3	6	1	-	-
Microscopy negative; culture positive - Microscopie négative; culture positive	463	18	-	2	-	35	180	42	25	45	100	2	14
Microscopy negative; culture negative - Microscopie négative; culture négative	235	10	-	6	1	17	69	12	28	37	47	-	8
Microscopy negative; culture not done - Microscopie négative; culture non réalisée	11	-	-	-	1	-	3	3	1	-	2	-	1
Microscopy not done; culture positive - Microscopie non réalisée; culture positive	31	-	1	3	1	-	8	2	12	1	3	-	-
Microscopy not done; culture negative - Microscopie non réalisée; culture négative	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
Microscopy not done; culture not done - Microscopie non réalisée; culture non réalisée	83	1	-	3	1	-	36	-	9	10	23	-	-

TABLE 13. New Active and Reactivated Cases, Bacillary Status, Canada and Provinces, 1988  
 TABLEAU 13. Nouveaux cas actifs et réactivés, état bacillaire, Canada et provinces, 1988

Bacillary status État bacillaire	Canada T.-N.	Mfld. I.-P.-É	P.E.I. N.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.-B.	Qué. Q.-C.	Ont. Ontario	Man. Manitoba	Sask. Saskatchewan	Alta. A.-B.	B.C. C.-B.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
percentage distribution - répartition procentuelle													
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Microscopy positive; culture positive - Microscopie positive; culture positive	53.8	27.7	25.0	42.3	72.2	88.1	49.1	41.4	41.6	42.1	39.3	50.0	36.1
Microscopy positive; culture negative - Microscopie positive; culture négative	2.3	23.1	-	3.9	-	-	2.7	2.7	0.7	1.7	2.0	-	-
Microscopy positive; culture not done - Microscopie positive; culture non réalisée	1.5	4.6	50.0	-	5.6	-	1.6	2.7	2.0	3.4	0.3	-	-
Microscopy negative; culture positive - Microscopie négative; culture positive	23.6	27.7	-	7.7	-	8.0	28.4	37.8	16.8	25.6	33.3	50.0	38.9
Microscopy negative; culture negative - Microscopie négative; culture négative	12.0	15.4	-	23.1	5.6	3.9	10.9	10.8	18.8	21.0	15.7	-	22.2
Microscopy not done; culture positive - Microscopie non réalisée; culture positive	1.6	-	25.0	11.5	5.6	-	1.3	1.8	8.1	0.6	1.0	-	-
Microscopy not done; culture negative - Microscopie non réalisée; culture négative	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	-	-	-
Microscopy not done; culture not done - Microscopie non réalisée; culture non réalisée	4.2	1.5	-	11.5	5.6	-	5.7	-	6.0	5.7	7.7	-	-

TABLE 14. New Active and Reactivated Cases, Bacillary Status, by Diagnosis and by Origin, 1988

TABLEAU 14. Nouveaux cas actifs et réactivés, état bacillaire, par le diagnostic et par l'origine, 1988

Bacillary status Etat bacillaire	Diagnosis - Diagnostic							Origin - Origine		
	Respiratory - Respiratoire							Non-respi- ratory	Indians	Other
	Total	Pulmo- nary	Miliary	Primary	Pleurisy (tuber- culous)	Tuber- culous	Other respi- ratory			
Pulmo- nary	Miliaire	Primaire	Pleurésie (tuber- culouse)	Laryn- gite tuber- culouse		Autres respira- toires	Non- respira- toire	Indiens	Inuit	Autres
number - nombre										
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés	1,962	1,266	37	100	87	2	19	451	311	26 1,625
Microscopy positive; culture positive - Microscopie positive; culture positive	1,056	799	19	12	23	2	6	195	130	12 914
Microscopy positive; culture negative - Microscopie positive; culture négative	46	30	-	3	2	-	-	11	8	4 34
Microscopy positive; culture not done - Microscopie positive; culture non réalisée	29	12	2	1	1	-	1	12	1	- 28
Microscopy negative; culture positive - Microscopie négative; culture positive	463	260	10	20	31	-	10	132	78	4 381
Microscopy negative; culture negative - Microscopie négative; culture négative	235	118	3	34	26	-	2	52	58	6 171
Microscopy negative; culture not done - Microscopie négative; culture non réalisée	11	7	-	1	-	-	-	3	3	- 8
Microscopy not done; culture positive - Microscopie non réalisée; culture positive	31	9	-	4	2	-	-	16	9	- 22
Microscopy not done; culture negative - Microscopie non réalisée; culture négative	8	-	-	6	1	-	-	1	8	- -
Microscopy not done; culture not done - Microscopie non réalisée; culture non réalisée	83	31	3	19	1	-	-	29	16	- 67

TABLE 14. New Active and Reactivated Cases, Bacillary Status, by Diagnosis and by Origin, 1988 - Concluded  
 TABLEAU 14. Nouveaux cas actifs et réactivés, état bacillaire, par le diagnostic et par l'origine, 1988 - fin

Bacillary status Etat bacillaire	Diagnosis - Diagnostic							Origin - Origine		
	Respiratory - Respiratoire							Non-respiratory	Indians	Other
	Total	Pulmonary	Miliary	Primary	Pleurisy (tuberculous)	Tuberculosis	Other respiratory			
	Pulmonary	Miliary	Primaire	Pleurésie (tuberculeuse)	Laryngite tuberculeuse	Autres respiratoires	Non-respiratoire			
percentage distribution - répartition procentuelle										
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Microscopy positive; culture positive - Microscopie positive; culture positive	53.8	63.1	51.4	12.0	26.4	100.0	29.4	43.2	41.8	46.2
Microscopy positive; culture negative - Microscopie positive; culture négative	2.3	2.4	-	3.0	2.3	-	-	2.4	2.6	15.4
Microscopy positive; culture not done - Microscopie positive; culture non réalisée	1.5	0.9	5.4	1.0	1.1	-	5.9	2.7	0.3	-
Microscopy negative; culture positive - Microscopie négative; culture positive	23.6	20.5	27.0	20.0	35.6	-	58.8	29.3	25.1	15.4
Microscopy negative; culture negative - Microscopie négative; culture négative	12.0	9.3	8.1	34.0	29.9	-	5.9	11.5	18.6	23.1
Microscopy negative; culture not done - Microscopie négative; culture non réalisée	0.6	0.6	-	1.0	-	-	-	0.7	1.0	-
Microscopy not done; culture positive - Microscopie non réalisée; culture positive	1.6	0.7	-	4.0	2.3	-	-	3.5	2.9	-
Microscopy not done; culture negative - Microscopie non réalisée; culture négative	0.4	-	-	6.0	1.1	-	-	0.2	2.6	-
Microscopy not done; culture not done - Microscopie non réalisée; culture non réalisée	4.2	2.4	8.1	19.0	1.1	-	-	6.4	5.1	-

TABLE 15. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Origin and Method of Determination of Bacillary Status, Canada and Provinces, 1988

Origin and method	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.		
number - nombre						
Number of cases reported	1,962	65	4	26	18	438
Determination:						
By microscopy and culture	1,798	61	1	20	14	438
By microscopy only	42	3	2	-	2	-
By culture only	39	-	1	3	1	-
No determination reported	83	1	-	3	1	-
Indians	311	7	-	1	-	6
Determination:						
By microscopy and culture	274	7	-	-	-	6
By microscopy only	4	-	-	-	-	-
By culture only	17	-	-	-	-	-
No determination reported	16	-	-	-	-	-
Inuit	26	4	-	-	-	7
Determination:						
By microscopy and culture	26	4	-	-	-	7
By microscopy only	-	-	-	-	-	-
By culture only	-	-	-	-	-	-
No determination reported	-	-	-	-	-	-
Other	1,625	54	4	25	18	425
Determination:						
By microscopy and culture	1,498	50	1	19	14	425
By microscopy only	38	3	2	-	2	-
By culture only	22	-	1	3	1	-
No determination reported	67	1	-	3	1	-
/						
	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	N.W.T.
				Alb.	C.-B.	Yukon
						T.N.-O.
Number of cases reported	635	111	149	176	300	4
Determination:						
By microscopy and culture	577	102	116	159	271	4
By microscopy only	14	7	4	6	3	-
By culture only	8	2	20	1	3	-
No determination reported	36	-	9	10	23	-
Indians	7	41	99	58	69	3
Determination:						
By microscopy and culture	7	41	76	51	63	3
By microscopy only	-	-	2	-	1	-
By culture only	-	-	15	1	1	-
No determination reported	-	-	6	6	4	-
Inuit	-	-	-	-	-	-
Determination:						
By microscopy and culture	-	-	-	-	-	-
By microscopy only	-	-	-	-	-	-
By culture only	-	-	-	-	-	-
No determination reported	-	-	-	-	-	-
Other	628	70	50	118	231	1
Determination:						
By microscopy and culture	570	61	40	108	208	1
By microscopy only	14	7	2	6	2	-
By culture only	8	2	5	-	2	-
No determination reported	36	-	3	4	19	-

TABLEAU 15. Nouveaux cas actifs et réactivés et répartition procentuelle suivant l'origine et la méthode de détermination d'état bacillaire, Canada et provinces, 1988

Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Origine et méthode
	T.-N.	I.P.-É.	N.É.			
<b>percentage distribution - répartition procentuelle</b>						
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Nombre de cas rapportés
91.6	93.9	25.0	76.9	77.8	100.0	Détermination:
2.1	4.6	50.0	-	11.1	-	Par la microscopie et la culture
2.0	-	25.0	11.5	5.6	-	Par la microscopie seulement
4.2	1.5	-	11.5	5.6	-	Par la culture seulement
						Pas de détermination rapportée
100.0	100.0	-	100.0	-	100.0	Indiens
88.1	100.0	-	100.0	-	100.0	Détermination:
1.3	-	-	-	-	-	Par la microscopie et la culture
5.5	-	-	-	-	-	Par la microscopie seulement
5.0	-	-	-	-	-	Par la culture seulement
						Pas de détermination rapportée
100.0	100.0	-	-	-	100.0	Inuit
100.0	100.0	-	-	-	100.0	Détermination:
-	-	-	-	-	-	Par la microscopie et la culture
-	-	-	-	-	-	Par la microscopie seulement
-	-	-	-	-	-	Par la culture seulement
						Pas de détermination rapportée
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Autres
92.2	92.6	25.0	76.0	77.8	100.0	Détermination:
2.3	5.6	50.0	-	11.1	-	Par la microscopie et la culture
1.4	-	25.0	12.0	5.6	-	Par la microscopie seulement
4.1	1.9	-	12.0	5.6	-	Par la culture seulement
						Pas de détermination rapportée
 <b>Ont.</b> <b>Man.</b> <b>Sask.</b> <b>Alta.</b> <b>B.C.</b> <b>N.W.T.</b>						
			Alb.	C.-B.	Yukon	T.N.-O.
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
90.9	91.9	77.9	90.3	90.3	100.0	97.2
2.2	6.3	2.7	3.4	1.0	-	2.8
1.3	1.8	13.4	0.6	1.0	-	-
5.7	-	6.0	5.7	7.7	-	-
						Pas de détermination rapportée
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Indiens
100.0	100.0	76.8	87.9	91.3	100.0	95.0
-	-	2.0	-	1.5	-	5.0
-	-	15.2	1.7	1.5	-	-
-	-	6.1	10.3	5.8	-	-
						Pas de détermination rapportée
-	-	-	-	-	-	100.0
-	-	-	-	-	-	100.0
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Autres
90.8	87.1	80.0	91.5	90.0	100.0	100.0
2.2	10.0	4.0	5.1	0.9	-	-
1.3	2.9	10.0	-	0.9	-	-
5.7	-	6.0	3.4	8.2	-	-
						Pas de détermination rapportée

34  
**TABLE 16. New Active and Reactivated Cases by Diagnosis and Method of Determination of Bacillary Status, Canada and Provinces, 1988**

Diagnosis and method	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.
		T.-N.	I.P.-É.	N.É.		
number						
Number of cases notified	1,962	65	4	26	18	438
Determination:						
By microscopy and culture	1,798	61	1	20	14	438
By microscopy only	42	3	2	-	2	-
By culture only	39	-	1	3	1	-
No determination reported	83	1	-	3	1	-
Respiratory	1,511	58	4	16	15	347
Determination:						
By microscopy and culture	1,408	55	1	14	12	347
By microscopy only	27	2	2	-	2	-
By culture only	22	-	1	2	-	-
No determination reported	54	1	-	-	1	-
Pulmonary	1,266	43	3	16	13	317
Determination:						
By microscopy and culture	1,205	41	1	14	11	317
By microscopy only	21	2	1	-	1	-
By culture only	9	-	1	2	-	-
No determination reported	31	-	-	-	1	-
Miliary	37	2	-	-	-	7
Determination:						
By microscopy and culture	32	2	-	-	-	7
By microscopy only	2	-	-	-	-	-
By culture only	-	-	-	-	-	-
No determination reported	3	-	-	-	-	-
Primary	100	8	1	-	-	1
Determination:						
By microscopy and culture	69	7	-	-	-	1
By microscopy only	2	-	1	-	-	-
By culture only	10	-	-	-	-	-
No determination reported	19	1	-	-	-	-
Pleurisy (tuberculous)	87	4	-	-	2	18
Determination:						
By microscopy and culture	82	4	-	-	1	18
By microscopy only	1	-	-	-	1	-
By culture only	3	-	-	-	-	-
No determination reported	1	-	-	-	-	-
Tuberculous laryngitis	2	1	-	-	-	1
Determination:						
By microscopy and culture	2	1	-	-	-	1
By microscopy only	-	-	-	-	-	-
By culture only	-	-	-	-	-	-
No determination reported	-	-	-	-	-	-
Other respiratory	19	-	-	-	-	3
Determination:						
By microscopy and culture	18	-	-	-	-	3
By microscopy only	1	-	-	-	-	-
By culture only	-	-	-	-	-	-
No determination reported	-	-	-	-	-	-
Non-respiratory	451	7	-	10	3	91
Determination:						
By microscopy and culture	390	6	-	6	2	91
By microscopy only	15	1	-	-	-	-
By culture only	17	-	-	1	1	-
No determination reported	29	-	-	3	-	-

TABLEAU 16. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le diagnostic et la méthode de détermination d'état bacillaire, Canada et provinces, 1988

Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	Diagnostic et méthode
			Alb.	C.B.	T.N.-O.		
<b>nombre</b>							
635	111	149	176	300	4	36	<b>Nombre de cas déclarés</b> Détermination:
577	102	116	159	271	4	35	Par la microscopie et la culture
14	7	4	6	3	-	1	Par la microscopie seulement
8	2	20	1	3	-	-	Par la culture seulement
36	-	9	10	23	-	-	Pas de détermination rapportée
464	91	126	123	233	4	30	<b>Respiratoire</b> Détermination:
432	83	102	111	218	4	29	Par la microscopie et la culture
8	6	4	1	1	-	1	Par la microscopie seulement
2	2	13	1	1	-	-	Par la culture seulement
22	-	7	10	13	-	-	Pas de détermination rapportée
420	70	78	93	188	3	22	<b>Pulmonaire</b> Détermination:
392	63	74	90	178	3	21	Par la microscopie et la culture
7	5	2	1	1	-	1	Par la microscopie seulement
2	2	1	-	1	-	-	Par la culture seulement
19	-	1	2	8	-	-	Pas de détermination rapportée
8	7	1	5	6	-	1	<b>Miliaire</b> Détermination:
5	7	-	4	6	-	1	Par la microscopie et la culture
1	-	-	-	-	-	-	Par la microscopie seulement
-	-	-	-	-	-	-	Par la culture seulement
2	-	-	1	-	-	-	Pas de détermination rapportée
6	3	41	17	18	1	4	<b>Primaire</b> Détermination:
6	3	24	10	13	1	4	Par la microscopie et la culture
-	-	1	-	-	-	-	Par la microscopie seulement
-	-	10	-	-	-	-	Par la culture seulement
-	-	6	7	5	-	-	Pas de détermination rapportée
18	10	6	5	21	-	3	<b>Pleurésie (tuberculeuse)</b> Détermination:
17	10	4	4	21	-	3	Par la microscopie et la culture
-	-	-	-	-	-	-	Par la microscopie seulement
-	-	2	1	-	-	-	Par la culture seulement
1	-	-	-	-	-	-	Pas de détermination rapportée
-	-	-	-	-	-	-	<b>Laryngite tuberculeuse</b> Détermination:
-	-	-	-	-	-	-	Par la microscopie et la culture
-	-	-	-	-	-	-	Par la microscopie seulement
-	-	-	-	-	-	-	Par la culture seulement
-	-	-	-	-	-	-	Pas de détermination rapportée
12	1	-	3	-	-	-	<b>Autres respiratoires</b> Détermination:
12	-	-	3	-	-	-	Par la microscopie et la culture
-	1	-	-	-	-	-	Par la microscopie seulement
-	-	-	-	-	-	-	Par la culture seulement
-	-	-	-	-	-	-	Pas de détermination rapportée
171	20	23	53	67	-	6	<b>Non respiratoire</b> Détermination:
145	19	14	48	53	-	6	Par la microscopie et la culture
6	1	-	5	2	-	-	Par la microscopie seulement
6	-	7	-	2	-	-	Par la culture seulement
14	-	2	-	10	-	-	Pas de détermination rapportée

36

**TABLE 16. New Active and Reactivated Cases and Percentage Distribution by Diagnosis and Method of Determination of Bacillary Status, Canada and Provinces, 1988 - Concluded**

Diagnosis and method	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.
		T.-N.	I.-P.-É.	N.-É.		
percentage distribution						
Number of cases notified	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Determination:						
By microscopy and culture	91.6	93.9	25.0	76.9	77.8	100.0
By microscopy only	2.1	4.6	50.0	-	11.1	-
By culture only	2.0	-	25.0	11.5	5.6	-
No determination reported	4.2	1.5	-	11.5	5.6	-
Respiratory	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Determination:						
By microscopy and culture	93.2	94.8	25.0	87.5	80.0	-
By microscopy only	1.8	3.4	50.0	-	13.3	-
By culture only	1.5	-	25.0	12.5	-	-
No determination reported	3.6	1.7	-	-	6.7	-
Pulmonary	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Determination:						
By microscopy and culture	95.2	95.4	33.3	87.5	84.6	100.0
By microscopy only	1.7	4.7	33.3	-	7.7	-
By culture only	0.7	-	33.3	12.5	-	-
No determination reported	2.5	-	-	-	7.7	-
Miliary	100.0	100.0	-	-	-	100.0
Determination:						
By microscopy and culture	86.5	100.0	-	-	-	100.0
By microscopy only	5.4	-	-	-	-	-
By culture only	-	-	-	-	-	-
No determination reported	8.1	-	-	-	-	-
Primary	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0
Determination:						
By microscopy and culture	69.0	87.5	-	-	-	100.0
By microscopy only	2.0	-	100.0	-	-	-
By culture only	10.0	-	-	-	-	-
No determination reported	19.0	12.5	-	-	-	-
Pleurisy (tuberculous)	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0
Determination:						
By microscopy and culture	94.3	100.0	-	-	50.0	100.0
By microscopy only	1.2	-	-	-	50.0	-
By culture only	3.5	-	-	-	-	-
No determination reported	1.2	-	-	-	-	-
Tuberculous laryngitis	100.0	100.0	-	-	-	100.0
Determination:						
By microscopy and culture	100.0	100.0	-	-	-	100.0
By microscopy only	-	-	-	-	-	-
By culture only	-	-	-	-	-	-
No determination reported	-	-	-	-	-	-
Other respiratory	100.0	-	-	-	-	100.0
Determination:						
By microscopy and culture	94.7	-	-	-	-	100.0
By microscopy only	5.3	-	-	-	-	-
By culture only	-	-	-	-	-	-
No determination reported	-	-	-	-	-	-
Non-respiratory	100.0	100.0	-	100.0	100.0	100.0
Determination:						
By microscopy and culture	86.5	85.7	-	60.0	66.7	100.0
By microscopy only	3.3	14.3	-	-	-	-
By culture only	3.8	-	-	10.0	33.3	-
No determination reported	6.4	-	-	30.0	-	-

TABLEAU 16. Nouveaux cas actifs et réactivés et la répartition procentuelle suivant le diagnostic et la méthode de détermination d'état bacillaire, Canada et provinces, 1988 - fin

Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	Diagnostic et méthode
			Alb.	C.B.	T.N.-O.		
<b>répartition procentuelle</b>							
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Nombre de cas déclarés
							Détermination:
90.9	91.9	77.9	90.3	90.3	100.0	97.2	Par la microscopie et la culture
2.2	6.3	2.7	3.4	1.0	-	2.8	Par la microscopie seulement
1.3	1.8	13.4	0.6	1.0	-	-	Par la culture seulement
5.7	-	6.0	5.7	7.7	-	-	Pas de détermination rapportée
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Respiratoire
							Détermination:
93.1	91.2	81.0	90.2	93.6	-	-	Par la microscopie et la culture
1.7	6.6	3.2	0.8	0.4	-	-	Par la microscopie seulement
0.4	2.2	10.3	0.8	0.4	-	-	Par la culture seulement
4.7	-	5.6	8.1	5.6	-	-	Pas de détermination rapportée
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Pulmonaire
							Détermination:
93.3	90.0	94.9	96.8	94.7	100.0	95.5	Par la microscopie et la culture
1.7	7.1	2.6	1.1	0.5	-	4.6	Par la microscopie seulement
0.5	2.9	1.3	-	0.5	-	-	Par la culture seulement
4.5	-	1.3	2.2	4.3	-	-	Pas de détermination rapportée
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	Miliaire
							Détermination:
62.5	100.0	-	80.0	100.0	-	100.0	Par la microscopie et la culture
12.5	-	100.0	-	-	-	-	Par la microscopie seulement
-	-	-	-	-	-	-	Par la culture seulement
25.0	-	-	20.0	-	-	-	Pas de détermination rapportée
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Primaire
							Détermination:
100.0	100.0	58.5	58.8	72.2	100.0	100.0	Par la microscopie et la culture
-	-	2.4	-	-	-	-	Par la microscopie seulement
-	-	24.4	-	-	-	-	Par la culture seulement
-	-	14.6	41.2	27.8	-	-	Pas de détermination rapportée
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	Pleurésie (tuberculeuse)
							Détermination:
94.4	100.0	66.7	80.0	100.0	-	100.0	Par la microscopie et la culture
-	-	-	-	-	-	-	Par la microscopie seulement
-	-	33.3	20.0	-	-	-	Par la culture seulement
5.6	-	-	-	-	-	-	Pas de détermination rapportée
-	-	-	-	-	-	-	Laryngite tuberculeuse
-	-	-	-	-	-	-	Détermination:
-	-	-	-	-	-	-	Par la microscopie et la culture
-	-	-	-	-	-	-	Par la microscopie seulement
-	-	-	-	-	-	-	Par la culture seulement
-	-	-	-	-	-	-	Pas de détermination rapportée
100.0	100.0	-	100.0	-	-	-	Autres respiratoires
100.0	-	-	100.0	-	-	-	Détermination:
-	100.0	-	-	-	-	-	Par la microscopie et la culture
-	-	-	-	-	-	-	Par la microscopie seulement
-	-	-	-	-	-	-	Par la culture seulement
-	-	-	-	-	-	-	Pas de détermination rapportée
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	Non respiratoire
							Détermination:
84.8	95.0	60.9	90.6	79.1	-	100.0	Par la microscopie et la culture
3.5	5.0	-	9.4	3.0	-	-	Par la microscopie seulement
3.5	-	30.4	-	3.0	-	-	Par la culture seulement
8.2	-	8.7	-	14.9	-	-	Pas de détermination rapportée

TABLE 17. New Active and Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary, Diagnosis, Canada and Provinces, 1988  
 TABLEAU 17. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le nombre de bacillaires et le diagnostic, Canada et provinces, 1988

Diagnosis Diagnostic	Canada	Nfld.			P.E.I.			N.S.			Alta.			B.C.		N.W.T.	
		T.-N.	I.P.-É.	N.É.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alb.	C.B.	Yukon	T.N.-O.				
<i>/bacillus</i>																	
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés	1,962	65	4	26	18	438	635	111	149	176	300	4	36				
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	1,625	54	4	17	15	421	527	96	103	129	228	4	27				
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	82.8	83.1	100.0	65.4	83.3	96.1	83.0	86.5	69.1	73.3	76.0	100.0	75.0				
rate per 100,000 population - taux pour 100,000 habitants																	
Cases notified - Cas déclarés	7.6	11.4	3.1	3.0	2.5	6.6	6.7	10.2	14.7	7.4	10.1	15.8	69.0				
Bacillary cases - Cas bacillaires	6.3	9.5	3.1	1.9	2.1	6.3	5.6	8.9	10.2	5.4	7.7	15.8	51.8				
Respiratory, number of cases notified - Respiratoire, nombre de cas déclarés	1,511	58	4	16	15	347	464	91	126	123	233	4	30				
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	1,259	47	4	12	12	330	385	81	89	87	185	4	23				
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	83.3	81.0	100.0	75.0	80.0	95.1	83.0	89.0	70.6	70.7	79.4	100.0	76.7				
Pulmonary, number of cases notified - Pulmonaire, nombre de cas déclarés	1,266	43	3	16	13	317	420	70	78	93	188	3	22				
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	1,110	37	3	12	11	303	353	64	68	78	159	3	19				
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	87.7	86.1	100.0	75.0	84.6	95.6	84.1	91.4	87.2	83.9	84.6	100.0	86.4				
Miliary, number of cases notified - Miliaire, nombre de cas déclarés	37	2	-	-	-	7	8	7	1	5	6	-	1				
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	31	2	-	-	-	7	6	6	1	3	6	-	-				
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	83.8	100.0	-	-	-	100.0	75.0	85.7	100.0	60.0	100.0	-	-				
Primary, number of cases notified - Primaire, nombre de cas déclarés	100	8	1	-	-	1	6	3	41	17	18	1	4				
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	40	4	1	-	-	1	4	-	18	3	6	1	2				
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	40.0	50.0	100.0	-	-	100.0	66.7	-	43.9	17.7	33.3	100.0	50.0				
Pleurisy (tuberculous), number of cases notified - Pleurésie (tuberculeuse), nombre de cas déclarés	87	4	-	-	2	18	18	10	6	5	21	-	3				
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	59	3	-	-	1	15	11	10	2	1	14	-	2				
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	67.8	75.0	-	-	50.0	83.3	61.1	100.0	33.3	20.0	66.7	-	66.67				

TABLE 17. New Active and Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary, Diagnosis, Canada and Provinces, 1988 - Concluded

TABLEAU 17. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le nombre de bacillaires et le diagnostic, Canada et provinces, 1988 - fin

Diagnosis Diagnostic	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.B.	Qué. Qué.	Ont. Ont.	Man. Man.	Sask. Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon T.N.-O.	N.W.T. N.W.T.
Tuberculous laryngitis, number of cases notified - Laryngite tuberculeuse, nombre de cas déclarés		2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés		2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	100.0	100.0	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-
Other respiratory, number of cases notified - Autres respiratoires, nombre de cas déclarés	19	-	-	-	-	3	12	1	-	3	-	-	-
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	17	-	-	-	-	3	11	1	-	2	-	-	-
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	89.5	-	-	-	-	100.0	91.7	100.0	-	66.7	-	-	-
Non-respiratory, number of cases notified - Non respiratoire, nombre de cas déclarés	451	7	-	10	3	91	171	20	23	53	67	-	6
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	366	7	-	5	3	91	142	15	14	42	43	-	4
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	81.2	100.0	-	50.0	100.0	100.0	83.0	75.0	60.9	79.3	64.2	-	66.7

TABLE 18. New Active and Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary and Origin, Canada and Provinces, 1988  
TABLEAU 18. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le nombre de bacillaires et l'origine, Canada et provinces, 1988

Origin Origine	Canada	Nfld. T.-N.	P.E.I. I.-P.-É.	N.S. N.-É.	N.B. N.B.	Qué. Qué.	Ont. Ont.	Man. Man.	Sask. Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.-B.	Yukon T.N.-O.	N.W.T. N.W.T.	
Number of cases notified - Nombre de cas déclarés	1,962	65	4	26	18	438	635	111	149	176	300	4	36	
Number reported positive Bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	1,625	54	-	4	17	15	421	527	96	103	129	228	4	27
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	82.8	83.1	100.0	65.4	83.3	96.1	83.0	86.5	69.1	73.3	76.0	100.0	75.0	
Cases notified - Cas déclarés	7.6	11.4	3.1	3.0	2.5	6.6	6.7	10.2	14.7	7.4	10.1	15.8	69.0	
Bacillary cases - Cas bacillaires	6.3	9.5	3.1	1.9	2.1	6.3	5.6	8.9	10.2	5.4	7.7	15.8	51.8	
Indians, number of cases notified - Indiens, nombre de cas déclarés	311	7	-	1	-	6	7	41	99	58	69	3	20	
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	226	5	-	1	-	5	7	36	67	36	49	3	17	
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	72.7	71.4	-	100.0	-	83.3	100.0	87.8	67.7	62.1	71.0	100.0	85.0	

TABLE 18. New Active and Reactivated Cases by Number Testing Positive Bacillary and Origin, Canada and Provinces, 1988 - Concluded

TABLEAU 18. Nouveaux cas actifs et réactivés suivant le nombre de bacillaires et l'origine, Canada et provinces, 1988 - fin

Origin Origine	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
		T.-N.	i.P.-É.	N.É.						Alb.	C.B.		
Inuit, number of cases notified - Inuit, nombre de cas déclarés	26	4	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	15
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	20	4	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	9
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	76.9	100.0	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	60.0
Other, number of cases notified - Autres, nombre de cas déclarés	1,625	54	4	25	18	425	628	70	50	118	231	1	1
Number reported positive bacillary - Nombre de cas bacillaires positifs rapportés	1,379	45	4	16	15	409	520	60	36	93	179	1	1
Bacillary as percentage of cases notified - Cas bacillaires par pourcentage de cas déclarés	84.9	83.3	100.0	64.0	83.3	96.2	82.8	85.7	72.0	78.8	77.5	100.0	100.0

TABLE 19. Reactivated Cases by Length of Inactive Interval, Canada and Provinces, 1988

TABLEAU 19. Cas réactivés suivant l'intervalle inactif, Canada et provinces, 1988

Length of inactive interval Durée de l'intervalle inactif	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.
		T.-N.	i.P.-É.	N.É.						Alb.	C.B.		
Total	176	9	-	2	3	16	75	9	15	16	29	-	2
0 - 1 year - an	15	-	-	-	1	10	-	1	1	2	-	-	-
1 - 2 years - ans	5	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-
2 - 3 "	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
3 - 4 "	4	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-
4 - 5 "	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
5 - 6 "	6	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-
6 - 7 "	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
7 - 8 "	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
8 - 20 "	33	2	-	1	8	11	2	4	2	3	-	-	-
20 years and over - ans et plus	93	7	-	2	2	3	40	3	7	8	19	-	2
Not stated - Non précisée	10	-	-	-	2	3	0	1	2	2	-	-	-

TABLE 20. Notifications of Reactivated Cases by Origin and Sex, Canada and Provinces, 1988

TABLEAU 20. Déclarations de cas réactivés suivant l'origine et le sexe, Canada et provinces, 1988

Origin and sex Origine et sexe	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T. T.N.-O.	
		T.-N.	i.P.-É.	N.É.						Alb.	C.B.			
Total	T.	176	9	-	2	3	16	75	9	15	16	29	-	2
	M.	111	7	-	1	1	15	45	6	11	8	16	-	1
	F.	65	2	-	1	2	1	30	3	4	8	13	-	1
Indians - Indiens	T.	30	1	-	-	-	-	1	6	10	4	7	-	1
	M.	20	-	-	-	-	-	1	4	8	3	4	-	-
	F.	10	1	-	-	-	-	-	2	2	1	3	-	1
Inuit	T.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M.	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	F.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other - Autres	T.	144	7	-	2	3	16	74	3	5	12	22	-	-
	M.	89	6	-	1	1	15	44	2	3	5	12	-	-
	F.	55	1	-	1	2	1	30	1	2	7	10	-	-

**Post-censal Population Estimates, by Sex and Age Group, Canada and Provinces, June 1st, 1988.**  
**Estimations postcensitaires de la population, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada et provinces, 1er juin, 1988.**

Sex and age Sexe et âge	Canada T.-N. I.-P.-É	Nfld. P.E.I. N.S. N.B. Que.	Ont. Man.	Sask.	Alta. Alb.	B.C. C.B.	Yukon N.W.T. T.N.-O
thousands - milliers							
Total	25,911.7	568.0	128.8	882.8	714.3	6,638.2	9,426.2
< 1	376.8	7.5	2.0	12.2	9.6	86.6	138.1
1-4	1,461.1	33.5	7.7	48.5	39.6	337.6	523.5
5-9	1,826.3	46.2	9.9	61.0	51.7	466.1	631.2
10-14	1,791.5	52.1	9.9	63.2	56.0	455.5	626.3
15-19	1,898.1	56.1	10.5	70.3	59.5	454.2	688.4
20-24	2,111.6	51.3	11.0	76.2	60.4	540.3	776.9
25-29	2,376.5	47.1	10.7	79.8	61.6	619.0	867.0
30-34	2,298.6	47.5	10.4	75.1	61.6	608.0	814.7
35-39	2,067.2	45.0	9.5	67.7	56.3	546.7	743.6
40-44	1,818.3	37.8	8.4	60.1	48.6	490.7	666.8
45-49	1,423.9	27.5	6.3	46.2	36.7	388.8	527.2
50-54	1,228.2	23.1	5.6	39.8	30.5	325.8	463.5
55-59	1,216.4	21.6	5.4	38.3	30.1	327.4	458.9
60-64	1,138.5	19.5	5.1	36.5	29.2	297.4	436.1
65-69	989.3	18.3	5.0	35.3	27.3	244.9	371.4
70-74	755.8	14.4	4.2	29.2	21.9	185.2	272.4
75-79	551.1	10.2	3.3	21.2	16.4	132.6	201.8
80-84	335.0	5.3	2.0	12.6	9.7	78.9	123.8
85 >	247.5	4.0	1.9	9.6	7.6	52.5	94.6
<b>Male -</b>							
<b>Masculin</b>	<b>12,777.3</b>	<b>284.1</b>	<b>63.6</b>	<b>433.0</b>	<b>505.0</b>	<b>3,347.1</b>	<b>4,399.2</b>
< 1	193.0	3.9	1.0	6.2	5.0	44.4	71.0
1-4	748.3	16.9	3.9	24.9	172.9	267.7	33.7
5-9	935.8	23.5	5.0	31.0	26.6	239.2	323.1
10-14	918.3	26.9	5.1	32.5	28.4	233.9	320.7
15-19	974.8	28.7	5.5	36.1	30.7	233.1	353.9
20-24	1,066.9	25.4	5.5	38.8	30.5	273.2	393.6
25-29	1,184.9	23.1	5.4	39.8	30.6	309.0	432.3
30-34	1,140.6	23.2	5.2	37.1	30.5	301.8	401.2
35-39	1,027.6	22.4	4.7	33.7	27.9	271.2	366.0
40-44	910.5	19.9	4.2	30.1	24.6	243.8	332.5
45-49	713.2	13.9	3.2	22.9	18.5	193.1	263.5
50-54	613.4	11.8	2.8	19.9	15.1	159.7	231.5
55-59	602.7	11.0	2.7	18.7	14.7	158.0	228.3
60-64	542.3	9.7	2.4	17.2	13.8	138.9	207.4
65-69	449.6	9.0	2.3	16.1	12.5	109.0	168.7
70-74	329.8	6.7	1.9	12.9	9.8	77.5	118.9
75-79	226.5	4.5	1.4	9.0	7.0	51.3	82.3
80-84	123.9	2.2	0.8	4.8	3.6	27.1	43.9
85 >	75.2	1.4	0.6	1.3	2.3	15.2	26.7
<b>Female -</b>							
<b>Féminin</b>	<b>13,134.4</b>	<b>284.5</b>	<b>65.5</b>	<b>448.4</b>	<b>361.8</b>	<b>3,386.2</b>	<b>4,792.7</b>
< 1	183.8	3.6	1.0	6.0	4.6	42.2	67.1
1-4	712.8	16.6	3.8	23.7	19.4	164.6	255.8
5-9	890.5	22.7	4.8	30.0	25.0	226.9	308.1
10-14	873.2	25.2	4.8	30.8	27.6	221.7	305.5
15-19	923.4	27.4	5.0	34.1	28.9	221.1	334.5
20-24	1,044.7	25.8	5.5	37.3	29.9	267.1	383.4
25-29	1,191.6	24.0	5.3	40.0	31.0	310.1	434.7
30-34	1,158.0	24.3	5.2	38.0	31.1	306.2	413.5
35-39	1,039.6	22.6	4.8	34.1	28.4	275.5	377.5
40-44	907.8	18.7	4.2	30.1	24.0	246.9	334.2
45-49	710.6	13.6	3.1	23.2	18.1	195.7	263.7
50-54	614.8	11.3	2.8	19.9	15.4	166.2	232.0
55-59	613.7	10.6	2.6	19.6	15.4	169.4	230.6
60-64	596.2	9.8	2.6	19.3	15.4	158.6	228.7
65-69	539.7	9.3	2.7	19.2	14.8	135.9	202.7
70-74	426.0	7.7	2.3	16.3	12.1	107.7	153.4
75-79	324.6	5.6	1.9	12.2	9.4	81.3	119.5
80-84	211.1	3.1	1.2	7.8	6.0	51.8	79.9
85 >	172.3	2.6	1.3	6.8	5.3	37.3	67.9

Demography Division, Population Estimates Section, Statistics Canada - Division de la démographie, Section des estimations démographiques, Statistique Canada.





STATISTICS CANADA LIBRARY  
BIBLIOTHÈQUE STATISTIQUE CANADA



1010491501