



LE VIH AU CANADA: Les points saillants de la surveillance pour 2018


Cas déclarés de VIH par catégorie d'exposition chez les femmes adultes



Cas déclarés de VIH par catégorie d'exposition chez les hommes adultes




Les femmes représentaient 29.3% des nouveaux cas déclarés




Les hommes représentaient 70.7% des nouveaux cas déclarés

2561 NOUVEAUX CAS DE VIH DÉCLARÉS EN 2018


Répartition des nouveaux cas de VIH par groupe d'âge et par sexe



Taux de diagnostic pour 100 000 habitants



Cas de VIH déclarés par statut d'Autochtone ou de Non-Autochtone



En 2018:

- Le taux de diagnostic a augmenté de 6.5 pour 100 000 habitants en 2017 à 6.9 pour 100 000 habitants en 2018
- Les gbHARSAH représentaient le pourcentage le plus élevé par catégorie d'exposition, mais ce pourcentage a diminué au cours du temps
- Le nombre et le taux de diagnostic féminin ont augmenté

259 enfants ont été exposés au VIH durant la grossesse
96.5% des mères séropositives recevaient la thérapie antirétrovirale périnatale

5 enfants étaient infectés par le VIH :
2 mères avaient reçu la thérapie antirétrovirale périnatale
3 mères n'avaient pas reçu la thérapie antirétrovirale périnatale

Référence:

Haddad N, Robert A, Weeks A, Popovic N, Siu W and Archibald C. Le VIH au Canada - Rapport de surveillance, 2018. Relevé des maladies transmissibles au Canada. 2019

Pub. 190424 | Cat. HP40-237/2018E-1-PDF | 978-0-660-33108-9