

Virus de l'hépatite C (VHC)

Dépistage et diagnostic Pour les professionnels de la santé





44 % des personnes vivant avec le VHC ne savent pas qu'elles sont infectées

Offrir le dépistage à :

L'hépatite C est souvent

ASYMPTOMATIQUE

Services personnels (p. ex. tatouage ou perçage) avec matériel non stérile



Réception d'une transfusion sanguine, de produits sanguins ou d'une greffe d'organe avant 1992





possiblement non stérile Exposition à

Réception de

soins médicaux

avec du matériel







du sang lors d'activité sexuelle

Partage de matériel de consommation de drogues,

même une seule fois







Diagnostic de VIH ou d'hépatite B



Symptômes ou signes cliniques de maladie hépatique



Exposition en milieu de travail (p. ex. piqûre d'aiguille)

Diagnostic de l'hépatite C:

Le diagnostic de l'infection par le VHC nécessite deux tests

Adoptez une **APPROCHE ACTIVE** pour le dépistage

Test de dépistage des anticorps anti-hépatite C (ANTI-VHC)



Infection par le VHC (actuelle ou résolue)

Aucune infection par le VHC

Test de détection de l'acide ribonucléique du VHC (ARN du VHC)

ARN VHC



Aucune infection par le VHC (résolue)

Orientation aux soins:

L'hépatite C est **CURABLE**

Les traitements antiviraux à action directe sans interféron offrent une réponse virologique soutenue >90 %



Les régimes de traitement durent de 8 à 24 semaines et ont peu d'effets secondaires



Consultez un professionnel de la santé expérimenté dans la prise en charge de l'hépatite virale

Pour plus d'informations,

consultez Canada.ca et recherchez l'hépatite C pour les professionnels de la santé

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par la ministre de la Santé, 2018 | Cat. : HP40-254/2019F-PDF | ISBN : 978-0-660-31801-1 | Pub. : 190196



Public Health publique du Canada Agency of Canada

