

## Du 9 février au 15 février 2020 (semaine de déclaration 07)

### Sommaire global


- L'activité grippale est demeurée élevée en semaine 07. Toutefois, la plupart des indicateurs sont restés similaires ou ont légèrement diminué par rapport à la semaine précédente.
- La grippe A(H1N1) est actuellement la grippe A dominante en circulation au Canada, représentant 83 % des échantillons de grippe A sous-typés à la semaine 07.
- Les taux d'hospitalisation cumulatifs les plus élevés sont ceux des enfants de moins de 5 ans et des adultes de 65 ans et plus.
- Le Réseau canadien de surveillance sentinelle (RCSS) a publié des estimations intérimaires de l'efficacité vaccinale (EV) selon lesquelles le vaccin antigrippal 2019-2020 a permis de parvenir à une protection significative contre les syndromes grippaux nécessitant des soins médicaux dans la première partie de la saison au Canada. Selon cette publication, l'efficacité du vaccin (EV) contre la grippe saisonnière était estimée à 58 % par tout type de grippe, 44 % pour la souche A(H1N1), 62 % pour la souche A(H3N2) et 69 % pour la grippe B.

### Activité grippale et pseudogrippale (propagation géographique)

Au cours de la semaine 07, presque toutes les régions (44 sur 45) des provinces et territoires participant ont signalé de l'activité grippale. Parmi ces régions, 40 % ont fait état d'une activité sporadique, 56 % d'une activité localisée et 2 % d'une activité généralisée (figure 1).

**Figure 1 – Carte de l'activité grippale et pseudogrippale par province et territoire, Canada, semaine 2020-07**

Nombre de régions qui ont fait état de la situation dans la semaine 07 : 45 sur 53



## Détections de la grippe confirmée en laboratoire

À la semaine 07, la part des essais en laboratoire révélant un résultat positif pour la grippe était similaire à celle des deux semaines précédentes (29 %). Ce chiffre reste similaire à celui du pic signalé depuis la fin décembre. Les gripes A et B sont toujours en circulation.

Les résultats suivants ont été signalés par des laboratoires sentinelles au Canada (figures 2 et 3) :

- Le pourcentage de tests positifs pour la grippe B était de 13 % à la semaine 07. Ce taux est toujours plus de deux fois la moyenne (5,3 %) pour cette période de l'année.
- Le pourcentage de tests positifs pour la grippe A était de 16 % à la semaine 07, ce qui est similaire à les six semaines précédentes, et inférieur à la moyenne pour cette période de l'année
- Parmi les détections de grippe A sous-typée, la grippe A(H1N1) comptait pour 83 % des détections, ce qui est similaire à les deux semaines précédentes.

À ce jour cette saison (semaines 35 à 07), 38 671 détections de grippe en laboratoire ont été signalées :

- 57 % (22 035) étaient de type A.
- Parmi les détections de grippe A sous-typée (5 279), le virus A(H1N1) est maintenant le sous-type prédominant dans l'ensemble cette saison avec une légère majorité (64 %).


Des informations détaillées sur l'âge et le type / sous-type ont été reçues pour 30 142 cas de grippe confirmés en laboratoire (tableau 1). À ce jour cette saison (semaines 35 à 07) :

- Parmi les cas de la grippe A(H3N2) (1 662), la plus grande proportion concernaient des adultes de 65 ans et plus (46 %).
- Les cas de la grippe B (13 795) étaient principalement dans les groupes d'âge plus jeunes; 57 % des cas avaient moins de 19 ans, et 30 % avaient entre 20 et 44 ans.
- Parmi les cas de grippe A(H1N1) (2 414), 30 % des cas concernaient des adultes de 65 ans et plus, avec des proportions à peu près égales chez les adultes de 20 à 44 ans et de 45 à 64 ans (~25 %).

Pour obtenir des données cumulatives et hebdomadaires plus détaillées sur la grippe, veuillez lire la description pour les [figures 2 et 3](#) ou le rapport intitulé [Détection de virus des voies respiratoires au Canada](#).


### Figure 2 – Nombre et pourcentage de tests de détection de la grippe positifs, par type, sous-type et semaine de surveillance, Canada, semaines 2019-35 à 2020-07

Nombre de laboratoires qui ont fait état de la situation dans la semaine 07 : 35 sur 36



La zone ombragée désigne les semaines où le taux de positivité était d'au moins 5 % et où le nombre minimal de tests positifs était de 15, signalant le début et la fin de [l'activité grippale saisonnière](#) (article en anglais seulement).

**Figure 3 – Distribution des échantillons de grippe positifs, par type/sous-type et province/territoire\*, Canada, semaines 2019-35 à 2020-07**



\* Les échantillons des T.N.-O., du Yn et du Nt sont envoyés à des laboratoires de référence dans d'autres provinces.

**Tableau 1 – Nombre cumulé d'échantillons positifs pour la grippe, par type, sous-type et groupe d'âge, en fonction des rapports détaillés des cas confirmés en laboratoire, Canada, semaines 2019-35 à 2020-07**

Groupes d'âge (ans)	Cumulatif (25 août 2019 au 15 février 2020)						
	Influenza A				B	Influenza A et B	
	A Total	A(H1N1)	A(H3N2)	A (Non sous-typé) <sup>1</sup>	B Total	#	%
0-4	2645	287	162	2196	3118	5763	19%
5-19	1843	168	215	1460	4804	6647	22%
20-44	3451	624	263	2564	4157	7608	25%
45-64	3164	608	252	2304	764	3928	13%
65+	5244	727	770	3747	952	6196	21%
<b>Total</b>	<b>16347</b>	<b>2414</b>	<b>1662</b>	<b>12271</b>	<b>13795</b>	<b>30142</b>	<b>100%</b>

<sup>1</sup> Non sous-typé : L'échantillon a été typé en tant que grippe A, mais aucun résultat n'était disponible pour ce qui est du sous-type.


## Surveillance syndromique/syndrome grippal

### Surveillance syndromique assurée par les professionnels de la santé sentinelles

Au cours de la semaine 07, 1,4 % des consultations auprès de professionnels des soins de santé étaient attribuables à un syndrome grippal (SG) ce qui est en dessous de la moyenne pour cette période de l'année (figure 4).

**Figure 4 – Pourcentage de visites pour le syndrome grippal déclarées par les sentinelles chaque semaine, Canada, semaines 2019-35 à 2020-07**

Nombre de sentinelles qui ont fait état de la situation au cours de la semaine 07: 90



La zone ombrée en bleu représente les pourcentages maximal et minimal signalé par semaine des saisons 2014-2015 à 2018-2019.

### Surveillance syndromique participative

La part des participants au programme FluWatchers indiquant des symptômes de toux et de fièvre a diminué au cours de la semaine 07 comparativement à la semaine précédente. Au cours de la semaine 07, 3 044 participants ont soumis des données au programme FluWatchers. De ce nombre, 2,6 % (79) ont signalé des symptômes une toux et de la fièvre (figure 5).


Parmi les 79 participants qui ont signalé une toux et de la fièvre :

- 22 % ont consulté un professionnel de la santé.
- 66 % ont signalé avoir manqué des jours de travail ou d'école, soit un total combiné de 187 jours d'absence au travail ou à l'école.

Si vous souhaitez participer au programme [FluWatchers](#), [inscrivez-vous aujourd'hui](#).


**Figure 5 – Pourcentage de participants au programme FluWatchers qui ont signalé une toux et de la fièvre, Canada, semaines 2019-40 à 2020-07**

Nombre de participants qui ont soumis des données pour la semaine 07: 3 044



**Figure en ligne - Répartition géographique des participants au programme FluWatchers ayant signalé une toux et de la fièvre, Canada, semaine 2020-07**

Cliquez sur la carte pour accéder au lien




## Surveillance des éclosions de la grippe

Au cours de la semaine 07, 31 éclosions ont été signalées : 20 dans des établissements de soins de longue durée, 10 dans des établissements [classé dans la catégorie « autre »](#), qui peut inclure des maisons de retraite, des établissements correctionnels, des collèges/universités, et une dans une école ou garderie (figure 6). De plus, 7 éclosions de syndrome grippal ont été signalées dans des écoles ou garderies.

À ce jour cette saison, au total 702 éclosions de la grippe confirmée en laboratoire ont été signalées : 61 % (430) dans des établissements de soins de longue durée, 26 % (185) dans des établissements classés dans la catégorie « autre », 11 % (74) dans des établissements de soins de courte durée, et 2 % (13) dans des écoles ou garderies. Parmi les 668 éclosions pour lesquelles le type de virus de la grippe a été signalé, 88 % (588) étaient associées à la grippe de type A. Parmi les 264 éclosions de la grippe A pour lesquelles le sous-type de virus a été signalé, 52 % (136) étaient associées à la grippe de type A(H3N2). À ce jour cette saison, 119 éclosions de syndrome grippal ont été signalées dans des écoles ou garderies.

**Figure 6 - Nombre de nouvelles éclosions de la grippe confirmées en laboratoire par semaine, Canada, semaines 2019-35 à 2020-07**

Nombre de provinces et territoires qui ont fait état de la situation au cours de la semaine 07: 11 sur 13



## Surveillance des cas sévères de grippe

### Hospitalisations et décès associés à la grippe déclarés par les provinces et territoires

À ce jour cette saison, 1 687 hospitalisations associées à la grippe ont été signalées par les provinces et territoires participants<sup>1</sup>.


- 65 % des cas étaient associées à la grippe A.
- Parmi les cas pour lesquels le sous-type de la grippe a été signalé (786), 61 % étaient associées à la grippe A(H3N2).
- Jusqu'à la semaine 07, les taux cumulés d'hospitalisations les plus élevés concernaient les enfants de moins de 5 ans, ainsi que les adultes de 65 ans et plus (54/100 000 de la population).

189 admissions à une unité de soins intensifs et 64 décès ont été signalés.

65 % des admissions à une unité de soins intensifs et 72 % des décès étaient associées à la grippe A.

**Figure 7 - Taux cumulatif d'hospitalisations associées à la grippe, par groupe d'âge et semaine de surveillance, Canada, signalées par les provinces et territoires participants<sup>1</sup>, Canada, semaines 2019-35 à 2020-07**

Nombre de provinces et territoires qui ont fait état de la situation au cours de la semaine 07: 8 sur 9



<sup>1</sup>Des hospitalisations attribuables à la grippe sont déclarés par l'Alberta, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, les Territoires du Nord-Ouest, et le Yukon. Seules les hospitalisations nécessitant des soins médicaux intensifs sont signalées par la Saskatchewan.

## Hospitalisations et décès associés à la grippe chez les enfants


Au cours de la semaine 07, 69 hospitalisations associées à la grippe confirmée en laboratoire chez les enfants (âgés de 16 ans ou moins) ont été signalées par le réseau du Programme canadien de surveillance active de l'immunisation (IMPACT) (figure 8). Le nombre de cas attribuables à la grippe B demeure élevé. Cependant, ces dernières semaines, une proportion croissante de cas a été attribuable à la grippe A.

Le nombre élevé de cas cette saison par rapport aux saisons précédentes est probablement attribuable à la circulation simultanée de la grippe A et de la grippe B cette saison. Le nombre d'hospitalisations en pédiatrie liées à la grippe A est supérieur à la moyenne pour cette période de l'année, ce qui est courant quand le virus A(H1N1) est la souche prédominante en circulation. Cependant, cette saison, le nombre d'hospitalisations liées à la grippe B est largement supérieur à celui observé au cours des saisons précédentes, et on observe cette tendance plus tôt dans la saison.

À ce jour cette saison (semaines 35 à 07) :

- 951 hospitalisations chez les enfants ont été signalées par le réseau IMPACT, dont 51 % (483) étaient associées à la grippe A et 49 % (468) associées à la grippe B.
- La plus grande proportion des hospitalisations (65 %) concernaient des enfants de moins de cinq ans (figure 9).
- 140 admissions à une unité de soins intensifs ont été signalés, dont 52 % étaient associées à la grippe A.
- Moins de cinq décès ont été signalés.


**Figure 8 – Nombre d'hospitalisations pédiatriques ( $\leq 16$  ans) associées à la grippe signalées par le réseau IMPACT, par semaine, Canada, semaines 2019-35 à 2020-07**



La zone ombrée en bleu représente les nombres de cas maximal et minimal signalé par semaine des saisons 2014-2015 à 2018-2019.



**Figure 9 - Nombre cumulé d'hospitalisations pédiatriques ( $\leq 16$  ans) associées à la grippe par groupe d'âge signalées par le réseau IMPACT, Canada, semaines 2019-35 à 2020-07**




### Hospitalisations et décès associés à la grippe chez les adultes

La surveillance des hospitalisations associées à la grippe confirmée en laboratoire chez les adultes (âgés de 20 ans ou plus) menée par le réseau du Programme canadien de surveillance active de l'immunisation (CIRN) a débuté le 1 novembre pour la saison grippale 2019-20.


À ce jour cette saison, 581 hospitalisations, 53 admissions à une unité de soins intensifs, et 25 décès ont été signalés (figure 10).

- La majorité des hospitalisations ont été associées à la grippe de type A (82 %). Parmi les cas de la grippe A qui ont été sous-typés (162) 91 % étaient la grippe A(H1N1).
- Parmi les 476 cas associées à la grippe A, la plus grande proportion des hospitalisations concernaient des adultes de 65 à 79 ans (35 %) et des adultes de 80 ans et plus (32 %). Parmi les 103 cas de la grippe B, 33 % étaient âgés de 16 à 34 ans (figure 11).
- Dans 87 % des cas d'hospitalisation, on a fait état d'au moins un type de comorbidité.

**Figure 10 - Nombre d'hospitalisations chez les adultes ( $\geq 16$  ans) associées à la grippe signalées par le réseau CIRN-SOS, par semaine, Canada, semaines 2019-35 à 2020-07**



**Figure 11 - Nombre cumulatif d'hospitalisations chez les adultes (≥16 ans) associées à la grippe, par groupe d'âge, signalées par le réseau CIRN-SOS, Canada, semaines 2019-35 à 2020-07**



## Caractérisation des souches grippales

Du 1<sup>er</sup> septembre 2019 au 20 février 2020, le Laboratoire national de microbiologie (LNM) a caractérisé 692 virus de la grippe (355 A(H1N1), 155 A(H3N2) et 182 virus de type B) qui ont été reçus des laboratoires au Canada.

### **Grippe A(H3N2)**

Au cours des dernières années, les souches présentes de la grippe A(H3N2) ont évolué et sont de plus en plus difficiles à caractériser au moyen d'une épreuve d'inhibition de l'hémagglutination (IH). La caractérisation génétique est établie par séquençage du gène de l'hémagglutinine (HA) des virus de la grippe aux fins de comparaison de leurs propriétés génétiques.

#### **Caractérisation antigénique :**

Parmi les 51 virus de la grippe A(H3N2) caractérisés antigéniquement à date cette saison, la majorité (80 %) ont montré une réduction du titre par un test IH utilisant un antisérum obtenu contre le virus A/Kansas/14/2017 cultivé dans des œufs. Dix virus étaient antigéniquement apparentés à A/Kansas/14/2017 (Figure 12a).

#### **Caractérisation génétique :**

Presque la totalité (98 %) des 135 virus de la grippe A(H3N2) caractérisés cette saison appartenaient au groupe génétique 3C.2a1b, en fonction de l'analyse de la séquence du gène de l'hémagglutinine. Trois virus appartenaient au groupe génétique 3C.3a (Figure 13).

Les virus du groupe 3C.2a1b analysés représentent :

- 90 % (28 sur 31) des virus qui étaient davantage caractérisés antigéniquement..
- 100 % (104 sur 104) des virus qui ne se sont pas développés à un titre suffisamment élevé d'hémagglutination pour la caractérisation antigénique par un test IH.

Le virus A/Kansas/14/2017 appartient au sous-groupe génétique 3C.3a. Cette souche est le composant de la grippe A(H3N2) du vaccin antigrippal de l'hémisphère Nord 2019-2020.

## Grippe A(H1N1)

Parmi les 355 virus A(H1N1) caractérisés cette saison, 57 % étaient antigéniquement apparentés à A/Brisbane/02/2018 par un test IH utilisant un antisérum obtenu contre le virus A/Brisbane/02/2018 propagé par culture dans des œufs (Figure 12b).

Le virus A/Brisbane/02/2018 est le composant de la grippe A(H1N1) du vaccin antigrippal de l'hémisphère Nord 2019-2020.

## Grippe de type B

Parmi les 182 virus de la grippe B caractérisés antigéniquement cette saison, la grande majorité (180) appartenait à la lignée Victoria. Deux virus étaient antigéniquement apparentés à B/Phuket/3073/2013 (lignée Yamagata).

La majorité (89 %, 161) des virus de la lignée Victoria ont montré une réduction du titre par un test IH utilisant un antisérum obtenu contre le virus B/Colorado/06/2017 propagé par culture cellulaire (Figure 12c).


L'analyse de séquences des 150 virus montrant une réduction du titre contre le virus B/Colorado/06/2017 a montré que 100 % présentaient une délétion de trois acides aminés (162-164) du gène HA. Le séquençage génétique est en attente pour les autres virus.

Les composants de la grippe B recommandés pour le vaccin antigrippal de l'hémisphère nord 2019-2020 sont B/Colorado/06/2017 (lignée Victoria) et B/Phuket/3073/2013 (lignée Yamagata). B/Phuket/3073/2013 est inclus dans le vaccin antigrippal quadrivalent.

**Figure 12 – Distribution des phénotypes antigéniques parmi les virus de la grippe caractérisés, Canada, 1 septembre 2019 au 20 février 2020**


### A) Virus A(H3N2)

Nombre de virus caractérisés: 51




### B) Virus A(H1N1)

Nombre de virus caractérisés: 355




### C) Virus de la grippe B

Nombre de virus caractérisés: 182



**Figure 13 – Distribution des groupes génétiques parmi les virus de la grippe A(H3N2) caractérisés, Canada, 1 septembre 2019 au 20 février 2020**

Nombre de virus séquencés: 135



## Résistance aux antiviraux

Le Laboratoire national de microbiologie (LNM) évalue également la résistance antivirale des virus de la grippe reçus des laboratoires au Canada. Du 1<sup>er</sup> septembre 2019 au 20 février 2020, les résultats suivants ont été signalés :

### **Oseltamivir**

486 virus de la grippe (140 A(H3N2), 164 A(H1N1) et 182 virus de type B) ont été testés pour leur résistance à l'oseltamivir :

- Tous les virus de la grippe A(H3N2) et de la grippe B analysés étaient sensibles à l'oseltamivir.
- Parmi les virus de la grippe A(H1N1) analysés, 163 (99 %) étaient sensibles à l'oseltamivir, et un virus était résistant à l'oseltamivir, présentant la mutation H275Y dans le gène de la neuraminidase.

### **Zanamivir**

486 virus de la grippe (140 A(H3N2), 164 A(H1N1) et 182 virus de type B) ont été testés pour la résistance au zanamivir :

- Tous les virus de l'influenza analysés étaient sensibles au zanamivir.

### **Amantadine**

Des niveaux élevés de résistance à l'amantadine demeurent parmi les virus de la grippe A(H1N1) et A(H3N2). Tous les virus testés cette saison étaient résistants.

## Surveillance des vaccins

La surveillance des vaccins fait référence aux activités en lien avec le suivi de la couverture et de l'efficacité du vaccin contre la grippe.

### Efficacité vaccinale

Le Réseau canadien de surveillance sentinelle (RCSS) (page en anglais) fournit des estimations de l'efficacité du vaccin contre la grippe saisonnière dans la prévention des syndromes dus à des cas de grippe confirmés en laboratoire nécessitant des soins médicaux chez les Canadiens.

En se fondant sur les données recueillies entre le 1<sup>er</sup> novembre 2019 et le 1<sup>er</sup> février 2020, on estimait l'efficacité vaccinale (EV) à 58 % pour tout type de grippe, 44 % pour la souche A(H1N1), 62 % pour la souche A(H3N2) et 69 % pour la grippe B. On a observé une protection importante chez les enfants et les jeunes âgés de 1 à 19 ans contre la grippe A comme la grippe B. Un niveau de protection significatif a aussi été constaté chez les adultes âgés de 20 à 64 ans pour tous les types de grippe (tableau 2). Chez les adultes de plus de 65 ans et plus, malgré un manque de précision dû à des effectifs faibles, on estimait que l'EV était inférieure à 18 % (IC à 95 % : -59 à 58). Les estimations intérimaires du RCSS sont [accessibles ici](#) (page en anglais).

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le réseau et les résultats précédents concernant l'efficacité vaccinale sur [le site Web du RCSS](#) (page en anglais).

Les estimations mises à jour de l'efficacité vaccinale seront publiées à la fin de la saison de la grippe 2019-2020. Les données disponibles seront alors vraisemblablement suffisantes pour évaluer l'EV selon les groupes d'âge, y compris chez les adultes de 65 ans et plus avec plus de précision, ainsi que pour les sous-types de grippe A.

**Tableau 2 – Estimations de l'efficacité vaccinale contre les syndromes grippaux nécessitant des soins médicaux, RCSS, 1 novembre 2019 au 1 février 2020**

	Tous les âges		1-19 ans	20-64 ans
	EV(%) (IC)*	N	EV(%) (IC)*	EV(%) (IC)*
Tous les types de grippe	58 (47, 66)	2808	74 (59, 84)	55 (41, 66)
Influenza A	49 (34, 60)	2128	70 (44, 84)	45 (25, 59)
Influenza A(H1N1)	44 (26, 58)	1948		
Influenza A(H3N2)	62 (37, 77)	1561		
Influenza B	69 (57, 77)	2080	77 (59, 87)	68 (51, 79)

IC: intervalle de confiance de 95%

\* ajusté en fonction du groupe d'âge, de la province, de l'intervalle de collecte des échantillons et de la durée calendaire

### Couverture vaccinale

Les estimations de la couverture vaccinale antigrippale pour la saison 2019-2020 devraient être disponibles en février ou mars 2020.

## Rapports provinciaux et internationaux sur la grippe

- Colombie-Britannique\* – [Influenza Surveillance; Vaccine Effectiveness Monitoring](#)
- Alberta\* – [Respiratory Virus Surveillance](#)
- Saskatchewan\* – [Influenza Reports](#)
- Manitoba\* – [Seasonal Influenza Reports](#)
- Ontario\* – [Ontario Respiratory Pathogen Bulletin](#)
- Québec – [Système de surveillance de la grippe](#)
- Nouveau Brunswick – [Rapport sur la surveillance de la grippe](#)
- Île-du-Prince-Édouard\* – [Influenza Summary](#)
- Nouvelle-Écosse\* – [Respiratory Watch Report](#)
- Terre-Neuve-et-Labrador\* – [Surveillance and Disease Reports](#)
- Yukon\* – [Information on Pandemic, Influenza, Seasonal Flu, Avian Flu and H1N1](#)
- Territoires du Nord-Ouest\* – [Influenza/ Flu Information](#)
- Nunavut\* – [Influenza Information](#)
- Organisation mondiale de la Santé\* – [FluNet \(Global Influenza Surveillance Network\)](#)
- Organisation panaméricaine de la santé (OPS)\* – [Rapport sur la situation de l'influenza de l'Organisation panaméricaine de la santé](#)
- U.S. Centers for Disease Prevention & Control (CDC)\* - [Weekly Influenza Summary Update](#)
- ECDC\* – [Surveillance reports and disease data on seasonal influenza](#)
- United Kingdom\* – [Weekly Influenza Activity Reports](#)
- Hong Kong Centre for Health Protection\* - [Flu Express](#)
- Australie\* – [Influenza Surveillance Report and Activity Updates](#)
- Nouvelle-Zélande\* – [Influenza Weekly Update](#)

\*Disponible en Anglais seulement

## Notes

Les chiffres présentés dans les rapports FluWatch correspondent aux données de surveillance disponibles au moment de la rédaction. Tous les chiffres sont préliminaires et peuvent changer selon les signalements ultérieurs.

Pour en savoir plus sur les définitions, les descriptions et le programme FluWatch en général, consultez la [Vue d'ensemble de la surveillance de la grippe au Canada](#). Pour obtenir de plus amples renseignements sur la grippe, consultez notre page Web sur [la grippe](#).

*Nous voudrions remercier tous les partenaires participant au programme FluWatch cette année.*

Ce [rapport](#) est disponible sur la page Web du gouvernement du Canada sur la grippe.  
This [report](#) is available in both official languages.