



Health
Canada Santé
Canada

*Your health and
safety... our priority.*

*Votre santé et votre
sécurité... notre priorité.*

ENQUÊTE CANADIENNE SUR LE CANNABIS (ECC), 2020

Canada 

Enquête canadienne sur le cannabis (ECC) de 2020

Tableaux détaillés

Tableau 1. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 2. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par orientation sexuelle, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 3. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par zone urbaine et rurale, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 4. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon la province/les territoires, le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 5. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par établissement d'enseignement actuel, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 6. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par niveau de scolarité le plus élevé, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 7. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par type d'emploi comportant des tâches dangereuses ou critiques pour la sécurité exécutées au moins une fois par semaine, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 8. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par identité autochtone, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 9. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par origine ethnique, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 10. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par lieu de naissance (Canada), selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 11. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par état de santé, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 12. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par revenu de ménage, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 13. Acceptabilité sociale de la consommation occasionnelle de divers produits, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2020

Tableau 14. Acceptabilité sociale de la consommation régulière de divers produits, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus Canada,

Tableau 15. Risque perçu de divers comportements, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2020

Tableau 16a. Mises en garde pour la santé ayant été vues, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 16b. Amélioration des connaissances grâce aux mises en garde pour la santé, tous les répondants ayant vu les messages, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 16c. Perception d'une connaissance suffisante des méfaits du cannabis sans avoir vu les mises en garde pour la santé, tous les répondants n'ayant pas vu les messages, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 17. Lieu de diffusion des campagnes de sensibilisation et des messages de sécurité ou de santé publique, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 18a. Thèmes des campagnes de sensibilisation et des messages de sécurité ou de santé publique, tous les répondants ayant déclaré avoir vu ou entendu ces messages, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 18b. Perception quant à la crédibilité des campagnes de sensibilisation et des messages de sécurité ou de santé publique, tous les répondants ayant déclaré avoir vu ou entendu ces messages, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 19a. Opinion sur l'accès à une quantité suffisante de renseignements fiables sur les risques pour la santé liés à la consommation de cannabis pour prendre des décisions éclairées, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2020

Tableau 19b. Connaissance des lignes directrices de réduction des risques liés à l'utilisation du cannabis, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 20. Connaissances ou croyances concernant les méfaits du cannabis, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 21. Méthodes de consommation du cannabis à l'intérieur de la maison au cours des 12 derniers mois, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 22. Exposition à la fumée ou à la vapeur secondaire de cannabis dans les lieux suivants au cours des 30 derniers jours, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 23a. Toute personne, y compris vous-même, ayant cultivé du cannabis dans sa résidence ou à proximité de celle-ci au cours des 12 derniers mois, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 23b. Nombre actuel de plants cultivés dans la résidence ou à proximité de celle-ci, répondants ayant déclaré avoir cultivé des plants dans leur résidence ou à proximité de celle-ci au cours des 12 derniers mois, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 24. Toute personne, y compris vous-même, ayant préparé des produits comestibles ou des boissons à base de cannabis dans sa résidence au cours des 12 derniers mois, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 25. Opinion – la consommation de cannabis affecte négativement la conduite automobile, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 26. Opinion – temps d'attente requis pour conduire sécuritairement après avoir consommé du cannabis, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois,

Tableau 27. Opinion – probabilité d'être surpris à conduire sous l'influence, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2020

Tableau 28a. Passager d'un véhicule dans les deux heures suivant la consommation de cannabis par le conducteur, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 28b. Passager d'un véhicule dans les deux heures suivant la consommation de cannabis par le conducteur, tous les répondants, selon la province/les territoires, Canada, 2020

Tableau 29. Proportion, médiane et âge moyen de l'initiation de la consommation de cannabis, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 30. Proportion, médiane et âge moyen de l'initiation de la consommation de cannabis, selon la province/les territoires, Canada, 2020

Tableau 31a. Changement concernant la consommation de cannabis à des fins non médicales en raison de la pandémie de COVID-19, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 31b. Raisons de l'augmentation de la consommation de cannabis attribuable à la pandémie de COVID-19, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 31c. Raisons de la diminution de la consommation de cannabis attribuable à la pandémie de COVID-19, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 32. Disposition à déclarer publiquement sa consommation de cannabis maintenant que ce produit est légal, usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 33. Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 34. Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon la province/les territoires, Canada, 2020

Tableau 35a. Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 35b. Nombre de fois où l'on a consommé du cannabis pendant une journée typique de consommation au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 36. Nombre d'heures « gelé » pendant une journée typique au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 37. Méthodes de consommation du cannabis au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 38. Méthodes de consommation du cannabis au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, selon la province/les territoires, Canada, 2020

Tableau 39a. Types de produits de cannabis consommés par vapotage, usagers ayant utilisé un vaporisateur et/ou un vaporisateur stylo au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 39b. Types de dispositifs de vapotage utilisés, usagers ayant utilisé un vaporisateur stylo ou une cigarette électronique au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada,

Tableau 40. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées lorsqu'il s'agit de choisir des produits, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 41. Produits de cannabis consommés au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 42. Produits de cannabis consommés au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, selon la province/les territoires, Canada, 2020

Tableau 43. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les fleurs et les feuilles séchées, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 44. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans le haschisch et le skuff, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 45. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans l'huile de cannabis pour administration orale, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 46. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les vaporisateurs stylos et les cartouches de cannabis, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 47. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les concentrés et les extraits de cannabis, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 48. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les produits comestibles à base de cannabis, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 49. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les boissons à base de cannabis, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 50. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les produits topiques à base de cannabis, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 51. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les autres produits de cannabis, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 52. Fréquence de la consommation des produits de cannabis au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2020

Tableau 53. Quantité moyenne consommée lors d'une journée habituelle par type de produit au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge,

Tableau 54. Fournisseur habituel de cannabis au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 55a. Fréquence d'obtention auprès d'une source légale ou autorisée au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 55b. Sources légales ou autorisées au cours des 12 derniers mois, usagers ayant obtenu du cannabis d'une source légale au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 55c. Paiement à la personne ayant partagé du cannabis, usagers ayant reçu du cannabis d'une personne au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 55d. Changement concernant l'accès à une source légale ou autorisée en raison de la pandémie de COVID-19, usagers ayant obtenu du cannabis d'une source légale au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 56a. Fréquence d'obtention auprès d'une source illégale ou non autorisée au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada,

Tableau 56b. Sources illégales ou non autorisées au cours des 12 derniers mois, usagers ayant obtenu du cannabis d'une source illégale au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 56c. Changement concernant l'accès à une source illégale ou non autorisée en raison de la pandémie de COVID-19, usagers ayant obtenu du cannabis d'une source illégale au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 57. Facteurs qui influent le plus sur le choix du fournisseur de cannabis, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 58. Fréquence de non-disponibilité d'un produit du cannabis chez un détaillant sous réglementation provinciale depuis la légalisation du cannabis, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 59a. Somme dépensée pour acheter du cannabis à des fins non médicales au cours d'un mois typique, usagers de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 59b. Somme dépensée pour acheter du cannabis à des fins non médicales auprès d'une source légale au cours des 30 derniers jours, usagers de cannabis au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 59c. Somme dépensée pour acheter du cannabis à des fins non médicales auprès d'une source illégale au cours des 30 derniers jours, usagers de cannabis au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 60a. Somme dépensée pour acheter du cannabis à des fins non médicales au cours d'un mois typique, usagers au cours des 12 derniers mois, selon la province/les territoires, Canada, 2020

Tableau 60b. Somme dépensée pour obtenir du cannabis à des fins non médicales auprès d'une source légale au cours des 30 derniers jours, usagers de cannabis au cours des 30 derniers jours, selon la province/les territoires, Canada, 2020

Tableau 60c. Somme dépensée pour acheter du cannabis à des fins non médicales auprès d'une source illégale au cours des 30 derniers jours, usagers de cannabis au cours des 30 derniers jours, selon la province/les territoires, Canada, 2020

Tableau 61. Produits de cannabis achetés ou reçus au cours des 30 derniers jours, usagers au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 62. Fréquence d'obtention de produits de cannabis au cours des 30 derniers jours, usagers au cours des 30 derniers jours, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2020

Tableau 63. Quantité moyenne de cannabis acheté ou reçu par type de produit au cours des 30 derniers jours, usagers au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 64. Prix moyen par unité d'achat par type de produit au cours des 30 derniers jours, acheteurs au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 65. Pourcentage d'usagers qui ont obtenu du cannabis gratuitement par type de produit au cours des 30 derniers jours, personnes ayant obtenu du cannabis au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 66. Lieu de consommation du cannabis au cours des 30 derniers jours, usagers au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 67a. Fréquence de la consommation de cannabis deux heures avant ou pendant l'école au cours des 12 derniers mois, élèves ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 67b. Fréquence de l'absentéisme à l'école dû à la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, élèves ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 68a. Fréquence de la consommation de cannabis deux heures avant ou pendant le travail au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 68b. Fréquence de l'absentéisme au travail dû à la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada,

Tableau 69a. Possession actuelle de cannabis dans la maison ou aux alentours, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 69b. Endroit où le cannabis est entreposé à la maison, usagers au cours des 12 derniers mois qui possèdent actuellement du cannabis à la maison, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 70. Fréquence de la consommation d'autres substances psychoactives en association avec le cannabis au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2020

Tableau 71. Changements concernant la consommation de substances depuis la légalisation du cannabis, usagers de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge,

Tableau 72a. Conduite d'un véhicule dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 72b. Conduite d'un véhicule dans les quatre heures après avoir ingéré un produit de cannabis, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 72c. Conduite d'un véhicule dans les deux heures après avoir consommé du cannabis ou un produit de cannabis en association avec de l'alcool, usagers ayant déclaré avoir conduit dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis ou dans les quatre heures après avoir ingéré du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 72d. Conduite d'un véhicule dans les deux heures après avoir consommé du cannabis ou un produit de cannabis en association avec une autre drogue, usagers ayant déclaré avoir conduit dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis ou dans les quatre heures après avoir ingéré du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 73a. Conduite d'un véhicule dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis, usagers au cours des 12 derniers mois, selon la province/les territoires, Canada, 2020

Tableau 73b. Conduite d'un véhicule dans les quatre heures après avoir ingéré du cannabis, usagers au cours des 12 derniers mois, selon la province/les territoires, Canada, 2020

Tableau 74. Raisons de conduire un véhicule motorisé après avoir consommé du cannabis, répondants ayant déclaré avoir conduit après avoir consommé du cannabis, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 75a. Interaction avec un agent d'application de la loi concernant la conduite sous l'influence du cannabis en tant que conducteur, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 75b. Interaction avec un agent d'application de la loi concernant la possession personnelle de cannabis, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 76. Effets de la consommation du cannabis au cours des 12 derniers mois, usagers de cannabis au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2020

Tableau 77. Pointages ASSIST chez les usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 78a. Sentiment d'avoir besoin d'aide professionnelle à l'égard de la consommation de cannabis, usagers ayant consommé du cannabis plus d'une fois dans leur vie, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 78b. Obtention d'une aide professionnelle à l'égard de la consommation de cannabis, usagers ayant consommé du cannabis plus d'une fois dans leur vie, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada,

Tableau 79a. Consommation de cannabis devant des mineurs au cours des 12 derniers mois, usagers d'âge légal qui ont consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe, Canada, 2020

Tableau 79b. Partage de cannabis avec un mineur au cours des 12 derniers mois, usagers d'âge légal qui ont consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe, Canada, 2020

Tableau 79c. Partage de cannabis avec un mineur par une personne d'âge légal au cours des 12 derniers mois, mineurs ayant consommé au cours des 12 derniers mois, selon le sexe, Canada,

Tableau 80a. Consommation de cannabis pendant la dernière grossesse, femmes âgées de 16 à 50 ans qui ont accouché au cours des 5 dernières années, Canada, 2020

Tableau 80b. Consommation de cannabis pendant l'allaitement, femmes âgées de 16 à 50 ans qui ont accouché et allaité au cours des 5 dernières années, Canada, 2020

Tableau 81. Description de la taille de l'échantillon global, selon la province/les territoires, le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 82. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 83. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par orientation sexuelle, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 84. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par zone urbaine et rurale, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 85. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, selon la province/les territoires, le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 86. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par type d'établissement d'enseignement actuel, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 87. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par niveau de scolarité le plus élevé, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 88. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par type d'emploi comportant des tâches dangereuses ou critiques pour la sécurité exécutées au moins une fois par semaine, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 89. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par identité autochtone, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 90. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par origine ethnique, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 91. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par lieu de naissance (Canada), selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 92. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par état de santé, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 93. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, par revenu de ménage, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 94. But de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, tous les répondants, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 95. Description de la taille de l'échantillon de la section médicale, selon le groupe d'âge, le sexe et la province/les territoires, Canada, 2020

Tableau 96. Usagers de cannabis à des fins médicales possédant un document médical fourni par un professionnel de la santé, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 97a. Usagers de cannabis à des fins médicales ayant actuellement accès au cannabis grâce au programme de Santé Canada, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 97b. Usagers de cannabis à des fins médicales couverts par une assurance pour la consommation de cannabis, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 98. Fréquence de la consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 99. Effets de la consommation du cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2020

Tableau 100. Diminution de la prise d'autres médicaments à la suite de la consommation de cannabis à des fins médicales, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 101. Changements concernant la prise d'autres substances en raison de la consommation de cannabis à des fins médicales, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 102a. Fournisseur habituel de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 102b. Intention de se procurer du cannabis auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada maintenant qu'il est légal de vendre au détail et en ligne du cannabis à des fins non médicales, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 103a. Fréquence d'obtention de cannabis à des fins médicales auprès d'une source légale ou autorisée au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 103b. Sources légales ou autorisées au cours des 12 derniers mois, usagers ayant obtenu du cannabis à des fins médicales d'une source légale au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 103c. Paiement à la personne ayant partagé du cannabis, usagers ayant reçu du cannabis à des fins médicales d'une personne au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge,

Tableau 104a. Fréquence d'obtention de cannabis à des fins médicales auprès d'une source illégale ou non autorisée au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 104b. Sources illégales ou non autorisées au cours des 12 derniers mois, usagers ayant obtenu du cannabis à des fins médicales d'une source illégale au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 105. Méthodes de consommation du cannabis au cours des 12 derniers mois, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 106a. Types de produits de cannabis consommés par vapotage, usagers ayant utilisé un vaporisateur et/ou un vaporisateur stylo à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 106b. Types de dispositifs de vapotage utilisés, usagers ayant utilisé un vaporisateur stylo ou une cigarette électronique à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 107. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées lorsqu'il s'agit de choisir des produits de cannabis à des fins médicales, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 108. Produits de cannabis consommés au cours des 12 derniers mois, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 109. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les fleurs et les feuilles séchées à des fins médicales, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 110. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans le haschisch et le skuff à des fins médicales, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 111. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans l'huile de cannabis pour administration orale à des fins médicales, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 112. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les vaporisateurs stylos et les cartouches de cannabis à des fins médicales, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada,

Tableau 113. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les concentrés et les extraits de cannabis à des fins médicales, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 114. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les produits comestibles à base de cannabis à des fins médicales, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 115. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les boissons à base de cannabis à des fins médicales, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 116. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les produits topiques à base de cannabis à des fins médicales, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 117. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les autres produits de cannabis à des fins médicales, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 118. Fréquence de la consommation des produits de cannabis au cours des 12 derniers mois, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2020

Tableau 119. Quantité moyenne consommée lors d'une journée habituelle par type de produit au cours des 12 derniers mois, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 120. Proportion d'usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois déclarant avoir consommé du cannabis à des fins médicales au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 121a. Somme dépensée pour acheter du cannabis à des fins médicales au cours d'un mois typique, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 121b. Somme dépensée pour acheter du cannabis à des fins médicales auprès d'une source légale au cours des 30 derniers jours, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 121c. Somme dépensée pour acheter du cannabis à des fins médicales auprès d'une source illégale au cours des 30 derniers jours, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 122. Produits de cannabis achetés ou reçus au cours des 30 derniers jours, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge,

Tableau 123. Fréquence d'obtention de produits de cannabis au cours des 30 derniers jours, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 30 derniers jours, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2020

Tableau 124. Quantité moyenne de cannabis acheté ou reçu par type de produit au cours des 30 derniers jours, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 125. Prix moyen par unité d'achat par type de produit au cours des 30 derniers jours, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 126. Opinion – la consommation de cannabis à des fins médicales affecte négativement la conduite automobile, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 127. Opinion – temps d'attente requis pour conduire sécuritairement après avoir consommé du cannabis à des fins médicales, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 128a. Conduite d'un véhicule dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis à des fins médicales, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 128b. Conduite d'un véhicule dans les quatre heures après avoir ingéré un produit de cannabis à des fins médicales, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 129. Raisons de conduire un véhicule motorisé après avoir consommé du cannabis à des fins médicales, répondants ayant déclaré avoir conduit après avoir consommé du cannabis, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

Tableau 1. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Estimation de la population ('000)	28 907	14 843	14 063	1 621	2 243	25 043
Consommé au cours des 12 derniers mois	26,9 [26,0-27,9]	23,4 [22,2-24,6]	30,7 [29,3-32,1]	43,5↑ [40,0-47,1]	52,5↓ [50,1-54,9]	23,6 [22,6-24,6]
Non consommé au cours des 12 derniers mois	73,1 [72,1-74,0]	76,6 [75,4-77,8]	69,3 [67,9-70,7]	56,5↓ [52,9-60,0]	47,5↑ [45,1-49,9]	76,4 [75,4-77,4]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 2. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par orientation sexuelle, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Hétérosexuel	25,4 [24,4-26,3]	21,0 [19,7-22,3]	29,7 [28,3-31,2]	41,8 [37,8-45,9]	49,1 [46,4-51,9]	22,7 [21,7-23,8]
Homosexuel (gai ou lesbienne)	43,3 [37,0-49,8]	35,6 [26,7-45,7]	48,6 [40,3-56,9]	#	54,6 [44,4-64,3]	38,9 [31,2-47,1]
Bisexuel	55,1 [50,4-59,7]	57,0 [51,6-62,3]	50,0 [41,0-58,9]	53,6 [44,3-62,6]	69,0 [62,8-74,6]	48,4 [41,1-55,7]
Autre	44,5↑ [34,8-54,7]	50,8 [38,9-62,6]	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 3. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par zone urbaine et rurale, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Zone urbaine	27,7 [26,6-28,8]	24,2 [22,8-25,7]	31,2 [29,6-32,8]	43,9 [40,0-47,9]	53,1 [50,4-55,7]	24,0 [22,8-25,2]
Zone rurale	24,6 [22,8-26,4]	21,1 [18,8-23,5]	28,7 [26,0-31,6]	42,5↑ [35,3-50,1]	49,3 [43,5-55,1]	22,3 [20,4-24,3]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 4. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon la province/les territoires, le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Estimation de la population ('000)	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Canada	28 907	26,9 [26,0-27,9]	23,4 [22,2-24,6]	30,7 [29,3-32,1]	43,5↑ [40,0-47,1]	52,5↓ [50,1-54,9]	23,6 [22,6-24,6]
Terre-Neuve-et-Labrador	440	29,4 [25,0-34,2]	24,7 [19,4-30,8]	34,4 [27,6-41,9]	#	#	26,6 [22,2-31,7]
Île-du-Prince-Édouard	119	27,7 [23,5-32,3]	21,4 [16,6-27,1]	34,6 [28,0-41,9]	#	#	26,4 [22,1-31,3]
Nouvelle-Écosse	780	30,0 [25,9-34,5]	25,6 [20,5-31,4]	34,9 [28,5-41,9]	#	63,3 [52,1-73,1]	25,3 [21,0-30,2]
Nouveau-Brunswick	628	28,1 [23,9-32,7]	25,0 [19,5-31,4]	31,4 [25,3-38,3]	#	60,9 [47,5-72,8]	24,2 [19,9-29,1]
Québec	6 745	20,7 [19,0-22,7]	17,0 [14,8-19,4]	24,7 [21,9-27,7]	44,0 [37,5-50,6]	46,2 [41,9-50,7]	17,2 [15,3-19,3]
Ontario	11 078	28,9 [27,3-30,6]	25,8 [23,5-28,1]	32,3 [29,9-34,8]	42,8 [36,7-49,1]	56,4 [52,2-60,5]	25,4 [23,6-27,3]
Manitoba	1 018	27,6 [23,8-31,7]	25,6 [20,6-31,3]	29,7 [24,1-35,9]	#	#	23,8 [19,9-28,1]
Saskatchewan	869	26,7 [22,6-31,1]	25,3 [19,8-31,8]	28,0 [22,4-34,4]	#	#	24,2 [19,9-29,1]
Alberta	3 240	28,2 [25,8-30,7]	25,2 [22,0-28,6]	31,2 [27,7-35,0]	45,9 [37,7-54,2]	53,1 [45,8-60,3]	24,6 [22,0-27,4]
Colombie-Britannique	3 905	29,4 [27,1-31,9]	24,0 [21,0-27,2]	35,2 [31,6-38,9]	39,5↑ [30,9-48,9]	47,6 [41,3-54,0]	27,3 [24,7-30,0]
Territoires¹	85	36,7 [29,5-44,4]	#	42,6 [33,2-52,6]	#	#	30,5↑ [22,9-39,5]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 5. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par établissement d'enseignement actuel, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
École primaire ou secondaire	30,5↓ [26,8-34,4]	25,3 [20,6-30,7]	36,0 [30,5-41,8]	38,8 [33,0-44,9]	#	25,7 [21,2-30,9]
École de métiers, collège, cégep ou autre établissement non universitaire	29,6 [27,2-32,1]	26,3 [23,0-29,8]	32,9 [29,4-36,5]	42,1 [35,2-49,4]	53,7 [48,0-59,4]	25,9 [23,2-28,8]
Université	27,9 [26,1-29,8]	26,8 [24,3-29,6]	29,0 [26,4-31,7]	46,0 [39,8-52,4]	48,5↑ [45,1-52,0]	21,3 [19,2-23,6]
Aucune de ces réponses	25,6 [24,3-26,8]	21,2 [19,7-22,9]	29,0 [26,4-31,7]	51,5↓ [41,5-61,3]	57,4 [53,1-61,5]	23,7 [22,4-25,0]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 6. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par niveau de scolarité le plus élevé, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Niveau inférieur à un diplôme d'études secondaires	28,2 [24,1-32,8]	24,5↑ [18,9-31,1]	31,4 [25,6-37,9]	35,8 [28,9-43,3]	#	23,6 [18,5-29,6]
École secondaire	32,7 [30,7-34,9]	28,5↓ [25,7-31,4]	37,3 [34,3-40,4]	44,8 [40,6-49,1]	53,8 [49,9-57,5]	23,7 [21,1-26,5]
Certificat ou diplôme d'une école de métiers	32,1 [29,2-35,2]	24,8 [20,5-29,8]	36,0 [32,3-40,0]	#	58,9 [49,6-67,7]	30,6 [27,5-33,8]
Collège, Cégep	26,5↑ [24,4-28,7]	22,7 [20,2-25,5]	31,7 [28,3-35,4]	#	52,8 [47,4-58,2]	23,9 [21,7-26,2]
Université de niveau inférieur à un baccalauréat	23,4 [20,2-26,8]	21,5↓ [17,4-26,1]	25,6 [20,9-30,9]	#	41,1 [32,0-50,9]	22,1 [18,8-25,7]
Baccalauréat	26,1 [24,2-28,1]	23,0 [20,5-25,6]	29,5↑ [26,7-32,5]	#	52,5↓ [47,3-57,6]	24,0 [22,0-26,0]
Diplôme d'études supérieures	19,2 [17,1-21,6]	18,8 [16,0-22,1]	19,7 [16,6-23,2]	#	#	18,9 [16,7-21,3]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 7. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par type d'emploi comportant des tâches dangereuses ou critiques pour la sécurité¹ exécutées au moins une fois par semaine, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Conduite d'un véhicule motorisé	31,6 [29,5-33,9]	26,6 [22,8-30,8]	33,5↓ [30,9-36,1]	58,0 [46,1-68,9]	57,7 [51,1-63,9]	29,4 [27,1-31,8]
Manipulation d'équipement, de machinerie ou d'outils ou travail à proximité de ceux-ci	33,8 [31,6-36,1]	27,1 [22,9-31,8]	35,6 [33,1-38,3]	47,8 [39,4-56,3]	58,7 [53,2-64,0]	30,5↓ [28,0-33,0]
Travail en hauteur à plus de 2 mètres du sol	36,3 [33,0-39,7]	31,5↑ [23,6-40,7]	37,0 [33,5-40,8]	47,3 [34,8-60,0]	58,7 [50,9-66,0]	33,3 [29,7-37,1]
Travail avec des substances dangereuses	35,2 [32,9-37,7]	31,7 [27,6-36,2]	36,7 [33,8-39,6]	50,4 [42,1-58,7]	57,7 [52,1-63,0]	31,6 [28,9-34,3]
Travail avec des objets tranchants	33,9 [31,7-36,1]	28,0 [24,9-31,4]	37,8 [34,9-40,8]	47,1 [39,8-54,5]	58,1 [53,0-63,0]	30,2 [27,8-32,7]
Travail à proximité de surfaces ou d'objets chauds, de flammes nues ou de vapeur	36,7 [33,8-39,9]	33,9 [28,6-39,6]	37,9 [34,3-41,6]	44,2 [35,7-53,1]	61,1 [54,6-67,3]	32,7 [29,3-36,3]
Travaux électriques	32,8 [29,3-36,5]	28,1* [19,6-38,4]	33,4 [29,7-37,3]	#	59,9 [49,9-69,2]	30,2 [26,5-34,2]
Manipulation de charges supérieures à 20 kg	37,1 [34,7-39,6]	31,8 [27,2-36,8]	38,6 [35,9-41,5]	54,5↑ [45,8-63,0]	62,1 [56,7-67,2]	33,1 [30,4-35,9]
Travail dans un endroit où l'éjection potentielle de particules dans les airs ou la chute potentielle d'objets peuvent causer des blessures	37,6 [34,7-40,6]	31,2 [25,3-37,7]	39,2 [35,9-42,6]	49,4 [39,7-59,1]	58,5↓ [51,9-64,8]	34,5↓ [31,2-37,9]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 8. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par identité autochtone, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-24 (%)	25+ (%)
Premières nations (Indien de l'Amérique du Nord)	40,1 [32,8-47,9]	36,1 [26,8-46,6]	45,5↓ [34,4-57,0]	62,3 [49,0-73,9]	35,4 [27,3-44,5]
Métis	40,1 [33,1-47,6]	37,9 [28,4-48,4]	42,4 [32,3-53,1]	56,1 [42,3-69,0]	37,1 [29,4-45,6]
Inuk (Inuit)	#	#	#	#	#
Ne s'identifie pas en tant qu'Autochtone	26,5↑ [25,6-27,5]	22,9 [21,7-24,2]	30,3 [29,0-31,8]	48,3 [46,2-50,4]	23,2 [22,2-24,3]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 9. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par origine ethnique¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Blanc	28,5↑ [27,5-29,6]	24,3 [22,9-25,8]	33,3 [31,7-35,0]	49,2 [44,9-53,5]	58,8 [55,9-61,7]	25,1 [24,0-26,3]
Asiatique du Sud (p. ex., Indien de l'Inde, Pakistanais, Sri-Lankais, etc.)	16,4 [13,1-20,3]	#	17,4 [13,2-22,6]	#	36,2 [27,4-45,9]	13,0 [9,5-17,6]
Chinois	13,5↑ [10,3-17,7]	#	#	#	#	11,7* [8,1-16,6]
Noir	20,9 [16,9-25,5]	15,3* [10,8-21,2]	25,6 [19,7-32,6]	#	40,3 [31,7-49,6]	17,0 [12,5-22,7]
Philippin	24,4 [18,4-31,6]	#	#	#	#	#
Latino-Américain	23,8 [18,8-29,7]	#	26,2 [19,3-34,6]	#	47,7 [35,6-60,0]	17,4* [12,1-24,4]
Arabe	18,3 [13,5-24,4]	#	20,6* [14,3-28,7]	#	#	#
Asiatique du Sud-Est (p. ex., Vietnamien, Cambodgien, Malaisien, Laotien, Thaïlandais, etc.)	#	#	#	#	#	#
Asiatique de l'Ouest (p. ex., Iranien, Afghan, etc.)	#	#	#	#	#	#
Coréen	#	#	#	#	#	#
Japonais	#	#	#	#	#	#
Autre	26,9 [22,0-32,5]	22,2 [16,1-29,9]	31,3 [24,1-39,6]	#	53,1 [41,0-64,9]	21,6 [16,3-28,0]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse. Les répondants qui se sont identifiés en tant qu'Autochtones n'ont pas eu à indiquer une autre origine ethnique.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 10. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par lieu de naissance (Canada), selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Oui	30,7 [29,6-31,8]	26,5↓ [25,1-28,0]	35,5↓ [33,8-37,2]	46,6 [42,6-50,6]	56,9 [54,2-59,6]	27,2 [26,0-28,5]
Non	15,3 [13,8-16,8]	11,9 [10,1-14,1]	18,0 [15,9-20,3]	33,0 [26,3-40,5]	37,6 [32,8-42,7]	12,3 [10,8-14,0]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 11. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par état de santé, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Santé physique						
Excellent	24,5↑ [22,7-26,5]	19,8 [17,4-22,5]	29,2 [26,5-32,2]	38,6 [31,7-46,0]	46,6 [41,4-51,9]	21,9 [19,9-24,1]
Très bon	26,1 [24,7-27,5]	22,4 [20,5-24,3]	29,9 [27,8-32,0]	48,1 [42,3-53,9]	53,6 [49,7-57,4]	22,4 [20,9-24,0]
Bon	29,3 [27,5-31,1]	26,1 [23,7-28,6]	32,7 [30,1-35,5]	42,8 [36,3-49,6]	52,8 [48,4-57,1]	25,9 [24,0-28,0]
Passable	30,9 [27,5-34,5]	28,3 [23,9-33,1]	34,1 [29,0-39,6]	40,0 [29,8-51,1]	61,1 [52,9-68,7]	26,6 [22,8-30,7]
Mauvais	27,6 [21,1-35,2]	28,5↓* [19,9-39,0]	#	#	#	25,0 [18,3-33,3]
Santé mentale						
Excellent	17,9 [16,3-19,7]	12,4 [10,3-14,9]	22,2 [19,9-24,6]	31,2 [23,1-40,7]	42,4 [36,0-49,0]	16,5↑ [14,9-18,3]
Très bon	24,7 [23,1-26,3]	20,0 [18,0-22,2]	29,3 [27,0-31,8]	39,5↑ [32,9-46,6]	46,5↑ [41,8-51,2]	22,5↑ [20,9-24,3]
Bon	32,2 [30,3-34,2]	28,4 [26,0-31,0]	37,1 [34,1-40,1]	40,8 [34,5-47,4]	52,5↑ [48,2-56,8]	29,1 [27,0-31,4]
Passable	46,2 [43,0-49,5]	42,5↑ [38,3-46,8]	51,4 [46,4-56,3]	52,4 [44,9-59,8]	61,7 [56,4-66,8]	40,7 [36,5-45,0]
Mauvais	57,3 [51,4-62,9]	57,5↓ [50,1-64,5]	56,9 [47,3-66,1]	57,6 [45,8-68,6]	65,3 [57,1-72,7]	52,9 [43,7-61,8]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 12. Consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, par revenu de ménage, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Moins de 10 000 \$	34,8 [29,1-41,0]	35,6 [28,1-43,8]	34,0 [25,6-43,6]	36,9 [26,7-48,4]	49,6 [40,6-58,6]	#
De 10 000 \$ à 24 999 \$	31,5↑ [27,8-35,5]	29,4 [24,7-34,7]	34,3 [28,5-40,5]	#	56,9 [50,5-63,1]	24,8 [20,5-29,6]
De 25 000 \$ à 49 999 \$	28,6 [26,1-31,2]	24,9 [21,8-28,4]	33,0 [29,2-37,1]	47,9 [36,7-59,3]	53,1 [47,6-58,5]	24,6 [21,9-27,5]
De 50 000 \$ à 74 999 \$	28,2 [25,8-30,6]	23,7 [20,8-27,0]	33,4 [29,8-37,2]	52,7 [42,0-63,2]	53,0 [46,4-59,5]	25,3 [22,8-27,9]
De 75 000 \$ à 99 999 \$	27,8 [25,4-30,3]	23,5↑ [20,3-27,1]	31,7 [28,3-35,4]	45,6 [35,4-56,1]	51,4 [43,9-58,8]	25,5↓ [23,0-28,2]
De 100 000 \$ à 124 999 \$	27,9 [25,3-30,7]	26,2 [22,5-30,3]	29,4 [25,8-33,4]	45,0 [33,6-56,9]	54,4 [46,3-62,3]	25,4 [22,6-28,4]
De 125 000 \$ à 149 999 \$	25,9 [22,8-29,2]	21,1 [17,1-25,7]	30,0 [25,6-34,9]	59,9 [45,9-72,5]	56,7 [45,8-67,1]	22,7 [19,5-26,2]
150 000 \$ ou plus	29,1 [26,7-31,6]	24,8 [21,6-28,4]	32,5↑ [29,2-36,0]	49,4 [39,9-58,9]	60,1 [52,4-67,3]	26,3 [23,8-29,0]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 13. Acceptabilité sociale de la consommation occasionnelle de divers produits, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2020

		Tout à fait acceptable (%)	Plutôt acceptable (%)	Plutôt inacceptable (%)	Tout à fait inacceptable (%)	Aucune opinion (%)
Alcool	Tous les répondants	58,2 [57,1-59,3]	31,9 [30,9-32,9]	4,7 [4,3-5,2]	3,5↑ [3,1-4,0]	1,6 [1,4-1,9]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	51,1 [49,8-52,5]	36,5↓ [35,2-37,8]	5,9 [5,3-6,6]	4,5↑ [4,0-5,1]	1,9 [1,6-2,4]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	77,2 [75,5-78,8]	19,7 [18,2-21,3]	1,5↑ [1,1-2,0]	#	#
Tabagisme (cigarette/cigare/tabac sans fumée)	Tous les répondants	17,4 [16,7-18,3]	29,6 [28,6-30,6]	26,5↓ [25,5-27,5]	23,5↑ [22,6-24,5]	2,9 [2,5-3,3]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	13,0 [12,2-13,9]	28,8 [27,6-30,0]	27,6 [26,4-28,8]	27,3 [26,1-28,5]	3,3 [2,9-3,9]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	29,4 [27,7-31,1]	31,7 [29,9-33,5]	23,8 [22,2-25,5]	13,4 [12,1-14,9]	1,7 [1,3-2,3]
Cigarettes électroniques (liquide de vapotage à base de nicotine)	Tous les répondants	18,5↑ [17,7-19,4]	28,4 [27,4-29,4]	23,0 [22,1-23,9]	26,2 [25,3-27,2]	3,9 [3,5-4,3]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	12,7 [11,9-13,6]	26,7 [25,6-27,9]	24,5↑ [23,4-25,7]	31,8 [30,5-33,0]	4,2 [3,7-4,8]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	34,2 [32,5-36,1]	32,8 [31,0-34,6]	19,0 [17,5-20,6]	11,1 [9,9-12,5]	2,8 [2,3-3,6]
Fumer du cannabis à des fins non médicales	Tous les répondants	35,2 [34,2-36,3]	31,4 [30,4-32,5]	14,8 [14,0-15,6]	15,7 [14,9-16,5]	2,9 [2,5-3,3]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	22,1 [21,1-23,2]	33,9 [32,6-35,1]	18,9 [17,9-20,0]	21,3 [20,2-22,4]	3,7 [3,2-4,3]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	70,4 [68,6-72,2]	24,8 [23,2-26,6]	3,6 [3,0-4,4]	#	#
Vapoter du cannabis à des fins non médicales	Tous les répondants	29,5↑ [28,5-30,5]	29,1 [28,1-30,1]	16,7 [15,9-17,6]	20,3 [19,4-21,3]	4,3 [3,9-4,8]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	17,6 [16,6-18,6]	29,8 [28,6-31,0]	20,4 [19,3-21,5]	27,0 [25,8-28,2]	5,3 [4,7-5,9]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	61,7 [59,7-63,5]	27,6 [25,9-29,4]	7,1 [6,1-8,1]	2,2 [1,7-2,9]	1,5↓* [1,1-2,0]

Consommation des produits comestibles contenant du cannabis à des fins non médicales	Tous les répondants	35,4 [34,3-36,4]	30,8 [29,7-31,8]	14,2 [13,4-15,0]	15,9 [15,1-16,7]	3,8 [3,4-4,3]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	22,3 [21,2-23,4]	33,1 [31,9-34,3]	18,2 [17,2-19,3]	21,6 [20,5-22,7]	4,9 [4,3-5,5]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	70,9 [69,0-72,6]	24,4 [22,7-26,2]	3,4 [2,8-4,2]	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 14. Acceptabilité sociale de la consommation régulière de divers produits, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus Canada, 2020

		Tout à fait acceptable (%)	Plutôt acceptable (%)	Plutôt inacceptable (%)	Tout à fait inacceptable (%)	Aucune opinion (%)
Alcool	Tous les répondants	22,4 [21,5-23,3]	39,1 [38,0-40,2]	24,0 [23,0-24,9]	12,4 [11,7-13,1]	2,2 [1,9-2,5]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	17,9 [16,9-19,0]	38,9 [37,6-40,2]	25,8 [24,6-27,0]	14,8 [13,9-15,8]	2,6 [2,2-3,1]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	34,1 [32,3-36,0]	39,9 [38,0-41,8]	19,3 [17,9-20,9]	5,8 [5,0-6,8]	0,8* [0,6-1,3]
Tabagisme (cigarette/cigare/tabac sans fumée)	Tous les répondants	10,4 [9,8-11,1]	24,3 [23,4-25,3]	31,1 [30,0-32,1]	31,4 [30,4-32,4]	2,8 [2,4-3,2]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	7,1 [6,5-7,8]	22,8 [21,7-23,9]	31,3 [30,1-32,6]	35,5↑ [34,3-36,8]	3,2 [2,8-3,7]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	19,3 [17,8-20,9]	28,3 [26,5-30,1]	30,6 [28,8-32,4]	20,2 [18,6-21,8]	1,7 [1,3-2,2]
Cigarettes électroniques (liquide de vapotage à base de nicotine)	Tous les répondants	11,1 [10,5-11,8]	24,1 [23,2-25,0]	28,9 [27,9-29,9]	32,6 [31,6-33,7]	3,3 [2,9-3,7]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	6,9 [6,3-7,6]	21,2 [20,2-22,3]	29,3 [28,1-30,5]	39,0 [37,7-40,3]	3,6 [3,1-4,1]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	22,5↓ [20,9-24,1]	31,9 [30,2-33,8]	28,0 [26,3-29,8]	15,3 [13,9-16,8]	2,3 [1,8-3,0]
Fumer du cannabis à des fins non médicales	Tous les répondants	19,2 [18,4-20,1]	29,2 [28,2-30,2]	25,3 [24,3-26,3]	23,7 [22,7-24,7]	2,6 [2,3-3,0]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	10,1 [9,3-10,9]	26,2 [25,0-27,3]	29,1 [27,9-30,4]	31,3 [30,1-32,5]	3,3 [2,9-3,8]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	43,6 [41,7-45,5]	37,6 [35,7-39,5]	15,0 [13,7-16,4]	3,2 [2,6-3,9]	#
Vapoter du cannabis à des fins non médicales	Tous les répondants	16,4 [15,6-17,2]	26,1 [25,2-27,0]	26,2 [25,3-27,2]	27,8 [26,8-28,8]	3,5↑ [3,1-4,0]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	8,3 [7,6-9,0]	22,0 [21,0-23,1]	29,5↑ [28,3-30,8]	35,9 [34,6-37,2]	4,2 [3,7-4,8]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	38,3 [36,4-40,2]	37,1 [35,3-39,0]	17,3 [15,9-18,8]	5,7 [4,8-6,8]	1,5↑* [1,1-2,1]

Consommation des produits comestibles contenant du cannabis à des fins non médicales	Tous les répondants	19,2 [18,4-20,1]	29,2 [28,2-30,2]	25,5↑ [24,6-26,5]	22,9 [21,9-23,8]	3,3 [2,9-3,7]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	10,7 [9,9-11,5]	26,2 [25,1-27,4]	28,7 [27,5-30,0]	30,2 [29,0-31,5]	4,1 [3,6-4,7]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	42,1 [40,2-44,0]	37,2 [35,4-39,1]	16,8 [15,4-18,3]	3,0 [2,4-3,7]	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 15. Risque perçu de divers comportements, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2020

		Aucun risque (%)	Faible risque (%)	Risque modéré (%)	Risque élevé (%)	Ne sais as (%)
Consommer de l'alcool occasionnellement	Tous les répondants	35,0 [33,9-36,0]	48,0 [46,9-49,1]	12,8 [12,1-13,6]	2,4 [2,1-2,8]	1,8 [1,6-2,1]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	32,5↑ [31,3-33,8]	48,4 [47,1-49,8]	13,9 [13,0-14,8]	3,0 [2,6-3,5]	2,2 [1,8-2,6]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	41,1 [39,2-43,0]	47,2 [45,3-49,1]	9,9 [8,8-11,1]	#	0,9* [0,6-1,4]
Consommer de l'alcool régulièrement	Tous les répondants	2,4 [2,1-2,8]	21,9 [21,1-22,9]	44,1 [43,1-45,2]	30,3 [29,3-31,3]	1,2 [1,0-1,5]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	2,3 [2,0-2,8]	20,1 [19,1-21,2]	42,9 [41,6-44,2]	33,2 [31,9-34,4]	1,5↑ [1,2-1,9]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	2,8 [2,2-3,5]	26,9 [25,1-28,6]	47,6 [45,7-49,5]	22,4 [20,9-24,1]	#
Fumer du tabac occasionnellement	Tous les répondants	5,8 [5,3-6,3]	33,2 [32,2-34,3]	39,9 [38,8-41,0]	19,7 [18,9-20,7]	1,3 [1,1-1,6]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	5,0 [4,5-5,6]	30,2 [29,0-31,4]	40,8 [39,5-42,2]	22,4 [21,2-23,5]	1,6 [1,3-2,0]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	8,0 [7,0-9,1]	41,4 [39,5-43,3]	37,4 [35,5-39,3]	12,7 [11,4-14,1]	#
Fumer du tabac régulièrement	Tous les répondants	0,9 [0,7-1,1]	3,3 [2,9-3,7]	13,5↓ [12,7-14,2]	81,4 [80,6-82,2]	1,0 [0,8-1,2]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	0,9 [0,7-1,2]	3,0 [2,6-3,5]	12,3 [11,5-13,2]	82,5↑ [81,5-83,5]	1,2 [1,0-1,5]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	0,9* [0,6-1,3]	3,9 [3,2-4,7]	16,6 [15,3-18,1]	78,3 [76,7-79,9]	#
Utiliser une cigarette électronique contenant de la nicotine occasionnellement	Tous les répondants	4,5↓ [4,1-4,9]	28,0 [27,1-29,0]	37,6 [36,6-38,7]	26,3 [25,3-27,3]	3,6 [3,2-4,1]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	3,3 [2,9-3,8]	24,3 [23,2-25,4]	38,1 [36,8-39,4]	30,3 [29,0-31,5]	4,1 [3,6-4,7]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	7,7 [6,8-8,8]	38,3 [36,4-40,1]	36,4 [34,5-38,3]	15,3 [13,9-16,8]	2,4 [1,8-3,0]

Utiliser une cigarette électronique contenant de la nicotine régulièrement	Tous les répondants	1,2 [1,0-1,4]	6,1 [5,6-6,6]	23,5↓ [22,6-24,4]	66,1 [65,0-67,1]	3,2 [2,8-3,6]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	1,0 [0,7-1,3]	4,9 [4,4-5,5]	20,2 [19,1-21,2]	70,5↑ [69,3-71,7]	3,5↓ [3,0-4,0]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	1,6 [1,3-2,2]	9,5↓ [8,4-10,6]	32,5↓ [30,7-34,3]	53,9 [51,9-55,8]	2,5↑ [2,0-3,2]
Fumer du cannabis occasionnellement	Tous les répondants	21,0 [20,2-21,9]	42,8 [41,7-43,8]	23,6 [22,7-24,6]	10,3 [9,7-11,1]	2,2 [1,9-2,6]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	13,3 [12,5-14,2]	41,2 [39,9-42,5]	28,7 [27,5-30,0]	13,9 [13,0-14,9]	2,8 [2,4-3,3]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	41,9 [40,0-43,9]	47,1 [45,2-49,1]	10,1 [8,9-11,4]	#	#
Fumer du cannabis régulièrement	Tous les répondants	5,5↓ [5,0-6,0]	19,6 [18,8-20,5]	32,1 [31,1-33,1]	40,6 [39,5-41,7]	2,3 [1,9-2,6]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	2,6 [2,2-3,0]	13,4 [12,6-14,3]	30,3 [29,1-31,5]	50,8 [49,5-52,2]	2,8 [2,4-3,3]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	13,3 [12,0-14,7]	36,5↓ [34,6-38,3]	36,9 [35,0-38,8]	12,8 [11,5-14,2]	#
Vapoter du cannabis occasionnellement	Tous les répondants	13,4 [12,7-14,2]	35,1 [34,1-36,2]	27,4 [26,4-28,4]	18,5↑ [17,7-19,4]	5,5↑ [5,0-6,1]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	7,3 [6,7-8,0]	30,7 [29,5-31,9]	31,7 [30,5-33,0]	23,9 [22,8-25,1]	6,4 [5,8-7,1]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	30,2 [28,4-32,0]	47,5↓ [45,5-49,4]	15,5↓ [14,1-17,0]	3,9 [3,2-4,7]	3,0 [2,4-3,8]
Vapoter du cannabis régulièrement	Tous les répondants	4,5↑ [4,1-5,0]	15,4 [14,7-16,2]	28,0 [27,1-29,0]	46,7 [45,6-47,8]	5,3 [4,8-5,8]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	1,9 [1,6-2,2]	9,7 [9,0-10,5]	25,2 [24,1-26,4]	57,2 [55,9-58,5]	6,0 [5,4-6,7]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	11,8 [10,6-13,1]	31,0 [29,3-32,8]	35,9 [34,1-37,8]	17,9 [16,5-19,5]	3,3 [2,7-4,2]
Consommation de produits comestibles contenant du cannabis occasionnellement	Tous les répondants	22,6 [21,8-23,5]	38,9 [37,9-40,0]	22,2 [21,2-23,1]	11,7 [11,0-12,5]	4,5↑ [4,1-5,0]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	13,9 [13,0-14,8]	37,6 [36,4-38,9]	27,0 [25,8-28,2]	15,7 [14,7-16,7]	5,8 [5,2-6,5]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	46,5↓ [44,5-48,4]	42,5↑ [40,6-44,4]	9,1 [8,1-10,4]	1,0* [0,6-1,5]	0,9* [0,6-1,4]

Consommation de produits comestibles contenant du cannabis régulièrement	Tous les répondants	8,9 [8,4-9,5]	21,1 [20,2-22,0]	29,4 [28,4-30,4]	35,6 [34,5-36,6]	5,1 [4,6-5,6]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	4,2 [3,8-4,8]	15,2 [14,3-16,1]	29,2 [28,0-30,4]	45,1 [43,7-46,4]	6,3 [5,7-7,0]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	21,6 [20,0-23,2]	37,1 [35,3-39,0]	29,9 [28,1-31,7]	9,8 [8,6-11,0]	1,7 [1,2-2,3]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 16a. Mises en garde pour la santé ayant été vues, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Oui, sur les produits et les emballages de cannabis	Tous les répondants	14,2 [13,5-15,0]	11,1 [10,3-12,1]	17,5↑ [16,4-18,7]	18,9 [16,3-21,8]	25,5↑ [23,5-27,7]	12,9 [12,2-13,7]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	6,1 [5,5-6,7]	5,6 [4,8-6,4]	6,7 [5,8-7,6]	8,3 [6,0-11,4]	12,0 [9,9-14,4]	5,7 [5,1-6,3]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	36,3 [34,5-38,2]	29,3 [26,8-32,0]	42,0 [39,4-44,6]	32,2 [27,5-37,3]	37,8 [34,6-41,1]	36,5↑ [34,3-38,8]
Oui, sur le site Web de Santé Canada	Tous les répondants	8,6 [8,0-9,3]	9,6 [8,7-10,6]	7,6 [6,8-8,4]	11,8 [9,7-14,2]	8,6 [7,3-10,0]	8,4 [7,7-9,1]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	10,1 [9,3-11,0]	10,9 [9,8-12,1]	9,2 [8,1-10,4]	15,8 [12,6-19,6]	12,9 [10,7-15,3]	9,7 [8,9-10,6]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	4,5↑ [3,8-5,4]	5,3 [4,1-6,8]	3,9 [3,0-5,0]	#	4,8 [3,5-6,5]	4,2 [3,3-5,3]
Oui, les deux ci-dessus	Tous les répondants	14,8 [14,0-15,5]	14,5↑ [13,5-15,6]	15,0 [14,0-16,1]	22,9 [20,1-26,1]	28,4 [26,3-30,6]	13,0 [12,2-13,8]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	10,0 [9,3-10,8]	9,9 [8,9-11,1]	10,1 [9,1-11,3]	16,0 [12,8-19,8]	18,5↓ [15,9-21,3]	9,3 [8,5-10,1]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	27,5↑ [25,9-29,3]	29,7 [27,3-32,4]	25,8 [23,6-28,1]	32,3 [27,4-37,5]	37,5↓ [34,3-40,7]	25,0 [23,0-27,1]
Non	Tous les répondants	35,5↑ [34,5-36,6]	35,5↑ [34,0-37,1]	35,5↑ [34,0-37,1]	19,7 [17,0-22,6]	16,1 [14,4-18,0]	38,3 [37,1-39,5]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	42,2 [40,9-43,6]	40,9 [39,1-42,8]	43,8 [41,9-45,7]	24,8 [21,0-29,0]	24,4 [21,5-27,5]	44,1 [42,7-45,5]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	17,3 [15,8-18,9]	17,6 [15,4-20,1]	17,0 [15,0-19,2]	12,7 [9,5-16,7]	8,5↑ [6,8-10,5]	19,6 [17,7-21,6]
Incertain/Je ne sais pas	Tous les répondants	26,9 [25,9-27,9]	29,2 [27,8-30,7]	24,3 [23,0-25,7]	26,7 [23,7-30,0]	21,4 [19,4-23,4]	27,4 [26,3-28,5]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	31,5↑ [30,3-32,8]	32,6 [31,0-34,4]	30,2 [28,5-32,0]	35,2 [30,8-39,8]	32,3 [29,1-35,6]	31,3 [30,0-32,6]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	14,3 [13,0-15,8]	18,1 [15,8-20,5]	11,4 [9,8-13,2]	16,1 [12,5-20,5]	11,5↓ [9,5-13,8]	14,7 [13,0-16,6]

Tableau 16b. Amélioration des connaissances grâce aux mises en garde pour la santé, tous les répondants ayant vu les messages, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Oui	Tous les répondants	28,3 [26,8-29,9]	28,9 [26,7-31,3]	27,7 [25,6-29,8]	38,3 [33,8-43,1]	27,5↑ [24,9-30,3]	27,4 [25,6-29,3]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	33,7 [31,4-36,2]	33,3 [30,0-36,7]	34,3 [30,9-37,8]	41,4 [34,2-48,9]	32,4 [27,7-37,5]	33,3 [30,6-36,1]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	22,7 [20,9-24,6]	23,1 [20,3-26,1]	22,4 [20,0-25,0]	36,4 [30,6-42,7]	25,1 [22,0-28,4]	20,3 [18,1-22,7]
Non	Tous les répondants	38,9 [37,3-40,6]	35,7 [33,4-38,2]	41,8 [39,6-44,2]	24,2 [20,3-28,6]	36,0 [33,2-39,0]	40,9 [38,9-42,9]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	31,3 [29,0-33,7]	29,0 [25,9-32,3]	34,0 [30,6-37,5]	#	29,2 [24,7-34,1]	32,8 [30,2-35,6]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	46,7 [44,4-49,0]	44,7 [41,3-48,2]	48,1 [45,1-51,2]	31,7 [26,1-37,9]	39,4 [35,8-43,1]	50,4 [47,5-53,3]
Un peu	Tous les répondants	28,7 [27,2-30,3]	30,8 [28,6-33,2]	26,8 [24,8-28,9]	32,9 [28,5-37,6]	32,4 [29,6-35,3]	27,7 [25,9-29,6]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	30,2 [27,9-32,6]	32,6 [29,5-36,0]	27,3 [24,1-30,7]	39,5↑ [32,4-47,1]	31,5↑ [26,8-36,6]	29,3 [26,8-32,0]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	27,3 [25,3-29,3]	28,5↓ [25,5-31,7]	26,4 [23,8-29,1]	28,0 [22,8-33,8]	32,8 [29,5-36,4]	25,8 [23,4-28,4]
Incertain/Je ne sais pas	Tous les répondants	4,1 [3,5-4,8]	4,5↑ [3,6-5,7]	3,7 [3,0-4,7]	#	4,1 [3,0-5,5]	4,1 [3,3-4,9]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	4,8 [3,9-6,0]	5,1 [3,8-6,8]	4,5↓ [3,3-6,1]	#	#	4,6 [3,5-5,9]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	3,4 [2,6-4,3]	3,7* [2,6-5,4]	3,1* [2,2-4,3]	#	#	3,4 [2,5-4,7]

Tableau 16c. Perception d'une connaissance suffisante des méfaits du cannabis sans avoir vu les mises en garde pour la santé, tous les répondants n'ayant pas vu les messages, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Oui	Tous les répondants	48,5↓ [46,5-50,4]	46,2 [43,5-48,9]	50,9 [48,2-53,6]	41,9 [34,3-49,9]	39,3 [33,7-45,2]	49,0 [47,0-51,1]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	47,1 [45,0-49,2]	45,1 [42,2-48,1]	49,3 [46,3-52,2]	37,3 [28,7-46,7]	36,3 [29,9-43,3]	47,7 [45,5-49,9]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	57,0 [52,0-61,9]	53,3 [45,8-60,6]	60,1 [53,3-66,6]	#	46,3 [35,3-57,6]	58,0 [52,4-63,5]
Non	Tous les répondants	21,4 [19,9-23,1]	22,5↑ [20,3-24,9]	20,3 [18,2-22,6]	25,3 [18,9-32,8]	23,0 [18,3-28,4]	21,3 [19,6-23,0]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	22,4 [20,7-24,2]	23,3 [20,9-25,9]	21,4 [19,1-24,0]	#	25,9 [20,2-32,5]	22,2 [20,4-24,1]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	15,6 [12,2-19,7]	17,6 [12,5-24,1]	14,0* [9,8-19,5]	#	#	15,1 [11,4-19,7]
Un peu	Tous les répondants	23,3 [21,7-24,9]	23,9 [21,7-26,2]	22,7 [20,5-25,0]	28,2 [21,7-35,7]	33,3 [27,9-39,1]	22,7 [21,1-24,5]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	23,1 [21,4-24,9]	23,7 [21,3-26,2]	22,4 [20,1-25,0]	30,4 [22,7-39,4]	32,4 [26,2-39,3]	22,6 [20,8-24,4]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	24,7 [20,7-29,1]	24,8 [19,1-31,5]	24,6 [19,3-30,7]	#	#	24,0 [19,6-29,0]
Incertain/Je ne sais pas	Tous les répondants	6,8 [5,9-7,9]	7,4 [6,1-9,1]	6,2 [5,0-7,6]	#	#	7,0 [6,0-8,1]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	7,4 [6,4-8,6]	7,9 [6,4-9,7]	6,9 [5,5-8,6]	#	#	7,5↓ [6,4-8,8]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 17. Lieu de diffusion¹ des campagnes de sensibilisation et des messages de sécurité ou de santé publique sur le cannabis, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Établissement d'enseignement	Tous les répondants	13,7 [13,0-14,3]	13,8 [12,8-14,7]	13,6 [12,7-14,5]	62,2 [58,7-65,5]	41,5↓ [39,1-43,9]	8,0 [7,4-8,7]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	11,3 [10,5-12,0]	11,3 [10,3-12,4]	11,2 [10,2-12,3]	62,7 [58,0-67,1]	42,5↓ [39,1-46,0]	7,1 [6,4-7,8]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	20,3 [18,9-21,8]	21,9 [19,7-24,1]	19,1 [17,3-21,0]	62,0 [56,6-67,1]	40,7 [37,4-44,0]	11,3 [9,9-12,8]
Médias sociaux	Tous les répondants	32,2 [31,2-33,1]	31,0 [29,6-32,4]	33,4 [32,0-34,8]	67,9 [64,5-71,2]	64,3 [62,0-66,6]	27,0 [25,9-28,0]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	26,1 [25,0-27,2]	25,3 [23,9-26,9]	26,9 [25,3-28,6]	64,9 [60,2-69,3]	60,4 [57,0-63,8]	22,3 [21,2-23,5]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	49,0 [47,1-50,9]	49,8 [46,9-52,7]	48,3 [45,7-51,0]	72,8 [67,7-77,3]	68,1 [64,9-71,1]	42,3 [40,0-44,7]
Sites Web autres que les médias sociaux	Tous les répondants	14,2 [13,4-14,9]	13,0 [12,0-14,0]	15,4 [14,3-16,5]	24,3 [21,4-27,4]	24,6 [22,6-26,7]	12,6 [11,8-13,4]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	12,2 [11,3-13,0]	11,4 [10,4-12,6]	13,0 [11,8-14,3]	23,7 [20,0-27,9]	22,4 [19,7-25,4]	11,0 [10,2-12,0]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	19,7 [18,2-21,2]	18,1 [16,0-20,3]	21,0 [19,0-23,2]	25,4 [21,1-30,4]	26,7 [23,8-29,7]	17,6 [15,9-19,5]
Événements (p. ex., événements sportifs, concerts, festivals ou marchés)	Tous les répondants	7,7 [7,2-8,3]	7,4 [6,7-8,2]	8,1 [7,3-8,9]	13,5↓ [11,2-16,1]	12,8 [11,3-14,5]	6,9 [6,3-7,5]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	5,9 [5,4-6,5]	5,5↑ [4,8-6,4]	6,4 [5,6-7,3]	12,2 [9,4-15,7]	12,1 [10,0-14,5]	5,3 [4,7-5,9]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	12,7 [11,5-14,0]	13,5↑ [11,7-15,6]	12,0 [10,4-13,8]	15,5↓ [12,0-19,7]	13,6 [11,5-16,1]	12,2 [10,7-13,8]
Kiosques ou points de vente temporaires	Tous les répondants	6,2 [5,7-6,8]	6,2 [5,5-6,9]	6,3 [5,6-7,1]	10,7 [8,8-13,1]	10,0 [8,6-11,5]	5,6 [5,1-6,2]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	5,1 [4,6-5,7]	5,0 [4,3-5,8]	5,2 [4,5-6,1]	10,3 [7,8-13,5]	9,4 [7,5-11,7]	4,6 [4,1-5,2]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	9,1 [8,1-10,2]	9,8 [8,2-11,7]	8,5↑ [7,2-10,0]	11,5↑ [8,5-15,4]	10,6 [8,8-12,9]	8,5 [7,2-9,9]

Magasins de cannabis légaux intérieurs/extérieurs	Tous les répondants	14,1 [13,4-14,8]	13,5↑ [12,6-14,5]	14,7 [13,8-15,8]	23,9 [21,0-27,0]	30,9 [28,7-33,2]	12,0 [11,3-12,8]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	8,2 [7,6-8,9]	8,6 [7,7-9,6]	7,8 [6,9-8,8]	16,2 [12,9-20,1]	18,6 [16,1-21,5]	7,3 [6,6-8,0]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	30,1 [28,4-31,9]	30,0 [27,5-32,6]	30,2 [27,9-32,6]	34,3 [29,4-39,5]	42,2 [38,9-45,5]	27,2 [25,2-29,3]
Affiches ou panneaux publicitaires	Tous les répondants	30,1 [29,1-31,1]	30,8 [29,4-32,2]	29,4 [28,0-30,8]	43,9 [40,4-47,4]	47,8 [45,4-50,2]	27,6 [26,6-28,7]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	26,1 [25,0-27,3]	26,1 [24,6-27,7]	26,2 [24,5-27,8]	41,7 [37,1-46,4]	43,5↑ [40,1-47,0]	24,4 [23,2-25,7]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	41,2 [39,3-43,1]	46,4 [43,5-49,3]	37,0 [34,5-39,5]	47,6 [42,3-53,0]	51,9 [48,5-55,2]	38,3 [36,0-40,6]
Établissements de santé	Tous les répondants	24,7 [23,8-25,7]	28,4 [27,1-29,8]	20,9 [19,6-22,1]	38,3 [34,9-41,8]	34,5↑ [32,2-36,8]	23,0 [22,0-24,0]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	22,7 [21,6-23,8]	25,9 [24,3-27,5]	19,0 [17,6-20,5]	34,9 [30,5-39,6]	30,5↑ [27,4-33,9]	21,7 [20,5-22,9]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	30,5↓ [28,8-32,3]	37,1 [34,4-39,9]	25,2 [23,1-27,5]	43,3 [38,1-48,7]	38,2 [35,0-41,6]	27,4 [25,4-29,6]
Journaux ou revues papier	Tous les répondants	19,0 [18,1-19,9]	18,5↑ [17,3-19,8]	19,5↑ [18,3-20,8]	15,3 [13,0-18,1]	16,9 [15,2-18,8]	19,4 [18,5-20,4]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	18,5↓ [17,5-19,6]	17,9 [16,5-19,4]	19,2 [17,7-20,8]	13,7 [10,7-17,3]	18,3 [15,8-21,2]	18,7 [17,6-19,9]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	20,5↑ [18,9-22,2]	20,7 [18,4-23,2]	20,3 [18,2-22,6]	17,8 [14,1-22,3]	15,7 [13,5-18,3]	21,8 [19,8-23,9]
Télévision/radio	Tous les répondants	49,8 [48,7-50,9]	47,9 [46,3-49,5]	51,9 [50,4-53,4]	45,0 [41,6-48,6]	46,4 [44,1-48,8]	50,5↓ [49,2-51,7]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	48,9 [47,6-50,2]	47,4 [45,6-49,3]	50,6 [48,7-52,6]	44,1 [39,5-48,9]	44,2 [40,8-47,7]	49,4 [48,0-50,8]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	52,8 [50,9-54,7]	49,9 [47,0-52,8]	55,1 [52,5-57,7]	46,3 [41,1-51,7]	48,4 [45,0-51,7]	54,5↓ [52,1-56,8]
Magasins de cannabis illégaux intérieurs/extérieurs	Tous les répondants	3,3 [3,0-3,7]	2,9 [2,4-3,4]	3,9 [3,3-4,4]	6,3 [4,8-8,2]	5,8 [4,8-7,1]	2,9 [2,6-3,3]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	1,8 [1,5-2,2]	1,5↑ [1,2-2,0]	2,2 [1,7-2,8]	#	3,8* [2,7-5,4]	1,6 [1,3-1,9]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	7,5↓ [6,5-8,5]	7,3 [6,0-9,0]	7,6 [6,3-9,1]	8,0* [5,5-11,4]	7,6 [5,9-9,6]	7,4 [6,3-8,7]

Organisme communautaire/à but non lucratif	Tous les répondants	4,6 [4,2-5,1]	5,1 [4,5-5,8]	4,2 [3,6-4,9]	6,8 [5,2-8,8]	6,5↑ [5,4-7,8]	4,3 [3,9-4,9]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	4,1 [3,7-4,7]	4,4 [3,7-5,1]	3,9 [3,2-4,7]	6,7* [4,7-9,4]	6,4 [4,9-8,4]	3,9 [3,4-4,5]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	6,1 [5,2-7,0]	7,5↑ [6,2-9,2]	4,9 [3,9-6,1]	#	6,5↑ [5,0-8,4]	5,8 [4,8-7,1]
Lieu de travail	Tous les répondants	10,9 [10,3-11,5]	9,3 [8,5-10,2]	12,5↑ [11,6-13,5]	13,3 [11,1-15,9]	14,0 [12,4-15,7]	10,4 [9,8-11,2]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	9,8 [9,1-10,6]	8,3 [7,4-9,3]	11,6 [10,5-12,8]	11,4 [8,7-14,8]	15,6 [13,3-18,3]	9,4 [8,7-10,3]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	13,8 [12,6-15,2]	12,8 [11,1-14,8]	14,6 [12,9-16,5]	16,0 [12,5-20,3]	12,6 [10,5-14,9]	13,8 [12,3-15,5]
Je n'ai remarqué aucune campagne de sensibilisation ni aucun message de santé publique	Tous les répondants	22,2 [21,2-23,1]	23,8 [22,4-25,1]	20,5↓ [19,2-21,8]	10,0 [8,1-12,2]	11,5↑ [10,1-13,2]	23,9 [22,9-25,0]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	25,2 [24,1-26,4]	26,6 [25,0-28,3]	23,6 [22,0-25,2]	12,2 [9,4-15,5]	13,4 [11,2-16,0]	26,5↓ [25,2-27,8]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	13,7 [12,4-15,1]	14,0 [12,0-16,2]	13,5↓ [11,8-15,4]	7,2* [4,9-10,3]	9,8 [7,9-12,0]	15,3 [13,6-17,1]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 18a. Thèmes des campagnes de sensibilisation et des messages de sécurité ou de santé publique¹, tous les répondants ayant déclaré avoir vu ou entendu ces messages, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Conduite d'un véhicule après la consommation de cannabis	Tous les répondants	81,4 [80,4-82,4]	80,8 [79,3-82,1]	82,1 [80,7-83,4]	82,1 [79,1-84,7]	84,5↑ [82,6-86,3]	81,0 [79,9-82,1]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	79,8 [78,5-81,0]	79,4 [77,7-81,1]	80,1 [78,3-81,8]	77,3 [72,8-81,2]	80,0 [76,8-82,8]	79,9 [78,5-81,2]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	85,7 [84,2-87,1]	84,8 [82,4-86,9]	86,4 [84,3-88,3]	88,3 [84,4-91,3]	88,5↓ [86,1-90,5]	84,8 [82,8-86,6]
Méfais de la consommation de cannabis	Tous les répondants	42,5↑ [41,3-43,7]	43,4 [41,7-45,2]	41,6 [39,9-43,3]	57,6 [53,9-61,3]	51,3 [48,8-53,9]	40,4 [39,1-41,8]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	41,5↓ [40,0-43,0]	43,0 [40,9-45,1]	39,7 [37,6-41,9]	58,9 [53,9-63,8]	49,0 [45,2-52,7]	40,0 [38,3-41,6]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	45,1 [43,0-47,2]	44,6 [41,6-47,7]	45,5↓ [42,7-48,3]	57,1 [51,5-62,5]	53,5↓ [50,0-56,9]	41,7 [39,2-44,3]
Dépendance et consommation de cannabis	Tous les répondants	28,8 [27,7-30,0]	29,7 [28,1-31,4]	27,9 [26,4-29,5]	34,2 [30,7-37,8]	33,5↑ [31,2-35,9]	27,9 [26,7-29,2]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	28,3 [26,9-29,7]	29,3 [27,3-31,3]	27,3 [25,3-29,3]	32,5↓ [28,0-37,4]	32,0 [28,6-35,5]	27,8 [26,3-29,4]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	29,6 [27,8-31,5]	30,4 [27,7-33,3]	29,0 [26,5-31,5]	36,9 [31,7-42,3]	34,8 [31,6-38,1]	27,6 [25,3-29,9]
Lignes directrices de réduction des risques liés à l'utilisation du cannabis	Tous les répondants	13,5↑ [12,7-14,4]	13,3 [12,2-14,5]	13,7 [12,6-14,9]	22,7 [19,8-26,0]	23,0 [20,9-25,2]	11,8 [11,0-12,8]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	11,9 [11,0-13,0]	11,4 [10,1-12,8]	12,6 [11,2-14,1]	22,3 [18,4-26,8]	22,2 [19,3-25,5]	10,7 [9,7-11,8]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	17,3 [15,9-18,9]	18,9 [16,7-21,4]	16,1 [14,2-18,1]	23,6 [19,3-28,6]	23,7 [20,9-26,8]	15,2 [13,4-17,1]

Incertain/Je ne sais pas	Tous les répondants	8,0 [7,3-8,7]	7,9 [7,0-8,9]	8,1 [7,2-9,1]	6,7 [5,1-8,8]	5,5↓ [4,4-6,7]	8,4 [7,6-9,2]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	9,3 [8,4-10,2]	9,1 [8,0-10,4]	9,5↓ [8,3-10,9]	9,4 [6,9-12,8]	8,2 [6,3-10,5]	9,3 [8,4-10,3]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	5,0 [4,1-6,0]	4,6 [3,5-6,2]	5,2 [4,1-6,7]	#	#	5,6 [4,6-6,9]

Tableau 18b. Perception quant à la crédibilité des campagnes de sensibilisation et des messages de sécurité ou de santé publique, tous les répondants ayant déclaré avoir vu ou entendu ces messages, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Oui	Tous les répondants	73,2 [72,1-74,2]	75,1 [73,5-76,6]	71,2 [69,7-72,8]	71,3 [67,8-74,6]	69,9 [67,5-72,2]	73,7 [72,4-74,9]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	76,2 [74,9-77,5]	77,2 [75,4-79,0]	75,1 [73,2-77,0]	75,2 [70,5-79,3]	75,2 [71,8-78,3]	76,4 [74,9-77,8]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	66,0 [64,0-67,9]	68,9 [65,9-71,6]	63,6 [60,9-66,3]	66,7 [61,2-71,8]	65,2 [61,8-68,5]	66,0 [63,5-68,4]
Non	Tous les répondants	3,6 [3,1-4,0]	2,5↑ [2,0-3,1]	4,6 [4,0-5,4]	#	4,1 [3,2-5,1]	3,5↑ [3,1-4,1]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	2,6 [2,2-3,2]	2,0 [1,4-2,8]	3,3 [2,6-4,2]	#	#	2,7 [2,2-3,3]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	5,8 [5,0-6,9]	4,0 [3,0-5,3]	7,3 [6,0-8,9]	#	5,9 [4,5-7,7]	6,1 [5,0-7,4]
Un peu	Tous les répondants	18,2 [17,3-19,1]	17,2 [15,9-18,6]	19,2 [17,9-20,5]	21,0 [18,1-24,3]	21,8 [19,7-23,9]	17,6 [16,6-18,7]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	15,3 [14,3-16,4]	15,0 [13,5-16,6]	15,7 [14,2-17,3]	15,9 [12,5-19,9]	16,8 [14,2-19,8]	15,2 [14,0-16,4]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	24,9 [23,2-26,7]	23,4 [20,9-26,1]	26,1 [23,7-28,6]	27,8 [23,0-33,1]	26,1 [23,1-29,3]	24,3 [22,1-26,6]

Incertain/Je ne sais pas	Tous les répondants	5,1 [4,6-5,7]	5,2 [4,5-6,1]	5,0 [4,3-5,8]	4,5↑* [3,2-6,3]	4,3 [3,4-5,5]	5,2 [4,6-5,9]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	5,8 [5,1-6,6]	5,8 [4,9-6,8]	5,9 [4,9-7,0]	#	6,1 [4,5-8,2]	5,8 [5,0-6,6]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	3,3 [2,6-4,2]	3,7* [2,6-5,2]	3,0 [2,2-4,1]	#	#	3,6 [2,7-4,7]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 19a. Opinion sur l'accès à une quantité suffisante de renseignements fiables sur les risques pour la santé liés à la consommation de cannabis pour prendre des décisions éclairées, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2020

	Tout à fait d'accord (%)	Plutôt d'accord (%)	Ni d'accord, ni en désaccord (%)	Plutôt en désaccord (%)	Pas du tout d'accord (%)
Tous les répondants	44,3 [43,2-45,4]	32,7 [31,7-33,8]	11,4 [10,7-12,2]	7,5↓ [6,9-8,1]	4,1 [3,7-4,6]
Non-usagers au cours des 12 derniers mois	37,8 [36,5-39,1]	34,3 [33,1-35,6]	13,8 [12,9-14,8]	9,0 [8,2-9,8]	5,1 [4,5-5,7]
Usagers au cours des 12 derniers mois	61,9 [59,9-63,8]	28,0 [26,3-29,9]	5,1 [4,3-6,1]	3,5↓ [2,8-4,3]	1,5↓ [1,1-2,0]

Tableau 19b. Connaissance des lignes directrices de réduction des risques liés à l'utilisation du cannabis, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Oui	Tous les répondants	9,9 [9,3-10,6]	9,6 [8,7-10,5]	10,2 [9,3-11,2]	12,3 [10,2-14,9]	12,2 [10,8-13,9]	9,5↑ [8,8-10,3]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	8,7 [8,0-9,4]	8,5↓ [7,5-9,6]	8,9 [7,9-10,0]	12,6 [9,7-16,1]	9,1 [7,3-11,3]	8,5↓ [7,7-9,3]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	13,0 [11,8-14,4]	13,1 [11,3-15,2]	13,0 [11,4-14,8]	12,3 [9,3-16,1]	15,0 [12,8-17,5]	12,7 [11,2-14,4]
Non	Tous les répondants	74,2 [73,3-75,2]	73,2 [71,8-74,6]	75,3 [74,0-76,6]	71,8 [68,5-74,9]	71,2 [69,0-73,3]	74,7 [73,6-75,7]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	75,0 [73,8-76,1]	74,0 [72,3-75,5]	76,2 [74,5-77,8]	73,6 [69,2-77,6]	75,1 [71,9-77,9]	75,0 [73,8-76,3]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	72,4 [70,6-74,1]	70,7 [68,1-73,3]	73,7 [71,3-75,9]	70,2 [65,1-74,8]	67,8 [64,6-70,8]	73,6 [71,4-75,6]
Incertain/Je ne sais pas	Tous les répondants	15,8 [15,0-16,7]	17,2 [16,0-18,4]	14,4 [13,4-15,6]	15,8 [13,4-18,6]	16,5↑ [14,8-18,4]	15,8 [14,9-16,7]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	16,4 [15,4-17,4]	17,6 [16,2-19,0]	14,9 [13,6-16,4]	13,8 [10,9-17,4]	15,8 [13,4-18,5]	16,5↑ [15,5-17,6]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	14,6 [13,3-16,0]	16,2 [14,1-18,4]	13,3 [11,6-15,2]	17,5↑ [13,8-22,0]	17,3 [14,9-19,9]	13,7 [12,1-15,5]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 20. Connaissances ou croyances concernant les méfaits du cannabis, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
La fumée du cannabis peut-elle être nocive?							
Oui	Tous les répondants	75,2 [74,3-76,2]	74,2 [72,8-75,6]	76,3 [75,0-77,6]	75,8 [72,6-78,7]	78,6 [76,5-80,5]	74,9 [73,8-76,0]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	76,7 [75,5-77,8]	74,6 [72,9-76,2]	79,1 [77,5-80,6]	79,6 [75,6-83,1]	78,8 [75,8-81,5]	76,4 [75,1-77,6]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	71,8 [70,0-73,5]	73,5↓ [70,8-76,0]	70,4 [67,9-72,8]	71,4 [66,2-76,0]	78,4 [75,5-81,1]	70,5↓ [68,3-72,6]
Non	Tous les répondants	9,4 [8,8-10,1]	8,3 [7,5-9,1]	10,6 [9,7-11,6]	14,6 [12,2-17,4]	12,2 [10,7-13,9]	8,8 [8,2-9,5]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	6,2 [5,6-6,8]	6,1 [5,3-7,1]	6,2 [5,4-7,2]	8,3* [5,9-11,4]	9,2 [7,4-11,5]	5,9 [5,3-6,6]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	18,0 [16,6-19,6]	15,2 [13,2-17,3]	20,3 [18,3-22,6]	22,3 [18,1-27,2]	14,8 [12,6-17,4]	18,2 [16,4-20,1]
Incertain/Je ne sais pas	Tous les répondants	15,3 [14,5-16,2]	17,5↓ [16,3-18,8]	13,1 [12,0-14,2]	9,6 [7,8-11,9]	9,2 [7,9-10,7]	16,2 [15,3-17,2]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	17,1 [16,1-18,2]	19,3 [17,8-20,8]	14,7 [13,4-16,1]	12,1 [9,4-15,4]	12,0 [9,9-14,5]	17,7 [16,6-18,8]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	10,2 [9,0-11,5]	11,4 [9,6-13,4]	9,3 [7,8-11,0]	#	6,7 [5,2-8,6]	11,3 [9,9-13,0]

Est-ce approprié pour une femme enceinte ou qui allaite de consommer du cannabis?

Oui	Tous les répondants	2,9 [2,6-3,3]	2,6 [2,1-3,1]	3,2 [2,7-3,8]	#	2,6 [1,9-3,5]	3,0 [2,6-3,5]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	2,1 [1,8-2,6]	1,8 [1,4-2,3]	2,5↑ [2,0-3,2]	#	#	2,2 [1,8-2,7]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	4,9 [4,1-5,8]	5,1 [4,0-6,5]	4,8 [3,8-6,1]	#	3,5↓* [2,4-5,0]	5,6 [4,6-6,8]
Non	Tous les répondants	88,0 [87,2-88,6]	89,6 [88,7-90,5]	86,2 [85,1-87,2]	89,9 [87,5-91,9]	85,7 [83,9-87,3]	88,0 [87,2-88,8]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	89,6 [88,8-90,4]	91,2 [90,2-92,2]	87,7 [86,4-89,0]	91,2 [88,1-93,6]	87,6 [85,1-89,8]	89,7 [88,8-90,5]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	83,5↓ [82,0-84,9]	84,5↓ [82,3-86,4]	82,7 [80,6-84,6]	88,3 [84,2-91,3]	84,1 [81,4-86,4]	82,8 [81,0-84,5]
Incertain/Je ne sais pas	Tous les répondants	9,1 [8,5-9,8]	7,8 [7,0-8,7]	10,6 [9,6-11,5]	8,6 [6,8-10,9]	11,7 [10,3-13,4]	8,9 [8,3-9,7]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	8,2 [7,6-9,0]	7,0 [6,1-8,0]	9,7 [8,6-10,9]	7,3* [5,2-10,2]	11,0 [9,0-13,5]	8,1 [7,4-8,9]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	11,6 [10,4-12,9]	10,4 [8,8-12,3]	12,5↑ [10,9-14,3]	10,3 [7,4-14,2]	12,4 [10,4-14,9]	11,6 [10,1-13,2]

La consommation quotidienne ou quasi quotidienne de cannabis augmente-t-elle le risque de problèmes de santé mentale?							
Oui	Tous les répondants	65,7 [64,7-66,7]	66,8 [65,4-68,3]	64,5↑ [63,0-66,0]	69,3 [65,9-72,5]	70,7 [68,4-72,8]	65,0 [63,9-66,2]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	69,6 [68,4-70,8]	69,8 [68,1-71,5]	69,4 [67,6-71,1]	70,7 [66,2-74,8]	73,0 [69,8-76,0]	69,4 [68,1-70,7]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	55,2 [53,2-57,1]	57,0 [54,0-59,8]	53,8 [51,1-56,4]	67,5↑ [62,3-72,4]	68,5↓ [65,3-71,5]	51,0 [48,7-53,4]
Non	Tous les répondants	12,5↑ [11,8-13,3]	11,2 [10,3-12,2]	14,0 [13,0-15,1]	14,0 [11,7-16,8]	12,0 [10,5-13,6]	12,5↓ [11,7-13,3]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	8,1 [7,4-8,8]	7,9 [7,0-8,9]	8,3 [7,4-9,4]	10,0 [7,5-13,3]	7,6 [6,0-9,7]	8,0 [7,3-8,8]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	24,2 [22,6-26,0]	21,7 [19,3-24,2]	26,3 [24,0-28,7]	19,1 [15,1-23,8]	15,9 [13,6-18,6]	26,5↓ [24,4-28,7]
Incertain/Je ne sais pas	Tous les répondants	21,8 [20,9-22,7]	22,0 [20,7-23,3]	21,5↑ [20,3-22,8]	16,7 [14,2-19,4]	17,4 [15,6-19,3]	22,5↓ [21,5-23,5]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	22,3 [21,2-23,4]	22,3 [20,8-23,8]	22,3 [20,7-23,9]	19,3 [15,8-23,2]	19,4 [16,7-22,3]	22,6 [21,4-23,8]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	20,6 [19,0-22,2]	21,4 [19,0-23,9]	20,0 [17,9-22,2]	13,4 [10,2-17,3]	15,6 [13,3-18,2]	22,5↓ [20,5-24,5]

Les adolescents sont-ils plus à risque de préjudice découlant de la consommation de cannabis que les adultes?

Oui	Tous les répondants	83,9 [83,1-84,7]	84,4 [83,2-85,5]	83,4 [82,2-84,5]	84,2 [81,4-86,6]	86,1 [84,4-87,7]	83,7 [82,8-84,6]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	83,7 [82,7-84,7]	83,6 [82,2-84,9]	83,9 [82,5-85,3]	84,0 [80,2-87,2]	83,5↑ [80,8-86,0]	83,7 [82,7-84,8]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	84,6 [83,1-86,0]	87,3 [85,2-89,1]	82,4 [80,2-84,3]	84,7 [80,4-88,2]	88,4 [86,1-90,4]	83,8 [81,9-85,5]
Non	Tous les répondants	5,5↑ [5,1-6,1]	4,9 [4,2-5,6]	6,3 [5,6-7,0]	7,4 [5,8-9,5]	5,4 [4,4-6,6]	5,4 [4,9-6,0]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	4,7 [4,2-5,3]	4,5↑ [3,8-5,4]	4,9 [4,1-5,7]	#	5,3 [3,9-7,0]	4,6 [4,1-5,3]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	7,9 [6,9-9,0]	6,2 [4,9-7,8]	9,3 [7,9-10,9]	10,1 [7,4-13,8]	5,5↑ [4,2-7,2]	8,1 [6,9-9,5]
Incertain/Je ne sais pas	Tous les répondants	10,5↑ [9,9-11,3]	10,7 [9,8-11,7]	10,4 [9,4-11,4]	8,4 [6,6-10,6]	8,5↑ [7,3-10,0]	10,9 [10,1-11,7]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	11,6 [10,7-12,4]	11,9 [10,7-13,1]	11,2 [10,0-12,5]	10,5↑ [7,9-13,9]	11,2 [9,2-13,6]	11,6 [10,7-12,6]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	7,5↑ [6,5-8,7]	6,5↑ [5,2-8,1]	8,3 [6,9-10,0]	#	6,1 [4,7-7,9]	8,1 [6,9-9,6]

La consommation de produits de cannabis contenant une faible concentration de THC entraîne-t-elle un affaiblissement accru des facultés?

Oui	Tous les répondants	13,3 [12,6-14,1]	13,6 [12,6-14,8]	13,1 [12,0-14,2]	12,4 [10,2-14,9]	8,3 [7,1-9,8]	13,9 [13,0-14,7]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	16,3 [15,3-17,3]	15,8 [14,5-17,2]	16,9 [15,5-18,4]	15,7 [12,5-19,5]	12,6 [10,5-15,1]	16,5↑ [15,5-17,6]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	5,1 [4,3-6,1]	6,2 [4,9-7,8]	4,3 [3,3-5,5]	8,4* [5,8-11,9]	4,4 [3,2-6,0]	4,9 [4,0-6,1]
Non	Tous les répondants	44,6 [43,5-45,7]	40,2 [38,7-41,8]	49,3 [47,7-50,8]	45,5↑ [42,0-49,0]	56,1 [53,7-58,5]	43,5↑ [42,3-44,8]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	34,3 [33,1-35,6]	31,8 [30,1-33,5]	37,2 [35,4-39,1]	30,5↑ [26,4-35,4]	38,7 [35,4-42,2]	34,2 [32,9-35,6]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	72,7 [70,9-74,4]	68,0 [65,2-70,6]	76,5↓ [74,2-78,7]	64,5↓ [59,2-69,4]	71,9 [68,8-74,7]	73,8 [71,7-75,9]
Incertain/Je ne sais pas	Tous les répondants	42,0 [40,9-43,1]	46,1 [44,6-47,7]	37,7 [36,2-39,2]	42,1 [38,7-45,6]	35,6 [33,3-37,9]	42,6 [41,4-43,8]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	49,4 [48,1-50,7]	52,4 [50,6-54,2]	45,9 [44,0-47,8]	53,8 [49,1-58,5]	48,6 [45,2-52,1]	49,2 [47,8-50,7]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	22,2 [20,6-23,8]	25,8 [23,4-28,4]	19,2 [17,2-21,4]	27,1 [22,7-32,1]	23,8 [21,0-26,7]	21,2 [19,3-23,3]

Est-il possible qu'il faille jusqu'à quatre heures pour ressentir le plein effet des produits comestibles ou des boissons à base de cannabis?

Oui	Tous les répondants	52,2 [51,1-53,4]	51,7 [50,1-53,2]	52,8 [51,3-54,4]	62,1 [58,6-65,5]	69,1 [66,8-71,2]	50,1 [48,9-51,3]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	44,4 [43,1-45,7]	44,2 [42,4-46,0]	44,7 [42,8-46,6]	54,0 [49,3-58,7]	57,2 [53,8-60,6]	43,2 [41,8-44,7]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	73,4 [71,6-75,1]	76,3 [73,7-78,7]	71,1 [68,7-73,5]	72,7 [67,7-77,2]	79,7 [76,9-82,2]	72,3 [70,0-74,4]
Non	Tous les répondants	10,1 [9,5-10,8]	8,5↑ [7,7-9,4]	11,8 [10,9-12,9]	10,8 [8,8-13,2]	8,8 [7,6-10,3]	10,2 [9,5-11,0]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	8,7 [8,0-9,4]	7,9 [6,9-8,9]	9,6 [8,5-10,8]	7,9 [5,8-10,9]	6,2 [4,8-8,1]	8,8 [8,1-9,7]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	14,0 [12,7-15,5]	10,6 [9,0-12,5]	16,8 [14,9-18,9]	14,1 [10,8-18,3]	11,2 [9,3-13,4]	14,6 [13,0-16,4]
Incertain/Je ne sais pas	Tous les répondants	37,6 [36,5-38,7]	39,8 [38,2-41,3]	35,3 [33,8-36,8]	27,1 [24,0-30,3]	22,1 [20,2-24,2]	39,7 [38,5-40,9]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	46,9 [45,6-48,2]	48,0 [46,1-49,8]	45,7 [43,8-47,6]	38,0 [33,5-42,7]	36,5↑ [33,2-39,9]	47,9 [46,5-49,4]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	12,5↑ [11,2-13,9]	13,1 [11,2-15,3]	12,1 [10,4-14,0]	13,1 [9,9-17,2]	9,1 [7,4-11,3]	13,2 [11,5-14,9]

Les effets de l'inhalation de cannabis sont-ils plus durables que ceux de la consommation de produits comestibles ou de boissons à base de cannabis?

Oui	Tous les répondants	9,1 [8,5-9,7]	9,1 [8,2-10,0]	9,1 [8,2-10,1]	14,5↓ [12,2-17,1]	8,7 [7,4-10,1]	8,8 [8,1-9,5]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	10,1 [9,3-10,9]	9,5↑ [8,5-10,7]	10,6 [9,5-11,9]	16,4 [13,2-20,2]	10,5↓ [8,5-12,8]	9,7 [8,9-10,6]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	6,4 [5,5-7,4]	7,5↓ [6,1-9,1]	5,5↑ [4,4-6,9]	11,9 [8,8-15,7]	6,9 [5,4-8,9]	5,6 [4,6-6,9]
Non	Tous les répondants	39,5↑ [38,5-40,6]	35,6 [34,1-37,0]	43,7 [42,2-45,2]	47,6 [44,1-51,1]	58,9 [56,5-61,3]	37,3 [36,1-38,4]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	27,5↓ [26,3-28,7]	26,1 [24,6-27,8]	29,0 [27,4-30,8]	30,1 [26,0-34,6]	38,6 [35,3-42,0]	26,7 [25,5-28,0]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	72,2 [70,4-74,0]	66,5↓ [63,6-69,2]	76,8 [74,4-79,0]	70,4 [65,3-75,0]	77,4 [74,4-80,1]	71,4 [69,1-73,5]
Incertain/Je ne sais pas	Tous les répondants	51,4 [50,3-52,5]	55,3 [53,8-56,9]	47,2 [45,7-48,8]	38,0 [34,6-41,5]	32,4 [30,2-34,7]	54,0 [52,7-55,2]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	62,5↓ [61,2-63,7]	64,3 [62,6-66,0]	60,3 [58,4-62,2]	53,5↓ [48,7-58,2]	50,9 [47,5-54,4]	63,5↑ [62,2-64,9]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	21,4 [19,8-23,1]	26,1 [23,5-28,7]	17,7 [15,7-19,9]	17,8 [14,0-22,2]	15,7 [13,4-18,3]	23,0 [21,0-25,1]

L'utilisation du cannabis peut-elle causer une dépendance chez certaines personnes?							
Oui	Tous les répondants	90,0 [89,3-90,6]	90,8 [89,9-91,7]	89,0 [88,0-90,0]	96,1 [94,6-97,3]	94,2 [93,0-95,3]	89,2 [88,4-89,9]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	89,1 [88,2-89,9]	90,1 [88,9-91,1]	87,9 [86,6-89,1]	96,3 [94,1-97,6]	92,0 [89,9-93,7]	88,6 [87,6-89,5]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	92,6 [91,4-93,6]	93,5↑ [91,8-94,9]	91,8 [90,1-93,1]	96,6 [94,0-98,1]	96,2 [94,8-97,3]	91,3 [89,9-92,6]
Non	Tous les répondants	2,4 [2,1-2,8]	1,7 [1,3-2,1]	3,2 [2,7-3,8]	#	1,7* [1,2-2,4]	2,5↑ [2,1-2,9]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	1,8 [1,5-2,2]	1,3 [1,0-1,8]	2,4 [1,9-3,1]	#	#	1,9 [1,5-2,3]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	3,7 [3,0-4,6]	2,5↑* [1,7-3,6]	4,7 [3,7-6,0]	#	#	4,2 [3,4-5,3]
Incertain/Je ne sais pas	Tous les répondants	7,6 [7,1-8,3]	7,5↓ [6,7-8,4]	7,8 [7,0-8,7]	#	4,1 [3,2-5,2]	8,3 [7,7-9,0]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	9,1 [8,3-9,9]	8,6 [7,6-9,7]	9,6 [8,6-10,8]	#	6,7 [5,1-8,6]	9,5↑ [8,7-10,4]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	3,7 [3,0-4,6]	3,9 [2,8-5,4]	3,5↑ [2,6-4,7]	#	#	4,4 [3,5-5,6]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 21. Méthodes de consommation du cannabis à l'intérieur de la maison au cours des 12 derniers mois¹, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Une personne a fumé du cannabis	Tous les répondants	26,6 [25,7-27,5]	25,1 [23,8-26,4]	28,2 [26,9-29,5]	40,6 [37,2-44,2]	50,4 [48,0-52,8]	23,6 [22,6-24,6]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	9,7 [9,0-10,5]	11,1 [10,0-12,2]	8,2 [7,2-9,2]	13,8 [10,9-17,4]	18,7 [16,2-21,5]	9,0 [8,3-9,9]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	72,4 [70,6-74,2]	71,2 [68,5-73,8]	73,4 [70,9-75,7]	75,1 [70,1-79,5]	79,4 [76,5-81,9]	70,7 [68,5-72,9]
Une personne a vapoté du cannabis	Tous les répondants	11,2 [10,6-11,9]	9,4 [8,6-10,3]	13,2 [12,3-14,2]	15,7 [13,4-18,4]	21,7 [19,8-23,7]	10,0 [9,4-10,7]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	3,5↓ [3,0-3,9]	3,7 [3,1-4,4]	3,2 [2,6-3,9]	#	5,8 [4,4-7,7]	3,3 [2,8-3,8]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	32,5↑ [30,7-34,3]	28,3 [25,8-31,0]	35,9 [33,4-38,4]	29,7 [25,1-34,8]	36,0 [32,9-39,3]	32,1 [30,0-34,4]
Bu ou mangé un produit du cannabis	Tous les répondants	20,6 [19,8-21,5]	20,1 [19,0-21,3]	21,2 [20,0-22,4]	29,8 [26,7-33,2]	39,4 [37,1-41,8]	18,4 [17,5-19,3]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	6,9 [6,3-7,5]	7,6 [6,8-8,6]	6,0 [5,1-6,9]	8,4 [6,1-11,5]	9,9 [8,0-12,2]	6,6 [6,0-7,4]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	58,0 [56,1-59,9]	60,6 [57,7-63,4]	56,0 [53,3-58,6]	57,1 [51,7-62,3]	66,3 [63,2-69,4]	56,5↓ [54,1-58,8]
Consommé du cannabis d'une autre façon	Tous les répondants	3,6 [3,2-4,0]	4,7 [4,1-5,4]	2,4 [2,0-2,9]	3,5↑* [2,4-5,1]	3,3 [2,6-4,3]	3,6 [3,2-4,1]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	2,9 [2,4-3,3]	3,9 [3,2-4,7]	1,6 [1,2-2,2]	#	#	3,0 [2,5-3,5]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	5,3 [4,5-6,3]	6,9 [5,5-8,5]	4,1 [3,2-5,2]	#	5,3 [4,0-7,0]	5,4 [4,4-6,6]
Personne n'a consommé de cannabis dans sa	Tous les répondants	64,2 [63,1-65,2]	64,5↑ [63,1-66,0]	63,8 [62,3-65,2]	52,2 [48,6-55,7]	41,4 [39,0-43,8]	67,0 [65,8-68,1]
	Non-usagers au cours des 12	83,9	81,4	86,9	80,8	77,1	84,5↓

Le cannabis dans ma résidence	derniers mois	[82,9-84,9]	[79,9-82,7]	[85,6-88,1]	[76,8-84,3]	[74,0-79,9]	[83,4-85,4]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	10,8	9,7	11,6	15,2	9,1	10,6
	[9,6-12,1]	[8,1-11,6]	[10,0-13,5]	[11,7-19,6]	[7,4-11,2]	[9,2-12,2]	

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 22. Exposition à la fumée ou à la vapeur secondaire de cannabis dans les lieux suivants au cours des 30 derniers jours, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Maison/résidence							
Oui	Tous les répondants	18,6 [17,8-19,4]	18,7 [17,6-19,9]	18,5↓ [17,3-19,7]	21,8 [19,0-24,8]	27,9 [25,8-30,1]	17,6 [16,7-18,5]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	11,5↓ [10,7-12,3]	12,2 [11,1-13,4]	10,6 [9,5-11,8]	12,7 [9,9-16,3]	15,4 [13,0-18,1]	11,2 [10,3-12,1]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	37,8 [35,9-39,7]	40,1 [37,4-43,0]	35,9 [33,4-38,4]	33,1 [28,3-38,4]	39,2 [36,0-42,5]	38,1 [35,8-40,4]
Non	Tous les répondants	79,1 [78,3-80,0]	79,1 [77,8-80,2]	79,2 [78,0-80,4]	75,3 [72,1-78,2]	69,5↓ [67,2-71,6]	80,3 [79,3-81,2]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	85,9 [84,9-86,7]	85,3 [84,0-86,5]	86,5↑ [85,2-87,7]	83,8 [79,9-87,0]	80,4 [77,5-83,0]	86,3 [85,3-87,2]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	61,2 [59,3-63,1]	58,8 [56,0-61,6]	63,1 [60,5-65,6]	64,8 [59,5-69,7]	59,4 [56,1-62,6]	61,1 [58,7-63,4]
Ne sais pas	Tous les répondants	2,2 [2,0-2,6]	2,2 [1,8-2,7]	2,3 [1,9-2,8]	#	2,7 [2,0-3,6]	2,2 [1,9-2,6]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	2,7 [2,3-3,1]	2,6 [2,0-3,2]	2,9 [2,3-3,5]	#	4,2* [3,0-5,9]	2,6 [2,2-3,1]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	1,0* [0,7-1,5]	#	#	#	#	#

Milieu de travail ou à l'école							
Oui	Tous les répondants	4,9 [4,4-5,3]	4,1 [3,6-4,7]	5,6 [5,0-6,3]	15,2 [12,8-17,9]	9,0 [7,7-10,5]	3,8 [3,4-4,3]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	4,9 [4,4-5,4]	4,2 [3,6-4,9]	5,6 [4,9-6,5]	16,1 [12,9-19,9]	11,0 [9,0-13,3]	4,0 [3,5-4,5]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	4,9 [4,2-5,7]	4,0 [3,1-5,2]	5,6 [4,6-6,8]	13,9 [10,6-18,1]	7,3 [5,7-9,2]	3,3 [2,6-4,3]
Non	Tous les répondants	93,3 [92,8-93,8]	94,1 [93,4-94,7]	92,5↓ [91,7-93,2]	81,8 [78,9-84,4]	89,4 [87,8-90,8]	94,4 [93,8-94,9]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	92,9 [92,3-93,5]	93,7 [92,8-94,4]	92,1 [91,0-93,0]	80,3 [76,2-83,8]	86,3 [83,7-88,5]	93,9 [93,2-94,5]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	94,4 [93,6-95,2]	95,6 [94,5-96,6]	93,5↓ [92,2-94,6]	84,3 [80,0-87,8]	92,2 [90,2-93,9]	96,1 [95,1-96,9]
Ne sais pas	Tous les répondants	1,9 [1,6-2,2]	1,8 [1,4-2,3]	1,9 [1,5-2,4]	#	#	1,8 [1,5-2,2]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	2,2 [1,9-2,6]	2,2 [1,7-2,8]	2,3 [1,8-2,9]	#	#	2,1 [1,7-2,6]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	#	#	#	#	#	#

Voiture ou autre véhicule privé

Oui	Tous les répondants	5,4 [4,9-5,8]	4,4 [3,9-5,0]	6,3 [5,7-7,1]	15,3 [12,9-18,1]	10,2 [8,9-11,8]	4,3 [3,8-4,8]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	3,5↓ [3,1-3,9]	2,7 [2,2-3,3]	4,4 [3,7-5,2]	8,8 [6,4-11,8]	6,2 [4,8-8,1]	3,1 [2,6-3,6]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	10,4 [9,4-11,6]	10,2 [8,6-11,9]	10,7 [9,2-12,3]	23,6 [19,2-28,5]	13,9 [11,7-16,3]	8,2 [7,0-9,5]
Non	Tous les répondants	93,5↓ [93,0-93,9]	94,5↓ [93,8-95,1]	92,4 [91,6-93,1]	82,7 [79,8-85,2]	88,2 [86,6-89,7]	94,6 [94,1-95,1]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	95,1 [94,6-95,6]	96,0 [95,3-96,6]	94,1 [93,2-94,9]	89,0 [85,6-91,6]	91,2 [89,1-93,0]	95,6 [95,0-96,2]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	89,0 [87,9-90,1]	89,4 [87,5-90,9]	88,8 [87,2-90,2]	74,8 [69,8-79,3]	85,4 [82,9-87,6]	91,5↓ [90,1-92,7]
Ne sais pas	Tous les répondants	1,2 [1,0-1,4]	1,1 [0,8-1,4]	1,3 [1,0-1,7]	#	#	1,1 [0,9-1,4]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	1,4 [1,1-1,7]	1,3 [0,9-1,7]	1,6 [1,2-2,1]	#	#	1,3 [1,0-1,7]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	#	#	#	#	#	#

Endroits publics (p. ex., centres commerciaux, rues, etc.)							
Oui	Tous les répondants	36,0 [35,0-37,1]	35,4 [33,9-36,9]	36,7 [35,3-38,2]	39,2 [35,8-42,6]	42,1 [39,7-44,5]	35,3 [34,2-36,5]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	36,4 [35,2-37,7]	35,5↓ [33,8-37,2]	37,5↓ [35,7-39,3]	40,7 [36,2-45,4]	45,9 [42,4-49,4]	35,7 [34,3-37,0]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	35,1 [33,3-37,0]	34,9 [32,2-37,7]	35,3 [32,8-37,8]	37,5↓ [32,5-42,7]	38,7 [35,5-42,0]	34,1 [31,9-36,4]
Non	Tous les répondants	60,0 [58,9-61,1]	60,9 [59,4-62,4]	59,1 [57,5-60,6]	56,1 [52,6-59,6]	55,5↓ [53,1-57,8]	60,7 [59,5-61,9]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	58,8 [57,5-60,1]	60,2 [58,4-61,9]	57,1 [55,2-59,0]	52,5↑ [47,8-57,2]	50,1 [46,6-53,6]	59,6 [58,2-60,9]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	63,5↓ [61,6-65,3]	63,7 [60,9-66,4]	63,3 [60,7-65,8]	60,8 [55,5-65,8]	60,3 [57,0-63,5]	64,4 [62,1-66,7]
Ne sais pas	Tous les répondants	3,9 [3,5-4,4]	3,7 [3,2-4,3]	4,2 [3,6-4,9]	4,7 [3,4-6,5]	2,5↓ [1,8-3,3]	4,0 [3,6-4,5]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	4,8 [4,3-5,4]	4,3 [3,7-5,1]	5,4 [4,6-6,3]	6,7* [4,7-9,6]	4,0* [2,8-5,6]	4,8 [4,2-5,4]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	1,4* [1,0-2,0]	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 23a. Toute personne, y compris vous-même, ayant cultivé du cannabis dans sa résidence ou à proximité de celle-ci au cours des 12 derniers mois, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Oui	Tous les répondants	6,6 [6,1-7,1]	6,2 [5,5-6,9]	7,0 [6,3-7,8]	6,9 [5,3-8,9]	8,2 [7,0-9,7]	6,4 [5,9-7,0]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	3,3 [2,9-3,8]	3,3 [2,7-4,0]	3,3 [2,7-4,1]	#	#	3,3 [2,8-3,9]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	15,3 [13,9-16,8]	15,5↓ [13,4-17,7]	15,2 [13,4-17,2]	10,8 [7,9-14,6]	12,9 [10,8-15,3]	16,3 [14,6-18,2]
Non	Tous les répondants	90,4 [89,7-91,0]	90,9 [90,0-91,7]	89,9 [88,9-90,7]	88,4 [85,9-90,4]	88,0 [86,4-89,6]	90,7 [90,0-91,4]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	93,4 [92,7-94,0]	93,6 [92,6-94,4]	93,2 [92,2-94,1]	90,4 [87,2-92,9]	91,9 [89,8-93,7]	93,6 [92,9-94,3]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	82,5↓ [80,9-83,9]	82,3 [79,9-84,4]	82,7 [80,6-84,6]	85,8 [81,7-89,2]	84,6 [82,0-86,9]	81,6 [79,7-83,4]
Ne sais pas	Tous les répondants	3,0 [2,7-3,4]	2,9 [2,4-3,5]	3,1 [2,6-3,7]	4,8 [3,5-6,5]	3,7 [2,9-4,7]	2,8 [2,4-3,3]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	3,3 [2,8-3,8]	3,1 [2,5-3,8]	3,5↓ [2,8-4,2]	#	4,9 [3,6-6,7]	3,1 [2,6-3,6]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	2,2 [1,7-2,9]	2,3* [1,6-3,3]	2,2* [1,5-3,1]	#	#	2,0* [1,4-2,9]

Tableau 23b. Nombre actuel de plants cultivés dans la résidence ou à proximité de celle-ci, répondants ayant déclaré avoir cultivé des plants dans leur résidence ou à proximité de celle-ci au cours des 12 derniers mois, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

		Total (n ^{bre})	Femmes (n ^{bre})	Hommes (n ^{bre})	16-19 (n ^{bre})	20-24 (n ^{bre})	25+ (n ^{bre})
Nombre moyen de plants cultivés	Tous les répondants	3,4 [3,1-3,7]	3,3 [2,8-3,7]	3,5↑ [3,1-4,0]	#	2,9 [2,4-3,4]	3,5↓ [3,1-3,8]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	3,8 [3,0-4,5]	3,3 [2,4-4,2]	4,4 [3,2-5,6]	#	#	3,9 [3,0-4,7]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	3,2 [3,0-3,5]	3,3 [2,8-3,8]	3,2 [2,9-3,5]	#	3,0 [2,4-3,6]	3,3 [3,0-3,6]
Nombre médian de plants cultivés	Tous les répondants	3,0 [2,6-3,4]	3,0 [2,5-3,5]	3,0 [2,5-3,5]	#	2,0 [1,5-2,5]	3,0 [2,6-3,4]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	3,0 [2,5-3,5]	3,0 [2,2-3,8]	3,0 [2,4-3,6]	#	#	3,0 [2,5-3,5]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	3,0 [2,6-3,4]	3,0 [2,5-3,5]	3,0 [2,5-3,5]	#	2,0 [1,2-2,8]	4,0 [3,6-4,4]

Remarque : Les répondants ayant déclaré cultiver actuellement plus de 25 plantes n'ont pas pu être inclus dans le calcul de la moyenne, car il a été impossible de déterminer le nombre précis de plants.

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 24. Toute personne, y compris vous-même, ayant préparé des produits comestibles ou des boissons à base de cannabis dans sa résidence au cours des 12 derniers mois, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Oui	Tous les répondants	6,9 [6,4-7,4]	6,4 [5,8-7,2]	7,4 [6,7-8,2]	9,9 [8,0-12,2]	15,2 [13,5-16,9]	6,0 [5,5-6,6]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	2,6 [2,2-3,0]	2,7 [2,2-3,3]	2,4 [1,9-3,0]	#	4,3* [3,1-6,0]	2,4 [2,0-2,9]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	18,8 [17,3-20,3]	18,7 [16,6-21,0]	18,8 [16,9-20,9]	18,6 [14,9-23,2]	25,0 [22,3-28,0]	17,5↑ [15,8-19,4]
Non	Tous les répondants	91,6 [91,1-92,2]	92,3 [91,4-93,0]	91,0 [90,2-91,8]	87,8 [85,3-89,9]	82,2 [80,3-84,0]	92,7 [92,1-93,3]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	95,8 [95,2-96,3]	95,8 [95,0-96,4]	95,8 [95,0-96,5]	93,5↓ [90,8-95,4]	91,7 [89,6-93,5]	96,1 [95,5-96,6]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	80,6 [79,0-82,0]	80,7 [78,4-82,9]	80,5↓ [78,4-82,4]	80,5↑ [76,0-84,4]	73,7 [70,7-76,5]	82,0 [80,1-83,7]
Ne sais pas	Tous les répondants	1,4 [1,2-1,7]	1,3 [1,0-1,7]	1,6 [1,2-2,0]	#	2,6 [2,0-3,5]	1,3 [1,0-1,6]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	1,7 [1,4-2,0]	1,5↑ [1,2-2,1]	1,8 [1,4-2,4]	#	4,0* [2,8-5,6]	1,5↓ [1,2-1,9]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 25. Opinion – la consommation de cannabis affecte négativement la conduite automobile, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Oui	Tous les répondants	83,0 [82,1-83,8]	83,8 [82,6-84,9]	82,0 [80,8-83,2]	78,8 [75,8-81,6]	79,5↓ [77,4-81,3]	83,5↑ [82,6-84,4]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	85,5↑ [84,5-86,4]	85,0 [83,6-86,2]	86,1 [84,8-87,4]	84,0 [80,2-87,2]	85,2 [82,5-87,5]	85,6 [84,6-86,6]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	76,5↑ [74,8-78,1]	80,4 [78,0-82,6]	73,4 [71,0-75,6]	72,8 [67,7-77,3]	74,4 [71,3-77,2]	77,4 [75,3-79,3]
Non	Tous les répondants	5,3 [4,8-5,8]	4,4 [3,8-5,1]	6,2 [5,4-7,0]	6,1 [4,7-8,0]	4,6 [3,7-5,7]	5,3 [4,7-5,8]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	4,7 [4,2-5,3]	4,2 [3,5-5,0]	5,3 [4,5-6,2]	#	4,9 [3,6-6,6]	4,7 [4,1-5,3]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	6,6 [5,7-7,7]	5,0 [3,9-6,4]	7,9 [6,6-9,5]	#	4,1 [3,0-5,7]	7,0 [5,9-8,4]
Cela dépend	Tous les répondants	6,0 [5,5-6,5]	5,4 [4,8-6,1]	6,6 [5,9-7,4]	9,0 [7,1-11,3]	12,5↓ [11,0-14,2]	5,2 [4,7-5,8]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	2,9 [2,5-3,4]	3,2 [2,6-3,9]	2,5↑ [2,0-3,1]	#	4,0* [2,8-5,5]	2,8 [2,4-3,3]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	14,3 [13,0-15,6]	12,3 [10,6-14,3]	15,8 [14,0-17,8]	16,2 [12,5-20,7]	20,2 [17,7-23,1]	12,8 [11,3-14,5]
Incertain/Je ne sais pas	Tous les répondants	5,8 [5,3-6,3]	6,4 [5,6-7,2]	5,2 [4,5-5,9]	6,1 [4,6-8,0]	3,5↓ [2,7-4,5]	6,0 [5,4-6,6]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	6,9 [6,3-7,6]	7,6 [6,7-8,7]	6,1 [5,3-7,1]	7,5↑* [5,4-10,5]	6,0 [4,5-7,9]	6,9 [6,2-7,7]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	2,6 [2,0-3,3]	2,2* [1,5-3,3]	2,9 [2,1-4,0]	#	#	2,8 [2,1-3,7]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 26. Opinion – temps d’attente requis pour conduire sécuritairement après avoir consommé du cannabis, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d’âge, Canada, 2020

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Immédiatement	Tous les répondants	2,1 [1,8-2,5]	1,8 [1,4-2,3]	2,4 [2,0-3,0]	#	#	2,2 [1,8-2,6]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	1,8 [1,5-2,2]	1,8 [1,4-2,4]	1,8 [1,4-2,5]	#	#	1,9 [1,5-2,3]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	2,8 [2,2-3,5]	#	3,8 [2,9-5,0]	#	#	3,0 [2,3-3,9]
De 30 à moins de 60 minutes	Tous les répondants	1,0 [0,9-1,2]	0,9 [0,7-1,2]	1,2 [0,9-1,6]	#	2,0* [1,4-2,8]	0,9 [0,7-1,1]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	0,7 [0,5-0,9]	0,6* [0,4-0,8]	0,8* [0,6-1,2]	#	#	0,6* [0,4-0,8]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	2,0 [1,5-2,6]	1,9* [1,3-2,8]	2,0* [1,4-2,9]	#	#	1,8* [1,3-2,5]
De 1 à moins de 3 heures	Tous les répondants	5,2 [4,7-5,6]	4,3 [3,7-4,9]	6,1 [5,4-6,9]	6,1 [4,6-8,1]	6,1 [5,1-7,3]	5,0 [4,5-5,6]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	2,7 [2,3-3,2]	2,5↑ [2,0-3,2]	3,0 [2,4-3,7]	#	3,8* [2,7-5,3]	2,7 [2,3-3,2]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	11,6 [10,4-12,9]	10,0 [8,3-11,9]	12,9 [11,2-14,8]	11,0 [8,0-14,8]	8,2 [6,6-10,2]	12,3 [10,8-14,0]
De 3 à moins de 5 heures	Tous les répondants	14,7 [14,0-15,5]	12,9 [11,9-14,0]	16,6 [15,5-17,8]	14,6 [12,3-17,2]	18,5↓ [16,7-20,4]	14,4 [13,5-15,3]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	11,6 [10,8-12,5]	10,3 [9,2-11,4]	13,2 [11,9-14,6]	11,4 [8,8-14,7]	13,2 [11,0-15,8]	11,5↑ [10,6-12,5]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	23,2 [21,6-24,9]	21,6 [19,3-24,1]	24,5↑ [22,3-26,8]	18,9 [15,1-23,3]	23,3 [20,6-26,3]	23,7 [21,7-25,8]

De 5 à moins de 7 heures	Tous les répondants	11,1 [10,4-11,8]	11,0 [10,1-12,0]	11,2 [10,2-12,2]	14,3 [11,9-16,9]	15,3 [13,6-17,0]	10,5↑ [9,8-11,3]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	9,8 [9,0-10,6]	9,7 [8,7-10,8]	9,8 [8,8-11,0]	12,2 [9,4-15,7]	14,9 [12,6-17,6]	9,4 [8,6-10,2]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	14,7 [13,3-16,2]	15,5↑ [13,5-17,8]	14,0 [12,2-16,0]	17,1 [13,4-21,7]	15,6 [13,4-18,1]	14,2 [12,6-16,0]
De 7 à moins de 8 heures	Tous les répondants	6,3 [5,8-6,9]	6,4 [5,7-7,2]	6,2 [5,5-7,0]	7,5↑ [5,9-9,5]	9,0 [7,7-10,4]	6,0 [5,5-6,6]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	5,9 [5,4-6,6]	5,8 [5,0-6,6]	6,1 [5,3-7,1]	7,6 [5,5-10,4]	10,0 [8,1-12,3]	5,6 [5,0-6,3]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	7,4 [6,5-8,5]	8,6 [7,1-10,3]	6,5↓ [5,3-7,9]	7,5↓* [5,2-10,7]	8,0 [6,4-10,1]	7,3 [6,2-8,6]
8 heures ou plus	Tous les répondants	24,9 [24,0-25,9]	25,1 [23,8-26,5]	24,7 [23,4-26,1]	27,6 [24,5-30,9]	25,1 [23,0-27,2]	24,7 [23,7-25,8]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	26,9 [25,8-28,1]	26,3 [24,7-27,9]	27,7 [26,0-29,4]	31,7 [27,5-36,3]	28,8 [25,7-32,0]	26,6 [25,4-27,9]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	19,6 [18,1-21,2]	21,4 [19,2-23,9]	18,1 [16,2-20,2]	22,0 [17,8-26,7]	21,6 [19,0-24,5]	18,9 [17,1-20,9]
Autre	Tous les répondants	3,5↓ [3,1-3,9]	3,0 [2,6-3,6]	4,0 [3,5-4,6]	5,1 [3,8-6,9]	6,6 [5,5-7,9]	3,1 [2,7-3,5]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	2,1 [1,7-2,4]	2,2 [1,7-2,8]	1,9 [1,4-2,4]	#	#	2,0 [1,6-2,4]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	7,4 [6,5-8,4]	5,7 [4,6-7,1]	8,8 [7,5-10,3]	8,0* [5,5-11,4]	10,4 [8,6-12,7]	6,8 [5,7-8,0]
Ne sais pas	Tous les répondants	31,1 [30,1-32,2]	34,5↑ [33,0-36,1]	27,6 [26,2-29,0]	20,9 [18,1-23,9]	15,8 [14,2-17,7]	33,2 [32,0-34,4]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	38,4 [37,2-39,8]	40,8 [39,0-42,7]	35,7 [33,8-37,5]	28,5↓ [24,3-33,0]	24,0 [21,2-27,2]	39,7 [38,3-41,1]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	11,3 [10,1-12,6]	13,7 [11,7-15,9]	9,3 [7,9-11,0]	10,4 [7,5-14,2]	8,4 [6,7-10,5]	11,9 [10,4-13,6]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 27. Opinion – probabilité d’être arrêté en conduisant sous l’influence, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2020

		Pas du tout probable (%)	Peu probable (%)	Plutôt probable (%)	Probable (%)	Très probable (%)
Conduire avec les facultés affaiblies par l’alcool	Tous les répondants	2,2 [1,9-2,6]	11,9 [11,1-12,6]	40,7 [39,6-41,8]	30,3 [29,3-31,3]	14,9 [14,2-15,7]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	2,5↑ [2,1-3,0]	13,0 [12,1-13,9]	40,9 [39,6-42,2]	28,6 [27,4-29,8]	15,0 [14,1-16,0]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	1,3* [0,9-1,9]	8,8 [7,7-10,0]	40,0 [38,1-42,0]	35,0 [33,2-36,9]	14,9 [13,6-16,3]
Conduire avec les facultés affaiblies par le cannabis	Tous les répondants	5,1 [4,6-5,6]	30,5↑ [29,5-31,5]	40,3 [39,2-41,4]	17,3 [16,5-18,2]	6,8 [6,2-7,4]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	5,3 [4,7-5,9]	29,5↑ [28,3-30,8]	39,6 [38,3-40,9]	17,7 [16,7-18,7]	7,9 [7,2-8,7]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	4,5↑ [3,8-5,4]	33,3 [31,5-35,2]	41,9 [40,0-43,9]	16,5↑ [15,1-18,0]	3,7 [3,0-4,5]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l’arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l’échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d’échantillonnage élevée ou petite taille de l’échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 28a. Passager d'un véhicule dans les deux heures suivant la consommation de cannabis par le conducteur, tous les répondants, usagers et non-usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Oui	Tous les répondants	23,2 [22,3-24,1]	19,6 [18,5-20,8]	26,9 [25,6-28,3]	28,6 [25,5-31,9]	37,4 [35,1-39,7]	21,5↑ [20,6-22,5]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	13,3 [12,5-14,2]	12,1 [11,1-13,3]	14,7 [13,4-16,1]	12,2 [9,5-15,5]	18,4 [15,9-21,2]	13,1 [12,2-14,0]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	49,8 [47,8-51,7]	43,8 [41,0-46,7]	54,5↑ [51,9-57,1]	49,4 [44,1-54,8]	54,7 [51,3-58,0]	48,8 [46,4-51,2]
Cela est arrivé il y a combien de temps							
Dans les 30 derniers jours	Tous les répondants	13,2 [11,9-14,6]	12,7 [10,8-14,8]	13,6 [11,9-15,6]	24,5↑ [19,4-30,6]	17,4 [14,7-20,6]	11,6 [10,1-13,2]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	6,3 [4,9-8,1]	7,1* [5,0-9,8]	5,7* [3,9-8,2]	#	#	5,3 [3,9-7,3]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	18,2 [16,3-20,3]	17,7 [14,8-21,1]	18,5↓ [16,0-21,3]	25,1 [19,2-32,3]	19,6 [16,3-23,4]	17,0 [14,7-19,7]
Dans les 12 derniers mois	Tous les répondants	23,9 [22,2-25,7]	25,0 [22,4-27,8]	23,1 [20,9-25,5]	50,3 [43,8-56,9]	35,5↑ [31,8-39,3]	19,9 [18,0-21,9]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	12,7 [10,7-15,0]	12,7 [9,8-16,2]	12,7 [10,0-15,9]	#	20,7 [14,9-28,0]	11,0 [9,0-13,5]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	32,0 [29,6-34,5]	36,3 [32,4-40,3]	29,2 [26,2-32,5]	55,4 [47,7-62,8]	40,0 [35,7-44,4]	27,4 [24,5-30,5]
Il y a plus de 12 mois	Tous les répondants	62,8 [60,8-64,8]	62,3 [59,3-65,3]	63,3 [60,5-65,9]	25,1 [19,9-31,2]	47,1 [43,2-51,0]	68,5↑ [66,2-70,8]
	Non-usagers au cours des 12 derniers mois	81,0 [78,3-83,4]	80,3 [76,2-83,7]	81,7 [77,9-85,0]	#	68,9 [61,1-75,8]	83,6 [80,7-86,1]
	Usagers au cours des 12 derniers mois	49,8 [47,1-52,5]	46,0 [41,9-50,2]	52,2 [48,8-55,8]	19,5↓ [14,2-26,2]	40,5↓ [36,1-44,9]	55,6 [52,2-58,8]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 28b. Passager d'un véhicule dans les deux heures suivant la consommation de cannabis par le conducteur, tous les répondants, selon la province/les territoires, Canada, 2020

			Cela est arrivé il y a combien de temps?		
		Oui (%)	Dans les 30 derniers jours (%)	Dans les 12 derniers mois (%)	Il y a plus de 12 mois (%)
Passager dans un véhicule conduit par une personne qui a pris le volant dans les deux heures après avoir consommé du cannabis	Canada	23,2 [22,3-24,1]	13,2 [11,9-14,6]	23,9 [22,2-25,7]	62,8 [60,8-64,8]
	Terre-Neuve-et-Labrador	27,1 [22,8-31,8]	#	#	60,1 [50,6-68,8]
	Île-du-Prince-Édouard	22,3 [18,5-26,6]	#	33,0 [24,1-43,2]	55,5↓ [45,2-65,3]
	Nouvelle-Écosse	28,2 [24,1-32,7]	#	24,1 [17,5-32,2]	61,8 [53,0-69,8]
	Nouveau-Brunswick	23,0 [19,2-27,4]	#	#	58,8 [48,9-68,1]
	Québec	18,0 [16,3-19,8]	12,1 [9,4-15,6]	24,3 [20,3-28,8]	63,6 [58,6-68,3]
	Ontario	22,6 [21,1-24,2]	12,6 [10,3-15,3]	24,6 [21,6-27,9]	62,8 [59,1-66,3]
	Manitoba	27,2 [23,4-31,3]	#	30,6 [23,3-39,1]	54,1 [45,4-62,5]
	Saskatchewan	28,0 [23,8-32,5]	#	24,1* [17,2-32,8]	59,2 [50,0-67,8]
	Alberta	25,3 [23,0-27,8]	13,6 [10,4-17,6]	22,6 [18,4-27,3]	63,8 [58,5-68,8]
	Colombie-Britannique	28,0 [25,7-30,4]	12,9 [10,0-16,5]	20,9 [17,2-25,2]	66,1 [61,4-70,6]
	Territoires ¹	38,3 [31,3-45,8]	#	#	48,6 [37,0-60,4]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 29. Proportion, médiane et âge moyen de l'initiation de la consommation de cannabis, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Estimation de la population ('000)	28 907	14 843	14 063	1 621	2 243	25 043
Consommation au cours de la vie	59,6 [58,6-60,7]	56,8 [55,3-58,4]	62,6 [61,1-64,1]	52,2 [48,7-55,8]	68,4 [66,1-70,6]	59,3 [58,1-60,6]
Consommation au cours des 12 derniers mois	26,9 [26,0-27,9]	23,4 [22,2-24,6]	30,7 [29,3-32,1]	43,5↑ [40,0-47,1]	52,5↓ [50,1-54,9]	23,6 [22,6-24,6]
Consommation au cours des 30 derniers jours	18,1 [17,3-18,9]	15,1 [14,1-16,1]	21,3 [20,1-22,5]	27,1 [24,0-30,3]	35,7 [33,4-38,0]	15,9 [15,1-16,8]
Âge médian de l'initiation (ans)	18,0 [17,9-18,1]	18,0 [17,8-18,2]	18,0 [17,8-18,2]	16,0 [15,8-16,2]	17,0 [16,8-17,2]	18,0 [17,7-18,3]
Âge moyen de l'initiation (ans)	20,0 [19,7-20,2]	20,4 [20,0-20,8]	19,5↑ [19,2-19,9]	15,7 [15,5-15,9]	17,2 [17,1-17,4]	20,5↑ [20,2-20,8]

Remarque : Les usagers ayant déclaré avoir commencé à consommer à l'âge de 70 ans ou plus n'ont pas pu être inclus dans le calcul de la moyenne, car il a été impossible de déterminer l'âge précis.

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 30. Proportion, médiane et âge moyen de l'initiation de la consommation de cannabis, selon la province/les territoires, Canada, 2020

	Estimation de la population ('000)	Consommation au cours de la vie (%)	Consommation au cours des 12 derniers mois (%)	Consommation au cours des 30 derniers jours (%)		Âge médian de l'initiation (ans)	Âge moyen de l'initiation (ans)
Canada	28 907	59,6 [58,6-60,7]	26,9 [26,0-27,9]	18,1 [17,3-18,9]		18,0 [17,9-18,1]	20,0 [19,7-20,2]
Terre-Neuve-et-Labrador	440	57,3 [52,0-62,4]	29,4 [25,0-34,2]	21,2 [17,4-25,6]		18,0 [17,1-18,9]	20,6 [19,1-22,1]
Île-du-Prince-Édouard	119	59,6 [54,7-64,4]	27,7 [23,5-32,3]	19,5↑ [15,9-23,7]		18,0 [17,4-18,6]	20,1 [19,0-21,3]
Nouvelle-Écosse	780	66,7 [62,0-71,2]	30,0 [25,9-34,5]	20,8 [17,3-24,9]		18,0 [17,4-18,6]	19,8 [18,7-20,9]
Nouveau-Brunswick	628	62,7 [57,4-67,7]	28,1 [23,9-32,7]	20,0 [16,4-24,2]		18,0 [17,1-18,9]	21,0 [19,5-22,4]
Québec	6 745	60,7 [58,2-63,2]	20,7 [19,0-22,7]	12,0 [10,6-13,5]		18,0 [17,6-18,4]	20,1 [19,5-20,7]
Ontario	11 078	59,5↑ [57,6-61,4]	28,9 [27,3-30,6]	19,3 [17,9-20,8]		18,0 [17,7-18,3]	20,3 [19,8-20,8]
Manitoba	1 018	52,4 [47,9-56,8]	27,6 [23,8-31,7]	17,6 [14,4-21,3]		18,0 [17,2-18,8]	20,6 [19,4-21,7]
Saskatchewan	869	56,7 [51,9-61,4]	26,7 [22,6-31,1]	19,1 [15,6-23,1]		17,0 [16,4-17,6]	19,6 [18,4-20,9]
Alberta	3 240	56,0 [53,2-58,7]	28,2 [25,8-30,7]	20,5↑ [18,4-22,8]		17,0 [16,6-17,4]	19,2 [18,6-19,7]
Colombie-Britannique	3 905	61,9 [59,2-64,5]	29,4 [27,1-31,9]	21,6 [19,5-23,8]		17,0 [16,7-17,3]	19,2 [18,6-19,8]
Territoires¹	85	69,5↓ [62,3-75,8]	36,7 [29,5-44,4]	28,6 [21,9-36,4]		17,0 [16,0-18,0]	18,6 [17,3-20,0]

Remarque : Les usagers ayant déclaré avoir commencé à consommer à l'âge de 70 ans ou plus n'ont pas pu être inclus dans le calcul de la moyenne, car il a été impossible de déterminer l'âge précis.

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 31a. Changement concernant la consommation de cannabis à des fins non médicales¹ en raison de la pandémie de COVID-19, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Augmentation de la consommation	21,7 [20,2-23,3]	22,6 [20,4-25,1]	21,0 [19,0-23,2]	31,4 [26,6-36,5]	30,8 [27,8-34,0]	18,8 [17,0-20,7]
Diminution de la consommation	22,1 [20,5-23,7]	24,5↑ [22,1-27,1]	20,1 [18,2-22,3]	38,2 [33,2-43,6]	28,6 [25,7-31,7]	18,9 [17,0-20,8]
Consommation identique	56,2 [54,2-58,1]	52,8 [49,9-55,7]	58,8 [56,3-61,4]	30,4 [25,7-35,5]	40,6 [37,4-43,9]	62,4 [60,0-64,7]

Tableau 31b. Raisons² de l'augmentation de la consommation de cannabis³ attribuable à la pandémie de COVID-19, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Stress	53,5↓ [49,4-57,4]	58,0 [52,2-63,7]	49,5↑ [44,0-55,1]	51,4 [42,0-60,7]	50,3 [44,3-56,3]	54,9 [49,4-60,3]
Anxiété	52,7 [48,7-56,7]	61,4 [55,6-66,9]	45,2 [39,8-50,7]	52,6 [43,2-61,9]	52,9 [46,9-58,8]	52,6 [47,1-58,1]
Ennui	64,9 [60,8-68,7]	59,9 [54,0-65,6]	69,1 [63,4-74,2]	82,5↑ [74,7-88,3]	79,4 [74,2-83,8]	56,5↑ [51,0-61,9]
Perte d'emploi en raison de COVID-19	21,0 [17,9-24,4]	21,0 [16,7-26,1]	20,9 [16,8-25,7]	#	25,9 [21,0-31,5]	19,9 [15,8-24,7]
Proche directement/indirectement touché par la COVID-19	3,8* [2,5-5,5]	#	#	#	#	#
Accès réduit aux soins de santé	6,2* [4,3-8,7]	#	#	#	#	#
Détente	73,5↓ [69,7-76,9]	75,0 [69,4-79,8]	72,2 [66,8-76,9]	72,8 [63,7-80,4]	76,0 [70,6-80,6]	72,8 [67,4-77,5]
Fermeture ou heures d'ouverture réduites des magasins de cannabis	3,8* [2,5-5,7]	#	#	#	#	#
Incapacité à socialiser avec les autres	#	#	#	#	#	#
Autre	9,3 [7,2-12,0]	9,3* [6,6-13,0]	9,4* [6,4-13,5]	#	10,2* [7,1-14,3]	9,6* [6,7-13,5]

Tableau 31c. Raisons² de la diminution de la consommation de cannabis⁴ attribuable à la pandémie de COVID-19, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Stress	12,4 [10,0-15,3]	11,5↑ [8,4-15,7]	13,3 [9,9-17,6]	#	#	12,3 [9,2-16,4]
Anxiété	12,6 [10,2-15,4]	12,2 [9,1-16,2]	12,9 [9,6-17,2]	#	13,5↑ [9,8-18,4]	11,5↑ [8,5-15,4]
Ennui	10,3 [8,2-12,9]	7,6* [5,2-11,0]	12,9 [9,6-17,1]	#	11,4* [8,0-16,0]	7,8* [5,3-11,2]
Perte d'emploi en raison de COVID-19	5,2* [3,7-7,2]	#	#	#	#	#
Proche directement/indirectement touché par la COVID-19	#	#	#	#	#	#
Accès réduit aux soins de santé	#	#	#	#	#	#
Détente	18,4 [15,3-21,9]	15,7 [11,8-20,7]	21,0 [16,5-26,2]	#	#	21,0 [16,7-26,0]
Fermeture ou heures d'ouverture réduites des magasins de cannabis	16,0 [13,2-19,2]	16,0 [12,1-20,7]	16,0 [12,3-20,6]	#	18,3 [13,9-23,8]	15,1 [11,5-19,6]
Incapacité à socialiser avec les autres	14,1 [11,7-17,0]	15,2 [11,6-19,6]	13,1 [9,9-17,1]	#	23,2 [18,2-29,0]	10,5↑ [7,6-14,4]
Autre	35,6 [31,8-39,7]	39,9 [34,2-45,8]	31,5↓ [26,5-37,0]	31,8 [24,3-40,6]	34,1 [28,4-40,3]	37,0 [31,7-42,6]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Parmi les usagers ayant consommé du cannabis à des fins non médicales au cours des 12 derniers mois.

² Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

³ Parmi les usagers ayant consommé davantage.

⁴ Parmi les usagers ayant moins consommé.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 32. Disposition à déclarer publiquement sa consommation de cannabis maintenant que ce produit est légal, usagers du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Oui, je suis plus disposé à déclarer publiquement que je consomme du cannabis à des fins non médicales	50,8 [48,8-52,7]	51,9 [49,0-54,8]	49,9 [47,2-52,5]	51,1 [45,8-56,4]	56,4 [53,0-59,7]	49,6 [47,2-52,0]
Non, j'étais déjà disposé à déclarer publiquement que je consomme du cannabis à des fins non médicales	24,8 [23,1-26,5]	21,7 [19,4-24,2]	27,3 [25,0-29,7]	20,7 [16,7-25,4]	22,5↑ [19,9-25,4]	25,7 [23,7-27,9]
Non, je ne suis pas plus disposé à déclarer publiquement que je consomme du cannabis à des fins non médicales	17,9 [16,5-19,5]	19,6 [17,4-22,1]	16,6 [14,7-18,7]	18,8 [15,0-23,3]	15,9 [13,6-18,5]	18,2 [16,4-20,2]
Incertain/Je ne sais pas	6,5↑ [5,6-7,6]	6,8 [5,5-8,5]	6,3 [5,1-7,7]	9,3* [6,7-12,9]	5,2 [3,9-6,8]	6,5↓ [5,4-7,8]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 33. Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Moins de 1 jour par mois	34,9 [33,1-36,8]	40,4 [37,6-43,4]	30,5↑ [28,2-33,0]	37,6 [32,6-43,0]	32,7 [29,6-35,9]	35,1 [32,8-37,4]
1 jour par mois	6,7 [5,8-7,8]	7,9 [6,5-9,7]	5,7 [4,6-7,1]	#	6,1 [4,6-7,8]	6,9 [5,7-8,2]
2 ou 3 jours par mois	12,2 [11,0-13,5]	12,9 [11,2-15,0]	11,6 [10,0-13,3]	16,0 [12,5-20,3]	14,4 [12,2-16,9]	11,3 [9,9-12,9]
1 ou 2 jours par semaine	12,8 [11,6-14,2]	11,6 [9,9-13,6]	13,8 [12,1-15,7]	11,6 [8,6-15,5]	14,8 [12,6-17,4]	12,6 [11,1-14,2]
3 ou 4 jours par semaine	8,5↑ [7,5-9,7]	7,3 [5,9-8,8]	9,5↑ [8,1-11,2]	#	8,6 [7,0-10,7]	8,7 [7,5-10,1]
5 ou 6 jours par semaine	7,1 [6,2-8,1]	6,1 [4,9-7,6]	7,9 [6,6-9,4]	#	7,1 [5,5-9,0]	7,1 [6,0-8,4]
Tous les jours	17,7 [16,3-19,3]	13,7 [11,8-15,8]	21,0 [18,9-23,2]	14,5↑ [11,1-18,8]	16,3 [14,0-18,9]	18,4 [16,7-20,3]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 34. Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon la province/les territoires, Canada, 2020

	Moins qu'une fois par mois (%)	Chaque mois (1 à 3 jours par mois) (%)	Chaque semaine (1 à 4 jours par semaine) (%)	Tous les jours ou presque (5 jours/semaine et plus) (%)
Canada	34,9 [33,1-36,8]	18,9 [17,4-20,5]	21,3 [19,8-23,0]	24,8 [23,2-26,6]
Terre-Neuve-et-Labrador	28,2 [20,7-37,2]	#	#	26,9 [19,6-35,7]
Île-du-Prince-Édouard	36,5↓ [28,0-45,8]	#	#	25,0 [17,9-33,7]
Nouvelle-Écosse	27,8 [21,0-35,8]	19,2* [13,6-26,4]	24,0 [17,4-32,0]	29,0 [21,8-37,4]
Nouveau-Brunswick	31,1 [23,7-39,6]	#	25,1 [18,3-33,5]	25,2 [18,3-33,8]
Québec	45,4 [40,7-50,2]	19,0 [15,4-23,1]	19,3 [15,8-23,4]	16,3 [13,2-20,0]
Ontario	34,8 [31,6-38,0]	19,0 [16,6-21,7]	19,7 [17,2-22,4]	26,5↑ [23,7-29,6]
Manitoba	35,4 [27,7-44,0]	#	#	29,7 [22,5-38,0]
Saskatchewan	30,0 [22,2-39,1]	#	#	27,8 [20,4-36,6]
Alberta	32,2 [27,7-37,2]	17,3 [13,8-21,4]	25,6 [21,3-30,3]	24,9 [20,7-29,7]
Colombie-Britannique	28,5↑ [24,4-33,0]	19,3 [15,9-23,2]	24,9 [21,0-29,3]	27,3 [23,2-31,8]
Territoires¹	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 35a. Fréquence de la consommation de cannabis au cours des 30 derniers jours¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (jours)	Femmes (jours)	Hommes (jours)	16-19 (jours)	20-24 (jours)	25+ (jours)
Nombre médian de jours	10,0 [8,9-11,1]	7,0 [5,5-8,5]	15,0 [13,2-16,8]	8,0 [4,5-11,5]	12,0 [9,5-14,5]	10,0 [7,8-12,2]
Nombre moyen de jours	14,4 [13,8-14,9]	12,4 [11,6-13,2]	15,9 [15,1-16,6]	13,3 [11,7-14,9]	14,4 [13,5-15,4]	14,5↓ [13,8-15,2]

Tableau 35b. Nombre de fois où l'on a consommé du cannabis pendant une journée typique de consommation au cours des 30 derniers jours¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
1 fois par jour	55,1 [52,7-57,4]	60,4 [56,9-63,9]	51,0 [47,9-54,1]	55,1 [48,3-61,8]	53,0 [48,9-57,0]	55,5↓ [52,6-58,3]
2 fois par jour	19,4 [17,6-21,3]	17,5↓ [14,9-20,3]	20,8 [18,4-23,4]	17,1 [12,7-22,7]	20,9 [17,7-24,4]	19,3 [17,1-21,7]
3 fois par jour	11,1 [9,7-12,7]	11,0 [9,0-13,4]	11,2 [9,3-13,3]	#	10,6 [8,3-13,4]	11,3 [9,5-13,2]
4 fois par jour	4,1 [3,3-5,2]	2,8* [1,8-4,1]	5,2 [3,9-6,8]	#	#	4,0 [3,0-5,3]
5 fois ou plus par jour	10,3 [9,0-11,8]	8,4 [6,7-10,5]	11,8 [10,0-14,0]	#	12,2 [9,8-15,2]	10,0 [8,4-11,8]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Parmi les usagers ayant déclaré avoir consommé du cannabis au cours des 30 derniers jours.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 36. Nombre d'heures « gelé » pendant une journée typique¹ au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Moins de 1 heure	13,9 [12,3-15,7]	17,8 [15,1-20,9]	11,0 [9,1-13,3]	#	6,9 [5,1-9,3]	16,0 [14,0-18,3]
1 ou 2 heures	34,6 [32,3-36,9]	36,7 [33,2-40,3]	33,0 [30,1-36,0]	31,2 [25,2-37,8]	29,7 [26,2-33,6]	35,9 [33,2-38,8]
3 ou 4 heures	35,5↑ [33,3-37,8]	32,0 [28,8-35,4]	38,2 [35,2-41,3]	38,3 [31,9-45,0]	39,3 [35,4-43,3]	34,5↓ [31,8-37,3]
5 ou 6 heures	9,1 [7,9-10,5]	9,0 [7,3-11,1]	9,2 [7,6-11,2]	16,6 [12,1-22,4]	14,9 [12,2-18,1]	7,1 [5,8-8,8]
7 heures ou plus	6,8 [5,8-8,1]	4,5↑ [3,3-6,1]	8,6 [7,0-10,5]	#	9,1 [7,1-11,8]	6,4 [5,2-8,0]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Usagers au cours des 30 derniers jours.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 37. Méthodes de consommation du cannabis¹ au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Fumé (p. ex., un joint, une pipe à eau, une pipe ou un cigare)	79,2 [77,6-80,8]	75,8 [73,1-78,2]	82,0 [79,9-84,0]	89,6 [85,9-92,4]	88,4 [86,1-90,4]	76,2 [74,1-78,2]
Consommé dans un produit alimentaire (p. ex., brownies, gâteaux, biscuits ou bonbon)	51,6 [49,7-53,5]	52,0 [49,1-54,9]	51,3 [48,7-53,9]	57,0 [51,7-62,2]	59,9 [56,6-63,1]	49,3 [46,9-51,7]
Bu (p. ex., thé, boisson gazeuse, alcool, autres boissons)	7,4 [6,5-8,5]	6,7 [5,4-8,2]	8,0 [6,8-9,5]	8,3* [5,8-11,8]	10,1 [8,3-12,2]	6,8 [5,7-8,1]
Vaporisé avec un vaporisateur (non portable)	12,0 [10,8-13,4]	8,9 [7,4-10,6]	14,6 [12,8-16,5]	11,7 [8,7-15,5]	9,5↑ [7,8-11,6]	12,6 [11,1-14,2]
Vaporisé avec un vaporisateur stylo ou une cigarette électronique (portable)	23,5↑ [21,9-25,1]	21,2 [19,0-23,6]	25,4 [23,2-27,7]	32,1 [27,2-37,3]	31,2 [28,2-34,4]	20,9 [19,1-22,9]
Inhalé (p. ex., y compris couteau/clou chaud)	7,0 [6,2-7,9]	5,1 [4,1-6,4]	8,5↓ [7,3-9,9]	10,8 [8,0-14,5]	12,4 [10,4-14,7]	5,4 [4,5-6,5]
Appliqué sur la peau (p. ex., produit topique)	5,0 [4,2-5,9]	6,6 [5,3-8,2]	3,7 [2,9-4,9]	#	4,6 [3,3-6,2]	5,2 [4,3-6,4]
Par la bouche ou sous la langue	3,7 [3,0-4,5]	5,2 [4,0-6,7]	2,4 [1,8-3,3]	#	3,6* [2,6-5,1]	3,9 [3,1-4,9]
Autre méthode utilisée	0,9* [0,6-1,3]	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 38. Méthodes de consommation du cannabis¹ au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, selon la province/les territoires, Canada, 2020

	Fumé (p. ex., un joint, une pipe à eau, une pipe ou un cigare) (%)	Consommé dans un produit alimentaire (p. ex., brownies, gâteaux, biscuits ou bonbon)	Bu (p. ex., thé, boisson gazeuse, alcool, autres boissons) (%)	Vaporisé avec un vaporisateur (non portable) (%)	Vaporisé avec un vaporisateur stylo ou une cigarette électronique (portable) (%)	Inhalé (p. ex., y compris couteau/clou chaud) (%)	Appliqué sur la peau (p. ex., produit topique) (%)	Par la bouche ou sous la langue (%)	Autre méthode utilisée (%)
Canada	79,2 [77,6-80,8]	51,6 [49,7-53,5]	7,4 [6,5-8,5]	12,0 [10,8-13,4]	23,5↑ [21,9-25,1]	7,0 [6,2-7,9]	5,0 [4,2-5,9]	3,7 [3,0-4,5]	0,9* [0,6-1,3]
Terre-Neuve-et-Labrador	81,2 [73,1-87,2]	49,7 [40,7-58,7]	#	#	#	#	#	#	#
Île-du-Prince-Édouard	78,7 [69,8-85,5]	51,6 [42,4-60,7]	#	#	#	#	#	#	#
Nouvelle-Écosse	77,8 [69,9-84,0]	50,4 [42,1-58,7]	#	#	20,6 [14,7-28,1]	#	#	#	#
Nouveau-Brunswick	78,0 [69,7-84,5]	54,1 [45,2-62,8]	#	#	22,9 [16,5-30,9]	#	#	#	#
Québec	84,0 [79,9-87,4]	29,8 [25,7-34,1]	7,1 [5,1-9,7]	10,5↓ [7,9-13,8]	13,7 [10,8-17,3]	3,8* [2,6-5,4]	#	#	#
Ontario	78,4 [75,5-81,1]	58,5↑ [55,2-61,8]	7,2 [5,7-9,1]	12,1 [10,1-14,5]	25,7 [22,9-28,6]	5,8 [4,5-7,4]	5,2 [3,9-7,0]	3,3* [2,3-4,8]	#
Manitoba	77,6 [69,7-83,9]	54,5↓ [45,9-62,8]	#	#	24,7 [18,1-32,7]	#	#	#	#
Saskatchewan	81,7 [73,3-87,9]	69,8 [60,9-77,5]	#	#	25,5↓ [18,4-34,1]	#	#	#	#
Alberta	74,8 [70,1-79,0]	54,7 [49,6-59,8]	8,3* [5,9-11,4]	12,2 [9,2-15,9]	26,6 [22,4-31,2]	10,8 [8,2-14,3]	#	#	#
Colombie-Britannique	79,4 [75,2-83,0]	51,9 [47,2-56,6]	7,4* [5,3-10,2]	13,4 [10,5-16,9]	27,7 [23,7-32,0]	8,4 [6,3-11,2]	10,7 [8,1-14,0]	#	#
Territoires²	79,8 [65,8-89,0]	58,7 [45,3-70,8]	#	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 39a. Types de produits de cannabis consommés par vapotage¹, usagers ayant utilisé un vaporisateur et/ou un vaporisateur stylo au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Fleurs/feuilles séchées	65,1 [61,8-68,3]	61,6 [56,2-66,7]	67,4 [63,1-71,4]	51,7 [42,8-60,4]	65,4 [59,9-70,5]	67,1 [62,8-71,1]
Huile/extrait de cannabis liquide (p. ex., huile de cannabis au butane, liquide de vapotage avec THC/CBD, etc.)	59,5↑ [56,1-62,9]	60,7 [55,3-65,9]	58,8 [54,3-63,0]	79,2 [71,1-85,4]	65,3 [59,9-70,5]	55,1 [50,8-59,4]
Extrait de cannabis solide (p. ex., shatter, hachisch, etc.)	24,1 [21,4-27,1]	20,3 [16,5-24,7]	26,6 [23,0-30,5]	31,3 [23,9-39,9]	32,3 [27,4-37,7]	21,1 [17,8-24,7]
Autre produit à base de cannabis	#	#	#	#	#	#

Tableau 39b. Types de dispositifs de vapotage utilisés, usagers ayant utilisé un vaporisateur stylo ou une cigarette électronique au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Dispositif de vapotage jetable (p. ex., vaporisateur stylo à usage unique)	18,5↓ [15,7-21,7]	16,0 [12,0-21,1]	20,2 [16,5-24,4]	#	17,7 [13,5-22,8]	17,1 [13,6-21,4]
Dispositif de vapotage non jetable (p. ex., vaporisateur stylo avec des cartouches/capsules/ réservoirs rechargeables/ remplaçables)	71,8 [68,3-75,1]	75,4 [69,8-80,2]	69,4 [64,7-73,7]	62,6 [52,9-71,4]	68,4 [62,5-73,7]	74,5↑ [69,8-78,7]
Dispositifs jetables et non jetables	9,7 [7,8-12,1]	8,6* [5,9-12,3]	10,5↓ [7,9-13,7]	#	13,9 [10,2-18,6]	8,3 [6,0-11,5]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 40. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées lorsqu'il s'agit de choisir des produits¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Plus de THC, moins de CBD	29,1 [27,4-30,9]	20,4 [18,2-22,7]	36,0 [33,5-38,6]	35,5↑ [30,6-40,8]	32,9 [29,8-36,1]	27,5↑ [25,5-29,7]
Plus de CBD, moins de THC	10,9 [9,7-12,2]	14,5↓ [12,5-16,7]	8,0 [6,7-9,6]	#	8,1 [6,4-10,1]	12,2 [10,7-13,8]
Proportions égales en THC et en CBD	9,7 [8,6-10,9]	9,7 [8,1-11,6]	9,7 [8,3-11,4]	#	10,1 [8,2-12,3]	10,1 [8,7-11,6]
THC seulement	6,2 [5,3-7,1]	4,3 [3,3-5,5]	7,7 [6,4-9,2]	#	5,1 [3,8-6,8]	6,3 [5,3-7,5]
CBD seulement	1,9 [1,4-2,5]	2,4* 1,7-3,4]	#	#	#	2,2 [1,6-3,0]
J'utilise habituellement des produits contenant les différentes concentrations indiquées ci-dessus	16,3 [15,0-17,8]	17,6 [15,5-20,0]	15,3 [13,5-17,3]	14,0 [10,7-18,2]	19,1 [16,6-21,9]	16,1 [14,4-17,9]
Autre	1,3* [0,9-1,9]	#	1,5↓* [1,0-2,2]	#	#	1,4* [0,9-2,1]
Incertain/Je ne sais pas	24,6 [22,9-26,4]	30,0 [27,3-32,8]	20,3 [18,2-22,6]	30,8 [26,0-36,0]	22,8 [20,1-25,7]	24,2 [22,2-26,4]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Usagers au cours des 12 derniers mois.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 41. Produits de cannabis consommés¹ au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Fleurs/feuilles séchées	73,8 [72,0-75,5]	67,1 [64,2-69,8]	79,1 [76,9-81,2]	77,1 [72,2-81,3]	81,0 [78,2-83,5]	71,9 [69,7-74,0]
Hachisch/skuff	19,0 [17,6-20,5]	13,6 [11,9-15,6]	23,3 [21,2-25,5]	28,5↑ [24,0-33,5]	25,5↑ [22,8-28,6]	16,5↑ [14,9-18,4]
Huile de cannabis pour administration orale (p. ex., dans un compte-gouttes/une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules/capsules)	25,0 [23,3-26,6]	25,4 [23,0-27,9]	24,6 [22,5-26,9]	20,7 [16,8-25,2]	27,5↓ [24,6-30,5]	25,0 [23,0-27,1]
Vaporisateurs stylos/cartouches de cannabis	21,7 [20,2-23,3]	19,9 [17,7-22,3]	23,1 [21,0-25,3]	32,5↓ [27,6-37,7]	27,5↓ [24,6-30,6]	19,2 [17,4-21,2]
Concentrés/extraits de cannabis (p. ex., «shatter»/«budder», etc.)	13,4 [12,2-14,7]	8,8 [7,4-10,4]	17,1 [15,3-19,1]	18,7 [14,9-23,1]	16,4 [14,1-18,9]	12,2 [10,7-13,8]
Produits comestibles à base de cannabis (p. ex., biscuits, bonbons)	48,8 [46,8-50,7]	51,3 [48,4-54,2]	46,8 [44,2-49,4]	55,1 [49,8-60,4]	58,1 [54,8-61,3]	46,2 [43,8-48,5]
Boissons à base de cannabis (p. ex., cola, thé, café)	6,0 [5,2-7,0]	5,2 [4,1-6,6]	6,6 [5,5-8,0]	#	9,1 [7,4-11,2]	5,3 [4,4-6,5]
Agents topiques (p. ex., lotion, onguent, crèmes appliquées sur la peau)	6,9 [6,0-8,0]	9,3 [7,7-11,1]	5,0 [3,9-6,2]	#	6,6 [5,1-8,5]	7,3 [6,1-8,6]
Autre	2,2 [1,7-2,8]	2,6* [1,8-3,6]	1,9* [1,3-2,7]	#	#	2,3 [1,7-3,1]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 42. Produits de cannabis consommés¹ au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, selon la province/les territoires, Canada, 2020

	Fleurs/feuilles séchées (%)	Hachisch/skuff (%)	Huile de cannabis pour administration orale (p. ex., dans un compte-gouttes/une seringue, un flacon-	Vaporisateurs stylos/cartouches de cannabis (%)	Concentrés/extraits de cannabis (p. ex., «shatter»/«budde r», etc.) (%)	Produits comestibles à base de cannabis (p. ex., biscuits, bonbons) (%)	Boissons à base de cannabis (p. ex., cola, thé, café) (%)	Agents topiques (p. ex., lotion, onguent, crèmes appliquées sur la peau) (%)	Autre (%)
Canada	73,8 [72,0-75,5]	19,0 [17,6-20,5]	25,0 [23,3-26,6]	21,7 [20,2-23,3]	13,4 [12,2-14,7]	48,8 [46,8-50,7]	6,0 [5,2-7,0]	6,9 [6,0-8,0]	2,2 [1,7-2,8]
Terre-Neuve-et-Labrador	77,1 [68,5-83,8]	26,2 [18,9-35,1]	26,4 [19,3-35,1]	#	#	46,7 [37,8-55,8]	#	#	#
Île-du-Prince-Édouard	79,1 [70,1-85,9]	#	32,7 [24,5-42,0]	#	#	46,5↑ [37,5-55,7]	#	#	#
Nouvelle-Écosse	75,6 [67,5-82,1]	23,3 [16,9-31,1]	35,3 [27,8-43,7]	16,3* [11,2-23,2]	16,4* [11,2-23,2]	46,7 [38,6-55,1]	#	#	#
Nouveau-Brunswick	70,6 [62,0-77,9]	24,9 [17,9-33,5]	34,3 [26,3-43,3]	24,6 [17,9-32,8]	#	56,4 [47,5-64,9]	#	#	#
Québec	76,8 [72,4-80,7]	18,8 [15,5-22,7]	25,5↑ [21,7-29,8]	11,4 [8,7-14,7]	8,1 [6,0-10,8]	25,2 [21,4-29,4]	6,3* [4,5-8,7]	#	#
Ontario	72,9 [69,8-75,8]	20,0 [17,5-22,7]	20,6 [18,1-23,5]	25,0 [22,3-27,9]	12,7 [10,6-15,0]	55,6 [52,3-58,9]	5,9 [4,5-7,7]	7,4 [5,8-9,4]	#
Manitoba	73,4 [65,1-80,3]	#	27,3 [20,5-35,4]	23,3 [16,9-31,2]	#	47,7 [39,3-56,2]	#	#	#
Saskatchewan	73,5↓ [64,5-80,9]	#	26,5↓ [19,3-35,3]	25,3 [18,2-34,1]	#	66,9 [57,8-74,8]	#	#	#
Alberta	72,0 [67,2-76,4]	14,2 [11,2-18,0]	33,7 [29,1-38,7]	22,1 [18,3-26,4]	17,4 [13,9-21,5]	53,4 [48,3-58,4]	#	#	#
Colombie-Britannique	73,4 [69,0-77,4]	18,7 [15,4-22,5]	24,2 [20,4-28,4]	24,8 [21,1-29,0]	15,0 [12,0-18,6]	50,9 [46,1-55,6]	#	13,3 [10,3-16,9]	#
Territoires²	79,6 [68,5-87,5]	#	#	#	#	51,0 [37,9-63,9]	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 43. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les fleurs et les feuilles séchées¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
THC						
Forte (plus de 20 % de THC)	30,0 [28,0-32,1]	19,5↓ [17,0-22,2]	37,1 [34,4-40,0]	31,7 [26,3-37,6]	30,9 [27,6-34,4]	29,6 [27,1-32,2]
Modérée (de 10 % à 20 % de THC)	32,7 [30,7-34,8]	33,0 [29,9-36,3]	32,5↓ [29,8-35,3]	28,5↑ [23,4-34,2]	35,0 [31,5-38,6]	32,7 [30,2-35,4]
Faible (moins de 10 % de THC)	8,6 [7,5-9,9]	10,4 [8,5-12,7]	7,4 [6,0-9,1]	#	7,4 [5,8-9,5]	9,2 [7,7-10,8]
Aucune (0 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	28,4 [26,4-30,5]	36,7 [33,3-40,2]	22,8 [20,4-25,4]	33,0 [27,5-39,0]	26,5↓ [23,3-29,9]	28,3 [25,7-31,0]
CBD						
Forte (plus de 20 % de CBD)	10,2 [9,0-11,7]	10,1 [8,2-12,4]	10,3 [8,7-12,3]	#	8,9 [7,0-11,2]	10,7 [9,1-12,6]
Modérée (de 10 % à 20 % de CBD)	23,3 [21,5-25,2]	23,7 [20,8-26,7]	23,1 [20,7-25,6]	14,4 [10,6-19,3]	21,7 [18,8-24,9]	24,8 [22,5-27,3]
Faible (moins de 10 % de CBD)	24,5↓ [22,6-26,4]	20,2 [17,6-23,0]	27,4 [24,9-30,0]	27,1 [22,1-32,7]	30,7 [27,4-34,2]	22,7 [20,5-25,1]
Aucune (0 % de CBD)	5,8 [4,8-6,9]	3,6* [2,6-4,9]	7,3 [5,9-9,0]	#	5,7 [4,2-7,6]	5,8 [4,6-7,3]
Incertain/Je ne sais pas	36,2 [34,1-38,4]	42,5↓ [39,0-46,0]	32,0 [29,3-34,8]	44,1 [38,2-50,2]	33,0 [29,6-36,6]	35,9 [33,2-38,7]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Parmi les usagers ayant consommé des fleurs et des feuilles séchées au cours des 12 derniers mois.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 44. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans le haschisch et le skuff¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
THC						
Forte (plus de 20 % de THC)	47,8 [43,6-52,1]	31,2 [25,1-38,1]	55,6 [50,4-60,8]	50,8 [41,0-60,5]	49,2 [42,7-55,7]	46,8 [41,1-52,6]
Modérée (de 10 % à 20 % de THC)	16,8 [13,8-20,2]	20,9 [15,4-27,6]	14,9 [11,5-19,0]	#	16,5↓ [12,1-22,1]	17,7 [13,7-22,5]
Faible (moins de 10 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Aucune (0 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	31,6 [27,8-35,7]	46,3 [39,2-53,6]	24,7 [20,4-29,6]	34,1 [25,4-44,0]	32,7 [26,8-39,1]	30,8 [25,7-36,4]
CBD						
Forte (plus de 20 % de CBD)	13,0 [10,3-16,2]	#	16,1 [12,5-20,5]	#	#	13,4 [9,9-18,0]
Modérée (de 10 % à 20 % de CBD)	18,1 [15,0-21,7]	22,6 [16,9-29,5]	16,0 [12,5-20,3]	#	17,8 [13,3-23,4]	19,1 [14,9-24,1]
Faible (moins de 10 % de CBD)	16,5↓ [13,6-19,8]	#	19,5↓ [15,7-23,9]	#	15,4 [11,3-20,8]	16,3 [12,5-20,9]
Aucune (0 % de CBD)	12,3 [9,8-15,3]	#	13,7 [10,6-17,6]	#	12,7* [9,0-17,7]	12,0 [8,8-16,1]
Incertain/Je ne sais pas	40,2 [36,1-44,4]	51,8 [44,6-59,0]	34,7 [29,9-39,8]	40,7 [31,5-50,6]	42,8 [36,4-49,4]	39,3 [33,8-45,0]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Parmi les usagers ayant consommé de haschisch et de skuff au cours des 12 derniers mois.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 45. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans l'huile de cannabis pour administration orale¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
THC						
Forte (plus de 20 % de THC)	29,8 [26,5-33,3]	18,7 [14,8-23,2]	39,0 [34,1-44,0]	34,7 [25,0-45,9]	37,2 [31,4-43,3]	27,7 [23,7-32,0]
Modérée (de 10 % à 20 % de THC)	22,1 [19,1-25,4]	22,1 [17,8-27,2]	22,1 [18,1-26,6]	#	21,6 [16,8-27,2]	23,1 [19,4-27,3]
Faible (moins de 10 % de THC)	19,3 [16,5-22,4]	24,3 [19,9-29,4]	15,1 [11,7-19,2]	#	17,7 [13,4-22,9]	20,4 [16,9-24,3]
Aucune (0 % de THC)	8,5↓ [6,6-10,9]	10,4 [7,5-14,2]	6,9* [4,6-10,3]	#	#	8,9 [6,6-11,9]
Incertain/Je ne sais pas	20,3 [17,4-23,6]	24,5↓ [19,9-29,7]	16,9 [13,4-21,1]	#	16,4 [12,4-21,4]	19,9 [16,4-24,0]
CBD						
Forte (plus de 20 % de CBD)	24,5↓ [21,4-27,8]	25,3 [20,8-30,4]	23,8 [19,7-28,4]	#	25,2 [20,2-30,9]	24,3 [20,6-28,5]
Modérée (de 10 % à 20 % de CBD)	23,2 [20,1-26,5]	25,3 [20,7-30,5]	21,4 [17,5-25,9]	#	21,2 [16,5-26,8]	24,9 [21,1-29,1]
Faible (moins de 10 % de CBD)	19,0 [16,2-22,2]	15,6 [12,1-20,0]	21,8 [17,8-26,5]	#	24,0 [19,1-29,7]	18,2 [14,8-22,2]
Aucune (0 % de CBD)	7,9 [6,0-10,3]	#	10,1 [7,3-13,7]	#	#	7,4* [5,2-10,4]
Incertain/Je ne sais pas	25,4 [22,3-28,9]	28,5↑ [23,7-33,9]	22,9 [18,9-27,4]	36,9 [26,8-48,4]	21,2 [16,6-26,7]	25,2 [21,4-29,5]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Parmi les usagers ayant consommé de l'huile de cannabis pour administration orale au cours des 12 derniers mois.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 46. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les vaporisateurs stylos et les cartouches de cannabis¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
THC						
Forte (plus de 20 % de THC)	46,1 [42,1-50,1]	35,3 [29,7-41,4]	53,5↑ [48,2-58,7]	51,9 [42,4-61,3]	50,3 [43,8-56,7]	43,7 [38,5-49,1]
Modérée (de 10 % à 20 % de THC)	23,6 [20,2-27,3]	26,0 [20,8-32,0]	21,9 [17,7-26,8]	#	18,4 [13,9-24,0]	26,8 [22,3-32,0]
Faible (moins de 10 % de THC)	4,7* [3,2-6,8]	#	#	#	#	#
Aucune (0 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	25,0 [21,6-28,7]	30,8 [25,3-37,1]	20,9 [17,0-25,6]	32,1 [23,7-41,9]	25,2 [19,9-31,3]	23,5↓ [19,2-28,5]
CBD						
Forte (plus de 20 % de CBD)	13,0 [10,5-16,1]	9,7* [6,7-13,7]	15,4 [11,8-19,8]	#	13,0* [9,3-17,9]	13,7 [10,3-17,9]
Modérée (de 10 % à 20 % de CBD)	20,8 [17,7-24,3]	26,6 [21,3-32,7]	16,8 [13,3-21,1]	#	19,7 [15,0-25,5]	22,0 [17,9-26,8]
Faible (moins de 10 % de CBD)	21,2 [18,2-24,6]	19,6 [15,1-25,0]	22,3 [18,4-26,9]	#	22,7 [17,8-28,5]	21,4 [17,4-26,0]
Aucune (0 % de CBD)	11,5↑ [9,2-14,3]	#	13,9 [10,7-17,9]	#	#	11,3 [8,4-15,2]
Incertain/Je ne sais pas	33,4 [29,7-37,3]	36,1 [30,3-42,4]	31,5↑ [26,9-36,5]	41,0 [32,0-50,8]	34,3 [28,5-40,7]	31,6 [26,8-36,8]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Parmi les usagers ayant utilisé des vaporisateurs stylos ou des cartouches de cannabis au cours des 12 derniers mois.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 47. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les concentrés et les extraits de cannabis¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
THC						
Forte (plus de 20 % de THC)	64,4 [59,3-69,1]	51,7 [42,7-60,7]	69,6 [63,6-75,0]	62,5↓ [50,3-73,3]	68,0 [60,1-75,1]	63,7 [57,0-69,9]
Modérée (de 10 % à 20 % de THC)	14,1 [10,8-18,2]	#	11,1* [7,7-15,8]	#	#	15,9 [11,5-21,6]
Faible (moins de 10 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Aucune (0 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	19,4 [15,7-23,7]	24,5↓ [17,6-33,0]	17,3 [13,1-22,5]	#	19,2* [13,6-26,4]	18,1 [13,5-23,8]
CBD						
Forte (plus de 20 % de CBD)	18,5↑ [15,0-22,7]	#	21,8 [17,3-27,2]	#	19,6 [14,0-26,6]	18,8 [14,2-24,5]
Modérée (de 10 % à 20 % de CBD)	17,6 [14,0-22,0]	24,8* [17,6-33,7]	14,7 [10,8-19,7]	#	#	19,5↓ [14,7-25,4]
Faible (moins de 10 % de CBD)	20,6 [16,8-25,0]	21,1* [14,6-29,6]	20,4 [15,9-25,7]	#	22,9 [16,8-30,4]	21,7 [16,7-27,7]
Aucune (0 % de CBD)	11,6 [8,8-15,3]	#	13,3 [9,7-17,9]	#	#	11,6* [7,9-16,6]
Incertain/Je ne sais pas	31,6 [27,1-36,4]	35,9 [27,8-44,9]	29,8 [24,6-35,6]	#	36,7 [29,3-44,7]	28,4 [22,8-34,8]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Parmi les usagers ayant consommé des concentrés ou des extraits de cannabis au cours des 12 derniers mois.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 48. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les produits comestibles à base de cannabis¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
THC						
Forte (plus de 10 mg de THC)	36,5↑ [34,0-39,1]	25,8 [22,6-29,3]	45,9 [42,2-49,6]	49,2 [42,0-56,5]	44,5↑ [40,2-49,0]	32,7 [29,5-36,0]
Modérée (de 2,5 mg à 10 mg de THC)	26,7 [24,4-29,2]	27,9 [24,5-31,6]	25,7 [22,6-29,1]	16,3* [11,6-22,3]	25,2 [21,5-29,3]	28,6 [25,6-31,8]
Faible (moins de 2,5 mg de THC)	8,5↓ [7,0-10,2]	11,1 [8,7-13,9]	6,2 [4,5-8,3]	#	6,2* [4,3-8,7]	9,6 [7,7-11,9]
Aucune (0 mg de THC)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	27,4 [25,0-29,9]	34,3 [30,5-38,3]	21,3 [18,4-24,6]	29,2 [22,9-36,4]	23,4 [19,9-27,4]	28,1 [25,0-31,4]
CBD						
Forte (plus de 10 mg de CBD)	14,3 [12,5-16,3]	10,3 [8,2-12,9]	17,8 [15,1-20,9]	#	14,2 [11,4-17,6]	14,7 [12,4-17,3]
Modérée (de 2,5 mg à 10 mg de CBD)	23,5↑ [21,3-25,9]	26,7 [23,3-30,5]	20,7 [17,9-23,8]	15,8* [11,1-22,0]	23,0 [19,5-27,1]	24,7 [21,9-27,8]
Faible (moins de 2,5mg de CBD)	14,7 [12,9-16,7]	12,1 [9,8-14,9]	17,0 [14,4-20,0]	16,1 [11,5-21,9]	16,7 [13,7-20,3]	14,0 [11,8-16,6]
Aucune (0 mg de CBD)	9,0 [7,6-10,6]	6,6 [5,0-8,6]	11,1 [8,9-13,6]	#	10,3 [8,0-13,2]	8,2 [6,5-10,3]
Incertain/Je ne sais pas	38,5↑ [35,9-41,2]	44,3 [40,3-48,3]	33,5↓ [30,1-37,1]	44,8 [37,7-52,2]	35,7 [31,6-40,1]	38,3 [35,0-41,8]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Parmi les usagers ayant consommé des produits comestibles à base de cannabis au cours des 12 derniers mois.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 49. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les boissons à base de cannabis¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
THC						
Forte (plus de 20 % de THC)	30,1 [23,4-37,3]	#	38,3 [29,3-48,1]	#	36,4 [26,8-47,3]	27,4* [19,4-37,3]
Modérée (de 10 % à 20 % de THC)	21,6 [16,0-28,4]	#	#	#	#	#
Faible (moins de 10 % de THC)	19,2 [13,9-26,0]	#	#	#	#	#
Aucune (0 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	23,4 [17,3-30,9]	#	#	#	#	#
CBD						
Forte (plus de 20 % de CBD)	19,5↓ [14,4-25,9]	#	22,7* [15,8-31,6]	#	#	#
Modérée (de 10 % à 20 % de CBD)	25,0 [19,1-32,0]	#	#	#	#	#
Faible (moins de 10 % de CBD)	18,0* [12,7-24,8]	#	#	#	#	#
Aucune (0 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	28,8 [22,2-36,5]	37,1 [26,3-49,5]	#	#	#	31,6 [22,7-42,1]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Parmi les usagers ayant consommé des boissons à base de cannabis au cours des 12 derniers mois.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 50. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les produits topiques à base de cannabis¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
THC						
Forte (plus de 20 % de THC)	22,3 [16,6-29,3]	#	#	#	#	21,1* [14,7-29,5]
Modérée (de 10 % à 20 % de THC)	15,8* [10,8-22,4]	#	#	#	#	#
Faible (moins de 10 % de THC)	17,3 [12,6-23,3]	#	#	#	#	#
Aucune (0 % de THC)	14,9* [10,4-21,0]	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	29,7 [23,2-37,0]	31,6 [23,4-41,2]	#	#	#	31,1 [23,6-39,9]
CBD						
Forte (plus de 20 % de CBD)	42,4 [35,1-49,9]	37,3 [28,6-46,9]	50,0 [38,2-61,8]	#	#	39,8 [31,5-48,8]
Modérée (de 10 % à 20 % de CBD)	17,8 [12,7-24,2]	#	#	#	#	#
Faible (moins de 10 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Aucune (0 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	28,0 [21,8-35,2]	32,1 [23,8-41,7]	#	#	#	29,6 [22,3-38,2]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Parmi les usagers ayant utilisé des produits topiques à base de cannabis au cours des 12 derniers mois.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 51. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les autres produits de cannabis¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
THC						
Forte (plus de 20 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Modérée (de 10 % à 20 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Faible (moins de 10 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Aucune (0 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	49,0 [35,9-62,2]	#	#	#	#	#
CBD						
Forte (plus de 20 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Modérée (de 10 % à 20 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Faible (moins de 10 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Aucune (0 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	53,1 [39,7-66,1]	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Parmi les usagers ayant consommé d'autres produits de cannabis au cours des 12 derniers mois.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 52. Fréquence de la consommation des produits de cannabis¹ au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2020

	Moins de 1 jour par mois (%)	Chaque mois (%)	Chaque semaine (%)	Tous les jours ou presque (%)
Fleurs/feuilles séchées	30,6 [28,5-32,7]	18,1 [16,5-19,9]	21,5↓ [19,7-23,4]	29,8 [27,8-31,9]
Hachisch/skuff	41,1 [36,9-45,4]	34,7 [30,7-38,9]	15,2 [12,5-18,4]	9,0 [6,7-11,9]
Huile de cannabis pour administration orale (p. ex., dans un compte-gouttes/une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules/capsules)	43,9 [40,2-47,7]	36,5↑ [32,9-40,3]	12,9 [10,6-15,6]	6,7 [5,0-8,9]
Vaporisateurs stylos/cartouches de cannabis	40,1 [36,1-44,2]	31,9 [28,3-35,7]	20,1 [17,1-23,5]	8,0 [6,0-10,4]
Concentrés/extraits de cannabis (p. ex., «shatter»/«budder», etc.)	36,1 [31,5-41,1]	35,7 [30,9-40,8]	14,3 [11,2-18,0]	13,9 [10,7-17,8]
Produits alimentaires comestibles à base de cannabis (p. ex., biscuits, bonbons)	54,1 [51,4-56,8]	32,4 [29,9-35,0]	11,1 [9,5-13,0]	2,4* [1,6-3,4]
Boissons à base de cannabis (p. ex., cola, thé, café)	56,8 [49,1-64,2]	30,9 [24,3-38,3]	#	#
Agents topiques (p. ex., lotion, onguent, crèmes appliquées sur la peau)	31,3 [24,7-38,6]	31,3 [24,9-38,6]	24,0 [18,0-31,2]	#
Autres (p. ex., graines, teinture de cannabis, suppositoire, etc.)	76,2 [63,1-85,6]	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 53. Quantité moyenne consommée lors d'une journée habituelle par type de produit¹ au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total	Femmes	Hommes	16-19	20-24	25+
Fleurs/feuilles séchées – (grammes)	1,1 [1,0-1,3]	1,0 [0,8-1,2]	1,2 [1,1-1,4]	1,2 [1,0-1,5]	1,1 [0,9-1,2]	1,1 [1,0-1,3]
Hachisch/skuff – (grammes)	0,4 [0,4-0,5]	0,4 [0,3-0,5]	0,4 [0,3-0,5]	0,5* [0,3-0,6]	0,3 [0,3-0,4]	0,4 [0,3-0,5]
Huile de cannabis pour administration orale² (p. ex., dans un compte-gouttes/une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules/capsules) – (millilitres)	1,0 [0,9-1,1]	1,0 [0,9-1,2]	1,0 [0,9-1,2]	1,4 [1,0-1,8]	1,1 [0,9-1,3]	1,0 [0,9-1,1]
Vaporisateurs stylos/cartouches de cannabis – (cartouches)	0,1 [0,1-0,1]	0,1 [0,1-0,1]	0,1 [0,1-0,2]	0,1 [0,1-0,2]	0,1 [0,1-0,2]	0,1 [0,1-0,1]
Concentrés/extraits de cannabis (p. ex., «shatter»/«budder», etc.) – (grammes)	0,3 [0,2-0,4]	0,3* [0,1-0,4]	0,3 [0,2-0,4]	0,3* [0,1-0,4]	0,2* [0,2-0,3]	0,3 [0,2-0,4]
Produits comestibles à base de cannabis (p. ex., biscuits, bonbons) – (portions)	1,2 [1,2-1,3]	1,0 [1,0-1,1]	1,4 [1,3-1,5]	1,5↑ [1,3-1,7]	1,4 [1,3-1,5]	1,1 [1,0-1,2]
Boissons à base de cannabis (p. ex., cola, thé, café) – (millilitres)	318,5↓ [275,5-361,4]	244,1 [205,3-283,0]	362,0 [299,7-424,3]	#	404,8 [333,2-476,3]	284,2 [235,7-332,7]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Une vaporisation d'huile de cannabis pour administration orale a été convertie en 0,1 millilitre et une capsule/gélule molle a été convertie en 0,16 millilitre.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 54. Fournisseur habituel de cannabis au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Cultivé par moi/pour moi	6,8 [5,8-8,0]	5,6 [4,2-7,4]	7,7 [6,3-9,4]	#	#	8,3 [7,0-9,8]
Point de vente autorisé	40,6 [38,7-42,6]	41,8 [38,9-44,7]	39,7 [37,1-42,3]	26,4 [22,0-31,4]	45,5↑ [42,2-48,9]	41,3 [38,9-43,7]
Source en ligne autorisée (producteur détenant une licence de Santé Canada, détaillant sous réglementation provinciale)	13,3 [12,0-14,7]	13,8 [11,8-16,0]	12,9 [11,2-14,8]	13,0 [9,5-17,4]	13,6 [11,4-16,2]	13,3 [11,7-15,0]
Point de vente illégal	2,9 [2,2-3,6]	#	3,4 [2,5-4,5]	#	#	2,9 [2,2-3,9]
Source en ligne illégale	3,5↓ [2,8-4,3]	2,5↑* [1,8-3,6]	4,2 [3,3-5,4]	#	5,7 [4,3-7,6]	3,3 [2,5-4,3]
Partage dans un groupe d'amis	6,5↑ [5,6-7,6]	6,2 [4,9-7,8]	6,8 [5,6-8,3]	13,3 [10,1-17,4]	6,3 [4,8-8,2]	5,8 [4,7-7,1]
Membre de la famille	4,4 [3,6-5,4]	6,3 [5,0-8,0]	2,9* [2,1-4,1]	#	#	4,9 [3,9-6,1]
Ami	16,4 [15,0-17,9]	16,8 [14,7-19,2]	16,0 [14,1-18,1]	27,9 [23,0-33,3]	17,4 [14,9-20,2]	14,8 [13,2-16,7]
Connaissance	1,4* [1,0-2,0]	#	#	#	#	1,6* [1,1-2,3]
Vendeur	3,0 [2,4-3,7]	2,6* [1,8-3,7]	3,3 [2,5-4,4]	#	#	2,4 [1,7-3,2]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 55a. Fréquence d'obtention auprès d'une source légale ou autorisée au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Toujours	36,9 [35,0-38,8]	37,2 [34,5-40,1]	36,6 [34,1-39,1]	24,7 [20,4-29,5]	37,5↑ [34,4-40,8]	38,2 [35,9-40,6]
Presque toujours	16,1 [14,7-17,5]	15,8 [13,9-18,0]	16,2 [14,5-18,2]	19,4 [15,6-24,0]	19,4 [16,9-22,2]	15,0 [13,4-16,7]
Parfois	12,1 [10,9-13,4]	12,5↓ [10,7-14,4]	11,9 [10,3-13,6]	13,9 [10,6-18,0]	15,4 [13,1-17,9]	11,3 [9,9-12,8]
Rarement	14,5↓ [13,1-15,9]	14,1 [12,1-16,3]	14,8 [13,0-16,7]	15,8 [12,2-20,3]	13,1 [11,0-15,6]	14,6 [12,9-16,4]
Jamais	20,5↓ [18,9-22,2]	20,4 [18,0-23,0]	20,5↑ [18,4-22,8]	26,2 [21,7-31,3]	14,5↑ [12,3-17,1]	21,0 [19,0-23,1]

Tableau 55b. Sources légales ou autorisées¹ au cours des 12 derniers mois, usagers ayant obtenu du cannabis d'une source légale au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Détaillant autorisé/réglementé par la province (p. ex., point de vente)	70,6 [68,6-72,6]	68,8 [65,6-71,7]	72,2 [69,4-74,8]	61,4 [55,1-67,3]	73,4 [70,1-76,6]	71,1 [68,5-73,5]
Détaillant en ligne autorisé/réglementé par la province (p. ex., site Web provincial)	29,3 [27,3-31,3]	30,6 [27,7-33,7]	28,2 [25,6-30,9]	27,3 [22,0-33,3]	29,8 [26,6-33,2]	29,4 [27,0-31,9]
Autre personne partageant le cannabis avec moi	35,3 [33,2-37,3]	39,3 [36,2-42,5]	32,0 [29,4-34,7]	52,3 [46,1-58,5]	44,6 [41,1-48,3]	31,3 [28,8-33,8]
J'ai cultivé mon propre cannabis	5,5↑ [4,6-6,6]	4,5↑ [3,3-6,1]	6,3 [5,0-7,9]	#	3,6* [2,5-5,2]	6,2 [5,1-7,7]
Autre	4,0 [3,2-5,0]	3,3* [2,3-4,6]	4,6 [3,5-6,1]	#	#	4,3 [3,3-5,5]

Tableau 55c. Paiement à la personne ayant partagé du cannabis, usagers ayant reçu du cannabis d'une personne au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Paiement à la personne ayant partagé du cannabis	22,6 [19,7-25,8]	20,3 [16,5-24,6]	24,9 [20,8-29,6]	35,9 [28,0-44,6]	23,6 [19,2-28,6]	19,8 [16,2-24,0]

Tableau 55d. Changement concernant l'accès à une source légale ou autorisée en raison de la pandémie de COVID-19², usagers ayant obtenu du cannabis d'une source légale au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Les produits que je voulais n'étaient pas disponibles	15,9 [14,4-17,5]	16,1 [13,9-18,5]	15,7 [13,8-17,9]	22,3 [17,5-28,0]	18,1 [15,5-21,1]	14,7 [12,9-16,7]
Les produits que je voulais ont augmenté de prix	10,6 [9,4-11,9]	9,9 [8,2-11,9]	11,1 [9,5-13,0]	18,4 [14,0-23,8]	11,9 [9,7-14,5]	9,4 [8,0-11,0]
Autre	6,9 [5,9-8,1]	7,9 [6,3-10,0]	6,0 [4,8-7,6]	#	8,5↓ [6,7-10,7]	6,5↑ [5,3-8,1]
Aucun changement concernant l'accès (exclusif)	71,9 [69,9-73,8]	71,5↑ [68,5-74,3]	72,2 [69,6-74,7]	62,7 [56,5-68,6]	68,2 [64,7-71,5]	73,8 [71,3-76,0]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse, sauf s'ils avaient sélectionné « aucun changement concernant l'accès ».

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 56a. Fréquence d'obtention auprès d'une source illégale ou non autorisée au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Toujours	9,5↓ [8,3-10,7]	6.7 [5,3-8,4]	11.7 [10,0-13,6]	13.3 [10,0-17,5]	8,0 [6,4-10,1]	9.3 [7,9-10,9]
Presque toujours	10,0 [8,9-11,2]	9,5↑ [8,0-11,3]	10.4 [8,9-12,1]	13.2 [9,9-17,4]	13.6 [11,5-16,1]	8.9 [7,6-10,3]
Parfois	11.1 [9,9-12,3]	9.8 [8,2-11,6]	12.1 [10,5-13,9]	14.6 [11,2-18,7]	12,5↑ [10,4-14,9]	10.3 [9,0-11,9]
Rarement	14.7 [13,4-16,2]	15.4 [13,4-17,7]	14.2 [12,5-16,1]	18.4 [14,6-23,0]	16.3 [14,0-18,9]	14,0 [12,4-15,7]
Jamais	54.7 [52,7-56,7]	58.6 [55,7-61,4]	51.6 [49,0-54,3]	40,5↑ [35,4-45,8]	49,5↑ [46,2-52,9]	57,5↑ [55,1-59,9]

Tableau 56b. Sources illégales ou non autorisées¹ au cours des 12 derniers mois, usagers ayant obtenu du cannabis d'une source illégale au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Détaillant non autorisé/non réglementé (p. ex., point de vente)	18,6 [16,5-21,0]	16,8 [13,7-20,5]	19,8 [17,0-23,0]	#	22,0 [18,3-26,3]	19,3 [16,5-22,4]
Détaillant en ligne non autorisé/non réglementé	22,1 [19,8-24,6]	19,0 [15,7-22,8]	24,2 [21,2-27,5]	#	25,1 [21,2-29,5]	23,0 [20,1-26,2]
Auprès d'une personne que je connais (p. ex., un ami, un membre de la famille, une connaissance)	58,0 [55,2-60,9]	61,7 [57,2-66,0]	55,6 [51,8-59,3]	65,8 [58,7-72,2]	59,8 [55,0-64,3]	56,3 [52,6-60,0]
Auprès d'un vendeur	19,9 [17,8-22,2]	18,0 [15,0-21,5]	21,2 [18,4-24,3]	40,9 [34,2-48,0]	26,9 [23,0-31,3]	14,6 [12,2-17,4]
Autre	8,0 [6,5-9,8]	9,3 [6,8-12,5]	7,1 [5,3-9,5]	#	#	8,5↑ [6,6-10,9]

Tableau 56c. Changement concernant l'accès à une source illégale ou non autorisée en raison de la pandémie de COVID-19², usagers ayant obtenu du cannabis d'une source illégale au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Les produits que je voulais n'étaient pas disponibles	12,3 [10,5-14,3]	12,4 [9,6-15,9]	12,2 [10,0-14,8]	15,1* [10,6-21,0]	12,3 [9,5-15,8]	11,8 [9,6-14,5]
Les produits que je voulais ont augmenté de prix	5,9 [4,7-7,3]	5,2* [3,6-7,3]	6,4 [4,8-8,4]	#	7,4* [5,2-10,3]	5,0 [3,7-6,8]
Autre	6,4 [5,2-7,9]	8,2 [6,2-10,8]	5,2 [3,8-7,0]	#	8,3 [6,1-11,3]	5,6 [4,2-7,5]
Aucun changement concernant l'accès (exclusif)	77,8 [75,4-80,1]	76,7 [72,7-80,3]	78,5↑ [75,4-81,4]	71,4 [64,6-77,4]	73,9 [69,5-77,9]	79,9 [76,7-82,7]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse, sauf s'ils avaient sélectionné « aucun changement concernant l'accès ».

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 57. Facteurs qui influent le plus¹ sur le choix du fournisseur de cannabis, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

		Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Prix	Premier rang	28,7 [27,0-30,5]	24,5↓ [22,1-27,0]	32,0 [29,6-34,5]	38,7 [33,6-44,1]	35,3 [32,1-38,6]	26,1 [24,1-28,3]
	Deuxième rang	15,8 [14,4-17,3]	14,4 [12,5-16,5]	16,9 [15,0-19,0]	19,7 [15,7-24,4]	17,1 [14,8-19,8]	15,0 [13,4-16,8]
	Troisième rang	11,6 [10,4-12,9]	11,1 [9,5-13,1]	12,0 [10,4-13,8]	13,4 [10,1-17,6]	13,0 [10,9-15,4]	11,1 [9,7-12,7]
Approvisionnement sécuritaire	Premier rang	25,8 [24,0-27,5]	32,6 [29,9-35,5]	20,3 [18,2-22,5]	28,5↑ [23,8-33,7]	22,1 [19,4-25,1]	26,2 [24,1-28,4]
	Deuxième rang	16,7 [15,3-18,3]	18,6 [16,3-21,1]	15,3 [13,5-17,3]	16,5↓ [12,8-20,9]	17,0 [14,6-19,6]	16,7 [15,0-18,7]
	Troisième rang	9,3 [8,2-10,4]	9,4 [7,9-11,3]	9,1 [7,7-10,7]	9,8* [7,0-13,5]	9,8 [8,0-11,9]	9,1 [7,8-10,6]
Qualité	Premier rang	14,8 [13,5-16,3]	11,1 [9,3-13,1]	17,8 [15,9-20,0]	12,6 [9,4-16,6]	12,9 [10,8-15,2]	15,5↑ [13,8-17,4]
	Deuxième rang	26,6 [24,9-28,4]	24,1 [21,7-26,7]	28,6 [26,2-31,1]	26,1 [21,6-31,1]	24,7 [21,9-27,7]	27,1 [24,9-29,3]
	Troisième rang	19,3 [17,8-20,9]	18,8 [16,6-21,3]	19,6 [17,6-21,8]	19,4 [15,5-24,0]	20,3 [17,7-23,1]	19,1 [17,2-21,1]
Commodité (p. ex., heures d'activités, livraison)	Premier rang	8,3 [7,3-9,5]	9,3 [7,7-11,2]	7,5↑ [6,3-9,0]	#	7,9 [6,3-10,0]	8,6 [7,4-10,0]
	Deuxième rang	10,7 [9,6-12,0]	11,1 [9,4-13,1]	10,4 [8,9-12,1]	10,8 [7,9-14,8]	13,0 [10,9-15,5]	10,2 [8,8-11,8]
	Troisième rang	15,1 [13,8-16,6]	14,8 [12,8-16,9]	15,5↓ [13,6-17,5]	11,4 [8,3-15,5]	16,3 [13,9-18,9]	15,4 [13,7-17,2]
Capacité à acheter auprès d'une source légale	Premier rang	6,2 [5,3-7,2]	5,7 [4,5-7,2]	6,5↑ [5,3-8,0]	#	5,8 [4,4-7,5]	6,6 [5,5-7,9]
	Deuxième rang	6,2 [5,3-7,2]	7,9 [6,4-9,7]	4,8 [3,8-6,1]	#	5,2 [4,0-6,9]	6,4 [5,3-7,7]
	Troisième rang	8,4 [7,4-9,6]	9,2 [7,7-11,0]	7,8 [6,5-9,4]	#	7,7 [6,1-9,6]	8,9 [7,6-10,3]

Proximité du détaillant	Premier rang	3,6 [2,9-4,4]	3,9 [2,9-5,2]	3,4 [2,5-4,4]	#	3,3* [2,3-4,7]	3,9 [3,0-4,9]
	Deuxième rang	5,7 [4,9-6,7]	5,8 [4,6-7,4]	5,6 [4,5-7,0]	#	5,8 [4,4-7,6]	5,8 [4,8-7,0]
	Troisième rang	7,2 [6,2-8,2]	7,7 [6,3-9,4]	6,7 [5,5-8,1]	10,4 [7,5-14,1]	8,4 [6,7-10,4]	6,5↑ [5,4-7,8]
Disponibilité de types de produits particuliers (p. ex., produits comestibles)	Premier rang	2,5↓ [2,0-3,1]	2,5↑ [1,9-3,5]	2,4* [1,7-3,4]	#	#	2,6 [1,9-3,4]
	Deuxième rang	4,5↑ [3,8-5,4]	5,5↑ [4,4-7,0]	3,7 [2,8-4,8]	#	4,1* [3,0-5,7]	4,8 [3,9-5,9]
	Troisième rang	7,8 [6,8-9,0]	10,0 [8,3-12,0]	6,1 [5,0-7,6]	#	7,6 [6,0-9,6]	8,1 [6,8-9,5]
Concentration	Premier rang	2,4 [1,9-3,1]	1,8* [1,2-2,6]	3,0 [2,2-4,0]	#	#	2,4 [1,8-3,2]
	Deuxième rang	7,7 [6,8-8,8]	5,8 [4,6-7,3]	9,3 [7,9-10,9]	9,8 [7,1-13,5]	6,9 [5,4-8,8]	7,6 [6,5-9,0]
	Troisième rang	10,4 [9,2-11,6]	6,8 [5,5-8,3]	13,2 [11,5-15,2]	11,5↓ [8,5-15,4]	9,7 [7,9-12,0]	10,4 [9,0-11,9]
Anonymat/confidentialité	Premier rang	2,2 [1,7-2,9]	#	2,2* [1,5-3,1]	#	#	2,3* [1,7-3,2]
	Deuxième rang	2,9 [2,3-3,7]	3,4* [2,4-4,7]	2,6* [1,9-3,6]	#	#	3,0 [2,3-4,0]
	Troisième rang	5,3 [4,4-6,2]	6,3 [5,0-8,0]	4,4 [3,4-5,6]	#	#	5,7 [4,7-7,0]
Accès à une souche ou variété spécifique	Premier rang	1,1* [0,8-1,6]	#	#	#	#	#
	Deuxième rang	2,5↓ [1,9-3,2]	2,5↓* [1,7-3,6]	2,5↓ [1,8-3,4]	#	#	2,7 [2,0-3,5]
	Troisième rang	4,3 [3,6-5,1]	4,0 [3,0-5,3]	4,5↑ [3,6-5,7]	#	3,7* [2,6-5,1]	4,3 [3,5-5,4]
Autre	Premier rang	4,4 [3,6-5,3]	5,3 [4,0-6,9]	3,7 [2,7-4,8]	#	4,0 [2,9-5,5]	4,7 [3,7-5,9]
	Deuxième rang	#	#	#	#	#	#
	Troisième rang	1,3* [0,9-1,9]	#	#	#	#	1,5↓* [1,0-2,2]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants devaient classer les trois principaux facteurs qui influencent leur choix d'une source d'approvisionnement en cannabis.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 58. Fréquence de non-disponibilité d'un produit du cannabis chez un détaillant sous réglementation provinciale depuis la légalisation du cannabis, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Toujours	5,4 [4,6-6,4]	3,8 [2,9-5,1]	6,7 [5,5-8,2]	#	4,9 [3,6-6,5]	5,6 [4,6-6,8]
Souvent	11,9 [10,7-13,1]	11,2 [9,5-13,1]	12,4 [10,8-14,2]	8,5↓*	13,8 [11,6-16,2]	11,9 [10,5-13,5]
Parfois	20,5↑ [19,0-22,1]	20,1 [17,9-22,5]	20,8 [18,8-23,0]	18,5↑ [14,7-23,0]	25,8 [23,0-28,8]	19,7 [17,9-21,6]
Rarement	17,8 [16,4-19,3]	16,5↓ [14,5-18,7]	18,8 [16,9-20,9]	20,1 [16,1-24,7]	21,8 [19,2-24,7]	16,7 [15,0-18,6]
Jamais	32,8 [30,9-34,7]	35,8 [33,0-38,7]	30,3 [27,9-32,9]	24,5↑ [20,2-29,3]	24,4 [21,6-27,4]	35,4 [33,1-37,8]
Je n'ai jamais eu l'intention d'acheter de cannabis auprès d'un détaillant sous réglementation provinciale	11,6 [10,4-13,0]	12,6 [10,7-14,7]	10,9 [9,4-12,7]	23,7 [19,4-28,7]	9,4 [7,6-11,6]	10,7 [9,2-12,3]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 59a. Somme dépensée pour acheter du cannabis à des fins non médicales au cours d'un mois typique, usagers de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (\$)	Femmes (\$)	Hommes (\$)	16-19 (\$)	20-24 (\$)	25+ (\$)
Somme médiane généralement dépensée par mois (dollars)	25,00 [23,43-26,57]	20,00 [16,39-23,61]	30,00 [24,82-35,18]	20,00 [11,62-28,38]	30,00 [26,18-33,82]	25,00 [20,88-29,12]
Somme moyenne généralement dépensée par mois (dollars)	66,75 [61,96-71,54]	53,26 [47,37-59,15]	76,69 [69,66-83,71]	56,93 [45,96-67,91]	65,08 [57,80-72,35]	68,25 [62,21-74,28]

Remarque : Les répondant ayant déclaré avoir dépensé plus de 1 000 dollars n'ont pas pu être inclus dans le calcul de la moyenne, car il a été impossible de déterminer le montant précis en dollars.

Tableau 59b. Somme dépensée pour acheter du cannabis à des fins non médicales auprès d'une source légale au cours des 30 derniers jours, usagers de cannabis au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (\$)	Femmes (\$)	Hommes (\$)	16-19 (\$)	20-24 (\$)	25+ (\$)
Somme moyenne dépensée au cours des 30 derniers jours (dollars)	48,89 [44,61-53,16]	41,68 [35,53-47,82]	53,79 [47,98-59,60]	46,50* [28,40-64,60]	47,13 [40,31-53,95]	49,52 [44,43-54,61]

Remarque : Les répondant ayant déclaré avoir dépensé plus de 1 000 dollars n'ont pas pu être inclus dans le calcul de la moyenne, car il a été impossible de déterminer le montant précis en dollars.

Tableau 59c. Somme dépensée pour acheter du cannabis à des fins non médicales auprès d'une source illégale au cours des 30 derniers jours, usagers de cannabis au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (\$)	Femmes (\$)	Hommes (\$)	16-19 (\$)	20-24 (\$)	25+ (\$)

Somme moyenne dépensée au cours des 30 derniers jours (dollars)	46,55 [40,35-52,75]	37,52 [29,71-45,32]	52,91 [43,92-61,91]	51,91 [35,95-67,87]	39,60 [31,55-47,64]	47,37 [39,58-55,16]
--	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Remarque : Les répondant ayant déclaré avoir dépensé plus de 1 000 dollars n'ont pas pu être inclus dans le calcul de la moyenne, car il a été impossible de déterminer le montant précis en dollars.

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Remarque : Les personnes qui ont déclaré dépenser plus de 1 000 dollars ont été éliminées de l'analyse, car il n'était pas possible de déterminer une valeur précise en dollars.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 60a. Somme dépensée pour acheter du cannabis à des fins non médicales au cours d'un mois typique, usagers au cours des 12 derniers mois, selon la province/les territoires, Canada, 2020

		Total (\$)
Somme moyenne généralement dépensée par mois (dollars)	Canada	66,75 [61,96-71,54]
	Terre-Neuve-et-Labrador	89,96 [62,50-117,43]
	Île-du-Prince-Édouard	73,64 [52,11-95,16]
	Nouvelle-Écosse	65,35 [49,56-81,13]
	Nouveau-Brunswick	57,86 [41,31-74,40]
	Québec	46,85 [37,59-56,11]
	Ontario	75,03 [65,80-84,26]
	Manitoba	61,88 [42,83-80,93]
	Saskatchewan	83,64 [58,75-108,52]
	Alberta	65,13 [54,87-75,38]
	Colombie-Britannique	65,20 [55,08-75,31]
	Territoires ¹	105,47 [72,04-138,90]

Tableau 60b. Somme dépensée pour acheter du cannabis à des fins non médicales auprès d'une source légale au cours des 30 derniers jours, usagers de cannabis au cours des 30 derniers jours, selon la province/les territoires, Canada, 2020

		Total (\$)
Somme moyenne dépensée au cours des 30 derniers jours (dollars)	Canada	48,89 [44,61-53,16]
	Terre-Neuve-et-Labrador	66,75* [42,48-91,01]
	Île-du-Prince-Édouard	58,17* [38,29-78,05]
	Nouvelle-Écosse	43,02* [27,04-59,01]
	Nouveau-Brunswick	51,68* [34,49-68,86]
	Québec	43,25 [32,90-53,59]
	Ontario	49,33 [41,48-57,17]
	Manitoba	41,63* [27,24-56,01]
	Saskatchewan	73,22* [46,89-99,54]
	Alberta	51,41 [41,96-60,86]
	Colombie-Britannique	46,11 [36,73-55,48]
	Territoires ¹	#

Tableau 60c. Somme dépensée pour acheter du cannabis à des fins non médicales auprès d'une source illégale au cours des 30 derniers jours, usagers de cannabis au cours des 30 derniers jours, selon la province/les territoires, Canada, 2020

		Total (\$)
Somme moyenne dépensée au cours des 30 derniers jours (dollars)	Canada	46,55 [40,35-52,75]
	Terre-Neuve-et-Labrador	#
	Île-du-Prince-Édouard	39,77* [21,82-57,73]
	Nouvelle-Écosse	33,67* [16,41-50,92]
	Nouveau-Brunswick	32,35* [14,90-49,80]
	Québec	30,71* [20,16-41,26]
	Ontario	57,60 [45,14-70,05]
	Manitoba	67,48* [36,73-98,23]
	Saskatchewan	47,40* [21,05-73,76]
	Alberta	33,78* [19,14-48,43]
	Colombie-Britannique	44,88 [32,33-57,44]
	Territoires ¹	75,88* [40,11-111,65]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

¹ Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Remarque : Les personnes qui ont déclaré dépenser plus de 1 000 dollars ont été éliminées de l'analyse, car il n'était pas possible de déterminer une valeur précise en dollars.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 61. Produits de cannabis achetés ou reçus¹ au cours des 30 derniers jours, usagers au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Fleurs/feuilles séchées	70,8 [68,6-73,0]	67,0 [63,4-70,4]	73,7 [70,8-76,4]	79,4 [73,3-84,3]	76,7 [73,1-80,0]	68,7 [65,9-71,4]
Hachisch/skuff	6,7 [5,7-7,9]	5,0 [3,8-6,6]	8,0 [6,5-9,8]	13,1* [9,2-18,3]	8,6 [6,7-11,1]	5,6 [4,4-7,1]
Huile de cannabis pour administration orale (p. ex., dans un compte-gouttes/une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules/capsules)	11,9 [10,5-13,5]	12,2 [10,1-14,6]	11,8 [9,9-13,9]	#	10,6 [8,4-13,2]	12,3 [10,6-14,3]
Vaporisateurs stylos/cartouches de cannabis	11,4 [10,0-12,9]	11,5↑ [9,4-14,1]	11,3 [9,5-13,3]	17,0 [12,5-22,8]	11,5↑ [9,1-14,4]	10,7 [9,1-12,6]
Concentrés/extraits de cannabis (p. ex., «shatter»/«budder», etc.)	6,3 [5,3-7,5]	4,7 [3,5-6,4]	7,5↑ [6,1-9,3]	#	7,1 [5,3-9,4]	6,1 [4,9-7,6]
Produits alimentaires comestibles à base de cannabis (p. ex., biscuits, bonbons)	27,5↓ [25,4-29,6]	31,2 [28,0-34,7]	24,6 [22,1-27,4]	25,6 [20,1-32,0]	28,9 [25,3-32,8]	27,4 [24,9-30,0]
Boissons à base de cannabis (p. ex., cola, thé, café)	2,6 [2,0-3,4]	2,5↓* [1,7-3,6]	2,8* [1,9-3,9]	#	4,7* [3,3-6,7]	2,2* [1,5-3,2]
Agents topiques (p. ex., lotion, onguent, crèmes appliquées sur la peau)	1,6* [1,1-2,4]	#	#	#	#	#
Autres (p. ex., graines, teinture de cannabis, suppositoire, etc.)	8,8 [7,5-10,4]	9,8 [7,7-12,5]	8,1 [6,5-10,1]	#	6,3 [4,6-8,7]	9,9 [8,2-11,9]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 62. Fréquence d'obtention de produits de cannabis au cours des 30 derniers jours, usagers au cours des 30 derniers jours, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2020

	Une fois (%)	Deux ou trois fois (%)	Quatre fois ou plus (%)
Fleurs/feuilles séchées	54,1 [51,3-56,8]	30,0 [27,6-32,6]	15,9 [14,0-18,0]
Hachisch/skuff	65,8 [56,8-73,7]	22,8* [16,0-31,5]	#
Huile de cannabis pour administration orale (p. ex., dans un compte-gouttes/une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules/capsules)	78,4 [72,3-83,4]	13,5↑* [9,7-18,6]	#
Vaporisateurs stylos/cartouches de cannabis	65,9 [59,0-72,2]	25,9 [20,3-32,4]	#
Concentrés/extraits de cannabis (p. ex., «shatter»/«budder», etc.)	57,0 [47,9-65,7]	27,7 [20,4-36,5]	#
Produits alimentaires comestibles à base de cannabis (p. ex., biscuits, bonbons)	66,6 [62,2-70,7]	25,5↓ [21,8-29,6]	7,9 [5,8-10,8]
Boissons à base de cannabis (p. ex., cola, thé, café)	60,8 [46,0-73,9]	#	#
Agents topiques (p. ex., lotion, onguent, crèmes appliquées sur la peau)	#	#	#
Autres (p. ex., graines, teinture de cannabis, suppositoire, etc.)	90,0 [80,5-95,2]	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 63. Quantité moyenne de cannabis acheté ou reçu par type de produit¹ au cours des 30 derniers jours, usagers au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total	Femmes	Hommes	16-19	20-24	25+
Fleurs/feuilles séchées² – (grammes)	17,4 [13,5-21,3]	17,4* [8,8-26,1]	17,3 [14,3-20,3]	8,4 [6,9-9,9]	15,8 [11,7-19,8]	19,0 [13,7-24,3]
Hachisch/skuff – (grammes)	6,3* [3,1-9,5]	5,2* [2,5-7,9]	#	#	#	5,3* [3,5-7,2]
Huile de cannabis pour administration orale³ (p. ex., dans un compte-gouttes/une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules/capsules) – (millilitres)	19,8 [16,8-22,9]	18,5↑ [14,4-22,7]	20,7 [16,4-25,0]	#	22,7 [16,8-28,7]	19,5↑ [15,8-23,2]
Vaporisateurs stylos/cartouches de cannabis – (cartouches)	1,5↑ [1,4-1,7]	1,5↑ [1,3-1,8]	1,5↑ [1,3-1,7]	1,3 [1,1-1,5]	1,4 [1,3-1,6]	1,6 [1,4-1,8]
Concentrés/extraits de cannabis (p. ex., «shatter»/«budder», etc.) – (grammes)	#	5,1* [3,1-7,1]	#	#	4,2* [2,3-6,0]	#
Produits alimentaires comestibles à base de cannabis (p. ex., biscuits, bonbons) – (portions)	7,4 [6,6-8,2]	7,4 [6,2-8,6]	7,3 [6,2-8,5]	7,4* [4,3-10,5]	7,8 [6,1-9,5]	7,3 [6,3-8,3]
Boissons à base de cannabis (p. ex., cola, thé, café) – (millilitres)	491,4 [372,1-610,8]	#	518,3 [358,9-677,7]	#	468,2 [318,3-618,1]	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Un joint a été converti en 0,33 gramme.

³ Une capsule/gélule molle a été convertie en 0,16 millilitre.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 64. Prix moyen par unité d'achat par type de produit¹ au cours des 30 derniers jours, acheteurs au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (\$)	Femmes (\$)	Hommes (\$)	16-19 (\$)	20-24 (\$)	25+ (\$)
Fleurs/feuilles séchées - (par gramme)	10,48 [8,98-11,98]	9,86 [8,74-10,98]	10,80 [8,59-13,00]	8,80 [6,31-11,29]	12,11* [7,27-16,95]	10,26 [8,64-11,87]
Hachisch/skuff - (par gramme)	14,09 [11,45-16,73]	#	13,50 [11,01-15,98]	#	#	13,96 [10,14-17,79]
Huile de cannabis pour administration orale (p. ex., dans un compte-gouttes/une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules/capsules) – (par millilitre)	#	#	8,40* [4,70-12,10]	#	#	#
Vaporisateurs stylos/cartouches de cannabis – (par cartouche)	47,18 [44,47-49,89]	49,66 [45,24-54,08]	45,47 [42,20-48,74]	#	45,59 [40,76-50,42]	46,97 [43,50-50,43]
Concentrés/extraits de cannabis (p. ex., «shatter»/ «budder», etc.) – (par gramme)	30,10 [25,44-34,76]	#	31,34 [25,25-37,42]	#	26,10 [21,72-30,49]	31,56 [25,27-37,86]
Produits alimentaires comestibles à base de cannabis (p. ex., biscuits, bonbons) – (par portion)	6,97 [6,11-7,83]	5,88 [5,01-6,74]	7,89 [6,51-9,26]	7,62 [5,65-9,58]	6,20 [5,11-7,29]	7,08 [5,96-8,21]
Boissons à base de cannabis (p. ex., cola, thé, café) – (par millilitre)	0,07* [0,03-0,11]	#	0,08* [0,03-0,13]	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 65. Pourcentage d'usagers qui ont obtenu du cannabis gratuitement par type de produit¹ au cours des 30 derniers jours, personnes ayant obtenu du cannabis au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Fleurs/feuilles séchées	10,9 [9,0-13,1]	16,8 [13,2-21,1]	7,5↓ [5,5-10,0]	#	10,5↓ [7,7-14,1]	9,9 [7,7-12,8]
Hachisch/skuff	#	#	#	#	#	#
Huile de cannabis pour administration orale (p. ex., dans un compte-gouttes/une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules/capsules)	#	#	#	#	#	#
Vaporisateurs stylos/cartouches de cannabis	#	#	#	#	#	#
Concentrés/extraits de cannabis (p. ex., «shatter»/«budder», etc.)	#	#	#	#	#	#
Produits alimentaires comestibles à base de cannabis (p. ex., biscuits, bonbons)	17,0 [13,1-21,7]	17,5↓* [11,9-24,9]	16,5↑* [11,6-23,0]	#	#	18,3 [13,4-24,4]
Boissons à base de cannabis (p. ex., cola, thé, café)	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 66. Lieu de consommation du cannabis¹ au cours des 30 derniers jours, usagers au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Maison/résidence privée	95,6 [94,6-96,4]	95,1 [93,3-96,4]	96,0 [94,7-97,0]	91,1 [86,8-94,1]	95,0 [92,9-96,4]	96,2 [95,0-97,1]
Concert, événement sportif, festival, etc.	3,0 [2,3-3,9]	#	3,7 [2,7-5,0]	#	#	2,8* [2,0-3,9]
Restaurant/café/café-restaurant/bar/pub	2,4 [1,8-3,1]	#	3,0 [2,1-4,1]	#	#	2,0* [1,4-3,0]
A l'intérieur d'un bâtiment accessible au public (p. ex., bureau, hôtel, centre commercial)	1,0* [0,7-1,6]	#	#	#	#	#
École/collège/université	1,6 [1,2-2,2]	#	#	#	#	#
Lieu de travail	2,4 [1,8-3,2]	#	3,3* [2,4-4,7]	#	#	2,3* [1,6-3,4]
À l'intérieur d'une voiture	9,9 [8,6-11,3]	8,6 [7,0-10,7]	10,8 [9,1-12,8]	21,6 [16,5-27,8]	12,7 [10,2-15,6]	8,1 [6,7-9,7]
Dans un lieu extérieur public (p. ex., rue, parc, allée, centre commercial, etc.)	25,4 [23,5-27,5]	23,1 [20,3-26,0]	27,2 [24,6-30,0]	39,2 [32,8-45,9]	35,8 [32,0-39,7]	21,9 [19,6-24,3]
Autre	3,8 [3,0-4,8]	3,3* [2,2-5,0]	4,2 [3,1-5,5]	#	#	4,1 [3,1-5,4]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 67a. Fréquence de la consommation de cannabis deux heures avant ou pendant l'école au cours des 12 derniers mois, élèves ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Rarement (moins d'une journée par mois)	14,7 [13,0-16,6]	15,8 [13,2-18,8]	13,8 [11,6-16,4]	25,0 [20,2-30,4]	24,2 [20,8-27,9]	8,8 [6,9-11,2]
Parfois (de 1 à 3 jours par mois)	5,0 [4,0-6,3]	4,0* [2,8-5,8]	5,8 [4,3-7,8]	9,3* [6,4-13,3]	8,7 [6,6-11,3]	#
Souvent (chaque semaine)	3,6 [2,8-4,7]	4,1* [2,8-5,9]	3,3* [2,2-4,8]	#	#	#
Toujours ou presque toujours (presque tous les jours d'école)	2,6 [2,0-3,5]	#	#	#	#	#
Jamais au cours des 12 derniers mois	74,0 [71,7-76,2]	73,6 [70,1-76,9]	74,4 [71,1-77,3]	50,6 [44,8-56,4]	60,5↓ [56,4-64,5]	84,8 [81,8-87,4]

Tableau 67b. Fréquence de l'absentéisme à l'école dû à la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, élèves ayant consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
1 jour par mois	2,6 [1,9-3,6]	#	3,5↓* [2,4-4,9]	#	#	#
De 2 à 3 jours par mois	#	#	#	#	#	#
De 4 à 5 jours par mois	#	#	#	#	#	#
Plus de 5 jours par mois	#	#	#	#	#	#

Je ne me suis jamais absenté pour cette raison	94,6 [93,3-95,7]	95,7 [93,8-97,0]	93,7 [91,8-95,2]	86,9 [82,2-90,5]	93,5↑ [91,1-95,3]	97,2 [95,6-98,2]
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 68a. Fréquence de la consommation de cannabis deux heures avant ou pendant le travail au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Rarement (moins d'une journée par mois)	9,8 [8,7-11,0]	8,7 [7,2-10,4]	10,7 [9,2-12,5]	11,9 [8,7-15,9]	10,1 [8,2-12,3]	9,5↑ [8,2-11,0]
Parfois (de 1 à 3 jours par mois)	3,3 [2,7-4,0]	2,8* [2,0-3,9]	3,7 [2,8-4,8]	#	5,3 [4,0-7,0]	2,8 [2,1-3,7]
Souvent (chaque semaine)	2,1 [1,6-2,7]	#	2,6* [1,8-3,6]	#	#	2,0* [1,4-2,8]
Toujours ou presque toujours (presque tous les jours où je travaille)	2,6 [2,1-3,3]	#	3,5↑ [2,7-4,6]	#	#	2,5↓ [1,9-3,3]
Jamais au cours des 12 derniers mois	68,7 [66,8-70,5]	70,8 [68,0-73,4]	67,0 [64,5-69,5]	60,6 [55,2-65,8]	70,4 [67,3-73,4]	69,3 [67,0-71,6]
Je n'ai pas travaillé au cours des 12 derniers mois	13,5↓ [12,1-15,0]	14,8 [12,7-17,1]	12,5↓ [10,7-14,4]	17,1 [13,4-21,5]	9,2 [7,5-11,4]	13,9 [12,2-15,8]

Tableau 68b. Fréquence de l'absentéisme au travail dû à la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
1 jour par mois	#	#	#	#	#	#
De 2 à 3 jours par mois	#	#	#	#	#	#
De 4 à 5 jours par mois	#	#	#	#	#	#
Plus de 5 jours par mois	#	#	#	#	#	#

Je ne me suis jamais absenté pour cette raison	81,9 [80,2-83,4]	80,6 [78,0-83,0]	82,9 [80,7-84,9]	72,4 [67,2-77,1]	83,7 [81,0-86,1]	82,7 [80,6-84,6]
Je ne travaille pas	17,1 [15,6-18,8]	18,7 [16,4-21,3]	15,8 [13,9-18,0]	25,6 [21,1-30,7]	14,0 [11,8-16,6]	16,7 [14,9-18,8]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 69a. Possession actuelle de cannabis dans la maison ou aux alentours, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Oui	73,2 [71,4-74,9]	73,7 [71,0-76,2]	72,8 [70,4-75,1]	57,5↑ [52,1-62,7]	71,4 [68,3-74,4]	75,4 [73,3-77,5]
Non	24,5↓ [22,8-26,2]	24,0 [21,6-26,6]	24,8 [22,6-27,2]	37,5↓ [32,4-42,8]	26,6 [23,8-29,7]	22,5↓ [20,5-24,6]
Incertain/Je ne sais pas	2,3 [1,8-3,0]	2,3* [1,5-3,3]	2,4* [1,7-3,3]	#	#	2,0* [1,5-2,9]

Tableau 69b. Endroit où le cannabis est entreposé à la maison¹, usagers au cours des 12 derniers mois qui possèdent actuellement du cannabis à la maison, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Contenant à l'épreuve des enfants	30,2 [28,1-32,3]	31,2 [28,2-34,3]	29,3 [26,6-32,2]	32,8 [26,6-39,7]	32,4 [28,8-36,2]	29,5↓ [27,1-32,0]
Contenant verrouillé, p. ex., armoire, tiroir ou coffre-fort	18,9 [17,1-20,7]	17,5↓ [15,0-20,2]	20,0 [17,7-22,6]	19,5↑ [14,5-25,6]	15,1 [12,5-18,2]	19,5↑ [17,4-21,8]
Pièce verrouillée	5,7 [4,7-6,7]	3,8 [2,8-5,2]	7,1 [5,7-8,8]	#	5,8 [4,2-8,0]	5,3 [4,2-6,6]
Armoire ou tiroir non verrouillé	35,7 [33,5-37,9]	38,2 [35,0-41,6]	33,6 [30,7-36,5]	36,8 [30,3-43,7]	37,6 [33,9-41,5]	35,2 [32,6-37,8]
Réfrigérateur ou congélateur non verrouillé	8,6 [7,3-10,1]	9,2 [7,3-11,5]	8,1 [6,5-10,1]	#	5,9 [4,3-8,1]	9,7 [8,1-11,5]
Étagère ou table	17,2 [15,6-18,9]	17,4 [15,1-20,0]	17,0 [14,9-19,3]	20,1 [15,0-26,4]	24,4 [21,1-27,9]	15,5↑ [13,7-17,5]
Local extérieur, p. ex., remise ou garage	7,0 [5,9-8,3]	4,9 [3,6-6,5]	8,7 [7,1-10,7]	#	5,2* [3,7-7,3]	7,2 [5,9-8,7]

Lieu extérieur, p. ex., jardin ou serre	1,8 [1,3-2,5]	#	#	#	#	1,7* [1,2-2,5]
Autre	5,8 [4,9-6,9]	6,6 [5,1-8,4]	5,2 [4,1-6,7]	#	7,0 [5,2-9,3]	5,3 [4,3-6,7]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 70. Fréquence de la consommation d'autres substances psychoactives¹ en association² avec le cannabis au cours des 12 derniers mois, usagers au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2020

	Jamais (%)	Rarement (%)	Parfois (%)	Souvent (%)	Toujours (%)
Alcool	26,9 [25,1-28,6]	26,1 [24,4-27,8]	29,7 [27,9-31,5]	12,8 [11,5-14,2]	4,6 [3,9-5,5]
Tabac ou cigarette électronique avec nicotine	68,3 [66,5-70,0]	7,0 [6,1-8,0]	7,7 [6,8-8,8]	9,0 [8,0-10,2]	8,0 [7,0-9,0]
Opioïdes sur ordonnance (p. ex., oxycodone, Dilaudid^{MD}, morphine, Demerol^{MD}, Tylenol avec codéine n° 3^{MD})	95,2 [94,3-96,0]	2,8 [2,2-3,4]	1,3* [0,9-1,9]	#	#
Stimulants sur ordonnance (p. ex., Ritalin^{MD}, Concerta^{MD}, Adderall^{MD}, Dexedrine^{MD})	95,5↑ [94,8-96,2]	1,9 [1,5-2,4]	1,2 [0,9-1,6]	#	0,7* [0,5-1,1]
Sédatifs/tranquillisants sur ordonnance (p. ex., diazépam, lorazépam, Valium^{MD}, Ativan^{MD}, alprazolam, Xanax^{MD}, clonazépam, Rivotril^{MD})	95,4 [94,5-96,2]	2,3 [1,8-2,9]	1,4 [1,0-1,9]	#	#
Opioïdes illégaux (p. ex., héroïne, fentanyl non pharmaceutique)	99,3 [98,8-99,5]	#	#	#	#
Stimulants illégaux (p. ex., cocaïne, crack, méthamphétamine, ecstasy/MDMA)	94,0 [93,0-94,8]	3,8 [3,2-4,6]	1,7 [1,3-2,2]	#	#
Hallucinogènes illégaux (p. ex., LSD, champignons magiques, kétamine, PCP)	90,9 [89,8-91,9]	6,1 [5,3-7,0]	2,6 [2,1-3,2]	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Le terme « en association » signifie que le produit a été mélangé au cannabis ou consommé en même temps que le cannabis.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 71. Changements concernant la consommation de substances depuis la légalisation du cannabis, usagers de cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Cannabis						
Augmentation de la consommation	28,0 [26,4-29,8]	29,9 [27,4-32,6]	26,5↑ [24,3-28,8]	32,9 [28,1-38,0]	33,8 [30,7-37,0]	26,3 [24,3-28,4]
Diminution de la consommation	5,4 [4,6-6,4]	4,1 [3,2-5,4]	6,5↓ [5,3-7,9]	#	9,2 [7,5-11,3]	4,7 [3,7-5,8]
Consommation identique	61,2 [59,3-63,1]	59,5↑ [56,7-62,3]	62,5↑ [60,0-65,0]	52,5↑ [47,2-57,8]	53,5↑ [50,2-56,9]	63,8 [61,5-66,0]
Je ne consomme pas cette substance	5,3 [4,5-6,3]	6,4 [5,1-8,0]	4,5↓ [3,5-5,7]	9,1* [6,4-12,8]	3,4* [2,4-4,8]	5,2 [4,3-6,4]
Alcool						
Augmentation de la consommation	3,7 [3,1-4,4]	3,7 [2,8-4,8]	3,7 [2,9-4,7]	13,2 [9,9-17,3]	4,6 [3,4-6,2]	2,4 [1,8-3,2]
Diminution de la consommation	15,3 [14,0-16,7]	13,1 [11,3-15,1]	17,1 [15,3-19,1]	13,2 [10,0-17,2]	21,6 [19,0-24,5]	14,3 [12,8-16,1]
Consommation identique	71,4 [69,6-73,1]	74,4 [71,9-76,8]	69,0 [66,6-71,3]	64,6 [59,3-69,5]	66,2 [63,0-69,3]	73,3 [71,1-75,3]
Je ne consomme pas cette substance	9,6 [8,5-10,8]	8,8 [7,3-10,6]	10,1 [8,6-11,9]	9,1* [6,4-12,7]	7,6 [6,0-9,6]	10,0 [8,7-11,5]
Tabac ou cigarette électronique avec nicotine						
Augmentation de la consommation	2,7 [2,3-3,3]	2,7 [2,0-3,6]	2,8 [2,2-3,6]	13,6 [10,4-17,6]	4,8 [3,6-6,5]	#

Diminution de la consommation	5,3 [4,5-6,2]	4,1 [3,1-5,3]	6,3 [5,2-7,6]	8,3* [5,7-11,9]	7,6 [6,0-9,5]	4,5↓ [3,6-5,6]
Consommation identique	26,3 [24,6-28,0]	24,8 [22,4-27,3]	27,5↓ [25,2-29,8]	33,8 [29,0-39,1]	30,1 [27,1-33,2]	24,6 [22,6-26,7]
Je ne consomme pas cette substance	65,7 [63,8-67,5]	68,5↓ [65,8-71,0]	63,4 [60,9-65,9]	44,3 [39,0-49,6]	57,6 [54,2-60,8]	69,9 [67,7-72,0]
Opioides						
Augmentation de la consommation	#	#	#	#	#	#
Diminution de la consommation	#	#	#	#	#	#
Consommation identique	3,9 [3,2-4,7]	3,8 [2,9-5,2]	3,9 [3,0-5,0]	#	4,2 [3,1-5,7]	3,7 [2,8-4,7]
Je ne consomme pas cette substance	95,3 [94,5-96,1]	95,8 [94,4-96,8]	95,0 [93,8-96,0]	92,8 [89,5-95,1]	94,2 [92,5-95,6]	95,9 [94,8-96,7]
Stimulants						
Augmentation de la consommation	#	#	#	#	#	#
Diminution de la consommation	0,9* [0,7-1,3]	#	1,3* [0,9-2,0]	#	#	#
Consommation identique	7,3 [6,4-8,3]	7,1 [5,8-8,6]	7,5↓ [6,2-8,9]	9,4* [6,7-13,0]	10,9 [9,0-13,2]	6,3 [5,3-7,6]
Je ne consomme pas cette substance	91,4 [90,2-92,3]	92,1 [90,5-93,4]	90,8 [89,2-92,1]	86,8 [82,7-90,0]	86,8 [84,4-88,9]	92,8 [91,5-93,9]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 72a. Conduite d'un véhicule dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Conduite dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis	22,0 [20,5-23,7]	14,9 [13,0-17,1]	27,7 [25,4-30,1]	16,1 [12,5-20,4]	22,3 [19,6-25,1]	22,7 [20,8-24,7]
Cela est arrivé il y a combien de temps¹						
Dans les 30 derniers jours	39,2 [35,3-43,3]	31,8 [25,7-38,7]	42,5↓ [37,6-47,5]	#	36,6 [30,1-43,6]	39,3 [34,6-44,2]
Dans les 12 derniers mois	32,0 [28,3-35,9]	35,9 [29,2-43,2]	30,3 [25,9-35,0]	#	33,6 [27,4-40,4]	30,7 [26,3-35,5]
Il y a plus de 12 mois	28,8 [25,2-32,7]	32,3 [25,8-39,5]	27,3 [23,1-31,9]	#	29,8 [23,8-36,6]	30,0 [25,7-34,7]
Que contenait le type de produit de cannabis²						
THC seulement	35,2 [29,1-41,9]	#	37,8 [30,5-45,6]	#	#	38,2 [30,8-46,1]
CBD seulement	#	#	#	#	#	#
Concentration élevée de THC (mais faible concentration de CBD)	39,5↑ [33,4-46,0]	32,4* [22,8-43,8]	41,8 [34,6-49,5]	#	50,4 [38,9-62,0]	37,8 [30,7-45,5]
Concentration élevée de CBD (mais faible concentration de THC)	#	#	#	#	#	#
Proportions égales en THC et en CBD	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	15,4 [11,0-21,0]	#	#	#	#	#

Tableau 72b. Conduite d'un véhicule dans les quatre heures après avoir ingéré un produit de cannabis, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Conduite dans les quatre heures suivant l'ingestion d'un produit à base de cannabis	13,4 [12,2-14,8]	9,1 [7,6-10,8]	16,9 [15,0-19,0]	11,6 [8,6-15,5]	12,5↓ [10,5-14,8]	13,8 [12,3-15,6]
Cela est arrivé il y a combien de temps³						
Dans les 30 derniers jours	31,6 [27,0-36,7]	30,5↓ [22,8-39,4]	32,1 [26,5-38,4]	#	29,1 [21,3-38,3]	32,0 [26,4-38,1]
Dans les 12 derniers mois	39,7 [34,7-45,0]	36,6 [28,2-45,8]	41,1 [34,9-47,5]	#	46,3 [37,2-55,6]	37,2 [31,3-43,5]
Il y a plus de 12 mois	28,7 [24,1-33,7]	32,9 [24,8-42,2]	26,8 [21,5-32,9]	#	#	30,8 [25,2-36,9]
Que contenait le produit de cannabis⁴						
THC seulement	29,4 [21,6-38,7]	#	34,1 [24,4-45,3]	#	#	30,0* [20,9-41,1]
CBD seulement	#	#	#	#	#	#
Concentration élevée de THC (mais faible concentration de CBD)	40,3 [31,5-49,6]	#	39,2 [29,0-50,5]	#	#	39,7 [29,6-50,8]
Concentration élevée de CBD (mais faible concentration de THC)	#	#	#	#	#	#
Proportions égales en THC et en CBD	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	#	#	#	#	#	#

Tableau 72c. Conduite d'un véhicule dans les deux heures après avoir consommé du cannabis ou un produit de cannabis en association avec de l'alcool, usagers ayant déclaré avoir conduit dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis ou dans les quatre heures après avoir ingéré du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Conduite d'un véhicule dans les deux heures suivant la consommation de cannabis ou d'un produit de cannabis en association avec de l'alcool	18,8 [16,0-21,9]	14,6 [10,6-19,9]	20,6 [17,1-24,7]	#	13,6 [9,8-18,6]	20,6 [17,2-24,5]
Cela est arrivé il y a combien de temps?⁵						
Dans les 30 derniers jours	33,6 [25,8-42,4]	#	34,4 [25,5-44,6]	#	#	32,7 [24,2-42,5]
Dans les 12 derniers mois	29,9 [22,4-38,7]	#	27,0* [19,0-36,9]	#	#	30,3 [22,0-40,1]
Il y a plus de 12 mois	36,5↓ [28,2-45,6]	#	38,6 [28,9-49,2]	#	#	37,0 [27,9-47,2]

Tableau 72d. Conduite d'un véhicule dans les deux heures après avoir consommé du cannabis ou un produit de cannabis en association avec une autre drogue, usagers ayant déclaré avoir conduit dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis ou dans les quatre heures après avoir ingéré du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Conduite d'un véhicule dans les deux heures suivant la consommation de cannabis ou d'un produit de cannabis en association avec une autre drogue	7,4 [5,7-9,6]	#	8,4 [6,3-11,2]	#	#	7,3 [5,3-9,9]
Cela est arrivé il y a combien de temps?⁶						
Dans les 30 derniers jours	#	#	#	#	#	#
Dans les 12 derniers mois	#	#	#	#	#	#
Il y a plus de 12 mois	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Parmi les usagers ayant conduit dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis.

² Parmi les usagers ayant conduit dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis au cours des 30 derniers jours.

³ Parmi les usagers ayant conduit dans les quatre heures après avoir ingéré du cannabis.

⁴ Parmi les usagers ayant conduit dans les quatre heures après avoir ingéré du cannabis au cours des 30 derniers jours.

⁵ Parmi les usagers ayant conduit dans les deux heures après avoir consommé du cannabis en association avec de l'alcool.

⁶ Parmi les usagers ayant conduit dans les deux heures après avoir consommé du cannabis en association avec une autre drogue.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 73a. Conduite d'un véhicule dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis, usagers au cours des 12 derniers mois, selon la province/les territoires, Canada, 2020

			Cela est arrivé il y a combien de temps ¹		
		Oui (%)	Dans les 30 derniers jours (%)	Dans les 12 derniers mois (%)	Il y a plus de 12 mois (%)
Conduite dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis	Canada	22,0 [20,5-23,7]	39,2 [35,3-43,3]	32,0 [28,3-35,9]	28,8 [25,2-32,7]
	Terre-Neuve-et-Labrador	25,3 [18,3-33,9]	#	#	#
	Île-du-Prince-Édouard	25,4 [18,2-34,3]	#	#	#
	Nouvelle-Écosse	17,4* [12,0-24,5]	#	#	#
	Nouveau-Brunswick	22,4* [15,8-30,8]	#	#	#
	Québec	17,0 [13,8-20,8]	39,5↓ [29,2-50,8]	39,2 [28,9-50,5]	#
	Ontario	20,8 [18,2-23,6]	38,1 [31,3-45,5]	28,0 [21,9-35,1]	33,9 [27,2-41,2]
	Manitoba	29,2 [22,0-37,6]	#	#	#
	Saskatchewan	32,9 [24,7-42,2]	#	#	#
	Alberta	22,1 [18,2-26,6]	35,9 [26,3-46,7]	34,0 [24,6-44,8]	#
	Colombie-Britannique	27,5↑ [23,4-32,0]	39,4 [30,8-48,7]	35,8 [27,5-45,1]	24,8 [17,8-33,4]
	Territoires ²	#	#	#	#

Tableau 73b. Conduite d'un véhicule dans les quatre heures après avoir ingéré du cannabis, usagers au cours des 12 derniers mois, selon la province/les territoires, Canada, 2020

			Cela est arrivé il y a combien de temps ³		
		Oui (%)	Dans les 30 derniers jours (%)	Dans les 12 derniers mois (%)	Il y a plus de 12 mois (%)
Conduite dans les quatre heures suivant l'ingestion d'un produit à base de cannabis	Canada	13,4 [12,2-14,8]	31,6 [27,0-36,7]	39,7 [34,7-45,0]	28,7 [24,1-33,7]
	Terre-Neuve-et-Labrador	#	#	#	#
	Île-du-Prince-Édouard	#	#	#	#
	Nouvelle-Écosse	#	#	#	#
	Nouveau-Brunswick	#	#	#	#
	Québec	9,9 [7,4-13,0]	#	40,7* [27,7-55,1]	#
	Ontario	13,0 [10,9-15,5]	30,7 [22,9-39,8]	41,3 [32,5-50,6]	28,1 [20,5-37,1]
	Manitoba	#	#	#	#
	Saskatchewan	#	#	#	#
	Alberta	13,2 [10,2-17,1]	#	#	#
	Colombie-Britannique	17,5↑ [14,1-21,5]	#	41,7 [30,9-53,3]	#
	Territoires ²	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Parmi les usagers ayant conduit dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis.

² Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

³ Parmi les usagers ayant conduit dans les quatre heures après avoir ingéré du cannabis.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 74. Raisons de conduire un véhicule motorisé après avoir consommé du cannabis¹, répondants ayant déclaré avoir conduit après avoir consommé du cannabis², selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Je ne me sentais pas désorienté/affaibli	77,9 [74,6-80,9]	80,9 [75,2-85,5]	76,6 [72,5-80,2]	80,5↑ [69,5-88,3]	72,9 [66,7-78,3]	78,6 [74,7-82,1]
Je ne pensais pas que je me ferais prendre par la police/agent d'application de la loi	8,9 [7,1-11,2]	#	9,1 [6,9-11,9]	#	14,2 [10,3-19,3]	7,3 [5,3-10,0]
Je n'avais pas d'autre moyen de transport	12,0 [9,9-14,5]	12,5↑ [9,0-17,1]	11,7 [9,2-14,8]	#	23,0 [18,0-28,9]	8,8 [6,6-11,7]
Je pensais que je pourrais conduire prudemment	24,0 [21,0-27,3]	27,6 [22,2-33,8]	22,3 [18,8-26,3]	#	33,8 [28,0-40,2]	20,9 [17,4-24,8]
Je n'avais pas à conduire très loin	23,2 [20,3-26,5]	28,9 [23,5-35,1]	20,6 [17,2-24,5]	40,0 [29,1-52,0]	35,5↓ [29,5-41,9]	19,4 [16,0-23,2]
Autre	8,1 [6,3-10,4]	#	9,6 [7,3-12,6]	#	#	7,3 [5,3-10,1]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Parmi les usagers ayant conduit dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis ou dans les quatre heures après avoir ingéré du cannabis.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 75a. Interaction avec un agent d'application de la loi concernant la conduite sous l'influence du cannabis en tant que conducteur, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Interaction avec un agent d'application de la loi concernant la conduite sous l'influence du cannabis en tant que conducteur	1,5↑ [1,1-2,0]	#	2,3 [1,7-3,1]	#	#	1,4* [0,9-2,0]

Tableau 75b. Interaction avec un agent d'application de la loi concernant la possession personnelle de cannabis, usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Interaction avec un agent d'application de la loi concernant la possession personnelle de cannabis	1,1* [0,8-1,5]	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 76. Effets de la consommation du cannabis au cours des 12 derniers mois, usagers de cannabis au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2020

	Très bénéfique (%)	Plutôt bénéfique (%)	Aucun effet (%)	Plutôt nuisible (%)	Très nuisible (%)
Amitié ou vie sociale	10,2 [9,2-11,4]	25,0 [23,4-26,7]	62,1 [60,2-63,9]	2,3 [1,8-2,9]	#
Santé physique	8,1 [7,1-9,2]	17,0 [15,6-18,5]	65,9 [64,0-67,7]	8,5↓ [7,5-9,6]	#
Santé mentale	16,2 [14,8-17,6]	30,1 [28,3-31,9]	47,3 [45,3-49,3]	5,8 [5,0-6,8]	0,6* [0,4-0,9]
Vie de famille ou mariage	9,8 [8,7-11,1]	16,9 [15,4-18,4]	68,9 [67,1-70,7]	3,7 [3,1-4,5]	#
Rendement au travail ou à l'école	5,3 [4,5-6,2]	8,9 [7,9-10,0]	80,5↓ [78,9-81,9]	4,6 [3,9-5,4]	#
Qualité de vie	16,4 [15,1-17,9]	33,6 [31,8-35,5]	46,2 [44,2-48,1]	3,2 [2,6-4,0]	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 77. Pointages ASSIST¹ chez les usagers au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Faible risque de manifester des problèmes	25,2 [23,2-27,2]	30,4 [27,3-33,6]	21,1 [18,8-23,6]	17,1 [13,0-22,0]	18,0 [15,3-21,0]	27,5↑ [25,2-30,0]
Risque modéré de manifester des problèmes	71,9 [69,8-73,8]	67,3 [64,0-70,4]	75,5↓ [72,9-77,9]	73,3 [67,6-78,4]	75,8 [72,5-78,9]	70,9 [68,4-73,3]
Risque élevé de manifester des problèmes/forte probabilité	3,0 [2,4-3,7]	2,4* [1,7-3,4]	3,4 [2,6-4,5]	#	6,2 [4,6-8,3]	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ OMS – Test de dépistage de la consommation d'alcool, de tabac et de substances. Explication du pointage :

Faible : Vous courez un faible risque de problèmes de santé et d'autres problèmes découlant de vos habitudes de consommation actuelles.

Modéré : Vous courez un risque modéré de problèmes de santé et d'autres problèmes découlant de vos habitudes de consommation de substances actuelles.

Élevé : Vous courez un risque élevé de problèmes graves (problèmes de santé, problèmes sociaux, financiers, juridiques, relationnels) découlant de vos habitudes de consommation actuelles, et vous êtes probablement dépendent.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 78a. Sentiment d'avoir besoin d'aide professionnelle à l'égard de la consommation de cannabis, usagers ayant consommé du cannabis plus d'une fois dans leur vie, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Non, jamais	96,7 [96,1-97,1]	97,1 [96,3-97,7]	96,3 [95,5-97,0]	93,5↓ [90,1-95,7]	92,5↓ [90,6-94,0]	97,3 [96,7-97,8]
Oui, au cours des 12 derniers mois	1,2 [0,9-1,5]	1,2* [0,8-1,6]	1,2 [0,8-1,6]	#	4,2 [3,1-5,7]	#
Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois	2,2 [1,8-2,7]	1,8 [1,3-2,4]	2,5↑ [2,0-3,3]	#	3,3* [2,4-4,6]	2,1 [1,7-2,6]

Tableau 78b. Obtention d'une aide professionnelle à l'égard de la consommation de cannabis, usagers ayant consommé du cannabis plus d'une fois dans leur vie, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Non, jamais	97,8 [97,3-98,2]	98,3 [97,7-98,8]	97,3 [96,6-97,9]	95,8 [93,0-97,6]	95,4 [93,9-96,5]	98,2 [97,7-98,6]
Oui, au cours des 12 derniers mois	0,7* [0,5-1,0]	#	#	#	#	#
Oui, mais pas au cours des 12 derniers mois	1,5↑ [1,2-1,9]	1,1* [0,8-1,7]	1,8 [1,4-2,5]	#	#	1,4 [1,0-1,9]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 79a. Consommation de cannabis devant des mineurs¹ au cours des 12 derniers mois, usagers d'âge légal qui ont consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)
Oui	13,6 [12,3-15,0]	12,5↑ [10,7-14,5]	14,5↑ [12,7-16,5]
Non	83,3 [81,9-84,7]	85,7 [83,6-87,5]	81,5↑ [79,4-83,5]
Incertain/Je ne sais pas	3,0 [2,5-3,7]	1,8* [1,3-2,6]	4,0 [3,1-5,0]

Tableau 79b. Partage de cannabis avec un mineur¹ au cours des 12 derniers mois, usagers d'âge légal qui ont consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois, selon le sexe, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)
Oui	4,5↓ [3,7-5,3]	4,4 [3,4-5,7]	4,5↓ [3,6-5,6]
Non	94,4 [93,5-95,2]	95,1 [93,7-96,1]	93,8 [92,5-94,9]
Incertain/Je ne sais pas	1,2 [0,9-1,6]	#	1,7* [1,2-2,5]

Tableau 79c. Partage de cannabis avec un mineur¹ par une personne d'âge légal au cours des 12 derniers mois, mineurs ayant consommé au cours des 12 derniers mois, selon le sexe, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)
Oui	62,2 [55,7-68,2]	61,7 [52,0-70,4]	62,6 [53,9-70,6]
Non	34,4 [28,5-40,8]	35,2 [26,6-44,8]	33,8 [26,1-42,5]
Incertain/Je ne sais pas	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Un mineur est âgé de 17 ans ou moins en Alberta, de 20 ans ou moins au Québec, ou de 18 ans ou moins dans les autres provinces et territoires.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 80a. Consommation de cannabis pendant la dernière grossesse, femmes âgées de 16 à 50 ans qui ont accouché au cours des 5 dernières années, Canada, 2020

	Total (%)
Pas consommé de cannabis après avoir appris être enceinte du dernier enfant	96,0 [93,5-97,6]
Consommé du cannabis après avoir appris être enceinte du dernier enfant	#

Tableau 80b. Consommation de cannabis pendant l'allaitement, femmes âgées de 16 à 50 ans qui ont accouché et allaité au cours des 5 dernières années, Canada, 2020

	Total (%)
Pas consommé de cannabis pendant l'allaitement du dernier enfant	93,8 [90,3-96,2]
Consommé du cannabis pendant l'allaitement du dernier enfant	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 81. Description de la taille de l'échantillon global, selon le groupe d'âge, le sexe et la province/les territoires, Canada, 2020

	Femmes	Hommes	16-19	20-24	25+	Total
Canada	5 535	5 287	858	1 800	8 164	10 822
Terre-Neuve-et-Labrador	232	178	18	29	363	410
Île-du-Prince-Édouard	251	186	17	38	382	437
Nouvelle-Écosse	256	213	27	80	362	469
Nouveau-Brunswick	229	199	19	55	354	428
Québec	1 092	1 020	218	494	1 400	2 112
Ontario	1 452	1 517	243	558	2 168	2 969
Manitoba	266	241	20	56	431	507
Saskatchewan	210	231	26	51	364	441
Alberta	701	669	140	182	1 048	1 370
Colombie-Britannique	748	729	111	235	1 131	1 477
Territoires¹	98	104	19	22	161	202

¹ Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 82. Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Estimation de la population ('000)	28 907	14 843	14 063	1 621	2 243	25 043
Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois avec ordonnance d'un professionnel de la santé	3,3 [2,9-3,7]	3,4 [2,8-4,0]	3,2 [2,7-3,8]	#	#	3,7 [3,2-4,1]
Consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois sans ordonnance d'un professionnel de la santé	10,6 [9,9-11,2]	10,8 [9,9-11,8]	10,3 [9,4-11,2]	11,2 [9,2-13,7]	17,7 [15,9-19,6]	9,9 [9,2-10,6]
Pas consommé de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois	86,2 [85,4-86,9]	85,8 [84,7-86,9]	86,5↓ [85,4-87,5]	88,3 [85,8-90,4]	81,2 [79,2-83,0]	86,5↓ [85,6-87,3]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 83. Consommation de cannabis à des fins médicales¹ au cours des 12 derniers mois, par orientation sexuelle, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Hétérosexuel	13,0 [12,3-13,8]	12,7 [11,6-13,9]	13,3 [12,3-14,4]	9,8 [7,6-12,5]	15,6 [13,7-17,7]	13,0 [12,2-13,9]
Homosexuel (gai ou lesbienne)	15,4 [11,4-20,5]	#	#	#	#	#
Bisexuel	29,9 [25,9-34,2]	32,1 [27,3-37,3]	24,3 [17,6-32,5]	24,7* [17,5-33,6]	31,6 [25,9-37,9]	31,1 [24,8-38,0]
Autre	40,6 [30,8-51,3]	45,8 [34,0-58,1]	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Comprend la consommation de cannabis à des fins médicales avec ou sans ordonnance d'un professionnel de la santé.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 84. Consommation de cannabis à des fins médicales¹ au cours des 12 derniers mois, par zone urbaine et rurale, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Zone urbaine	13,0 [12,2-13,8]	13,3 [12,1-14,5]	12,7 [11,6-13,9]	12,1 [9,7-15,0]	19,0 [17,0-21,2]	12,4 [11,6-13,4]
Zone rurale	16,3 [14,7-17,9]	16,5↑ [14,4-18,9]	16,0 [13,8-18,4]	#	17,6 [13,6-22,5]	16,5↑ [14,8-18,3]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Comprend la consommation de cannabis à des fins médicales avec ou sans ordonnance d'un professionnel de la santé.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 85. Consommation de cannabis à des fins médicales¹ au cours des 12 derniers mois, selon la province/les territoires, le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Estimation de la population ('000)	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Canada	28 907	13,8 [13,1-14,6]	14,2 [13,1-15,3]	13,5↑ [12,5-14,6]	11,7 [9,6-14,2]	18,8 [17,0-20,8]	13,5↑ [12,7-14,4]
Terre-Neuve-et-Labrador	440	15,9 [12,4-20,0]	16,0 [11,5-21,9]	#	#	#	15,9 [12,2-20,3]
Île-du-Prince-Édouard	119	13,5↓ [10,5-17,1]	12,6* [8,9-17,5]	#	#	#	12,7 [9,7-16,6]
Nouvelle-Écosse	780	18,8 [15,4-22,8]	21,5↓ [16,7-27,2]	15,9* [11,4-21,9]	#	#	18,3 [14,6-22,7]
Nouveau-Brunswick	628	20,8 [16,9-25,3]	18,3 [13,2-24,7]	23,5↓ [17,8-30,3]	#	#	21,4 [17,1-26,4]
Québec	6 745	7,1 [5,9-8,5]	7,2 [5,5-9,4]	7,0 [5,5-9,0]	#	9,8 [7,5-12,8]	6,9 [5,6-8,6]
Ontario	11 078	14,9 [13,6-16,3]	15,7 [13,8-17,8]	14,1 [12,4-16,1]	12,9* [9,2-17,7]	21,9 [18,7-25,6]	14,4 [13,0-16,0]
Manitoba	1 018	14,1 [11,3-17,4]	16,1 [12,1-21,1]	#	#	#	14,3 [11,3-18,0]
Saskatchewan	869	16,1 [12,8-19,9]	17,3 [12,7-23,1]	14,8 [10,6-20,3]	#	#	15,3 [11,9-19,6]
Alberta	3 240	15,3 [13,4-17,4]	15,5↓ [12,9-18,4]	15,1 [12,5-18,2]	#	17,2 [12,4-23,6]	15,0 [12,9-17,3]
Colombie-Britannique	3 905	18,3 [16,3-20,5]	17,2 [14,6-20,2]	19,5↓ [16,6-22,7]	#	22,7 [17,8-28,5]	18,3 [16,1-20,7]
Territoires²	85	16,1* [10,8-23,2]	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Comprend la consommation de cannabis à des fins médicales avec ou sans ordonnance d'un professionnel de la santé.

² Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 86. Consommation de cannabis à des fins médicales¹ au cours des 12 derniers mois, par type d'établissement d'enseignement actuel, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
École primaire ou secondaire	16,3 [13,4-19,6]	14,8 [11,0-19,7]	17,8 [13,7-22,8]	11,1* [7,8-15,7]	#	17,3 [13,5-22,0]
École de métiers, collège, cégep ou autre établissement non universitaire	16,7 [14,8-18,8]	18,9 [15,9-22,2]	14,6 [12,1-17,4]	#	21,0 [16,6-26,2]	16,8 [14,6-19,3]
Université	11,0 [9,7-12,4]	12,3 [10,3-14,5]	9,7 [8,1-11,6]	#	13,7 [11,5-16,3]	10,6 [9,0-12,4]
Aucune de ces réponses	13,9 [13,0-15,0]	13,6 [12,2-15,0]	14,3 [13,0-15,8]	#	23,5↓ [20,0-27,3]	13,4 [12,4-14,4]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Comprend la consommation de cannabis à des fins médicales avec ou sans ordonnance d'un professionnel de la santé.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 87. Consommation de cannabis à des fins médicales¹ au cours des 12 derniers mois, par niveau de scolarité le plus élevé, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Niveau inférieur à un diplôme d'études secondaires	18,2 [14,7-22,3]	18,1 [13,2-24,3]	18,3 [13,7-24,0]	#	#	18,5↑ [14,1-24,0]
École secondaire	17,0 [15,4-18,8]	17,0 [14,7-19,6]	17,0 [14,7-19,6]	11,0 [8,6-14,0]	20,5↓ [17,6-23,7]	18,0 [15,7-20,5]
Certificat ou diplôme d'une école de métiers	18,6 [16,2-21,2]	18,3 [14,5-22,9]	18,7 [15,8-22,0]	#	29,7 [21,9-38,9]	18,0 [15,6-20,7]
Collège, Cégep	15,8 [14,1-17,8]	16,6 [14,2-19,2]	14,8 [12,3-17,8]	#	15,9 [12,2-20,5]	16,0 [14,1-18,1]
Université de niveau inférieur à un baccalauréat	14,6 [12,0-17,7]	15,4 [11,8-19,8]	13,7 [10,2-18,2]	#	#	14,5↓ [11,7-17,7]
Baccalauréat	9,4 [8,2-10,8]	9,8 [8,1-11,8]	9,0 [7,4-10,9]	#	14,9 [11,6-18,9]	8,9 [7,7-10,4]
Diplôme d'études supérieures	8,8 [7,3-10,7]	10,1 [7,8-12,9]	7,4 [5,5-10,0]	#	#	8,8 [7,3-10,7]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Comprend la consommation de cannabis à des fins médicales avec ou sans ordonnance d'un professionnel de la santé.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 88. Consommation de cannabis à des fins médicales¹ au cours des 12 derniers mois, par type d'emploi comportant des tâches dangereuses ou critiques pour la sécurité² exécutées au moins une fois par semaine, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Conduite d'un véhicule motorisé	16,8 [15,1-18,6]	18,7 [15,4-22,5]	16,0 [14,1-18,2]	#	27,5↓ [22,1-33,7]	16,2 [14,4-18,1]
Manipulation d'équipement, de machinerie ou d'outils ou travail à proximité de ceux-ci	17,0 [15,3-18,9]	17,5↑ [14,0-21,7]	16,9 [15,0-19,0]	#	25,8 [21,4-30,9]	16,6 [14,6-18,7]
Travail en hauteur à plus de 2 mètres du sol	17,6 [15,1-20,3]	14,1* [9,5-20,3]	18,2 [15,5-21,2]	#	24,7 [18,7-31,9]	16,6 [14,0-19,7]
Travail avec des substances dangereuses	18,2 [16,3-20,2]	17,4 [14,2-21,2]	18,5↑ [16,3-21,0]	#	25,2 [20,7-30,3]	17,6 [15,5-19,9]
Travail avec des objets tranchants	17,6 [15,9-19,4]	16,9 [14,3-19,9]	18,0 [15,8-20,4]	14,3* [10,0-20,0]	26,3 [22,0-31,0]	16,9 [15,0-19,0]
Travail à proximité de surfaces ou d'objets chauds, de flammes nues ou de vapeur	20,5↑ [18,1-23,2]	23,0 [18,4-28,4]	19,6 [16,8-22,7]	#	28,9 [23,3-35,3]	20,2 [17,3-23,3]
Travaux électriques	17,2 [14,6-20,2]	#	17,1 [14,3-20,3]	#	#	16,7 [13,9-20,0]
Manipulation de charges supérieures à 20 kg	19,0 [17,1-21,0]	21,3 [17,4-25,8]	18,3 [16,2-20,6]	#	27,5↑ [23,0-32,6]	18,1 [16,0-20,3]
Travail dans un endroit où l'éjection potentielle de particules dans les airs ou la chute potentielle d'objets peuvent causer des blessures	18,4 [16,2-20,9]	16,4 [12,0-22,0]	18,9 [16,4-21,7]	#	25,3 [20,0-31,4]	18,0 [15,5-20,8]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Comprend la consommation de cannabis à des fins médicales avec ou sans ordonnance d'un professionnel de la santé.

² Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 89. Consommation de cannabis à des fins médicales¹ au cours des 12 derniers mois, par identité autochtone, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-24 (%)	25+ (%)
Premières nations (Indien de l'Amérique du Nord)	25,4 [19,0-33,2]	30,0* [21,0-40,9]	#	#	25,0* [17,7-34,1]
Métis	28,1 [21,8-35,4]	31,8 [22,8-42,5]	#	#	28,9 [21,8-37,4]
Inuk (Inuit)	#	#	#	#	#
Ne s'identifie pas en tant qu'Autochtone	13,4 [12,7-14,2]	13,6 [12,5-14,7]	13,2 [12,2-14,3]	15,4 [14,0-17,0]	13,1 [12,3-13,9]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Comprend la consommation de cannabis à des fins médicales avec ou sans ordonnance d'un professionnel de la santé.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 90. Consommation de cannabis à des fins médicales¹ au cours des 12 derniers mois, par origine ethnique², selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Blanc	14,9 [14,0-15,8]	14,8 [13,6-16,1]	15,0 [13,8-16,3]	14,0 [11,2-17,3]	21,0 [18,7-23,5]	14,5↓ [13,5-15,5]
Asiatique du Sud (p. ex., Indien de l'Inde, Pakistanais, Sri-Lankais, etc.)	6,4* [4,5-9,0]	#	#	#	#	#
Chinois	#	#	#	#	#	#
Noir	6,6* [4,5-9,7]	#	#	#	#	#
Philippin	#	#	#	#	#	#
Latino-Américain	#	#	#	#	#	#
Arabe	#	#	#	#	#	#
Asiatique du Sud-Est (p. ex., Vietnamien, Cambodgien, Malaisien, Laotien, Thaïlandais, etc.)	#	#	#	#	#	#
Asiatique de l'Ouest (p. ex., Iranien, Afghan, etc.)	#	#	#	#	#	#
Coréen	#	#	#	#	#	#
Japonais	#	#	#	#	#	#
Autre	15,0 [11,4-19,5]	#	#	#	#	14,4 [10,3-19,8]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Comprend la consommation de cannabis à des fins médicales avec ou sans ordonnance d'un professionnel de la santé.

² Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Remarque : Les répondants qui se sont identifiés en tant qu'Autochtones n'ont pas eu à indiquer une autre origine ethnique.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 91. Consommation de cannabis à des fins médicales¹ au cours des 12 derniers mois, par lieu de naissance (Canada), selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Oui	15,9 [15,0-16,8]	16,0 [14,8-17,3]	15,8 [14,5-17,1]	13,4 [10,9-16,4]	20,8 [18,6-23,1]	15,6 [14,7-16,7]
Non	7,4 [6,3-8,6]	7,3 [5,7-9,3]	7,4 [6,0-9,1]	#	12,2 [9,2-15,9]	7,1 [5,9-8,4]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Comprend la consommation de cannabis à des fins médicales avec ou sans ordonnance d'un professionnel de la santé.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 92. Consommation de cannabis à des fins médicales¹ au cours des 12 derniers mois, par état de santé, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Santé physique						
Excellent	9,0 [7,8-10,4]	7,9 [6,3-9,9]	10,1 [8,4-12,1]	#	12,7 [9,6-16,7]	8,6 [7,3-10,1]
Très bon	11,4 [10,4-12,5]	11,8 [10,3-13,4]	11,0 [9,6-12,5]	9,9* [6,9-13,9]	18,0 [15,2-21,3]	10,9 [9,8-12,1]
Bon	15,8 [14,3-17,3]	15,7 [13,7-17,9]	15,9 [13,8-18,1]	12,7* [8,9-17,8]	20,5↑ [17,2-24,3]	15,5↓ [13,9-17,2]
Passable	27,2 [23,8-30,9]	29,8 [25,1-35,0]	24,1 [19,5-29,4]	#	29,5↑ [22,5-37,6]	28,4 [24,5-32,7]
Mauvais	44,1 [36,1-52,4]	49,1 [38,1-60,2]	38,5↑ [27,5-50,9]	#	#	44,6 [35,9-53,6]
Santé mentale						
Excellent	8,7 [7,6-10,1]	9,1 [7,2-11,4]	8,5↓ [7,0-10,2]	#	#	8,6 [7,4-10,0]
Très bon	10,5↑ [9,4-11,8]	10,6 [8,9-12,5]	10,5↓ [9,0-12,1]	#	12,8 [10,0-16,4]	10,6 [9,4-12,0]
Bon	16,0 [14,5-17,6]	15,1 [13,2-17,2]	17,2 [14,9-19,7]	#	16,3 [13,3-19,8]	16,5↓ [14,8-18,3]
Passable	26,0 [23,2-29,0]	24,9 [21,3-28,9]	27,5↓ [23,3-32,1]	14,7* [10,3-20,6]	26,9 [22,3-31,9]	28,2 [24,5-32,3]
Mauvais	42,0 [36,4-47,8]	44,3 [37,3-51,7]	38,5↓ [29,6-48,2]	#	36,1 [28,6-44,4]	49,2 [40,2-58,3]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Comprend la consommation de cannabis à des fins médicales avec ou sans ordonnance d'un professionnel de la santé.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 93. Consommation de cannabis à des fins médicales¹ au cours des 12 derniers mois, par revenu de ménage, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-24 (%)	25+ (%)
Moins de 10 000 \$	19,2 [14,6-24,9]	21,8 [15,7-29,5]	#	17,8 [12,8-24,1]	#
De 10 000 \$ à 24 999 \$	19,6 [16,5-23,1]	20,6 [16,5-25,4]	18,3 [13,9-23,7]	21,0 [16,7-26,1]	19,1 [15,4-23,6]
De 25 000 \$ à 49 999 \$	16,5↑ [14,5-18,8]	17,5↓ [14,7-20,7]	15,3 [12,5-18,7]	19,2 [15,6-23,5]	16,1 [13,8-18,7]
De 50 000 \$ à 74 999 \$	14,9 [13,0-16,9]	14,9 [12,4-17,9]	14,8 [12,3-17,7]	15,7 [11,9-20,5]	14,7 [12,8-17,0]
De 75 000 \$ à 99 999 \$	16,9 [14,9-19,0]	16,1 [13,4-19,3]	17,6 [14,9-20,6]	17,9 [13,6-23,1]	16,8 [14,6-19,1]
De 100 000 \$ à 124 999 \$	12,9 [10,9-15,1]	13,4 [10,6-16,9]	12,4 [9,9-15,4]	13,4* [9,4-18,6]	12,8 [10,7-15,3]
De 125 000 \$ à 149 999 \$	10,4 [8,4-12,8]	9,4* [6,7-13,1]	11,2 [8,5-14,7]	#	10,1 [7,9-12,7]
150 000 \$ ou plus	9,8 [8,3-11,6]	9,9 [7,7-12,7]	9,8 [7,9-12,2]	13,3 [9,8-17,8]	9,5↓ [7,9-11,4]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Comprend la consommation de cannabis à des fins médicales avec ou sans ordonnance d'un professionnel de la santé.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 94. But de la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois, tous les répondants, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Aucune consommation au cours des 12 derniers mois	68,3 [67,3-69,3]	70,7 [69,4-72,1]	65,8 [64,4-67,2]	55,2 [51,7-58,7]	45,9 [43,5-48,3]	71,2 [70,1-72,3]
Consommation à des fins non médicales seulement	17,9 [17,1-18,7]	15,1 [14,1-16,1]	20,8 [19,6-22,0]	33,0 [29,8-36,4]	35,3 [33,0-37,6]	15,3 [14,5-16,2]
Consommation à des fins non médicales et médicales¹	9,1 [8,5-9,7]	8,3 [7,6-9,1]	9,9 [9,1-10,9]	10,6 [8,6-12,9]	17,2 [15,4-19,1]	8,3 [7,7-8,9]
Consommation à des fins médicales¹ seulement	4,7 [4,2-5,2]	5,9 [5,1-6,7]	3,5↓ [2,9-4,1]	#	#	5,2 [4,7-5,8]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Comprend la consommation de cannabis à des fins médicales avec ou sans ordonnance d'un professionnel de la santé.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 95. Description de la taille de l'échantillon de la section médicale, selon le groupe d'âge, le sexe et la province/les territoires, Canada, 2020

	Femmes	Hommes	16-19	20-24	25+	Total
Canada	514	391	47	159	699	905
Terre-Neuve-et-Labrador	26	16	2	2	38	42
Île-du-Prince-Édouard	21	18	0	5	34	39
Nouvelle-Écosse	36	18	2	8	44	54
Nouveau-Brunswick	24	21	1	5	39	45
Québec	45	34	5	18	56	79
Ontario	161	117	19	69	190	278
Manitoba	25	14	0	5	34	39
Saskatchewan	28	21	0	8	41	49
Alberta	68	51	9	12	98	119
Colombie-Britannique	72	73	7	24	114	145
Territoires ¹	8	8	2	3	11	16

¹ Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

Remarque : Tous les répondants n'ont pas indiqué leur sexe à la naissance.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 96. Usagers de cannabis à des fins médicales¹ possédant un document médical fourni par un professionnel de la santé, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Possession d'un document médical	29,7 [26,3-33,4]	28,2 [23,7-33,2]	31,7 [26,6-37,3]	#	#	33,4 [29,6-37,6]
Non-possession d'un document médical	70,3 [66,6-73,7]	71,8 [66,8-76,3]	68,3 [62,7-73,4]	98,6 [90,9-99,8]	93,7 [88,7-96,5]	66,6 [62,4-70,4]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 97a. Usagers de cannabis à des fins médicales¹ ayant actuellement accès au cannabis grâce au programme de Santé Canada, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Accès grâce au programme de Santé Canada	58,8 [51,4-65,8]	56,9 [46,8-66,5]	61,1 [50,4-70,8]	#	#	59,2 [51,7-66,3]
Pas d'accès grâce au programme de Santé Canada	41,2 [34,2-48,6]	43,1 [33,5-53,2]	38,9 [29,2-49,6]	#	#	40,8 [33,7-48,3]

Tableau 97b. Usagers de cannabis à des fins médicales¹ couverts par une assurance pour la consommation de cannabis, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Oui, entièrement couvert	4,3* [3,0-6,2]	#	#	#	#	4,5↑* [3,0-6,7]
Oui, partiellement couvert	5,0* [3,5-7,1]	#	#	#	#	#
Non	90,7 [88,1-92,8]	89,8 [86,0-92,6]	91,9 [88,1-94,5]	91,2 [77,9-96,8]	93,4 [87,8-96,6]	90,4 [87,4-92,7]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 98. Fréquence de la consommation de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-24 (%)	25+ (%)
Moins de 1 jour par mois	14,0 [11,7-16,7]	15,1 [12,0-18,8]	12,5↑ [9,2-16,8]	14,5↓* [10,1-20,4]	13,9 [11,4-17,0]
1 jour par mois	5,9 [4,3-8,1]	7,0* [4,8-10,2]	#	#	5,8* [4,0-8,2]
2 à 3 jours par mois	16,1 [13,5-19,0]	18,8 [15,2-23,1]	12,3 [9,2-16,4]	18,7 [13,6-25,2]	15,7 [12,9-19,0]
1 ou 2 jours par semaine	12,6 [10,3-15,4]	10,8 [8,0-14,4]	15,0 [11,4-19,6]	17,7 [12,9-23,7]	11,9 [9,4-14,9]
3 ou 4 jours par semaine	8,9 [6,8-11,5]	10,0* [7,1-13,8]	7,4* [5,0-10,9]	#	9,4 [7,1-12,3]
5 ou 6 jours par semaine	7,9 [6,2-10,2]	#	10,5↓* [7,5-14,5]	#	7,8 [5,8-10,3]
Tous les jours	34,5↑ [31,0-38,3]	32,2 [27,6-37,2]	37,7 [32,4-43,4]	27,5↓ [21,4-34,5]	35,6 [31,6-39,7]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 99. Effets de la consommation du cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, usagers de cannabis à des fins médicales¹ au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2020

	Très bénéfique (%)	Plutôt bénéfique (%)	Aucun effet (%)	Plutôt nuisible (%)	Très nuisible (%)
Amitié ou vie sociale	19,8 [17,0-22,9]	22,0 [19,0-25,3]	56,4 [52,7-60,1]	#	#
Santé physique	34,0 [30,5-37,7]	40,0 [36,3-43,9]	23,1 [20,1-26,4]	2,9* [2,0-4,2]	#
Santé mentale	38,2 [34,7-41,9]	33,2 [29,7-36,9]	26,4 [23,0-30,0]	#	#
Vie de famille ou mariage	25,2 [22,1-28,6]	21,6 [18,7-24,9]	51,3 [47,5-55,1]	#	#
Rendement au travail ou à l'école	16,5↓ [13,9-19,4]	20,4 [17,5-23,7]	59,8 [56,0-63,5]	#	#
Qualité de vie	42,8 [39,1-46,5]	41,9 [38,2-45,7]	14,1 [11,6-16,9]	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 100. Diminution de la prise d'autres médicaments à la suite de la consommation de cannabis à des fins médicales¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Oui	57,1 [53,2-60,8]	55,7 [50,6-60,7]	58,9 [53,2-64,3]	#	55,8 [47,6-63,6]	57,0 [52,7-61,1]
Non	22,8 [19,7-26,3]	24,7 [20,5-29,4]	20,3 [16,0-25,4]	#	21,5↓ [15,6-28,9]	23,5↑ [20,1-27,4]
Sans objet	20,1 [17,3-23,3]	19,6 [15,9-24,0]	20,8 [16,7-25,6]	#	22,7 [16,7-30,2]	19,5↓ [16,4-23,0]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 101. Changements concernant la prise d'autres substances en raison de la consommation de cannabis à des fins médicales¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Alcool						
Augmentation de la consommation	#	#	#	#	#	#
Diminution de la consommation	23,6 [20,7-26,8]	17,5↓ [14,2-21,3]	32,0 [27,0-37,4]	#	40,2 [32,6-48,4]	21,0 [17,9-24,5]
Consommation identique	53,0 [49,2-56,7]	56,4 [51,3-61,3]	48,4 [42,7-54,1]	#	50,2 [42,1-58,2]	53,7 [49,5-57,9]
Je ne consomme pas cette substance	23,2 [20,1-26,6]	25,9 [21,6-30,6]	19,6 [15,4-24,7]	#	#	25,1 [21,5-28,9]
Tabac ou cigarette électronique avec nicotine						
Augmentation de la consommation	#	#	#	#	#	#
Diminution de la consommation	7,6 [5,9-9,6]	6,5↑* [4,6-9,1]	9,0* [6,4-12,5]	#	#	6,5↑ [4,8-8,8]
Consommation identique	22,2 [19,4-25,4]	17,3 [14,1-21,0]	29,0 [24,2-34,3]	#	34,5↑ [27,3-42,6]	20,4 [17,3-23,8]
Je ne consomme pas cette substance	68,7 [65,2-71,9]	74,6 [70,3-78,4]	60,7 [55,1-66,0]	#	50,5↓ [42,4-58,5]	72,0 [68,2-75,4]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 102a. Fournisseur habituel de cannabis à des fins médicales¹ au cours des 12 derniers mois, usagers de cannabis à des fins médicales² au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-24 (%)	25+ (%)
Cultivé par moi/pour moi	16,2 [13,5-19,4]	12,8 [9,6-17,0]	20,8 [16,3-26,1]	#	17,5↓ [14,4-21,1]
Point de vente autorisé	44,3 [40,5-48,1]	44,9 [39,8-50,1]	43,4 [37,8-49,1]	52,1 [44,7-59,5]	43,1 [39,0-47,4]
Source en ligne autorisée (producteur détenant une licence de Santé Canada, détaillant sous réglementation provinciale)	41,5↓ [37,7-45,3]	42,7 [37,6-48,0]	39,8 [34,3-45,5]	33,8 [27,1-41,3]	42,6 [38,4-46,9]
Point de vente illégal	6,4 [4,9-8,4]	5,5↑* [3,8-8,0]	7,7* [5,2-11,2]	#	5,9 [4,2-8,0]
Source en ligne illégale	7,9 [6,2-10,1]	5,3* [3,6-7,9]	11,4 [8,3-15,4]	17,3 [12,4-23,5]	6,5↑ [4,8-8,9]
Partage dans un groupe d'amis	4,3 [3,2-5,9]	4,3* [2,9-6,3]	#	#	#
Membre de la famille	9,5↓ [7,5-11,9]	11,6 [8,7-15,2]	#	#	9,2 [7,0-11,9]
Ami	16,9 [14,3-19,9]	15,5↑ [12,4-19,2]	18,8 [14,6-23,7]	32,0 [25,3-39,5]	14,7 [12,0-17,9]
Connaissance	4,3* [3,0-6,2]	#	#	#	4,3* [2,8-6,4]
Vendeur	5,7 [4,3-7,6]	#	6,7* [4,6-9,9]	#	4,2* [2,8-6,2]

Tableau 102b. Intention de se procurer du cannabis auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada maintenant qu'il est légal de vendre au détail et en ligne du cannabis à des fins non médicales, usagers de cannabis à des fins médicales³ au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-24 (%)	25+ (%)
Oui	75,6 [67,4-82,2]	72,6 [61,4-81,5]	80,0 [67,8-88,3]	#	75,6 [67,1-82,4]
Non	#	#	#	#	#
Ne sais pas	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

³ Parmi les usagers de cannabis à des fins médicales, qui se sont procuré du cannabis auprès d'un producteur autorisé de Santé Canada.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 103a. Fréquence d'obtention de cannabis à des fins médicales auprès d'une source légale ou autorisée¹, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Toujours	42,3 [38,6-46,1]	44,3 [39,3-49,4]	39,6 [34,2-45,3]	#	38,6 [31,1-46,7]	43,4 [39,2-47,6]
Presque toujours	11,2 [9,2-13,7]	10,7 [8,1-14,0]	12,0 [8,9-15,9]	#	#	10,6 [8,4-13,3]
Parfois	11,4 [9,3-14,0]	11,5↓ [8,7-14,9]	11,4 [8,4-15,4]	#	#	10,5↓ [8,2-13,3]
Rarement	15,9 [13,2-19,0]	15,6 [12,2-19,8]	16,2 [12,4-21,0]	#	#	16,1 [13,2-19,5]
Jamais	19,1 [16,2-22,4]	17,9 [14,1-22,4]	20,8 [16,5-25,9]	#	#	19,5↓ [16,2-23,2]

Tableau 103b. Sources légales ou autorisées^{1,2} au cours des 12 derniers mois, usagers ayant obtenu du cannabis à des fins médicales d'une source légale au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Détaillant autorisé/réglementé par la province (p. ex., point de vente)	64,7 [60,6-68,7]	63,5↓ [57,9-68,7]	66,5↑ [60,2-72,3]	#	70,5↓ [61,6-78,0]	64,1 [59,4-68,5]
Détaillant en ligne autorisé/réglementé par la province (p. ex., site Web provincial)	41,7 [37,7-45,9]	41,9 [36,5-47,5]	41,5↓ [35,5-47,8]	#	30,9 [23,4-39,6]	42,9 [38,4-47,6]
Autre personne partageant le cannabis avec moi	16,9 [14,1-20,2]	18,1 [14,4-22,5]	15,3 [11,3-20,4]	#	31,6 [23,8-40,5]	14,0 [11,1-17,5]
J'ai cultivé mon propre cannabis	9,6 [7,4-12,5]	#	13,8* [9,8-19,0]	#	#	10,4 [7,8-13,6]
Autre	#	#	#	#	#	#

--	--	--	--	--	--	--

Tableau 103c. Paiement à la personne ayant partagé du cannabis, usagers ayant reçu du cannabis à des fins médicales d'une personne au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Paiement à la personne ayant partagé du cannabis	33,0 [24,4-42,9]	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

² Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 104a. Fréquence d'obtention de cannabis à des fins médicales auprès d'une source illégale ou non autorisée¹ au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Toujours	12,7 [9,8-16,4]	12,4 [8,6-17,6]	13,1* [9,0-18,7]	#	#	11,4 [8,3-15,5]
Presque toujours	14,1 [11,1-17,7]	12,5↑ [9,0-17,2]	15,9* [11,3-21,9]	#	#	12,0 [8,9-16,0]
Parfois	14,0 [11,0-17,8]	12,5↑* [8,7-17,6]	15,9* [11,3-21,9]	#	#	13,8 [10,4-18,1]
Rarement	15,3 [12,2-19,1]	15,5↓ [11,3-20,8]	15,1* [10,7-20,9]	#	#	15,0 [11,5-19,3]
Jamais	43,8 [38,8-49,0]	47,0 [40,1-54,0]	40,0 [33,0-47,5]	#	#	47,8 [42,1-53,5]

Tableau 104b. Sources illégales ou non autorisées^{1,2} au cours des 12 derniers mois, usagers ayant obtenu du cannabis à des fins médicales d'une source illégale au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada,

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Détaillant non autorisé/non réglementé (p. ex., point de vente)	23,5↓ [18,4-29,4]	26,7 [19,5-35,2]	#	#	#	26,1 [20,0-33,2]
Détaillant en ligne non autorisé/non réglementé	30,5↓ [24,9-36,7]	25,9 [18,9-34,5]	35,3 [27,1-44,5]	#	#	30,7 [24,1-38,1]
Auprès d'une personne que je connais (p. ex., un ami, un membre de la famille, une connaissance)	54,2 [47,8-60,5]	53,2 [44,3-61,9]	55,2 [46,1-64,0]	#	59,4 [47,7-70,1]	52,7 [45,1-60,2]
Auprès d'un vendeur	21,7 [17,0-27,3]	19,2* [13,3-26,9]	24,4 [17,7-32,8]	#	#	17,2* [12,2-23,6]
Autre	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales et qui ont sélectionné une autre réponse.

² Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

ise que celle d'avoir toujours obtenu du cannabis d'une source légale.

Tableau 105. Méthodes de consommation du cannabis¹ au cours des 12 derniers mois, usagers de cannabis à des fins médicales² au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Fumé (p. ex., un joint, une pipe à eau, une pipe ou un cigare)	50,4 [46,6-54,2]	43,3 [38,4-48,3]	60,0 [54,2-65,5]	81,3 [66,4-90,6]	78,5↑ [71,2-84,4]	46,0 [41,9-50,2]
Consommé dans un produit alimentaire (p. ex., brownies, gâteaux, biscuits ou bonbon)	44,7 [41,0-48,5]	41,2 [36,4-46,2]	49,4 [43,7-55,0]	#	47,3 [39,3-55,4]	43,8 [39,6-48,0]
Bu (p. ex., thé, boisson gazeuse, alcool, autres boissons)	11,5↑ [9,3-14,2]	7,6* [5,4-10,6]	16,9 [13,0-21,8]	#	#	11,9 [9,5-14,9]
Vaporisé avec un vaporisateur (non portable)	12,7 [10,5-15,4]	8,3 [6,0-11,4]	18,8 [14,7-23,6]	#	#	12,7 [10,2-15,7]
Vaporisé avec un vaporisateur stylo ou une cigarette électronique (portable)	20,7 [17,8-23,8]	17,4 [14,0-21,5]	25,0 [20,5-30,2]	#	25,1 [18,8-32,5]	20,0 [16,9-23,5]
Inhalé (p. ex., y compris couteau/clou chaud)	5,2 [3,9-6,9]	#	8,7* [6,3-12,0]	#	#	4,2* [2,9-6,0]
Appliqué sur la peau (p. ex., produit topique)	17,9 [15,1-21,2]	19,9 [15,9-24,5]	15,4 [11,6-20,0]	#	#	19,1 [15,9-22,8]
Par la bouche ou sous la langue	21,9 [18,9-25,3]	29,5↓ [25,0-34,4]	11,7 [8,5-15,8]	#	#	23,9 [20,4-27,7]
Autre méthode utilisée	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 106a. Types de produits de cannabis consommés par vapotage¹, usagers² ayant utilisé un vaporisateur et/ou un vaporisateur stylo à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Fleurs/feuilles séchées	71,5↓ [64,8-77,3]	68,9 [58,7-77,6]	73,6 [64,6-80,9]	#	66,7 [52,7-78,3]	72,9 [65,4-79,3]
Huile/extrait de cannabis liquide (p. ex., huile de cannabis au butane, liquide de vapotage avec THC/CBD, etc.)	53,8 [46,9-60,6]	55,9 [45,5-65,7]	52,1 [42,8-61,2]	#	58,2 [44,3-70,9]	51,7 [43,9-59,4]
Extrait de cannabis solide (p. ex., «shatter», hachisch, etc.)	25,3 [20,0-31,6]	#	32,3 [24,4-41,4]	#	#	23,3 [17,6-30,3]
Autre produit à base de cannabis	#	#	#	#	#	#

Tableau 106b. Types de dispositifs de vapotage utilisés, usagers ayant utilisé un vaporisateur stylo ou une cigarette électronique à des fins médicales au cours des 12 derniers mois², selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Dispositif de vapotage jetable (p. ex., vaporisateur stylo à usage unique)	#	#	#	#	#	#
Dispositif de vapotage non jetable (p. ex., vaporisateur stylo avec des cartouches/capsules/ réservoirs rechargeables/ remplaçables)	76,6 [68,9-82,9]	78,6 [67,8-86,5]	74,8 [63,5-83,5]	#	79,2 [63,7-89,2]	78,9 [70,1-85,6]
Dispositifs jetables et non jetables	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 107. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées lorsqu'il s'agit de choisir des produits de cannabis à des fins médicales¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-24 (%)	25+ (%)
Plus de THC, moins de CBD	21,4 [18,5-24,6]	13,2 [10,2-16,9]	32,5↑ [27,4-38,0]	25,8 [20,0-32,7]	20,7 [17,6-24,3]
Plus de CBD, moins de THC	26,3 [23,2-29,8]	29,7 [25,4-34,5]	21,8 [17,4-26,9]	24,4 [18,8-31,1]	26,6 [23,1-30,5]
Proportions égales de THC et de CBD	12,2 [9,9-14,8]	11,5↑ [8,8-15,0]	13,0 [9,7-17,3]	#	12,0 [9,5-14,9]
THC seulement	#	#	#	#	#
CBD seulement	15,5↓ [12,8-18,7]	18,6 [14,7-23,2]	11,3* [8,1-15,6]	#	16,5↓ [13,4-20,1]
J'utilise habituellement des produits contenant les différentes concentrations indiquées ci-dessus	13,7 [11,4-16,4]	14,2 [11,1-18,0]	13,0 [9,7-17,1]	18,2 [13,1-24,7]	13,0 [10,5-16,1]
Autre	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	6,6 [4,9-9,0]	8,2* [5,7-11,7]	#	#	6,6* [4,7-9,2]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 108. Produits de cannabis consommés¹ au cours des 12 derniers mois, usagers de cannabis à des fins médicales² au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Flours/feuilles séchées	53,9 [50,1-57,7]	46,8 [41,9-51,9]	63,5↑ [57,7-68,9]	75,3 [59,7-86,3]	79,0 [71,6-84,8]	50,3 [46,1-54,5]
Hachisch/skuff	9,5↓ [7,6-11,8]	5,4* [3,7-7,6]	15,0 [11,5-19,5]	#	#	8,9 [6,9-11,5]
Huile de cannabis pour administration orale (p. ex., dans un compte-gouttes/une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules/capsules)	48,2 [44,4-52,0]	52,4 [47,3-57,4]	42,5↑ [37,0-48,2]	#	28,0 [21,5-35,6]	51,2 [47,0-55,4]
Vaporisateurs stylos/cartouches de cannabis	13,6 [11,3-16,2]	12,1 [9,2-15,6]	15,6 [12,1-19,9]	#	#	12,7 [10,2-15,7]
Concentrés/extraits de cannabis (p. ex., «shatter»/«budder», etc.)	9,6 [7,7-11,9]	6,1* [4,2-8,9]	14,3 [10,9-18,5]	#	#	8,8 [6,8-11,4]
Produits comestibles à base de cannabis (p. ex., biscuits, bonbons)	32,6 [29,2-36,1]	32,0 [27,6-36,7]	33,4 [28,3-38,9]	#	39,0 [31,4-47,2]	31,1 [27,4-35,1]
Boissons à base de cannabis (p. ex., cola, thé, café)	4,3* [3,1-6,0]	#	#	#	#	4,4* [3,1-6,3]
Agents topiques (p. ex., lotion, onguent, crèmes appliquées sur la peau)	17,7 [14,9-20,9]	19,8 [15,9-24,4]	14,8 [11,1-19,4]	#	#	18,9 [15,8-22,6]
Autre	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 109. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les fleurs et les feuilles séchées à des fins médicales¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
THC						
Forte (plus de 20 % de THC)	36,0 [31,5-40,7]	26,2 [20,8-32,4]	45,8 [39,1-52,6]	#	28,2 [20,8-36,9]	36,4 [31,3-42,0]
Modérée (de 10 % à 20 % de THC)	35,4 [30,9-40,1]	38,8 [32,4-45,6]	32,0 [25,9-38,6]	#	33,6 [25,5-42,7]	35,9 [30,7-41,4]
Faible (moins de 10 % de THC)	13,6 [10,7-17,0]	15,6 [11,5-20,7]	11,6* [8,0-16,6]	#	#	12,6 [9,4-16,7]
Aucune (0 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	13,4 [10,1-17,5]	17,3* [12,2-23,9]	#	#	#	13,7 [10,0-18,6]
CBD						
Forte (plus de 20 % de CBD)	25,5↓ [21,6-29,8]	27,5↑ [22,0-33,8]	23,5↓ [18,3-29,6]	#	31,0 [23,2-40,0]	24,3 [19,9-29,3]
Modérée (de 10 % à 20 % de CBD)	35,1 [30,6-39,9]	37,7 [31,4-44,5]	32,5↑ [26,4-39,2]	#	31,0 [23,3-39,9]	36,1 [30,9-41,6]
Faible (moins de 10 % de CBD)	17,8 [14,5-21,7]	12,0* [8,5-16,8]	23,6 [18,3-29,8]	#	#	18,4 [14,6-23,0]
Aucune (0 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	17,5↓ [13,9-21,8]	20,0 [14,6-26,7]	15,0* [10,6-20,8]	#	#	17,4 [13,2-22,5]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Répondants ayant consommé des fleurs ou des feuilles séchées de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 110. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans le haschisch et le skuff à des fins médicales¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
THC						
Forte (plus de 20 % de THC)	55,9 [44,3-67,0]	#	59,7 [44,9-73,0]	#	#	57,9 [44,6-70,2]
Modérée (de 10 % à 20 % de THC)	32,0* [22,1-43,8]	#	#	#	#	#
Faible (moins de 10 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Aucune (0 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	#	#	#	#	#	#
CBD						
Forte (plus de 20 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Modérée (de 10 % à 20 % de CBD)	30,4* [20,9-41,9]	#	#	#	#	#
Faible (moins de 10 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Aucune (0 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Répondants ayant consommé du haschisch ou du skuff à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 111. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans l'huile de cannabis pour administration orale à des fins médicales¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
THC						
Forte (plus de 20 % de THC)	12,6 [9,6-16,4]	9,2* [6,1-13,7]	18,2* [12,6-25,6]	#	#	12,3 [9,2-16,4]
Modérée (de 10 % à 20 % de THC)	18,0 [14,2-22,7]	17,4 [12,7-23,4]	#	#	#	18,0 [13,9-22,9]
Faible (moins de 10 % de THC)	36,0 [30,8-41,6]	38,0 [31,3-45,2]	32,8 [24,9-41,8]	#	#	36,2 [30,7-42,2]
Aucune (0 % de THC)	20,4 [16,2-25,3]	19,5↑ [14,4-25,9]	21,8* [15,3-30,1]	#	#	20,2 [15,8-25,5]
Incertain/Je ne sais pas	12,9 [9,4-17,5]	15,8* [11,0-22,3]	#	#	#	13,2 [9,5-18,1]
CBD						
Forte (plus de 20 % de CBD)	43,1 [37,6-48,7]	44,3 [37,3-51,5]	41,2 [32,8-50,0]	#	#	42,5↓ [36,7-48,4]
Modérée (de 10 % à 20 % de CBD)	26,5↓ [21,9-31,6]	24,6 [19,2-31,0]	29,6 [22,1-38,3]	#	#	26,7 [21,9-32,1]
Faible (moins de 10 % de CBD)	12,5↑ [9,2-16,8]	12,8* [8,7-18,5]	#	#	#	12,8 [9,3-17,4]
Aucune (0 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	13,0 [9,5-17,6]	15,3* [10,5-21,7]	#	#	#	13,2 [9,5-18,2]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Répondants ayant consommé de l'huile de cannabis pour administration orale à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 112. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les vaporisateurs stylos et les cartouches de cannabis à des fins médicales¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
THC						
Forte (plus de 20 % de THC)	42,1 [32,9-51,8]	#	50,7 [37,4-63,9]	#	#	39,9 [29,6-51,2]
Modérée (de 10 % à 20 % de THC)	31,1 [22,7-41,0]	#	#	#	#	32,5↓* [22,8-43,9]
Faible (moins de 10 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Aucune (0 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	#	#	#	#	#	#
CBD						
Forte (plus de 20 % de CBD)	31,0 [22,7-40,8]	#	#	#	#	#
Modérée (de 10 % à 20 % de CBD)	35,7 [27,0-45,6]	#	#	#	#	37,1 [27,1-48,5]
Faible (moins de 10 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Aucune (0 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Répondants ayant utilisé des vaporisateurs stylos ou des cartouches de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 113. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les concentrés et les extraits de cannabis à des fins médicales¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
THC						
Forte (plus de 20 % de THC)	55,1 [43,4-66,2]	#	69,0 [54,5-80,5]	#	#	56,7 [43,0-69,4]
Modérée (de 10 % à 20 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Faible (moins de 10 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Aucune (0 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	#	#	#	#	#	#
CBD						
Forte (plus de 20 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Modérée (de 10 % à 20 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Faible (moins de 10 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Aucune (0 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Répondants ayant consommé des concentrés ou des extraits de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 114. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les produits comestibles à base de cannabis à des fins médicales¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
THC						
Forte (plus de 10 mg de THC)	30,9 [25,4-36,9]	21,6 [15,8-28,7]	42,9 [33,6-52,7]	#	#	29,4 [23,3-36,3]
Modérée (de 2,5 mg à 10 mg de THC)	31,9 [26,3-38,2]	32,5↑ [25,3-40,7]	31,2 [22,7-41,1]	#	#	32,4 [25,9-39,6]
Faible (moins de 2,5 mg de THC)	11,4* [8,0-16,0]	#	#	#	#	12,1* [8,3-17,4]
Aucune (0 mg de THC)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	20,1 [15,4-25,9]	24,8 [18,0-33,1]	#	#	#	20,1 [14,8-26,7]
CBD						
Forte (plus de 10 mg de CBD)	26,1 [21,0-32,1]	24,0 [17,9-31,5]	28,9 [20,8-38,7]	#	#	25,6 [19,8-32,4]
Modérée (de 2,5 mg à 10 mg de CBD)	32,1 [26,5-38,3]	34,9 [27,5-43,2]	28,4 [20,5-38,0]	#	#	32,7 [26,3-39,8]
Faible (moins de 2,5 mg de CBD)	12,0* [8,5-16,6]	#	#	#	#	11,4* [7,7-16,8]
Aucune (0 mg de CBD)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	23,1 [18,0-29,0]	25,6 [18,8-33,8]	#	#	#	23,3 [17,6-30,2]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Répondants ayant consommé des produits comestibles à base de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 115. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les boissons à base de cannabis à des fins médicales¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
THC						
Forte (plus de 20 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Modérée (de 10 % à 20 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Faible (moins de 10 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Aucune (0 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	#	#	#	#	#	#
CBD						
Forte (plus de 20 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Modérée (de 10 % à 20 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Faible (moins de 10 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Aucune (0 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Répondants ayant consommé des boissons à base de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 116. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les produits topiques à base de cannabis à des fins médicales¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
THC						
Forte (plus de 20 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Modérée (de 10 % à 20 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Faible (moins de 10 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Aucune (0 % de THC)	19,9* [13,6-28,1]	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	#	#	#	#	#	#
CBD						
Forte (plus de 20 % de CBD)	45,5↓ [36,2-55,1]	35,5↑* [24,9-47,8]	63,5↑ [48,3-76,4]	#	#	47,1 [37,3-57,0]
Modérée (de 10 % à 20 % de CBD)	28,8 [20,8-38,4]	34,9* [24,3-47,2]	#	#	#	29,4 [21,0-39,4]
Faible (moins de 10 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Aucune (0 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Répondants ayant utilisé des produits topiques à base de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 117. Concentrations en THC et en CBD habituellement recherchées dans les autres produits de cannabis à des fins médicales¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
THC						
Forte (plus de 20 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Modérée (de 10 % à 20 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Faible (moins de 10 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Aucune (0 % de THC)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	#	#	#	#	#	#
CBD						
Forte (plus de 20 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Modérée (de 10 % à 20 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Faible (moins de 10 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Aucune (0 % de CBD)	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Répondants ayant utilisé d'autres produits de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 118. Fréquence de la consommation des produits de cannabis¹ au cours des 12 derniers mois, usagers de cannabis à des fins médicales² au cours des 12 derniers mois, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2020

	Moins de 1 jour par mois (%)	Chaque mois (%)	Chaque semaine (%)	Tous les jours ou presque (%)
Fleurs/feuilles séchées	14,9 [11,8-18,6]	17,9 [14,6-21,8]	18,4 [14,9-22,4]	48,9 [44,0-53,7]
Hachisch/skuff	#	42,8 [31,7-54,7]	#	#
Huile de cannabis pour administration orale (p. ex., dans un compte-gouttes/une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules/capsules)	18,9 [15,0-23,7]	22,7 [18,4-27,7]	21,6 [17,3-26,5]	36,8 [31,5-42,5]
Vaporisateurs stylos/cartouches de cannabis	#	38,3 [29,2-48,4]	24,4* [16,8-34,1]	#
Concentrés/extraits de cannabis (p. ex., «shatter»/«budder», etc.)	#	39,4 [28,3-51,8]	#	#
Produits comestibles à base de cannabis (p. ex., biscuits, bonbons)	30,3 [24,9-36,4]	39,3 [33,3-45,7]	19,8 [15,1-25,5]	#
Boissons à base de cannabis (p. ex., cola, thé, café)	#	#	#	#
Agents topiques (p. ex., lotion, onguent, crèmes appliquées sur la peau)	#	26,5↑ [18,9-35,8]	35,3 [26,7-45,0]	#
Autres (p. ex., graines, teinture de cannabis, suppositoire, etc.)	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 119. Quantité moyenne consommée lors qu'une journée habituelle par type de produit¹ au cours des 12 derniers mois, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois², selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total	Femmes	Hommes	16-24	25+
Fleurs/feuilles séchées – (grammes)	1,8 [1,4-2,1]	1,5↓ [1,0-1,9]	2,1 [1,6-2,6]	1,2 [0,9-1,4]	1,9 [1,5-2,4]
Hachisch/skuff – (grammes)	0,6 [0,4-0,8]	0,4* [0,2-0,7]	0,7* [0,5-1,0]	#	0,7 [0,5-0,9]
Huile de cannabis pour administration orale (p. ex., dans un compte-gouttes/une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules/capsules) – (millilitres)	1,4 [1,2-1,6]	1,4 [1,2-1,7]	1,3 [1,0-1,6]	1,2 [0,9-1,6]	1,4 [1,2-1,6]
Vaporisateurs stylos/cartouches de cannabis – (cartouches)	0,1 [0,1-0,2]	0,1* [0,1-0,1]	0,2* [0,1-0,2]	0,2* [0,1-0,2]	0,1* [0,1-0,1]
Concentrés/extraits de cannabis (p. ex., «shatter»/«budder», etc.) – (grammes)	0,4* [0,2-0,6]	0,5↓* [0,2-0,8]	0,4* [0,2-0,5]	0,2* [0,1-0,3]	0,5↓* [0,3-0,7]
Produits comestibles à base de cannabis (p. ex., biscuits, bonbons) – (portions)	1,3 [1,2-1,5]	1,4 [1,1-1,6]	1,3 [1,1-1,5]	1,4 [1,2-1,6]	1,3 [1,1-1,5]
Boissons à base de cannabis (p. ex., cola, thé, café) – (millilitres)	349,8 [256,1-443,6]	#	#	#	336,5↑ [240,8-432,2]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 120. Proportion d'usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹ déclarant avoir consommé du cannabis à des fins médicales au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Consommation à des fins médicales au cours des 30 derniers jours	74,2 [70,7-77,5]	72,6 [67,7-77,0]	76,4 [71,1-81,0]	74,0 [58,4-85,3]	71,6 [63,8-78,2]	74,5↑ [70,6-78,1]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 121a. Somme dépensée pour acheter du cannabis à des fins médicales au cours d'un mois typique, usagers de cannabis à des fins médicales¹ au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (\$)	Femmes (\$)	Hommes (\$)	16-19 (\$)	20-24 (\$)	25+ (\$)
Somme médiane généralement dépensée par mois (dollars)	47,00 [40,04-53,96]	40,00 [31,08-48,92]	50,00 [34,34-65,66]	50,00 [7,92-95,08]	40,00* [19,46-60,54]	50,00 [41,69-58,31]
Somme moyenne généralement dépensée par mois (dollars)	92,59 [80,71-104,46]	79,27 [66,05-92,49]	109,51 [88,84-130,18]	83,38* [53,62-113,13]	78,02 [58,72-97,32]	94,34 [81,04-107,64]

Remarque : Les répondant ayant déclaré avoir dépensé plus de 1 000 dollars n'ont pas pu être inclus dans le calcul de la moyenne, car il a été impossible de déterminer le montant précis en dollars.

Tableau 121b. Somme dépensée pour acheter du cannabis à des fins médicales auprès d'une source légale au cours

	Total (\$)	Femmes (\$)	Hommes (\$)	16-19 (\$)	20-24 (\$)	25+ (\$)
Somme moyenne dépensée au cours des 30 derniers jours (dollars)	75,40 [63,00-87,80]	69,34 [55,79-82,90]	82,39 [60,82-103,96]	#	42,09* [26,55-57,63]	79,39 [65,54-93,23]

Remarque : Les répondant ayant déclaré avoir dépensé plus de 1 000 dollars n'ont pas pu être inclus dans le calcul de la moyenne, car il a été impossible de déterminer le montant précis en dollars.

Tableau 121c. Somme dépensée pour acheter du cannabis à des fins médicales auprès d'une source illégale au cours

	Total (\$)	Femmes (\$)	Hommes (\$)	16-19 (\$)	20-24 (\$)	25+ (\$)
Somme moyenne dépensée au cours des 30 derniers jours (dollars)	41,82 [29,38-54,26]	26,96 [18,38-35,54]	60,01* [34,86-85,15]	#	45,92* [25,42-66,41]	41,00* [27,13-54,87]

Remarque : Les répondant ayant déclaré avoir dépensé plus de 1 000 dollars n'ont pas pu être inclus dans le calcul de la moyenne, car il a été impossible de déterminer le montant précis en dollars.

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

² Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 30 derniers jours, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 122. Produits de cannabis achetés ou reçus¹ au cours des 30 derniers jours, usagers de cannabis à des fins médicales² au cours des 30 derniers jours, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-24 (%)	25+ (%)
Fleurs/feuilles séchées	52,6 [48,2-56,9]	45,6 [39,9-51,5]	61,5↓ [55,0-67,7]	75,1 [66,9-81,7]	49,3 [44,5-54,1]
Hachisch/skuff	5,5↑* [3,9-7,8]	#	#	#	#
Huile de cannabis pour administration orale (p. ex., dans un compte-gouttes/une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules/capsules)	38,6 [34,4-43,0]	43,5↑ [37,7-49,5]	32,3 [26,5-38,7]	#	41,6 [36,9-46,5]
Vaporisateurs stylos/cartouches de cannabis	10,2 [7,9-13,1]	10,0* [7,0-14,1]	10,5↓* [7,3-14,8]	#	9,5↓ [7,0-12,6]
Concentrés/extraits de cannabis (p. ex., «shatter»/«budder», etc.)	6,0 [4,3-8,2]	#	#	#	5,5↓* [3,7-8,0]
Produits comestibles à base de cannabis (p. ex., biscuits, bonbons)	22,5↓ [19,1-26,3]	22,2 [17,8-27,3]	22,8 [17,8-28,8]	#	22,7 [19,0-26,9]
Boissons à base de cannabis (p. ex., cola, thé, café)	#	#	#	#	#
Agents topiques (p. ex., lotion, onguent, crèmes appliquées sur la peau)	9,0 [6,6-12,1]	#	#	#	9,4* [6,8-13,0]
Autres (p. ex., graines, teinture de cannabis, suppositoire, etc.)	9,9 [7,5-13,1]	10,8* [7,5-15,4]	#	#	10,4 [7,7-13,9]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 30 derniers jours, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 123. Fréquence d'obtention de produits de cannabis au cours des 30 derniers jours, usagers de cannabis à des fins médicales¹ au cours des 30 derniers jours, âgés de 16 ans et plus, Canada, 2020

	Une fois (%)	Deux ou trois fois (%)	Quatre fois ou plus (%)
Fleurs/feuilles séchées	56,7 [51,1-62,2]	30,5↓ [25,5-35,9]	12,8 [9,6-16,9]
Hachisch/skuff	#	#	#
Huile de cannabis pour administration orale (p. ex., dans un compte-gouttes/une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules/capsules)	81,5↑ [75,2-86,5]	14,0* [9,6-19,8]	#
Vaporisateurs stylos/cartouches de cannabis	76,8 [63,5-86,3]	#	#
Concentrés/extraits de cannabis (p. ex., «shatter»/«budder», etc.)	#	#	#
Produits comestibles à base de cannabis (p. ex., biscuits, bonbons)	67,0 [57,9-74,9]	23,6 [16,7-32,1]	#
Boissons à base de cannabis (p. ex., cola, thé, café)	#	#	#
Agents topiques (p. ex., lotion, onguent, crèmes appliquées sur la peau)	82,8 [66,9-92,0]	#	#
Autres (p. ex., graines, teinture de cannabis, suppositoire, etc.)	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 30 derniers jours, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 124. Quantité moyenne de cannabis acheté ou reçu par type de produit¹ au cours des 30 derniers jours, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 30 derniers jours², selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total	Femmes	Hommes	16-24	25+
Fleurs/feuilles séchées³ – (grammes)	25,2* [14,6-35,9]	#	22,9 [17,6-28,2]	15,9 [11,5-20,3]	27,5↓* [14,3-40,6]
Hachisch/skuff – (grammes)	#	#	#	#	#
Huile de cannabis pour administration orale (p. ex., dans un compte-gouttes/une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules/capsules)⁴ – (millilitres)	25,3 [21,2-29,3]	25,8 [20,3-31,3]	24,5↓ [18,7-30,2]	#	24,6 [20,4-28,9]
Vaporisateurs stylos/cartouches de cannabis – (cartouches)	1,6 [1,3-2,0]	1,5↓ [1,1-1,9]	1,8 [1,2-2,4]	#	1,6 [1,2-2,0]
Concentrés/extraits de cannabis (p. ex., «shatter»/«budder», etc.) – (grammes)	#	#	#	#	#
Produits comestibles à base de cannabis (p. ex., biscuits, bonbons) – (portions)	10,2 [7,8-12,6]	10,6 [7,7-13,5]	9,7* [5,7-13,7]	#	10,5↑ [7,9-13,2]
Boissons à base de cannabis (p. ex., cola, thé, café) – (millilitres)	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 30 derniers jours, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

³ Un joint a été converti en 0,33 gramme.

⁴ Une capsule/gélule molle a été convertie en 0,16 millilitre.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 125. Prix moyen par unité d'achat par type de produit¹ au cours des 30 derniers jours, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 30 derniers jours², selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (\$)	Femmes (\$)	Hommes (\$)	16-24 (\$)	25+ (\$)
Fleurs/feuilles séchées - (par gramme)	13,48* [7,60-19,36]	11,57 [8,41-14,73]	#	8,98 [7,41-10,55]	14,63* [7,31-21,94]
Hachisch/skuff - (par gramme)	#	#	#	#	#
Huile de cannabis pour administration orale (p. ex., dans un compte-gouttes/une seringue, un flacon-vaporisateur ou sous forme de gélules/capsules) – (par millilitre)	14,88* [6,70-23,06]	13,46* [6,92-20,00]	#	#	15,45* [6,88-24,01]
Vaporisateurs stylos/cartouches de cannabis – (par cartouche)	51,06 [45,09-57,03]	#	#	#	#
Concentrés/extraits de cannabis (p. ex., «shatter»/«budder», etc.) – (par gramme)	#	#	#	#	#
Produits comestibles à base de cannabis (p. ex., biscuits, bonbons) – (par portion)	6,69 [5,12-8,25]	6,14* [3,87-8,41]	7,41 [5,53-9,30]	#	6,76 [5,00-8,51]
Boissons à base de cannabis (p. ex., cola, thé, café) – (par millilitre)	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 30 derniers jours, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 126. Opinion – la consommation de cannabis à des fins médicales affecte négativement la conduite automobile, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-24 (%)	25+ (%)
Oui	45,7 [41,9-49,5]	46,0 [41,0-51,1]	45,2 [39,6-50,9]	47,3 [40,1-54,6]	45,4 [41,3-49,6]
Non	20,6 [17,6-23,9]	17,8 [13,9-22,3]	24,3 [19,8-29,6]	17,5↓ [12,6-23,8]	21,0 [17,7-24,8]
Cela dépend	26,8 [23,6-30,3]	28,3 [24,0-33,0]	24,9 [20,3-30,0]	32,5↑ [26,1-39,8]	26,0 [22,5-29,8]
Incertain/Je ne sais pas	6,9 [5,1-9,3]	7,9* [5,5-11,4]	#	#	7,6 [5,5-10,3]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 127. Opinion – temps d’attente requis pour conduire sécuritairement après avoir consommé du cannabis à des fins médicales, usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois¹, selon le sexe et le groupe d’âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-24 (%)	25+ (%)
Immédiatement	7,7 [5,7-10,2]	#	11,5↑* [8,2-16,0]	#	8,5↑ [6,3-11,4]
De 30 à moins de 60 minutes	3,5↓* [2,3-5,2]	#	#	#	#
De 1 à moins de 3 heures	10,6 [8,5-13,2]	8,5↑* [6,1-11,8]	13,4 [10,0-17,8]	#	10,1 [7,8-12,9]
De 3 à moins de 5 heures	18,6 [16,0-21,7]	16,9 [13,6-20,9]	21,0 [16,9-25,8]	22,5↓ [17,1-29,0]	18,1 [15,2-21,4]
De 5 à moins de 7 heures	11,7 [9,4-14,3]	13,1 [10,1-16,9]	9,7* [6,8-13,6]	16,8* [11,9-23,1]	10,9 [8,5-13,8]
De 7 à moins de 8 heures	6,9 [5,2-9,1]	8,0* [5,6-11,3]	#	#	6,2* [4,4-8,7]
8 heures ou plus	14,0 [11,5-16,8]	13,5↓ [10,4-17,3]	14,6 [10,9-19,2]	#	14,8 [12,1-18,0]
Ne sais pas	16,5↓ [13,7-19,7]	22,0 [17,8-26,7]	9,0* [6,2-13,0]	#	17,5↑ [14,4-21,2]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 128a. Conduite d'un véhicule dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis à des fins médicales, usagers de cannabis à des fins médicales¹ au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Conduite dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis	19,6 [16,8-22,8]	11,0 [8,2-14,5]	31,4 [26,4-36,9]	#	19,6 [14,0-26,7]	19,7 [16,6-23,2]
Cela est arrivé il y a combien de temps²						
Dans les 30 derniers jours	45,0 [36,8-53,5]	#	49,3 [39,3-59,3]	#	#	45,5↑ [36,5-54,9]
Dans les 12 derniers mois	32,8 [25,4-41,3]	#	28,4 [20,3-38,2]	#	#	33,4 [25,2-42,7]
Il y a plus de 12 mois	22,1 [15,9-29,8]	#	#	#	#	21,1* [14,5-29,7]
Que contenait le produit de cannabis³						
THC seulement	#	#	#	#	#	#
CBD seulement	#	#	#	#	#	#
Concentration élevée de THC (mais faible concentration de CBD)	36,5↓* [25,4-49,2]	#	#	#	#	#
Concentration élevée de CBD (mais faible concentration de THC)	#	#	#	#	#	#
Proportions égales en THC et en CBD	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	#	#	#	#	#	#

Tableau 128b. Conduite d'un véhicule dans les quatre heures après avoir ingéré un produit de cannabis à des fins médicales, usagers de cannabis à des fins médicales¹ au cours des 12 derniers mois, selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Conduite dans les quatre heures suivant l'ingestion d'un produit de cannabis	15,9 [13,3-18,8]	10,7 [8,0-14,3]	22,7 [18,3-27,8]	#	#	17,1 [14,2-20,4]
Cela est arrivé il y a combien de temps⁴						
Dans les 30 derniers jours	49,0 [39,6-58,5]	#	52,5↓ [40,7-64,1]	#	#	50,7 [40,8-60,6]
Dans les 12 derniers mois	29,3 [21,5-38,5]	#	#	#	#	28,0 [20,1-37,7]
Il y a plus de 12 mois	#	#	#	#	#	#
Que contenait le produit de cannabis⁵						
THC seulement	#	#	#	#	#	#
CBD seulement	#	#	#	#	#	#
Concentration élevée de THC (mais faible concentration de CBD)	#	#	#	#	#	#
Concentration élevée de CBD (mais faible concentration de THC)	#	#	#	#	#	#
Proportions égales en THC et en CBD	#	#	#	#	#	#
Incertain/Je ne sais pas	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Usagers de cannabis à des fins médicales au cours des 12 derniers mois, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

² Parmi les usagers ayant conduit dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis.

³ Parmi les usagers ayant conduit dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis au cours des 30 derniers jours.

⁴ Parmi les usagers ayant conduit dans les quatre heures après avoir ingéré un produit de cannabis.

⁵ Parmi les usagers ayant conduit dans les quatre heures après avoir ingéré un produit de cannabis au cours des 30 derniers jours.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.

Tableau 129. Raisons de conduire un véhicule motorisé après avoir consommé du cannabis à des fins médicales¹, répondants ayant déclaré avoir conduit après avoir consommé du cannabis², selon le sexe et le groupe d'âge, Canada, 2020

	Total (%)	Femmes (%)	Hommes (%)	16-19 (%)	20-24 (%)	25+ (%)
Je ne me sentais pas désorienté/affaibli	81,0 [74,2-86,3]	84,6 [74,1-91,3]	78,6 [69,2-85,7]	#	87,7 [71,0-95,4]	80,3 [72,9-86,1]
Je ne pensais pas que je me ferais prendre par la police/agent d'application de la loi	#	#	#	#	#	#
Je n'avais pas d'autre moyen de transport	#	#	#	#	#	#
Je pensais que je pourrais conduire prudemment	17,1* [12,0-23,7]	#	#	#	#	#
Je n'avais pas à conduire très loin	13,1* [8,9-19,0]	#	#	#	#	#
Autre	#	#	#	#	#	#

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance à 95 %]

Les symboles ↑ et ↓ renvoient à la direction de l'arrondissement des nombres entiers.

¹ Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs choix de réponse.

² Parmi les usagers ayant conduit dans les deux heures après avoir fumé ou vapoté du cannabis ou dans les quatre heures après avoir ingéré du cannabis à des fins médicales, qui ont rempli la section de l'enquête sur la consommation à des fins médicales.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Variabilité d'échantillonnage élevée ou petite taille de l'échantillon – même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête canadienne sur le cannabis, 2020.