




# SURVEILLANCE DE LA MALADIE DE LYME AU CANADA


ÉDITION ANNUELLE PRÉLIMINAIRE 2018

## QUEL EST LE RISQUE ?


- ▶ La **maladie de Lyme** est la maladie à **transmission vectorielle** la plus signalée au Canada
- ▶ Le plus **grand risque** de contracter la maladie de Lyme se situe dans les régions où les populations de tiques porteuses de la bactérie, *Borellia burgdorferi*, se sont établies

## QUI EST LE PLUS À RISQUE ?

- ▶  Les enfants âgés de 5 à 14 ans
- ▶  Adultes âgés de 60 à 74 ans
- ▶  Les personnes ayant une exposition professionnelle et récréative


 Dans les zones avec des tiques à pattes noires

## COMMENT Y FAIRE FACE ?


- ▶ La plupart des cas de la maladie de Lyme peuvent être traités efficacement avec des antibiotiques pendant 2 à 4 semaines, s'ils sont diagnostiqués tôt
- 

## FAITS SAILLANTS


### DÉCLARÉS EN 2018



## DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE DES CAS SIGNALÉS





## SAISONNALITÉ





## RECOMMANDATIONS DE LA SANTÉ PUBLIQUE

### CONSEILS POUR ÉVITER LES PIQÛRES DE TIQUES :

SE PROTÉGER DURANT LES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

-  couvrez la peau exposée
-  utilisez un insectifuge

RÉDUISEZ LES RISQUES ENVIRONNANTS

-  effectuez une vérification complète du corps après chaque activité de plein air
-  retirez les tiques à l'aide d'une pincette propre et à pointe fine