



CAPSULE DES SERVICES DE SANTÉ

Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) Âge, sexe et origine autochtone

COLLECTE DE DONNÉES

Les données issues de la surveillance accrue de 2005 à 2012 dans l'Application Web du Système de surveillance des maladies infectieuses ont été analysées pour trouver les dossiers contenant une preuve de test de dépistage du VIH. Les cas de VIH ont été déterminés par une réaction sérologique positive, un traitement par TAHA pour le VIH, ou une séropositivité autodéclarée. Les dossiers ont été examinés pour assurer la qualité et la cohérence des données. La séropositivité a été recoupée selon le sexe, l'origine autochtone et l'âge. Les données ont été extraites en juin 2016.

ANALYSES ET RÉSULTATS

Cas de VIH

L'Analyse a visé un total de 24 353 dossiers contenant de l'information sur la séropositivité. Parmi ces dossiers, 429 répondaient à la définition d'un cas de VIH (1,76 %). De ce nombre, 365 (85 %) étaient déjà conscients de leur séropositivité à l'admission (78 ou 21 % étaient des cas nouvellement diagnostiqués lors du dépistage de routine à l'admission). Sur les 64 détenus chez qui le VIH a été nouvellement diagnostiqué dans le cadre d'un suivi durant leur incarcération, 17 avaient des données sérologiques de base négatives (le laboratoire a confirmé la séroconversion)¹.

Prévalence du VIH

Tableau 1 : Prévalence du VIH par sexe, origine autochtone et âge

	Prévalence des cas de VIH [±]	Chi carré
Total		
Global	429/24 353 (1,76 %)	s. o.
Sexe		
Hommes	373/22 671 (1,65 %)	p<0,0001
Femmes	56/1 670 (3,35 %)	
Origine autochtone		
Autochtone	143/5 449 (2,62 %)	p<0,0001
Non-Autochtone	286/18 904 (1,51 %)	
Âge		
17-19	0/241 (0 %)	p<0,0001
20-29	71/8 651 (0,82 %)	
30-39	133/7 115 (1,87 %)	
40-49	167/5 155 (3,24 %)	
50-59	45/2 217 (2,03 %)	
60+	11/783 (1,39 %)	

± - L'addition des chiffres peut ne pas correspondre aux totaux indiqués en raison des données manquantes


¹ Capsule sur les services de santé; Reprise de test de dépistage du VIH et séroconversion. SCC 2016

La prévalence du VIH était plus élevée chez les délinquantes (3,35 % contre 1,65 %), les détenus d'origine autochtone (2,62 % contre 1,51 %) et les détenus âgés de 40 à 49 ans (3,24 %) (voir le tableau 1).

Origine autochtone et sexe

La prévalence du VIH était plus élevée chez les détenus d'origine autochtone (6,03 %) comparativement aux délinquants d'origine autochtone (2,27 %) et aux autres délinquantes (2,16 %) (voir la figure 1).

Figure 1 : Prévalence du VIH par origine autochtone et sexe



Sexe et âge

Parmi les hommes, la prévalence du VIH était plus élevée chez les détenus âgés de 40 à 49 ans (3,25 %) et de 50 à 59 ans (2,11 %). Parmi les femmes, la prévalence du VIH était plus élevée chez les délinquantes âgées de 30 à 39 ans (4,86 %) et de 40 à 49 ans (3,07 %).

Chez les détenus d'origine autochtone, la prévalence du VIH était plus élevée dans les groupes d'âge de 40 à 49 ans (4,19 %) et de 30 à 39 ans (2,76 %). Parmi les délinquantes d'origine autochtone, la prévalence du VIH était plus élevée dans les groupes d'âge de 30 à 39 ans (8,88 %) et de 20 à 29 ans (5,75 %).

RÉSUMÉ

La prévalence estimée du VIH de 1,76 % parmi les détenus du SCC était cohérente avec les rapports publiés précédemment qui avaient recours à d'autres méthodes². La majorité (85 %) du fardeau de la prévalence est acquise avant l'incarcération au SCC. Cette analyse démontre que des sous-groupes particuliers (délinquantes, détenus d'origine autochtone), surtout celui des jeunes délinquantes d'origine autochtone, sont plus susceptibles d'avoir le VIH.

² *Capsules des services de santé; Rapport de surveillance du VIH 2014 SCC 2016*