

Feuillets d'information de la santé

Arthrite, 2013



Statistique
Canada

Statistics
Canada

Canada

Comment obtenir d'autres renseignements

Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l'ensemble des données et des services de Statistique Canada, visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca.

Vous pouvez également communiquer avec nous par :

Courriel à STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca

Téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros suivants :

- | | |
|---|----------------|
| • Service de renseignements statistiques | 1-800-263-1136 |
| • Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants | 1-800-363-7629 |
| • Télécopieur | 1-514-283-9350 |

Programme des services de dépôt

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| • Service de renseignements | 1-800-635-7943 |
| • Télécopieur | 1-800-565-7757 |

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s'est doté de normes de service à la clientèle que les employés observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi publiées sur le site www.statcan.gc.ca sous « Contactez-nous » > « Normes de service à la clientèle ».

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population du Canada, les entreprises, les administrations et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques exactes et actuelles.

Signes conventionnels dans les tableaux

Les signes conventionnels suivants sont employés dans les publications de Statistique Canada :

- . indisponible pour toute période de référence
- .. indisponible pour une période de référence précise
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- 0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
- 0^s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie
- ^p provisoire
- ^r révisé
- x confidentiel en vertu des dispositions de la *Loi sur la statistique*
- ^E à utiliser avec prudence
- F trop peu fiable pour être publié
- * valeur significativement différente de l'estimation pour la catégorie de référence ($p < 0,05$)

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2014

Tous droits réservés. L'utilisation de la présente publication est assujettie aux modalités de l'[entente de licence ouverte](#) de Statistique Canada.


Une [version HTML](#) est aussi disponible.

This publication is also available in English.



Arthrite, 2013


Le terme « arthrite » sert à décrire de nombreuses affections qui touchent les articulations, les tissus entourant les articulations et d'autres tissus conjonctifs. Les types d'arthrite les plus courants sont l'arthrose et l'arthrite rhumatoïde. Les douleurs, les raideurs, les enflures ou les difformités des articulations qui s'ensuivent peuvent réduire considérablement la qualité de vie¹.



Les données sur l'arthrite sont basées sur une question de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes où l'on demandait aux répondants s'ils avaient de l'arthrite, à l'exception de la fibromyalgie.

En 2013, 15,9 % (4,6 millions) des Canadiens de 15 ans et plus ont déclaré avoir reçu un diagnostic d'arthrite d'un professionnel de la santé (graphique 1). Depuis 2007, le taux d'arthrite² est resté le même chez les hommes, 12,4 % d'entre eux ayant déclaré être atteints de cette affection en 2013. Chez les femmes, le taux d'arthrite est demeuré stable depuis 2007, à environ 19 %, sauf en 2011 où il a augmenté pour atteindre 21,2 %³.


Graphique 1
Pourcentage de personnes déclarant avoir reçu un diagnostic d'arthrite, selon le sexe, population à domicile de 15 ans et plus, Canada, 2007 à 2013



Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2007-2013.

Tant chez les hommes que chez les femmes, le pourcentage de personnes déclarant faire de l'arthrite augmente avec l'âge, les personnes de 75 ans et plus ayant affiché le taux le plus élevé. En 2013, les femmes étaient plus susceptibles que les hommes d'être atteintes d'arthrite dans tous les groupes d'âge (graphique 2).

Graphique 2
Pourcentage de personnes déclarant avoir reçu un diagnostic d'arthrite, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 15 ans et plus, Canada, 2013



Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2013.

Le Québec⁴ était la seule province où le taux d'arthrite (10,1 %) enregistré parmi la population était **plus bas** que la moyenne nationale (15,9 %).

La proportion de répondants de 15 ans et plus ayant déclaré faire de l'arthrite était **supérieure** à la moyenne nationale au :

- Terre-Neuve-et-Labrador (21,7 %)
- L'Île-du-Prince-Édouard (21,0 %)
- Nouvelle-Écosse (24,3 %)
- Nouveau-Brunswick (20,9 %)
- Ontario (17,7 %)
- Manitoba (19,9 %)

Les répondants des autres provinces et territoires⁵ ont déclaré des taux comparables à la moyenne nationale.

Étant donné le lien étroit qui existe entre l'âge et l'arthrite, une province ou un territoire avec une population disproportionnellement élevée de jeunes pourrait s'attendre à avoir un taux d'arthrite inférieur à la moyenne nationale. Inversement, une province ou un territoire avec une population ayant un taux plus élevé de personnes âgées devrait avoir un taux d'arthrite supérieur à la moyenne nationale. Pour annuler l'effet des différences entre les répartitions selon l'âge dans les comparaisons interprovinciales, reportez-vous au tableau CANSIM n^o (numéro) 105-0503 pour connaître les taux normalisés selon l'âge.

Notes

1 La Société de l'arthrite, <http://www.arthrite.ca> (site consulté le 10 mai 2010).

2 Il est à noter qu'une personne souffre d'arthrite si elle a déclaré avoir reçu un diagnostic d'arthrite d'un professionnel de la santé.

- 3 Dans le questionnaire français de 2011, le mot « arthrose » a été ajouté dans la question sur l'arthrite car les patients tendent à associer le mot « arthrite » avec arthrite rhumatoïde et « arthrose » avec ostéoarthrite. Cependant, le mot « arthrose » a été omis en 2012. Par conséquent, les estimations de l'arthrite en 2011 pour la province de Québec et par ricochet celles du Canada ont été affectées par ces changements. Les données relatives à l'indicateur de l'arthrite en 2011 devraient être utilisées avec prudence.
 - 4 L'augmentation observée en 2011 pour le taux d'arthrite au Québec et l'ajout du concept de l'« arthrose » signifie que le fait de ne pas avoir ce terme diminuera les taux de la province. Cela pourrait être l'une des raisons pour lesquelles le Québec affiche un taux d'arthrite inférieur au taux national.
 - 5 Notez que le proportion de l'arthrite du Nunavut a un coefficient de variation entre 16,6 % et 33,3 % ; il faut donc interpréter les données en question avec prudence.
-

Références

La Société de l'arthrite, <http://www.arthrite.ca> (site consulté le 10 mai 2010).

Wilkins, Kathryn. 2004. « Incidence de l'arthrite par rapport au surpoids », *Rapports sur la santé*, vol. (volume) 15, n^o (numéro) 1, janvier, produit n^o (numéro) 82-003 au catalogue de Statistique Canada, pages 43 à 54, /studies-etudes/82-003/archive/2004/6764-fra.pdf (site consulté le 20 mai 2010).

Wilkins, Kathryn, 1999. « L'hormonothérapie substitutive et l'incidence de l'arthrite », *Rapports sur la santé*, vol. (volume) 11, n^o (numéro) 2, automne, produit n^o (numéro) 82-003 au catalogue de Statistique Canada, pages 57 à 66, /studies-etudes/82-003/archive/1999/4735-fra.pdf (site consulté le 20 mai 2010).

Données

D'autres données sur l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes sont disponibles dans les tableaux CANSIM 105-0501 et 105-0503.