

Feuillets d'information de la santé

Accès à un médecin régulier, 2014



Comment obtenir d'autres renseignements

Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l'ensemble des données et des services de Statistique Canada, visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca.

Vous pouvez également communiquer avec nous par :

Courriel à STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca

Téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros suivants :

- | | |
|---|----------------|
| • Service de renseignements statistiques | 1-800-263-1136 |
| • Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants | 1-800-363-7629 |
| • Télécopieur | 1-514-283-9350 |

Programme des services de dépôt

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| • Service de renseignements | 1-800-635-7943 |
| • Télécopieur | 1-800-565-7757 |

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s'est doté de normes de service à la clientèle que les employés observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi publiées sur le site www.statcan.gc.ca sous « Contactez-nous » > « Normes de service à la clientèle ».

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population du Canada, les entreprises, les administrations et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques exactes et actuelles.

Signes conventionnels dans les tableaux

Les signes conventionnels suivants sont employés dans les publications de Statistique Canada :

- . indisponible pour toute période de référence
- .. indisponible pour une période de référence précise
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- 0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
- 0^s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie
- ^p provisoire
- ^r révisé
- x confidentiel en vertu des dispositions de la *Loi sur la statistique*
- ^E à utiliser avec prudence
- F trop peu fiable pour être publié
- * valeur significativement différente de l'estimation pour la catégorie de référence ($p < 0,05$)

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2015

Tous droits réservés. L'utilisation de la présente publication est assujettie aux modalités de l'[entente de licence ouverte](#) de Statistique Canada.

Une [version HTML](#) est aussi disponible.

This publication is also available in English.




Accès à un médecin régulier, 2014

Pour bien des Canadiens, le médecin régulier est le premier point de contact pour obtenir des soins de santé. Il existe un lien entre le fait de ne pas avoir accès à un médecin régulier et des consultations moins fréquentes d'omnipraticiens ou de spécialistes, lesquels peuvent jouer un rôle dans le dépistage et le traitement précoces des problèmes de santé.

En 2014, 14,9 % des Canadiens de 12 ans et plus, soit environ 4,5 millions de personnes, ont déclaré ne pas avoir de médecin régulier. Le pourcentage de femmes qui n'ont pas accès à un médecin régulier est passé de 10,1 % en 2003 à 11,7 % en 2008 et n'a pas significativement changé depuis. Le pourcentage chez les hommes est resté autour de 19 % depuis 2003 (graphique 1).

Graphique 1
Pourcentage de personnes sans médecin régulier, selon le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada, 2003 à 2014




Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2003, 2005, 2007 à 2014.

Le groupe des hommes et les femmes âgés de 20 à 34 ans étaient les moins susceptibles d'avoir un médecin régulier, tandis que ceux de 65 ans et plus étaient les plus susceptibles d'en avoir un. Seulement 5,5 % des hommes et 5,0 % des femmes de 65 ans et plus n'avaient pas de médecin régulier, comparativement à 32,6 % des hommes et 20,3 % des femmes de 20 à 34 ans (graphique 2).

En 2014, les hommes étaient plus susceptibles que les femmes de déclarer ne pas avoir de médecin régulier, et ce, pour les groupes d'âge de 20 à 64 ans (graphique 2). Chez les 65 ans et plus et les 12 à 19 ans, il n'y avait pas de différence significative entre les hommes et les femmes.

Graphique 2
Pourcentage de personnes sans médecin régulier, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada, 2014



Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2014.

La proportion de résidents sans médecin régulier était **inférieure** à la moyenne nationale (14,9 %) au:

- Terre-Neuve-et-Labrador (10,1 %)
- L'Île-du-Prince-Édouard (9,5 %)
- Nouvelle-Écosse (10,6 %)
- Nouveau-Brunswick (6,1 %)
- Ontario (7,5 %)

La proportion de résidents sans médecin régulier était **supérieure** à la moyenne nationale au:

- Québec (25,2 %)
- Saskatchewan (20,1 %)
- Alberta (19,9 %)
- Yukon (26,1 %)
- Territoires du Nord-Ouest (57,7 %)
- Nunavut (82,5 %)

Les répondants du Manitoba et de la Colombie-Britannique ont déclaré des taux comparables à la moyenne nationale.

En 2014, parmi les 4,5 millions de personnes sans médecin régulier, la raison la plus souvent évoquée pour ne pas avoir de médecin régulier était le fait de ne pas en avoir cherché un (45,9 %). Les autres raisons pour lesquelles les personnes n'avaient pas de médecin étaient les suivantes : les médecins de leur région n'acceptaient pas de nouveaux patients (21,5 %), leur médecin avait pris sa retraite ou avait quitté la région et (20,2 %), ou qu'aucun médecin n'était disponible dans leur région (14,4 %). Par ailleurs, 13,1 % des gens n'ont pas fourni de raison particulière expliquant pourquoi ils n'avaient pas de médecin. (Notez que la somme de ces pourcentages est supérieure à 100 %, étant donné que les répondants pouvaient indiquer plus d'une raison expliquant pourquoi ils n'avaient pas trouvé de médecin régulier.)

Parmi les 4,5 millions de personnes sans médecin régulier au Canada en 2014, 81,5 % ont déclaré avoir un endroit où aller habituellement quand elles sont malades ou ont besoin de conseils en matière de santé. Si elles avaient besoin de soins médicaux, 59,1 % de ces personnes déclaraient qu'elles auraient recours à une clinique sans rendez-vous, 14,2 %, à l'urgence d'un hôpital et 8,6%, à un centre de santé communautaire. Les autres (18,1 %) ont déclaré d'autres lieux, comme des cliniques avec rendez-vous, des cabinets de médecin, des cliniques de consultations externes et des lignes d'information téléphonique sur la santé.

Note

- 1 Dans les territoires, un infirmier praticien est plus souvent le premier intervenant médical consulté plutôt qu'un médecin régulier

Références

Nabalamba, Alice, Millar, Wayne J. 2007. « Aller chez le médecin », *Rapports sur la santé*, vol. (volume) 18, n. (numéro) 1, produit n. (numéro) 82-003 au catalogue de Statistique Canada, pages 25 à 39, <http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2006002/article/9569-fra.htm>.

Carrière, Gisèle. 2005. « Consultation des médecins et des infirmières », *Rapports sur la santé*, vol. (volume) 16, n. (numéro) 4, produit n. (numéro) 82-003 au catalogue de Statistique Canada, pages 49 à 52, <http://www.statcan.gc.ca/studies-etudes/82-003/archive/2005/8043-fra.pdf>.

Tjepkema, Michael. 2008. « Utilisation des services de santé par les gais, les lesbiennes et les bisexuels au Canada », *Rapports sur la santé*, vol. (volume) 19, n. (numéro) 1, produit n. (numéro) 82-003 au catalogue de Statistique Canada, pages 57 à 70, <http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2008001/article/10532-fra.htm>.

Données

D'autres données sur l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes sont disponibles dans le tableau CANSIM 105-0501.