

Feuillets d'information de la santé

Exposition à la fumée secondaire à la maison, 2014



Statistique
Canada

Statistics
Canada

Canada

Comment obtenir d'autres renseignements

Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l'ensemble des données et des services de Statistique Canada, visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca.

Vous pouvez également communiquer avec nous par :

Courriel à STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca

Téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros suivants :

- Service de renseignements statistiques 1-800-263-1136
- Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants 1-800-363-7629
- Télécopieur 1-514-283-9350

Programme des services de dépôt

- Service de renseignements 1-800-635-7943
- Télécopieur 1-800-565-7757

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s'est doté de normes de service à la clientèle que les employés observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi publiées sur le site www.statcan.gc.ca sous « Contactez-nous » > « Normes de service à la clientèle ».

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population du Canada, les entreprises, les administrations et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques exactes et actuelles.

Signes conventionnels dans les tableaux

Les signes conventionnels suivants sont employés dans les publications de Statistique Canada :

- . indisponible pour toute période de référence
- .. indisponible pour une période de référence précise
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- 0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
- 0^s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie
- ^p provisoire
- ^r révisé
- x confidentiel en vertu des dispositions de la *Loi sur la statistique*
- ^E à utiliser avec prudence
- F trop peu fiable pour être publié
- * valeur significativement différente de l'estimation pour la catégorie de référence ($p < 0,05$)

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2015

Tous droits réservés. L'utilisation de la présente publication est assujettie aux modalités de l'[entente de licence ouverte](#) de Statistique Canada.

Une [version HTML](#) est aussi disponible.

This publication is also available in English.



Exposition à la fumée secondaire à la maison, 2014


Le « tabagisme passif », ou l'exposition à la fumée secondaire, a des effets néfastes sur la santé respiratoire. Le cancer du poumon chez l'adulte et l'asthme chez l'enfant sont deux des maladies les plus souvent associées à l'exposition à la fumée secondaire¹.

La proportion de non-fumeurs de 12 ans et plus qui étaient exposés régulièrement à la fumée secondaire à la maison était de 3,9 % en 2014, en baisse par rapport à 4,5 % en 2013. Ce taux a diminué considérablement depuis 2003, alors qu'il se chiffrait à 10,6 %. En 2014, le taux d'exposition à de la fumée secondaire à la maison était plus élevé chez les hommes (4,3 %) que chez les femmes (3,5 % ; graphique 1).

En 2014, 9,2 % des jeunes Canadiens âgés de 12 à 19 ans ont été exposés à la fumée secondaire à la maison – une diminution de 23,4 % en 2003 (graphique 1). Ce groupe d'âge est le plus susceptible d'être exposé à la fumée secondaire à la maison. Parmi les 1 million de Canadiens non-fumeurs de 12 ans et plus qui étaient régulièrement exposés à la fumée secondaire à la maison, le groupe d'âge de 12 à 19 ans représente 27,9 %.

Graphique 1
Pourcentage de non-fumeurs exposés régulièrement à la fumée secondaire à la maison, selon le sexe et groupe d'âge sélectionné, population à domicile de 12 ans et plus, Canada, 2003 à 2014

pourcentage




Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2003, 2005, 2007 à 2014.

Les hommes de 55 ans et plus étaient significativement plus susceptibles que les femmes d'être exposés à la fumée secondaire à la maison², mais il n'y avait pas de différence significative entre les sexes dans les autres groupes d'âge (graphique 2).

Graphique 2
Pourcentage de non-fumeurs exposés régulièrement à la fumée secondaire à la maison, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 12 ans et plus, Canada, 2014

pourcentage



^E à utiliser avec prudence (coefficient de variation compris entre 16,6 % et 33,3 %)

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2014.

La proportion de personnes qui ont déclaré d'exposition à la fumée secondaire à la maison était **inférieure** à la moyenne nationale (3,9 %) au :

- Ontario (3,4 %)
- Colombie-Britannique (2,1 %)

La proportion de personnes qui ont déclaré d'exposition à la fumée secondaire à la maison était **supérieure** à la moyenne nationale au Québec (5,7 %).

Les répondants des autres provinces³ et territoires³ ont déclaré des taux comparables à la moyenne nationale.

Notes

-
- 1 Le Directeur du Service de santé publique des États-Unis, Département de la Santé et des Services sociaux, 1987, « *The Health Consequences of Involuntary Smoking* », A Report of the Surgeon General, 1986, n^o (numéro) (PHS) 87-8398, Washington, DC.
 - 2 Il est à noter que les hommes et les femmes âgés de 35 à 44 ans et 45 à 54 ans présentaient des coefficients de variation qui fluctuaient entre 16,6 % et 33,3 % ; il faut donc interpréter les données en question avec prudence.
 - 3 Notez que les proportions de l'Île-du-Prince-Édouard, les Territoires du Nord-Ouest, et du Yukon ont des coefficients de variation entre 16,6 % et 33,3 % ; il faut donc les interpréter avec prudence. Les données du Nunavut ne sont pas assez fiables pour être publiées, car la proportion a un coefficient de variation plus élevé que 33,3 %.
-

Références

Shields, Margot. 2007. « Usage du tabac – Prévalence, interdictions et exposition à la fumée secondaire », *Rapports sur la santé*, vol.18, n^o (numéro) 3, produit n^o (numéro) 82-003 au catalogue de Statistique Canada, pages 53 à 72, <http://www.statcan.gc.ca/pub/82-003-x/2006007/article/smoking-fumer/10198-fra.pdf>.

Pérez, Claudio E. 2004. « Exposition à la fumée secondaire – qui est à risque? », *Rapports sur la santé*, vol. (volume) 16, n^o (numéro) 1, produit n^o (numéro) 82-003 au catalogue de Statistique Canada, pages 9 à 18, <http://www.statcan.gc.ca/studies-etudes/82-003/archive/2004/7037-fra.pdf>.

Bearer C. 1995. « Environmental health hazards: how children are different from adults. » *The Future of Children: Critical Issues for Children and Youths*, vol. (volume) 5, n^o (numéro) 2, pages 11 à 26, <http://www.jstor.org/stable/1602354> (site consulté le 15 mai 2013).

Données

D'autres données sur l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes sont disponibles dans le tableau CANSIM 105-0501.