

Feuillets d'information de la santé

Les dix principales causes de décès, 2013



Statistique
Canada

Statistics
Canada

Canada

Comment obtenir d'autres renseignements

Pour toute demande de renseignements au sujet de ce produit ou sur l'ensemble des données et des services de Statistique Canada, visiter notre site Web à www.statcan.gc.ca.

Vous pouvez également communiquer avec nous par :

Courriel à STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca

Téléphone entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au vendredi aux numéros suivants :

- Service de renseignements statistiques 1-800-263-1136
- Service national d'appareils de télécommunications pour les malentendants 1-800-363-7629
- Télécopieur 1-514-283-9350

Programme des services de dépôt

- Service de renseignements 1-800-635-7943
- Télécopieur 1-800-565-7757

Normes de service à la clientèle

Statistique Canada s'engage à fournir à ses clients des services rapides, fiables et courtois. À cet égard, notre organisme s'est doté de normes de service à la clientèle que les employés observent. Pour obtenir une copie de ces normes de service, veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais 1-800-263-1136. Les normes de service sont aussi publiées sur le site www.statcan.gc.ca sous « Contactez-nous » > « Normes de service à la clientèle ».

Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du Canada repose sur un partenariat bien établi entre Statistique Canada et la population du Canada, les entreprises, les administrations et les autres organismes. Sans cette collaboration et cette bonne volonté, il serait impossible de produire des statistiques exactes et actuelles.

Signes conventionnels dans les tableaux

Les signes conventionnels suivants sont employés dans les publications de Statistique Canada :

- . indisponible pour toute période de référence
- .. indisponible pour une période de référence précise
- ... n'ayant pas lieu de figurer
- 0 zéro absolu ou valeur arrondie à zéro
- 0^s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur arrondie
- ^p provisoire
- ^r révisé
- x confidentiel en vertu des dispositions de la *Loi sur la statistique*
- ^E à utiliser avec prudence
- F trop peu fiable pour être publié
- * valeur significativement différente de l'estimation pour la catégorie de référence ($p < 0,05$)

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2017

Tous droits réservés. L'utilisation de la présente publication est assujettie aux modalités de l'[entente de licence ouverte](#) de Statistique Canada.

Une [version HTML](#) est aussi disponible.

This publication is also available in English.



Feuillets d'information de la santé Les dix principales causes de décès, 2013



Le nombre de décès est utilisé comme critère de classement de la mortalité par principale cause de décès. Le classement des causes de décès est une façon informative de présenter les statistiques de la mortalité, de manière à compléter d'autres mesures sur la mortalité comme les taux de mortalité et la table de mortalité. La méthode de sélection des principales causes de décès a été établie par le National Center for Health Statistics du U.S. Department of Health and Human Services (Heron).

Les statistiques présentées dans ce feuillet d'information proviennent des statistiques de l'état civil de la Base canadienne de données sur les décès. Ces données sont recueillies auprès de tous les bureaux provinciaux et territoriaux de l'état civil et contiennent des renseignements démographiques et médicaux (cause de décès) sur tous les décès survenus au Canada.

La proportion de décès des dix principales causes de décès tend à diminuer

Depuis l'an 2000, le fardeau relatif associé aux 10 principales causes de décès tend à diminuer, tandis que la proportion de décès attribués à toutes les autres causes a augmenté. En 2013, les 10 principales causes de décès étaient à l'origine de 188 804 décès, ce qui représentait 75 % de l'ensemble des décès au Canada par rapport à 80 % en 2000 (tableau 1).

Le classement des 10 principales causes de décès est resté relativement stable de 2000 à 2013, sauf en 2010 et en 2012, où les accidents (les blessures involontaires) ont passé au quatrième rang, en avant des maladies chroniques des voies respiratoires inférieures, et en 2013, où la grippe et pneumopathie ont passé au septième rang, en avant de la maladie d'Alzheimer.

Tableau 1
Classement, nombre et pourcentage de décès pour les 10 principales causes, Canada, 2000, 2012 et 2013

Causes de décès	2013			2012			2000		
	rang	nombre	%	rang	nombre	%	rang	nombre	%
Toutes les causes de décès	...	252 338	100,0	...	246 596	100,0	...	218 062	100,0
Total, 10 principales causes de décès	...	188 804	74,8	...	184 869	75,0	...	175 149	80,3
Tumeurs malignes (cancer)	1	75 112	29,8	1	74 361	30,2	1	62 672	28,7
Maladies du coeur	2	49 891	19,8	2	48 681	19,7	2	55 070	25,3
Maladies cérébrovasculaires (accident vasculaire cérébral)	3	13 400	5,3	3	13 174	5,3	3	15 576	7,1
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	4	11 976	4,7	5	11 130	4,5	4	9 813	4,5
Accidents (blessures involontaires)	5	11 452	4,5	4	11 290	4,6	5	8 589	3,9
Diabète sucré (diabète)	6	7 045	2,8	6	6 993	2,8	6	6 714	3,1
Grippe et pneumopathie	7	6 551	2,6	8	5 694	2,3	8	4 966	2,3

Maladie d'Alzheimer	8	6 345	2,5	7	6 293	2,6	7	5 007	2,3
Lésions auto-infligées (suicide)	9	4 054	1,6	9	3 926	1,6	9	3 606	1,7
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (maladie du rein)	10	2 978	1,2	10	3 327	1,3	10	3 136	1,4
Toutes les autres causes	...	63 534	25,2	...	61 727	25,0	...	42 913	19,7

... n'ayant pas lieu de figurer

Note: L'ordre des causes de décès dans ce tableau est fondé d'après le classement des 10 principales causes de 2013.

Source : Statistique de l'état civil - Base de données sur les décès, tableau CANSIM 102-0561 (www.statcan.gc.ca/cansim/a05?lang=fra&id=1020561) .

Le cancer, la principale cause de décès, était à l'origine de 75 112 décès en 2013, soit 30 % de l'ensemble des décès, représentant une proportion à peu près stable depuis 2000 (29 %). Venaient ensuite au deuxième rang, les maladies du cœur avec 20 % de l'ensemble des décès, suivies au troisième rang des accidents vasculaires cérébraux (maladies cérébrovasculaires) avec 5 %.

Trois des dix principales causes de décès avaient le même classement chez les hommes et chez les femmes

En 2013, les hommes et les femmes avaient en commun huit des dix principales causes de décès. Cependant, seules trois principales causes de décès avaient le même classement : le cancer (premier), les maladies du cœur (deuxième) et les maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (quatrième).

Tableau 2
Classement et nombre de décès pour les 10 principales causes de décès selon le sexe, Canada, 2013

Causes de décès	Hommes			Femmes			Rapport de masculinité ¹
	rang	nombre	%	rang	nombre	%	
Toutes les causes de décès	...	126 973	100,0	...	125 365	100,0	101
Tumeurs malignes (cancer)	1	39 384	31,0	1	35 728	28,5	110
Maladies du cœur	2	26 454	20,8	2	23 437	18,7	113
Accidents (blessures involontaires)	3	6 570	5,2	5	4 882	3,9	135
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures	4	6 030	4,7	4	5 946	4,7	101
Maladies cérébrovasculaires (accident vasculaire cérébral)	5	5 543	4,4	3	7 857	6,3	71
Diabète sucré (diabète)	6	3 786	3,0	8	3 259	2,6	116
Lésions auto-infligées (suicide)	7	3 041	2,4	11	1 013	0,8	300
Grippe et pneumopathie	8	2 992	2,4	7	3 559	2,8	84
Maladie chronique et cirrhose du foie	9	1 956	1,5	12	1 005	0,8	195
Maladie d'Alzheimer	10	1 954	1,5	6	4 391	3,5	45
Néphrite, syndrome néphrotique et néphropathie (maladie du rein)	11	1 439	1,1	9	1 539	1,2	94
Sepsie	13	1 070	0,8	10	1 219	1,0	88
Toutes les autres causes	...	26 754	21,1	...	31 530	25,2	85

... n'ayant pas lieu de figurer

1 Nombre de décès d'hommes pour 100 décès de femmes.

Note: L'ordre des causes de décès dans ce tableau est fondé d'après le classement en rang des 10 principales causes chez les hommes.

Source : Statistique de l'état civil - Base de données sur les décès, tableau CANSIM 102-0561 (www.statcan.gc.ca/cansim/a05?lang=fra&id=1020561) .

La troisième principale cause de décès chez les hommes était les accidents (blessures involontaires) alors que cette cause se situait au cinquième rang chez les femmes. En 2000, les accidents se trouvaient au cinquième rang chez les hommes et au septième rang chez les femmes.

Le suicide était la septième principale cause de décès chez les hommes en 2013, le même rang comparé à 2000. Chez les femmes, le suicide se classait au onzième en 2013, mais au dixième rang en 2000. Dans le tableau 2, le rapport de masculinité (décès d'hommes pour 100 décès de femmes) en 2012, indique que le suicide chez les hommes est trois fois plus élevé que celui chez les femmes. Une étude sur les taux de suicide au Canada confirme cette situation (Navaneelan).

La maladie d'Alzheimer se classait au sixième rang chez les femmes alors qu'elle occupait le dixième rang chez les hommes. Le rapport de masculinité indique qu'en 2013, il y avait au-delà de deux fois plus de femmes qui sont décédées de cette cause de décès que d'hommes. En 2000, la maladie d'Alzheimer était au cinquième rang chez les femmes alors qu'elle était au dixième rang chez les hommes.

Bien que chez les femmes, l'accident vasculaire cérébral (AVC) se retrouvait au troisième rang depuis 2000, chez les hommes l'AVC a reculé du troisième rang en 2000 au cinquième rang en 2013.

Chez les femmes, le diabète a reculé du sixième rang en 2000 au huitième rang en 2013. La sepsie se retrouvait au dixième rang en 2013 chez les femmes, tandis qu'elle était au quinzième rang en 2000.


Disparités selon l'âge

Le graphique 1 montre clairement qu'il existait des différences dans les répartitions par groupe d'âge des décès selon la principale cause de décès en 2013. Dans le groupe d'âge des 1 à 24 ans, plus de la moitié des décès de ce groupe d'âge était attribuable à des causes externes de décès, c'est-à-dire aux accidents (blessures involontaires) avec 36 %, et au suicide avec 18 %. Les décès par cancer venaient au troisième rang avec 11 %, suivis de l'homicide avec 4 %.

Dans le groupe des personnes âgées de 25 à 44 ans, les accidents (blessures involontaires) constituaient la principale cause de décès avec 23 %, suivis des décès par cancer avec 20 % et ensuite des décès par suicide avec 17 %. Dans ce groupe d'âge, les maladies du cœur occupaient le quatrième rang.

Dans le groupe d'âge des 45 à 64 ans, 43 % des décès sont attribuables aux décès par cancer, suivis des maladies du cœur avec 16 %.

Dans le groupe d'âge des personnes âgées de 65 ans et plus, là où le nombre de décès était le plus important, les décès attribuables à des maladies chroniques faisaient parties des cinq principales causes de décès. Les décès par cancer et les maladies du cœur constituaient près de la moitié des causes de décès de ce groupe d'âge. Venaient ensuite, les décès attribuables aux AVC avec 6%, les maladies chroniques des voies respiratoires inférieures avec 5 % et la maladie d'Alzheimer avec 3 %.



Références

HERON, M. 2007. « Deaths: Leading causes for 2004 », *National Vital Statistics Reports*, 56 (5).

NAVANEELAN, Tanya. 2012. « Les taux de suicide : un aperçu », *Coup d'œil sur la Santé*, produit n° 82-624-X au catalogue de Statistique Canada.

Données

D'autres données sur les principales causes de décès sont disponibles dans les tableaux CANSIM 102-0561 (www.statcan.gc.ca/cansim/a05?lang=fra&id=1020561), 102-0562 (www.statcan.gc.ca/cansim/a05?lang=fra&id=1020562), 102-0563 (www.statcan.gc.ca/cansim/a05?lang=fra&id=1020563) et 102-0564 (www.statcan.gc.ca/cansim/a05?lang=fra&id=1020564).