




Caractéristiques distinctives de l'ANAPHYLAXIE



APPARITION RAPIDE DES SYMPTÔMES
(de quelques **minutes** à **4 heures** après l'injection)
incluent :



PEAU

- urticaire • prurit • œdème de Quincke
- bouffées vasomotrices



RESPIRATION

- toux • respiration sifflante • dyspnée
- bronchospasmes • détresse respiratoire



GASTRO-INTESTINAL

- nausées • vomissements • diarrhée
- douleurs abdominales sévères



CARDIOVASCULAIRE

- tachycardie • hypotension • syncope
- étourdissements • arythmies



SYSTÈME NERVEUX CENTRAL

- irritabilité • sentiment de malheur imminent
- baisse du niveau de conscience

**En cas de suspicion d'anaphylaxie,
une réponse rapide est importante.**

Les étapes **1** **2** **3** et **4** doivent être effectuées **promptement et simultanément**

- 1** Demander à quelqu'un de composer le **911** (là où il est accessible) ou de communiquer avec les services médicaux d'urgence
- 2** **Évaluer** les voies respiratoires, la respiration, la circulation
- 3** Coucher la personne sur le **dos (décubitus dorsal)** et **élever ses membres inférieurs**
- 4** Injecter l'**ÉPINÉPHrine** par voie intramusculaire dans la partie antérolatérale de la mi-cuisse (*se référer au tableau de dosage de l'épinéphrine*)
- 5** Répéter toutes les **5 minutes** s'il n'y a aucune amélioration

Source: Agence de la Santé publique du Canada. Anaphylaxie et autres réactions aiguës après la vaccination : Guide canadien d'immunisation : Partie 2 – La sécurité des vaccins Ottawa (ON): ASPC; 2020.

© Sa Majesté le Roi du Chef du Canada, représenté par le ministre de la Santé, 2023
Cat.: HP5-160/2023F-PDF | ISBN: 978-0-660-49730-3 | Pub.: 230267

