

Les progrès du Canada vers l'élimination de l'épidémie de VIH



Le Canada s'est engagé à atteindre les cibles mondiales pour le dépistage et le traitement du VIH¹. Les **cibles mondiales pour 2025** sont les suivantes² :

- 95 % des personnes vivant avec le VIH ont reçu un diagnostic,
- 95 % des personnes ayant reçu un diagnostic de VIH reçoivent un traitement et
- 95 % des personnes recevant un traitement ont une charge virale supprimée

On estime qu'à la fin de 2022, il y avait

65 270
personnes
vivant avec
le VIH
(PVVIH)

Parmi les PVVIH,



51 % était un homme gai, bisexuel ou autre homme ayant des relations sexuelles avec des hommes (**gbHARSAH**)



25 % était de sexe **féminin**



13 % était une personne ayant déjà utilisé des **drogues par injection**

Le VIH affecte disproportionnellement certaines personnes, populations et communautés

La **prévalence** estimée du VIH en 2022 parmi ces populations était :



0,2 %

dans la population canadienne totale



0,25 %



0,08 %



2,2 %

parmi les personnes ayant déjà utilisé des drogues par injection³



5 %

parmi les gbHARSAH^{4,5}

Les progrès du Canada vers l'atteinte des cibles **95-95-95**, en 2022⁶ :

89 %

des PVVIH avaient reçu un diagnostic

85 %

des personnes ayant reçu un diagnostic de VIH recevaient un traitement

95 %

des personnes recevant un traitement antirétroviral avaient une charge virale supprimée



1 PVVIH sur 10

ne connaissait pas son statut sérologique

La pandémie de la COVID-19 a réduit la demande et l'accès aux services et a eu un impact sur les progrès du Canada vers l'atteinte des cibles 95-95-95. Les efforts continus visant à fournir des soins et un soutien culturellement adaptés aideront le Canada à se remettre des conséquences de la pandémie.



48 368 PVVIH



16 544 PVVIH

90 %



des personnes vivant avec le VIH avaient reçu un diagnostic

86 %



86 %



des personnes ayant reçu un diagnostic de VIH recevaient un traitement

84 %



96 %



des personnes recevant un traitement antirétroviral avaient une charge virale supprimée

92 %



Les cibles du continuum de soins du VIH pour les PVVIH de sexe féminin sont inférieures à celles pour les PVVIH de sexe masculin

On estime que **1 848 nouvelles infections** sont survenues au Canada en 2022.

15 % d'augmentation par rapport à l'estimation pour 2020 (1 610).



Chaque jour,

5 personnes

ont été infectées

Les nouvelles infections surviennent plus fréquemment chez certaines populations que dans la population générale

Les **taux d'incidence** estimés en 2022 (pour 100 000 personnes) étaient les suivants :

5

dans la population canadienne totale



6



3

494

parmi les personnes ayant utilisé des drogues par injection au cours des 6 à 12 derniers mois³

187

parmi les gbHARSAH sexuellement actifs^{4,5}

Interventions pour **prévenir la transmission**



Connaissez votre statut pour pouvoir accéder au traitement, protéger votre santé et celle de votre (vos) partenaire(s)



La PrEP-VIH et la PPE-VIH sont des médicaments qui peuvent aider à réduire le risque de contracter le VIH⁸



Le VIH n'est pas transmis sexuellement lorsqu'une PVVIH suit un traitement et que la quantité de VIH dans son sang reste très faible⁷



Pour en savoir plus sur le VIH, visitez Canada.ca/VIH

¹ Plan d'action 2024-2030 du gouvernement du Canada sur les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) ² Stratégies mondiales du secteur de la santé contre, respectivement, le VIH, l'hépatite virale et les infections sexuellement transmissibles pour la période 2022-2030 ³ Prévalence : nombre estimé de personnes ayant utilisé des drogues par injection vivant avec le VIH (8 573) / taille estimée de la population nationale de personnes ayant déjà utilisé des drogues par injection, en 2021 (révisée et non publiée) (388 400). L'incidence a été calculée à partir du nombre estimé de nouvelles infections parmi les personnes séronégatives qui avaient utilisé des drogues injectables au cours des 12 derniers mois. ⁴ Prévalence du VIH parmi les gbHARSAH : nombre estimé de gbHARSAH vivant avec le VIH (33 183) / taille estimée de la population nationale gbHARSAH en termes d'identité ou de comportement en 2020 (669 613). L'incidence du VIH parmi les gbHARSAH sexuellement actifs a été calculée à partir du nombre estimé de nouvelles infections parmi les gbHARSAH séronégatifs ayant déclaré des relations sexuelles anales au cours des 6 à 12 derniers mois. ⁵ Sorge JT, Colyer S, Cox J, Kroch AE, Lachowsky NJ, Popovic N, Yang Q. Taille de la population d'hommes gais, bisexuels et autres hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes au Canada. Relevé des maladies transmissibles au Canada 2023;49(11/12):465-76. <https://doi.org/10.14745/ccdr.v49i1112a021> ⁶ Ces estimations remplacent toutes les estimations précédemment publiées par l'Agence de la santé publique du Canada concernant les progrès vers l'élimination du VIH. Des données mises à jour étaient disponibles et des améliorations ont été intégrées aux méthodes. Ces révisions signifient que les estimations de 2022 ne doivent pas être comparées directement avec les estimations publiées précédemment. ⁷ Prévenir la transmission du VIH : Indétectable = Intransmissible (I=I) ⁸ Fiche d'information sur le VIH : Prévention biomédicale du VIH - PrEP et PPE