

ÉNUMÉRATION DES ESPÈCES D'OISEAUX DE LA SEIGNEURIE
DE RIVIÈRE-DU-LOUP COMPRENANT LA RÉSERVE NATIONALE DE FAUNE
DE LA BAÏE DE L'ISLE-VERTE

Première esquisse

par

Léo-Guy de Repentigny

Service canadien de la faune
Environnement Canada

Le 24 février 1981

Symboles

- P - Printemps (1er mars - 31 mai)
 E - Eté (1er juin - 31 août)
 A - Automne (1er sept. - 30 nov.)
 H - Hiver (1er déc. - 28(29) fév.).

Prés - Présence nombre d'années observé x nombre d'années de la première à la dernière observation: ce produit ÷ 100 (période la plus continue possible).

R - Réserve nationale de faune de baie de L'Isle-Verte.

S - Territoire de la seigneurie de Rivière-du-Loup à l'exclusion de celui de la RNF.

* Espèce observée sur ce territoire.

** Espèce nicheuse (ou qui a niché) sur ce territoire.

(Tourte) Espèce éteinte.

Formule pour établir l'abondance de l'espèce par saison

Cette formule nous a permis de compenser pour le nombre de jours où l'espèce a été présente sur le territoire, d'après les observations accessibles à l'élaboration de ce travail. Cette approximation de l'abondance satisfait les besoins de cette énumération en grande partie.

Elle s'énumère ainsi:

$$\frac{\frac{n^j}{n^a} n^i}{91 n^a}$$

où: n^j = nombre de jours total par saison pour toute la période d'observation où l'espèce a été présente.

n^a = nombre d'années total où l'espèce a été observée. Ex.: 1956, 1958, 1959, 1965, 1968 = 5.

n^i = nombre d'individus total par saison pour toute la période d'observation.

91 = nombre de jours dans une saison.


Limites pour chacun des paliers

Abondant : 1,1 - +

Commun : 0,06 - 1,09

Occasionnel: 0,01 - 0,059

Rare : - - 0,009



LIMITE DU TERRITOIRE ÉTOIÉ
SEIGNEURIE DE RIVIÈRE-DU-LOUP

ILE DU SAINT-LAURENT

St-Siméon

TANIERSE

LE AUX BOISSES

LE AUX BOISSES

LES PARADES

ILE VERDE

ILE CADOUNA

LES DU VIEUX-LENDREUIL

ILE AUX LILIES

RIVE DE BAIE DE L'ISLE-VERDE

RIVIÈRE DES MACHES

ROUTE 132

TANIERSE

St-Éloi

TRIS-PISIOLES

St-Éloi

St-Éloi

St-Éloi

St-Éloi

RIVIÈRE VERTE

RIVIÈRE VERTE

RIVIÈRE VERTE

RIVIÈRE VERTE

St-François

St-François

St-François

St-François

St-François

St-François

RIVIÈRE TRIS-PISIOLES

RIVIÈRE TRIS-PISIOLES

RIVIÈRE TRIS-PISIOLES

RIVIÈRE TRIS-PISIOLES

RIVIÈRE TRIS-PISIOLES

CANTON DE BÉGNON

CANTON DE DENNOVILLE

CANTON DE VIGER

CANTON DE MONTMORIS

CANTON DE LA

RIOU

1:250,000

TERRITOIRE DE LA SEIGNEURIE DE RIVIÈRE-DU-LOUP (COMTÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP)
LET UNE PARTIE DU COMTÉ DE KAMOURASKA

ENUMERATION

	<u>P</u> <u>E</u> <u>A</u> <u>H</u>	<u>Prés.</u>	<u>R</u> <u>S</u>
1. Huart à collier	C C O -	4,14	* *
2. Huart à gorge rousse	A R R -	5,76	* *
3. Grèbe jougris	R R O -	2,6	* *
4. Grèbe cornu	- - O -	1,26	* *
5. Grèbe à bec bigarré	- - R -	0,01	* *
6. Grand Puffin	- - R -	0,01	* *
7. Puffin fuligineux	- R - -	0,09	* *
8. Pétrel cul-blanc	R - R -	0,08	* *
9. Pélican blanc d'Amérique	- R - -	0,01	* *
10. Fou de Bassan	R O O -	2,94	* *
11. Grand Cormoran	R R - -	0,26	* *
12. Cormoran à aigrettes	C A C -	4,75	* **
13. Grand Héron	C C O -	5,5	* **
14. Héron vert	- R - -	-	* *
15. Aigrette neigeuse	- R - -	0,01	* *
16. Grande Aigrette	R - - -	0,01	* *
17. Aigrette garzette	R - - -	0,01	* *
18. Bihoreau à couronne noire	O C R -	3,91	** **
19. Butor d'Amérique	R R - -	0,18	* *
20. Bernache du Canada	A R C -	3,84	* *
21. Bernache cravant	A C R -	5,0	* *
22. Oie blanche	A R C -	2,53	* *
23. Canard malard	O O O -	2,88	* *
24. Canard noir	C A C -	4,86	** **
25. Canard chipeau	R O R -	0,35	* *
26. Canard pilet	A O O -	3,0	* *
27. Sarcelle à ailes vertes	C C O -	2,42	* *
28. Sarcelle à ailes bleues	O C R -	1,54	* *
29. Canard siffleur d'Europe	R R - -	0,44	* *
30. Canard siffleur d'Amérique	C O R -	0,64	* *
31. Canard souchet	R O - -	1,36	* *

	<u>P E A H</u>	<u>Prés.</u>	<u>R S</u>
32. Canard huppé	- R - -	0,01	* *
33. Morillon à collier	O - R -	1,0	* *
34. Morillon à dos blanc	R - - -	0,08	* *
35. Grand Morillon	O R O -	1,76	* *
36. Petit Morillon	R - - -	0,06	* *
37. Garrot commun	A C C O	2,73	* *
38. Garrot de Barrow	C R O R	3,4	* *
39. Petit Garrot	R R R R	0,95	* *
40. Canard kakawi	O R O O	3,15	* *
41. Canard arlequin	O O R -	1,08	* *
42. Eider à duvet	A A C R	5,75	* **
43. Eider remarquable	O O R -	3,6	* *
44. Macreuse à ailes blanches	C C O -	3,36	* *
45. Macreuse à front blanc	A O C -	5,04	* *
46. Macreuse à bec jaune	A O R -	4,75	* *
47. Bec-scie couronné	R R - -	0,63	* *
48. Grand Bec-scie	C R O R	3,25	* *
49. Bec-scie à poitrine rousse	C O O R	4,56	* *
50. Vautour à tête rouge	- R - -	0,01	* *
51. Autour	R R R -	1,15	* *
52. Epervier brun	O R R -	1,84	* *
53. Epervier de Cooper	R - R -	0,44	* *
54. Buse à queue rousse	R - - -	1,0	* *
55. Petite Buse	R R - -	-	* *
56. Buse pattue	R O O -	2,2	* *
57. Aigle doré.	- R - -	0,28	* *
58. Aigle à tête blanche	- R - -	0,01	* *
59. Busard des marais	O O R -	2,64	* *
60. Aigle pêcheur	O O R -	3,12	* **
61. Gerfaut	- - R R	0,09	* *
62. Faucon pèlerin	O R O -	3,22	* *

	<u>P</u>	<u>E</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Prés.</u>	<u>R</u>	<u>S</u>
63. Faucon émerillon	R	R	R	-	2,3	*	*
64. Crécerelle d'Amérique	O	R	R	-	1,75	*	*
65. Gêlinotte huppée	R	-	-	R	0,72	*	*
66. Râle élégant	R	R	-	-	0,14	*	
67. Râle de Virginie	-	R	-	-	0,01		*
68. Râle de Caroline	-	R	-	-	0,04		*
69. Gallinule commune	R	-	-	-	0,01		*
70. Foulque d'Amérique	R	R	-	-	0,39	*	*
71. Huîtrier d'Amérique	R	R	-	-	0,18		*
72. Pluvier à collier	C	C	O	-	3,93	*	*
73. Pluvier siffleur	R	-	-	-	0,01		*
74. Pluvier kildir	C	C	R	-	2,25	**	*
75. Pluvier doré d'Amérique	-	C	O	-	1,33	*	*
76. Pluvier argenté	A	A	O	-	3,74	*	*
77. Tournepierré roux	O	A	C	-	3,36	*	*
78. Bécasse d'Amérique	R	R	-	-	0,88		*
79. Bécassine des marais	C	C	-	R	0,85	**	*
80. Courlis corlieu	R	A	R	-	3,2	*	*
81. Courlis à long bec	-	-	R	-	0,01		*
82. Maubèche branle-queue	O	O	R	-	4,0	*	**
83. Chevalier solitaire	O	R	R	-	1,98	*	*
84. Chevalier semi-palmé	-	R	-	-	0,16	*	
85. Grand Chevalier à pattes jaunes	O	C	R	-	4,14	*	*
86. Petit Chevalier à pattes jaunes	O	O	R	-	0,98	*	**
87. Bécasseau à poitrine rousse	R	O	O	-	1,2	*	*
88. Bécasseau maritime	C	R	R	-	3,96		*
89. Bécasseau à poitrine cendrée	O	O	O	-	2,64	*	*
90. Bécasseau à croupion blanc	R	O	O	-	1,57		*
91. Bécasseau de Baird	-	R	R	-	0,68		*
92. Bécasseau minuscule	C	C	R	-	3,68		*
93. Bécasseau variable	R	O	O	-	0,95		*

	<u>P</u>	<u>E</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Prés.</u>	<u>R</u>	<u>S</u>
94. Bécasseau roux	C	C	-	-	1,98	*	*
95. Bécasseau à long bec	-	R	-	-	0,04		*
96. Bécasseau à échasses	-	R	-	-	0,96		*
97. Bécasseau semi-palmé	O	A	R	-	2,42	*	*
98. Bécasseau sanderling	R	C	O	-	6,02		*
99. Bécasseau roussâtre	R	-	R	-	0,14		*
100. Barge hudsonienne	-	C	C	-	1,89	*	*
101. Chevalier combattant	R	-	-	-	0,01		*
102. Phalarope roux	-	-	R	-	0,01		*
103. Phalarope de Wilson	R	R	-	-	0,09	*	*
104. Phalarope hyperboréen	R	C	O	-	4,32		*
105. Labbe pomarin	R	O	O	-	0,16		*
106. Labbe parasite	C	-	C	-	0,5		*
107. Labbe à longue queue	-	R	-	-	0,01		*
108. Grand Labbe	-	-	R	-	0,01		*
109. Goéland bourgmestre	R	-	-	-	0,01		*
110. Goéland arctique	R	-	-	R	0,14		*
111. Goéland à manteau noir	C	C	C	R	4,25	*	**
112. Goéland argenté	A	A	C	R	4,75	*	**
113. Goéland à bec cerclé	C	A	C	-	2,5	*	*
114. Mouette rieuse d'Amérique	-	R	-	-	0,01	*	
115. Mouette de Bonaparte	R	O	O	-	1,89		*
116. Mouette pygmée	-	-	R	-	0,01		*
117. Mouette tridactyle	R	C	A	-	2,6	*	*
118. Mouette de Sabine	-	R	R	-	0,06		*
119. Sterne commune	A	R	R	-	0,68		*
120. Sterne arctique	R	-	R	-	0,94		*
121. Sterne noire	R	-	-	-	0,01		*
122. Petite Sterne	-	-	R	-	0,01		*
123. Gode	O	O	R	-	2,31		*
124. Marmette commune	R	R	R	-	0,42		*
125. Marmette de Brünnich	-	-	-	R	0,01		*

	<u>P</u>	<u>E</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Prés.</u>	<u>R</u>	<u>S</u>
126. Mergule nain	O	R	O	-	1,14		*
127. Guillemot noir	A	C	C	R	5,04	*	*
128. Macareux moine	-	-	R	-	0,04		*
129. Pigeon biset	R	R	R	R	-		*
130. Tourterelle triste	R	-	R	-	1,19		*
131. (Tourte)	-	-	-	-	-		*
132. Coulicou à bec jaune	-	-	R	-	0,01		*
133. Coulicou à bec noir	-	R	-	-	0,24		*
134. Gran-duc d'Amérique	R	R	-	-	0,33	*	*
135. Harfang des neiges	R	R	O	R	1,08	*	*
136. Chouette épervière	R	-	-	-	0,2	*	*
137. Chouette rayée	-	R	-	-	-		*
138. Chouette cendrée	R	R	-	-	0,82		*
139. Hibou moyen-duc	-	O	-	-	0,16		**
140. Hibou des marais	R	O	R	-	1,18		*
141. Nyctale boréale	-	-	R	-	0,01		*
142. Petite Nyctale	R	R	R	-	0,63		*
143. Engoulevent mange-maringouins	R	R	R	-	0,84		*
144. Martinet ramoneur	O	R	-	-	1,92	*	*
145. Colibri à gorge rubis	O	O	R	-	1,76		*
146. Martin-pêcheur d'Amérique	R	R	R	-	0,6		*
147. Pic flamboyant	O	O	O	-	3,5	*	**
148. Pic maculé	R	R	O	-	0,01		*
149. Pic chevelu	R	O	R	-	1,74	*	*
150. Pic mineur	O	C	O	R	2,52		**
151. Pic à dos noir	O	-	O	-	1,53		*
152. Pic à dos rayé	O	-	O	-	0,56		*
153. Tyran tritri	R	R	-	-	0,3		*
154. Moucherolle phébi	R	O	R	-	0,96	*	*
155. Moucherolle à ventre jaune	O	O	R	-	0,64		*
156. Moucherolle des aulnes	O	O	-	-	1,76	*	*

	<u>P</u>	<u>E</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Prés.</u>	<u>R</u>	<u>S</u>
157. Moucherolle tchébec	O	O	R	-	1,74		*
158. Pioui de l'Est	R	O	-	-	1,12		*
159. Moucherolle à côtés olive	R	R	-	-	0,01		*
160. Alouette cornue	C	R	C	-	2,16	*	*
161. Hirondelle bicolore	C	O	R	-	2,75	*	**
162. Hirondelle des sables	R	C	-	-	1,38	*	**
163. Hirondelle à ailes hérissées	R	-	-	-	0,22		*
164. Hirondelle des granges	O	C	R	-	2,75	*	*
165. Hirondelle à front blanc	R	-	-	-	0,69	*	*
166. Hirondelle pourprée	-	-	R	-	0,01		**
167. Geai gris	-	-	R	-	0,01		*
168. Geai bleu	R	R	R	-	0,69		*
169. Grand Corbeau	C	O	O	R	5,46	*	**
170. Corneille d'Amérique	C	C	O	R	3,0	*	**
171. Mésange à tête noire	O	O	O	O	3,0	*	**
172. Mésange à tête brune	O	C	C	O	4,14	*	*
173. Sittelle à poitrine blanche	R	R	-	-	0,04		*
174. Sittelle à poitrine rousse	O	C	O	O	3,3		**
175. Grimpereau brun	O	O	R	R	3,52		*
176. Troglodyte familier	R	R	-	-	-		*
177. Troglodyte des forêts	O	O	O	-	3,08		**
178. Troglodyte des marais	-	R	-	-	0,01	*	
179. Moqueur polyglotte	R	R	R	-	0,64	*	*
180. Moqueur chat	O	O	R	-	2,75	*	*
181. Moqueur roux	R	R	-	-	0,9		*
182. Merle d'Amérique	C	O	C	-	2,5	*	**
183. Grive des bois	R	-	-	-	0,06		*
184. Grive solitaire	R	O	O	R	2,07	*	*
185. Grive à dos olive	O	C	O	-	3,22	*	**
186. Grive à joues grises	R	R	-	-	0,48		*
187. Grive fauve	O	O	R	-	0,84	*	*

	<u>P</u>	<u>E</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Prés.</u>	<u>R</u>	<u>S</u>
188. Merle bleu à poitrine rouge	R	R	-	-	-		*
189. Roitelet à couronne dorée	C	O	O	-	3,3		*
190. Roitelet à couronne rubis	C	O	O	-	2,76	*	**
191. Pipit commun	C	R	R	C	3,36		*
192. Jaseur des cèdres	R	O	R	-	1,92		*
193. Pie-grièche boréale	R	-	R	-	0,64		*
194. Pie-grièche migratrice	R	-	-	-	0,01	*	
195. Etourneau sansonnet	C	C	C	-	8,84	*	**
196. Viréo à tête bleue	R	-	R	-	0,2		*
197. Viréo aux yeux rouges	O	O	R	-	0,6		*
198. Viréo de Philadelphie	R	R	-	-	0,12		*
199. Viréo mélodieux	R	R	-	-	0,12		*
200. Fauvette noir et blanc	O	O	R	-	0,6		*
201. Fauvette obscure	O	C	R	-	3,36	*	**
202. Fauvette verdâtre	R	-	-	-	0,54		*
203. Fauvette à joues grises	R	O	R	-	2,53	*	*
204. Fauvette parula	O	O	R	-	2,31		**
205. Fauvette jaune	O	O	R	-	1,26		*
206. Fauvette à tête cendrée	O	O	R	-	3,25	*	**
207. Fauvette tigrée	O	O	R	-	2,42	*	*
208. Fauvette bleue à gorge noire	R	O	R	-	1,98		*
209. Fauvette à croupion jaune	O	C	C	-	4,5	*	**
210. Fauvette verte à gorge noire	O	O	R	-	2,53	*	**
211. Fauvette à gorge orangée	R	O	R	-	2,31		*
212. Fauvette à flancs marron	O	O	R	-	0,88		*
213. Fauvette à poitrine baie	C	O	R	-	4,0	*	**
214. Fauvette rayée	O	O	R	-	1,12	*	*
215. Fauvette à couronne rousse	R	R	R	-	1,26		*
216. Fauvette couronnée	O	O	R	-	2,3	*	**
217. Fauvette des ruisseaux	R	O	R	-	1,57		**
218. Fauvette triste	R	R	R	-	0,95	*	*
219. Fauvette masquée	O	O	R	-	2,75	*	**

	<u>P</u>	<u>E</u>	<u>A</u>	<u>H</u>	<u>Prés.</u>	<u>R</u>	<u>S</u>
220. Fauvette polyglotte	-	R	-	-	0,2		*
221. Fauvette à calotte noire	0	0	R	-	2,75		*
222. Fauvette du Canada	0	R	-	-	1,19		*
223. Fauvette flamboyante	0	0	R	-	1,8	*	**
224. Moineau domestique	C	C	0	R	0,01	*	*
225. Goglu	C	0	C	-	1,75	*	*
226. Sturnelle des prés	R	R	-	-	0,01		*
227. Carouge à épaulettes	A	C	0	-	2,25	**	**
228. Mainate rouilleux	0	R	R	-	2,07	*	*
229. Mainate bronzé	A	C	R	-	2,0	*	**
230. Vacher à tête brune	C	0	0	-	2,75	*	**
231. Tangara écarlate	R	R	R	-	0,85		*
232. Gros-bec à poitrine rose	R	0	R	-	2,52	*	*
233. Gros-bec errant	R	C	0	-	3,5	*	*
234. Roselin pourpré	0	0	0	R	3,25	*	**
235. Gros-bec des pins	R	0	0	0	2,07	*	*
236. Sizerin blanchâtre	-	-	-	R	0,01		*
237. Sizerin à tête rouge	0	-	0	0	2,09	*	*
238. Chardonneret des pins	0	C	C	R	4,25		**
239. Chardonneret jaune	C	C	0	-	3,5	*	*
240. Bec-croisé rouge	0	C	0	-	0,48		*
241. Bec-croisé à ailes blanches	0	C	C	0	3,04		*
242. Tohi aux yeux rouges	R	R	-	-	0,06		*
243. Pinson des prés	0	C	R	-	3,75	*	**
244. Pinson de Le Conte	-	R	-	-	0,01		*
245. Pinson à queue aiguë	R	C	-	-	2,76	**	**
246. Pinson vespéral	R	R	R	-	0,44		*
247. Junco ardoisé	C	R	C	-	4,64		**
248. Pinson hudsonien	R	R	C	-	1,54		*
249. Pinson familier	0	R	R	-	1,61	*	**
250. Pinson à couronne blanche	C	0	C	-	3,25	*	*

	<u>P</u> <u>E</u> <u>A</u> <u>H</u>	<u>Prés.</u>	<u>R</u> <u>S</u>
251. Pinson à gorge blanche	C C C -	4,0	* **
252. Pinson fauve	O C O -	4,94	**
253. Pinson de Lincoln	O O R -	1,2	*
254. Pinson des marais	R R R -	1,32	* *
255. Pinson chanteur	C C O -	2,75	** **
256. Bruant lapon	O R R -	1,2	* *
257. Bruant des neiges	O - A O	2,16	* *

BIBLIOGRAPHIE

Références

Annual Reports 1935-1965. The Province of Québec Society for the Protection of Birds.

Arbib, R.S. 1957. "The New-York standards of abundance, frequency and seasonal occurrence". Audubon Field Notes 2:63-64.

Baillargé, W. 1930. Canadian Field-Naturalist 44:120.

Bulletin (and News Letter) 1958-1980. The Province of Québec Society for the Protection of Birds.

Bulletin ornithologique 1956-1980. Club des ornithologues du Québec.

Brown, R.G.B, D.N. Nettleship, P. Germain, C.E. Tull et T. Davis 1975. Atlas des oiseaux de mer de l'est du Canada. Service canadien de la faune, Ottawa.

Cantin, M., A. Bourget, G. Chapdelaine et W.G. Alliston 1976. "Distribution et écologie de la reproduction du Canard chipeau (*Anas strepera*) au Québec." Naturaliste Canadien 103:469-481.

Cayouette, R. 1958. "Historique de l'invasion de l'Etourneau sansonnet dans le Québec." Bull. Orn. 3(2):6-8.

Cayouette, R. 1961. "Quel est le sort de ces Couvées mixtes de canards?" Bull. Orn. 6(1):16.

Cayouette, R. 1962. "Calendrier des migrations automnales des oiseaux du Québec." Bull. Orn. 7(1):7-18.

Cayouette, R. 1963. "Calendrier des migrations printanières des oiseaux du Québec." Bull. Orn. 8(2):7-21.

- David, N. 1976. "Historique de l'établissement du Cardinal au Québec." Bull. Orn. 21:90-92.
- David, N. 1976. "Précisions sur la fréquence de l'hivernage des oiseaux au Québec." Bull. Orn. 21(4):124-133.
- David, N. 1978. Victor Gaboriault, ornithologue. Cahiers d'ornithologie Victor-Gaboriault, numéro 1. Club des ornithologues du Québec.
- David, N. 1980. Etat et distribution des oiseaux du Québec méridional. Cahiers d'ornithologie Victor-Gaboriault, numéro 3. Club des ornithologues du Québec.
- DesGranges, J.-L. 1978. Situation du Grand Héron (*Ardea herodias*) au Québec. Service canadien de la faune. Rapport inédit.
- Dionne, C.E. 1889. Catalogue des oiseaux de la province de Québec. J. Dussault, Québec.
- Dionne, C.E. 1906. Les oiseaux de la province de Québec. Dussault et Proulx, Québec.
- Feuilles de Contact 1972-1980. Club des ornithologues du Québec.
- Gendron, G. 1979. "Compte rendu des observations de l'automne 1979 dans le Bas Saint-Laurent." Bull. Orn. 24(4):116-124.
- Godfrey, W.E. 1966. The birds of Canada, National Museum of Canada. Bulletin no. 203.
- Godfrey, W.E. 1967. Les oiseaux du Canada. Musée National du Canada. Bulletin no. 203.

- Godfrey, W.E. 1972. Encyclopédie des oiseaux du Québec. Les Editions de l'Homme.
- Gosselin, M. 1977. "Historique de l'établissement du Phalarope de Wilson (*Steganopus tricolor*) au Québec." Bull. Orn. 22:114-119.
- Gosselin, M. 1977a. "Notes au sujet de la présence du Grand Labbe au Québec." Bull. Orn. 22:147-149.
- Hamel, D. 1971. "Île-aux-Basques, Rivière-du-Loup. Excursion d'automne. 9, 10, 11 octobre 1971." Bull. Orn. 16(3):71.
- Hamel, F. 1960. "Notes sur le Gerfaut à l'île-aux-Basques." Bull. Orn. 5(2):7.
- Hamel, F. 1960a. "Impressions d'hiver à l'île-aux-Basques." Bull. Orn. 5(2):8-9.
- Hardy, J. 1977. "Etude de la distribution de la Chouette cendrée au Québec." Bull. Orn. 22:14-20.
- Hardy, J. 1977a. "Etude de la distribution du Huart arctique dans l'est de l'Amérique du Nord." Bull. Orn. 22:74-88.
- Lebel, J.-P. 1977. Arrivées printanières des oiseaux dans la région comprise entre L'Isle-Verte et Matane. Miméographié.
- Lebel, J.-P. 1978. Arrivée printanière de l'avifaune dans la région de Rimouski en 1977. Miméographié.
- Lebel, J.-P. 1978a. Arrivée printanière de l'avifaune dans la région comprise entre L'Isle-Verte et Matane, 1960-1977. Miméographié.
- Lewis, H.F. 1932. Canadian Field-Naturalist 46:82.

Meredith, R. 1930. Canadian Field-Naturalist 44:198.

Noël, J.P. 1979. Distribution de la faune avienne. Réserve de L'Isle-Verte Québec. Été 1978: une approche biogéographique. Rapport interne du Service canadien de la faune, Québec. Publication inédite.

Ouellet, H. 1967. "The distribution of the Cerulean Warbler in the province of Quebec, Canada". The Auk 84:272-274.

Ouellet, H. 1973. "The Yellow-breasted Chat in Quebec". Can. Field-Nat. 87:182.

Ouellet, H., R. McNeil et J. Burton 1973. "The Western Sandpiper in Quebec and the Maritimes Provinces, Canada". Can. Field-Nat. 87:291-300.

Pelletier, J.R. 1978. Liste des espèces d'oiseaux observés dans la région du Bas St-Laurent au 31 décembre 1977. Miméographié.

Rapports annuels 1926-1946. Société Provancher d'histoire naturelle du Canada.

Reed, A. 1975. Les colonies d'oiseaux aquatiques dans l'estuaire du St-Laurent. Bulletin no. 19, faune du Québec, ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche.

Tanguay, R. 1964. "Les oiseaux des comtés de Kamouraska, L'Islet et Montmagny, P.Q.". Nat. Can. 91:309-331; 92:8-58.

Taverner, P.A. 1922. Les oiseaux de l'est du Canada. Mémoire 104, Commission géologique, ministère des Mines, Canada.

Tchébec, 1971, 1973-1980. The Province of Quebec Society for the Protection of Birds.

Terrill, L.M. 1961. "Cowbird hosts in Southern Quebec". Can. Field-Nat. 1961 (jan.-mars) 75:2-11.

Wynne, Edwards, V.C. 1938. 'Remarques sur d'autres oiseaux!' Rapp. ann. de la
Soc. Provancher d'hist. naturelle. 1938:22-24.