

PRÉVENTION ET TRAITEMENT DE LA SYPHILIS: conseils pour les organismes communautaires

Mesures que peuvent prendre les fournisseurs de services pour soutenir leurs clients en matière de syphilis



En tant que fournisseur de service, vous êtes un partenaire essentiel pour le Canada dans ses efforts visant à freiner l'augmentation actuelle des cas de syphilis. Grâce à vos liens déjà établis avec des populations clés au sein de la communauté, vous pouvez continuer de normaliser et déstigmatiser les questions de santé sexuelle et agir comme ressource de première ligne pour les clients qui ne se sentent pas à l'aise de recourir au système de santé.

Conseils pour discuter de la prévention et du traitement de la syphilis avec vos clients



Renseignez-vous

Renseignez-vous sur la prévention, le dépistage et le traitement de la syphilis

- Consultez des sources fiables, telles que les renseignements fournis par les gouvernements ou les organismes reconnus en matière de santé sexuelle, afin d'être en mesure de discuter de la prévention et du traitement de la syphilis.
- Pour connaître d'autres sources de renseignements, consultez les sites web suivants:
 - Agence de la santé publique du Canada (ASPC) : <https://www.canada.ca/la-syphilis>,
 - Ressources sur la syphilis, CATIE : <https://www.catie.ca/fr/ressources-sur-la-syphilis>



Parlez-en

Partagez l'information et préparez-vous à répondre à des questions sur la syphilis

Conséquences

- En l'absence de traitement, la syphilis peut entraîner de graves problèmes de santé qui touchent plusieurs organes et systèmes, dont le cerveau, les yeux, le cœur, le système nerveux et les os.
- Une syphilis non traitée durant la grossesse peut provoquer une fausse couche ou la mort de l'enfant à la naissance, ou causer la syphilis congénitale chez l'enfant.
- Toute personne sexuellement active peut attraper la syphilis, et personne n'est à l'abri.
- Les cas de syphilis sont en hausse au Canada. En 2022, 13 953 cas de syphilis infectieuse ont été signalés, de même que 117 cas confirmés de syphilis congénitale précoce.



Canada 

Transmission

- La syphilis est une infection transmissible sexuellement qui se communique par contact direct avec une lésion infectieuse durant un rapport sexuel génital, anal ou oral.
- La syphilis peut également être transmise au bébé durant la grossesse par l'entremise du placenta, ou encore à la naissance par contact direct avec une lésion infectieuse.
- La syphilis est plus contagieuse aux premiers stades de l'infection, au moment où la personne atteinte n'a pas forcément remarqué les symptômes.

Dépistage¹

- Le dépistage de la syphilis se fait habituellement par une analyse sanguine. Il peut également être effectué par le biais d'un prélèvement sur une éruption ou une lésion.
- Le dépistage de la syphilis est recommandé à toute personne sexuellement active avec un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire, ou avec de multiples partenaires, ou encore sur demande du ou de la partenaire.
- Le dépistage de la syphilis tous les 3 à 6 mois est recommandé pour les personnes ayant plusieurs partenaires sexuels.
- Le dépistage systématique est recommandé pour toutes les personnes enceintes, durant le premier trimestre ou lors de la première visite prénatale, et de nouveau au cours du troisième trimestre et à l'accouchement pour les personnes plus à risque.

Traitement

- La syphilis peut être traitée et guérie au moyen d'antibiotiques, habituellement administrés par injection, ce qui peut contribuer à prévenir sa transmission aux partenaires sexuels.
- Le traitement de la syphilis durant la grossesse est sécuritaire et peut prévenir la transmission de l'infection au fœtus en développement.

Suivi

- Le dépistage de suivi sur une base régulière suivant le traitement est important pour confirmer que la syphilis est bel et bien guérie, en plus de faciliter la collecte de renseignements clés sur la santé sexuelle et reproductive pour l'avenir.

Notification

- Les unités de santé publique régionales reçoivent les résultats de dépistage positifs, ce qui facilite leur suivi de l'état de santé de l'ensemble de la communauté.
- Seuls le client, son professionnel de la santé et l'infirmière en santé publique seront informés du résultat positif du dépistage.
- Une infirmière en santé publique peut assister le client dans la démarche d'informer ses partenaires actuels et passés sur l'importance de se faire dépister.



Soutien

Aidez vos clients à naviguer dans les services de santé sexuelle et les services sociaux

- Consultez les sites web suivants pour connaître d'autres sources de renseignements qui vous aideront à guider vos clients à travers les services de santé sexuelle et les services sociaux :
 - Localisateur de services de CATIE : <https://oualler.catie.ca>
 - Services et aides à proximité de l'AFAC : <https://stbbi.nwac.ca/fr/services-et-aides>

¹Pour plus de détails, voir les guides sur les ITSS pour les professionnels de la santé : [Guide sur la Syphilis : Dépistage et test diagnostiques sur le site Canada.ca](#). Les recommandations n'ont pas préséance sur toute exigence de politique ou de pratique législative ou réglementaire provinciale ou territoriale ni sur les lignes directrices provinciales qui régissent la pratique des professionnels de la santé dans leurs juridictions respectives, dont les recommandations peuvent être différentes en raison du contexte épidémiologique ou de la situation dans la région.

