


PRÉVALENCE (12 derniers mois)



FRÉQUENCE D'UTILISATION (12 derniers mois)



Nom de la combinaison, n^{bre} non pondéré de pers. qui consomment (données agrégées), de pers. qui consomment (sources probabiliste et non probabiliste)

TRANCHES D'ÂGE

Répartition, en âge, des personnes ayant combiné des substances comparativement à la distribution nationale des 13 ans et +





SCHÉMA DE COMBINAISON (sur 24 heures)



RAISONS LES PLUS COURANTES DE COMBINER (5 principales)



ÉTATS LES PLUS RECHERCHÉS (5 principaux)




RISQUE PERÇU



PRÉVALENCE EN FONCTION DE LA SANTÉ MENTALE (AUTO-ÉVALUATION)




PRÉVALENCE (12 derniers mois)



TRANCHES D'ÂGE

Répartition, en âge, des personnes ayant combiné des substances comparativement à la distribution nationale des 13 ans et +




FRÉQUENCE D'UTILISATION (12 derniers mois)



SCHÉMA DE COMBINAISON (sur 24 heures)




RAISONS LES PLUS COURANTES DE COMBINER (5 principales)




Cannabis + EVL

Pers. qui consomment n = 386
 Panel probabiliste n = 214
 Panel non probabiliste n = 172


ÉTATS LES PLUS RECHERCHÉS (5 principaux)



RISQUE PERÇU



PRÉVALENCE EN FONCTION DE LA SANTÉ MENTALE (AUTO-ÉVALUATION)



PRÉVALENCE (12 derniers mois)

| | |
|------------|------|
| Pays | 0 %* |
| 13 à 17 | 0 %* |
| 18 à 24 | 0 %* |
| 25 et + | 0 %* |
| Femme | 0 %* |
| Homme | 0 %* |
| Atl. | 0 %* |
| Qc | 0 %* |
| Ont. | 0 %* |
| Man./Sask. | 0 %* |
| Alb. | 0 %* |
| C.-B. | 0 %* |
| Terr. | 0 %* |

* Correspond à un véritable « 0 ».

FRÉQUENCE D'UTILISATION (12 derniers mois)

Analyse masquée : Échantillon insuffisant de réponses à cette question

SCHÉMA DE COMBINAISON (sur 24 heures)

Analyse masquée : Échantillon insuffisant de réponses à cette question

RAISONS LES PLUS COURANTES DE COMBINER (5 principales)

Analyse masquée : Échantillon insuffisant de réponses à cette question

Cannabis + opioïdes non prescrits


Pers. qui consomment n = 7
 Panel probabiliste n = 0
 Panel non probabiliste n = 7

ÉTATS LES PLUS RECHERCHÉS (5 principaux)

Analyse masquée : Échantillon insuffisant de réponses à cette question

RISQUE PERÇU

Pers. qui ne consomment pas



TRANCHES D'ÂGE

Répartition, en âge, des personnes ayant combiné des substances comparativement à la distribution nationale des 13 ans et +


Analyse masquée : Échantillon insuffisant de réponses à cette question

PRÉVALENCE EN FONCTION DE LA SANTÉ MENTALE (AUTO-ÉVALUATION)

| | |
|-----------------------|------|
| Excellente/très bonne | 0 %* |
| Bonne | 0 %* |
| Moins que bonne | 0 %* |

* Correspond à un véritable « 0 ».


PRÉVALENCE (12 derniers mois)



* Correspond à un véritable « 0 ».

TRANCHES D'ÂGE

Répartition, en âge, des personnes ayant combiné des substances comparativement à la distribution nationale des 13 ans et +



FRÉQUENCE D'UTILISATION (12 derniers mois)



SCHÉMA DE COMBINAISON (sur 24 heures)




RAISONS LES PLUS COURANTES DE COMBINER (5 principales)

Analyse masquée : Échantillon insuffisant de réponses à cette question


Cannabis + opioïdes prescrits

Pers. qui consomment n = 41
Panel probabiliste n = 27
Panel non probabiliste n = 14

ÉTATS LES PLUS RECHERCHÉS (5 principaux)




RISQUE PERÇU



PRÉVALENCE EN FONCTION DE LA SANTÉ MENTALE (AUTO-ÉVALUATION)



PRÉVALENCE (12 derniers mois)



FRÉQUENCE D'UTILISATION (12 derniers mois)




Cannabis + autre substance réglementée

Pers. qui consomment n = 135
 Panel probabiliste n = 71
 Panel non probabiliste n = 64


ÉTATS LES PLUS RECHERCHÉS (5 principaux)



SCHÉMA DE COMBINAISON (sur 24 heures)




RISQUE PERÇU




TRANCHES D'ÂGE

Répartition, en âge, des personnes ayant combiné des substances comparativement à la distribution nationale des 13 ans et +




RAISONS LES PLUS COURANTES DE COMBINER (5 principales)



PRÉVALENCE EN FONCTION DE LA SANTÉ MENTALE (AUTO-ÉVALUATION)




PRÉVALENCE (12 derniers mois)



TRANCHES D'ÂGE


Répartition, en âge, des personnes ayant combiné des substances comparativement à la distribution nationale des 13 ans et +




FRÉQUENCE D'UTILISATION (12 derniers mois)



SCHÉMA DE COMBINAISON (sur 24 heures)




RAISONS LES PLUS COURANTES DE COMBINER (5 principales)




Cannabis + médicament

Pers. qui consomment n = 499
 Panel probabiliste n = 252
 Panel non probabiliste n = 247


ÉTATS LES PLUS RECHERCHÉS (5 principaux)




RISQUE PERÇU



PRÉVALENCE EN FONCTION DE LA SANTÉ MENTALE (AUTO-ÉVALUATION)




PRÉVALENCE (12 derniers mois)



TRANCHES D'ÂGE


Répartition, en âge, des personnes ayant combiné des substances comparativement à la distribution nationale des 13 ans et +




FRÉQUENCE D'UTILISATION (12 derniers mois)



SCHÉMA DE COMBINAISON (sur 24 heures)



RAISONS LES PLUS COURANTES DE COMBINER (5 principales)




Cannabis + alcool

Pers. qui consomment
n = 1 278
Panel probabiliste
n = 713
Panel non probabiliste
n = 565

ÉTATS LES PLUS RECHERCHÉS (5 principaux)




RISQUE PERÇU



PRÉVALENCE EN FONCTION DE LA SANTÉ MENTALE (AUTO-ÉVALUATION)




PRÉVALENCE (12 derniers mois)



TRANCHES D'ÂGE

Répartition, en âge, des personnes ayant combiné des substances comparativement à la distribution nationale des 13 ans et +




FRÉQUENCE D'UTILISATION (12 derniers mois)



SCHÉMA DE COMBINAISON (sur 24 heures)



RAISONS LES PLUS COURANTES DE COMBINER (5 principales)




Alcool + EVL

Pers. qui consomment n = 944
 Panel probabiliste n = 517
 Panel non probabiliste n = 427

ÉTATS LES PLUS RECHERCHÉS (5 principaux)



RISQUE PERÇU



PRÉVALENCE EN FONCTION DE LA SANTÉ MENTALE (AUTO-ÉVALUATION)



PRÉVALENCE (12 derniers mois)

| | |
|------------|------|
| Pays | 0 % |
| 13 à 17 | 0 %* |
| 18 à 24 | 0 %* |
| 25 et + | 0 % |
| Femme | 0 % |
| Homme | 0 % |
| Atl. | 0 % |
| Qc | 0 % |
| Ont. | 0 % |
| Man./Sask. | 0 %* |
| Alb. | 0 %* |
| C.-B. | 0 % |
| Terr. | 0 %* |

* Correspond à un véritable « 0 ».

TRANCHES D'ÂGE

Répartition, en âge, des personnes ayant combiné des substances comparativement à la distribution nationale des 13 ans et +

Analyse masquée : Échantillon insuffisant de réponses à cette question

FRÉQUENCE D'UTILISATION (12 derniers mois)

Analyse masquée : Échantillon insuffisant de réponses à cette question

SCHÉMA DE COMBINAISON (sur 24 heures)

Analyse masquée : Échantillon insuffisant de réponses à cette question

RAISONS LES PLUS COURANTES DE COMBINER (5 principales)

Analyse masquée : Échantillon insuffisant de réponses à cette question

Alcool + opioïdes non prescrits

Pers. qui consomment
n = 13


Panel probabiliste
n = 2

Panel non probabiliste
n = 11

ÉTATS LES PLUS RECHERCHÉS (5 principaux)

Analyse masquée : Échantillon insuffisant de réponses à cette question


RISQUE PERÇU



PRÉVALENCE EN FONCTION DE LA SANTÉ MENTALE (AUTO-ÉVALUATION)

| | |
|-----------------------|-----|
| Excellente/très bonne | 0 % |
| Bonne | 0 % |
| Moins que bonne | 1 % |

PRÉVALENCE (12 derniers mois)



FRÉQUENCE D'UTILISATION (12 derniers mois)



Alcool + opioïdes prescrits

Pers. qui consomment n = 53
 Panel probabiliste n = 23
 Panel non probabiliste n = 30


ÉTATS LES PLUS RECHERCHÉS (5 principaux)



SCHÉMA DE COMBINAISON (sur 24 heures)




RISQUE PERÇU



TRANCHES D'ÂGE


Répartition, en âge, des personnes ayant combiné des substances comparativement à la distribution nationale des 13 ans et +




RAISONS LES PLUS COURANTES DE COMBINER (5 principales)

Analyse masquée : Échantillon insuffisant de réponses à cette question

PRÉVALENCE EN FONCTION DE LA SANTÉ MENTALE (AUTO-ÉVALUATION)



PRÉVALENCE (12 derniers mois)



FRÉQUENCE D'UTILISATION (12 derniers mois)



Alcool + autre substance réglementée

Pers. qui consomment n = 197
 Panel probabiliste n = 100
 Panel non probabiliste n = 97

ÉTATS LES PLUS RECHERCHÉS (5 principaux)






SCHÉMA DE COMBINAISON (sur 24 heures)




TRANCHES D'ÂGE


Répartition, en âge, des personnes ayant combiné des substances comparativement à la distribution nationale des 13 ans et +




RAISONS LES PLUS COURANTES DE COMBINER (5 principales)




RISQUE PERÇU



PRÉVALENCE EN FONCTION DE LA SANTÉ MENTALE (AUTO-ÉVALUATION)




PRÉVALENCE (12 derniers mois)



TRANCHES D'ÂGE

Répartition, en âge, des personnes ayant combiné des substances comparativement à la distribution nationale des 13 ans et +




FRÉQUENCE D'UTILISATION (12 derniers mois)



SCHÉMA DE COMBINAISON (sur 24 heures)



RAISONS LES PLUS COURANTES DE COMBINER (5 principales)




Alcool + médicament

Pers. qui consomment n = 932
 Panel probabiliste n = 495
 Panel non probabiliste n = 437

ÉTATS LES PLUS RECHERCHÉS (5 principaux)




RISQUE PERÇU



PRÉVALENCE EN FONCTION DE LA SANTÉ MENTALE (AUTO-ÉVALUATION)




PRÉVALENCE (12 derniers mois)



TRANCHES D'ÂGE

Répartition, en âge, des personnes ayant combiné des substances comparativement à la distribution nationale des 13 ans et +




FRÉQUENCE D'UTILISATION (12 derniers mois)



SCHÉMA DE COMBINAISON (sur 24 heures)




RAISONS LES PLUS COURANTES DE COMBINER (5 principales)




Médicament + EVL

Pers. qui consomment n = 565
 Panel probabiliste n = 309
 Panel non probabiliste n = 256


ÉTATS LES PLUS RECHERCHÉS (5 principaux)



RISQUE PERÇU



PRÉVALENCE EN FONCTION DE LA SANTÉ MENTALE (AUTO-ÉVALUATION)



PRÉVALENCE (12 derniers mois)

| | |
|------------|------|
| Pays | 0 % |
| 13 à 17 | 0 %* |
| 18 à 24 | 0 %* |
| 25 et + | 0 % |
| Femme | 0 %* |
| Homme | 0 % |
| Atl. | 0 % |
| Qc | 0 % |
| Ont. | 0 % |
| Man./Sask. | 0 %* |
| Alb. | 0 %* |
| C.-B. | 0 % |
| Terr. | 0 %* |

* Correspond à un véritable « 0 ».

FRÉQUENCE D'UTILISATION (12 derniers mois)

Analyse masquée : Échantillon insuffisant de réponses à cette question

SCHÉMA DE COMBINAISON (sur 24 heures)

Analyse masquée : Échantillon insuffisant de réponses à cette question

RAISONS LES PLUS COURANTES DE COMBINER (5 principales)

Analyse masquée : Échantillon insuffisant de réponses à cette question


Médicament + opioïdes non prescrits

Pers. qui consomment n = 8
 Panel probabiliste n = 1
 Panel non probabiliste n = 7

ÉTATS LES PLUS RECHERCHÉS (5 principaux)

Analyse masquée : Échantillon insuffisant de réponses à cette question

RISQUE PERÇU



TRANCHES D'ÂGE

Répartition, en âge, des personnes ayant combiné des substances comparativement à la distribution nationale des 13 ans et +


Analyse masquée : Échantillon insuffisant de réponses à cette question

PRÉVALENCE EN FONCTION DE LA SANTÉ MENTALE (AUTO-ÉVALUATION)

| | |
|-----------------------|------|
| Excellente/très bonne | 0 %* |
| Bonne | 0 % |
| Moins que bonne | 0 % |


* Correspond à un véritable « 0 ».

PRÉVALENCE (12 derniers mois)



TRANCHES D'ÂGE

Répartition, en âge, des personnes ayant combiné des substances comparativement à la distribution nationale des 13 ans et +




FRÉQUENCE D'UTILISATION (12 derniers mois)



SCHÉMA DE COMBINAISON (sur 24 heures)




RAISONS LES PLUS COURANTES DE COMBINER (5 principales)




Médicament + opioïdes prescrits

Pers. qui consomment n = 65
 Panel probabiliste n = 34
 Panel non probabiliste n = 31

ÉTATS LES PLUS RECHERCHÉS (5 principaux)




RISQUE PERÇU



PRÉVALENCE EN FONCTION DE LA SANTÉ MENTALE (AUTO-ÉVALUATION)



PRÉVALENCE (12 derniers mois)



FRÉQUENCE D'UTILISATION (12 derniers mois)




Médicament + autre substance réglementée

Pers. qui consomment n = 75
 Panel probabiliste n = 18
 Panel non probabiliste n = 57


ÉTATS LES PLUS RECHERCHÉS (5 principaux)



SCHÉMA DE COMBINAISON (sur 24 heures)




RISQUE PERÇU




TRANCHES D'ÂGE

Répartition, en âge, des personnes ayant combiné des substances comparativement à la distribution nationale des 13 ans et +




RAISONS LES PLUS COURANTES DE COMBINER (5 principales)



PRÉVALENCE EN FONCTION DE LA SANTÉ MENTALE (AUTO-ÉVALUATION)




PRÉVALENCE (12 derniers mois)



TRANCHES D'ÂGE


Répartition, en âge, des personnes ayant combiné des substances comparativement à la distribution nationale des 13 ans et +




FRÉQUENCE D'UTILISATION (12 derniers mois)



SCHÉMA DE COMBINAISON (sur 24 heures)



RAISONS LES PLUS COURANTES DE COMBINER (5 principales)



Deux médicaments

Pers. qui consomment n = 202


Panel probabiliste n = 69

Panel non probabiliste n = 133


ÉTATS LES PLUS RECHERCHÉS (5 principaux)




RISQUE PERÇU



PRÉVALENCE EN FONCTION DE LA SANTÉ MENTALE (AUTO-ÉVALUATION)



PRÉVALENCE (12 derniers mois)



FRÉQUENCE D'UTILISATION (12 derniers mois)



Autre substance réglementée + EVL

Pers. qui consomment
n = 32
Panel probabiliste
n = 9
Panel non probabiliste
n = 23


ÉTATS LES PLUS RECHERCHÉS (5 principaux)



SCHÉMA DE COMBINAISON (sur 24 heures)




RISQUE PERÇU



TRANCHES D'ÂGE


Répartition, en âge, des personnes ayant combiné des substances comparativement à la distribution nationale des 13 ans et +



RAISONS LES PLUS COURANTES DE COMBINER (5 principales)

Analyse masquée : Échantillon insuffisant de réponses à cette question

PRÉVALENCE EN FONCTION DE LA SANTÉ MENTALE (AUTO-ÉVALUATION)



PRÉVALENCE (12 derniers mois)

| | |
|------------|------|
| Pays | 0 % |
| 13 à 17 | 0 %* |
| 18 à 24 | 0 %* |
| 25 et + | 0 % |
| Femme | 0 % |
| Homme | 0 % |
| Atl. | 0 %* |
| Qc | 0 % |
| Ont. | 0 %* |
| Man./Sask. | 0 %* |
| Alb. | 0 %* |
| C.-B. | 0 % |
| Terr. | 0 %* |

* Correspond à un véritable « 0 ».

FRÉQUENCE D'UTILISATION (12 derniers mois)

Analyse masquée : Échantillon insuffisant de réponses à cette question

SCHÉMA DE COMBINAISON (sur 24 heures)

Analyse masquée : Échantillon insuffisant de réponses à cette question

Autre substance réglementée + opioïdes non prescrits

Pers. qui consomment n = 9
 Panel probabiliste n = 1
 Panel non probabiliste n = 8

ÉTATS LES PLUS RECHERCHÉS (5 principaux)

Analyse masquée : Échantillon insuffisant de réponses à cette question

TRANCHES D'ÂGE


Répartition, en âge, des personnes ayant combiné des substances comparativement à la distribution nationale des 13 ans et +

Analyse masquée : Échantillon insuffisant de réponses à cette question

RAISONS LES PLUS COURANTES DE COMBINER (5 principales)

Analyse masquée : Échantillon insuffisant de réponses à cette question

RISQUE PERÇU



PRÉVALENCE EN FONCTION DE LA SANTÉ MENTALE (AUTO-ÉVALUATION)

| | |
|-----------------------|------|
| Excellente/très bonne | 0 % |
| Bonne | 0 %* |
| Moins que bonne | 0 % |

* Correspond à un véritable « 0 ».

PRÉVALENCE (12 derniers mois)

| | |
|------------|------|
| Pays | 0 % |
| 13 à 17 | 0 %* |
| 18 à 24 | 0 %* |
| 25 et + | 0 % |
| Femme | 0 %* |
| Homme | 0 % |
| Atl. | 0 %* |
| Qc | 0 % |
| Ont. | 0 % |
| Man./Sask. | 0 %* |
| Alb. | 0 %* |
| C.-B. | 0 % |
| Terr. | 0 %* |

* Correspond à un véritable « 0 ».

FRÉQUENCE D'UTILISATION (12 derniers mois)

Analyse masquée : Échantillon insuffisant de réponses à cette question

SCHÉMA DE COMBINAISON (sur 24 heures)

Analyse masquée : Échantillon insuffisant de réponses à cette question

RAISONS LES PLUS COURANTES DE COMBINER (5 principales)

Analyse masquée : Échantillon insuffisant de réponses à cette question

TRANCHES D'ÂGE

Répartition, en âge, des personnes ayant combiné des substances comparativement à la distribution nationale des 13 ans et +

Analyse masquée : Échantillon insuffisant de réponses à cette question


Autre substance réglementée + opioïdes prescrits

Pers. qui consomment n = 3
 Panel probabiliste n = 1
 Panel non probabiliste n = 2

ÉTATS LES PLUS RECHERCHÉS (5 principaux)

Analyse masquée : Échantillon insuffisant de réponses à cette question


RISQUE PERÇU



PRÉVALENCE EN FONCTION DE LA SANTÉ MENTALE (AUTO-ÉVALUATION)


| | |
|-----------------------|-----|
| Excellente/très bonne | 0 % |
| Bonne | 0 % |
| Moins que bonne | 0 % |

PRÉVALENCE (12 derniers mois)



TRANCHES D'ÂGE

Répartition, en âge, des personnes ayant combiné des substances comparativement à la distribution nationale des 13 ans et +




FRÉQUENCE D'UTILISATION (12 derniers mois)



SCHÉMA DE COMBINAISON (sur 24 heures)



RAISONS LES PLUS COURANTES DE COMBINER (5 principales)




Deux autres substances réglementées

Pers. qui consomment n = 41
 Panel probabiliste n = 9
 Panel non probabiliste n = 32

ÉTATS LES PLUS RECHERCHÉS (5 principaux)




RISQUE PERÇU




PRÉVALENCE EN FONCTION DE LA SANTÉ MENTALE (AUTO-ÉVALUATION)



PRÉVALENCE (12 derniers mois)



FRÉQUENCE D'UTILISATION (12 derniers mois)



Opioides prescrits + EVL

Pers. qui consomment
n = 76
Panel probabiliste
n = 45
Panel non probabiliste
n = 31

ÉTATS LES PLUS RECHERCHÉS (5 principaux)




SCHÉMA DE COMBINAISON (sur 24 heures)




TRANCHES D'ÂGE


Répartition, en âge, des personnes ayant combiné des substances comparativement à la distribution nationale des 13 ans et +



RAISONS LES PLUS COURANTES DE COMBINER (5 principales)



RISQUE PERÇU



PRÉVALENCE EN FONCTION DE LA SANTÉ MENTALE (AUTO-ÉVALUATION)



PRÉVALENCE (12 derniers mois)

| | |
|------------|------|
| Pays | 0 % |
| 13 à 17 | 0 %* |
| 18 à 24 | 0 %* |
| 25 et + | 0 % |
| Femme | 0 % |
| Homme | 0 %* |
| Atl. | 0 %* |
| Qc | 0 %* |
| Ont. | 0 %* |
| Man./Sask. | 0 %* |
| Alb. | 0 %* |
| C.-B. | 0 % |
| Terr. | 0 %* |

* Correspond à un véritable « 0 ».

TRANCHES D'ÂGE

Répartition, en âge, des personnes ayant combiné des substances comparativement à la distribution nationale des 13 ans et +

Analyse masquée : Échantillon insuffisant de réponses à cette question

FRÉQUENCE D'UTILISATION (12 derniers mois)

Analyse masquée : Échantillon insuffisant de réponses à cette question

SCHÉMA DE COMBINAISON (sur 24 heures)

Analyse masquée : Échantillon insuffisant de réponses à cette question

RAISONS LES PLUS COURANTES DE COMBINER (5 principales)

Analyse masquée : Échantillon insuffisant de réponses à cette question


Opioides non prescrits + EVL

Pers. qui consomment n = 5
Panel probabiliste n = 0
Panel non probabiliste n = 5

ÉTATS LES PLUS RECHERCHÉS (5 principaux)

Analyse masquée : Échantillon insuffisant de réponses à cette question

RISQUE PERÇU



PRÉVALENCE EN FONCTION DE LA SANTÉ MENTALE (AUTO-ÉVALUATION)

| | |
|-----------------------|------|
| Excellente/très bonne | 0 %* |
| Bonne | 0 %* |
| Moins que bonne | 0 % |

* Correspond à un véritable « 0 ».