



PRÉVALENCE (12 derniers mois)



FRÉQUENCE D'UTILISATION (30 derniers jours, pers. ayant consommé)



USAGE SOUS ORDONNANCE/EVL (lorsqu'applicable)




Nom de la substance, n^{bre} non pondéré de pers. qui consomment (données agrégées), de pers. qui consomment (sources probabiliste et non probabiliste)

EXPÉRIENCE VÉCUE




TRANCHES D'ÂGE

Répartition, en âge, des personnes ayant fait usage de substance comparativement à la distribution nationale des 13 ans et +



ÉTATS LES PLUS RECHERCHÉS (5 principaux)




RISQUE PERÇU*




PRÉVALENCE EN FONCTION DE LA SANTÉ MENTALE (AUTO-ÉVALUATION)



PRÉVALENCE (12 derniers mois)



FRÉQUENCE D'UTILISATION (30 derniers jours, pers. ayant consommé)




USAGE SOUS ORDONNANCE/EVL (lorsqu'applicable)



Cannabis


Pers. qui consomment
n = 2 524
Panel probabiliste
n = 1 338
Panel non probabiliste
n = 1 186

EXPÉRIENCE VÉCUE




TRANCHES D'ÂGE


Répartition, en âge, des personnes ayant fait usage de substance comparativement à la distribution nationale des 13 ans et +



ÉTATS LES PLUS RECHERCHÉS (5 principaux)




RISQUE PERÇU*




*Les réponses <2% ne sont pas indiquées


PRÉVALENCE EN FONCTION DE LA SANTÉ MENTALE (AUTO-ÉVALUATION)



PRÉVALENCE (12 derniers mois)



FRÉQUENCE D'UTILISATION (30 derniers jours, pers. ayant consommé)




USAGE SOUS ORDONNANCE/EVL (lorsqu'applicable)

Sans objet

Alcool


Pers. qui consomment
n = 6 578
Panel probabiliste
n = 3 510
Panel non probabiliste
n = 3 068

EXPÉRIENCE VÉCUE




TRANCHES D'ÂGE


Répartition, en âge, des personnes ayant fait usage de substance comparativement à la distribution nationale des 13 ans et +



ÉTATS LES PLUS RECHERCHÉS (5 principaux)




RISQUE PERÇU*




*Les réponses <2% ne sont pas indiquées


PRÉVALENCE EN FONCTION DE LA SANTÉ MENTALE (AUTO-ÉVALUATION)



PRÉVALENCE (12 derniers mois)



FRÉQUENCE D'UTILISATION (30 derniers jours, pers. ayant consommé)




USAGE SOUS ORDONNANCE/EVL (lorsqu'applicable)

Sans objet

Nicotine


Pers. qui consomment
n = 1 596
Panel probabiliste
n = 728
Panel non probabiliste
n = 868

EXPÉRIENCE VÉCUE




TRANCHES D'ÂGE


Répartition, en âge, des personnes ayant fait usage de substance comparativement à la distribution nationale des 13 ans et +



ÉTATS LES PLUS RECHERCHÉS (5 principaux)




RISQUE PERÇU*




*Les réponses <2% ne sont pas indiquées

PRÉVALENCE EN FONCTION DE LA SANTÉ MENTALE (AUTO-ÉVALUATION)




PRÉVALENCE (12 derniers mois)




TRANCHES D'ÂGE


Répartition, en âge, des personnes ayant fait usage de substance comparativement à la distribution nationale des 13 ans et +




FRÉQUENCE D'UTILISATION (30 derniers jours, pers. ayant consommé)



USAGE SOUS ORDONNANCE/EVL (lorsqu'applicable)




ÉTATS LES PLUS RECHERCHÉS (5 principaux)




Opiïdes prescrits

Pers. qui consomment n = 375
Panel probabiliste n = 213
Panel non probabiliste n = 162

EXPÉRIENCE VÉCUE



RISQUE PERÇU*




*Les réponses <2% ne sont pas indiquées

PRÉVALENCE EN FONCTION DE LA SANTÉ MENTALE (AUTO-ÉVALUATION)




PRÉVALENCE (12 derniers mois)




TRANCHES D'ÂGE

Répartition, en âge, des personnes ayant fait usage de substance comparativement à la distribution nationale des 13 ans et +



FRÉQUENCE D'UTILISATION (30 derniers jours, pers. ayant consommé)



USAGE SOUS ORDONNANCE/EVL (lorsqu'applicable)



ÉTATS LES PLUS RECHERCHÉS (5 principaux)




Opiïdes non prescrits

Pers. qui consomment n = 55
 Panel probabiliste n = 9
 Panel non probabiliste n = 46

EXPÉRIENCE VÉCUE




RISQUE PERÇU*




*Les réponses <2% ne sont pas indiquées

PRÉVALENCE EN FONCTION DE LA SANTÉ MENTALE (AUTO-ÉVALUATION)




PRÉVALENCE (12 derniers mois)




TRANCHES D'ÂGE

Répartition, en âge, des personnes ayant fait usage de substance comparativement à la distribution nationale des 13 ans et +




FRÉQUENCE D'UTILISATION (30 derniers jours, pers. ayant consommé)



USAGE SOUS ORDONNANCE/EVL (lorsqu'applicable)




ÉTATS LES PLUS RECHERCHÉS (5 principaux)




Anxiolytiques

Pers. qui consomment
n = 941
Panel probabiliste
n = 437
Panel non probabiliste
n = 504

EXPÉRIENCE VÉCUE




RISQUE PERÇU*




*Les réponses <2% ne sont pas indiquées

PRÉVALENCE EN FONCTION DE LA SANTÉ MENTALE (AUTO-ÉVALUATION)




PRÉVALENCE (12 derniers mois)




TRANCHES D'ÂGE


Répartition, en âge, des personnes ayant fait usage de substance comparativement à la distribution nationale des 13 ans et +




FRÉQUENCE D'UTILISATION (30 derniers jours, pers. ayant consommé)



USAGE SOUS ORDONNANCE/EVL (lorsqu'applicable)




ÉTATS LES PLUS RECHERCHÉS (5 principaux)




Sédatifs ou somnifères

Pers. qui consomment n = 1 077
Panel probabiliste n = 523
Panel non probabiliste n = 554

EXPÉRIENCE VÉCUE




RISQUE PERÇU*




*Les réponses <2% ne sont pas indiquées

PRÉVALENCE EN FONCTION DE LA SANTÉ MENTALE (AUTO-ÉVALUATION)




PRÉVALENCE (12 derniers mois)




TRANCHES D'ÂGE


Répartition, en âge, des personnes ayant fait usage de substance comparativement à la distribution nationale des 13 ans et +




FRÉQUENCE D'UTILISATION (30 derniers jours, pers. ayant consommé)



USAGE SOUS ORDONNANCE/EVL (lorsqu'applicable)




ÉTATS LES PLUS RECHERCHÉS (5 principaux)




Antidépresseurs

Pers. qui consomment
n = 1 174
Panel probabiliste
n = 538
Panel non probabiliste
n = 636


EXPÉRIENCE VÉCUE




RISQUE PERÇU*



PRÉVALENCE EN FONCTION DE LA SANTÉ MENTALE (AUTO-ÉVALUATION)




PRÉVALENCE (12 derniers mois)




TRANCHES D'ÂGE


Répartition, en âge, des personnes ayant fait usage de substance comparativement à la distribution nationale des 13 ans et +




FRÉQUENCE D'UTILISATION (30 derniers jours, pers. ayant consommé)



USAGE SOUS ORDONNANCE/EVL (lorsqu'applicable)



ÉTATS LES PLUS RECHERCHÉS (5 principaux)




Stimulants

Pers. qui consomment n = 346
 Panel probabiliste n = 173
 Panel non probabiliste n = 173

EXPÉRIENCE VÉCUE




RISQUE PERÇU*




*Les réponses <2% ne sont pas indiquées


PRÉVALENCE EN FONCTION DE LA SANTÉ MENTALE (AUTO-ÉVALUATION)



PRÉVALENCE (12 derniers mois)



FRÉQUENCE D'UTILISATION (30 derniers jours, pers. ayant consommé)



USAGE SOUS ORDONNANCE/EVL (lorsqu'applicable)

Sans objet

Cocaïne ou crack

Pers. qui consomment
n = 182
Panel probabiliste
n = 69
Panel non probabiliste
n = 113


EXPÉRIENCE VÉCUE




TRANCHES D'ÂGE

Répartition, en âge, des personnes ayant fait usage de substance comparativement à la distribution nationale des 13 ans et +


Âge moyen, 1^{re} consommation :
Pays : 22,1
Homme : 21,6
Femme : 23,0



ÉTATS LES PLUS RECHERCHÉS (5 principaux)



RISQUE PERÇU*



*Les réponses <2% ne sont pas indiquées


PRÉVALENCE EN FONCTION DE LA SANTÉ MENTALE (AUTO-ÉVALUATION)



PRÉVALENCE (12 derniers mois)



FRÉQUENCE D'UTILISATION (30 derniers jours, pers. ayant consommé)




USAGE SOUS ORDONNANCE/EVL (lorsqu'applicable)


Sans objet

TRANCHES D'ÂGE

Répartition, en âge, des personnes ayant fait usage de substance comparativement à la distribution nationale des 13 ans et +



ÉTATS LES PLUS RECHERCHÉS (5 principaux)




MDMA ou ecstasy

Pers. qui consomment n = 116
Panel probabiliste n = 53
Panel non probabiliste n = 63

EXPÉRIENCE VÉCUE



RISQUE PERÇU*




*Les réponses <2% ne sont pas indiquées

PRÉVALENCE EN FONCTION DE LA SANTÉ MENTALE (AUTO-ÉVALUATION)




PRÉVALENCE (12 derniers mois)




TRANCHES D'ÂGE

Répartition, en âge, des personnes ayant fait usage de substance comparativement à la distribution nationale des 13 ans et +




FRÉQUENCE D'UTILISATION (30 derniers jours, pers. ayant consommé)



USAGE SOUS ORDONNANCE/EVL (lorsqu'applicable)

Sans objet


ÉTATS LES PLUS RECHERCHÉS (5 principaux)




Hallucinogènes

Pers. qui consomment n = 387
Panel probabiliste n = 237
Panel non probabiliste n = 150

EXPÉRIENCE VÉCUE




RISQUE PERÇU*




*Les réponses <2% ne sont pas indiquées

PRÉVALENCE EN FONCTION DE LA SANTÉ MENTALE (AUTO-ÉVALUATION)




PRÉVALENCE (12 derniers mois)




TRANCHES D'ÂGE

Répartition, en âge, des personnes ayant fait usage de substance comparativement à la distribution nationale des 13 ans et +




FRÉQUENCE D'UTILISATION (30 derniers jours, pers. ayant consommé)



USAGE SOUS ORDONNANCE/EVL (lorsqu'applicable)

Sans objet

ÉTATS LES PLUS RECHERCHÉS (5 principaux)




Méthamphétamines

Pers. qui consomment n = 71
Panel probabiliste n = 19
Panel non probabiliste n = 52

EXPÉRIENCE VÉCUE



RISQUE PERÇU*




*Les réponses <2% ne sont pas indiquées

PRÉVALENCE EN FONCTION DE LA SANTÉ MENTALE (AUTO-ÉVALUATION)




PRÉVALENCE (12 derniers mois)




*Le taux représente <1%

TRANCHES D'ÂGE

Répartition, en âge, des personnes ayant fait usage de substance comparativement à la distribution nationale des 13 ans et +




FRÉQUENCE D'UTILISATION (30 derniers jours, pers. ayant consommé)



USAGE SOUS ORDONNANCE/EVL (lorsqu'applicable)

Sans objet


ÉTATS LES PLUS RECHERCHÉS (5 principaux)




Sels de bain

Pers. qui consomment n = 133
Panel probabiliste n = 15
Panel non probabiliste n = 118

EXPÉRIENCE VÉCUE




RISQUE PERÇU*




*Les réponses <2% ne sont pas indiquées

PRÉVALENCE EN FONCTION DE LA SANTÉ MENTALE (AUTO-ÉVALUATION)




PRÉVALENCE (12 derniers mois)




*Le taux représente <1%

TRANCHES D'ÂGE

Répartition, en âge, des personnes ayant fait usage de substance comparativement à la distribution nationale des 13 ans et +




FRÉQUENCE D'UTILISATION (30 derniers jours, pers. ayant consommé)



USAGE SOUS ORDONNANCE/EVL (lorsqu'applicable)

Sans objet

ÉTATS LES PLUS RECHERCHÉS (5 principaux)




Substances inhalées

Pers. qui consomment n = 66
Panel probabiliste n = 14
Panel non probabiliste n = 52

EXPÉRIENCE VÉCUE



RISQUE PERÇU*




*Les réponses <2% ne sont pas indiquées

PRÉVALENCE EN FONCTION DE LA SANTÉ MENTALE (AUTO-ÉVALUATION)




PRÉVALENCE (12 derniers mois)




TRANCHES D'ÂGE

Répartition, en âge, des personnes ayant fait usage de substance comparativement à la distribution nationale des 13 ans et +




FRÉQUENCE D'UTILISATION (30 derniers jours, pers. ayant consommé)



USAGE SOUS ORDONNANCE/EVL (lorsqu'applicable)



ÉTATS LES PLUS RECHERCHÉS (5 principaux)




EVL non conformément aux indications

Pers. qui consomment
 n = 405
 Panel probabiliste
 n = 171
 Panel non probabiliste
 n = 234

EXPÉRIENCE VÉCUE



RISQUE PERÇU*



*Les réponses <2% ne sont pas indiquées

PRÉVALENCE EN FONCTION DE LA SANTÉ MENTALE (AUTO-ÉVALUATION)

