



Implants mammaires

FACTEURS À CONSIDÉRER

Vous envisagez peut-être la pose d'un implant mammaire pour la reconstruction d'un sein après une mastectomie. Vous songez peut-être à augmenter la taille d'un sein, modifier son apparence ou remplacer un implant existant.

Avant de prendre une décision concernant la pose d'implants mammaires, vous devez être au courant de ce qui suit :

- Les risques et les avantages des différents types d'implants
- Toute modification de la forme d'un sein peut être irréversible
- Plus vous portez des implants mammaires longtemps, plus le risque est grand que vous ayez des complications
- Certaines de ces complications nécessiteront d'autres opérations
- Les implants mammaires ne sont pas conçus pour durer toute une vie et devront être retirés ou remplacés un jour ou l'autre

Ces renseignements ne constituent pas un avis médical. Discutez des avantages et des risques avec votre médecin ou votre chirurgien avant toute pose d'implant mammaire et examinez toutes vos options.

Après l'opération, vous devriez consulter votre médecin si vous :

- développez des complications
- avez des préoccupations à propos de votre implant
- présentez des signes ou des symptômes liés au lymphome anaplasique à grandes cellules associé aux implants mammaires



Santé
Canada Health
Canada

Canada

CE QUE VOUS DEVRIEZ SAVOIR

- Les implants mammaires ne sont pas conçus pour durer toute une vie.
- Vous devrez peut-être remplacer un implant si vous avez des complications ou si l'implant ne répond pas à vos besoins (par exemple, la taille ou la forme).
- Vous devriez demander à votre chirurgien une copie de la fiche d'enregistrement de l'implant mammaire, qui contient de l'information comme le nom du fabricant, le modèle et le numéro de série. Cette information est importante et vous aidera à déterminer si un avis concernant le produit ou un rappel du produit vous concerne ou concerne votre implant.
- Vous pouvez également demander à votre chirurgien une copie des renseignements détaillés sur l'implant mammaire fournis par le fabricant.
- Votre chirurgien et vous devriez signer un formulaire de consentement éclairé avant tout traitement. Cette étape est importante pour reconnaître que votre chirurgien vous a expliqué les risques et les avantages de l'opération et des implants.
- Vous devriez demander à votre chirurgien de fournir les détails de l'opération dans une lettre adressée à votre médecin de famille ou à votre professionnel de la santé. Il est important de faire un suivi médical régulier auprès d'un professionnel de la santé afin de détecter tout problème après l'opération.

QUESTIONS QUE VOUS POUVEZ POSER À VOTRE CHIRURGIEN AVANT L'OPÉRATION

- Quel type d'implant le chirurgien recommande-t-il et pourquoi?
- Outre l'implant, quels autres types de matériaux peuvent être utilisés au cours de l'opération (par exemple, treillis, pinces, timbres)?
- Quels sont les risques et les effets secondaires possibles?
- Quels sont les titres de compétences du chirurgien et quels sont ses antécédents de pratique de cette intervention, du retrait d'implants et de l'extraction de capsules de tissu cicatriciel?
- Quel est le coût de l'opération?
- Quels sont les coûts futurs pour faire enlever ou remplacer un implant?
- Quels sont les coûts futurs liés au traitement de complications possibles à la suite de la pose d'implants?
- Quand une opération de remplacement peut-elle être nécessaire?

Vous trouverez [ici](#) d'autres questions que vous pouvez poser à votre chirurgien.

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES

Immédiatement après l'opération:

- Douleur
- Enflure
- Saignements
- Infection
- Changements dans la sensation au niveau du sein ou du mamelon

Dans certains cas, d'autres opérations pourraient s'avérer nécessaires :

- quand un événement indésirable survient après l'intervention initiale
- si la forme ou la taille de l'implant ne convient pas

Parmi les événements indésirables, mentionnons :

- le positionnement incorrect de l'implant
- une rupture (l'enveloppe de l'implant se rompt ou se déchire)
- le resserrement ou le durcissement du tissu cicatriciel autour de l'implant (un phénomène appelé contracture capsulaire)

Une personne ayant un implant mammaire peut présenter divers symptômes ou développer différentes maladies, comme de la fatigue et des problèmes de mémoire ou de concentration. On rapporte également des maladies auto-immunes, lorsque le corps s'attaque par erreur à des cellules, des tissus ou des organes sains. On fait parfois référence à ces symptômes ou ces maladies comme la maladie des implants mammaires. On ne comprend pas encore la mesure dans laquelle et la manière dont ces symptômes ou ces maladies sont liés aux implants mammaires.

Dans de rares cas, il est possible qu'une personne développe un lymphome anaplasique à grandes cellules associé aux implants mammaires (appelé LAGC-AIM, un type de lymphome non hodgkinien, c'est-à-dire un cancer du système immunitaire). Les symptômes du lymphome anaplasique à grandes cellules associé aux implants mammaires peuvent apparaître des mois ou des années après la pose de l'implant.

Vous devriez examiner régulièrement vos seins à la recherche de tout changement inhabituel, comme :

- une enflure soudaine ou la présence d'une bosse
- une rougeur, une douleur ou une éruption cutanée
- du capitonnage, un plissement ou un renflement de la peau
- un mamelon qui change de place ou qui s'inverse (pointe vers l'intérieur)

Discutez de tout signe ou symptôme avec votre professionnel de la santé dès que possible et [signalez-les](#) à Santé Canada.

Vous trouverez d'autres risques et événements indésirables possibles [ici](#). Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur le LAGC-AIM [ici](#).

Renseignez-vous davantage sur les implants mammaires.
