


Outil de surveillance des sécheresses au Canada

Conditions en date du 31 décembre 2025



Une grande partie du Canada a reçu d'importantes précipitations en décembre, ce qui a considérablement amélioré les conditions relatives à la sécheresse. Malgré une amélioration importante dans la plupart des régions du pays, toutes les provinces et tous les territoires ont continué d'être touchés par la sécheresse. L'Ouest canadien a connu une amélioration notable, en particulier le sud de la Colombie-Britannique, la région de la rivière de la Paix et le nord des Prairies. Une grande partie de l'est du Canada a également reçu suffisamment de précipitations pour que les conditions générales s'améliorent. Cependant, certaines parties de l'est de l'Ontario, du sud du Québec et des Maritimes ont reçu des précipitations près de la normale ou inférieures à la normale, ce qui n'a entraîné qu'un faible changement des conditions. Les températures ont été supérieures à la normale dans une grande partie de la Colombie-Britannique, les régions du sud de la province ayant notamment connu des températures de quatre à cinq degrés au-dessus de la normale mensuelle. Dans le reste du Canada, à l'exception de

petites régions du sud de l'Alberta et du sud-ouest de la Saskatchewan, des températures inférieures à la normale ont été observées; les régions du nord de l'Alberta et du Yukon ont connu des températures mensuelles de plus de cinq degrés sous la normale.

À la fin du mois, 77 % du pays se trouvaient en situation de conditions anormalement sèches (D0) ou de sécheresse modérée à exceptionnelle (D1 à D4), dont 73 % des terres agricoles du pays.

Région du Pacifique (BC)

La Colombie-Britannique a connu un mois de décembre principalement humide, les précipitations ayant été dans la normale à bien supérieures à la normale dans une grande partie de la province. Dans certains secteurs localisés, elles ont été de 200 % supérieures à la normale, notamment aux stations de Victoria, de Fort St. John et de Fort Nelson. En revanche, des précipitations inférieures à la normale ont été reçues dans certaines parties de l'île de Vancouver et de la côte sud. Les températures ont varié, le nord de la Colombie-Britannique enregistrant des températures allant jusqu'à dix degrés sous la normale, alors qu'elles étaient de jusqu'à quatre degrés supérieures à la normale dans le sud-est de la province. Les chutes de neige ont été très variables, des accumulations exceptionnellement élevées ayant été observées dans les régions du nord et du nord-ouest, tandis que certaines parties du sud de la Colombie-Britannique ont reçu des chutes de neige inférieures à la normale. Le manteau neigeux est considérablement plus épais que l'an dernier, et plusieurs emplacements ont déjà dépassé leurs valeurs maximales d'équivalent en eau de la neige de 2025.

Les conditions se sont améliorées dans tout le sud de la Colombie-Britannique. Dans l'île de Vancouver et le long de la côte et des basses-terres continentales, la diminution des conditions anormalement sèches (D0) et de sécheresse modérée (D1) reflète une hausse des précipitations associée à des épisodes de rivière atmosphérique. Dans la région de Thompson–Okanagan et de Kootenay, les hausses ont été plus prononcées, permettant une diminution importante des zones en situation de sécheresse grave (D2), de sécheresse modérée (D1) et de conditions anormalement sèches (D0). Cependant, des zones isolées en situation de sécheresse grave (D2) persistent dans les hautes terres de Shuswap et à l'est des hautes terres de l'Okanagan, où il subsiste des déficits de précipitations à long terme. Dans le centre de la Colombie-Britannique, les niveaux d'humidité ont continué de s'améliorer, mais les conditions sont demeurées variables. Dans la région de Cariboo, une réduction importante de l'étendue des zones en situation de sécheresse grave (D2) et une disparition des zones en situation de sécheresse extrême (D3) a été constatée, mais une grande partie de la région demeure dans des conditions anormalement sèches (D0) ou de sécheresse modérée (D1), et des zones éparses en situation de sécheresse grave (D2) subsistent. Dans certaines parties de l'intérieur, les précipitations totales n'ont pas été suffisantes pour entraîner des changements considérables des catégories de sécheresse. Les parties méridionales de la région ont connu de légères améliorations, notamment une réduction notable des zones en situation de sécheresse grave (D2) et l'élimination de celles en situation de sécheresse extrême (D3), grâce à des précipitations supérieures à la normale et à une forte accumulation de neige. Dans le nord de la Colombie-Britannique, la région de la rivière de la Paix a connu une réduction importante des cas de sécheresse grave (D2) et extrême (D3) et ne compte plus de zones en situation de sécheresse

exceptionnelle (D4); cependant, des zones persistantes de sécheresse grave (D2) et de sécheresse modérée (D1) ont subsisté au sud de Dawson Creek, le long de la frontière entre la Colombie-Britannique et l'Alberta, ce qui reflète les préoccupations continues liées à la faible quantité d'eau disponible malgré les fortes chutes de neige dans certaines parties de la région. Les parties septentrionales de la région de Nechako ont également connu une amélioration, notamment une diminution des conditions anormalement sèches (D0) et de sécheresse modérée (D1), grâce à des précipitations et chutes de neige bien au-dessus de la normale.

À la fin du mois, 50 % de la région du Pacifique était classée dans la catégorie de conditions anormalement sèches (D0) ou de sécheresse modérée à extrême (D1 à D3), dont 70 % des terres agricoles de la région.

Région des Prairies (AB, SK, MB)

Les précipitations supérieures à la normale et les températures généralement plus basses que la normale en décembre ont permis une amélioration modérée de la situation sur le plan de la sécheresse dans toute la région des Prairies. Les températures moyennes ont été inférieures à la normale dans une grande partie des Prairies, et des températures de six à dix degrés sous la normale ont été enregistrées dans le nord de l'Alberta et le nord de la Saskatchewan. Les tempêtes de neige ont entraîné des précipitations supérieures à la normale en Alberta, dans le sud de la Saskatchewan et dans le sud du Manitoba, celles-ci ayant atteint trois fois la normale mensuelle totale dans plusieurs localités. Toutefois, certaines parties du nord de la Saskatchewan et du nord du Manitoba ont enregistré des précipitations près de la normale. Malgré d'importantes chutes de neige dans l'ensemble des Prairies, ces précipitations n'ont pas été suffisantes pour compenser les déficits à long terme, en particulier dans les régions du sud.

Dans le sud de l'Alberta, des précipitations supérieures à la normale ont contribué à l'amélioration des conditions, notamment à une réduction des conditions anormalement sèches (D0) et de sécheresse modérée (D1). Cependant, deux zones en situation de sécheresse modérée (D1) ont persisté près de Medicine Hat et au sud de Lethbridge, le long de la frontière entre l'Alberta et les États-Unis. Le centre de l'Alberta a également connu des améliorations notables, notamment une réduction généralisée des conditions de sécheresse modérée (D1) et grave (D2), et la fin de la situation de sécheresse extrême (D3) dans la région de Red Deer. Dans le nord de l'Alberta, les conditions se sont améliorées de façon plus importante. Dans le nord-ouest, des chutes de neige considérables ont entraîné la fin des situations de sécheresse exceptionnelle (D4) et une réduction importante des conditions de sécheresse grave (D2) et extrême (D3), bien qu'une zone en situation de sécheresse extrême (D3) subsiste dans la région de la rivière de la Paix et au sud-ouest de Grande Prairie, le long de la frontière entre l'Alberta et la Colombie-Britannique. Dans l'ensemble, le manteau neigeux épais et les chutes de neige régulières ont contribué à l'amélioration des conditions dans la majeure partie de la province, malgré que le manteau neigeux soit demeuré inférieur à la normale dans certaines zones localisées des régions du centre et de l'est.

La Saskatchewan a reçu des précipitations près de la normale en décembre, celles-ci se situant à plus de 85 % de la normale dans la majeure partie de la province. Les températures mensuelles ont été inférieures à la normale dans l'ensemble de la province, les anomalies ayant atteint quatre degrés sous la normale dans les régions du centre de la province. Dans l'ensemble du sud de la Saskatchewan, des précipitations supérieures à la normale ont permis l'amélioration de la situation, notamment une réduction des conditions anormalement sèches (D0) et de sécheresse modérée (D1). Les portions ouest du centre de la Saskatchewan ont connu de légères améliorations ce mois-ci, notamment des réductions des conditions allant d'anormalement sèches à de sécheresse grave (D0 à D2) et une diminution de la situation de sécheresse extrême (D3) dans les environs de La Ronge. Dans le nord de la Saskatchewan, les conditions se sont également légèrement améliorées; les conditions allant d'anormalement sèches à de sécheresse grave (D0 à D2) ont diminué, grâce à des précipitations dans la normale à supérieures à la normale.

Dans la majeure partie du Manitoba, les précipitations ont été supérieures à 85 % de la normale en décembre, à l'exception de certaines zones du sud-est, du sud-ouest et du nord où elles ont représenté 40 % à 85 % de la normale. Les températures mensuelles ont été inférieures à la normale dans l'ensemble de la province, et la plupart des régions ont connu des températures de trois à quatre degrés sous la normale. Dans le sud du Manitoba, des précipitations supérieures à la normale ont permis une diminution des conditions allant d'anormalement sèches à de sécheresse modérée (D0 à D2). Le centre du Manitoba a également connu une amélioration, y compris des réductions des situations de sécheresse modérée à extrême (D1 à D3), grâce à des chutes de neige répétées. Dans le nord du Manitoba, seuls des ajustements mineurs ont été apportés aux évaluations de la sécheresse, des conditions de sécheresse grave (D2) et extrême (D3) subsistant dans une grande partie de la région. Dans l'ensemble, bien qu'une grande partie du Manitoba ait connu une amélioration, les conditions persistantes de sécheresse modérée (D1) à grave (D2) se sont maintenues dans certaines parties du nord où il subsiste des déficits.

À la fin du mois, 79 % de la région des Prairies était classée en conditions anormalement sèches (D0) ou de sécheresse allant de modérée à extrême (D1 à D3), dont 62 % du paysage agricole de la région.

Région du Centre (ON, QC)

En décembre, la région du Centre a connu des précipitations variables, et des chutes de neige ont contribué à des gains d'humidité à court terme dans plusieurs régions. Le nord-ouest de l'Ontario a reçu des précipitations variant entre 40 % et 200 % de la normale, tandis que l'est de la province a connu des conditions plus sèches, les précipitations s'y situant entre 60 et 85 % de la normale. Le sud de l'Ontario a enregistré des conditions près de la normale, les précipitations totales variant entre 60 et 150 % de la normale. Au Québec, la plupart des régions du sud ont reçu de 60 à 85 % des précipitations normales. La situation a été variable dans le nord du Québec, la région sud de l'Abitibi-Témiscamingue ayant reçu des précipitations représentant 85 à 150 % de la normale, tandis qu'une grande partie du reste du nord du Québec est demeurée plus sèche, avec moins de 60 % des précipitations normales. Les températures ont

été légèrement inférieures à la normale dans toute la région, et des périodes de froid extrême au Québec ont favorisé le développement du manteau neigeux.

En Ontario, les conditions relatives à la sécheresse se sont généralement améliorées en décembre. Le nord de l'Ontario a connu des améliorations notables, notamment une réduction des conditions allant d'anormalement sèches à de sécheresse grave (D0 à D2) et une réduction importante des situations de sécheresse extrême (D3). Une amélioration a été observée dans les parties est du nord de l'Ontario, grâce aux multiples chutes de neige d'importance, bien que les conditions sèches persistantes se soient maintenues près de la frontière entre l'Ontario et le Manitoba. L'est et le centre de l'Ontario ont connu une amélioration, dont une diminution des conditions de sécheresse grave (D2) et la disparition de la zone de sécheresse extrême (D3), grâce à l'accumulation de neige provenant des bourrasques de neige et des clippers. Malgré les récentes chutes de neige, les eaux souterraines demeurent préoccupantes dans l'est de l'Ontario; Ottawa a enregistré des précipitations d'environ 25 % inférieures à la moyenne pour l'année et a demandé aux résidents possédant des puits privés de limiter leur utilisation de l'eau. L'ouest et le sud de l'Ontario n'ont connu que de légères améliorations dans l'ensemble; les conditions de sécheresse grave (D2) ont été levées dans certaines régions, mais se sont maintenues dans les régions de Sarnia et de London, où le temps sec a persisté.

Au Québec, les conditions météorologiques ont été variables en décembre, de sorte que la situation s'est améliorée ou aggravée selon la région. Dans le nord de la province, les conditions se sont améliorées, le sud de la région de l'Abitibi-Témiscamingue ayant notamment connu une diminution des cas de sécheresse grave (D2) et l'élimination des cas de sécheresse extrême (D3) grâce à des précipitations mensuelles supérieures à la normale. Le sud-est du Québec a connu une légère aggravation des conditions de sécheresse, notamment une expansion des conditions anormalement sèches (D0) reflétant les déficits continus de précipitations. La Gaspésie a également connu une détérioration des conditions, dont un élargissement des conditions de sécheresse modérée (D1), l'apparition de zones en situation de sécheresse grave (D2) et le maintien de zones déjà en situation de sécheresse extrême (D3).

À la fin du mois, 86 % de la région du Centre était classée dans la catégorie de conditions anormalement sèches (D0) ou de sécheresse modérée à extrême (D1 à D3), dont 97 % des terres agricoles de la région.

Région de l'Atlantique (NB, NS, PEI, NL)

Dans l'ensemble, une grande partie de la région de l'Atlantique a reçu des précipitations près de la normale à inférieures à la normale en décembre, accompagnées de températures légèrement inférieures à la normale. Le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse ont reçu des précipitations représentant 60 à 85 % de la normale, les déficits de pluie les plus marqués ayant été observés dans l'est du Nouveau-Brunswick et le centre de l'Île-du-Prince-Édouard. En revanche, Terre-Neuve a connu des conditions particulièrement humides, les précipitations variant entre 85 % et plus de 200 % de la normale, tandis que la variabilité a été plus grande au Labrador, où les précipitations se sont situées entre 40 et 150 % de la normale. À Terre-Neuve-et-Labrador, les températures moyennes mensuelles ont été près de la normale ou inférieures à la normale, et les chutes de neige totales ont été

très élevées dans certaines parties de l'ouest et du nord de la province, bien que des conditions chaudes à la fin du mois aient entraîné une importante fonte des neiges.

Au Nouveau-Brunswick, malgré des précipitations mensuelles près de la normale à inférieures à la normale, l'humidité du sol et les conditions d'apport en eau de surface ont continué de s'améliorer, et les zones en situation de sécheresse grave (D2) et extrême (D3) ont diminué. Cependant, des zones de sécheresse extrême (D3) ont persisté dans l'est du Nouveau-Brunswick, où des déficits de précipitations à long terme subsistent. À l'Île-du-Prince-Édouard, les conditions se sont améliorées, et une zone n'est plus en situation de sécheresse extrême (D3) dans l'extrémité ouest de l'île. Malgré cette amélioration, les précipitations inférieures à la normale saisonnière, en particulier dans les parties centrales de l'île, ont continué de limiter le rétablissement complet. En Nouvelle-Écosse, la situation s'est également améliorée, comme en témoigne l'élimination des conditions de sécheresse extrême (D3) dans la région du sud-ouest. La majeure partie de la province est maintenant classée dans les catégories de sécheresse modérée (D1) ou grave (D2). La situation de sécheresse grave (D2) s'est maintenue dans certaines parties du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, où les déficits de précipitations et les chutes de neige variables ont limité le rétablissement. À Terre-Neuve, les conditions se sont améliorées, et il y a notamment eu une diminution des conditions anormalement sèches (D0) et de sécheresse modérée (D1) et une élimination des zones restantes en situation de sécheresse grave (D2). Les précipitations abondantes et les chutes de neige supérieures à la normale, en particulier dans les régions de l'ouest et du nord, ont favorisé l'amélioration de l'humidité du sol et de la disponibilité des eaux de surface. Cependant, une sécheresse localisée a persisté dans la presqu'île Avalon et dans de plus grandes parties de l'ouest de Terre-Neuve, où des déficits de précipitations à long terme persistent. Au Labrador, les conditions se sont légèrement améliorées, avec une réduction des cas de sécheresse modérée (D1).

À la fin du mois, 88 % de la région de l'Atlantique se trouvait en conditions anormalement sèches (D0) ou de sécheresse modérée à extrême (D1 à D4), dont 97 % des terres agricoles de la région.

Région du Nord (YK, NT)

Les conditions générales ont été caractérisées par des températures exceptionnellement basses dans l'ensemble de la région du Nord et par des précipitations au-dessus de la normale dans les régions du sud et du centre. Le centre et le sud du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest ont connu des températures bien inférieures à la moyenne, allant de quatre à plus de dix degrés sous la normale. Les précipitations ont été supérieures à la normale dans une grande partie de la région, en particulier dans les portions du sud et du centre, où les totaux ont varié entre 200 % et jusqu'à 400 % de la normale, bien que des conditions plus sèches ont persisté dans certaines zones localisées.

Au Yukon, les conditions se sont globalement améliorées. Le sud du Yukon a connu une amélioration notable, la situation de sécheresse grave (D2) ayant été levée dans certaines zones à la suite d'importantes précipitations; des précipitations représentant 418 % de la normale à Whitehorse et 325 % de la normale à Watson Lake ont notamment été enregistrées. La situation s'est également

améliorée dans le centre du Yukon, une diminution des conditions anormalement sèches (D0) ayant été observée, mais les zones près de Mayo sont demeurées sèches, les précipitations reçues s'y chiffrant à moins de 50 % de la normale. Le nord du Yukon a connu une légère amélioration, avec de faibles réductions des conditions anormalement sèches (D0), grâce à des précipitations supérieures à la moyenne le long de la côte nord.

Dans les Territoires du Nord-Ouest, les conditions se sont améliorées dans les régions du sud et du centre, où les conditions anormalement sèches (D0) à de sécheresse grave (D2) ont diminué et où la situation de sécheresse extrême (D3) a été levée dans plusieurs zones. Trois zones de sécheresse extrême (D3) ont été maintenues : au nord-ouest de Yellowknife, à l'est du Grand lac des Esclaves et à l'ouest de Fort Smith près de la frontière entre les T.N.-O. et l'Alberta. Malgré ces améliorations, de faibles niveaux d'eau ont persisté dans les principaux lacs et cours d'eau, y compris le Grand lac des Esclaves, le Grand lac de l'Ours, le fleuve Mackenzie, la rivière Hay et la rivière Liard, qui sont tous demeurés bien en deçà de leur niveau moyen pour cette période de l'année. Les conditions dans le nord des T.N.-O. étaient près de la normale à humides, les zones côtières ayant reçu entre 125 % et 225 % des précipitations normales.

À la fin du mois, 76 % de la région du Nord était classée en conditions anormalement sèches (D0) ou de sécheresse allant de modérée à extrême (D1 à D3).