

Flétrissement bactérien de la pomme de terre

Bonnes pratiques de gestion pour la prévention et le contrôle



Qu'est-ce que le flétrissement bactérien?

Le flétrissement bactérien (FB) est une maladie grave de la pomme de terre causée par la bactérie *Clavibacter sepedonicus*, qui se propage par l'équipement, des conteneurs et des tubercules infectés.



Prévention

- Seulement utiliser des semences de pommes de terre certifiées
- Désinfecter tout l'équipement et tous les outils
- Éviter de réutiliser des sacs possiblement contaminés
- Faire la rotation des cultures et détruire les repousses de plants de pommes de terre



Protocole du personnel

- Sensibiliser les travailleuses et travailleurs au sujet des symptômes et de la prévention du FB
- Désinfecter les chaussures et les outils
- Porter des vêtements et des gants propres



Pratiques agricoles

- Planter d'abord les champs de pommes de terre de semences
- S'assurer que l'équipement partagé est nettoyé et désinfecté
- Surveiller l'apparition de symptômes



Symptômes

- Jaunissement des feuilles
- Flétrissement des plantes
- Décoloration de l'anneau vasculaire des tubercules
- Substance collante sécrétée par les tubercules infectés
- Tissus des tubercules deviennent mous et peuvent s'affaisser sous la pression



Symptômes externes



Jaunissement des feuilles



Anneau vasculaire



Vue en coupe



Pourriture du tubercule

Si la présence du FB est détectée sur une unité de production de pommes de terre de semence :

- ❗ Aviser immédiatement votre [bureau local de l'Agence canadienne d'inspection des aliments](#)
- ❗ Tous les envois de pommes de terre de semence doivent être suspendus

Si le flétrissement bactérien est détecté dans une exploitation agricole ne cultivant pas de pommes de terre, communiquez avec votre ministère provincial de l'Agriculture.

➔ Veuillez suivre les principes de la [Norme nationale de biosécurité à la ferme pour les producteurs de pommes de terre](#)

