

QL
60
H86
1984

#823

**Résumé sur la niche écologique des espèces
retrouvées à la R.N.F du Cap Tourmente**



par :

CLAUDE HUOT

-projet relais: 6467JH7.

JUIN 1984

Avertissement.

Les noms choisis pour déterminer les espèces rencontrées à la RNF du Cap Tourmente, qu'ils soient français, anglais ou latins ont été sélectionnés d'après différents ouvrages. Par conséquent il se peut que ce choix ne corresponde pas aux attentes du lecteur, mais celui-ci doit comprendre et admettre qu'il existe encore, à l'échelle nationale, un conflit quant au choix de ces noms (principalement chez les oiseaux).

AMPHIBIENS

Salamandre à taches bleues - Blue-Spotted Salamander - Ambystoma laterale

X

N'est pas la Salamandre de Jefferson

Correction de la feuille de l'inventaire

Reproduction: Mars à avril. Dépose les oeufs séparément ou en petites masses de 6 à 10 oeufs sur des débris dans le fond des étangs.

Habitat: forêt décidue

Blue-spotted et Jefferson salamandre peuvent se croiser pour donner 2 hybrides uniquement femelle soit Silvery Salamander (Ambystoma platineum) et Tremblay's Salamander (Ambystoma tremblayi).

Salamandre cendrée (Red-backed Salamander) (Plethodon cinereus)

Reproduction:

Cour et accouplement d'octobre à avril

En juin ou juillet, elle suspend ses oeufs en forme de grappe de raisin (6-12 oeufs) dans une voûte ou une petite cavité sous la roche ou à l'intérieur d'une souche pourrie.

La femelle s'enroule autour de ses oeufs et les protège pour une période d'environ 2 mois.

Pas de stade aquatique. Complètement terrestre.

Seule salamandre à pondre ses oeufs en milieu terrestre.

La seule salamandre américaine à ne pas avoir de stade aquatique.

Habitat: Forêt de conifères humides et frais
forêt mixte
forêt de bois franc.

C'est la plus abondante et la plus commune
Se repose sous des pierres et des abris de bois

Se nourrit de petits invertébrés qu'il chasse la nuit.

Crapaud américain, American Toad, Bufo americanus. †

Reproduction: Mars à juillet

Il accroche ses oeufs (en forme de cordon) après la végétation

Habitat: Commun dans plusieurs habitats allant des champs fauchés jusqu'aux forêts de montagne où il y a des insectes et de l'humidité.

Nocturne et strictement insectivore.

Rainette crucifère - Spring Peeper - Hyla crucifer †

Reproduction: Mars à juin avec le début des pluies tièdes.

Habitat: Dans les arbres boisés près d'étang ou de marais permanent ou temporaire.

Nocturne

Hiberne sous des souches ou billots et sous des écorces.

Oua-ouaron - Bullfrog - Rana catesbeiana †

Reproduction: Mai à juillet

Masses d'oeufs attachés à la végétation submergée.

Habitat: Aquatique

Préfère étang, lac et ruisseau à faible débit assez large pour qu'il puisse nager et offrant un bon couvert de végétation

Moeurs: Nocturne

Préfère les rives

Alimentation: Gros spécimen = petits oiseaux et jeunes couleuvres

Régime normal: Insecte, écrevisse, grenouille, menés.

Grenouille verte - Green frog - Rana clamitans X

Reproduction: Mars à août

Les oeufs sont attachés après végétation submergée

Habitat: Vit près des eaux peu profondes (ruisseau, marécage, source et les bords des étangs et lacs). On peut aussi les trouver dans les débris d'arbres.

Principalement nocturne.

Grenouille du nord - Mink Frog - Rana septentrionalis X

Reproduction: Juin à août

Masses d'oeufs attachés à la végétation submergée

Habitat: Dans eaux froides où la végétation est abondante spécialement les nénuphars. On les retrouve près des bords d'étangs et de lacs ou dans les milieux tourbeux.

Principalement nocturne.

Grenouille des bois - Wood frog - Rana sylvatica X

Reproduction: Tôt le printemps avant que les glaces soient complètement fondues. Les masses d'oeufs sont attachées sur la végétation submergée.

Habitat: Boisés humides

Principalement diurne

Peut se rencontrer très loin des points d'eau pendant l'été. L'hiver, il hiberne sous des débris végétaux.

Grenouille léopard - Leopard frog - Rana pipiens X

Reproduction: Mars à juin

Les masses d'oeufs sont attachés à la végétation submergée ou pondue sur le sol.

Habitat: Site où il y a de l'eau fraîche et où la végétation est abondante. Marais broussailleux, champs humides.

Nocturne.

REPTILES

Couleuvre rayée - Garter Snake - Thamnophis sirtalis X

Reproduction: Tard en mars jusqu'au début mai. Occasionnellement à
Occasionnellement à l'automne
Naissances peuvent aller jusqu'en octobre.

Habitat: Près de l'eau
Dans prairie humide, marais, fossé de drainage et d'irrigation
dans boisé humide, ferme et parc

La plus fréquente

Active le jour

Plus fréquemment observée près des végétations humides
où elle se nourrit de grenouille, crapaud, salamandre et
vers de terre.

À l'occasion se nourrit de petits poissons et souris

Hiberne en grand nombre dans le nord de son territoire

POISSONS

Lamproie de l'est - American Brook Lamprey - Lampetra lemottei

- Habitat ruisseaux et petites rivières d'eau froide.
Généralement associée au chabot visqueux et l'omble de fontaine.
- niche fraie au printemps entre le début de mai et de début de juin dans ruisseaux et rivières d'eau froide (16°C).
nids construits dans le gravier.
- nourriture en été l'ammocète se nourrit de plantes et d'animaux microscopiques (diatomées, protozoaires)
lamproie non parasite
adultes vivant de 5 à 6 mois mais ne se nourrissent pas.

Ombles de fontaine - Brook trout - Salvelinus fontinalis

- Habitat cours d'eau et lacs d'eau fraîche, claire et bien oxygénée
- niche fraie tard en été ou en automne
de la fin de septembre en octobre ou novembre sur les fonds de gravier
- nourriture carnivore, grandes variétés d'animaux, crustacés, insectes aquatiques et terrestres, mollusques, menés, cannibalismes (jeunes et oeufs)

Meunier noir - White sucker - Catostomus commersoni

- Habitat lacs chauds peu profonds ou les baies peu profondes et les tributaires de grands lacs.
- niche fraie au printemps du début de mai au début de juin dans les cours d'eau graveleux, température de l'eau à 10°C.
- nourriture larves d'insectes, mollusques

Ventre citron - Finescale Dace - Chrosomus neogaeus

habitat eaux fraîches des fondrières
niche fraie au printemps, en juin
nourriture insectes, crustacés, plancton

Mulet à cornes - Creek Chub - Semotilus atromaculatus

habitat cours d'eau et ruisseaux clairs et eau du littoral des
 petits lacs
niche fraie au printemps à température de l'eau de 12,8°C, dans
 eaux tranquilles à fond de gravier
nourriture plancton (jeunes), insectes aquatiques et terrestres, les
 grands mâles mangent de plus des écrevisses et des petits
 poissons

Chabot tacheté - Mottled Sculpin - Cottus bairdi

habitat cours d'eau et lacs frais
niche fraie au printemps, sous une roche ou une corniche
nourriture larves et nymphes d'insectes aquatiques

Chabot visqueux - Slimy sculpin - Cottus cognatus

habitat régions plus profondes dans les lacs des cours d'eau plus
 frais et est réparti plus au nord que Chabot tacheté.
niche fraie au printemps sous une roche ou une corniche
nourriture larves d'insectes aquatiques

Épinoche à trois épines - Threespine Stickleback - Gasterosteus aculeatus

habitat	eaux peu profondes commune dans région de drainage des marais	X
niche	fraie en eau douce en été en juin ou juillet, nid de brin- dilles et plantes sur fond sablonneux dans eaux peu profonde	

MAMMIFÈRES

Musaraigne cendrée - "Common" shrew - Sorex cinereus «masked»

Nourriture	trouve sa nourriture surtout dans les feuilles et les détritux de sous-bois Se nourrit en majorité d'insectes (imago, larves, nymphes et oeufs) Salamandre et jeunes souris Vers, mollusques et cloportes peut se nourrir d'oisillons qu'elle trouve dans les arbres Végétaux = graines (surtout en hiver)
Habitat	Des forêts épaisses jusqu'à la toundra, du littoral jusqu'aux prairies alpines Elles affectionnent les sols forestiers où l'air est saturé de vapeur d'eau. Humidité = facteur limitatif Elles se retrouvent dans les tapis de feuilles, les souches, le bois pourri et la végétation herbacée.
Reproduction	fin avril à fin septembre = 1 ou 2 parties nid d'herbe sous un billot, une planche, une pierre ou une souche.
Moeurs:	ne creuse pas de terriers sauf dans sol très meuble ou dans la mousse.
Prédateurs	Buses, hiboux, belettes, grandes musaraignes renard roux, lynx roux Peut être victime = couleuvre, pie-grièche, héron ou chat

Musaraigne palustre - Water shrew - Sorex palustris

Nourriture	insectes (adultes et larves) aquatiques limaces, limaçons, petits poissons salamandres, vers, araignées.
Habitat	Forêts conifères et forêts mixtes le long des cours d'eau rapides et d'étangs Zones marécageuses et broussailles
Reproduction	Février à août 2-3 portées Nid de ramilles et de feuilles sèches dans une excavation du sol, pierres
Moeurs	Bien adapté au milieu aquatique
Prédateurs	oiseaux de proie, renard roux, lynx roux, loutre, vison et certains gros poissons

Musaraigne pygmée - Pigmy Shrew - Cicrosorex hoyi

nourriture	pétits insectes, vers, milles pattes et colimaçons
habitat	terrain humide ou à proximité d'un cours d'eau X régions herbeuses, tourbières, marécages sous les souches et entre les racines des arbres, dans l'humus
reproduction	juin à août
nid	sphère compacte d'herbe et de feuilles, cachée dans l'humus
prédateur	Couleuvre rayée, buses, chat

Grande musaraigne - Big Short-tailed shrew - Blarina brevicauda

nourriture	insectes, limaçons, vers, grenouilles champignons souterrains du genre Endogone souris ou campagnols ou musaraignes plus petites X
habitat	forêts conifères et feuillus, marécages, broussailles endroits humides épaisses couche d'humus
reproduction	mars et septembre nid sphérique d'herbes et de feuilles aménagé sous une bûche ou un tronc d'arbre dans l'humus du sol
mœurs	solitaire et occupe un territoire restreint
Prédateurs	oiseaux de proie (Grand duc, Chouette rayée, moufette, belettes, coyote, Renard roux, Lynx roux, certains gros poissons.

Taube à nez étoilé - Star-nosed Mole - Condylura cristata

Nourriture	insectes aquatiques, vers, crustacés, mollusques, petits poissons
Habitat	terrains humides au sol meuble X forêts, champs, marais, rives des lacs et cours d'eau
Reproduction	fin février, début juin. nid ovoïde creusé au-dessus du niveau de l'eau sous une bûche ou un arbre tombé et tapissé de feuilles et d'herbes séchées
Mœurs	Se tient souvent dans l'eau ou à la surface du sol
prédateurs	renard roux, opossum, belettes, buses, hibous, Grande musa- raigne (jeunes aux nids)

Chauve-souris - Common bats

Nourriture	La plupart se nourrissent d'insectes chassent les insectes au-dessus des clairières et cours d'eau
Habitat	forêts clairsemées, clairières, abords de cours d'eau
Reproduction	souvent à l'automne mais fertilisation des oeufs au printemps
Moeurs	Hiberne dans caverne, fente des rochers, grottes très humides
Prédateurs	oiseaux de proie

Lièvre d'Amérique - Varying hare - Lepus americanus

nourriture	été - diverses plantes herbacées: vesces, épilobes à feuilles et fraisier, framboisiers hiver - brindilles, bourgeons, écorce feuillus: érable, tremble, bouleau, rosier, noisetier, saule conifères: pin gris, pin blanc, mélèze, cèdre, épinette sapin
habitat	se développe en abondance quand des feux périodiques entraînent la croissance d'épais peuplements de jeunes conifères et de feuillus broussilleux (nourriture) couvert
forêt à maturité =	nombre de lièvres assez faible dans ces conditions, peut se rencontrer au bord des marécages et dans les clairières naturelles avec saules, aulnes et noisetiers.
reproduction	fin mars à fin juin nid d'herbes dans endroit abrité
Moeurs	se nourrit la nuit ou au crépuscule Le jour, il est caché sous des branches basses, des arbres tombés, des souches ou des débris de coupe
Prédateurs	Renard roux, coyote, belette, vison, Lynx roux, Grand duc, harfang, gerfaut, vautour, petite buse

Écureuil roux - Red squirrel - Tamiasciurus hudsonicus

Nourriture	varie selon l'habitat. dans forêt boréale, se nourrit surtout de cônes de conifères plus au sud = glands, graines, noisettes, bourgeons, fleurs fruits, plusieurs espèces végétales, champignons, larves d'insectes, oeufs et oisillons au printemps = arrache des bouts d'écorce pour lécher la sève
------------	--

Habitat	forêts mixtes et forêts de conifères comprenant pin blanc et pruche Très commun dans les érablières
Reproduction	Entre avril et août nids de feuilles et de brindilles tapissés d'écorce et construits dans les arbres entre 3 et 20 m du sol niche parfois dans un trou d de pic ou un nid de corneille abandonné ou de buse
Prédateurs	martre, vison, belette, lynx roux, renard, diverses espèces de buses et de hiboux

Marmotte commune - Woodchuck - Marmota monax

Nourriture	Plantes vertes, trèfle, luzerne, renoncule, pissenlit, plantain Écorce et ramilles de certains arbustes certains insectes
Habitat	pâturages terrains accidentés parsemés de souches et de cailloux forêts clairsemées et les pentes rocheuses préfère les terrains sablonneux et bien drainés
Reproduction	Mars ou avril terrier creusé à flanc de colline ou sur un terrain plat bien drainé
Prédateurs	Renard roux, coyote, lynx roux, ours noir, vison, divers rapaces

Suisse - Chipmunk - Tamias striatus

Nourriture	Grande variété de graines, de fruits, de noix et de plantes herbacées Limaces, vers, sauterelles, oeufs et oisillons
Habitat	forêt de feuillus bien drainée bordure des champs haies et buissons
Reproduction	Quand bonnes conditions, 2 périodes d'accouplement de la mi-mars à fin août et mi-juin à mi-juillet niche dans un terrier dont l'entrée est dissimulée sous une pierre, des racines ou des buissons.
Prédateur	belette, hermine, renard roux, lynx roux, raton laveur et buses

Grand Polatouche - Northern Flying Squirrel - Glaucomys sabrinus

Nourriture	Cônes de pins, d'épinettes et de sapins champignons, lichens arboricoles bourgeons, graines, insectes, fruits "oeufs et oisillons"
Habitat	Forêts de conifères et forêts mixtes comprenant des bouleaux et des peupliers
Reproduction	Mars à juillet Fait souvent son nid près des cours d'eau niche dans trou de pics et les cavités des arbres ou se construit dans un conifère un nid d'écorce et de brindilles tapissé de mousses et d'herbes.
Prédateur	hibou, martre, raton laveur, lynx roux.

Castor - Beaver - Castor canadensis X

Nourriture	feuilles, écorce et ramilles de la plupart des espèces ligneuses qui poussent près de l'eau. tiges et racines de diverses plantes aquatiques Espèces préférées: peuplier faux-tremble, bouleau blanc aulnes, valisnérie et nénuphars
Habitat	cours d'eau, étangs, marais, lacs des régions boisées
Reproduction	Janvier ou février hutte = amoncellement de branches et de boue
Prédateur	loup, coyote, ours noir, vison, lynx roux

Souris sylvestre - Deer mouse - Peromyscus maniculatus

Nourriture	Graines de diverses plantes herbacées, petits fruits, de noix, de champignons souterrains et de bourgeons Chenilles, araignées, vers, limaçons et mille-pattes
Habitat	Forêts de conifères et de feuillus Préfère sols secs et bien drainés et les endroits où la couverture végétale est dense
Reproduction	Mars - août. Nid est fait d'herbes et de feuilles sèches de poils et de plumes. Aménagé à l'abri d'une souche, sous une pierre, dans une touffe d'herbes ou dans le creux d'un arbre. Peut nicher dans les branches basses d'un arbre ou dans un nid d'oiseau abandonné.
Prédateurs	belette, hermine, mouffette, vison, raton laveur, renard coyote, loup, grande musaraigne, hibou, corneille

Campagnol à dos roux de Gapper - «Red-backed Mouse» Gapper's Red-backed Vale
Clethrionomys gapperi

Nourriture	Pousses tendres, pétioles, bourgeons et graines d'une variété de plantes et d'arbustes. Noix, baies, champignons souterrains (Endogone); Insectes, araignées, limaces. En hiver, ronge l'écorce et les racines des arbustes
Habitat	Forêt mixte ou forêt de conifères à proximité des cours d'eau, des marécages et des tourbières. Fréquente les zones de broussailles, les clairières et les endroits ombragés où l'humus est épais. Il abonde dans les boisés jonchés d'arbres tombés ou déracinés et en bordure des forêts.
Reproduction	Fin de l'hiver à la fin de l'automne. Nid sphérique constitué d'herbes, de feuilles, d'écorces, de brindilles et de mousse. Il est construit à l'abri d'une racine, d'une bille ou d'une souche. Peut nicher dans la fourche d'un arbre.
Prédateurs	Buses, hiboux, ratons laveurs, belettes, renards roux, coyotes, moufettes, martres, visons, ours noirs, certains poissons.

Campagnol des champs - Meadow Vale - Microtus pensylvanicus

Habitat	Prés humides, herbages de toutes sortes, champs en friche, marécages, clairières et broussailles, laïches.
Nidification	Sous une planche ou une roche, vieux terrier ou dans une touffe d'herbes.
Alimentation	Pousses d'herbes et de laïche, feuilles, fruits, fleurs insectes (limaçon), les jeunes de son espèce, en été. En hiver, graines, racines, tiges d'arbrisseaux.
Intérêt	Nourrit: brochet maillé, grand brochet, achigan, truite mouchetée, touladi, musaraigne à queue courte (mange les petits), belette pygmée, moufette, hermine et autres animaux à fourrure. Détruit: fait des dommages aux récoltes et forêts.

Rat musqué - Common Muskrat - Ondatra zibethicus

Habitat	Régions aquatiques, marais où il y a bonne végétation pour le soutenir.
Nidification	Hutte, mars, avril ou mai

Nourriture Plantes aquatiques, quenouilles, joncs, queues-de-cheval*
potamots*, carex, osier et riz sauvage.

Intérêt Trappage

Souris commune - House Mouse - Mus musculus

Habitat Steppes sèches et arides, maisons de régions boisées,
humides ou froides, prairies et champs secs.

Nidification Reproduction toute l'année, nid dans des amas de détritux,
armoires, matelas, sous les bâtiments.

Souris sauteuse des champs - Jumping mouse - Zapus hudsonius X

Habitat Prés humides, berges herbeuses des rivières, bord de marais,
bosquets d'aulnes, saules, lisière des bois et des haies.

Nidification 2 ou 3 portées par année naissance entre 15 juin et 30 août.

Alimentation Graines et herbes.

Souris sauteuse des bois - Woodland Jumping Mouse - Napeozapus insignis

Habitat En forêt près des cours d'eau, feuillus ou conifères.

Nidification Nid d'herbes ou de feuilles, sous une souche ou dans brous-
sailles.

Alimentation Insectes.

Porc-épic - Porcupine - Erethizon dorsatum

Habitat Forêts feuillus ou conifères, en été dans les prés et dans
les champs cultivés.

Nidification Copulent en novembre et en décembre si il n'y a pas eu
accouplement, la femelle est de nouveau en chaleur en janvier
ou en avril. Les petits naissent entre la mi-mai et la
fin de juillet.

Alimentation Plusieurs espèces d'arbres, les conifères entre autres.

Coyote - Brush Wolf - Canis latraus

Habitat	Toundra alpine, forêt boréale, forêt de peuplier faux-tremble, la steppe à végétation basse, près des fermes, vallons avec bosquets de peupliers faux-trembles et les rives garnies de saules.
Nidification	Accouplement au début du printemps, naissance fin avril, début mai dans un terrier
Alimentation	Petits mammifères et charogne, oiseaux, cerfs, insectes.

Loup - Timber wolf - Canis lupus

Habitat	Sommet de montagne, plaines, forêt de feuillus et de résineux.
Nidification	Terrier, fin février, mi mars pour l'accouplement
Alimentation	Cerf de Virginie, orignal, castor, lièvres, petits mammifères

Renard roux - Red fox - Vulpes Vulpes X

Habitat	Terrain semi-découvert, champs de culture, rives de lacs, vallées fluviales, clairières.
Nidification	Reproduction mi-janvier à la fin-mars.
Alimentation	Hiver: viande, petits mammifères, lièvres Été: canards, lièvres, poulets, oiseaux, écrevisses, grillons sauterelles, quelques végétaux, glands, herbe.

Ours noir - Black bear - Ursus americanus X

Habitat	Forêt résineux ou feuillus, marais et broussailles garnies de baies
Nidification	Caverne, crevasse, arbre creux, sous une souche renversée ou sous les branches inférieures d'un conifère.

Raton-laveur - Raccoon - Procyon lotor X

Habitat	Régions boisées, arrosées de cours d'eau, vallées fluviales et dans les bosquets de prairies.
Nidification	Dans les arbres creux, caverne, trou de marmotte.
Alimentation	Omnivores (fruits, baies) (écrevisses, poissons) larves, vertébrés, petits mammifères, etc.

Belette à queue longue - Long tailed weasel - Mustela frenata X

Habitat	Terrain découvert des prairies, tremblaies, terres d'alluvions, voisinage de l'eau.
Nidification	Accouplement juillet et août, naissance mars et début avril.
Alimentation	Petit mammifère, spermophiles, lièvres, rats, écureuils oiseaux.

Moufette rayée - Striped skunk - Mephitis mephitis

Habitat	Régions agricoles, forêts et vallées fluviales
Nidification	Terrier profond (2 à 6 m), gros nid d'herbes et de feuilles sèches.
Alimentation	Omnivore: automne et hiver : fruits (vignes sauvages), petits mammifères. Été: insectes, larves.

Lynx roux - Bobcat - Lynx rufus X

Habitat	Marais, taillis, flancs de collines, rocailleux, zones agricoles
Nidification	Litière de mousse et de feuilles sèches dans une bûche creuse, une infractuosit� rocheuse ou un fourr�, sous une souche.
Alimentation	Petits mammif�res; rats musqu�s, castor, chat, renard, grand h�ron, tortues.

Cerf de Virginie - White tailed deer - Odocoileus virginianus X

Habitat Lisière de bois, marais, cédrière, peupleraie, prairies.
Nidification Mise bas dans clairières à haute herbes entre avril et septembre (habituellement fin mai, mi-juin)
Alimentation Rameau de thuya, érable à épis et de Pensylvanie, cornouillier, peuplier.

Orignal - Moose - Alces alces V

Habitat Été: lac, tremblaie, aulnaie; Hiver: couvert résineux avec feuillus en régénération tout près.
Nidification Accouplement mi-septembre, fin novembre; naissance fin mai début juin, sur une rive ou dans une île buissonneuse.
Alimentation Branche d'arbre, rameaux, nénuphars, cornouiller stolonifère, sorbier, tremble, bouleau, noisetier, peuplier, petit merisier.

OISEAUX

HUART À COLLIER - Common Loon - Gavia immer

- Habitat** Lacs d'eau douce; grandes rivières; aussi longtemps que l'eau demeure libre de glaces.
- Nidification** Préférence: petits lacs bordés d'épinettes rouges et de sapins; nid situé près de l'eau, sur une île ou sur les grèves; nid composé d'un amas de matières végétales en décomposition; peut aussi être bâti au sommet d'un nid de rats musqués ou dans un îlot de plantes flottantes; construit au début juin; 2 oeufs; mâle et femelle couvent; course folle sur l'eau; niche presque toujours au même endroit d'année en année.
- Alimentation** Presqu'exclusivement de poissons; crustacés, mollusques, grenouilles, matières végétales; poissons communs de faible valeur économique.
- Moeurs** Le huart acquiert son plumage adulte à sa troisième année, il n'émigre donc pas au printemps avant d'avoir atteint cet âge; les jeunes restent le long des côtes; les adultes quittent leurs aires de nidification en octobre et reviennent en mai.

GRÈBE À BEC BIGARRÉ - Pied-billed Grebe - Podilymbus podiceps

- Habitat** été: fréquente des étangs d'eau douce, des marais, des cours d'eau lents et des baies peu profondes en bordure des lacs; mais toujours où il y a de la végétation marginale ou en touffes, émergente ou aquatique.
hiver: aux endroits libres de glace, en eau douce; en eau salée: ruisseaux de marées, estuaires et baies.
- Nidification** Nid: structure surélevée de plantes molles en décomposition, flottante ou construite depuis le fond de l'eau peu profonde; les deux adultes couvent de 5 à 7 oeufs.
- Alimentation** Poissons (24%), écrevisses (27%), insectes (43%); poissons: carpe, barbotte, anguille, épinuche

CORMORAN À AIGRETTES - Double crested Cormorant - Phalacrocorax auritus ✕

- Habitat Lacs et rivières d'eau douce, estuaires, eau salée; ordinairement à peu de distance des côtes; se retrouve sur les rochers, les falaises, les barres de gravier et sur les amoncellements de roche près de la mer.
- Nidification Niche sur les corniches, les sommets plats des falaises et dans les arbres près de l'eau; en colonies; le nid est placé sur du roc nu, sur une mince couche de terre recouvrant le roc, sur des petites îles; le nid est fait de branchages, de tiges de plantes, d'herbes marines, etc. les deux parents couvent 3 ou 4 oeufs.
- Alimentation Poissons de faible valeur commerciale; quelques amphibiens (salamandre), crustacés (crabe), plusieurs reptiles, mollusques et vers aquatiques.

GRAND HÉRON - Great Blue Heron - Ardea herodias ✕

- Habitat Eau libre peu profonde, salée ou douce, dans le fond des baies, sur les cours d'eau, sur le bord des rivières, dans les terrains marécageux, sur les lacs, étangs, fossés, vasières et marais.
- Nidification Nichent dans les forêts de feuillus, de résineux ou d'essences mêlées, quelquefois à grande distance de l'eau; Nid situé à un endroit offrant un vaste champ de vision; Ils recherchent les îles, les arbres émergeant des étangs à castor et le flanc des falaises; ils nichent en colonies; nid: structure de branchages, plutôt plate, aménagée tout près du sommet des arbres, quelquefois dans les arbustes ou sur le sol; les deux parents couvent de 3 à 5 oeufs.
- Alimentation Poissons dont la taille équivaut à moins de la moitié de la longueur de son bec; à l'occasion: crustacés, insectes, rongeurs, amphibiens (grenouilles), reptiles, petits oiseaux et graines de plantes.
- Prédateurs Âge adulte: très peu d'ennemis naturels, quelquefois des rapaces; chez les jeunes: corneille, corbeau, goéland, rapace, raton-laveur.

HÉRON VERT - Green Heron - Butorides virescens X

- Habitat Bords des nappes d'eau bordées de buissons et d'arbres; bords de cours d'eau lents, étangs et les marais; fourrés d'autours dans les terrains submergés.
- Nidification nid: structure de branchages sans consistance à environ 10 ou 20 pieds du sol ou sur le sol; niche presque toujours solitairement; les deux parents couvent de 4 à 5 oeufs.
- Alimentation Poissons, insectes, amphibiens, reptiles, escargots, souris.

BIHOREAU À COURONNE NOIRE - Black-Crowned Night-Heron - Nycticorax nycticorax X

- Habitat Fréquente les marais d'eau douce ou salée, les estuaires, où la marée se fait sentir, les vasières, le bord des lacs et des étangs, les cours d'eau peu rapides et quelquefois les champs.
- Nidification Nichent en colonies dans les arbres ou buissons; le nid se compose de branches; les deux parents couvent de 3 à 5 oeufs.
- Alimentation Il trouve sa nourriture surtout au coucher du soleil et à la tombée de la nuit; se nourrit largement de poissons mais consomme aussi des grenouilles, des écrevisses et d'autres crustacés ainsi que des petits rongeurs.

BUTOR AMÉRICAIN - American Bittern - Botaurus lentiginosus X

- Habitat Marais d'eau salée et d'eau douce, marécages, dans les champs humides, dans les fourrés mouilleux d'aulnes et de saules, parfois dans les champs plutôt secs.
- Nidification Nid: plate-forme de plantes de marais, quenouilles, scirpes et autres; parfois au sec dans un champ; femelle couve seule de 4 à 6 oeufs.
- Alimentation Dans les marécages, se nourrit de grenouilles, de serpents aquatiques, de petits poissons, d'écrevisses et autres animaux aquatiques; dans les champs dégagés, il capture des sauterelles et des souris.

BERNACHE DU CANADA - Canada Goose - Branta canadensis X

- Habitat Lacs, rivières, étangs d'eau douce et d'eau salée du littoral, dans les baies, dans les champs herbeux et dans les chaumes.
- Nidification Niche au nord, depuis l'ouest de l'Alaska jusqu'au Labrador et à Terre-Neuve et au sud de l'île de Victoria et de l'île de Baffin jusqu'à la frontière américaine dans l'ouest, et jusqu'au nord de l'Ontario et du Québec dans l'est.
Nid: construit sur le sol, près de l'eau, de préférence sur un îlot, sur une hutte de castor ou de rat musqué, parfois dans un arbre, dans le nid d'un rapace ou sur une corniche; 4 ou 6 oeufs couvés par la femelle.
- Alimentation Carex, baies, herbes, quenouilles; mange tôt le matin et tard l'après-midi; entretemps, elle reste en eau dégagée, sur les bancs de sable; se nourrit aussi de salicorne, trèfle, prêle et autres; mange des racines, des feuilles, des tubercules et des graines, des algues; mollusques et petits crustacés.

OIE BLANCHE - Snow Goose - Chen hyperborea X

- Habitat Durant la migration, elles évitent généralement les régions boisées; elles s'arrêtent dans les marais d'eau douce ou d'eau salée, sur les lacs, dans les champs humides, dans les champs de céréales et sur les bords de sable.
- Nidification Nid aménagé au sol est constitué d'un amoncellement de mousse ou autres matières végétales de la toundra; femelle couve seule de 3 à 5 oeufs; niche en colonies.
Au Canada: dans l'arctique à l'est
- Alimentation Strictement végétarienne toute leur vie; sur les aires de migration: rhizomes de carex (Scirpus americanus) spartina sp.
- Prédateurs Renards arctiques: oisillons; et labbes: oeufs.

CANARD MALARD - Mallard - Anas platyrhynchos †

Habitat	Fréquente les marais, les terrains marécageux, les étangs, les petits et grands lacs, l'eau calme des rivières et les endroits submergés en forêt ou en terrain découvert; cherche sa nourriture sur la terre ferme, particulièrement dans les champs de céréales; préférence: mares et petits marécages entourés de roseaux; territoire: endroit près d'un rivage, d'un banc de sable ou d'un tronc flottant
Nidification	Nid ordinairement au sol, généralement près de l'eau, rarement dans un arbre; peut être très loin de l'eau; le nid se compose de brins d'herbe, de joncs et de feuilles; femelle couve de 5 à 15 oeufs; le nid n'est pas nécessairement compris dans leur territoire; le nid est bien à l'abri de hautes herbes (arbrisseaux de prairie).
Alimentation	Barboteurs; plantes aquatiques charnues et racines tubéreuses de plantes d'eaux peu profondes; graines, insectes et petits animaux aquatiques, larves de moustiques; friand de céréales, de riz sauvage et de maïs; chez les jeunes: petits crustacés ex: puces d'eau; insectes, plantes minuscules ex: lentilles d'eau.

CANARD NOIR - Black Duck - Anas rubripes †

Habitat	Eau peu profonde, au bord des lacs, sur les étangs, sur les mares, sur les cours d'eau lents, dans les anses, dans les baies, dans les vasières, dans les marécages, dans les champs humides, dans les champs de céréales et sur l'eau libre.
Nidification	Durant cette période, peut se retrouver dans les terrains boisés, humides ou secs; Niche habituellement au sol dans une région boisée (plus ou moins loin de l'eau), dans un champ herbeux ou broussailleux, dans une île ou le long d'un petit cours d'eau; peut-être dans un trou ou une fourche d'arbre; à l'occasion, dans le nid abandonné d'une Corneille américaine ou d'un oiseau de proie. Le nid est composé de branchages, de tiges de plantes, de brins d'herbe et de feuilles; 6 à 12 oeufs incubés par la femelle.
Alimentation	Chez les jeunes, larves de moustiques, autres insectes, têtards; adultes, nourriture végétale, plantes submergées, salamandre; insectes aquatiques, larves, têtards, petits mammifères, petites grenouilles et crapauds, grains d'orge et maïs, sarrasin.
Prédateurs	Éperviers, hibou.

CANARD PILET - Pintail - *Anas acuta* X

Habitat	Étendue d'eau fraîche peu profonde et dans les marais, grands et petits; eaux salées ou saumâtres de la côte, en dehors de la saison de nidification
Nidification	Le nid est au sol, fréquemment près de l'eau; il peut être bien dissimulé dans la végétation, mais souvent il est dans une prairie à découvert, sans aucune protection; la femelle incube de 7 à 10 oeufs.
Alimentation	90% végétale (potamot, jonc); escargot et autres mollusques, sangsue, crabe, écrevisse, menés, vers, insectes aquatiques.

SARCELLE À AILES VERTES - Green-Winged Teal - *Anas carolinensis* J

Habitat	Fréquente les étangs, les marais et le bord peu profond des lacs.
Nidification	Nid au sol près de l'eau douce (quelquefois éloigné). Il est dissimulé par des herbes ou des buissons. La femelle couve seule de 10 à 12 oeufs.
Alimentation	Insectes aquatiques, petits mollusques, crustacés, têtards, parties molles des plantes aquatiques, graines de potamot, de jonc et herbes; visite les champs cultivés et mange les grains de maïs, blé, orge, avoine.

SARCELLE À AILES BLEUES - Blue-Winged Teal - *Anas discors* X

Habitat	Étangs et lacs d'eau douce; terrains marécageux et littoral herbeux des rivières lentes, même des plus petits cours d'eau; rarement en eau salée ou saumâtre.
Nidification	Nid placé sur le sol, près de l'eau, habituellement dissimulé dans les herbes ou autres végétations (parfois à découvert); il est composé de brins d'herbe et autres plantes flexibles. La femelle couve seule de 9 à 12 oeufs.
Alimentation	70% végétale (jonc, potamot, herbe); mollusques, insectes aquatiques, crustacés.

CANARD SIFFLEUR D'AMÉRIQUE - American Widgeon - Mareca americana X

- Habitat** Niche dans les terrains marécageux d'eau douce, dans les étangs et dans les endroits marécageux en bordure des lacs. En migration, il fréquente aussi les eaux peu profondes des baies de la côte.
- Nidification** Nid composé de brins d'herbe; placé dans une dépression dans un endroit sec, pas toujours près de l'eau; femelle couve de 7 à 12 oeufs.
- Alimentation** Plus de 90% du régime alimentaire est végétal; feuilles, tiges, bourgeons de potamot, herbes, jonc.

CANARD SOUCHET - Shoveler - Spatula clypeata Y

- Habitat** Fréquente les lacs peu profonds, souvent vaseux, les marais, les étangs et les trous d'eau, particulièrement ceux qui lui offrent une nourriture abondante et une bonne protection.
- Nidification** Le nid est formé d'herbes ou de matières similaires; ordinairement au sol et près de l'eau; femelle couve de 10 à 12 oeufs.
- Alimentation** Diatomés, ostracodes et copépodes; 66% végétales et 34% animale; plusieurs mollusques, (escargot d'eau douce) insectes aquatiques; petits poissons (carpe), plusieurs petits crustacés.

CANARD HUPPE - Wood Duck - Aix sponsa X

- Habitat** Canards percheurs; lacs, étangs et cours d'eau des régions boisées; étangs à castor.
- Nidification** Le nid est placé dans un tronc creux où une branche creuse d'un arbre, quelquefois dans une cavité creusée par un Grand Pic; l'entrée peut être située au niveau de la surface de l'eau jusqu'à 50 pieds au-dessus du sol; la femelle couve seule de 8 à 15 oeufs.
- Alimentation** 90% végétale: lentille d'eau, tiges et tubercules de potamot, herbes, graines de souchet, joncs et leurs graines, carex, graminées, racine de nénuphar, fruits et noix, glands; insectes aquatiques; menés; grenouilles, têtards, escargots, petites salamandres. Canardeaux: libellules, insectes, araignées. Aires d'élevage doit abriter un grand nombre de ces invertébrés.
- Prédateurs** Raton laveur

MORILLON À COLLIER - Ring-Necked Duck - *Aythya collaris* X

- Habitat** Eaux douces peu profondes (souvent acides) des marais, des prairies de carex et des tourbières; parfois des estuaires et des baies où la marée se fait sentir; peu souvent au large; en migration, se rencontre sur les rivières et les grands lacs dont les rivages sont marécageux.
- Nidification** Nid placé dans la végétation basse sur le bord de l'eau libre des tourbières, des étangs et des terrains marécageux; est composé de plantes paludéennes trouvées sur les lieux; la femelle couve de 6 à 14 oeufs.
- Alimentation** 80% végétale: plantes aquatiques, graines de potamot, herbes, lis d'eau, plusieurs graines, tubercules, feuilles de jonc, algues; animale: insectes aquatiques, escargots et autres mollusques, plusieurs araignées, puces d'eau, crabe, annélides, etc.

PETIT MORILLON - Lesser Scaup - *Aythya affinis* X

- Habitat** Pendant la nidification, se rencontre près des grands lacs et des étangs, dans les îles basses et dans les prairies humides à carex; pendant la migration, fréquente des petits lacs, des étangs et des rivières; on le rencontre aussi sur la côte, dans les baies, les estuaires et sur les grands lacs.
- Nidification** Nid: dépression en terrain sec, tapissée de grin d'herbes. Il est souvent dissimulé dans les herbes ou les buissons et à proximité de l'eau. La femelle couve de 8 à 12 oeufs. Ne niche presque pas au Québec (ouest central)
- Alimentation** Mange à une profondeur de 5 à 6 pieds; à peu près autant végétale qu'animale: graines de joncs, potamot, etc. escargot et autres mollusques, crustacés, insectes aquatiques.

GARROT COMMUN - Common Goldeneye - *Bucephala clangula* X

- Habitat** Pendant la nidification: lacs des régions boisées et sur les étangs de muskegs; à d'autres époques: fréquente le bord de la mer, les estuaires à marée, les lacs et les rivières d'eau douce; hiverne sur les rivières assez rapides pour empêcher la prise de glace.

Nidification	Niche dans une cavité naturelle d'un arbre ou dans un grand trou de pic; nid placé entre 5 et 60 pieds du sol; peut employer une fissure dans un rocher, s'il n'y a pas d'arbre propre à son genre de nidification; la femelle couve de 6 à 15 oeufs.
Alimentation	Peut descendre sous l'eau jusqu'à 20 pieds ou plus; été et automne: principalement des insectes et certaines parties végétales; graines, tubercules, partie de <u>potamogeton</u> , etc. Hiver: crabes, escargot, moule.

EIDER COMMUN - Common Eider - Somateria mollissima

Habitat	Espèces marines qui préfèrent les côtes rocailleuses basses, les grandes et petites îles; se rencontre aussi le long des côtes où il y a des lits de moules et de récifs; fréquente parfois l'eau douce près des côtes.
Nidification	Souvent en grandes colonies; nid: la base est formée de matières végétales; peut nicher dans de vieux nids; il est situé près de l'eau salée et abrité par une formation rocheuse ou dans une dépression de la végétation basse. La femelle couve de 4 à 6 oeufs.
Alimentation	Peut descendre sous l'eau de 35 à 60 pieds, mais préfère eau peu profonde; 100% animale: moule, clam et autres bivalves, gastropodes, échinodermes, crustacés, amphipodes, petits poissons, serpents marins.

BEC-SCIE COMMUN Common Merganser - Mergus merganser

Habitat.	Principalement d'eau douce; en été, fréquente l'eau douce des lacs et des rivières, habituellement en forêt ou tout près; en hiver, se rencontre sur rivières d'eau douce et sur la partie libre de glaces de certains lacs; il préfère l'eau claire qui lui est probablement nécessaire pour trouver sa nourriture
Nidification	Nid habituellement placé dans un arbre creux, quelquefois dans une cavité sur un escarpement, sur la berge d'une nappe d'eau, dans un amoncellement de cailloux ou sur le sol dans des buissons. La femelle couve seule de 8 à 12 oeufs.
Alimentation	Poissons, grenouilles, salamandre aquatique, écrevisse, crevettes et autres petits crustacés; escargots et autres mollusques, insectes aquatiques et leurs larves, vers, sangsues et racines et tiges de plantes aquatiques.

BEC-SCIE À POITRINE ROUSSE - Red-breasted Merganser - Mergus serrator X

Habitat	Plus souvent à l'eau salée que le Bec-scie commun; préfère l'eau salée des côtes en hiver; durant la nidification, il fréquente l'eau salée et l'eau douce: baies lagunes et estuaires; parfois les lacs et rivières d'eau douce.
Nidification	Nid placé sur le sol, sous des buissons, parfois dans un amoncellement de roches, sous un tronc renversé ou sous des racines d'arbre; à peu de distance de l'eau; c'est une dépression qui comporte quelques feuilles ou brins d'herbe; la femelle couve de 7 à 12 oeufs.
Alimentation	Petits poissons (menés, etc) écrevisses et crustacés marins

AUTOUR - Goshawk - Accipiter gentilis

Habitat	Forêts et régions boisées; préfère les peuplements mixtes; Fréquente aussi lisière des forêts et clairières; chasse bas, près du sol.
Nidification	Le nid est une volumineuse structure de branchages, l'intérieur est garni d'écorce et parfois de rameaux de conifères. Placé dans un arbre entre 20 et 75 pieds du sol, soit dans un conifère mais de préférence dans un feuillu. 2 à 4 oeufs.
Alimentation	Toutes sortes d'oiseaux et plusieurs espèces de mammifères.
Moeurs	Courtes ailes et longue queue sont bien adaptées à la poursuite de leurs proies en pleine forêt aussi bien que dans les clairières et les broussailles en bordure. Rapace diurne.

ÉPERVIER BRUN - Sharp-Shinned Hawk - Accipiter striatus

Habitat	Fréquente les régions boisées et leurs lisières; Pendant la migration: les terrains de bordure, les clairières broussailleuses et les rivages.
---------	--

Nidification Nid: placé dans un arbre, de préférence dans un conifère, entre 10 et 70 pieds du sol. Il est fait de petites branches et tapissé de branchages et d'écorce. Il est placé sur les branches basses et horizontales. Les deux sexes couvent de 3 à 6 oeufs.

Alimentation Petits oiseaux: pinsons et fauvettes

BUSE À QUEUE ROUSSE - Red Tailed Hawk - Buteo jamaicensis

Habitat Fréquente les régions boisées et les terrains découverts; dans la saison de nidification, elle se rencontre surtout près des endroits plantés d'arbres; s'il n'y a pas d'arbres, elle niche sur une corniche de rocher.

Nidification Nid habituellement placé dans un arbre, un conifère ou un feuillu assez haut. Quand il n'y a pas de grands arbres, dispose le nid dans un arbre court ou sur une corniche de rocher. Structure de branchages. 2 à 4 oeufs.

Alimentation Souris, rats, écureuils, chien de prairie, lapins, taupes, tamia rayé, musaraignes, rats musqués, spermophiles, porc-épic, belettes, moufettes; gallinules, râles, faisans, cailles, tourterelles, petit-duc, martin-pêcheur, pics, corneilles, étourneaux, sturnelles et autres petits oiseaux; Serpents, tortues, crapauds, lézards, grenouilles, salamandres, écrevisses, crickets, vers de terre; carpes, barbottes.

ÉPERVIER DE COOPER - Cooper's Hawk - Accipiter cooperii

Habitat Fréquente les régions boisées; se rencontre moins en bordure des forêts.

Nidification Nid fait de branches, souvent tapissé d'écorce, d'un peu de mousse ou d'herbe; placé entre 20 et 60 pieds du sol dans un conifère ou un feuillu; préfère de grands arbres robustes; choisi des boisés voisinant des champs à découvert ou des versants de collines. La femelle couve de 3 à 5 oeufs.

Alimentation Oiseaux: merles d'Amérique, pics, geais et colins.

BUSE À ÉPAULETTES ROUSSES - Red-Shouldered Hawk - Buteo lineatus

- Habitat Régions boisées, particulièrement les basses terres, les boisés et les bosquets près des espaces découverts et des fermes.
- Nidification Nid: volumineuse structure de branchages, tapissé de lambeaux d'écorce, de feuilles, de lichens, souvent de rameaux verts avec leurs feuilles. Placé entre 25 et 60 pieds du sol, soit dans un feuillu, soit dans un conifère. Les parents se partagent l'incubation de 2 à 4 oeufs.
- Alimentation Souris, musaraignes, taupes, écureuils, tamias rayés, lapins, rats musqués, opossums, belettes; occasionnellement des oiseaux: râles, faisans, tourterelles, pics, étourneaux, merles, sturnelles, petit duc; petits serpents, lézards, tortues, grenouilles, salamandres, sauterelles, araignées, vers de terre, escargots.

PETITE BUSE - Broad-Winged Hawk - Buteo platypterus

- Habitat Fréquente la forêt et les régions boisées
- Nidification Nid petit, souvent nid abandonné (d'une Corneille américaine ou d'autres grands oiseaux). Comprend des branchages et des rameaux d'arbres; il est tapissé de mousse et d'écorces. Placé entre 20 et 40 pieds du sol, soit dans un conifère ou un feuillu. Les deux sexes couvent de 2 à 4 oeufs.
- Alimentation Grenouilles, crapauds, serpents, lézards, écureuils roux, tamias rayés, souris, musaraignes, lapins, plusieurs petits oiseaux, chenilles, sauterelles, crickets, araignées, écrevisses, vers de terre.

BUSE PATTUE - Rough-Legged Hawk - Buteo lagopus X

- Habitat En migration et en hiver: terrains découverts comme les champs et les marais. En été: région arctique et subarctique.
- Nidification Niche au nord; le nid est construit sur une corniche, sur une saillie dans la berge abrupte d'une rivière ou dans un arbre.
- Alimentation Souris, lemming, chenilles; petits oiseaux, gélinottes, perdrix, tétras, faisans.

AIGLE DORÉ - Golden eagle - Aquila chrysaetos

- Habitat Dans des terrains montagneux, sur les contreforts de montagne dans des endroits herbeux fréquentés par les écureuils, au voisinage des falaises soit dans les vallées de rivière des prairies, soit sur les côtes de la mer. Peut pourchasser ses proies dans divers terrains, même dans les plaines.
- Nidification Nid habituellement placé sur une falaise, parfois dans un arbre; nid fait de branchages et d'autres matériaux grossiers, tapissés de brins d'herbe, de mousse et de feuilles. 2 oeufs.
- Alimentation Nourriture habituelle: lapins, marmottes, écureuils, téttras et perdrix. À l'occasion: insectes, petits mammifères, serpents, tortues, moufettes, chiens de prairie, chevreuils, antilopes, grand-duc, pies, pigeon, grues; charogne de porc, mouton, chevreuil, etc.

AIGLE À TÊTE BLANCHE - Bald Eagle - Haliaeetus leucocephalus

- Habitat Se rencontre près de l'eau: grandes rivières, lacs, bord de la mer.
- Nidification Nid de préférence dans un arbre, près de la cime, plus rarement sur une corniche; volumineuse structure de branchages et d'herbes associés à un grand nombre de débris; les deux parents couvent 2 oeufs.
- Alimentation Beaucoup plus nécrophage que prédateur; régime alimentaire composé principalement de poissons rejetés sur les grèves. Faute de poissons, il peut capturer quelques oiseaux.

BUSARD DES MARAIS - Marsh Hawk - Circus cyaneus

- Habitat Champs assez vastes, prairies, marais (eau douce ou salée) et au-dessus des terrains à découvert.
- Nidification Nid: herbes, branchages, brins de foin et de joncs. Il est placé sur le sol dans un arbuste nain ou dans des plantes basses, habituellement dans un pré bas, quelquefois dans prairies; de 4 à 6 oeufs.
- Alimentation Souris, rats, grenouilles, petits serpents, lézards, écrevisses, insectes, petits oiseaux et charogne.

AIGLE PÊCHEUR - Osprey - Pandion haliaetus

- Habitat** Près des lacs, des grandes rivières et des baies de la côte
- Nidification** Le nid est une structure massive de branchage, placés à différentes hauteurs, habituellement dans un arbre isolé, mort ou vivant, parfois sur un poteau de télégraphe, au sommet d'un rocher ou sur le sol. Les nids peuvent être réunis en colonies éparses; la femelle couve de 2 à 4 oeufs.
- Alimentation** Se nourrit uniquement de poissons de faible valeur économique; sur la côte: poulamons ou petites morues, plies; sur les rivières et les lacs d'eau douce: carpes, perchaudes et crapets-soleil.

FAUCON ÉMÉRILLON - Pigeon Hawk - Falco columbarius

- Habitat** Pendant la nidification: bois clairs (quelquefois denses) forêt de feuillus ou coniférienne, aussi les clairières de forêts et les coulées boisées dans les prairies. En dehors de cette période, il pourchasse ses proies dans les marais, sur les grèves, dans les vasières et dans les champs souvent sans arbres.
- Nidification** Prend souvent le nid abandonné de la Corneille américaine ou de la Pie bavarde, soit dans un conifère ou un feuillu. Peut être aussi dans un arbre creux ou sur une corniche, même dans un creux du sol; 4 ou 5 oeufs.
- Alimentation** Se nourrit de pétrel, sarcelle, grand pic, bécasse, bécasseau, courli, pluvier, caille, pigeon, tourterelle, martinet, geai, oiseaux noirs, sturnelle, moineau, jaseur, hirondelle, fauvette, alouette cornue, pipit et autres. Écureils, souris, chauve-souris, crapaud, lézard, grenouille, papillon, araignées et insectes.

CRÉCERELLE D'AMÉRIQUE - Sparrow Hawk - Falco sparverius

- Habitat** Terrains découverts: champs, prairies, brûlis, plaines, clairières de forêt, dans les villes, les terrains plats ou accidentés. Se perche au sommet d'arbres morts, sur des pieux de clôture, sur des poteaux et sur des édifices.

- Nidification Nid placé dans une cavité naturelle ou celui d'un pic dans un arbre, dans une crevasse de falaise, dans le nid d'une pie bavarde, dans une excavation dans une berge.
- Alimentation En grande partie d'insectes relativement gros (sauterelles); à l'occasion, peut capturer une souris ou un petit oiseau.

GÉLINOTTE HUPPÉE - Ruffed Brause - Bonasa umbellus

- Habitat Affectionne les forêts feuillues de repousse et les peuplements mêlés; la lisière de la forêt et les clairières; les ravins et les rives des cours d'eau bordés d'aulnes ou de saules, ainsi que les vergers abandonnés. Utilise les conifères pour se protéger. N'affectionne pas les grandes forêts parvenues à maturité.
- Nidification Nid: dépression à même le sol, garnie de feuilles; habituellement situé en forêt de repousse, souvent au pied d'un arbre, près d'un bloc de roc, sous un tronc renversé ou dans un tas de branchages. La femelle couve de 9 à 12 oeufs.
- Alimentation Jeunes: morceaux de vers, sauterelles, scarabés, papillons, araignées.
Adultes: 30% insectes et toutes les sortes de fruits sauvages, trèfle, noix; plusieurs graines, boutons, fleurs; quelquefois petites couleuvres, grenouilles, crapauds.

RÂLE DE VIRGINIE - Virginia Rail - Rallus limicola X

- Habitat Dans marais eau douce ou salée
- Nidification Nid aménagé en terrain marécageux, consiste en une corbeille de plantes paludéennes lâchement entrelacées et tapissée de brins d'herbe. Il est fixé aux tiges d'une touffe de grandes herbes un peu au-dessus de l'eau ou de la vase. Les deux parents couvent de 7 à 12 oeufs.
- Alimentation Vers de terre, larve d'insectes, escargots, chenilles, petits poissons, scarabés, écrevisses. À l'occasion, des graines d'herbe. 60% de son régime est composé d'insectes.

RÂLE DE CAROLINE - Sora Rail - Porzana carolina X

- Habitat Durant la nidification, fréquente les marais d'eau douce ou saumâtre. En migration, marais d'eau salée.
- Nidification Nid: coupe peu profonde, confectionnée avec des matières végétales sèches entrelacées, il est fixé à des tiges de plantes paludéennes. Quelquefois c'est une accumulation de plantes. Il est parfois placé sur le sol dans des herbes, près d'un marais ou d'un étang. Les deux parents couvent de 8 à 13 oeufs.
- Alimentation Printemps et été: petits mollusques, insectes aquatiques. 73% de son régime est constitué de graines.

RÂLE JAUNE - Yellow Rail - Coturnicops noveboracensis X

- Habitat Marais herbeux ou garnis de graminées. En migration: dans les champs de céréales ou de foin.
- Nidification Nid aménagé dans un marais herbeux, consiste en une cuvette tapissée de brins d'herbe fins ou de Carex dans une touffe ou sur une natte d'herbes sèches. 8 à 10 oeufs.
- Alimentation Petits escargots, insectes, graines, herbes et du trèfle.

PLUVIER À COLLIER - Semipalmated Plover - Charadrius semipalmatus X

- Habitat Dans eau salée ou eau douce, dans les vasières, sur les grèves, sur les rives à découvert des étangs, des lacs et des rivières. Pendant la nidification, il fréquente les crêtes basses de gravier à végétation clairsemée, les plaines graveleuses, les grèves et les dunes de sable.
- Nidification Nid: creux dans le sable, dans le gravier, dans la mousse ou dans des algues marines desséchées. L'intérieur est garni de débris de coquillages ou de végétaux. Les deux parents couvent 3 ou 4 oeufs.
- Alimentation Vers marins, petits mollusques et crustacés, oeufs d'animaux marins, insectes et leurs larves, sauterelles et cricquets, vers de terre.

PLUVIER KILDIR - Killdeer - Charadrius vociferus X

- Habitat** Fréquente les prés bien égouttés: pâturages, chaumes, labours, gravier à découvert, terrains de golfe, fossés en bordure des routes, terrains peu ou pas herbeux. Après la nidification, se retrouve au bord des étangs et des lacs, dans les endroits vaseux et humides; rarement en eau salée.
- Nidification** Nids: légère dépression à même le sol, garnie de quelques galets et quelques débris de plantes sèches. Les deux sexes couvent 4 oeufs.
- Alimentation** Scarabés, sauterelles, chenilles, papillons, centripèdes, araignées, tiques, vers de terre, escargots, écrevisses et plusieurs graines de plantes.

PLUVIER À VENTRE NOIR - Black-bellied Plover - Squatarola squatarola X

- Habitat** Fréquente souvent les champs à herbe courte, particulièrement ceux qui sont humides. Plus souvent dans les vasières, sur les grèves vaseuses, près des mares, sur les grèves et sur les barres de sable aussi bien près de l'eau douce ou salée. Niche dans les crêtes de bravier sèches mais peut aussi faire usage de la toundra humide.
- Nidification** Niche au nord dans une légère dépression à même le sol, tapissée de parcelles de lichen ou de mousse.
- Alimentation** Ver marin, insecte, petits mollusques et autres crustacés. À l'intérieur des terres: sauterelles, vers de terre, certaines graines, baies.

BÉCASSE AMÉRICAINE - Woodcock - Philohela minor X

- Habitat** Au printemps: mâle dans des clairières et des trouées de différentes grandeurs ou près de clairsemés de bois mêlés ou de feuillus; aussi dans des fourrés d'aulnes et de saules. Lors de la nidification, on la retrouve dans de jeunes boisés clairsemés, ainsi que dans des fourrés d'aulnes. En automne, elle affectionne les taillis d'aulnes et les fourrés d'aulnes humides mais fréquente aussi les boisés de régénération de faible densité, en terrain sec. Près des endroits où le sol est meuble et humide. Cherche parfois leur nourriture dans les champs à découvert.

Nidification Niche au sol dans des habitats variés: jeunes peuplements de régénération de bois mêlés ou de résineux; fourrés d'aulnes; parfois même dans des champs couverts de broussailles ou d'herbes. Le nid est une dépression du sol, tapissée de feuilles et brins d'herbes. La femelle couve 4 oeufs.

Alimentation Principalement des vers de terre.

BÉCASSINE ORDINAIRE - Woodcock - Capella gallinago

Habitat Grands ou petits marais d'eau douce, des tourbières, les bords marécageux de certaines nappes d'eau; des prés humides et d'autres endroits au sol boueux et couvert de végétation basse.
En migration, se rencontre dans les labours, les mares, les chaumes humides, dans les fossés et en bordure des ruisseaux; aussi dans les marais littoraux inondés à marée haute. Elle est souvent atterrie au bord de nappes d'eau où le sol a été transformé en boue noire par le piétinement d'animaux. Quelquefois dans les taillis d'aulnes clairsemés et dans les forêts humides. Ceux qui hivernent par ici se rencontrent habituellement près des sources.

Nidification Nid construit à même le sol. Faible dépression tapissée de brins d'herbe, dans un marais, une tourbière, un terrain marécageux, un lac ou tout près, dans l'herbe d'un pré ou dans un champs près de l'eau. Les deux couvent 4 oeufs.

Alimentation Vers de terre, 50% insectes: larves, mouche à cheval, à chevreuil, mouche domestique, cricquets, lacustes, chenilles, crustacées, mollusques, salamandres, grenouilles, lézards, etc.

MAUBÈCHE DES CHAMPS - Upland Plover - Bartramia longicauda

Habitat Fréquente les terres herbeuses et découvertes de l'intérieur: champs de foin, pâturages et prairies, les tourbières. Préférence pour plaines de l'intérieur et les vasières.

- Nidification** Nid: dépression à même le sol, tapissée de brins d'herbe, est dissimulé dans des herbes ou plantes basses. Les deux sexes couvent 4 oeufs.
- Alimentation** Plus de la moitié de sauterelles, cricquets, feuilles de trèfle, plusieurs insectes et larves, centipèdes, millipèdes, araignées, escargots, vers de terre, un peu de grains.

MAUBÈCHE BRANLE-QUEUE - Spotted Sandpiper - Actitis macularia

- Habitat** Rivages sablonneux, rocailleux ou vaseux des lacs, des étangs, des rivières et des cours d'eau, ainsi que les eaux salées de la côte, dans des endroits assez découverts. Cherche souvent sa nourriture sur des troncs d'arbres flottant.
- Nidification** Le nid est un creux dans le sol, généralement peu éloigné de l'eau. Le mâle se charge de l'incubation de 4 oeufs.
- Alimentation** Sauterelles, crickets, vers; insectes de plantes cultivées; jeunes poissons, petits crustacés.

CHEVALIER SOLITAIRE - Solitary Sandpiper - Tringa solitaria

- Habitat** Étangs calmes et petits lacs des régions boisées. Se rencontre aussi sur les rivages vaseux et peu profonds d'étendues d'eau douce ou saumâtre, rivages de lacs, rivières; terrains marécageux, endroits vaseux et à découvert de marais et trous bourbeux de bestiaux. Durant la nidification, se rencontre sur les rives d'étendues d'eau peu profonde dans des régions boisées ou en bordure.
- Nidification** Pond dans les nids abandonnés d'autres oiseaux qui nichent dans les arbres: Merle américain, Mainate rouilleux, Geai gris, Jaseur des cèdres, à différentes hauteurs dans des conifères ou feuillus. 4 oeufs.
- Alimentation** Insectes (larves, numphes), sauterelles, patineurs, chenilles, araignées, vers, petits crustacés, petites grenouilles.

GRAND CHEVALIER À PATTES JAUNES - Greater Yellowlegs - Totanus melanoleucus X

- Habitat En migration: étangs, terrains marécageux, bords peu profonds des lacs et des cours d'eau lents, dans les endroits submergés, sur la côte, dans les marais d'eau salée, dans les étangs à marée, dans les vasières et dans les baies. N'affectionnent pas les grèves avancées où déferlent les vagues.
Durant la nidification: régions boisées, tourbières, étangs et lacs, les cîmes peu élevées et peu boisées, ainsi que les brûlis. Dans la forêt claire.
- Nidification Nid: dépression ou creux à même le sol ou dans la mousse situé dans une tourbière ou sur une élévation à végétation clairsemée. 4 oeufs.
- Alimentation Menés, insectes aquatiques, larves, escargots, crabes, vers, têtards, baies.

BÉCASSEAU À POITRINE CENDRÉE - Pectoral Sandpiper - Erolia melanotos X

- Habitat En migration: marais herbeux, bord herbeux des étangs et des mares, les champs inondés, herbe rase de champs plus secs. Durant la nidification: toundra.
- Nidification Au nord (Yukon, etc) nid au sol; 4 oeufs.
- Alimentation Insectes, amphipodes, mites, araignées, graines d'herbe, crickets, vers, sauterelles.

BÉCASSEAU MINUSCULE - Least Sandpiper - Erolia minutilla X

- Habitat En migration: bords vaseux de nappes d'eau douce ou salée, avec ou sans végétation courte; dans les vasières ou les champs humides, parfois sur les grèves et champs secs. Durant nidification: tourbières, marais parsemés de touffes d'herbe, endroits plus élevés et plus secs garnis de plantes basses.
- Nidification Entre autre au nord du Québec. Nid: dépression du sol; 4 oeufs.
- Alimentation Moustiques, sauterelles, larves, insectes; petits crustacés et mollusques; vers.

BÉCASSEAU SEMI-PALMÉ - Semi palmed Sandpiper - Ereunetes pusillus ✓

- Habitat En migration: grèves de sable, vasières, bord découvert des mares, près des étangs, des lacs, des rivières, eau douce ou salées.
Durant nidification: terrains humides ou mouilleux de la toundra où croissent des éricacées.
- Nidification Nid: un petit creux dans la toundra humide.
- Alimentation Insectes aquatiques, amphipodes; larves de mouche, petits mollusques, crustacés, vers.

GOÉLAND À MANTEAU NOIR - Great Black-backed Gull - Larus marinus ✓

- Habitat Niche sur des falaises et dans des îles de la côte. dans des îles sur des lacs d'eau douce près des côtes. En d'autres saisons, se rencontre sur les grèves de la côte, dans les îles côtières, sur les lacs et les rivières d'eau douce, généralement près des côtes.
- Nidification Seul ou en colonies dans les îles et sur les falaises des côtes. Quelquefois dans des îles sur des lacs d'eau douce près des côtes.
Nid: dépression garnie d'herbe et d'algues, en un amas de plantes ou quelquefois en un creux sans revêtement.
Les deux sexes couvent 3 oeufs.
- Alimentation Omnivores. Dominant sur autres goélands. Se nourrit surtout d'oeufs, de jeunes et de quelques adultes d'oiseaux de mer. Quelques poissons; détritus.

GOÉLAND ARGENTÉ - Herring gull - Larus argentatus ✓

- Habitat Grèves et îles côtières, lacs, rivières d'eau douce; cherche souvent sa nourriture au dépotoirs, aux conserveries et dans les champs.
- Nidification Niche en colonies souvent avec cormorans, sternes et autres goélands. Nid placé au sol est une dépression. Le plus souvent situé dans une île côtière ou dans une île ou sur un rocher au milieu d'un lac ou d'une rivière; tantôt dans une île basse, sur le sommet plat d'une falaise ou sur une haute corniche, sur une falaise de roc et à l'occasion dans un arbre. La femelle incube 2 ou 3 oeufs.

Alimentation D'abord nécrophage, déchets de poissons soit aux dépotoirs ou aux bouches d'égouts. Sur les grèves, il s'empresse de nettoyer des nombreux animaux aquatiques morts ou échoués. Régime: poissons d'eau douce ou salée, diverses espèces d'invertébrés, des oeufs et petits d'autres espèces. Gros insectes: sauterelles; à l'occasion de souris; se nourrit souvent de baies sauvages (bleuets, camarine et sapindales).

GOËLAND À BEC CERCLE - Ring-billed Gull - *Larus delawarensis* x

Habitat Grèves, îles et lacs d'eau douce, rivières, étangs et grèves côtières d'eau salée. Fréquente dépotoirs et champs (labours frais).

Nidification Niche en colonies, sur des îles ou greves, en eau douce ou alcaline; nid placé sur le sol; 3 oeufs.

Alimentation Insectes, larves, vers; à l'occasion souris et oeufs d'autres oiseaux; sauterelles; nécrophage.

PIGEON BISET - Rock Dove - *Columba livia*

Habitat Dans les villes, dans les villages et sur les fermes; niche dans des recoins d'édifices; cherche sa nourriture dans les champs cultivés, dans les basses-cours, dans les dépotoirs, dans les rues. Évite les grandes forêts, mais se perche parfois dans les arbres.

Nidification Nid: accumulation peu épaisse de branchages et de paille. Habituellement placé à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice ou dans une falaise. Les deux sexes couvent deux oeufs.

Alimentation Graines, herbes, racines tendres, trèfle, baies.

TOURTERELLE TRISTE - Mourning Dove - *Zenaidura macroura*

Habitat Dans les bois clairs, dans les bosquets et dans les boisés aussi bien de résineux que de feuillus. Cherche sa nourriture dans des terres incultes couvertes de mauvaises herbes, des champs cultivés, des chaumes, des terrains herbeux, des bordures de route, des grèves et des sablières.

- Nidification** Nid: fragile plate-forme de granchages de préférence dans un résineux, le plus souvent entre 15 et 25 pieds, aussi sur le sol dans les prairies; peut prendre le nid abandonné d'une autre espèce. Les deux sexes participent à l'incubation de 2 oeufs.
- Alimentation** Graines: 98% du régime Ex: oxalis, setaria, blé, orge, maïs, avoine, millet, graines de pin.
Insectes, escargots.

COULICOU À BEC NOIR - Black-billed Cuckoo - Coccyzus erythrophthalmus

- Habitat** Forêt assez claire; les buissons d'aulnes et de saules et les vignes.
- Nidification** Nid fragile fait de brindilles, garni de matières végétales souples. Il est placé entre 2 et 7 pieds sur une branche d'arbuste ou d'arbrisseau, aussi bien feuillu que résineux. Les deux sexes couvent de 2 à 4 oeufs. Pond parfois dans le nid d'autres espèces.
- Alimentation** Principalement de chenilles; autres insectes: scarabés, sauterelles, cricquets; petits mollusques, poissons; certains fruits.

EFFRAIE - Barn Owl - Tyto alba

- Habitat** Cherche sa nourriture dans les champs ou tout autre endroit à découvert. Se perche et niche dans les édifices, dans les arbres creux et dans les infractuosités des falaises ou des rivages escarpés.
- Nidification** Construit son nid dans des endorits sombres et abrités, tels des cavités d'arbres ou de falaises, des greniers de grange; ne construit pas de nid mais il y a accumulation d'ossements et de poils des rongeurs dévorés. 5 à 8 oeufs.
- Alimentation** Petits rongeurs: souris, taupes, musaraignes, rats, écureuils, lapins; à l'occasion: chauve-souris, rats musqués, moufettes. Certains oiseaux: pigeons, pétrels, geais, héron vert, pinsons, carouges, étourneaux, sturnelles, hirondelles, râles, etc.

GRAND DUC - Great Horned Owl - Bubo virginianus

- Habitat Aussi bien forêt coniférienne que feuillue, tantôt la forêt épaisse continue, tantôt les bosquets, les boisés, les prairies, les ravins boisés et les vallées de rivière.
- Nidification Niche dans les arbres, dans le nid abandonné d'un oiseau de proie, d'une Corneille américaine ou d'un écureuil; quelquefois dans un arbre creux ou sur une corniche de falaise. 2 ou 3 oeufs.
- Alimentation Grandes variétés d'oiseaux et de petits mammifères: lièvres, rats, souris, gélinottes, canards, volailles et moufettes. À l'occasion porc-épic.

CHOUETTE RAYÉE^h - Barred Owl - Strix varia

- Habitat Forêt denses, les boisés, bosquets isolés d'arbres parvenus à maturité. Semble préférer les conifères ou les bois mixtes plutôt que les feuillus. Près des lacs, des cours d'eau, des marécages ou des marais.
- Nidification Niche habituellement dans des arbres creux ou dans les nids abandonnés de Falconiformes ou de Corneilles américaines. 2 ou 3 oeufs.
- Alimentation Souris, tamia, renard roux et argenté, écureuil volant, opossum, lapin, musaraigne, chauve-souris, tourterelle, gélinotte, caille, petits hiboux, gallinule pourpré, martin-pêcheur, corneille, geai, cardinal. Grenouille, écrevisse, lézard, petits serpents, escargots, salamandre. Quelques poissons. Sauterelles, cricquets, araignées.

CHOUETTE CENDRÉE^h - Great Grey Owl - Strix nebulosa

- Habitat Forêts conifériennes ou mixtes, quelquefois feuillues. Pendant l'hiver, se rencontre souvent dans forêts de feuillus, et parfois en plein champs. On la retrouve probablement au Québec, mais ce n'est pas démontré qu'elle y niche.

Nidification	Niche dans nid abandonné d'un falconiforme ou d'une Corneille américaine, entre 12 et 50 pieds, résineux ou feuillus. Forêt de pruches ou de pins. 2 à 5 oeufs.
Alimentation	Souris, rats, musaraignes, taupes, lapins, lièvres, écureuils roux, corneilles; à l'occasion des petits oiseaux.

ENGOULEVENT COMMUN - Common Nighthawk - Chordeiles minor

Habitat	Cherche sa nourriture dans les airs au-dessus des villes ou des terres inhabitées. Se perche dans les arbres de la forêt claire, sur les pieux de clôture dans les endroits à découvert; se pose au sol dans les clairières ou dans les percées de forêt, dans les endroits naturellement découverts, dans les brûlis et sur les toits plats, dans les plaines.
Nidification	Pond ses oeufs sur le sol (pas de nid), dans du sable ou du gravier, ou sur le roc dans des endroits à découvert. La femelle assure la couvaison de 2 oeufs.
Alimentation	Presqu'exclusivement d'insectes: maringouins, fourmis ailées sauterelles.

MARTINET RAMONEUR - Chimney Swift - Chaetura pelagica

Habitat	Cherche sa nourriture dans les airs; avant une pluie, il préfère des espaces au-dessus de l'eau ou des endroits à découvert.
Nidification ^N	Autrefois, construisait son nid dans un arbre creux ou dans une crevasse au flanc d'une falaise de roc. Aujourd'hui, utilise l'intérieur des cheminées. Nid: fait de brindilles agglutinées fixées au moyen de salive de l'oiseau. 4 ou 5 oeufs couvés par les 2 parents.
Alimentation	Insectes et araignées.

COLIBRI À GORGE RUBIS - Ruby-Throated Hamminbird - Archilochus colubris

- Habitat Jardins, vergers, clairières, en bordure de la forêt et presque partout où croissent des fleurs, assez près des arbres ou des grands buissons dans lesquels il se perche, s'abrite et niche.
Peut se nourrir dans des trous de Pic maculé.
- Nidification Nid: petite coupe fixée sur une branche d'arbre. Il est composé d'écailles de bourgeons et de duvet végétal, l'extérieur étant recouvert de petites brides de lichen, retenues par des fils d'araignée. La femelle couve 2 oeufs.
- Alimentation Insectes minuscules et nectar.

MARTIN PÊCHEUR - Belted Kingfisher - Megaceryle alcyon X

- Habitat À proximité des eaux poissonneuses (de préférence limpides) douces ou salées: lacs, étangs, rivières, ruisseaux. Généralement assez près d'un point élevé où il peut se percher, comme un arbre, un poteau ou des fils.
- Nidification Niche sur une berge de terre abrupte. Sait utiliser les tranchées creusées de main d'homme, les routes et les voies ferrées, les sablières, les tas de bran de scie, traces de roues dans les buttes de terre, les racines garnies de terre d'un arbre renversé.
Nid: terrier circulaire, au bout d'un tunnel dans la paroi d'une berge abrupte.
Tunnel mesure de 3 à 7 pieds, est horizontal ou légèrement incliné vers le haut. Le terrier est souvent placé près de la surface supérieure d'une berge. La femelle couve de 5 à 8 oeufs.
- Alimentation Petits poissons, gros têtards de grenouille d'Amérique, crabes, écrevisses, lézards, moules, grenouilles, crapauds, salamandre, petits serpents et tortues; sauterelles, papillons et insectes. Jeunes oiseaux, souris et certaines baies.

PIC FLAMBOYANT - Yellow-shafted Flicker - Colaptes auratus

- Habitat** Préfère les endroits assez peu ombragés, comme les forêts clairsemées, les fermes, les brûlis, les pâturages, et d'autres endroits à découvert dans le voisinage d'arbres. Cherche sa nourriture au sol ou dans les arbres. Se sert aussi des arbres pour se mettre à l'abri, pour se percher, pour tambouriner et pour nicher. Dans les prairies ou les plaines, il s'agrippe aux poteaux ou se perche sur les clôtures.
- Nidification** Peut faire son nid dans un édifice ou dans une berge de terre. Nid: cavité creusée par les 2 parents, le plus souvent dans un arbre, (souvent mort) à des hauteurs de 2 à 60 pieds. Souvent dans un poteau de téléphone ou dans un pieu de clôture. Les deux sexes couvent de 6 à 9 oeufs.
- Alimentation** Cherche le plus souvent sa nourriture au sol. Fourmis, autres espèces d'insectes qu'ils trouvent sur l'écorce ou sous l'écorce des arbres.

PIC MACULÉ - Yellow-bellied Sapsucker - Sphyrapicus varius

- Habitat** Durant la nidification, il préfère les forêts feuillues ou mixtes, particulièrement là où les peupliers ou les bouleaux sont importants.
- Nidification** Nid: trou creusé par l'oiseau dans un arbre (mort ou presque) à différentes hauteurs. Les deux sexes couvent de 3 à 7 oeufs.
- Alimentation** Insectes, oiseaux-mouches, autres pics, fauvettes, écureuils-volants; fruits et baies.

PIC CHEVELU - Hairy Woodpecker - Dendrocopos villosus

- Habitat** Pendant la nidification, il fréquente les forêts et les terrains boisés parvenus à une certaine maturité. Dans la forêt dense, il préfère les endroits assez clairsemés, les bordures ou les clairières; aussi les brûlis et les endroits déboisés. Se rencontre dans forêts de feuillus, de conifères ou mixtes mais préfère les endroits où se trouvent quelques feuillus.
- Nidification** Nid dans une cavité creusée par eux, dans un arbre vert ou sec. Les deux sexes incubent de 3 à 5 oeufs.
- Alimentation** Insectes, 75%; larves, millipèdes, araignées; fruits: framboises, bleuets, noix.

GRAND PIC - Pileated Woodpecker - Dryacopus pileatus

- Habitat Peuplements mûrs de divers types, particulièrement ceux où persistent des chicots. Au cours de la saison de nidification, il préfère les forêts relativement grandes et à l'état sauvage. Peut aussi fréquenter les boisés, les parcs et des peuplements mûrs de faible étendue.
- Nidification Niche dans une cavité qu'il se creuse entre 15 et 70 pieds du sol, dans un arbre mort, ou quelquefois vivant, aussi bien dans un conifère qu'un feuillu. Les deux sexes incubent 3 ou 4 oeufs.
- Alimentation 75% nourriture animale; 25% végétale: mouches, maringouins, graines, fruits, gomme.

TYRAN TRITRI - Eastern Kingbird - Tyrannus tyrannus

- Habitat Se rencontre dans des endroits relativement découverts: champs, pâturages, prairies (garnies de quelques arbres, de buissons ou de poteaux de clôture pour se percher et nicher), forêts claires, arbres isolés, vergers, bordure des forêts, fermes, arbres au pied inondé sur le bord de rivières ou de lacs et tourbières.
- Nidification Construit son nid sur une branche d'arbre ou de buisson, parfois sur un poteau de clôture ou sur une souche, à des hauteurs variant entre 8 et 20 pieds. Nid: structure volumineuse de brindilles et d'herbes, tapissée de poils d'animaux de racelles, d'herbes sèches et de fibres végétales. La femelle couve 3 ou 4 oeufs.
- Alimentation Insectivore.

MOUCHEROLLE HUPPE - Great Crested Flycatcher - Myiarchus crinitus

- Habitat Régions boisées parvenues à une certaine maturité, préférant les forêts feuillues ou mixtes. Se rencontre aussi dans les boisés parvenus à une maturité relative, les bosquets d'arbres assez grands et les vergers, près des régions boisées. Se perche sur les hautes branches des arbres.
- Nidification Le nid est construit dans une cavité d'arbre vert ou sec, le plus souvent un feuillu. Peut utiliser une cavité naturelle ou un trou de pic. Le nid volumineux est une accumulation de feuilles (aiguilles de pin), de crins, de plumes, de mousses, de débris, d'une ou plusieurs mues de serpent. Les deux sexes couvent de 4 à 6 oeufs.

Alimentation

Insectes: libellules, mouches, maringouins, sauterelles, cricquets, punaises, papillons, chenilles, araignées; fruits: mûres, cerises, framboises.

MOUCHEROLLE À VENTRE JAUNE - Yellow-bellied Flycatcher - Empidonax flaviventris

Habitat

Dans des régions boisées et dans des fourrés à l'abri du soleil, là où le parterre de la forêt est recouvert de mousse; dans des buissons d'aulnes et de saules, où croissent souvent des conifères; dans des tourbières et sur les bords boisés des cours d'eau. Cherche sa nourriture surtout dans les sous-étages des régions boisées. Dans la zone de nidification, il se perche quelquefois à 30 ou 40 pieds du sol à la cime d'un conifère ou d'un feuillu.

Nidification

Nid: composé de radicelles, de brins d'herbe et de mousse, habituellement placé sur le sol (souvent enfoncé dans la mousse) ou dans les racines d'un arbre renversé. La femelle couve de 3 à 5 oeufs.

Alimentation

Insectes: chenilles, araignées, fourmis, baies.

MOUCHEROLLE DES AULNES - Traill's Flycatcher - Empidonax traillii

Habitat

Fréquente les fourrés d'aulnes et de saules, les massifs de buissons d'aspect similaire, habituellement le long des cours d'eau, des lacs, des étangs, des tourbières et des marais; les endroits humides où les arbres ont été coupés ou les brûlis humides, les massifs de grands arbustes ou les jeunes peupliers faux-trembles en terrain élevé; les terres hautes couvertes de buissons, les courtes épinettes des tourbières et rarement les vergers.

Nidification

Nid: construit d'herbes, de tiges, de plantes et de fibres végétales. Il est placé dans une fourche verticale dans un buisson entre 2 et 6 pieds du sol. La femelle couve 3 ou 4 oeufs.

Alimentation

Plusieurs coléoptères (65 sp.) Guêpes (41%) mouches, punaises, chenilles, sauterelles, libellules, araignées, mille-pattes; mûres.

MOUCHEROLLE TCHÉBEC - Least Flycatcher - Empidonax minimus

- Habitat Fréquente les terrains boisés relativement clairs, soit feuillus, soit mixtes; le bord des forêts, les clairières, les boisés de feuillus en regain, les taillis, les vergers et les fourrés d'aulnes.
- Nidification Nid placé au creux d'une fourche verticale d'une branche, tantôt dans un feuillu, tantôt dans un conifère, ou sur une branche horizontale; dans des aulnes ou dans d'autres grands buissons. Le nid est habituellement placé entre 5 et 25 pieds du sol. 3 à 6 oeufs.
- Alimentation Insectes: 67 espèces de coléoptères, fourmis, guêpes, libellules, etc. araignées; petits fruits.

MOUCHEROLLE À CÔTES OLIVE - Olive-sided Flycatcher - Nuttallornis borealis

- Habitat Se perche haut dans les arbres souvent des arbres secs, dans les hautes branches sèches d'arbres verts ou dans les arbres verts dont la cime est peu fournie. Se rencontre dans des brûlis où persistent des chicots, dans des tourbières sur le bord de lacs où des arbres ont été noyés, dans des bûchés, dans des clairières.
- Nidification Nid placé au bout d'une branche de conifère, à grande hauteur rarement en dessous de 7 pieds du sol. Il est fait de brindilles, de radicelles, de lichen et de mousse. 3 ou 4 oeufs.
- Alimentation Insectes volants, fourmis.

PIOUI DE L'EST - Eastern Wood Pewee - Contopus virens

- Habitat Préfère les boisés clairs de feuillus parvenus à une certaine maturité, ainsi que les clairières. Il se rencontre aussi en forêt, dans les boisés, dans les vieux vergers, dans les bois mixtes; quelquefois dans les terrains boisés de conifères relativement clairs.
- Nidification Nid: fait de brins d'herbe, de fibres végétales, il est garni de lichens à l'extérieur. Il chevauche une branche horizontale (le plus souvent d'un feuillu) entre 8 et 60' du sol. La femelle couve de 2 à 4 oeufs.
- Alimentation Mouches, coléoptères, guêpes, abeille, fourmis, mite, punaise sauteuses; petits fruits.

MOUCHEROLLE PHÉBI - Eastern Phoebe - Sayornis phoebe

Habitat	Pendant la nidification, se rencontre souvent à proximité des cours d'eau et des lacs ou des falaises rocheuses, ainsi que des ponts lui offrant des niches appropriées, où se trouvent des arbres et des buissons. Se trouve aussi à proximité d'édifices, loin de l'eau.
Nidification	Nid: volumineux, construit de boue (pas toujours) de mousse, de brins d'herbe et de radicelles; il est garni d'herbes fines, de poils et de fibres végétales. Il est placé sur une corniche de roches, sous un pont ou sous une saillie d'édifice. La femelle couve 5 oeufs.
Alimentation	Coléoptères, guêtes, fourmis, abricilles, mouches, punaises, sauterelles, cricquets, libellules, mites, chenilles, araignées, mille-pattes, tiques. À l'occasion, des petits poissons.

ALOUETTE CORNUE - Horned lark - Eremophila alpestris

Habitat	Terrains découverts, champs, labours, grève
Nidification	Trou au sol, plus ou moins sec, découverts.

HIRONDELLE BICOLORE - Tree swallow - Iridoprocne bicolor

Habitat	Près de cours d'eau, endroit humide, prés humides, tourbières
Nidification	Cavités d'arbres, nichoirs
Alimentation	Insectes; fruits de cornoüiller à feuilles alternes, myrique beaumier.

HIRONDELLE DES SABLES - Bank swallow - Riparia riparia

Habitat	Près de cours d'eau, terrains découverts
Nidification	En colonies, dans un terrier.

HIRONDELLE À AILES HÉRISSES - Rough-Winged Swallow - Stelgidopteryx ruficollis

Habitat Berges de sable, glaise ou de gravier ou vieux terriers abandonnés à proximité de l'eau ou de terrains secs, sur des ponts ou infractuosités.

Nidification idem. habitat, en couples isolés.

HIRONDELLE DES GRANGES - Barn Swallow - Hirundo rustica

Habitat Près de cours d'eau, champs.

Nidification Intérieur d'édifices (divers genres) isolés ou en colonies sous des ponts, grottes, saillies rocheuses.

HIRONDELLE À FRONT BLANC - Cliff Swallow - Petrochelidon pyrrhonota

Habitat Près de cours d'eau, marais, terrains découverts.

Nidification Espèce grégaire, nid fixé aux édifices, sous les avant-toits.

Alimentation Insectes.

GEAI BLEU - Blue Jay - Cyanocitta cristata

Habitat Boisés feuillus ou mixtes de divers types, surtout là où il y a des hêtres ou des chênes ou des pommiers nains.

Nidification Arbres, surtout conifères, à 8 ou 20' du sol: aulne rugueux, pommier nain.

Alimentation Fruits, insectes, graines, akènes, oeufs ou poussins d'autres oiseaux; fruits d'amélanchier, aulnes rugueux, cerisier de Virginie, noisetier à long bec, pommier nain, sumac vinaigrier, sureau blanc*, blé cultivé, framboisier, graines de pommier nain.

GRAND CORBEAU - Common Raven - Corvus corax

Habitat	Montagneux et accidenté, bord de lac et de rivières, dépotoirs.
Nidification	Falaise, conifères, en couples isolés.
Alimentation	Nécrophage.

CORNEILLE AMÉRICAINE - Common Corw - Corvus brachyrhynchos

Habitat	Préfère régions découvertes avec boisés tout près.
Nidification	Dans un conifère, feuillus, buissons ou au sol, granges plus ou moins abandonnées.
Alimentation	Végétale ou animale; fruits: cerisier de Virginie*, cornouiller à feuilles alternes, cournouiller stolonifère*, pommier nain, sumac vinaigrier; blé cultivé, fraisiers.

MÉSANGE À TÊTE NOIRE - Black-capped Chickadee - Parus atricapillus

Habitat	Forêts feuillues ou mixtes, sec ou humide, âge et étendues variées; clairières et bordures du bois, grands buissons et dans les champs.
Nidification	Dans une cavité, près du sol.
Alimentation	Oeufs d'insectes, insectes, graines et fruits: sumac vinaigrier, airelles, blé cultivé.

MÉSANGE À TÊTE BRUNE - Boreal Chickadee - Parus hudsonicus

Habitat	Forêts conifères et mixtes, se nourrit dans feuillus et fourrés.
Nidification	Dans une cavité naturelle, arbre ou chicot pas plus haut que 10'.
Alimentation	GRAINES DE CÔNE, insectes, Larves.

MÉSANGE HUPPÉE - Tuffed Titmouse - Parus bicolor

Habitat Forêt feuillue ou mixte des milieux ruraux, résidentiels.
Nidification Cavité naturelle
Alimentation Amélanchier

SITELLE À POITRINE BLANCHE - White-Breasted Nuthatch - Sitta carolinensis

Habitat Feuillus d'une certaine maturité, bois mixtes.
Nidification Trou d'arbre à différentes hauteurs
Alimentation Fruits: sorbier d'Amérique

SITELLE À POITRINE ROUSSE - Red-Breasted Nuthatch - Sitta canadensis

Habitat Conifères ou mixtes, plus ou moins feuillus.
Nidification Fait un trou dans bois en décomposition: chicot, poteau à différentes hauteurs.

GRIMPEREAU BRUN - Brown Creeper - Certhia familiaris

Habitat Forêts matures, feuillues ou conifères
Nidification Sous un morceau d'écorce soulevé sur tronc d'arbre ou dans une cavité naturelle.
Alimentation Insectes.

TROGLODYTE DES FORÊTS - Winter Wren - Troglodytes troglodytes

Habitat Forêts de conifères à une certaine maturité, denses et humides, bord des cours d'eau, abattis de clairières.
Nidification Dans cavité des racines d'arbres renversé, souche pourrie ou dessous, broussailles.
Alimentation Insectes

TROGLODYTE DES MARAIS - Long-billed Marsh Wren - Telmatodytes palustris

Habitat Marais de faible profondeur, quenouilles et scirpes.
Nidification Dans la végétation
Alimentation Insectes

TROGLODYTE À BEC COURT - Short Billed Marsh Wren - Cistothorus platensis

Habitat Marais à longues herbes, tourbières, prés mouilleux, court
buissons, épars
Nidification Marais
Alimentation Insectes

MOQUEUR CHAT - Cat Bird - Dumetella carolinensis

Habitat Fourrés de buissons courts et denses de feuillus, près de
cours d'eau, des routes, des bois: aulne rugueux, pommier
nain.
Nidification Buissons denses: aulne rugueux, pommier nain
Alimentation Fruits: aulne rugueux, cerisier de Virginie*, cornouiller à
feuilles alternes*, et stolonifère, génévrier commun,
pommier nain*, sorbier*, sumac, sureau blanc et rouge,
houx, framboisiers.

MOQUEUR POLYGLOTTE - Northern Mockingbird - Mimus polyglottos

Habitat Buissons et enchevêtrements de végétation, haies: aulne
rugueux, if du Canada, sureau blanc et rouge.
Nidification de 4 à 20' au-dessus du sol, buissons, arbres ou vigne:
aulne rugueux, if du Canada, sureau blanc.
Alimentation Fruits: aulne rugueux, cornouiller à feuilles alternes,
génévrier commun, sumac vinaigrier, sureau blanc* et rouge.

MOQUEUR ROUX - Brown Thrasher - Toxostoma rufum

- Habitat Fourrés de feuillus, champs avec buissons, bord de forêts, sureau blanc et rouge.
- Nidification Fourrés de buissons, de préférence avec épines, quelques fois au sol. CT: sureau blanc
- Alimentation CT: fruit d'aulne rugueux, cerisier de Virginie*, cornouiller à feuilles alternes*, et stolonifère*, sorbier*, sumac, sureau blanc*, rouge, airelle, blé cultivé, fraisier, framboisier, houx, myrique beaumier.

MERLE AMÉRICAIN - American Robin - Turdus Migratorius

- Habitat Pâturage, ferme, champ, forêt claire, buchés et brûlis. CT: amélanchier, cornouiller à feuilles alternes, if du Canada, pommier nain, sureau rouge.
- Nidification Arbre ou buisson de type feuillus ou résineux; CT: amélanchier, cornouiller à feuilles alternes, if du Canada, pommier nain, Thuya occidental (cèdre).
- Alimentation Ver de terre; CT: fruit d'amélanchier, aulne rugueux, cerisier de Virginie*, cornouiller à feuilles alternes*, et stolonifère*, génévrier commun*, pommier nain, sorbier d'Amérique*, sumac vinaigrier, sureau blanc, rouge* (graine: cèdre), airelle, fraisier.

GRIVE DES BOIS - Wood Thrush - Hylocichla mustelina

- Habitat Strate basse des forêts de feuillus matures; CT: amélanchier, cornouiller à feuilles alternes, if du Canada, sureau blanc.
- Nidification Arbre ou arbuste de 5 à 15' de haut: CT: amélanchier, cornouiller à feuilles alternes*,
- Alimentation CT: fruit d'amélanchier, cerisier de Virginie*, cornouiller à feuilles alternes*, if du Canada, sorbier, sureau blanc*.

GRIVE SOLITAIRE - Hermit Thrush - Catharus guttata

Habitat	Forêts mixtes, feuillus ou conifères. Tourbière, marais forêts claires de pin gris, sol sec et sableux, brûlis buchers. CT: amélanchier, aulne rugueux, cerisier de Virginie, cornouiller à feuilles alternes, sureau blanc et rouge.
Nidification	Au sol, rarement dans un buisson; CT: aulne rugueux.
Alimentation	CT: fruit d'amélanchier, aulne rugueux, cerisier, cornouiller à feuilles alternes*, sureau blanc et rouge, houx.

GRIVE À DOS OLIVE - Swainson's Thrush - Catharus ustulata

Habitat	Forêt mixte ou de conifères, fourré d'aulne, saule, peuplement pur de grand feuillus, repousse de brûlis ou de coupe. CP: amélanchier, sureau blanc et rouge
Nidification	Petit conifères ou buissons résineux.
Alimentation	CT: fruit d'amélanchier, cerisier de Virginie*, de sureau blanc* et rouge*, cornouiller à feuilles alternes*, sorbier.

GRIVE FAUVE - Veery - Catharus fuscescens

Habitat	Feuillus ou mixtes, parterre à buisson clair, repousse d'aulne, de saule sur le bord de lac, cours d'eau, ravins. CT: cornouiller à feuilles alternes, sureau blanc et rouge.
Nidification	Au sol ou très près. CT: sureau blanc
Alimentation	CT: fruit du cerisier de Virginie, cornouiller à feuilles alternes, sorbier, sureau rouge*.

MERLE BLEU À POITRINE ROUGE - Eastern Bluebird - Sialia sialis

Habitat	Bois clair et épars, bord de bois, verger, ferme; CT: pommier nain, sureau rouge, myrique baumier.
Nidification	Dans creux d'arbre; CT: pommier nain dans une cavité.
Alimentation	CT: fruit d'amélanchier, cerisier de Virginie*, cornouiller à feuilles alternes*, cornouiller stolonifères*, génévrier commun*, sorbier*, sumac vinaigrier, sureau rouge*, houx.

ROITELET À COURONNE DORÉE - Golden-crowned Kinglet - *Regulus satrapa*

Habitat Conifères.
Nidification Sur conifères.
Alimentation Insectes (tordeuse des bourgeons), araignées.

ROITELET À COURONNE RUBIS - Ruby-crowned Kinglet - *Regulus calendula*

Habitat mixte et conifères, petit boisé, muskegs, plusieurs boisés quand c'est la migration
Nidification Dans conifères près du sol

JASEUR DES CÈDRES - Cedar Waxwing - *Bombycilla cedrorum*

Habitat Conifère et feuillus, clair ou épars, les buissons sur le bord d'habitations, arbres à baies et fruits, bord des lacs, tourbière, brûlis, CT: sureau blanc
Nidification Dans conifère ou feuillus de 4 à 40'
Alimentation Insecte, baies, CT: fruit d'amélanchier, sorbier*, aulne rugueux*, sureau blanc*, cerisier de Virginie*, cornouiller stolonifère, pommier nain*, sumac, houx, génévrier commun*; fleur: pommier nain

ÉTOURNEAU SANSONNET - Common starling - Sturnus vulgaris

Habitat	Partout
Nidification	Trou ou cavité dans un arbre; CT: pommiers nains.
Alimentation	Insectes et baies CT: fruit cerisier Virginie*, pommier nain*, sumac vinaigrier, sureau blanc*; Graines: de pommier nain; plantes: fraisier. N.B. Compétitionne avec le Pic à tête rouge et le Merle bleu à poitrine rouge.

VIRÉO À TÊTE BLEUE - Solitary Vireo - Vireo solitarius

H-bitat	Bois mixtes et clairs.
Nidification	Habituellement dans résineux, pas plus hauts que 15'.
Alimentation	Voir Viréo aux yeux rouges.

VIRÉO AUX YEUX ROUGES - Red-Eyed Vireo - Vireo olivaceus

Habitat	Feuillus et mixtes clairs, grand buisson, bord des cours d'eau, brûlis, coupe en régénération; CT: pommier nain.
Nidification	Feuillus de 5 à 10' ; CT: pommier nain
Alimentation	Insectes, baies; CT: fruit d'amélanchier, cerisier de Virginie, sumac vinaigrier.

VIREO DE PHILADELPHIE - Philadelphia Vireo - Vireo philadelphicus

Habitat	Mixte et feuillus clairs, lisières des forêts, peuplier faux-tremble, fourré d'aulne et saule.
Nidification	Dans feuillus de 10 à 45 pieds.
Alimentation	idem Viréo aux yeux rouges.

VIRÉO MÉLODIEUX - Warling Vireo - Vireo gilvus

- Habitat Feuillus mûrs et clairs, forêt mixte, vergers, parcs, villes, villages, fourrés, bosquets
- Nidification Très haut dans les feuillus
- Alimentation Voir: Viréo aux yeux rouge. CT: Cerisier de Virginie

FAUVETTE NOIR ET BLANC - Black and White Warbler - Mniotilta varia

- Habitat Feuillus mixtes, humides
- Nidification Au sol près d'un arbre, roche ou autre objet.

FAUVETTE OBSCURE - Tennessee Warbler - Vermivora peregrina

- Habitat Conifère, mixte, feuillus, tourbière, fourré, brûlis, régions claires.
- Nidification Au sol, dans troubières, flanc de colline, nid dans sphaigne.

FAUVETTE À JOUES GRISES - Nashville Warbler - Vermivora ruficapilla

- Habitat Mixte, feuillus clairs non à maturité avec peupliers faux-tremble et bouleau, avec buissons bas, terrain sec ou humide, ancienne clairière brûlis.
- Nidification Au sol dans un buisson ou touffe d'arbres

FAUVETTE PARULA - Parula Warbler - Parula americana

- Habitat Forêt feuillus ou conifères, clairières, humide avec lichens.
- Nidification Intérieur d'une touffe pendante de lichens.

FAUVETTE JAUNE - Yellow Warbler - Dendroica petechia

Habitat	Fourré aulne et saule, humide, cours d'eau, tourbières et marais, arbustes d'ornement. CT: Aubépine, sureau blanc.
Nidification	Arbres, buissons de 3 à 8' du sol; CT: dans aubépine et sureau blanc.
Alimentation	Insectes.

FAUVETTE À TÊTE CENDRÉE - Magnolia Warbler - Dendroica magnolia

Habitat	Mixte et claire, jeune résineux.
Nidification	Bas des conifères

FAUVETTE TIGRÉE - Cape May Warbler - Dendroica tigrina

Habitat	Mixte et résineux clair.
---------	--------------------------

FAUVETTE BLEUE À GORGE NOIRE - Black-Throated Blue Warbler - Dendroica caerulescens

Habitat	Mixte et feuillus et buissons.
Nidification	Arbustes à partir de 2" à 3' maximum.

FAUVETTE VERTE À GORGE NOIRE - Black Throated Green Warbler - Dendroica virens

Habitat	Mixte clair et résineux, peuplier faux-tremble et bouleaux.
Nidification	Jeunes et vieux conifères.
Alimentation	Insectes

FAUVETTE À COURONNE ROUSSE - Palm Warbler - Dendroica palmarum

Habitat Terrain sec ou humide, boisé épars avec buisson, tourbière.
Nidification Voir: habitat

FAUVETTE COURONNÉE - Ovenbird - Seiurus aurocapillus

Habitat Forêt feuillus et cimes denses
Nidification Au sol plus ou moins découvert dans forêt.

FAUVETTE DES RUISSEAUX - Northern Water Thrush - Seiurus noveboracensis

Habitat Fourré de buissons près de l'eau avec aulne et saule, tourbières, près de mares d'eau.
Nidification Dans racines d'arbre renversé, cavité de berge, dans souches.

FAUVETTE TRISTE - Mourning Warbler - Oporornis philadelphia

Habitat Bord de forêt et clairière ensoleillée, tourbière et marais, brûlis, bosquet en regain.
Nidification Habituellement au sol, plantes basses, buissons.

FAUVETTE MASQUÉE - Common Yellowthroat - Geothlypis trichas

Habitat Fourré, bord de cours d'eau, champs en friche, quenouilles, scirpes des marais.
Nidification Au sol ou près.

FAUVETTE À CROUPION JAUNE - Myrtle Warbler - Dendroica coronata

Habitat Bois clair; CT: myrique baumier
Nidification Conifères 10 à 15'.
Alimentation CT: fruits de génévrier commun, myrique baumier

FAUVETTE À GORGE ORANGÉE - Blackburnian Warbler - Dendroica fusca

Habitat Conifères et mixtes, forêt repousse ou à maturité.
Nidification Conifères de 5 à 85'.

FAUVETTE À FLANCS MARRONS - Chestnut-sided Warbler - Dendroica pensylvanica

Habitat Repousse broussailleux et clairs, fourrées feuillus, terrain sec et humide.
Nidification Petit arbre, buisson, vigne 1 à 3'.

FAUVETTE RAYÉE - Blackpool Warbler - Dendroica striata

Habitat Épinette noire, lieux humides, en migration dans conifères et feuillus.
Nidification Épinette et basse hauteur, jamais au sol.

FAUVETTE DES PINS - Pine Warbler - Dendroica Pinus

Habitat Pinède
Nidification Pinède
Alimentation La trouve dans différents peuplements.

FAUVETTE POLYGLOTTE - Yellow Breasted Chat - Icteria virens

- Habitat Fourrés, grand buisson en bordure des cours d'eau, clairière et sureau blanc.
- Nidification Dans des petits arbres ou enchevêtrement d'arbustes, de 2 à 5' de haut.
- Alimentation CT: Fruit du sureau blanc.

FAUVETTE À CALOTTE NOIRE - Wilson's Warbler - Wilsonia pusilla

- Habitat Buisson d'aulne, saules ou bouleaux, près des cours d'eau tourbières. CT: aubépine.
- Nidification Au sol à la base des buissons CT: aubépine

FAUVETTE FLAMBOYANTE - American Redstart - Setophaga ruticilla

- Habitat Forêt feuillus ou mixtes, endroit en regain brûlis.
- Nidification Dans une feuillus de 6 à 25 pieds.
- Alimentation CT: fruit amélanchier.

FAUVETTE DU CANADA - Canada Warbler - Wilsonia canadensis

- Habitat Buissons, fourré d'aulnes, humide, près des cours d'eau
- Nidification Au sol sur un objet au sol (arbre, souche) trou de berge ou racine d'arbre renversé

MOINEAU DOMESTIQUE - House sparrow - Passer domesticus

- Habitat Là où il y a présence humaine
- Nidification Dans le nid de certains oiseaux, édifices avec cavité.
- NB. compétitionne l'Hirondelle à front blanc et autres espèces.

GOGLU - Bobolink - Dolichonyx oryzivorus

Habitat Champs, prés, grandes herbes
Nidification Au sol, dans les grandes herbes où à découvert

STURNELLE DES PRÉS - Eastern Meadowlark - Sturnella Magna

Habitat Champ découvert, sol avec plus ou moins de végétation
Nidification Au sol dans touffes d'herbes

CAROUGE À ÉPAULETTES - Red Winged Blackbird - Agelaius phoeniceus

Habitat Marais à grenouilles, scipes, laîches ou autres. CT: aubépine, champs de blé.
Nidification Idem que l'habitat, dans la végétation CT: aubépine.
Alimentation Trouve dans chaume, labours, champs céréales; CT: fruit de l' mélanchier.

ORIOLE DE BALTIMORE - Baltimore Oriole - Icterus galbula

Habitat Grands arbres isolés, ormes et autres feuillus clairs. CT: Pommier nain.
Nidification Idem que l'Habitat, CT: pommier nain
Alimentation Insectes, chenilles, petits fruits; CT: fruit d'amélanchier cerisier de Virginie, pommiers nains, sorbier*, framboisier.

MAINATE ROUILLEUX - Rusty Blackbird - Euphagus carolinus

Habitat Forêts humides, grands buissons avec marres d'eau, tourbières, bords de lacs inondés et cours d'eau, digues de castor; CT: aubépine.
Nidification Dans petits conifères, quelquefois dans buisson feuillus. Près de l'eau à moins de 10' du sol; CT: aubépine.
Alimentation Blé cultivé, framboisiers.

MAINATE BRONZÉ - Common Grackle - Quiscalus guiscula X

- Habitat Champs, pâturages, pelouse, terrain golf, grève, marais, terrain humide avec aulne, saules, bois humide et clair
CT: sureau blanc.
- Nidification Dans bois clairs, parcs, bosquets, arbres d'ornements en petites colonies, dans des conifères, occasionnellement dans buissons, creux d'arbres; rarement au sol ou dans granges.
- Alimentation CT: fruits: cerisier à grappe, sorbier d'Amérique*, sureau blanc, framboisier, il cherche aussi dans les champs.

VACHER À TÊTE BRUNE - Brown-headed Cowbird - Molothrus ater

- Habitat Endroit découvert, cherche présence de grands mammifères (vache, cheval)
- Nidification Ne fait pas de nid, dépose les oeufs dans d'autres nids d'oiseaux (grue, fauvette, viréo, pinsons)
- Alimentation insectes

TANGARA ÉCARLATE - Scarlet tanager - Piranga olivacea

- Habitat Forêt feuillus mature, bois mixtes, pinèdes.
- Nidification Bout d'une branche horizontale entre 10 et 50' au-dessus du sol.
- Alimentation CT: fruit d'amélanchier, cerisier de Virginie.

TANGARA VERMILLON - Summer tanager - Piranga rubra

- Habitat
- Nidification
- Alimentation CT: fruit du Cerisier de Virginie

CARDINAL ROUGE - Northern Cardinal - *Cardinalis cardinalis*

- Habitat Fourré de conifères ou feuillus, enchevêtrements d'arbustes, haies en bordure des bois, bord de champs en friche, clairières, buissons sur le bord des cours d'eau, abords des habitations. CT: aulne rugueux, sureau blanc.
- Nidification Dans les grands buissons ou dans les petits arbres, habituellement de 5 à 8' de haut. CT: aulne rugueux, pommier nain.
- Alimentation CT: fruits d'amélanchier, aulne rugueux, cerisier à grappe, pommier nain, sumac vinaigrier, sureau blanc*, blé cultivé, framboisier, millet diffus.

GROS-BEC À POITRINE ROSE - Rose-breasted Grosbeak - *Phœticus ludovicianus*

- Habitat Forêt de feuillus ou mixtes avec grands buissons, non loin en bordure de cours d'eau, de lacs, d'étangs et de marais boisés en regain. CT: aubépine, sureau blanc et rouge.
- Nidification Grand buisson ou arbre entre 5 et 15' au-dessus du sol; CT: aubépine.
- Alimentation CT: fruit d'amélanchier, cerisier de Virginie*, sureau blanc et rouge*, graines d'aubépine.

BRUANT INDIGO - Indigo Bunting - *Passerina cyanea*

- Habitat Lieux parsemés de buissons, bordure de clairières, secteur de regain, ancien pâturage, buissons en bord de routes, bords de cours d'eau; CT: spirée à larges feuilles, sureau blanc.
- Nidification Arbres ou arbustes près du sol; CT: spirée à larges feuilles.
- Alimentation CT: fruit du sureau blanc.

GROS-BEC ERRANT - Evening Grosbeak - *Hesperiphona vespertina*

- Habitat Forêt mixte et de conifères, secteur de regain.
- Nidification dans conifères ou feuillus de 15 à 60' de haut.
- Alimentation Graine d'érable de negondo; CT: Fruit de l'aulne rugueux, cerisier de Virginie, génévrier commun*, pommier nain*, sorbier*, blé cultivé, tournesol, bourgeons du pommier nain.

ROSELIN POURPRÉ - Purple Finch - Carpodacus purpureus

- Habitat Forêt conifère mixte et clair, bords de clairières, grand buisson, parcs et jardin.
- Nidification Dans conifères ou pommier (rare) de 5 à 60' de haut.
- Alimentation CT: fruit: aulne rugueux, cornouiller stolonifère*, genévrier commun*, pommier nain*. Graines d'aubépine, de pommier nain*, blé cultivé, millet sp. Fleurs: pommier nain*.

GROS-BEC DES PINS - Pine Grosbeak - Pinicila enucleator

- Habitat Conifère clair, clairières et bord de forêt en migration et l'hiver dans les feuillus (frênes blancs, sorbiers et arbres à fruits) arbres d'ornement, vergers, grands buissons.
- Nidification Dans conifère de 12 à 15' de hauteur.
- Alimentation CT: Fruits: aulne rugueux, cerisier de Virginie, genevriers commun*, pommier nain, sorbier* d'Amérique.

CHARDONNERET DES PINS - Pine Siskin - Spinus pinus

- Habitat Forêt mixte et conifère à différent stade de maturité et de densité
- Nidification Dans conifères de 6 à 90' de hauteur.
- Alimentation CT: graines d'Aubépine*, tournesol, blé cultivé, cèdre*

CHARDONNERET JAUNE - American Goldfinch - Spinus tristis

- Habitat Champs en friche ou non, endroit où poussent mauvaises herbes, près des forêts et des boisés en regain. CT: Cornouiller stolonifère, spirée à larges feuilles, sureau blanc
- Nidification Forêt claire de feuillus CT: cornouiller stolonifère, (arbre préféré pour nicher), spirée à larges feuilles, sureau blanc

Alimentation Graine d'aubépine*, blé cultivé, millet ssp.
Fruit: cerisier de Virginie, cornouiller stolonifère*.

BEC-CROISÉ À AILES BLANCHES - White-winged Crossbill - Loxia leucoptera

Habitat Forêt conifère mixte et claire, clairière et bord des bois, bosquet.

Nidification dans un conifère en tout temps de l'année

Alimentation Graine, bourgeons, insectes.

BEC-CROISÉ ROUGE - Red Crossbill - Loxia curvirostra

Habitat Forêt de conifère

Nidification Dans conifère au bout d'une branche à différente hauteur

Alimentation Cônes, graines et fruits d'arbres feuillus tels ormes, aulnes et arbres fruitiers. CT: graines de pommier nain

TOHI COMMUN (yeux rouges) - Rufous-sided Towhee - Pipilo erythrophthalmus

Habitat Terrain broussailleux avec des fourrés et recouverts de feuilles mortes, clairières. CT: Sorbier d'Amérique sureau blanc, spirée à larges feuilles

Nidification au sol ou près dans un arbuste nain

Alimentation CT: fruit de cerisier de Virginie, pommier nain, sureau blanc, airelle; graine: pommier nain, blé cultivé

PINSON DES PRÉS - Savannah sparrow - Passerculus sandwichensis ✕

Habitat humide et découvert, marais, prairies, champs, plantes herbacées en touffes

Nidification Dépression creusée au sol à l'abri de touffes d'herbes.

PINSON SAUTERELLE - Grasshopper Sparrow - Ammodramus savannarum

Habitat Champs abandonnés, de foin ou parsemés de mauvaises herbes.
CT: sorbier

Nidification Au sol dans les champs

Alimentation graines

PINSON À QUEUE AIGUE - Sharp-tailed Sparrow - Ammospiza caudacuta X

Habitat Marais salés ou saumâtres, prés herbeux

Nidification au sol en colonie éparses

Alimentation graines

PINSON VESPÉRAL - Vesper Sparrow - Poecetes gramineus

Habitat Champ en friche, bord de route, endroit à mauvaises herbes
CT: spirée à larges feuilles

Nidification au sol, découvert ou non

JUNCO ARDOISÉ - Slate-colored Junco - Junco hyemalis

Habitat Forêt de conifères ou mixte, clairière en bordure des bois, brûlis

Nidification Au sol ou tout près, le nid est caché par une plante.

Alimentation CT: fruit d'amélanchier

PINSON HUDSONIEN - Tree sparrow - Spizella arborea

Habitat Arbrisseaux en campagne, champs parsemés de mauvaises herbes
CT: spirée à larges feuilles

Nidification au sol

Alimentation CT: graines d'aubépine et de mauvaises herbes

PINSON FAMILIER - Chipping sparrow - Spizella passerina

Habitat	Clairières, bord de forêts, fourrés, arbres sur le bord d'endroits herbeux et genévrier commun, if du Canada, sureau blanc.
Nidification	Conifères, feuillus, buissons, de 3 à 10' de hauteur CT: genévrier commun
Alimentation	CT: if du Canada, sureau blanc.

PINSON DES CHAMPS - Field Sparrow - Spizella pusilla

Habitat	Champs en friche, pâturage en regain, buissons épineux, brûlis.
Nidification	au sol ou dans un arbuste

PINSON À COURONNE BLANCHE - White crowned Sparrow - Zonotrichia leucophrys

Habitat	Buissons, fourrés, clairières, bordure de forêts.
Nidification	au sol ou dans un arbuste
Alimentation	CT: fruit cerisier de Virginie

PINSON À GORGE BLANCHE - White Throated Sparrow - Zonotrichia albicollis

Habitat	Clairière, bord de forêt conifères ou mixte, fourré, brûlis, forêt non mature. CT: spirée à larges feuilles, sureau blanc, genévrier commun, sorbier
Nidification	Au sol sous un buisson ou touffe d'herbe
Alimentation	CT: cerisier de Virginie, sureau blanc*, cornouiller stolonifère, genévrier commun

PINSON FAUVE - Fox sparrow - Passerella iliaca

Habitat	Fourrés, bois broussailleux, brûlis, CT: aubépine, aulne rugueux
Nidification	Au sol, arbuste ou sous un arbre mort, CT: aubépine
Alimentation	CT: fruit aulne rugueux et autres graines.

PINSON DE LINCOLN - Lincoln's Sparrow - Melospiza lincolnii X

Habitat Tourbière, régions humides

Nidification au sol

PINSON DES MARAIS - Swamp Sparrow - Melospiza georgiana X

Habitat Régions humides, hautes herbes (quenouilles), marais

Nidification Dans une touffe de plantes paludéennes ou bas, dans un buisson

PINSON CHANTEUR - Song Sparrow - Melospiza melodia

Habitat Arbuste broussailleux sur le bord de cours d'eau, clairières en bordure de forêt, fourrés de ferme; CT: aubépine, if du Canada, sureau blanc.

Nidification Au sol ou arbuste; CT: aubépine, if du Canada.

Alimentation CT: fruit d'amélanchier, cerisier de Virginie, cornouiller stolonifère*, if du Canada; graine: d'aubépine et sureau blanc.

BRUANT LAPON - Lapland longspur - Calcarius lapponicus X

Habitat champs (chaumes) grèves

Nidification au sol ou dans des dépressions

PLECTROPHANE DES NEIGES - Snow Bunting - Plectrophenax nivalis X

Habitat Champ d'herbes, chaumes, grève

Nidification Trou dans les roches, en-dessous

Alimentation Graines de mauvaises herbes

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

1961-1962

Bibliographie.

Bamfield, A.W.F., 1977, Les mammifères du Canada, 2^{ed.}, Québec, Les presses de l'Université Laval, 406 p.

Conant, R., 1975, A field guide to reptiles and amphibians of eastern and central north America, 2^{ed.}, Boston, Houghton Mifflin, the Peterson Field Guide series, 366 p.

Godfrey, W.E., 1979, Les oiseaux du Canada, Ottawa, Musées Nationaux du Canada, 506 p.

Peterson, R.T., 1980, A field guide to the birds, A completely new guide to all birds of eastern and central north America, Boston, Houghton Mifflin, 384 p.

Robbins, C.S., 1980, Guide des oiseaux d'Amérique du Nord; guide d'identification sur le terrain, la prairie, Québec, Éditions M. Broquet, 340 p.

Société zoologique de Québec inc, 1983, Noms Français des oiseaux du Canada et des États-Unis Continentaux, Bibliothèque Nationale du Québec, 80 p.

Terres, J.K., 1980, The Audubon Society encyclopedia of North American birds, New York, 1105 p.



LISTE DES ERREURS

Espèces à ajouter aux mammifères.

- Ecureuil gris.
- campagnol lemming de Cooper.

Espèces à ajouter aux oiseaux.

- Pic mineur.
- pie grièche boréale.

Amélioration ou correction dans le nom. (soit Français, anglais ou latin)

Amphibien

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| - Salamandre ambreée | <u>Plethodon cinereus cinereus</u> |
| - Grenouille verte | <u>Rana clamitans melanota</u> |
| - Grenouille léopard | <u>Rana pipiens pipiens</u> |

Reptile

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| - Couleuvre rayée | <u>Thamnophis sirtalis sirtalis</u> |
|-------------------|-------------------------------------|

Oiseaux

- | | | |
|--------------------------|---------|-----------------------|
| - Butor Américain. | devient | Butor d'Amérique. |
| - Eider commun. | devient | Eider à duvet. |
| - Bec-scie commun. | devient | Grand-Bec scie. |
| - Pluvier à ventre noir. | devient | Pluvier argenté. |
| - Bécasse Américaine. | devient | Bécasse d'Amérique. |
| - Bécassine Ordinaire. | devient | Bécassine des marais. |



- Woodcock. devient Common Snipe.
- Upland plover. devient Upland Sandpiper.
- Grand-Duc. devient Grand-Duc d'Amerique.
- Engoulevent commun. devient Engoulevent d'Amerique.
- Merle Americain. devient Merle d'Amerique.
- Oriole de Baltimore. devient Oriole du Nord.

Signification des abreviation ou des symboles.

*: Nourriture, Habitat, ou niche préférés d'une espèce.

CT: À Cap Tourmente (RNF)